



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
254/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
254/D




Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
254/D

254

A. XXIX. Alt

~~a 738~~



59.21.21392

222

ANTONII

AB ALTOMARI 21292

312

MEDICI ATQVE PHILOSOPHI

NEAPOLITANI,



*Omnia, quæ hucusque in lucem prodierunt, Opera, nunc primum
in unum collecta, & ab eodem Auctore diligentissimè
recognita & aucta: cum locis omnibus
in margine additis.*

Horum omnium Elenchum sexta pagina commonstrabit.

I
N
U
I
R
T
V
T
E,E
T
F
O
R
T
U
N
A.

222

LVGDUNI,

Apud Guilielmum Rouillium, sub scuto Veneto.

M. D. LXXXVI.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

Extrait du Priuilege du Roy.

PAR grace & priuilege du Roy est permis à Guillaume Rouille libraire de Lyon, d'imprimer, ou faire imprimer, vne foys ou plusieurs, ce present liure intitulé *Donati Antonij ab Altomari medici atque philosophi Neapolitani opera omnia ab eodē auctore in vnu collecta, recognita & aucta*. Lequel liure il a recouvert avec grans fraiz, mises & despēses: & pour ce est fait de fensē de par ledict Seigneur à tous autres libraires, imprimeurs & personnes quelconques, de non imprimer, vendre, ne destribuer en ses païs, terres & seigneuries, ledict liure nouuellemēt imprimé par ledict Rouille, si ce n'est par son consentement, & ce iusques au temps & terme de neuf ans, à compter du iour & datte que sera paracheuee la premiere impression, sur peine d'amende arbitraire & de confiscation des liures qu'ils auroient imprimez. Et afin qu'aucun ne puisse pretendre ignorance du present priuilege, ledict Seigneur veut & entend, que l'extrait d'iceluy estant mis au commencement dudict liure serue pour toute notification, sauf en demander copie audict Rouille (si bon leur semble) & ce à leurs despens. Car tel est son plaisir, non obstant oppositions & appellations quelconques, comme plus à plein est contenu & declaré par lesdictes lettres de priuilege, sur ce donnees à Paris, le deuxiesme de Decembre, mil cinq cens soixante & trois, & de son regne le quatriesme,

Par le Roy, à vostre relation,

Signé, DE VABRES.

Et scelé du grand seau en cire iaune à simple queue.



DONATVS ANTONIVS

AB ALTOMARI, VIRGILIO

RICCARDO S. D.



*Q*UUM in unum cogere mea opuscula decre-
uissem, qua iamdiu sparsa, fusaque & mendis
referta (typographorum negligentia) vide-
bantur, ea qua es doctrina & diligentia fretus,
dum Venetiis te contineres, sub tuo aspectu
subiicere volui: fieri etenim non potest, quin
propterea mendis non vacent: idque eo magis
facere constitui, quum te mei defensorem acerrimum semper agnoue-
rim, in hac praesertim tam suspiciosa & maledica temporum turbulen-
tia, in qua nemo est qui locum barbaris obrectatoribus non relinquat.
Nec ut opera hac essent praeciosa & ingenij mei monimenta effeci, sed
quod amicorum petitioni satisfacerem, & fructus extarent otij pome-
ridiani ad Galen. semper & Hippocr. mentem ex nostro instituto.
Accipias igitur amice beneuoleque, ut decet, deque mea erga te bene-
uolentia aliquid agnoscas. Accedit & de sanitatis latitudine hoc
paruum opusculum nuper elucubratum his iam contractioribus nocti-
bus meorum discipulorum, tuique (ut nosti) studiosissimorum causa:
quibus tum in me obseruantia, tum etiam singulari amore, non potui,
non satisfacere. Quod si qui pertinacia adducti, aut maleuolentia po-
tius suffusi, audeant contradicere, sciant non mihi sed Galeno se contra-
dicturos, quicum errasse malo, quam ad aliorum mentem recte sapere:
nec grauentur quid, quaque de re sentiant scribere, ut non contradicendo
tantum, sed scribendo posteritati prodesse videantur: erunt etenim ex
nostra Academia eis praestantes tecum, qui partes non secundas sustines,
quantum in Galeni doctrina Neapoli profecerint. Vale, meque, ut
soles, ama, & quoad fieri potest effice, ne mendose minuta hac opuscula
ad nos veniant, in apertumque iterum referantur.



VIRGILIUS RICCARDVS

SANSEVERINAS,

Ad studiosos.



IPPOCR. rei medicæ ceu primus inuentor, nec debitum ordinem dedit, nec quæque ad vnguem finiuit, obscuræque pro antiqua dicendi breuitate est interpretatus, artis tum huius nobilissimæ copiosa semina reliquit, quæ plerique corruerunt: Diuinissimus Galen. vt optimus agricola ea cum commodè seruit, auxit, tum perfecit, verùm non absque, propter rei magnitudinem, atque difficultatem, in aliquibus obscuritate, prolixitateque ac apparenti, in quibusdam contradictione. Accedit vir Diuinus huiusmet Artis Hippoc. Galenique sententiarum fidelissimus cultor, qui in dies industriis hominibus ac natura prudentibus non vulgarem vtilitatem afferre conatur. Diuis Senis semina optimè exarando, sparsim res à Galen. confusæque tum prolixè tractatas, miro ordine colligendo, lucidissima oratione explanando, atque eum ab omni contradictione vindicat. Inter hæc viri studiosissimi tractatum de venæ sectione in vtero gerentibus ad mentem Senis, & Galeni lucidatum atque denuo recognitum habetis. Demum ex eius lucubrationibus de latitudine sanitatis opusculum emanat ex sententia Galeni elicited, cuius prælectione in libro artis medicæ obscurissimè à Galeno adiecta, sole clariora nobis patefiunt, vniuersæque dubia à confusoribus ducta facillimè eluuntur. Interea pro viro Diuinissimo multos annos precamini: fortasse hunc Deus creauit, ne ignoraremus possibilia scitu in re medica. Deerant loci præcit. lib. eos addidit. Verùm doleo cum sub meo aspectu subiecisse voluerit, putans me quandiu

Venetiis commoraturum, ac vrgentem ob causam Bononiam

accedere opus mihi est, spero tamen omni menda

carentia opuscula hæc in lucem prodibunt.

Valete. Venetiis, xvi.

Calen. Martij.

* *



DONATI ANTONII

AB ALTOMARI MEDICI,

AC PHILOSOPHI

NEAPOLITANI,

Quod vtero gerentibus pro præseruatione abortus, venæ sectio non
competat: ex Hippocr. & Galen. sententia,

AD MARCV M ANTONIV M FALCONIV M,

PROEMIV M.



*Q*uoniam nonnulli nostri temporis Medici empirici
potius quàm rationales, ad pauca respicientes,
cùm primum ad vtero gerentes mulieres accer-
suntur incognita causa abortus, à qua solent aliàs
abortum pati, vel quæ posset esse in futurum, nulla
habita indicatione à totius temperamento, nec à
temperamento genitalium partium, ab habitu, ætate, consuetudine,
anni tẽpore, & denique antea acta vita, statim ad sanguinis missionem
accedunt eamque fieri iubent, tam si adsit sanguinis fluor ex uteri vasis,
quàm si non adsit. Ex quo non parua noxa pauperculis mulieribus,
verùm etiam fœtui comparatur. Visum fuit mihi, cùm tu, charissime
Marce Antoni, sepe, & alij quidam amici me nunc hortentur ad hoc,
paucissimis quantum potero verbis differere, quæ eo casu mihi videan-
tur: simul studens & tibi gratificari, & posteros pro viribus iuuare.
Sed, ut clarius veritas elucescat: hunc seruabo ordinem. Primò suc-
cinctam uteri constitutionem, eiusque sympathiam, siue naturalem
consensum describam. Secundò constitutionem, formationem, ac alli-
gationem fœtus cum ipso vtero, & qualiter, & quo sanguine
nutriatur ostendam. Tertiò quot, quæve sint in vnuer-
sum causa abortus dinumerabo. Quartò veritatem
quesiti dilucidabo. Quintò, & ultimò
obiectiones in contrarium
tollam.

INDEX LIBRORVM

TOTIVS OPERIS.

De vtero gerentibus.	pag. 1
De Alteratione, Concoctione, Digestione, Præparatione, ac Purgatione.	11
De sedimento in vrinis.	43
Quòd functiones principes, iuxta Galen. decreta, anima non in cerebri sinibus, sed in ipsius corpore exerceat.	53
Quòd naturalis spiritus in Galen. doctrina admittatur, & non omnino sit abolendus, vt quibuldam visum est.	63
Quòd exquisita tertiana, ad eiusdem Hippocratis & Galeni sententiam, in genere acutorum morborum contineatur.	70
De sanitatis latitudine.	83
De medendis humani corporis malis: Ars medica.	103
De medendis febribus. 443	De pestilenti febre. 599
De Mannæ differeñtiis, ac viribus, deq; eas dignoscendi via & ratione.	621
De Vinaceorum facultate, ac vsu.	638

EORVM OMNIUM, QVÆ

*toto hoc volumine describuntur,
capitulum Index.*

Quòd vtero gerentibus pro præseruatione abortus venæ sectio non competat ex Hippocr. & Galen. sententia.	pag. 1
De Natura. 13	De calido innato. 14
Quòd Ars medica & medici sint necessarij.	ibidem
De Alteratione.	ibidem
De Concoctione. 20	De Digestione. 26
De Præparatione. 28	De Purgatione. 32
An in principiis morborum, materia non turgente, purgante medicamento vtendum sit.	35
De Sedimento in vrinis.	43
Quòd functiones principes iuxta Galeni decreta anima non in cerebri sinibus, sed in ipsius corpore exerceat.	53
Quòd Naturalis spiritus in Galeni doctrina admittatur, & non omnino abolendus sit, vt quibuldam visum fuit.	63
Quòd exquisita tertiana ad Galeni sententiam in genere acutorum morborum reponenda sit.	70
De Sanitatis latitudine.	83

EORVM



FORVM QVÆ IN ARTE MEDICA

DESCRIBVNTVR CAPITVM INDEX,

In quo prior numerus caput,
posterior paginam
indicat.



E Methodo artis Medi-
ca, deque aliis ad eam
rem aut necessariis, aut
scitu dignis in presen-
tione pag. 103

De memoria deperdita cap. 1. pag. 113

De lethargo 2. 117

De caro 3. 119

De catocoe, vel de catalepsi 4. 120

De comate, seu de cataphora 5. 121

De phrenitide 6. 123

De melancholia 7. 128

De furore, seu insania 8. 133

De lupina insania 9. 136

De capitis dolore 10. ibid.

De cephalaea 11. 147

De hemicrania 12. 148

De convulsione 13. 149

De resolutione 14. 153

De convulsione canina 15. 157

De incubo 16. ibid.

De vertigine, & tenebrosa vertigi-
ne 17. 158

De epilepsia seu morbo comitiali 18. 161

De apoplexia 19. 168

De lippitudine 20. 171

De ungue oculi 21. 176

De supuratione 22. 177

De oculorum ulceribus 23. 178

De cicatricibus & albuginibus 24. 179

De pustulis 25. ibid.

De proidentia oculi 26. 180

De mydriasi, seu pupillae dilatatione
cap. 27. pag. 181

De tabe pupillae 28. 182

De suffusione 29. 183

De obscuritate, seu offuscatione oculo-
rum 30. 186

De nyctalope 31. 187

De egilope 32. 188

De aurium dolore 33. 189

De aurium sonitu 34. 191

De difficili, seu gravi auditu, & surdi-
tate 35. 192

De parotidibus 36. 193

De lesione olfactus, & narium vitii 37. 195

De ozenis 38. 196

De polypo 39. 197

De sanguinis ex naribus eruptione 40. 198

De dentium dolore 41. 200

De aphthis 42. 203

De distillatione, raucedine, & grauedi-
ne 43. 205

De inflammatione gurgulionis 44. 208

De glandularum iuxta linguam inflam-
matione 45. 211

De angina 46. 212

De tussi 47. 216

De difficultate spirandi 48. 220

De cruenta spuitione 49. 224

De laterali dolore, seu morbo 50. 232

De pneumonia 51. 244

De empyemate, seu suppuratione 52. 247

De tabe 53. 251

De palpitatione cordis 54. 258

De syncope 55. 260

De lactis defectu 56. 266

De lactis redundantia 57. 268

INDEX.

De lacte in casei speciem seu grumos conuerso	58. 269	De inflammatione lienis	88. 358
De mammarum inflammatione	59. 270	De scirrho lienis	89. 360
De cardiaco morbo, & cardialgia, seu cordis dolore	60. ibid.	De malo corporis habitu	90. 361
De canina appetentia	61. 174	De aqua inter cutem, seu hydropico morbo	91. 363
De citra, sine picca	62. 176	De diabete	92. 369
De bulimo, seu ingenti esuritione	63. 277	De sanguinis renum profluvio	93. 372
De cibi fastidio, seu inappetentia	64. 278	De lapide renum	94. 374
De immoderata siti	65. 281	De inflammatione renum	95. 379
De singultu	66. 283	De exulceratione renum	96. 381
De supinitate, stomachi subuersione nau- sea, & vomitu	67. 285	De stillicidio urine	97. 383
De inflammatione stomachi, vel ven- triculi	68. 290	De difficultate urine	98. 385
De cruditate	69. 291	De suppuratione urine	99. 387
De inflammatione ventriculi	70. 294	De his, qui in seipsis mingunt, vel de his, qui urinā continere nō possunt	100. 398
De leuitate intestinorum, & celiaca, seu ventrali affectione	71. 296.	De lapide vesicae, seu calculo	101. 391
De cholera	72. 300	De inflammatione vesicae	102. 393
De alui profluvio, seu vetricis fluxu	73. 302	De exulceratione vesicae	103. 394
De dysenteria, seu torminibus	74. 308	De seminis profluvio	104. 396
De tenesmo, seu tinesmo	75. 315	De priapismo, & satyriasi	105. 398
De hemorrhoidibus	76. 317	De ignavis partibus genitalibus	106. 401
De ragadiis	77. 322	De uteri affectibus, & primò de men- suum suppressione	107. 403
De procidente ano, vel de procidentia ani	78. 323	De immodica purgatione uteri, & san- guinis profluvio	108. 406
De colico affectu, seu coli dolore	79. 324	De muliebri profluvio	109. 408
De ileo, seu voluulo	80. 329	De uteri strangulatione, seu suffocatio- ne	110. 410
De lumbricis	81. 333	De uteri prolapsu, seu procidentia	111. 413
De Hepaticis, vel iis, qui iocinoris imbe- cillitate laborant	82. 338	De mola	112. 414
De hepatis obstructione	83. 343	De nō concipiētibus, siue sterilibus	113. 417
De inflammatione hepatis	84. 346	De difficultate partus	114. 420
De scirrho, seu tumore scirrhoso hepa- tis	85. 349	De secunda derelicta	115. 424
De ictero, seu morbo regio	86. 352	De uteri inflammatione	116. 425
De nigro ictero	87. 356	De exulceratione uteri	117. 427
		De ischiade, seu coxendicu dolore	118. 428
		De podagra, & arthritide, seu morbo articulari	119. 432

EORVM



EORVM QVÆ IN LIBRIS DE MEDENDIS

FEBRIBVS DESCRIBVNTVR,
capitum Elenchus primæ
partis.

PROEMIVM.



QVA via vtendum in hac
methodo constituenda.
cap. 1. pag. 443
Quid non sit methodus.
cap. 2. ibid.
Quid sit methodus. cap. 3. 444
Quo inuentionis instrumento, febrium
auxilia inuestiganda. cap. 4. 445
Quid febris significet, & quis calor sit.
cap. 5. 446
Explicantur variæ febris definitiones, ac
ostenditur in corporibus nostris du-
plex esse calidum. cap. 6. 448
Impugnatur Platonis opinio de calido
innato. cap. 7. 449
Quid sit calidum innatum apud Hippoc.
& Galenum. cap. 8. ibid.
Quid sit calidum acquisitum. cap. 9. 451
Qualis sit febris natura, quæue eius de-
finitio. cap. 10. 453
Quòd febris subiectum sit calidum in-
natum. cap. 11. 454
Quot sint primæ & essentielles febrium
differentiæ. cap. 12. 455
Quòd nulla febris generari possit, quin
cor afficiatur. cap. 13. 456
Quot, quibûsve modis febres omnes ge-
nerari contingat. cap. 14. 457
Quid sit febris diaria, & quomodo digno-
scatur. cap. 15. 459
Febres ex putredine ortas via, & digno-
scendi ratio. cap. 16. 461
Cur febres hecticæ appellantur, & quo-
modo generantur. cap. 17. 463
Num omnes partes quæ solidæ appel-
lantur in febribus hecticis accendantur,
& num semper cum siccitate co-
pulentur, & quemadmodum cum Ma-
rasmo conueniant & dissideant. cap.
18. 464

Quomodo vnum, duo, & tria, dici pos-
sint febrium hecticarum genera. cap.
19. 466
Quæ sint febrium hecticarum indicia
communia, examinaturq; exemplum
Gal. de calce aqua conspersa. cap. 20.
pag. 467
Cuiuslibet febris hecticæ particularia in-
dicia, & quòd ab yrinis pro earum di-
gnotione nullum sumatur proprium
indiciu. cap. 21. 469
Quòd hæc nostra methodus per indica-
tionem fiat, & quid sit indicatio. cap.
22. 472
Aduersus eos, qui parum rectè quid indi-
catio sit, intellexerunt: tum quid ex
Galen. sit indicans, indicatum, expe-
rientia, & analogismus. cap. 23. 473
Quomodo indicantibus, & coindicanti-
bus vtendum: vt quòd falsò per con-
traindicantia, prohibentia intellexe-
runt quidam, superfluoque correpu-
gnantia addiderint. cap. 24. 474
Quid per contraindicans & contraindi-
care in Galen. doctrina intelligendum
sit. cap. 25. 476
Quid sit totius artis medicæ commune
propositum, quidve huius nostræ me-
thodi proprium: ac quæ sit prima illa
vniuersalissima indicatio omniû præ-
ter naturam affectuum, à qua curandi
methodus exorditur. cap. 26. 477
Quomodo prima illa omnium curatio-
nis indicationum, quæ ex ipso qui cu-
ratur affectu desumitur, contrarieta-
tem, ac contrarium docuit. cap. 27.
pag. 478
Soluuntur rationes eorum, qui contrarie-
tatem aduersus Gal. curationem non
indicare contendunt. cap. 28. 480
Rationes

INDEX.

- Rationes, quibus quidam probare conantur, aërem curationem non indicare, diluuntur. cap. 29. 483
- Soluuntur rationes eorum qui naturalem corporis temperiem pro morborum curatione nihil indicare contendunt. cap. 30. 486
- Proponitur primorum trium scoporum indicantium diuisio, soluiturque Gale. cōtradictio de indicatione quæ à morbo sumitur. cap. 31. 488
- Aëris nos ambientis, & corporis temperiei in particulares scopos indicantes diuisio. cap. 32. 490
- Diluuntur rationes eorum qui probare nituntur, ætatem, consuetudinem, vitæ institutum, ac alia quædam, curationem non indicare. cap. 33. 491
- Num à viribus sumenda sit indicatio pro morborum curatione. cap. 34. 494
- Responsio ad obiectiones eorum, qui vires ad morborum curationem, nihil indicare, probare conantur. cap. 35. 496
- In quot quibusve generibus præsidiorum materiæ contineantur. cap. 36. 497
- De temporis occasione, & vnde capiendum sit opportunum auxiliorum tempus. cap. 37. 500
- Methodi medendi febres, quæ febres sunt, compendiosa repetitio. cap. 38. 503
- Febrium hecticarum medendi methodus. cap. 39. 505
- Continentium absque putredine febriū, dignotionis, & generationis modus ac curationis via. cap. 40. 507
- Febrium ex putredine ortarum curatiua methodus. cap. 41. 510
- Methodus medendi humorum putredinem vbi eius causæ non adsint, sed iam abierint. cap. 42. 511
- Curatiua methodus putredinis humorū, manentibus adhuc quæ eam excitauit causis. cap. 43. 513
- Abundantiæ humorum curatio. cap. 44. pag. 515
- Humorum crassitie, aut lentitie obstruentium, ac ipsius obstructionis, & prohibitiæ transpirationis curatiua methodus. cap. 45. 516
- Methodus medendi putredinem, tam per totum animal diffusam, quam si in vna quadam parte consistat. cap. 46. 518
- Putredinis in quapiam parte existentis, citra phlegmonem & cum phlegmone curatio. cap. 47. 520
- Soluuntur rationes quibus quidam probare nituntur quod indicationes quæ ab affectis partibus sumuntur, ad curationem non conducunt. cap. 48. 523
- Quibus potissima ratione vires custodiantur, ac quomodo vestiganda sit nutrimenti quantitas. cap. 49. 525
- Nutrimēti qualitas ex quibus desumenda sit. cap. 50. 528
- De particulari exhibendæ alimonie tempore. cap. 51. ibidem.
- Quo accessione tempore præter inclinationem cibis cum maiori noxa offeratur, ac quomodo in omnibus morbis instituenda sit victus ratio. ca. 52. 530
- Quomodo eorum quæ indicant magnitudo spectanda, & quotuplex ea sit: ac qua ratione vbi plures coeant indicationes magnæ, inter se conferendæ sint. cap. 53. 533
- Nonnullis exemplis, ratio spectandi indicationum magnitudines, examinatur. cap. 54. 535

SECUN

SECVNDÆ PARTIS CAPITA.

- Q**ua via particulares febrium differentia inuestigantur, ac proponuntur quæ ex humorum putredine excitantur, differendæ. cap.1. 539
- Quid per continuas & intermittentes febres intelligendum, cur utræque fiant, & quomodo inter se dissideant. ca.1. 540
- Quot modis continuæ & intermittentes febres generari possint. cap.3. 541
- Propter quid in intermittentibus, & non in continuis, rigor, horror, seu extremarum partium refrigeratio fiat: & quamobrem eadem in earum accessionum principis fiant, & naturalis calor intus se colligat. cap.4. 544
- Epilogantur quæ dicta sunt de causa motus caloris naturalis in principis accessionum: ac ostenditur alia ratione ipsum moueri, ubi in visceribus magna fuerit inflammatio orta, aut erysipelas: confirmaturq; intermittentes febres fieri non posse, nisi per corporis habitum humor putrescens deferatur cap.5. 546
- Quomodo tres intermittētium febrium differentia conueniant, & dissideant inter se, & continuarū ex bile ortarum subdiuisio cap.6. 547
- Qua ratione ex putrescente intra vasa flaua bile febris synochos dicta accendatur, & quod similiter ex aliis humoribus generari possit, nedum ex solo sanguine cap.7. 548
- Quid per *nauos* seu febres ardentes sit intelligendum cap.8. 550
- De continuarum febrium quæ plures accessiones habent conuenientia, & differentia. De epiala, & compositis febrium differentiis. Deque singulas particulares febres ex putredine ortas, curandi via cap.9. 552
- De quotidiani, tertiani, & quartani circuitus causa cap.10. 554
- De quintanis, septimanis, ac nonanis circuitibus, longitudine & breuitate, ac ordine, & perturbatione ordinis ipsarum accessionum cap.11. 556
- De febre sanguinis, & quod ipse interdū putrescat, permaneatque sub forma propria, & febris ex eo orta, sit sanguinea cap.12. 557
- Quod licet febris orta ex putrescente sanguine sit sanguinea, potest tamen biliosa appellari, quo fit ut non detur quartum genus febrium cap.13. 560
- Quod febres ex putrescente sanguine ortæ, non sint de genere ardentium ca.14. 562
- Quod febres, quæ ex sanguinis putredine generantur, sint de genere acutorum morborum cap.15. 564

PARTIS TERTIÆ SIUE EXERCITATIONIS CAPITA.

- D**e dignotione prognostico, ac curatione febrium ex putredine sanguinis accensarum cap.1. 567
- De causis, id est ardentis febris dignotione, prognostico, ac curatione ca.2. 569
- De exquisita tertianæ dignotione, prognostico, & curatione cap.3. 574
- De tertianæ nothæ dignotione, prognostico, ac curatione cap.4. 578
- Exquisita quartanæ causa, dignotio, prognosticum, ac curatio cap.5. 581
- De exquisita quotidianæ dignotione, causa, prognostico & curatione ca.6. 587
- De semitertianarum differentiis, earumque dignotione, prognostico, & curatione cap.7. 592
- De febrium hecticarum prognostico, ac curatione cap.8. 594
- Hecticarum febrium cum tabe curatio cap.9. 597

TRACT

TRACTATUS DE PESTILENTI

FEBRE CAPITA.

Quid per communes, quidve per dispersos, & dissimiles morbos subintelligendum sit, ac ex quibus causis proficiantur cap. 1. 599

Quot modis aer nos ambiens, qui communium morborum auctor est, in calido, frigido, humido, & secco, alteretur cap. 2. 600

Quod pestis è genere sit vulgare, & non aliorum communium morborum, & quomodo ab eis etiam dissideat cap. 2. 602

Quod ut pestilentes morbi generentur opus est, nedum in manifestis qualitatibus, verum etiam secundum totam substantiam aerem immutari cap. 4. 603

Quomodo ac quibus ex causis aer putrescat: & quod ex eo, & non abditis causis pestilentes morbi fiant cap. 5. 605

Quid sit febris pestilens, & quod non nisi ex pestilenti aeris statu proficiatur: soluunturque rationes in contrarium cap. 6. 607

De modo generationis pestilentium febrium, & quod in nullo trium primorum genere contineatur cap. 7. 608

De pestilentium febrium dignotione ac prognostico cap. 8. 612

De pestilentium febrium curatione cap. 9. 614

Quomodo & quibus à pestilentia quis præservari possit cap. 10. 618

FINIS.

PARTIS TERTIÆ SIVE EXE

De dignotione & curatione febrium pestilentium cap. 1. 619
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 2. 620
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 3. 621
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 4. 622
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 5. 623
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 6. 624
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 7. 625
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 8. 626
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 9. 627
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 10. 628

De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 11. 629
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 12. 630
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 13. 631
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 14. 632
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 15. 633
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 16. 634
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 17. 635
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 18. 636
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 19. 637
De dignotione & curatione febrium non pestilentium cap. 20. 638

TRACT

R E R V M O M N I V M, Q V A E
H O C I N V O L V M I N E C O N -
T I N E N T V R, I N S I G N I O R V M
C O P I O S I S S I M V S I N D E X.

A Borſus in utero gerentibus, cauſe pag. 4.	tia Athenis	608
& ſeq. vſque ad ſin. cap.	Aëris frigidiſas, pro diuerſa parte, quæ in hectica pri-	
Abortus quid	miſum afficitur, admittenda eſt	505
Abſynthium intus, repurgare poteſt,	abſque Aëre neque ſanitas illa ſeruari, nec morbus	485
foris non poteſt	quiſpiam propuſari vnquam poteſt	600
Abſynthium in tertiana quando competit	Aër duobus modis mutatur	104
Abundantia aliis etiam tollitur, quàm venæ ſectiōe	Affecta partis cognitio ex quibus	187
Abundantia humorū ante obſtructionē tollenda eſt	Affectus per conſenſum quot modis ſiant	ibid.
Abundantia humorum qualibet fuerit, venam pro eius	Affectus trifariam magni redduntur	104
ſublatione ſecare oportet	Affectorum locorum notitia, quos præſtet vſus	167
Abundantia ſlaua bilis vt plurimum pueros infeſtat	Agarici laus	424
Accreſſionis & intermiſſionis tempora non indicant ci-	Alantoides membrana (qua Latine inteſtinalis dici-	4
bandi tempus	tur) vnde & quomodo fiat	4
Accreſſiones exquiſitæ ſemiterſiane febris quales	Alantoides prius quàm Amnios in utero fabricatur	179
Acria, ſalfa, & nitroſa, atque etiam amara facultatem	Albugines in oculis vnde ſiant	278
habent craſſos humores ac viſcidos tenuandi, & in-	gnoſtica, & curatio	ibidem
cidendi	Alexandri hiſtoria mirabilis de muliere quadam	18
Acria, ſi pregnans amara vel aſpera præter conſuetu-	Alienus calor, ſeu non naturalis, corruptionis cauſa eſt	6
dinem comederit, abortum facit	Alimenti defectu per ſe foetus deſtruitur	45
Actio lienis quid ſit	Alimenti quicquid ad recur peruenit, ad ſanguinē im-	46
Actiōes partium duplices ſunt, pro duplici earum na-	mutatur, nec quicquam remanet inalteratum omnino	26
tura	atque immutatum	42
Acutus quilibet morbus, tam cum febre, quàm ſine fe-	Alimentorum digeſtionem à concoctione diſſerre con-	16
bre, lethalis eſt, vt pote, tam ſortum, quàm fuerantem	ſtat ex Galeno	16
perimens, ſecundum Galenum	Alopeciam curare ſi velis, primitus euacuatione vtire,	16
Acuta febris, vel aliquo humorū putreſcente, vel mem-	qua medicamentis purgantibus ſit	16
bro inflammationem patiente generatur	Alteratio eſt mutatio in qualitatē ſeu demutatio eius	16
Acuti morbi in quatuordecim diebus indicantur	qua prius fuit qualitatē	16
Acuti morbi ſunt, quicquid propria tempora vſque ad	Alteratione & auxiliorum præparatione vtimur in fe-	18
finem velociter pertranſeunt 74. & quomodo di-	bribus, quæ ex putreſcentibus excitantur humoribus	20
gnoſcantur	ibidem	16
Acutorum morborum natura cum febre, præſertim, du-	Alterationes in animalium corporibus ſunt tres ſecun-	16
plex eſt	dum Galenum	16
Acutorum morborum omnium natura propria eſt, vt fe-	Alterantia medicamentorum natura duplex	16
bre continuiam habeant	Alui profluuium poteſt abortum facere, auctore Gale-	5 & 6
Acutis in paſſionibus, in principiis, medicinis purgan-	no	304
tibus raro vtimur	Alui profluuium vnde 302. eius ſigna 303. cauſa 304.	ibidem
Aeger eo cali ſtatu vti cogitur, in quo ægrotauit, velit,	Alui deiectione ſi rufa ſeu admodum crocea fuerit, bilem	305
nolit, etiam in leuioribus morbis, vſquequo in alium	eſſe cauſam percipies	304
aërem migrauerit	Alui profluuii cauſa ex excrementis dignoſcitur	29 & 30
Aegilops quid ſit 188. eius cauſa ibid. curatio ibid.	Amara nitroſa quæcūque ſunt, ad purgandos me-	474
Aetia & conſuetudo non immediatē conferunt ad in-	tus omnes valent	366
uentionem remediorum, ſed immediatē ad effectum	Amnios membrana (hoc autem Latini Amiculi no-	198
cognitionem	minat) quid, eius fabrica & vſus 3. & 4. 423. & 424	104
Aetas puerilis ſlaua bile vt plurimum infeſtat	Amuleta, quæ capiti circumpoſita, & alligata dolorem	236
Aër, donec propriam ſeruat naturam, vel ſubſtantiam,	eius arcent	213
putreſcere nullo modo & peſtilens reddi poteſt	Analogiſmus quid ſit	
Aër facilis quàm aqua caleſcit, atque frigefcit	Anaſarca quid ſit 364. eius ſigna ibid. curatio	
Aër peſtilens quare huic & non illi animantium generi	Anaſtomofis ex quibus cauſis fiat	
eſt infeſtus	Anaſtomofis vſus medico maximē eſt neceſſarius	
Aër in omnium morborum curatione ſpectandus eſt	Anaxioni pleuritico octauā die venam ſecuit Hippo-	
Aër nos ambiens eſt tanquam cauſa ſine qua non ibid.	crates	
Aër quæ ratione indicatur, & quæ ratione indicat ibid.	Angina quid ſit. 212. eius ſigna	
Aëris diuiſio in præſentem cœli ſtatum		
Aëris ambiens caliditas immodica, cauſa fuit peſtilen-		

Angina curatio 212
Angina differentia quatuor 212
Anhelatio quid sit 221
Anhelosi qui dicantur ibidem
Ani procidentia quid sit 324. eius causa ibid. curatio ibidem
di ratio ibidem
Anima functiones principes non in cerebri sinibus, sed
in ipsius corpore exercet 53
Anima tres sunt partes ibidem
Anima functiones quare dicantur principes 54
Anima vis affertur a corporis malis 60
Animalis spiritus est exhalatio quadam sanguinis be-
nigni 65. 66. & 67
Animalis spiritus anime primum est instrumentum pro-
sensibilibus ac voluntariis motibus persciendis 54.
 55. & 59
Animalis spiritus ex vitali quomodo fiat 55 & 65
Anni temporum temperatura qua sunt 600
Annone caritas, qua multas nationes Imperio Romano
subditas affluxit, quia herbis omnis generis vesce-
bantur homines, multarum agritudinum causa fuit
 609
Antiades quid sint 211. causa ibid. curatio ibid.
Antonius Musa Brasaulus, & Petrus Andreas
Matthiolus vtramque mannam ab Oriente allatam
conspexerunt 626
Aphte ubi, & quomodo fiunt 203. & 204
Apoplexia quid sit 168. eius signa ibid. causa 170.
curatio ibid.
Apoplexia differentia quatuor 169
Aqua facilius quam omnia terrena corpora calet, at-
que frigescit 624
Aqua intercutem unde nomen sumpserit 363
eius signa 364. causa 365. curatio 366
Aquarum calidarum usus commodi caliditatem mo-
dicam efficere possunt 23
Aqua frigida intempestivum potum qua sequantur in-
commoda 509
Aque frigida potus, & sanguinis detractio duo sunt
continentium febrium maxima remedia 568
Aquam quomodo frigidissimam reddere possumus 623
Ardens febris & tertiana inter ceteras sunt biliosissima
 77. & 78
Ardentis febris curatio 61
Ardentes omnes febres etiam acute sunt 563
Ardentissimis in febribus, si usque ad animi defectio-
nem sanguis mittatur, totius corporis habitus statim
refrigeratur, & febris extinguitur 565
Armenia terra in pestilenti febre maxime commendatur
 616
Armenus lapis (si forte reperitur) in pestilenti febre
magnopere utilis est ibidem
Ars medica prior est dignitate medicis ipsis 15
Ars secandi corpora medico non est ignoranda 104
Artem medicam nihil aequè in agendo coniecturalem
efficit, vi cuiusque remedi quantitas 33
Artibus in rationalibus de nominibus disceptandum
non est, sed rerum habendaratio 475
Arteria aspera exulcerata signa 252
Artificiosa coniectura quantitas purgantis medica-
menti cognoscitur vel singulorum aliorum praesidio-
rum 20
Articulus quid sit 428
Articularis morbus quid sit 432
Ascarides tertium lumbricorum genus 332. eorum si-
gna 335. curandi ratio 337
Ascites quid sit 364. signa ibid. curatio 367

Aster morbus regius quid sit 356
Athleta in sanitatis ratione sunt miserrimi 595
Athleta a misero sive a miseria denominati sunt 92
Athletarum affectus non sunt secundum naturam ibid.
Auditus difficilis quis dicatur 192
Audiendi primum instrumentum quid sit 189
Aurium sonitus quid sit 191. eius cause ibid. curatio
 192
Auxilia tunc dicimus natura ministrare, cum auxilio-
rum materie in tempore, atque ut decet ab aliquibus,
humanis corporibus applicantur 15
Auxilia, quae concoctionem & digestionem adiuvant,
italia a medico paranda sunt, ut calidum innatu, seu
naturam ipsam roborent atque adaugeant, vel saltem
non dissipent, sed quo ad possunt, servent 27
Auxiliorum quantitas ad rectè medendum plurimum
conferit 501
Auxiliorum eorum temperatura, quae naturam in matu-
rationibus iuvant, commodiorata, ac similis ei corpo-
ri, cui admoventur, esse debet 22
Austera vicia, si suspensa diutius fuerint, dulciores red-
duntur 639
Authoris uxor a coxendicium dolore ex vinaceorum
usu, liberata fuit 643

B

Balneum aquae dulcis, si febris magnitudo non ob-
ster, apertissimum est 519
Balneum quale in febre ardenti faciendum 574
Balneum alia atque alia ratione inter facienda & foris
incidentia numeratur 498
Balneum aquae dulcis, & pitanae succus ad continen-
tis febris sine putredine curationem valet 509
Balneo adhibendo iria sunt necessario spectanda 513
Balneum aquae dulcis helictis maxime est commodum
 597
Barbari quidam & empirici medici falso nimiam cibi
& potus repletionem probarunt 615
Barbari serui historia 169
Bilis flava qua ratione concoquitur 25
Bilis flava si urgeat circa initia, priusquam in aliqua
parte firmetur, nulla expellata concoctione, statim
purganda est 25. & 26
Bilis flava in aetate puerili maxime superabundat 78
Bilis iuvenibus ratione etatis plurimare undat ibid.
Bilis in sanguinis substantiam reducere non valet 21
Bilis nigra cum flava in quo conveniat 556. in quo item
ab eadem differat ibid.
Bilem causam esse alui profluuij indicant rufa, seu ad-
modum crocea excrementa 304
Biliosus sit sanguis, cum putrescit, non statim bilis 560
Biliosi si fuerint ac tenues humores, inter initia eva-
cuandi sunt 40
Biliosis ex succis febrem ardentem generantibus si va-
pores ad caput ascendant non multi, nec admodum
acres, delirium oritur 62
Biliosum semper acutos morbos operatur 76
Biliosissima inter ceteras febres sunt tertiana & ardēs
febris 78
Biliosa fluxionis signa 619
Bonus habitus quid sit 84
Bubones etiam si in febre pestilentiali appareant, vena
nihilominus secanda est 615
Bubulum lac, si febris non urgeat, tepidum recensque
multum, ac potatum magnopere auxiliatur 306
Bubulis sterens cum hordeacea farina in aqua decocti
podagricis

Bulimos, seu ingens ejusio, quia sit 277. causa ibid.
curatio 278
Bulimos quibus cum canina appetentia cōueniat, quibus item ab eadem disteat 277
Bulimos ut generetur, tria sunt necessaria ibid.
C
Acobymia quid sit 535
Cesar de Rhodi cum ignem in quadam sylua pro carbonibus faciendis accendisset, ex orno, quae prope fornacem aderat, mannam resudasse propriis oculis vidit 651
Calabri, Sammites, & I' estini concretam manam quontannis colligunt ex fraxino & orno 616
Calculi in renibus generationis modus 375
Calculo laborantis vesicae signa 391. causa 392. prognostica ibid. curatio 393
Calculi pueris innasuntur ob loci calorem: viris autem non, propter corporis algorem 392
Calculi in senibus non generantur ibid. sed bene in pueris ibid.
Calculi inter initia magna cum diligentia curari debent 376
Calculorum in vesicae generationis praecipua causa, est ipsa qualitas materiae, id est crassitudo urinaria 392
Calculosis omnibus maxime confert, si a cena saepe uomant 378
Calfacere si velis, medicinam elige, in qua maior ignis sit portio, quam contrarii elementi 33
Calfaltio moderata & quies ad concoctionem non facile perducunt 22
Caliditas ad coaugmentandum lapidem non parum operatur 391
Caliditas mediocris omnibus utilis est, immoderata vero non minus frigiditate noxia 642
Calidum acquisitum cur dicatur 451
Calidum acquisitum ab innato differt ibid. & sequi, usque ad finem cap.
Calidum & exsiccans contraria sunt 17
Calidum innatum quid 13 & 448
Calor innatus in hectica & diaria febre adiunandus est 17
Calor innatus, & natura utrum discrepent 14
Calor in animalium corpore duplex 18 & 448. & 512
Calor adactus vehementius alterat 28
Caloris intro confluentis, in inflammationibus interioribus, & in principis accessionum, differentia 546
Caloris naturalis vis 512
Caloris alieni vis, & quibus de causis in corpore excitetur 512
Caloris tres sunt differentiae 455
Caloris natura est, homogenea cogere, ac in vnum copulare: quae vero heterogenea sunt, secernere, ac separare 28
Calori innato magnum usum frigiditas adiungit 14
Canina appetentia cur sic dicta 274
Canina appetentia quid sit ibid. eius signa 275. causa ibid. curatio ibid.
Canina conuulsio quid sit 157. eius signa ibid. causa ibid. curatio ibid.
Caprillum lac, si febris non urgeat, tepidum, recensque multum, ac potatum, magnopere alui profluvio auxiliatur 306
Capiis doloris species seu differentiae sunt tres 139
Capiis doloris signa 139. prognostica 140. curatio 141. & seq. usque ad finem cap.
Cardiacus morbus quid sit 271. eius signa 272. cu-

Carnosa substantia qua dicatur 463
Carnus est resolutio quadam principis facultatis (imaginatricis praesertim) ac priuatio sensuum, omniumque motionum, spirandi tamen facultate manente illa 139
Cari signa 119. prognosticum 120. curatio ibidem.
Catalepsis quid sit 120. eius causa ibidem. curandi ratio 121
Caterina Sanseuerina coxendicum dolore affecta, ex vinaceis maximum commodum adepta est 643
Causa diuersitatis accessionum in febribus triplex 557
Causa externa ad affectus cognitionem confert, & non ad curationem 514
Causa nulla sine patientis aptitudine agere potest 609
Causa per se abortum faciens, non potest ab eo praeseruare 6
ex quacunque Causa per se foetus destruitur, ex eadem nullo pacto potest praeseruari ibid.
Causis quid sit 550. est autem duplex: proprie dictus 551. & improprie dictus ibidem
Causa, id est ardentis febris dignotio 569
prognostica, ibidem, curatio 571
Cephalalgia a cephalaa in quibus differat, & in quibus conueniat 148
Cephalalgia quid sit 140. eius signa ibidem, prognostica 141. curatio, ibidem, & sequi, usque ad finem cap.
Cephalaa quid sit 147. eius signa ibid. causa ibid. curandi ratio 148
Cerebrum tertio loco post iecur & cor, in foetus generatione sit 3. & quare ibidem
Cerebrum ipsum si quomodocunque incidat non prius sensum & motum amittit animal, quam ad aliquem ventriculum vulnus penetraverit 55
Cerebrum per palatum, nares & aures inanitur 111
Cernicis veteri descriptio 1
Chirurgi quidam nostri temporis non parum decepti 22
Cholera unde nomen sumpsit 300
Cholera quid sit 300. eius signa 301. causa ib. curatio ibidem
Chori, id est, Secundarum (est autem membrana illa, quae parui obvoluitur ex utero prodit) descriptio 2
Chrysostoma de Aquino Ruborum comes, ab apoplexia ab autore sanata 170
Chylus ex ventriculo assumptus ex ipsa velui carne iocinoris alteratur, paulatimque in illius naturam vertitur 46
Cibamus accessionis initio, si sola vires in eadem non ferant 530
Cibus quandoque in accessus vigore dandus, & quando 531
Cibus in accessus vigore non dandus 529
Cibus quando dandus in febribus vnius accessus plurium accessuum ibidem
Cibi fastidium unde proueniat 278. eius causa 279. curatio ibidem
Cibum damus neglecto accessionis tempore, cum quid acciderit vires dissoluens 530
Cibi ex amygdalis confecti in febribus ardentibus omnino vitandi sunt 571
Cochlearum stillatitium liquorem hecticis non dandum 598
Coctio citius ut veniat, bonum est circa principia euacuare 36
Coctiones indicij celeritatem portendunt 13
Coctione quodlibet dulce efficitur, in Aristot. 641

Colicæ definitio 297. eius signa	ibidem.	Cor. quemadmodum substantia arteriarum initium exi-
curatio	298	stet, ita ab eo illico morrix facultas ad ipsas delegatur,
Colicus affectus, seu coli dolor, quid sit 325. eius signa ib.		que ipsi cordi imata est
causæ ibid. curatio	326	Cor post iecur quidem, sed ante cerebrum in fortibus gi-
Coma seu cataphora quid sit 121. eius due species ibidem		gnitur
Comatis vigilis causa 122. curatio	ibidem	Cor est arteriarum vitalis spiritus ferventis que sangui-
Communes morbi qui dicantur, & que eorum species 600		nis principium & fons
Concepius, antequam menses veniant, fieri non valet	1	Cordis generatio
Concipiendi instrumenta qua de causa in mulieribus in-		Cordis dolor quid sit
tus formata sunt	1	Cordis palpitatio quid sit 252. eius signa ibid. causa
Concoctio crassorem reddit urinam	23	253. curatio
Concoctio à digestionem quomodo & in quo differat	26	Corpus si ex toto integrum illesumq; duraret, talè quod
Concoctio naturalis maturatio est morbi	21	quale ipsum ab initio creator fabricatum reliquit, ne-
Concoctio quid, secundum Aristot. 21. & quonuplex ibi-		quaquam correctore eguisset
dem		Corpus quo modo dicatur salubre 85. & quonuplex
Cococtio, licet à calore innato precipue efficiatur, ab ali-		ibidem
quo tamen externorum auxiliorum iuvare potest	22	Corporis preparatio quid
Concoctio, & digestio, sicut & alia naturalia opera, ab in-		Corpora, ut à pestilentia præservari possint, exsiccanda
nato calore perficiuntur	27	sunt, & pori aperiendi
Concoctionem & digestionem idem iuvare potest	28	Corpora humana, licet ex sanguine conformentur, non ta-
Concoctiones citius ut eveniant, melius est circa princi-		men ex eo syncero, verum ut particeps viriusque bilis
pia evacuare	41	& pituitæ
Concoctum in quouis genere dulcius est	641	Corpora cuncta que purgantur, fluida fieri debent, prius-
Condyloma quid sit	322	quam purgentur
Condilomata unde dicta	322	Corpora nostra præsidia desiderant, auxiliisq; indigēt
Consuetudo quid, ex Galeno	492	Corpora quantuncunque fuerint optimè constituta, & tē-
Continens febris sine putredine non quevis corpora in-		perata victus ratione vivunt, fieri tamen nequit, ut in
nadit	507	eorum urinis non aliquid subsideat, aut pendeat, aut
Continens febris citra putredinem oritur ex redundan-		supernatet
tia ad vasa	508	Corporum duplex est intemperies
Continens febris sanguinis missione curatur	508	Corruptum quodiam est, id alienum à natura est
Continens febris ex sanguine differentia ires	507	Coxendicum dolor quid sit 429. eius signa ibid. causæ i-
Continens febres que sub diuturnis contineantur	507	bid. curatio
Continua tertiana	548	Coxendicum dolor, quibus communicet & differat à po-
Continua febres que	540	dagra & avirithide
Continua nulla exquisita simplex dicitur	553	Cruditas quid sit 292. eius signa ibid. causæ ibid. curatio
Continuarum & inermittentium febrium causa, ibidem		293
Continua febres cur plures habent accessiones	542	Cruditi signa semper sunt in morbi principio
Continua febres cur sint sine rigore, prima causa	544	Cruda urina que dicatur
secunda	ibidem	Crueia spiritio quid sit 212. eius signa ibidem, curatio
Continua plurium accessionum in quo conveniunt 552. in		Cruenti spiritio ex vasorum exesione curatio
quo item differunt	ibid.	Cruenti spiritio, si ex refrigeratis instrumentis spiritus fiat,
Continuarum ex bile species due	548	curatio
Contraindicantia aliquando quid agendum sit, indicant,		Curatio febris ex putredine sanguinis in aliam humoris
aliquando id moderantur, aliquando contrarium indi-		speciem transmutati
cant	497	Curatio febrium heclicarum cum tabe
Contraindicantium prima significatio 476. secunda 477		Curatio febris pestilentis
Contrarietas quatenus contrarietas, nihil utile particu-		Curatio febris facta ab obstructione sanguinis
latim indicat	483	Curatio per se & medicis exercetur, prænotio vero & di-
Contraria immoderatione eatenus utimur, pro sublatione		gnorio propter curationem
eorum que præter naturam sunt, ut tunc primum desi-		Curationem febrium nullus methodo prosecutus est, ut
namus, cum ad commoderatum pervenerimus	17	que ad Authorem post Galenum & Hippocratem 446
Contrarium eousque pro eo quod exuperat, inducendum		D
est, quoad particulam in symmetriam & habitum na-		D Ely in febribus ardentibus causa
turalem vindicaveris	18	Dens ut doleat, tribus modis fieri potest
Contrariorior contraria sunt remedia 17. 33. 478. 483		Dentium dolor
Convulsio quid sit 149. eius tres species, seu differentia		Dentium doloris curatio
150. causa ibid. curatio ex inanitione 151. ex reple-		Deperditæ memoriæ definitio
tionem 152. ex inflammatione 153. eius que sit per con-		Deperditæ memoriæ ex pituita redundantia, curatio
sensum	ibidem	Deperditam memoriæ curandi ratio
Convulsio canina quid sit 157. eius signa ibidem. causæ		Destillatio quot modis dicatur
ibid. curatio	ibidem	Diabetes quid sit 369. eius signa 370. curatio
Convulsus motus à voluntario in quo diserepat	149	Diaria & heclica febris quomodo differunt 505. quid cō-
Convulsio cum pestilenti morbo laborantibus pericu-		mune habent
losa est, ne inde contagium contrahatur	606	Diaria febris quid sit 459. eius signa
Cor post iecur formata necesse est	3	Diaria febris cur dicatur
		Diaria

non semper immediate	459	succis	639
Diaria & hectica febris, tantum contrariorum auxilio- rum adhibitione curantur	17	Duplex est calidum: unum naturale, alterum prater na- turam	512
Diaria febris ut generetur, spiritum prater naturam cal- factum esse necesse est	70	Dysenteria quid sit 309. eius signa 310. curatio 311	311
Diaria pro causarum & corporis affectuum varietate, va- rias & particulares habet curationum indicationes	539	Dysenteria proprie dicta quid sit	221
Diaria febres morbi sunt exigui temporis	74	Dysentericis somnus optimum est remedium	312
Diariarum febrium causa	539	E	
Diariis omnibus communis est materia & indicatio ibid.		Ebrietatem quae impediunt	146
Diarexis quid sit	198	si ex Ebrietate dolor capitis contingat, polygoni ra- muli duo corone modo circumpositi sanant	147
Difficultas partus quid sit 420. eius causa 422. curatio ibidem		Elementum ignis in regione nostra praeipollet	450
Difficultas urinae quid sit 385. eius causa 386. curatio ibidem		Empirici & barbari quidam falso probaverunt nimiam ci- bi & potus repletionem	615
Difficiliter qui discunt, promptè memorantur	57	Empiricos ad experientiam duxit sensus	445
Digerere quid sit	26	Empiricorum abusus extrinsecus est omnino	10
Digestio est ordinata alimentorum distributio. ibidem		Ephemeri animalis natura	459
Digestio quae sit circa humores seu excrementa, bifariam fieri potest	26	Ephemere febres, sanguine tantummodo calefacto, non autem putrescente fiunt	557
Digestio & concoctio à calore innato perficiuntur	27	Epiala est simplex febris	553
Digestio quae excrementorum est, ab ea, quae est alimen- torum, differt	28	Epiala febris 552. eius differentia ab exquisita & in- termittente quotidiana	553
Digestionis alia definitio	26	Epiala unde dicta	591
Dignotio inflammationis viscerum à qua refrigerantur extrema, & principij accessionum, à quo etiam refri- gerantur extrema	547	Epiala curatio	ibidem
Dignotio continentis febris ex pulsu, caloris qualitate, & urinis	508	Epialam febrem inducit vitrea & acida pituita modice putrescens, si per easdem sentientes corporis partes de- feratur	588
Dignotio affectus ex quibus fiat	106	Erysipelas in utero gravidis fore lethale Galenus asserit	5
Dionysii Siciliae tyranni ad captivos excecandos astutia	173	Ejus boni succi modicorum ciborum ad concoctionem per- ducit	22
Discendi facilitas cerebri substantiam formarum facile susceptivam indicat	57	Eucrasia est simularium parium	84
Discunt qui facile difficulter memorantur	57	Excessus cibi & potus saepe causa est ut fetus perdat	4
Difficilis corporum cuiuslibet partis essentiae propieta- tem indicat	104	Excrementa sicut in corporibus sanis coctionem indicant, non secus in corporibus morbo affectus indicabunt	21
Diutius si fuerit morbus nullo pacto in principio medi- camento purgante utendum est	35	Excrementa cocta quae 21. item cruda quae	ibid.
Dolor quid sit	136	Excrementa duo in sanguinis generatione solum gignun- tur	46
Dolor nunquid proprie dicatur alteratio, vel alterationis dignotio	137	Excrementa semicotta similia subinde fiunt corporibus, quae aluntur, quorum corporum scilicet sunt excre- menta	48
Dolor an ex quavis immutatione fiat	137	Excrementa seminibus cucurbitae similia, latorum ver- mum sunt indicia	107
Dolor coxendicium quid sit 423. eius signa ibid. causa i- bid. curatio	429	Excrementorum species affectam partem indicant	105
Dolor coli, seu colicus affectus, quid: eius signa. causa, curatio ratio 422. & sequentibus per totum caput		Excrementorum magnitudo partis affecta est indicium	105
Doloris species partem affectam indicat	105	Exercitatio omnis fit, cum particularia sub eandem viam, ac rationem dicuntur	103
Doloris proprietates internorum affectionum est nota	107	Experientia est eius quod frequenter, & eodem modo vi- sum est, comprehensio atque memoria	10
Doloris quor quae sunt causa	137	Experientia quid	475
Doloris capitis species seu differentia tres sunt	139	Experientia authoris de Orientali & Italica manu	636
Doloris capitis universales causa 140. particulares ibi- dem		Exquisita febris ardens dicitur à Galeno, continua cir- cuius habens & continens	551
Doloris capitis ex calida intemperie geniti signa 140. ex frigida ibidem. ex sicca ibide. ex bilioso succo ibidem. ex pituita ibidem. ex nigra bile ibidem & sequent.		Exquisitus causus quomodo generetur	ibid.
Doloris capitis prognostica	141	Exquisita tertiana dignotio 574. prognostica 575. cu- ratio	576
Doloris capitis cura ex siccitate 141. ex calida intempe- rie ibidem ex redundantia flava bile 142. ex frigida intem- perie 143. ex redundante pituita ibidem. ex ple- thora 144. ex flatuoso spiritu 145. ex ebrietate ibid. ex actu aut casu 146. in febribus	147	Exulceratio renu quomodo fiat 381. eius causa 382. cu- ratio	ibidem
Domus qualis eligenda in peste 428. &	618	Exulcerati vteri signa 427. causa ibidem. curatio ibidem	
Dulce omne à moderato calore provenit: idque sit dupli- citer	641	Exulcerata vesica signa 394. causa 395. curatio ibi- dem	
		Externa causa ad affectus cognitionem confert, non au- tem ad curationem	514

Fabritius Marcamaldus ab apoplexia ab autore liberatus 170
 Familiare esse necesse est, id quod nutrit 641
 Febris cur cum perpetuo consequatur inflammationes ratione putredinis, non tamen illa febris semper sit ex genere febrium ex putredine ortarum 458
 Febris ardens in quo consistat 563
 Febris acuta, vel aliquo humorum putrescente sit, vel membrum inflammationem patiente 75
 Febris continens cum putredine, est ex sanguine putrescente, & sanguinea, non biliosa 561
 Febris continua tertiana duplex 548
 Febris diaria cur dicatur 459
 Febris diaria quid sit 459
 Febris diaria semper à procacitica causa oritur, sed non semper immediatè 459
 Febris est totius animalis calor immodicus 70
 Febris ex putredine occupante uniuersum corpus, quomodo generetur, & in quibus corporibus 518
 Febris ex sanguine putrescente in omnibus, aut maioribus vasibus continens est: si in paruis quibusdam, continua plurium accessionum 560
 Febris ex sanguine quibus in corporibus generetur 568
 Febris quæ in generatione est, tollitur sublata causa, si exiguum si quod factum est, indicatioque una est 510
 Febris nulla generari potest, quin cor afficiatur 457
 Febris putrida tribus modis generari potest 72
 Febris est præter naturam caliditas, maxime quidem in totius animalis diffusa, si minus, aut omnino, vel in pluribus partibus, vel in nobilissimis contenta 70. 73
 Febris prout febris est, aqua frigida pota perpetuo est remedium 18
 Febris cum fuerit ardentissima & magna, cunctæque vires agroti ac concoctionis notæ planè euidentes sint: tunc frigidam homini putrida febre laboranti tribuere audacter debemus 17
 Febris pestilens ex praua vietus ratione oriri potest 609
 Febris pestilens unde generetur 610
 Febris pestilens in quo dissideat ab iis quæ ex putredine oriuntur 610
 Febris pestilens quid sit 607
 Febris pestilens nedum in humoribus accendi potest, verum etiam in partibus solidis ipsius cordis 610
 Febris continens causa 508. tres eius differentiæ ibidem
 Febris natura qualis, quæque eius definitio 453. per totum caput
 Febris causam antecedentem esse humorum putredinem testatur Galenus 18
 Febris magnitudo si misceat, tutius, cum oportet, aqua hordei vrendum est 18
 Febris subiectum est calidum innatum 455. & sequens per totum caput
 Febris quotidiana caliditas humidior cum quadam acritudine, non cum primum manus admouetur, confestim occurrens, sed per moram 587
 Febris pestilentis causa, apud Athenienses erat immodica aeris caliditas 608
 Febris pestilentis causa 611. eius signa 612. prognostica 613.
 Febrim sanamus, frigida adhibentes, non solum quæ talia sunt, sed ea quæ partim potestate, partim ex accidenti refrigerant 17
 Febris continens quæ sub putridis febribus comprehenduntur 507
 Febres continentes quæ sub diariis continentur 507

Febres continue cur in febricitationem non desinant 541.
 intermittentes vero in eam desinant ibid.
 Febres intermittentes quomodo gignuntur ex putredine humorum extra vasa 542
 Febres intermittentes à rigore semper incipiunt 544
 Febres intermittentes quæ sint 540
 Febres omnes ex sanguine in quo conueniunt 567
 Febres per implexum complicata, & per confusionem, quid 554
 Febrium quare quadam per circuitus, repetant 72
 Febres putridæ quæ 510
 Febrium commixtio per complexum, & confusionem multiplex 553
 Febrium generationis quinque modi 457
 Febrium curationem methodo nullus prosecutus est post Galenum & Hippocratem 446
 Febrium intermittendum initiis cur calor naturalis ad corporis intima se colligit 545
 Febrium primæ & essentielles differentiæ quorū sint 455.
 & seq. per totum caput
 Febrium putridarum inditium maximum existit vrinæ cruditas 51
 Febrium ex putredine ortarum signa 461
 Febribus ardentibus pituitosa est accommodatissima 29
 Febribus in ardentissimis, si visque ad animi defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur & febris extinguitur 563
 Febrium omnium pestilentium ortus est ex putredine 610
 Ferrum acutissimum manifestè obtusus sit toto die ac nocte molissimam ceram incidat 41
 Fibrosa substantia quæ dicatur 463
 Ficus quid sint 322
 Fluidum corpus bifariam reddi potest 30
 Fluor à spū sanguinis in quo differat 224
 Fluxionis pituitosæ signa 433
 Fluxionis biliosæ signa ibidem
 in Fluxione duplex est genus curationis 27
 Fœmina cum pregnantis est, non laborat, nec læguet, si singulis mensibus menses non desinant 4
 Fœmina non, nisi cum incipiunt, vel cessant menses, concipere potest 1
 ex Fœminarum semine non pauca sequitur ipsi fœtus vilitas 4
 ex Fœminarum semine, statim post coitum nutritur fœtus ibidem
 Fœminas cur cephalæa vehementius teneat 148
 Fœminæ semen multo minoris quantitatis est, quam maris 4
 Fœtus est cum substantia carnea iam est, nec amplius seminalis apparet 3
 Fœtus in utero gerentibus, non modò pro sui primæ constitutione, materiam postulat copiosam, verum etiam ad incrementum 1
 Fœtus in utero quo modo fiat, quæque ratione augmentum nutrimenti quæque suscipiat 1
 Fœtus ex sanguine, qui de matre in uterum descendit ex toto eius corpore singulis diebus, nutritur & augetur 3
 in Fœtu aliquod membrum gigni absque substantia sanguinea impossibile est 3
 Fœtum duplex principium 3
 Fœtura primæ constitutio humidior est ac frigidior 4
 Fraxinus & ornus in Italia inter ceteros arbores incisæ, mannâ ferunt 632
 Fraxini duo sunt genera secundum Theophrastum 629
 Frictio mediocris modicam caliditatem efficere potest 22
 Frigida

remedium	18	Habitus corporis quia	463
Frigida & sicca, & si putrescentis humoris qualitatibus opponatur, putredinemque quodammodo alterando inhibeant, concoquentia appellari haud possunt	20	Habitus nihil aliud significat, quam stabilitatem seu permanentiam affectionis	84
Frigida interpeptum potum qua sequantur incommoda	509	Habitus non stabilitatem, ac firmitudinem, sed lubricitatem & instabilitatem affectionis facile solubilis, & mutabilis significat	84
Frigida potus, & sanguinis detractio duo sunt continentium febrium maxima remedia	568	Hæmorrhoides quid sint 318. eius signa 319. causa ibidem. curatio	320
Frigidum homini dare, si febris ardentissima fuerit, & vires cunctæ valide, ac concoctionis notæ evidentes, audacter dare possumus	513	Hæmorrhoidum differentie duæ	318
à Frigore quæcunque concreverint seu coagulantur, à calido liquefunt, & solvantur: & contra	627. & 636	Hælica febris ut generetur, partes solidas præter naturam calidas esse necesse est	71
Frige facere si velis medicinam elige, in qua maior sit portio aque quam ignis	17	Hælica & diaria febris tantum contrariorum auxiliorum adhibitione curantur	17
Frigidior multo mulier viro est, & ob id imperfectior	1	Hælica febris & diaria quomodo differunt 505. quid habent commune	ibidem
Frigiditas in muliere vilitatem non æternam toti humano generi præbet	ibidem	Hælica curatur refrigerantibus & humectantibus	ibid.
Fructuum tunc perfecta est maturatio, quando semen, quod in ipsis est, potest efficere tale alterum, quale ipsum est	641	Hælica primum humiditatem partium propriam depascitur, deinde alias partes invadit	464
à Fructibus rectis omnibus (præter quàm si acidi fuerint abstinere debet, qui à pestilenti febre præservari desiderat	619	Hælica an semper cum siccitate sit coniuncta	465
Fulvus de Bernardis à dextra tibia, sinistræque cruris dolore ex vinaceorum usu liber evasit	644	Hælica quando incipiat 466. increseat	ibidem
Furor seu insania quid sit 133. eius causæ 134. signa ibidem. prognostica 135. curatio	ibidem	Hælica febris particularia indicia	160
Furorem prognostica ex præsentibus sumuntur	109	Hælica tertie speciei signa	470
G		Hælica in quo differant à cæteris colligantibus	471
Galenus à iunioribus medicis reprehensus	446	Hælicarum febrium hoc proprium atque inseparabile indicium, ut allato cibo statim hora una aut duabus elapsis febris accendatur aucta caliditate	468
Galenus in pestilenti aeris statu, corpora in quibus superfluitas redundabat, sanabat purgationibus, nulla quidem concoctione precedente	37	Hælicarum prognosticum 595. curatio	ibidem
Galenus non uno libro methodum curandi febres tradidit sed parvis, & obscure	446	Hælicarum cum tæbe curatio	597
Galenus historia cum gargarismo hortulanum quandam ab una, parvithimis & antiadibus ferè suffocatum sanavit	215	Hælicarum febrium generandarum duplex via	464
Galenus carpit Aetium	321	Hælicis omnibus commune est, ut pusilla ac semper à principio ad finem usque sine æquales	467
Galli mollem & teneram carnem habent, sunt candidi	516	Hælicis in febribus multa non occurrit humiditas	468
Generatio calculi cur senibus non competat	392	Hælicis in febribus pro earum dignotione nullum ex vrinis signum sumitur	470
Generatio lactis animalibus maxime est utilis	266	Hælicis in febribus inspicienda sunt semper vrina	472
Generationis calculi in renibus modus	375	Hemicrania quid sit 148. quæ consideranda pro eius curatione	ibidem
Generationis febrium quinque modi	457	Hepar quid	3
Generationis mammae modus, tempus, ac locus	625	Hepar, cor, cerebrum, & testes communiter uniuerso corpori principia sunt virtutum	67
Genitalium partium impotentia quid sit, eius causa, & curatio	401	Hepatis obstructio quid sit 343. curandi methodus	344
Genitura quid secundum Hippocratem	3	Hepatici seu iocinorosi qui appellantur 338. eius signa 339. causa ibid. curandi ratio	340
Glandularum iuxta linguam inflammatio quid sit	211	Hepaticus affectus, seu icterus imbecillitas proprie quid sit	338
Gratia auctori habenda est, difficile opus aggresso	446	Heterogenea quæ sunt, calor secernit, ac separat	28
Gravis seu difficilis auditus quid sit 192. eius causa ibid. curatio	193	Hieronymo Alberto Philippi regis consiliario, vinaceorum usus mirum in modum contulit	644
Grumi in lacte quæ ratione fiant	269	Hippocrates verebatur in acutis passionibus, medicinis purgantibus uti in earum principis	35
Gubernatrices anime facultates sunt tres	494	Hippocrates febrium curandarum methodum inchoavit duntaxat	446
naturalis, vitalis, & animalis	ibidem	Homini cuiusque singulatum suum proprium est puris mouendi medicamentum	22
Gurgulionis inflammatio quid sit 208. eius causæ, prognostica, curatio	209	Homini cur mammae pectori inhereant	266
Gurgulionis inflammationis differentia duæ	209	Homines ut peste laborant, opus est aerem ad eam esse inquinamenti plenum, ut natura humana offendantur	604
Gurgulionis si cura inflammationem nimium humectus laxior fiat, & propterea lingua radices, ac faucibus propensus incumbat, curatio	210	Homogenea quæ sunt, calor cogit, ac in unum copulat	28
H		Hordei aqua pro extinguenda sitis summo opere siticulosis est accommodata	18
Habitus bonus quid sit	84	Horror quid sit	546
Habitus corporis malus	361	Horror interpeptus cum febre inflammationis ad purificationem transeuntis est indicium	107
		Humor aliquis cum sanguine in venis redundat ac putrescit duobus modis: aut ut efficiat plethoram cum adiectione, aut cacoehymiam	541
		Humores communibus elementis respondentes	450

Humores cur aliquando in vasis, aliquando extra par-
 teant 541
 Humores turgentes mox à principio medicamento pur-
 gante sunt educi di, si natura non valeat eos fora spro-
 pellere 34
 Humores si tenues ac biliosi fuerint inter initia sunt eua-
 cuandi 40
 Humores, qui tenues sunt, omnes crudi sunt, & ut conco-
 quantur, robustam desiderant naturam 23. 24
 Humorum putredo antecedens causa est febris, secundum
 Galenum 18
 Humorum putredo duorum generum est 19
 Humorum eorum duntaxat qui in vasis continentur, nota
 est urina, neque eorum ullum planè nec manifestum,
 nec evidens signum habemus, præter solam urinam
 44
 Humoribus crudis, seu vitiosis in ventriculo cõtentis, nul-
 lo pacto faciendâ est sanguinis missio 7
 Hydropicus morbus unde nomen sumpserit 362
 Hyemis partes tres 601
 Hypochondriaca melancholia signa 130. eius curatio
 132

I

Icterus seu morbus regius quid sit 352. eius signa ibid.
 curatio 354
 Icterus niger quid sit 356. eius signa ibidem. curatio
 357
 Ictur quid 3. & quod prius quã cor & cerebrum in feb-
 ribus gignitur ibidem
 Ictur ipsum toti corpori idoneam procurat materiam ad
 alimentum 68
 Ictur venis veluti manibus vititur 43
 Icturis opus omnibus particulis est pernecessarium 520
 Icturis obstructio quid sit 343. eius signa ibidem. cura-
 tio 344
 Icturis scirrho laborantis indicia 350
 Ignis in peste succendi debet 614
 Ignis elementum in generatione nostra prepollet 450
 Ignorantia vitium est indelebile, si cum superbia sit con-
 iuncta 8
 Ileus, seu voluulus, quid sit 329. eius signa ibidem. cau-
 sa 330. curatio 331
 Imbecillitas virium febris accessiones longiores efficit 71
 Immoderata sitis 282. eius cause ibidem. curatio
 283
 Immodica mensurâ purgatio quid sit 406. eius signa 407
 curatio ibidem
 Impedientia fieri aliquid conferunt ad inuentionem re-
 mediorum 476
 Inappetentia quid sit 278. eius causa ibidem. cura-
 tio 28. & seq.
 Incubus quid 157. eius signa 158. causa ibidem. cura-
 tio. ibidem
 Indicia pro mamma tam liquida quàm concrete notitia
 637
 Indicia morborum oriuntur ex accidentium proprietate
 107
 Indicatio sumitur à temperamẽto quod presens erat cum
 cepit morbus 488
 Indicatio quid sit 472
 Indicationis duo sunt genera ibidem
 Indicatio ab observatione & ratiocinatione differt 473
 Indicatio omnium prima 477. hæc autè est plebi com-
 munis & sine arte ibidem
 Indicatione inuenire opponitur inuentioni per experien-
 tiam 472
 Indicationes multa ex affecta parte pro morborum cura-

Indicationes à putredine duæ, à febre totidè 514. à tras-
 piratione prohibita, duæ ibidem. ab obstructeone duæ
 ibidem
 Indicationum magnitudo ex dignitate eorum qua indicat,
 & propria essentia, spectanda est 533
 Indicans & indicatum idem esse potest diuersis rationibus
 486
 Indicium proprium atque inseparabile februm, que in
 humoribus accenduntur, est summisionis seu cõtractio-
 nis pulsuum velocitas 461
 Indicia propria febris ardentis duo sunt 569
 Indicium Picolhomineum ducis Amalsie filium à phre-
 nitide liberauit author 127
 Inedia est causa abortus 4. & 6
 Infantes recenter nati plurimum habent calidi innati 451
 Inflammatio hepatis quomodo generetur 346
 Inflammatio lienis 358. eius cause ibid. curatio ibid.
 Inflammatio renum 379. eius signa ibidem causa 380.
 curatio ibidem
 Inflammatio stomachi unde, eius signa, cause, curatio
 290. & seq.
 Inflammatio vesice quomodo fiat 393. curatio ibid.
 Inflammationis cum in abcessum vertitur, curatio 247
 Inflammationis mammarum curatio 270
 Inflammati veri signa 425. causa ibidem. curatio 426
 Inflammatory affectus ex pulsatorio dolore deprehendun-
 tur 106
 Inflatio ventriculi quid sit 294. eius cause 295. cura-
 tio ibidem
 Innatus, siue ingenius calor coctiones facit, secundum Ga-
 lenum 18. & 19
 Insania lupina species est quedam melancholia 136
 Insalubre corpus quando dicatur 88
 Intellectus promptitudo subtilem cerebri substantiam in-
 dicat, tarditas vero intellectus crassam 57
 Interiorum sensuum omnium primus & infimus est com-
 munis sensus 61
 Intermitteutes febres an aliquando fiant humore putre-
 scente per corpora sentientia non delato, & ob id sine ri-
 gore, & c. 422
 Intermitteutes simplices exquisitæ dici possunt, quo ad sen-
 sum 553
 Intermitteutium species tres 547 in quo conueniant ibid.
 in quibus dissideant 548
 Intermitteutium in principiis cur summa refrigerantur
 544
 Inuentionis cuiuslibet duo sunt instrumenta 445
 Iuniores medici hallucinati sunt 33. 34. & 447
 Iuniores medici in expositione verborum Galeni halluci-
 nati sunt 19. 48. 85. 242. 473. & 481
 Iunioribus medicis in notitiam deuenere nonnulla medi-
 camenta purgantia prauæ qualitatæ expertia, que a-
 pud antiquos fuisse prorsus incognita 33

L

Lac bubulum aut caprillum, si febris non urgeat, te-
 pidum recensque multum ac potatum magnopere
 auxiliatur 306
 Lac temperatus est cibus, cum hoc quid depurgat, simal-
 que ea qua in corpore sunt, contemperat, ac alium sistit
 311
 Lac quid sit 266
 Lactis defectus quid sit 266. eius signa 267. causa
 ibid. curatio ibid.
 Lactis generatio animalibus apprimè utilis 266
 Lactis in grumos, seu casei speciem conuersi descriptio 269
 causa ibidem curatio ibid.
 Lactis

Lactis redundantia quid 268. eius causa ibid. curatio ibid.
 Lactis temperamentum 267
 Lachryma involuntaria cum alijs pravis symptomatis, mortem significant 570
 Lactantibus & puerperis sepius evenit, ut pre lactis redundantia egrotent 268
 à Læsa actione partis affecta dignotio auspicanda est 104
 Lætas intestinorum quid sit 296. eius signa 297. causa 298. curatio ibid.
 Lapis in renibus & in vesica dumtaxat nascitur, atque etiam in colo 107
 Lapis renum quomodo fiat 374. eius signa ibid. causa 375. curatio 376
 Lapis in vesica, cur in pueris magis quam in adultis generetur 392
 Lapidem ex urina sabulosa deprehendimus 107
 Lateralis morbus quid sit 232. eius signa ibid. causa 233. curatio 235
 Laudandus est potius medicus, qui curat per cibum, quam qui per medicinam 35
 Latio est prioris loci mutatio 16
 Lethargus dicitur, cum marcor & inexpugnabilis penè dormiendi necessitas percipitur 117
 Leo Roganus iuvenis nostra ætate eruditissimus 45
 Lethargus ab obliuione, seu deperdita memoria quibus differat, quibus etiam conueniat 118
 Lethargus quis affectus sit præter naturam, 117. eius signa ibidem. causa 118. curatio ibidem
 in Libano monte quotannis manna decedit 625
 Lienis inflammatio quæ ratione curetur 358
 Lienis scirrhus 360. eius signa ibid. curatio ibid.
 Lingua nō admodum nigra, arida, aspera, securitatem, ac morbum fore breuem indicat 570
 Lingua nigricans ardentem febrem portendit 107. & 569
 Lippitudo quid sit 172. eius signa ibid. causa ibid. curatio 173
 Lippitudinis differentia tres 172
 Lippria febres adeo sunt lethales velut pestilentes vere dicta 607
 Lippriarum febrium curatio 574
 Locus affectus ex symptomatum proprietate innotescit 106
 Longis in morbis coctionem expectare semper oportet 35
 Lora vinum dici non potest 639
 Lora è vinaceis aqua madefactis qui fiat ibid.
 Lora quandoque aquosior, quandoque etiam meracior fieri potest, pro maiori vel minori quantitate aquæ superinfusa 638
 Lumbrici unde generentur 332. eorum curatio 336
 Lumbrici in intestinis gignuntur 107. & 332
 Lumbricorum tres differentia 77
 Lupina insania melancholia quadam est species 136. eius causa atque curatio ibid.

Mamma si utero gerenti repente graciles fiant, abortus signum est 9
 Mamme cur hominis pectori inhaerent 266
 Mammarum inflammationi vinacei tritis cum sale utiles sunt 640
 Manna liquida quomodo generetur 622
 Manna pruina quam rori magis similis est, eisdemque in eius generatione proportionem respondet 622

Manna duplex, liquida & concreta: & utriusque generatio 622. & 623
 Manna liquida seu mel roscidum rori: concreta vero, & quæ coagulata est, pruina correspondet 622
 Manna in quibusdam platibus, terris, seu lapidibus melius quam in quibusdam alijs conseruatur 625
 Manna in fraxino & orno reperta ab aqua soluitur ac liquefcit 627
 Manna super arborum, fruticum, herbarumque folia indifferenter reperitur 625
 Manna tam liquida quam concreta decedit è cælo anno 1546. in Gortina comitatu, ac Friuli patria, mense Maio & Iunio 626
 Manna quæ in fraxino & orno, herbis seu lapidibus reperitur, non est ros, sed pruina similis è cælo cadens ibid.
 Manna in fraxinis & ornis reperta, potissimum sub cane, est proprius dictarum arborum succus 630
 Manna ex fraxinis & ornis incisus emanat 632
 Manna ex orno & fraxino collecta valde similes facultates habet cum Arabum manna 634
 Manna aërea & roscida soluitur atque liquefit à solis, seu ignis calore, atque à calida aqua: arborea vero minime 637
 Manna arborea ab aërea calore dissidet ibid.
 Manna vis in medicina 633
 Manna materia quæ coagulatur, diuersa est 637
 Materia circa quam ars medica versatur (id est corpus humanum) continuè fluit mutationibus ac alterationibus, seu momentaneis transmutationibus obnoxium, faciliusque ab intrinsecis, & extrinsecis causis alteratur 34
 Materia omnis praesidiorum quatuor generibus continetur 498
 Materia refrigerantibus, & humectantibus duplex 506
 Materia ex qua roscidum, seu aëreum mel generatur, eiusdem est cum rore generis 623
 Materia praesidiorum dexter vsus consistit in quantitate, qualitate, & occasione 499
 Maturatio quid, ex Galeno 24
 Maturatio fructuum perfecta quando dicatur 641
 Maturaciones à medico extrinsecus inuari possunt 22
 Medicus est nature minister 13. & 14
 Medicus in agris quid primum inspicere debeat 103
 Medicus est nature imitator 34
 Medicus humorum in corpore redundantium præparationi absque dubio opem ferre potest 29
 Medici solius est, auxilia egrotis in tempore adhibere 15
 Medici terminus, quem nullo pacto transire debet, est ut tute medicetur 6.8. & 33
 Medici intentio est, causam auferre, quæ posset aliquæ præter naturam affectum futurum efficere 5. & 6
 Medicina est humani corporis moderatrix 12
 Medicina medicis ipsis dignitate prior est 15
 Medicina finis est sanitas 12
 Medicina totius communis scopus 477
 Medicam artem in agendo nihil aequè coniecturalem efficit, ut cuiusque remedij quantitas 3
 Medicamentum omne corporibus incundum est 12
 Medicamentum purgans proprium attrahere humorem appetens, cum is non adsit, sanguinem ac carnes colligat, ut ex ipsis proprium attrahat humorem 33
 Medicamentum quod semel in ventrem deuoratum est, quominus omne deuoratum non sit, fieri non potest ***

est 34
Medicamentum purgans, quibus dare quadrabit, his medicamentis tantum propina, quantum in plurimis mediocriter vacuari tum nouisti, tum es expertus ibidem
Medicamenta post cibum sumenda non sunt, quæ ad vehementiorem distributionem faciunt 27
Medicamenta purgantia adhibenda esse, quomodo intelligendum 38
Medicamentorum occasione sequuntur abortus 5
Medicamentis purgantibus utendum si sit, illud cum præmeditatione faciendum est 35
Medium febrium genus inter hellicas & putridas 307
Melancholia quid sit 128. propria eius indicia 129. prognostica 130. curandi ratio ibidem
Melancholia quibus à furore diffideat, & quibus conueniat 133
Melancholia tres species 129
Mellis genera duo apud Galenum 625
Memorantur alia quedam animalia præter hominem 54
Memoria crassam, & propterea stabilem & firmam cerebri substantiam indicat 57
Memoria deperdita quid 114
Memoria ex infrigidantibus cerebrum causis eiusque intemperie frigida ladicur 62
Memoria deperdite quot, quæue sint cause 115
Mensuum suppressio quid sit 403. eius causa ibid. curatio 404
Mensuum immodica suppressio 406. eius signa 407. curatio ibidem
Methodus quid sit 444
Methodus medendi quid sit 445
Methodi medendi initium à morbi natura 443
Methodi medendi febres, quæ febres sunt, compendiosa repetitio 503
Methodus in uniuersalibus, in particularibus exercitatio consistit 103
Moderari caloris effectus hic est, ut rigentes excalescat, astuantes verò frigefaciat 643
Moderata dicuntur ea, quæ sunt secundum naturam 17
Mola quid sit 414. eius signa 415. curatio 416
Morbus acutus quis 625
Morbus comitialis semper ad morbum in via conuenit 193
Morbus comitialis quid sit 161. eius signa 163. causa 164. prognostica ibid. curatio 165
Morbus regius quid 352. eius signa ibid. curatio 353
Morbi causa si adest, ipsi causa non morbo primo remedia adhibentur 511
Morbi comitialis differentia tres 163
Morbi comitialis peculiare signum est spuma ibid.
Morbi ipsius concilio princeps scopus, est qui penes temporis occasionem purgantium medicamentorum perpendendus est 34
Morbi summus vigor non ut indicans cibū, sed ut prohibens spectatur 527
Morbi tempora non indicant, sed impediunt ibid.
Morbi cum inchoant, si quid videtur mouendum moue 3540
Morbi in quibus futurum præagiri possit 109
Morbi qui sunt, duplices sunt, aut tolluntur sublata causa, aut ea sublata remanet adhuc dispositio 511
Morbi uniuersales, seu communes qui dicuntur qui etiam particulares seu dispersi 599

Morbo consistente facilius natura concoquere valet

35
Morbo consistente, cum iam natura concoquit, superfluum est euacuare 41
Morborum in principiis, materia non turgente, an purgante medicamento utendum sit 35
Morbifica cause quot, quæue sint 108
Mors sequitur, si cum virium infirmitate sit phlegmone in parte principe 531
Motus est prioris habitus mutatio secundum Galenum 16
Mulier viro est imperfectior, non solum circa genitales partes, sed etiam secundum totum 1
Mulier tantò mare est imperfectior quàm frigidior ibidem
Mulier à viro potissimum circa genitales partes discrepat, & quomodo ibidem
Mulieris imperfectio utilitatem maximam toti humano generi præstat ibidem
Mulieris frigida causa est (cum non possit exactè concoquere, nec valde discutere ac digerere) quare benigni alimenti superfluum aliquid ad fetus educationem necessarium colligant 1
Mulieres nonnunquam etiam nolentes abortum faciunt 4
Mulieres præter naturam crasse non concipiunt 5
in Mulieribus omnes partes quæ viris insunt, reperiuntur 1
in Mulieribus genitales partes condita sunt, in viris autem sunt extrà ibidem
Muliebri profusum quid sit 408. eius signa ibidem. causa 409. curandi methodus ibid.
Musculi vesicæ cernicem ambientis usus est multiplex 389
Musto omni quandiu seruet, inest dulcedo 641
Mutatio in corporibus duplex est, una lationis, secunda alterationis 16

N

Natius calor quomodo conseruetur 512
Natura hominum duplex est 12
Natura primaria est humani corporis opifex ibid.
Natura ægoris, sanitatem comparat ibid.
Natura plura significat 491
Natura in omnibus auxiliatur, morbos indicat, eorumque est medicatrix 12. & 14
Natura quæ nostra regit corpora, nihil aliud est, quam calor naturalis 14
Natura est uniuersa substantia ac temperies, quæ ex primis elementis constat, calido, frigido, humido, & sicco 12
Natura omnium artium, ac artificum ad medendum primaria, ac potissima est 15
Natura nostri corporis humida est, & calida 22
Natura ex tribus partibus constat: spiritu, substantia carnosa, & ex his quæ verè solida dicuntur 65
Natura humorum causa est, quare pituita quotidie, flaua bilis tertio, & nigra quarto quoque die accessionem pariat 555
Natura putredinis quæ, secundum Galen. 18
Natura nostra prima, seu temperamenta tria sunt quæ substantiam complerunt: spiritus scilicet, sanguis, & seminalis humiditas ex Galeno 13
Natura tunc medicis auxiliatur, cum auxilia in tempore, atque ut decet, ei porrigit atque propinat 15
Natura imitator est medicus 34
quæ secundum Naturam sunt, moderata dicuntur: quæ verò præter naturam, immoderata 17

Naturalis

Naturalis caloris vis	512	Palpitatio cordis à pulsu quo differat	258
Naturalis caloris idem est motus in horrore, & refrigeratione extremorum, qui in rigore	546	Palpitationis & tremoris convenientia & differentia	257
Naturalis partus quomodo fiat	421	Palpitationum ortus ex frigore est	ibid.
Nausea quid sit 286. eius signa 287. curatio	288	Paralysis quid	154
Neapolitani qua ratione heclicis cibos parent	598	Parotides quid sint 193. earum causa 194. curatio ibid.	
in Neapolitano regno pluribus in locis manna liquida decidere visa est	626	Particularia tempora quæ	529
Nervorum resolutio quid sit 154. eius signa 155. curatio	ibid.	Partium solidarum triplex substantia	463
Neutra tripliciter dicuntur	87	quarum Partium siccitas instaurari possit, & quarum	ibid.
Nitrosa amaræque quæcunque sunt, ad purgandos omnes meatus valent	30. & 517	Partium naturalis quomodo fiat	421
Nix & pruina idem ferè esse videntur	622	Partium difficultas quid sit ibid. eius cause 422. curatio	ibid.
Nivis generatio	ibid.	Pausaniæ Syri historia	156
Nothæ febres non compositæ ob id quod nothæ sunt, sed simplices non exquisitæ	553	Pectori hominis mammae cur inhereant	266
circa Nubes quemadmodum propter vaporum ad mediam aeris regionem eleuatarum infrigidatione tria proueniunt corpora, aqua videlicet, nix, & grando: ita propter easdem causas in aeris parte inferiori duo corpora generantur, ros & pruina	622	Peripneumonia quid sit 244. eius signa 245. causa	246
Nutritum corporibus inuicem est	12	ibid. curatio	613
Nyctalope quid sit 187. eius causa	ibid.	Pestis quæ minus periculosa, & quæ periculosior	613
curatio	ibid.	Pestis non à quouis celsitatu, quamuis vehementi & diuturno oritur, sed àly epidemic sine peste	603
		Pestis non est ex genere communium morborum qui sunt	602
		ex aëre anni temporibus immutato	606
		Pestis causa	606
		Pestis proprium est non solum ut plures perimat sed ex aëre originem ducat	610
		Pestilens febris ex humorum putredine generatur ibid.	
		Pestilens febris improprie heclica & diaria dicitur ibid.	
		Pestilens febris ob aeris caliditatem immodicam, apud Athenienses orta est	608
		Pestilentes febres cum fiunt, omnibus accidunt, omnibusque communes sunt	608
		Pestilentes febres vtrum diarie fiunt, cum spiritus non putrescant	611
		Pestilentium febrium curatio	614
		Pestilentium febrium natura est duplex	607
		Pestilentia seruati quidam, adeo omnium, quæ antea nouerant, obliti fuerunt, ut non solum suos familiares non agnoscerent, sed ne seipsos quidem	60
		Phlegmone similiarium primo, totius instrumenti per accidens	522
		Phlegmone primo morbus est in quantitate, deinde in intemperie	521
		Phlegmone quid sit	ibid.
		Phrenitis quid sit 123. eius signa ibid. curatio	125
		Phrenitis duplex & vtriusque exempla	60
		Phrenitis quo modo inflammatio dicatur	124
		Phrenitici à reliquis delirantibus in quo differant	ibid.
		Pica morbus unde dicatur	276
		Pica quid sit 276. eius signa ibid. causa ibidem.	
		curatio	ibidem
		Pili unde originem ducant	47
		Pilula pestilentes Russi	619
		Pituita quid sit	555
		Piscium venationes quo modo ab his, qui circa Potum habitant, fiant	623
		Pituita ipsa, siue dulcis, siue acida fuerit, quibus propriè maturatio tribuitur, ex maturatione crassior red- ditur	23
		Pituita falsa in sanguinis substantiam redire non valet	21
		Pleuritis quid sit 232. eius signa ibid. causa	234.
		curatio	235
		Pleuriticorum pulsus qualis sit	233
		Podagra quid sit 432. causa ibid. curandi methodus	

434			
Polypus quid sit 197.	curatio	ibid.	Putredinis genus triplex 49
Polypo qualia medicamenta conferant	197		Putredinis causa efficiens, materialis, augens 513
Positus ipse affecta partis est indicium	105		Putredinis causa adhuc permanentes per contraria tolluntur 513
Potus frigida quibus conditionibus offerendus	509		Putredinem humorum duorum generum esse Galenus asserit 18
Pregnans si quid asperum, acre, vel amarum præter consuetudinem comederit, vel biberit, abortum facit	5		Putredinem inhibere debet, qui febrem curare vult 18. & 19
Preparationi ars medica & medicus opitulantur	29		Putrefactio quid 18. & 605
Prophagia ut eueniant, qua requiruntur	109		Putrida febris quomodo generetur 71
Proapismus quid sit 399.	causa ibid.	curatio 400	Putridus aer si solidas cordis partes occupauit, neque vena sectione, neque purgatione vitendum 616
Primus scopus seu propositum in medendo	473		
Principium dimidium est totius	443		
Principia nostrorum corporum proxima & alia mediata, ex primis quatuor communibus constant	450		
Principia quatuor omnium que oriuntur & intereunt	449		
Principia tria, tres quoque, qua vitam nostram gubernant, facultates sunt in diuersis corporis sedibus	53.		
& ubi sit vniuscuiusque sedes	ibid.		
Procidencia ani quid sit, eius causa, & curandi ratio	323		
Procidencia oculi quid sit	180		
Profluuium alui abortum facere potest	5		
Profluuium muliebri quid sit 408.	eius signa ibid.		
causa 409.	curandi methodus ibidem		
Prognostica artis usus tres	109		
Protrinitudo intellectus, seu ingenium subtilem cerebri substantiam indicat	57		
Pruina quid, & eius generatio	622. & 623		
Pruina in frigidioribus locis generatur	622		
Pituita extenuat & incidit, non modo citra calfactionem, verum etiam absque exsiccatione	516		
Pituita cremor in immodica febris caliditate maxime utilis est	29		
Pueri, & qui crescent, plurimum habent innati caloris	451		
Pueris aliquando vena secanda, & quare	516		
Pueris fere omnibus ob voracitatem, & ob id, quod vna ventriculi operatio non potest duobus simul sufficere, augendo scilicet & alendo, multum sedimenti in vrinis excernitur	48		
Pulmonis ulcera sunt sanatu difficilima	253		
Pulmonis exulcerati signa	252		
Pulsus in diariis febribus qualis	460		
Pulsus commune febribus omnibus ex putredine ortus signum	568		
Pupilla tabes quid sit	182		
Pupilla dilatatio quid sit 181.	eius signa ibid.	causa ibid.	
curatio	182		
Purgatio in primis & ultimis mensibus timenda est grauidis	5		
Purgationes seu medicationes non damus eis, qui corporis salubritatem habent	33		
Purgationes egris corporibus sapenumero aliquo redundantante succo, seu putrescente competunt	ibid.		
Purgantia medicamenta quare dicantur	ibid.		
Purgantia medicamenta ut plurimum potentia calida sunt, febremque augent	35		
Purgantia medicamenta, quoad fieri valet, eligenda sunt que male qualitatibus sunt experta	33		
Pus unde gignitur	18. & 49		
Pustula quid sit	179		
Putredo quid sit	512. & 555		
Putredinis in parte vna citra phlegmonem curatio	521		
cum phlegmone	522		
Putredinis inhibito, manente tamen humorum substantia, non nisi dupliciter fieri potest	19		
			Qualitas alimenti morbo sit contraria, similis solidorum corporum temperatura 528
			Qualitas caloris maximum signum humoris febrem facientis 563
			Qualitas febrilis caloris non simplex est 448
			Qualitas medicamenti pro ratione redundantis succi eligenda est 33
			Qualitas nulla sine substantia inueniri potest 16
			Qualitates contrariae plures, pluresque forme in mixto reperiri possunt 454
			Qualitates contrarias opponere debemus his, que præter naturam inualuerunt 33
			Qualis fuerit eius natura, qui debet perferre purgationem, ad hoc ducere conuenit: & interdum usque ad animi defectionem, si eger tolerare possit 33
			Quantitas auxiliorum ad recte medendum plurimum confert 50
			Quantitas bona purgantis medicamenti, si coniectura viribus accommodetur, magni momenti est 33
			Quantitas cibi unde petatur 525
			Quantitas cibi quid sit ibid.
			Quantitas cibi & potus in peste tanta exhiberi debet, quantam vires exigunt, ut ex ea seruari possint, usque ad morbi summum vigorem 615
			Quantitas cibi quandoque pro copia, quandoque pro forma, seu specie apud Hippocratem & Galenum sumitur 525
			Quantitas morbi ac virium considerata est ei, qui de morbo prædicere velit 571
			Quantitatem cibi coindicantia 525
			Quartana exquisita species multa 581
			Quartana exquisita causa 581. dignotio 583. prognostica, curatio ibid.
			Quartana non exquisita curatio 586
			Quies, & calfactio moderata ad concoctionem perducunt 22
			Quintanorum & septimanorum circuituum causa 557
			Quo modo, & quibus a pestilentia quis præseruari possit 618
			Quotidiana febris incipit ab extremorum frige factione, atque horrore, potius quam rigore 587
			Quotidiana febris signa 588. prognostica 589. curatio ibid.
			R
			Rationem virtutis non indicant, sed coindicant atas, consuetudo &c. 492
			Rationalis facultatis sedes est in cerebro 55. & 6
			Ratiocinandi functio ladi potest, imaginandi, & memorandi facultatibus illeis permanentibus 61
			Ratiocinatricis anima qualiscunque sit substantia, siue corporea, siue incorporea, eius habitaculum est in ipsa cerebri corpore 54
			Refrigeratio quid 546
			Refrigerantia citra adstrictionem in helictis 506
			Refri-

Refrigerantia quibus partibus admoenda	ibid.	bit, si tenuiter viniatur: copiosum vero si largius: exiguum	
Regionales morbi quid sint	600	autem, si modice	45
Renēs ipsi non solas purgant venas ab excremento simul cum tenuiori sanguine ipsum attrahentes, sed arterias quoque	44	Sanitas duplex	84
Renum calculi generatio	375	Sanitas ex temperatura elementorum in humano corpore efficiuntur	12
Renum exulceratio quomodo fiat. 381. cause. 382. curatio	ibid.	Sanitatis in ratione nemo est magis quam athleta miser	92
Renum inflammationis signa 379. cause 380. curatio	ibid.	Sanitatis vniuersa latitudo in tres partes diuiditur	87
Renum lapis quomodo fiat.	374	Sarmentis que dicantur	65
Rerum habenda est ratio in artibus rationalibus, & non de nominibus disceptandum	475	Satyriasis quid sit 399. eius curatio	ibidem
Resolutio neruorum quid sit 230. eius signa 232. curatio	ibidem	Scirrhus quid sit 349. eius cause 350. curatio ibidem	
in Resolutione neruorum cur interim motus, interdum sensus duntaxat, quandoque ambo pereant	154	Scopo ex communissimo, qui est cōtrarietas, qui alij oriuntur	479
Respiratio quis ac qualis motus sit	169	Secunda quid sit 424. unde nomen sumpserit ibid. si derelicta sit curatio	ibid.
Respiratio inter alias omnes functiones maximè est necessaria	169	Sedimentum in corporibus sanis quid 45. eius generatio	ibid.
Rigor quid sit	546	Sedimentum in agris corporibus quid	49
Rima quid sint 322. eorum curatio	ibid.	Sedimentum habet urina copiosum, quoties morbus ex humoribus crudis fatiget: nullum, aut certe minimū quoties ex biliosis	45
Robur virum febris accessione breuiore facit	71	Sedimentorum in urinis notitia medicis est summo opere necessaria	43
Ros & pruina in quibus conueniunt, & in quibus differant	622	Segregatio absque valido calore peragi nequit	28
Ros & pluuia idem sunt	622	Selenides anes in Asia locustis iugiter edunt, easque celeriter excernunt	274
Ros in temperie ac temperatis locis magis quam pruina generatur	622	Semen, seu factum in primis mensibus, optimū ac syncerum sanguinem ex venis matris allicit atque attrahit, non vniuersum seu excrementosum	8
Roris generatio	ibid.	Seminis & sanguinis menstrui temperatura	450
Rubra spata sanguinis exuperantis sunt indicia	560	Seminis parua in utero moles deicitur, idque miratur & amplificatur ex sanguine	13
	S	Seminis profluum quid sit 396. eius cause ibid. curatio	397
Acra res est consilium, secundum Platonem	621	Semiteriana ex continuis est semper	593
Salubre corpus quomodo dicatur	85	Semiteriana febris unde dicta 592. eius curatio	596
Sanguis aliquando putrescere potest	619	Semibus & pueris, cur sanguis non detrahendus	515
Sanguis cum putrescit, biliosus fit, non statim bilis	622	Sensu fit ex alteratione, ac alterationis dignotione	137
Sanguis duplex	541	Serenitate & tranquillitate opus est, utros & pruina fiat	622
Sanguis interdum putrescens sub eius forma permanere poterit, ita ut non confectum in alteram humoris naturam transeat	560	Siccitas quibus corrigenda	506
Sanguis non equaliter secundum omnes sui partes putrescit	559	Siccitates nostris in corporibus sunt quatuor	465
Sanguis syncerus in animalium corpore non reperitur	450. & 560	Signa febrium ex putredine ortarum	461
Sanguis ex vena missio, abortus causa est	5. & 7	Singulus quid sit 283. eius curatio	284
Sanguinis missio duos habet precipuos scopos	5	Singulus a vomitu quibus differat	284
Sanguinis missio facienda pro preservatione abortus, dupliciter intelligi potest	ibidem	Sitis immoderata unde 281. eius cause ibidem curatio	282
Sanguinis missio vtero gerentibus pro preservatione abortus, fluente, vel non fluente ex utero vasis quibuslibet sanguine multo, aut exiguo, in primis, vel in medijs, seu in vltimis mensibus nullo pacto est facienda	6. & 7	Situs & pruina differentia ex Aristotele	623
Sanguinis missione in tutius iteratur, quam usque ad animi deliquium educere	515	Somnus a balneo ea que concoqui possunt maximè concoquitur	22
Sanguinis quantitas tanta à fieri ipso attrahitur, quanta indiget pro eius nutrimento ac augmento	8	Somnus in febribus tertianis initio accessionis vitandus	576
Sanguinis quodlibet profluum vni ex tribus causis tribuitur	198	Sonitus aurium quid sit	191
Sanguinis renum profluum 372. signa ibidem. curatio	373	Splenici qui propriè dicantur	360
Sanguinea febris quamuis sit maxima, non propterea erit ardens	563	Spirandi difficultas quot modis sumatur 220. eius differentia tres	221
Sanies est tenue illud excrementum, quod in canis ulceribus semper colligitur	45	Spiritus animalis in ipso cerebri corpore continetur	55
si quis sanus adhuc existens in sanguinis redundantis concursu sit postea non statim huius muci sanguinem est necesse	8	Spiritus est quoddam corpus calidum, tenuissimum ac leuissimum substantia, ex aëre & tenuissima, leuissima ac syncerissima parte sanguinis seu seminis genitum	64
Sanis in corporibus urina nullo pacto sedimentum habet		Spiritus vitalis est, qui in corde & arteriis continetur	64
		Sputi cruenti ex vasorum extensione curatio	230
		Sputa pallida si fuerint, bilis exuperantis sunt indicia	621
		Sputio cruenta quid sit 224. eius curatio	226
		Statum in pristinum qui rediturus est, is eadem via, unde	

digressus est, reuertatur	17	Temporum differentie due à medicis spectantur	501
Sterilitas quid sit 417. eius signa ibid. curatio	418	Tenebrosa vertigo 158. quomodo ab epilepsia discernatur	159
Stillicidium urinae quid sit 384. cause ibid. curatio	385	Tenesmus quid sit 315. eius signa 316. cause, curatio ibidem	
Stomachi supinitas unde	286	Tenuis quilibet succus crudus est	25
Stomachi, vel ventriculi inflammatio unde fiat, eius signa, cause, curatio 290 per totum caput.		Tenuis præter naturam existeries quæ utero gerunt necessario abortum faciunt	5
Sirangulatio uteri quid sit 410, signa 411. cause ibid. curatio	412	Tenuis ac buliosus si fuerint humores, inter initia euacuandi sunt	40
Stultitia est intellectus seu discursus amissio	61	Terra Armenia in febre pestilenti maxime commendatur	616
Stupor quid sit	155	in Terra ipsa est etiam quedam humiditas	605
Sudor quomodo efficiatur	45	Tertiana febris duplex est, exquisita tertiana, simpliciter, & producta	71
Sudoris & urinae eadem est materia	ibid.	Tertiana febris acutus est morbus	75
Suffusio quid sit 183. eius signa 184. curatio	185	Tertiana, & febris ardens inter ceteras febres sunt biliosissima	78
Suffusionis differentie plures	184	Tertiana mixta cum atra bile, minus est formidanda, quam cum pituita	579
Sugillatio quid sit 177. eius signa, curatio	ibid.	Tertiana pura, est acuta propter subtilitatem materiei, & eius caliditas est magna mordacitina propter fortitudinem cholere	78
Suppresso mensium quid sit 403. eius cause ibid. curatio	404	Tertiane duplicis ac triplicis curatio	577
Suppresso urinae quid sit 387. eius cause ibid. curatio	388	Tertiane plurimam extensa signa	578
Suppuratio quot modis dicatur	247	Tertiane pura signa	574
Suppuratio proprie dicta quid sit 248. eius signa, cause, ibid. curatio	250	Theriaca à Galeno in pestilenti febre commendatur	617
Surdas tri qui dicantur	192	Theriaca vera hodie vix reperitur	ibid.
Surditas quid sit	ibid.	Theriaca non à se propellendo, sed ad se trahendo venenum vacuat	ibid.
Symptomata si aliquid grauius cum febre ex putredine copuletur, quid agendum	537	Thoracis exulcerati signa	252
Syncope quid significet	260	Thymi quid sint 322. unde dicti	ibid.
Syncope quid sit 261. eius cause 262. curatio	263	Topica remedia quando intempestina	519
Syncope quib. à lipothymia, seu lipophychia differat	260	Tophi quomodo fiant 438. eorum curatio	ibid.
in Syncope quare dolores frigidi eueniant	261	Tormina que dicantur	309
Synochus ex sanguine minus acutus est, quam continens ex bile, & quare	564	Trāspiratio prohibita que causa est putredinis humorum ex qua febris, fit ab obstructione	514
Synochorum differentia tres	548	Transpirationis prohibita causa varie	513
Synocham febrem ex bile ortam clara luce fatetur Galenus	549	Troilus Spes vinaceorum usu in podagra maxime subleuatus	643
T			
Tabes pupilla quid sit 182. eius signa, cause ibid. curatio	183	Turba hominum, quantum fieri potest, ingredi domum prohibeatur in peste	614
Tabes pulmonis quid sit 251. eius signa 252. cause, curatio	253	Turgentes humores ante concoctionem euacuare iussit Hippocrates	25
Tabes siue marasmus quando fit 466. incipiens, incre-scens	ibid.	Turgentes humores medicamento purgante sunt mox à principio educendi, si natura eos foras propellere non valeat	34
Tabis species tres	251	Tus & myrrha sub Cane colliguntur	632
in Tabem incidunt maxime iuuenes	253	Tussis ex destillatione orta curatio	219
Tabes laboranti profluuium alui superueniens, lethale est ibid.		Tussis sub qua differentia contineatur	217
Tabida febris, non tantum sicca, sed etiam calida passio est 470		Tussium genera duo	217
Tabidorum pulsus languidus est ac parvus propter facultatis imbecillitatem	252	Tussium sedat manna, que super ramariscum cecidit	623
Tarditas intellectus crassam cerebri substantiam indicat	57	Tympanites quid sit 364. eius signa ibid. curatio	368
Temperamenta singulorum perfecte cognosci vix possunt 490		V	
ex Temperamenti diuisione oriuntur scopi	ibid.	Vacuatio est multiplex	512. & 522
à Temperamento parvis sumitur indicatio, ut ipsum consernetur	524	Vacuatio per accidens refrigerat	521
Temperatura eorum auxiliorum, que naturam in mutationibus iuuant, commodata, ac similis ei corpori, cui admoetur, esse debet	22	Vacuatio citra calfactionem & exsiccationem medico eligenda sunt	512
Tempestas humida, calidaque, & pluvia quare sit pestilens	234	Vapores ex quibus generatur manna concreta, non eo indigent frigore, pro eorum concretionem, quo nix & pruina sed minori, & quare	623
Tempus ante accessionem non indicat cibum dandum esse, sed non prohibet	530	Vene sectio in pestilenti febre quando, & quomodo fieri debeat 615. & sequent.	
Temporis occasio ad recte medendum plurimum confert	34	Vene sectio omnibus febribus putridis competit	519
Tempora accessionis & intermissionis non indicant cibandi tempus	503	Vene sectionem non ob multitudinem sanguinis vacuandam facimus, sed ut materiam quasi per riuos transferamus	312
		Vena	

<i>Vena sectio nec obstructionem, nec putredinem curat</i>	515	<i>Virum robur febris accessiones breviores facit, imbecillitas longiores</i>	71
<i>Vena sectio iterari potest in plethora simplici</i>	ibidem	<i>Visceribus est etiam sua caro</i>	346
<i>Vene sectionis loco quandoque purgatione vivitur</i>	ibid.	<i>Vita quid sit</i>	525
<i>Venaum & arteriarum tale est excrementum, quale in late concreto serum</i>	47	<i>Vicus canum semper exsiccantia, ac purgantia medicamenta desiderat, & quare</i>	47
<i>Venis quae ad ventriculum, & universa intestina pertinent, inest facultas quaedam sanguinis effectrix, qua succum qui ex cibis distribuitur, eisdem in sanguinem mutare naturale est</i>	5	<i>Vmbilicus quid</i>	2
<i>Venenum omne deleterium a foris impositis medicamentis vacuetur</i>	617	<i>Vniuersalis methodus sine exercitatione multa, in singulis artifice bonum efficere non potest</i>	103
<i>Ventriculi inflatio quid sit 294. eius cause 295. curatio ibidem.</i>		<i>Volulus, seu ileus unde nomen sumpsit</i>	310
<i>Ventriculi inflammatio unde procedat, eius signa, cause, curatio 290. & sequentibus per totum cap.</i>		<i>Vomitus quid sit 286. eius causa 288. curatio ibid.</i>	228
<i>Ventriculi postremi cerebri vulneratio maxime omnium animalum ledit</i>	55	<i>Vomitus sanguinis curatio</i>	228
<i>Vermis intra longitudinis quem mulier quadam euacuatione proiecit</i>	278	<i>Urina optima est, non solum si sedimentum habeat candidum & leue, sed si equale sit per omne tempus, dum morbus indicatur</i>	51
<i>Vertigo quid 158. eius causa 159. curatio</i>	160	<i>Urina est serum humorum in venis contentorum 43. quomodo generetur</i>	ibidem
<i>Ver quomodo calidum & humidum intelligatur</i>	601	<i>Urina cruda qua ratione concoqui dicatur</i>	21
<i>Vesica calculo laborantes signa 391. curatio</i>	392	<i>Urina cruda quae</i>	463
<i>Vesica exulcerata signa</i>	394	<i>Urina in febribus diuersi qualis</i>	461
<i>Vesica inflammata signa</i>	393	<i>Urina ut excrementum acervatur in venis & arteriis 43</i>	
<i>Vitii species permulta</i>	527	<i>Urina stillicidium quid sit 384. causa ibid. curatio 385</i>	
<i>Vitii rationem a duobus scopis sumunt Galenus & Hippocrates</i>	527	<i>Urina difficultas quid sit 385. eius causa ibid. curatio ibid.</i>	
<i>Vini potus modice calfacientis ad concoctionem perducit</i>	22 & 32	<i>Urina incontinentia quid sit 390. causa ibid. curatio ibid.</i>	
<i>Vini potus modice calfacientis ad prurum tum dulcis, tum acida concoctionem perficiendum maxime prodest</i>	27	<i>Urine redditio nec naturale opus est, nec animale, sed ex viris que mixtum</i>	389
<i>Vinacei qui dicantur 638. 639. unde fiant</i>	ibidem	<i>Urina suppressio quid sit 387. causa ibidem curatio</i>	388
<i>Vinacei omnibus utiles sunt</i>	463	<i>Urine semper inspiciente sunt in venteris, thoracis, pulmonis ac nervorum affectibus</i>	44
<i>Vinacei etiam si torculari vine admodum expressae fuerint, vini tamen proprietates retinent</i>	638	<i>Urinis quae probe innatant, quanto inferius subsident, tanto magis laudantur</i>	45
<i>Vinaceorum vniuersa substantia frigida est & sicca, atque adstringendi vim habet</i>	640	<i>Urinaculum quid</i>	2
<i>Vinaceorum usus</i>	644	<i>Uterus non alio pacto insurgit ad fetus excretionem, quam expultricis facultatis officio, tam in naturali partu, quam in abortu</i>	5
<i>Vinaceorum usu a graui morbo liberatus fuit author</i>	643	<i>Uteri asperitas ad seminis retentionem utilis est</i>	2
<i>Vinaceis si quis utatur ab initio, calculus in ipso nunquam generabitur</i>	645	<i>Uteri exulcerati signa 427. causa ibid. curatio</i>	ibidem
<i>Viperam veram suis cum conditionibus nunquam videre potuit author</i>	617	<i>Uteri inflammati signa 425. causa ibidem. curatio</i>	426
<i>Vir quare muliere est perfectior</i>	1	<i>Uteri in mulieribus descriptio</i>	1
<i>Viri a mulieribus potissimum circa genitales partes discrepant</i>	ibidem	<i>Uteri procidentia quid sit, eius signa, cause, & curatio</i>	414
<i>Vires inter curatorios scopos non sunt</i>	487	<i>per totum cap.</i>	
<i>Vires ex quibus dignoscantur</i>	109	<i>Uteri strangulatio quid sit 410. signa 411. causa ibid. curatio</i>	412
<i>Vires etsi contrario modo indicent, non propterea ad curationem non conferunt</i>	496	<i>Uteri triplex offensio</i>	4
<i>Vires in febribus consideranda & quo modo</i>	505	<i>Vine austera si suspensa diutius fuerint, dulciores redduntur</i>	639
<i>Vires quando contrario modo indicant</i>	496	<i>Vine quibus exiguum est succus, magis nutriunt: quibus autem vberior, minus quidem nutriunt, sed promptius subsident</i>	640
<i>Vires seruantur vitae custodia causa</i>	494	<i>Vuarum differentia multiplex</i>	639
<i>Vires si fuerint imbecilliores, sanguis mittendus non est, sed deiectio mediocri adhibenda</i>	42	<i>Vuis a solari calore dulcedo provenit, & fructibus omnibus maturatio</i>	641
<i>Virum propria conseruatio</i>	525		

X

X Enocrates de aurium sordibus deuorandis scripsit 499

Xenophontis milites cum per multam niuem iter fecissent oculis laesi fuerunt 173

F I N I S.

252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

FINIS



DONATI ANTONII ALTIMARI DE VTERO GERENTIBVS.

CAPVT I.



VANTVM ad primum, animaduertendum est quod licet homo inter omnia animalia sit perfectissimus, & in eo ipso rursus vir muliere perfectior, (cuius perfectionis causa, vt dicebat Aristotel. primo de Generatione animalium cap. 2. & Galenus 14. de Vsu partium cap. 6. est caloris exuberantia) tamen omnes partes quæ viris insunt, in mulieribus reperiuntur. In vno tantum potissimum, circa genitales partes discrepant: eo quod in mulieribus hæ partes intus conditæ sunt, in viris autem sunt extræ. Nimirum ergo si mulier tanto est mare imperfectior quanto frigidior, non solum secundum genitales partes, sed etiam secundum totum. Quæ imperfectio utilitatem non aspernendam toti humano generi præstitit: fetus enim dum vtero gerunt, non modò pro sui prima constitutione materia postulat copiosam, verum etiam ad eius incrementum. At si calidissima fuisset femina, tale alimentum præstare non potuisset: nunc verò frigidior cum sit, ne concoquere quidem exactè potest, nec valde discutere ac digerere: sequitur vt propter earum frigidam intemperiem benigni alimenti superfluum aliquod colligant. Quod alimentum dum in ætate florenti sunt, tanquam superfluum secernendo ab omnibus venis, per earum quasdam transmissum ad vterum, singulis mensibus, cum prægnantes non fuerint, expellitur. Tempore verò imprægnationis ea excrementa ad fetus educationem sunt accommodata, cum primæ foetura constitutio humidior

cap. 5 ac frigidior extiterit, vt dicebat Galenus libro secundo de Semine. Nec mirum si redundans iste sanguis, antequam concipiant, ad genitales partes ab omnibus earum partibus expellatur, cum hæ omnium sint imbecillissimæ ac infirmissimæ, vt inquit idem

cap. 60. Galenus citato lib. 2. de Semine. Mittuntur namque menses in eas venas, quæ in vtero committuntur, nihil conferente ad eorum delationem ipso vtero, vt liquet quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus. Hac ergo de causa concipiendi instrumenta in mulieribus intus formata sunt. est enim vterus instrumentum commodum, tum ad i-

psus mulieris, tum ad viri semen recipiendum, cum sit eius familiarissimus succus, vt ait idem Galenus decimo quarto de Vsu partium. ipsumque ex duabus tunicis compositum. Quarum exterior nervosa est, interior verò venosa, vt & distendi & contrahi faciliè possit. exterior simplex atque vna, interior verò duplex, vt patet libro de Dissectione vteri. satisque aspera ipsa interior, & præcipuè ad eius fundum, multisque ramis venarum ac arteriarum intercepta, à lateribus processus quosdam mammillares habens ad vtraque ilia. Quos quidam cornua nuncupant, testisque seminarios meatus agnatos habent adiacentes ad fundum eius in vtroque latere vtrinque alterum iuxta cornua. Ad quam à caua vena, & à sibi adiuncta arteria magna, paulò infra eas, quæ ad renes tendunt duæ venæ, & totidem arteriæ deferuntur: quarum altera à dextris ad dexteram, altera ad sinistras ad sinistram vteri partem committitur: & priusquam in ipsam ingre-
diantur, ramulum quendam ad testes porrigunt, deinde corpori ipsius vteri vtraque vnita ipsum intexunt nonnullis ramis venarum, & arteriarum ab ipsis ortis (vt suprà diximus.) Eius autem vteri ceruix musculosa cum sit, carne dura, & cartilaginea constat, quo medio mulier menses expurgat, maris genituram recipit, & fetus in lucem egreditur (vt dicebat Gale. 14. de Vsu partium, & lib. de Dissectione vteri.) in qua ceruice sunt aliæ quædam venæ, & arteriæ, quæ ipsam contexunt, ac nutritur eo sanguine, qui per dictas venas per ipsam trahitur: discissæ siquidem dictæ venæ sunt ab eis, quæ ad sedem tendunt apud os sacrum, cum quibus simul quoddam neruorum iugum extenditur, ac diuiditur, ex eodem loco proficiscens, ac per eandem viam simul ductum. Quorum neruorum crassities pro eorum usu mensurata est: cuiusque ceruicis extremitate vterus cunno committitur mediis quibusdam tenuibus fibris, recto intestino, & vesicæ annectitur, sacro item ossi alligatur, firmis quibusdam vinculis, & lumborum vertebriis. Verum hæc vincula laxa sunt omnia, vt late moueri, & transformari possit. Et quoniam non solum intra eum vterum ipsum semen in coitibus attrahere oportebat, verum etiam retinere eo tempore, quo mulier vtero gerit, nec non excernere, cum fetus fuerit perfectus: ob eam causam genus omne fibrarum natura ipsi molita est, fibris quidem rectis ad sese attrahens, transuersis excernens, omnibusque simul retinens, vt dicebat Galen. libro 14. de Vsu partium.

A

circa fin. Hæc quantum ad vteri constitutionem, & eius naturalem cum vicinis partibus consensum. Eum autem, quem habet cum aliis remotis, tū principalibus membris, breuitatis causa relinquo.

CAPVT II.

Vo verò ad id, quod secundò promissimus, relicta opinione Aristot. 2. lib. de Generat. animal. quæ fortasse ab aliquib. fuit malè intellecta, quia nunc cum medicis verb. a facimus: conabimur eorum sententiam prosequi, & potissimū Hippoc. & Gal. Qua de re sciendum est quòd, cum femina conceptura est, (id verò eo tempore fieri consentaneū est, quo vel incipiunt, vel cessant menses: cum reliquo toto tempore, quo menses expurgantur, concipere nullo modo possit) quoniam semen nequeat in vulua remanere, sed à copia influētis sanguinis eiicitur. Dico ergo, quòd & eo tempore, scilicet cum menstruum non multū, sed paucū effluit: vasa vteri, quæ interiorē eius partem penetrant, ex quibus menses expurgantur, ora aperta habent. Et cum eo tempore semen à viro, si- militūque & ab ipsa femina in vterum mittatur, ob eius vteri asperitatem ipsi vtero adhæret: satisque alimenti ex paucitate confluentis sanguinis habet. Qua de re, antequam menses veniant, conceptus fieri non valet: tum quia semen viri alimento caret, tum quia adhærentiam nullam inuenit. Immo cum lenis inueniatur vterus, defluit semen ipsum: aspera siquidē magis idonea sunt ad coalescendū quàm lenia (vt dicebat Gal. lib. de Dissect. vteri). Continuo igitur sibi permanente semine tempore, quo ab vtero trahitur, cum ab omnibus eius partibus tanquam familiarissimus succus simili modo appetatur (vt idem fateatur. Gal. 14. de vfu partiū, & lib. 1. de Semine.) extenditur demum, ac dilatur, postmodum sui lentitia, ac crassitia, calidorūque corporum adhæsiōne facili assequitur, vt statim tota eius exterior pars quæ vterū attingit, in membranam concrecat. Quæ membrana ab ipso vtero velut frustulū quoddam à ferro instrumento sepa- ta est: & tantum ea in parte, quæ maximè aspera- ta est vteri tunica (hoc verò est in vasorum orifi- ciis) connexa cōspicitur, non secus quàm videre est à dulciariis pistoribus, qui cum supra quoddam in- strumentum calidum aclatum, liqui- dam aliquantu- lum pultem proiciunt: efficiunt placentas, seu cru- stulas: ita natura ex semine intra vterum proiecto, & extensio membranam obducit: qualē dulciarius pistor extra ex pul- te crustulā, vetulamve perficit, vt volebat Gal. lib. 1. de Semine. Quodcunque igitur huiusmodi vasorum orificia semē attigerit, sta- tim alimentum per illa ad sese trahit, membrana ea in parte (vt puta quæ recens ac tenera adhuc sit) pa- tefacto eius foramine, aditum præbete. Quod qui- dem foramen postea temporis processu vas effici- tur, vteri venis coalitū ac simile. Hanc membranā Græci chorion appellant, Latini verò secundas: per quam membranā arteriæ & venæ penetrantes, ma- terias ex vtero ad fœtū transmittunt. Reliquū autē seminis omnes facultates ac vires naturales insitas habet: attrahentem vnā, quæ sibi accommodata ac familiaria trahit: retentiuam ac immutatiuam, quæ sibi cibum præparat: alteram verò expultricem, quæ aliena & superuacua excernit: materias autem proprias, quas attrahit ab vtero, habet, sangui- nem videlicet & spiritum per orificia supradicta,

quibus connexum est. Simul enim & ea, quæ ab vtero mandantur, per vasa attrahuntur, & membra- na ipsa magis ac magis indurefcit, donec ad perfe- ctam duritiem venerit, continuaturque tota cir- cumcirca, ipsum semen comprehendens. Solæ ta- men (vt dictum est) illæ partes perforatæ relinquitur, per quas materiarum fit transmissio. Nam reliquis chorij sinus interiorē partem vteri sub- sternit ac tangit solummodo, sine vlla coniunctio- ne. inde ergo (vt diximus) orta ipsius chorij vasa chorium ipsum intexunt ac inter sese miscentur & coalescunt quadam tenui membrana connexa. cuius coalescētia modus est, velut si cōsiderabis mul- tas ac tennes arboris radices, binas, & ternas inter sese vniri, ac coniungi, vt ex his aliæ quadam maio- res magnitudine, sed numero pauciores oriantur, atq; hæc alias procreent: & hoc tantisper fieri, quoad in vnū coniunctæ omnes ad summam superficiē terræ eam in partem arboris desinant, quæ truncus vocatur: ita hæc vasa chorij velut radices multæ at- que exiles inter se coalescunt, & vnitæ, maiores, quàm prius erant, euadunt, numero tamen paucio- res: demū sic maiores effectæ, vniuersæ in duos qua- si truncos in venas videlicet venæ, in arterias arte- riæ terminantur, ex vtraque parte tam dextra, quàm sinistra circa vmbilicum fœtum ingredientes. Ni- hil enim aliud est vmbilicus, nisi hæc quatuor vasa, duæ scilicet venæ, & totidem arteriæ, in medio vri- naculum habentia. Qui meatus in fundo vesicæ in- fantis exortus, à Medicis vrinaculum nuncupatur: per quem lotium in tunicam aliā intestinale dicitur deriuat (vt infra dicemus). Ex quibus patet partem nullam ipsius fœtus prius posse exire, quàm ea, quæ in chorio sunt, vasa, in quatuor ante- dicta capita coierint: cum singula fœtus membra- tum ad eorū generationem, tum ad reliquā omnē dispensationem, idoneo egeant alimento. Quod alimentum nullum aliud magis pro fœtu reperitur idoneum quàm quod à fœtante suppediat, sanguis videlicet ex quatuor humoribus constans. Quamuis à domino sic appelletur, vt testatur Ga- lenus libro octauo de Hippocratis & Platonis de- cretis. Relinquitur ergo, quòd nullo pacto fieri potest vt aliquod membrum in ipso fœtu absque substantia sanguinea gignatur: vt idem Galenus inquit lib. de Fœtum formatione. & libro primo de Natura humana. Quæ generatio (vt idem Gal. dicebat primo de Naturalibus facultatibus) non est simplex vna quædam naturæ operatio: sed ex alteratione constat & formatione. cum primū autem incipit ipsum animal gigni media alteratio- ne & formatione, id, quod primò semen erat, na- tura efficitur: vt dicebat Galen. 2. de Naturalibus facultatibus. Nam licet huiusmodi facultates sint in ipsomet semine, tamen propter materiæ defe- ctum erant otiosæ. Verū cum primū materiam attingit, circa ipsam operatur: non ab ipsa materia operationem sumens, sed circa ipsam manifestans operationē suam: & quandiu ipsa materia indige- ret, eius seminis facultates essent otiosæ. Propter quod Gal. in præcitato lib. secundo de Naturalibus facultatibus, semen ipsum Phidiæ artificis assimu- lauit sanguinē autē ceræ: quamuis huiusmodi ope- rationes, sicut & omnes aliæ, ab ipsa natura perficiā- tur absq; ratione & intellectu, vt volebat ipsemet Gal. de intriōne Hippoc. lib. 6. de locis affectis. & lib. de Fœtum formatione circa finē. Supradicta

8. de plac.
Hippoc. &
Plat. ca. 4

Lib. de fœ-
tum form.
cap. 2
1. de Nat.
hu. com. 18.

et 27
1. de Nat.
facult. cap.
6

2. de Nat.
facult. cap.
3

Lib. et ca.
eodem.

ergo

Lib. de dis-
sect. vteri
cap. ult.

14. de vfu
part. cap.
11. 1. de Se-
mine. cap. 4

1. de Semi-
ne cap. 4

6. de locis
affect. cap.
6. lib. de
forma fœt.
cap. ult.

ergo quatuor vasa, duæ scilicet venæ & duæ arteriæ
nō tamen inter se commixtæ: sed venis semper cum
venis, atque alteriis cum alteriis coeuntibus, per so-
lum vmbilicum, & per nullam aliam partem, fœtui
inferuntur: venæ quidem statim cum vmbilicum
superarunt in se mutuò coeunt, vnaque efficitur:
quæ sic progrediens ad hepatis sinum inferitur,
demum illinc tanquam à venarum principio ad om-
nes partes distribuitur: ipsæ verò arteriæ in par-
tem magnæ arteriæ, quæ est ad lumbos, per fun-
dum vesicæ adhærescens, ac per totam ipsam velut
per descensum quendam, quousque ad arteriam
perueniant magnam, quæ est ad lumbos (vt dixi-
mus) ibiq; inferuntur. Cur verò venæ statim in vmbi-
lico in vnum sint redactæ, arteriæ verò longo iti-
nere permancant duæ, Gal. 15. de Vsu part. optime
declarat: ego autem breuitatis causa relinquo. Pro-
pterea ergo natura vtrunque vasorum iugum loco
opportuno collocauit, per quæ velut per quosdam
truncos, fœtus ex matrice materias trahit, sangui-
nem videlicet & spiritum: mediis tamen velut ra-
dicibus vasīs, quæ chorion seu secundas intextunt.
Ex quibus sequitur & generatio, quæ efficitur (vt
dictum est) media alteratione & formatione, & nu-
tritio & augmentatio fœtus: nam quousque semi-
nis species in fœtu ipso apparet, ea animalis con-
stitutio non fœtus ab Hippocrate appellatur, sed
genitura: vbi verò sanguine fuerit repletum, cor-
que, cerebrum, & iecur indistinctam quidem ad-
huc, & informem, sed quanquam tamen coagula-
tionem & magnitudinem alicuius momenti præ se
tulerint; hoc secundum tempus fabricæ, fœtum ap-
pellat. sicque, cum substantia fœtus carnea iam est
& non amplius feminalis apparet; verè fœtum tūc
appellat Hippoc. Estque tertium tempus fabricæ,
cum tria supradicta principia videre exquisitè pos-
sumus, & reliquorum omnium membrorum descri-
ptio & delineatio apparet. Quartum tempus verò,
& extremū est, cum brachia & crura, ac omnia mē-
bra distinctè absoluta cernuntur: & tunc non am-
plius fœtū, sed infantem appellat Hippocrates id,
quod in vtero gestatur: eo quia, vt perfectū animal,
& palpat & mouetur. Sed id, videlicet quatenus
animal est, nō habet à femine: sed omnem genera-
tionē ac formationem, à femine habet vt planta, &
non vt animal. principii autē motionū, vt animal,
habet à progerminationibus trium principiorum
eius, mediis neruis, arteriis & venis, quæ à cerebro
corde, & hepate oriuntur, vt volebat Gal. primo
lib. de Semine. Qua de re, quousque supradicta tria
membra fuerint exacte formata & absoluta; semen
ipsum habet opificis rationē ipsi verò exacte abso-
lutis, proprias functiones exercere incipiunt, nullo
alterius auxilio indigētes ad propriā corū functio-
nes exercendā. Quocirca Gal. lib. primo de Semi-
ne posuit fœtum duplex principii, quorū vnum
habēt velut plantā ab ipso semine: reliquum vero
velut animalia habent à tribus principalibus mem-
bris cum iam perfectè formata sunt, & absoluta.
Sequitur modò videamus, sermonis affinitate du-
cti, quod istorum trium principiorum in fœtu pri-
mò formetur: In quo digladiantur Philosophi, tū
Stoici & inter eos Crypsippus, tū Peripatetici & præ-
cipuè Aristoteles, cum ipsis Medicis. Ego verò,
cum Medicus sim; eorum sequar opinionē. Et quo-
niam (vt dictum est) fieri nullo pacto potest, vt ali-
quod membrū in fœtu ipso gignatur absque sub-

stantia sanguinea, vt volebat Gal. lib. de Fœtum
formatione, videtur quod id membrum, quod sub-
stantiam habet ipsi sanguini quam similitudinā, quod
istud membrum ex eo promptissimè concreseat.
Cum ergo ipsum hepar non sit aliud, quàm quod-
dā parenchyma, vt Græci dicunt, Latine verò qua-
si quædam affusio, vt inquit Gal. lib. sexto de Hip-
pocratis & Platonis decretis, & libro decimo Me-
thodi medendi, cum habeat similitudinem in sub-
stantia & colore cum ipso sanguine, eiusque caro
sit sanguinis concretio quædam; sequitur necessa-
riò quod ipsum primò inter hæc tria principia gi-
gnatur. Secundo, cum dictum sit, de intentione Ga-
leni, fœtum ipsum vsque ad eius expressam ac ab-
solutam formationem à semine ipso velut plantā
dispenfari; sequitur quod eo tempore, quo taliter
dispenfatur, nulla sit cordis ipsius necessitas, & ex
consequenti sequitur cor ipsum post iecur formari.
Tertio, cum ad ipsius cordis generationē sangui-
ne opus esset, & iste sanguis nulla conuenientiori
via potuisset ad ipsum distribui, quàm mediis ra-
mis venæ cavae, cuius ortus & principium manife-
stè in ipsius hepatis gibba apparet, prout nonnullis
rationib. diffusè à Galeno probatur sexto de Hip-
pocr & Plat. decretis. Sequitur necessariò, quod iecur
ipsum primò: cor secundo, vltimò cerebrum in
fœtibus gignatur: prout quàm dilucidè se deter-
minat Gal. lib. de Fœtum formatione, ibiq; cor-
rigit ea, quæ ipsemet dixerat de cordis generatio-
ne in commentariis de semine, cuius etiam opinio-
nis voluit Gal. citato lib. de Fœtum formatione,
quod fuerit Hippocrates libro de Natura infantū
siue ipse fuerit, qui eum scripsit, siue Polybus eius
discipulus: taliter quod per illud rubrum, quod in
Psaltria ancillæ genitura excussa, post sex dies, ap-
paruit, hepar intelligat Hippocrates, & non cor,
vt aliqui interpretantur. Cur autem cerebrum vlti-
mò post iecur, & cor institutum fuit: dicebat Gal.
libro de Fœtum formatione: quia fœtui cerebro
non erat opus, cum neque videre, neque gustare,
neque olfacere, neque vlla alia functione ipsius vt
ipsum oporteret: nulla sensus tangendi, nulla ima-
ginationis, nullaque cogitationis, nec memoria
ipsi necessitas est. Formatis denique hoc ordine
tribus supradictis membris principibus, aliisque
partibus, tum ventris, tum brachiorum, & crurum,
sequitur quartum tempus post primā conceptio-
nem, vt Hippocrates dicebat, in quo non amplius
fœtus sed infans appellatur. Formato itaque, atque
absoluto infante in vtero eo modo quo dictum est:
quoniam necessum erat in ipso aliqua gigni excre-
menta, cum statim ab eo fœtu exhalet quoddam
vaporosum excrementum, quod sudori perfecti
animalis correspondet, necesse fuit huic excremen-
to membranā aliquam, in qua reponeretur, fabri-
cari, totum vnde quaque fœtum ipsum seu infantē
circumplectentem: sicque fabricata fuit ad hunc v-
sum membrana quædam, quæ Amnios Græce ap-
pellatur: Latini Amiculum nominant: lata quidem
& crassa, vt non solum sudoris receptaculum effi-
ceretur, verum etiam futuris motionibus membro-
rum fœtus posset persistere, cuius sudoris nō parua
existit vtilitas ipsi fœtui: vt fatetur Galenus 15. de
Vsu partium, vt pote quia fœtus in eo quasi inna-
tans sursum tollitur, ac vehitur, vt minus fiat grauis
his vinculis, per quæ matri cohærescit, & hac de
causa, vt ipse eodem loco dicebat, vt plurimū præ-

cap. 3.

6. de plac.
Hippoc. &
Plat. ca. 8.
10. metho.
medendi. c.
ult.

6. de plac.
Hippoc. &
Plato. cap.
1. siue ad
6. li. de for-
m. cap. 3.
lib. & cap.
eodem.

Lib. & ca.
eodem.

13. de Vsu
partium. cap.

41. de Vfu
part. ca. 10.
11
1. de Sem. c.
7
2. de Sem.
cap. 1. & 4.

feruat ad arboſu. Qui fortasſe vtero gerentibus om-
nib. eueniret, niſi foetus in huiusmodi humore in-
natus lenior fieret. Et quia auctoritate Galeni lib.
decimo quarto de Vſu partiũ, & primo & ſecundo
libro de Semine, mulieres ipſæ ſemen habet, idque
cum conceptura ſunt, eodem tempore cum mare
ex ſeminariis vaſis, & teſtibus cornibus ipſius vteri
mediis in eius ciuitatem emittunt: ex hoc ſemine
licet aquoſo & imperfecto, non pauca ſequitur ipſi
foetui vtilitas. Nam cum primum ſemen viri in v-
terum eiicitur, ex huiusmodi ſeminarum ſemine
tanquam Natura magis ipſi familiari quàm ſanguis
ſtatim dico ex huiusmodi ſeminarum ſemine nu-
tritur. Tum verò ex eo quædam alia tunica Allan-
thoides Græcè dicta, Latine inteſtinalis, gignitur:
ex figura ei nomen impoſitum, hæc membrana prius
tamen fabricata quàm ſupradicta Amnios dicta,
tenuis ac imbecillis, propterea quòd ex ſeroſio-
ri ſemine fuit effecta, anguſtior tamen quàm ſu-
pradicta. Quia ſemineum ſemen multò minoris
quantitatis eſt, quàm maris, longa vt vtriſque v-
teri cornibus appendatur: formati iam animalis v-
rinam excipit medio eo meatu, qui in fundo veſi-
cæ infantis eſt exortus: quem meatum, vt ſupra di-
ximus, vrinaculum Medici appellant. Qui humor
ad vrinam inſtat cum tenuior, tum ſtatuor, tũ acrior
eſt eo humore, qui intra Amiculum continetur, vt
teſtatur Gal. 15. de Vſu partium, & lib. 1. de Semine.
Horum duorum humorum cõmunis vſus, aliæque
ſeminarum ſeminis vtilitates latius conſcribuntur
à Gal. lib. 1. de Semine, & lib. 14. de Vſu partium.
Hac de cauſa rcliquo hæc quantum ad ſuccinctã
foetus conſtitutionem, formationem, & cum vtero
alligationem, quæ non parum ad rem, quam diſſe-
rere propoſuimus, cõducere videntur: ne quis for-
tè aliena fore arbitretur, ac ſuperflua pro hæc diſce-
ptione. Nutritur verò, & augetur ex ſanguine,
qui de matre in vterum deſcendit ex toto eius cor-
pore ſingulis diebus. Deſcendit autè non propter
ea quòd ex toto corpore, tanquam excrementum
exiſtens, ad ipſum vterum, & per conſequens ad fœ-
tum ipſum expellatur, velut ſanguis, qui in ſingulis
menſibus, mulieribus vtero non gerentibus, expur-
gatur: nam iſte ſanguis eo tempore, quo mulieres
prægnantes non ſunt, à toto corpore, tanquam ex-
crementũ exiſtens, expellitur, ipſo vtero nihil con-
ferente ad eius delationem, vt diximus ſuprà de in-
tentione Gale. lib. 5. de ſimplicium medicamentorum
facultatibus: verum iſt ſanguis, qui deſeruit pro
alimento ac augmento foetus, velut eius vtile ac fa-
miliare alimentum, non ſingulis menſibus, ſed ſin-
gulis diebus vi attractricis facultatis ipſius foetus
trahitur, prout in dies vires habet attrahendi, & eo
magis ac magis indiget, vt volebat Hippoc. lib. de
Natura infantium. Nec ita excrementoſus eſt, ve-
lut ipſe qui ſingulis menſibus expurgatur, cum ſit
eius tenuiſſima ac ſynceriſſima pars: & potiſſimum
in primis menſibus. Trahitur ergo tanta eius quan-
titas, quanta ſufficiens eſt pro eius nutritione & au-
gmento. Hoc idem aſſeruit Galen. 4. de cauſis ſym-
ptomatum. Vbi loquens de deprauati appetitus
prægnantium cauſa, inter alia dicebat, quòd foetus
in primis menſibus paucũ ad ſe ſanguinem, ac opti-
mum trahit; quia pauco indiget alimento: cum pa-
rum ſit auctus. Vbi verò procedente tempore iam
increuit; tunc plurimo eget alimento: & propter
hoc magnam trahit ſanguinis copiam. Itaque tra-

15. de Vſu
partium,
c. 5.
1. de Sem.
7. & 10. 14
de Vſu par.
cap. 11.

5. de Sim-
plic. medic.
facult. cap.
22

cap. 7

hit etiam aliquem vitioſum ſimul ſanguinẽ, & ex-
crementoſum. Quæ excrementa redundantia ab
attracto ſanguine ſupra eius alimentum, in ſupra-
dictas duas membranas expellit ac reponit. Et pro-
pterea dicebat Hippocrates libro de Natura infan-
tium, quòd, cum ſcœmina prægnans eſt; non labo-
rat, nec languet, ſi ſingulis menſibus menſes non
deſluent: velut illæ, quæ vtero non gerunt: nam iſte
ea de re laborant; quia ſingulis menſibus ſanguis
in corpore perturbatur, ac cum labore permoue-
tur. His verò prægnantibus quietè, placidè, ac ſen-
ſim ſine aliquo labore in vteri venas ſingulis, vt di-
ctum eſt, diebus vi attractricis facultatis foetus, de-
ſcendit, atque pro ſuo tum alimento, tum augmen-
to, vt dictum eſt, per medias chorij venas, & demũ
per ipſius vmbilici vaſa ad hepar, & denuo, eo ab-
ſoluto, ab ipſo, mediis venis, per totum corpus &
quamlibet eius partem diſfunditur ac diſtribuitur
mediis facultatibus naturalibus, quæ ipſis partibus
naturaliter inſitæ ſunt. Ex quibus patet, quomo-
do & quali ſanguine foetus nutriatur ac augetur.
Quod quidem ignorare non debet, imò & memo-
riæ tenere, qui velit huius noſtri quaſiti veritatem
percipere. Hæc quòd ad ſecundum.

CAPVT III.

Reliquũ eſt (quoniam, vt inquit Hip-
pocrat. primo lib. de Fœminarũ af-
fectibus, Mulieres nonnunquam etiã
nolentes abortum faciunt) vt cauſas
abortus dinumeremus: nã & hæc quo-
que non parum conferunt ad huius quaſiti verita-
tem veſtigandam. His enim dinumeratis facile po-
terimus veritatem dilucidare: cum ipſa præſeruatior
(vt dicebat Gal. lib. 1. de Compoſit. medic. per ge-
nera. cap. 1.) ſit ipſarum cauſarũ affectus præter Na-
turam parientium: ſicut curatio primò ipſarum af-
fectionum. Dicemusque omnes cauſas, quas poſuit
Hippo. tum citato lib. de Affectibus fœminarum,
tum lib. Aphor. 5. Demum, ſi quæ fuerint à iunio-
ribus Medicis conſcriptæ, eas quoque non præter-
ibimus: dicebat enim Hippo. ipſe, quòd ſi alicui fœ-
minæ vtero gerenti caput pituitoſum fuerit, eaque
pituita in ventriculum deſcendat, cum neceſſum
ſit ad id ſequi nonnullos cordis affectus præter Na-
turam; diſſoluuntur itaque, ac imbecillis redditus
ſit abortus. Sic etiam & in ingenti inedia & in ci-
borum ſatidio periculũ eſt quòd abortus fiat, eadẽ
de cauſa ſcilicet: quia imbecillæ redduntur. Hoc
idem volebat fieri in largo ventris fluore: etiam
ſi quod onus graue portauerit, ſi percutiatur, ſi ſa-
liat, ſi non comedat, ſi aliqua animi perturbatione
vexetur, ſi terreatur, ſi fortiter clamet, ſi febrat, ſic
etiam ſi crapuletur: nã immodicus cibus ac potus
ſæpe cauſa eſt, vt foetus perdat. Si vterus ipſe ple-
nus fuerit flatuoſo ſpiritu, cauſa eſt, vt partus ei-
ciatur: ſic ſi denſus valde: ſi magnus, paruusve ſit v-
terus ipſe: ſi aliquo alio magno morbo, vel dolore
laborat, & potiſſimum lumborum. Sunt etiam
cauſæ quædam, quæ foetum eiiciunt: vt ſi quid acre,
aſperum, vel amarum præter conſuetudinem co-
medant, vel bibant, & potiſſimum in primis men-
ſibus: ita etiam ſi ea comedant ac bibant, quæ
valde ventrem commoueat: ex ſuperfluo item e-
xercitio, ſeu labore, ex maxima ventris conſtri-
ctione ſequitur quoque nonnunquam abortus.
Hæ ſunt cauſæ, quæ eo ordine, quo conſcripſi-
mus,

15.
par.
cap.

mus, ab Hippocrate dinumerantur eodem primo libro de Foeminarum affectibus. libro autem aphorismorum quinto, nonnulla tum supra dictarum causarum, tum aliarum ab eodem scribuntur. Vnde Aphor. 29. volebat, quod in primis & ultimis mensibus verenda esset grauidis purgatio tanquam de facili valens abortum prouocare. & Aphorif. 30. dicebat quemlibet morbum acutum, tam cum febre, quam sine febre (vt exponit Galen. in commento) vtero gerentibus fore letale, vtpote tam foetum quam foetantem perimens. Aphorif. 31. expresse volebat sanguinis missionem ex vena fore causam reddit Galen. in commento. In Aphorif. 34. voluit alui profluuium posse abortum facere. Aphorif. 37. dicebat, Si mamma vtero gerenti repente fiant graciles, abortit. Gal. autem in commento reddens rationem dicti Hippocratis in Aphorismo asserbat non propter aliud significari abortum ex mammarum gracilitate, quam propter alimentum defectum: qui alimenti defectus sequitur tum ad incediam, tum ad sanguinis paucitatem, quae est in venis communibus vtero & mammis. & hoc idem sentiebat in sequenti Aphorif. 38. Aphor. autem 43. dicebat erysipelas in vtero grauidis fore letale. Vnde Galen. in commento dicebat quod ex necessitate foetus eo casu morietur. Aphorif. vero 44. ait de his, Prater naturam tenues existentes, quae vtero gerunt, necessario abortum pati, antequam foetus naturaliter in lucem edatur ac crascescat. Et in 46. Quaecunque prater naturam crassae, non concipiunt. Verum Aphorif. 45. fatebatur causam abortus in primis mensibus in corporibus mediocribus, absque alia occasione manifesta, semper fore mucorem nimium, acetabula vteri implentem, ac ex pondere ea dirumpentem, non valentibus supradictis acetabulis propter dictum pondus foetum continere. Cuius opinionis fuit Galen. in sexto lib. de Locis affectis. cap. 5. & 15. de Vsu partium. cap. 5. & lib. de Dissectione vteri. cap. vlti. Et, licet ab Hippocrate (vt quilibet sanae mentis percipere potest) omnes ferè tam externae, quam internae causae abortus in praedictis locis dinumerentur, tamen iuniores Medici aliquas, quae tacite ab Hippocrate tactae videntur, dinumerarunt. Et inter externas volunt, continentis nos aeris superfluum frigiditatem aut caliditatem: velut, si talis intemperatura fuerit regio, & tempus anni, posse abortum prouocare. quas causas Hippocrat. meminit libro Aphorif. 3. ita quoque & balneum superfluum, aut calidum, aut frigidum. Addunt & coitus multitudinem. Et inter causas perterrefactientes, terremotus, tonitrua, fulguris aspectus, ac bombardae sonitus. Inter causas vero internas conscripserunt quasdam ex parte foetus & partium continentium eum, vt sunt imbecillitas, aut mors ipsius foetus, mollificatio, aut ruptura abortus à Galeno 15. de Vsu partium: vtpote ruptura membranae, quae Amiculum dicitur: quae (vt supra diximus) humorem ad sudoris instar continet, & in eo foetus quasi innatans, minus fit grauis iis vinculis per quae vtero alligatur. Ea ergo disrumpit, cum dicta humiditas effundatur; foetus ipse amplius in ea non innatans, fit maxime grauis supradictis vinculis. Quapropter necessum est dirumpantur, & per consequens abortus fiat.

15. de Vsu
partium,
cap. 5

Medicamentorum insuper occasione sequuntur abortus, quae vel abortum prouocant, vel alio quopiam affectu foetum perimunt, vel aliquas membranarum eius corrumpunt, incidunt, & cum vterus ex distensione male est affectus, eodem auctore, tertio de Natur. facultat. Ponunt etiam quasdam alias causas ex parte foetantis, vt putae oris matricis amplitudinem, propter quam non potest post coitum sequi perfecta constrictio, & per consequens seminis retentio: item & tenuitatem seminis, ac paucitatem eius. propter quod non possunt ex eo generari membranae ita valentes, vt foetum ipsum valeant continere. Vltimo aiunt omnes intemperaturas tum vteri, tum aliorum membrorum. Quae cum ipso vtero consensum habent, siue fuerint simplices, siue compositae, siue cum materia, siue absque materia, fore causas abortus: sic habitus quoque mulierum si molles ac humidae valde fuerint: licet concipiant, non possunt tamen vsque ad praefinitum tempus foetum continere, verum ante ipsum abortum patiuntur. Haec sunt in vniuersum causae abortus quae tum ab Hippocrate, tum à Galen. tum ab aliis iunioribus Medicis conscriptae reperiuntur. Communis autem omnibus iam dictis affectibus ipsa est vteri offensio: atque huius ipsius triplex est causa, aut moles nimia, aut pondus aliquod, aut morsus moles, vbi amplius distendi vterus non valet: pondus, cum supra vires eius sit, quod continet: morsus, vbi vel humores, qui prius in membranis continebantur, his ruptis, in ipsum vterum sunt effusi: vel etiam totus partus corruptus & putris, ac in noxiam saniem dissolutus, vteri tunicam eius occasione irritat, ac mordet. Cum ergo horum aliquod non naturae sponte, sed violenter incidat, abortus prouocatur: Gal. auctore 3. de Natur. facult. Nam partus succedunt vehementissimis motibus ipsius foetus, vt ait Hippocr. lib. de Natur. infan. vterus vero non alio pacto insurgit ad foetus excretionem, quam expultricis facultatis officio tam in naturali partu, quam in abortu, vt liquet 2. de Causis sympt. Verum in naturali partu ex naturae sponte: in abortu, violenter, vt dictum est, ab aliqua dictarum causarum prater naturam irritata. Est enim abortus nil aliud, quam violenta & intempestiua foetus editio: vt omnibus in confesso est. Restat modò his sic explicatis, vt ad veritatem quaesiti, eiusque dilucidationem properemus.

3. de Pot.
natur. c. 12.

3. de Pot.
natur. c. 12.

cap. 3

CAPVT IIII.

Vinc ad dilucidationem veritatis eius, quod principaliter quaesitum est, percurramus. & vt ea clarius elucescat, primò animaduertendum est, quod ab omnibus Medicinae auctoribus concessum est, & praecipue à Gal. lib. de Sang. missione. & 9. de Meth. med. sanguinis missionem duos habere principes scopos. Aut enim fit pro euacuatione tantum eorum succorum qui in venis continentur: aut pro auersione cum euacuatione, tam ad longinqua quam ad proxima: siue fiat ea ratione curationis, siue praeseruationis. Ex quo patet quam friuolae sint aliae intentiones quae à iunioribus Medicis inaniter dictae ac inuenta, & ab ipsis commettae circa ipsam sanguinis missionem fuisse. Nam si quid aliud ad eam sequitur, illud est secundario & per accidens. Eius autem principes, & per se scopi

Libr. de
Sang. missi.
cap. 11. 12.
& 9. meth.
med. cap. 11

Lib. de Cō-
stit. art. me.
cap. 19. lib.
ad Tra. ca.
30. lib. art.
med. c. 99.

non sunt alij præter supradictos duos. Quid verò sit sanguinis missio, tanquam omnibus notū omitto. Secundo notandum est quod præseruatio, quam Græci prophylacticam vocant, vera ac sincera (vt dicebat Gal. lib. de Constit. artis medicæ, & in lib. An tuenda sanitas spectet ad Medicum, vel Gymnasticum, & lib. 3. artis Medicinalis) propriè attinet ad affectum futurum fieri, prohibendo eum, quam uis nondum sit in corpore: tamen quia imminet periculum ne quamprimum fiat. Hoc autem perficit artifex, delens ac auferens eam causam, ex qua affectus ipse præter Naturam quamprimum futurus est fieri: & non eam, ex qua sensibilibus morbus gignitur. Nam illa quæ hanc auferit causam, non est sincera & pura prophylactica, cum sit pars quædam artis curatricis. Dicitur autem aliquo modo prophylactica, seu præseruatio: quia causam, quæ morbum creat, adimit: vt voluit Gal. II. Meth. medendi. Hoc aut perficitur siue per alterantia, siue per euacuantia, si opus est: vel per vtrunque, Gal. auctore lib. de Constitutione artis medicæ, circa finem. Nimirum ergo si supra de intentione Gal. lib. I. de Compositione medicamentorum per genera, dicebamus præcautionem, seu præseruationem primò & per se fore causarum parientium affectus ipsos præter naturam existentium. Tertiò est animaduertendū quod sanguinis missio facienda pro præseruatione abortus potest dupliciter intelligi: vno modo, nullo apparente adhuc sanguinis fluore ex vtero, siue fuerit ex venis quæ in eius cavitare terminantur, siue ex venis, quæ ad ceruicem committuntur. Alio modo possumus loqui de re, apparente aliquo sanguinis fluore ex quouis supradictorum locorum fuerit. Quartò notandum est, quod diuidendo tempus foetationis in tria tempora præcipua, possumus loqui de supradicta sanguinis missione facienda, aut in tribus primis mensibus, aut in mediis, aut in vltimis. Notandum insuper est & quintò, quod, cum loquimur de supradicta sanguinis missione facienda pro præseruatione abortus: de ea non aliter loquimur, quàm indicatione tantum sumpta ab ea abortus causa, quæ licet ipsum non cœpit facere, tamen facere potest in futurum. Ita quod per ipsam sanguinis missionem foetum præseruando, prohibemus ne abortus in futurum fiat: & sic loquimur de vera ac sincera eius præseruatione, & non loquimur de supradicta sanguinis missione, prout posset in vtero gerentibus curare nonnullos affectus præter Naturam qui in ipsis gignuntur ac fiunt. Sextò notandum est quod sicuti perpetuò optimū est maximè tutò curare, vt volebat Galenus decimo quarto Metho. medendi, quod consistit in tribus, videlicet in cōsequutione intenti finis: aut saltem quem curas non laedas: & tertium, quod non faciliè vitium reuertatur. Propter quod præcipiebat Galenus ipse 12. Methodi medendi, quod terminus cap. 1. Medici, qui contra morbum pugnat, quem nullo pacto transire debet, est, vt tutò medicetur. Ita quoque in prophylactica, seu in præcautione prosequendum est: quia, cum in ea Medici intentio sit causam auferre, quæ posset aliquē præter Naturam affectū futurum efficere (vt prius dictum est) debet id prosequi omni conatu, tam per alterantia quàm per euacuantia, cum eis quæ maximè tuta sunt & cum quibus iam certus est non posse aliquā corpori noxam inferre. Hoc idem volebat Hippocrat. primò de Morbis vulgaribus, sub his verbis, Te ad hoc

1. epid. 5. 2.
sec. 50.

exerceto, morbis vt prois, aut nequid noceas. Quibus sic stantibus, dico assertiue absque controuersia vlla, sanguinis missionem vtero gerentibus, pro præseruatione abortus, fluente vel non fluente ex vteri vasis quibuslibet sanguine multo, aut exiguo in primis, vel in mediis, seu in vltimis mēsis nullo pacto faciendam fore. Ad quam veritatem corroborandam afferam in mediū nonnullas tum rationes, tum auctoritates: quarum rationum prima est. Omne illud, quod est per se causa faciens abortum, non potest præseruare ab eo: sed sanguinis missio est per se causa faciens abortum. igitur non potest præseruare ab eo. Maior patet: quia si non sequeretur quod idem simul & semel esset per se causa abortus, & præseruaret ab illo: quod est falsum & impossibile. Minor est Hippocratis Aphorism. 31. quintæ particulæ. Secunda ratio: Ex quacunque causa per se foetus destruitur, ex eadem nullo pacto potest conseruari: sed alimentis defectu per se foetus destruitur. igitur ex eo non potest conseruari. Maior patet. Minor est Galeni in commento citati Aphorism. tunc arguitur sic, Ex sanguinis missione vtero gerentibus facta, per se sequitur defectio alimentis foetus, vt patet per Galenum in eodem loco. Igitur ex sanguinis missione nullo pacto potest foetus ipse in vtero conseruari. Tertia ratio. Si de quo minus videtur non inesse, & inesse: ergo de quo magis. Sed minor noxa videtur quod foetus inferatur ex inedia, & tamen ea est causa abortus, vt patet per Galenum in commento Aphorism. 31. & 37. quintæ particulæ. Ergo magis sequetur ex sanguinis missione, cum maior noxa ex ea foetus inferatur. Maior clara est apud omnes Logicos. Quarta ratio: Si ex alui profluvio periculū est vtero gerentes abortire, solum ratione euacuationis, vt volebat Galenus in commento Aphorism. 33. quintæ particulæ: quæ euacuatio est aliorum humorum à sanguine, quanto magis ex euacuatione per sanguinis missionem, quæ sanguinem euacuat, ex quo sanguine foetus nutritur, & per consequens magis ei alimentum subtrahitur? Quinta ratio probans quod in primis mensibus nullo pacto pro præseruatione abortus competat sanguinis missio, est ista: Dictum est supra, præseruationem fieri per ablationem causæ, quæ posset in futurum quamprimum aliquem affectum præter naturam in corpore gignere. Tunc argumentor sic: Quæcunque corpora mediocria absque occasione manifesta abortiunt in primis mensibus, eius causa est plenitudo mucoris in vteri acetabulis: quæ dicta acetabula dirumpit: sed sanguinis missio nullo modo potest talem causam auferre ac prohibere, imò potius augere. igitur nullo pacto in primis mensibus ea facienda est. Et, si diceretur quod possunt nonnulli alij sensibiles præter Naturam affectus manifesti atque occulti in dictis primis mensibus abortum facere, qui affectus præter Naturam curari possent per sanguinis missionem, & ita abortus præpediri: tunc dico quod ea sanguinis missio præcipue fit pro curatione dicti affectus præter Naturam. Quo casu non est nostra intentio de ea loqui. nam (vt diximus supra) loquimur hic de sanguinis missione vtero gerentibus facienda, prout principaliter & per se posset ab abortu præseruare, & non per curationem alicuius affectus præter Naturam: in quem possunt prægnantes incidere, & curari forsan per sanguinis missionem: licet per eā (vt volebat Hippocrat. citato Aphor. 31. quin-

cap. 10.

31. quintæ particulæ. semper noxa foetus inferatur, & præcipue si aliis auxiliis curari non valeant. Nam eo tempore, licet per sanguinis missionem noxa imminuat foetus, vt diximus de intentione Hippocratis: tamen, quia alia salutis ratio non est, quam ea: etsi fuerit cum periculo, tentanda est, vt iubebat Galenus in his casibus decimo Method. medendi. ex Thucydidis consilio, eius tamen quantitatem minuens. Quod si affectus ipse præter Naturam ex ea curetur, & abortus non sequatur: hoc erit per accidens tum ratione quantitatis, & non qualitatis sanguinis missionis: cum ratione sui semper habeat abortum facere, nisi à quantitate labefactetur: tum quoque, quod ex tali sanguinis missione maius sequitur incommodum, quam incommodum, auferens per eam maiorem abortus causam. Et in hoc maxime allucinatur nonnulli nostri temporis Medici, qui quosdam interdum præter Naturam affectus taliter curantes, siue occulti fuerint, siue manifesti, putant se nonnunquam per sanguinis missionem præseruare vtero gerentes ab abortu, nullum facientes discrimen inter curationem, seu non veram prophylactice, & sinceram prophylactice: quamuis valde discrepent. Et hoc quoque dicendum erit eis, si aliquando in medijs & vltimis mensibus fortè in his casibus præcipiatur sanguinis missio alicui gerenti vtero, & abortus non fiat. Sexta ratio ad idem. Humoribus crudis, seu vitijs in ventriculo contentis, nullo pacto facienda est sanguinis missio, vt volebat Galenus in lib. de Sanguinis missione. & nono method. medendi. sed vtero gerentibus semper, vel saltem vt plurimum, tales humores in ventriculo continentur. Igitur eis non facienda est sanguinis missio. Nam per illam sanguinis missionem talis humoris crudi, vel vitijs attrahuntur ad venas. & sic non modò possunt esse causa abortus, immo maximam noxam & fortasse exitum inferre possunt ipsis vtero gerentibus. Secundo ex dicta sanguinis missione sequitur agitatio & commotio quædam dictorum humorum in ventriculo contentorum, ad quam sæpe animi deliquium, multoties syncope & quandoque mors sequi solet. Tercio ex eorum commotione fit appetitus ablatio, seu deprauatio: ad quam sequens inedia subtrahens foetus alimentum, posset abortum facere. Quod autem supradicti humores in vtero gerentium ventriculis contineantur, patet ex Galeno libro 4. de Causis sympt. Verum, quod in medijs & vltimis mensibus nullo pacto debeat talis sanguinis missio pro præseruatione abortus fieri, vnica ratione probatur sic. Eo tempore, quo foetus indiget multo ac maiori alimento, nullo pacto id debet ei subtrahi: sed in medijs & vltimis mensibus, cum foetus sit maior, multo maiori indiget alimento. Igitur eo tempore, pro eius conseruatione, nullo pacto erit sanguinis missio facienda: immo, si fiat, ex ea potius sequetur eius destructio & mors, vt volebat Hippocr. Aphor. citato. 31. quintæ particulæ, & Galen. in eius comment. Quod autem prædicta sanguinis missio non sit facienda, nec in primis, nec medijs, nec in vltimis mensibus, iam patet ex sententia Hippocr. in supradicto Aphorif. vbi dicebat: Mulier vtero gerens, sanguine misso ex vena, abortit: & magis, si foetus sit maior. Hoc idem testatur Galen. in commento dicti Aphorif. & in nonnullis alijs locis. Vltimò cui dubiū est, quin, si potuissent vtero gerentes per sangui-

De sangui-
nis missio.
cap. 20.
9. Metho.
med. cap. 5

1. de Sym-
ptom. cau.
cap. 7

nis missionem aliquo pacto præseruari ab abortu, illud literis mandassent tot ac tanti auctores artis Medicæ, qui ante nos fuere, & præcipue Græci: qui inter omnes alios audaces extiterunt in sanguinis missione facienda. Verum, cum illud ab aliquo eorum scriptum non reperiatur, immo à cunctis interdicatur præcipue ab Hipp. & Gale. autumandum est nullo pacto fieri posse, ac debere, tum potissimum, cum Hippoc. singulæ causæ, quæ abortum efficiere possent, fuerint notæ, ac ab eo conscriptæ, vt suprà annotauimus. Et tamen ab eo non modò dicta sanguinis missio nullibi conscripta reperitur, ac probatur, immo expressè in paulo ante citato Aphorif. prohibetur. ad hæc, si nulla earum, quas recensuimus abortus causas venæ sectione citra periculum auferri valet, tutius verò & absque noxa alijs medijs auferri queat: quis negabit ab ea abstinentum esse, ac alijs vtendum tutioribus auxilijs pro earundem causarum sublatione, si modò medicus semper tutè curare debeat? Cõcludamus ergo cum eo, & cum Gale. ac omnibus alijs medicæ artis eximijs auctoribus, nullo modo talem sanguinis missionem pro abortus præseruatione faciendam fore. & si qui eam præcipiant, quam valde supradictis auctoribus se opponunt, ac à veritate deuant.

C A P V T V.

Nstabunt fortè aliqui in medium afferetes quasdam abortus causas, quæ ab Hippocrate non fuerunt notæ, nec conscriptæ. Pro quarum delatione aiunt, quod sanguinis missio pro præseruatione abortus competat, vt puta vtero gerentibus corpora habentibus plethorica, in quibus redundans sanguis sit multus, siue ea multitudo fuerit quò ad vasa, siue quò ad vires (cum duplex ea sit) vt volebat Galen. lib. de multitudine, & libro de sanguinis missione: saltem in primis mensibus, ne foetus ipse ab ea sanguinis multitudine suffocetur, quæcumque ea sit, extat alia causa (vt aiunt) puta plenitudo vitiosi sanguinis, si vtero gerentibus insit. Quæ plenitudo sanguinis vitiosi potest sui vitio, eo sanguine existente inepto, pro alimento foetus ipsum perimere, & per consequens abortum proritare: potissimum si mulier conceperit, cum menses incipiant fluere, & sic eorum pars aliqua superflua retineatur: quo casu facta sanguinis missione ex venis cubiti maxime interna, posset per eam hic vitiosus sanguis reuelli, tum etiam, iecur ipsum alterari, eiusque concoctrix facultas vigorari, & sic abortus prohiberi. Dicunt tertio, quod cum sæpe vtero gerentibus eueniat sanguinis fluor ex vteri vasis, ex quo sanguinis fluore abortus accidere potest, tum foetus ipsum suffocando, tum propter nimiam eius euacuationem alimentum ei subtrahendo: in hoc casu sanguinis missio ex venis cubiti, potissimum interna (vt diximus) ex eis, quæ sunt vteri reuellendo, posset tum fluorem ipsum compescere, tum abortum præseruare. Hisce rationibus concludunt sanguinis missionem saltem in primis mensibus aliquibus vtero gerentibus ratione euacuationis, alijs verò ratione reuulsionis, ac hepatis alterationis, posse ac debere fieri, vt ab abortu præseruentur. Et ita absque pudore aliquo tenaciter, ac promptè supradictas rationes in medium afferunt, vt se aliquid dicere putent: quamuis inania ab eis incognita, ac minus intellecta proferant. ipse equidem tantæ eorum inscitie mise-

Lib. de mlti-
tud. cap. 3.
de Sangu-
inis missio. cap. 4

reor potissimum, cum in ea fuerint inueterati. Qua de re desperata est eorum salus: est enim indelebile vitium ignorantia, ut dicebat Galenus 13. Methodi medendi. præsertim si cum superbia sit

13. Metho.
med. cap.
13

1. de Symp.
cau. cap. 7

conjuncta. Sed iis omnis ad eorum friuolas rationes hoc pacto respondebimus. Quantum ad primam dico, quod, si bene Hippocratem libro de Natura infantium, & Galenum libro quarto de causis Symptomatum perlegissent: utique non ignorarent alium esse modum, quo in mulieribus eo tempore cum vtero non gerunt, sanguis singulis mensibus ad vterum ipsum defertur: & alium imprægnationis tempore: nam dictum est supra de intentione Hippocratis in præcitato loco, & Galeni libro quinto de Simplicium medicamen-

5. de Sim-
plic. medic.
facult. cap.
22

torum facultatibus, quod eo tempore, quo foemina non gerunt vtero, singulis mensibus tanquam quoddam superfluum, & excrementosum à toto corpore per venas, ad eas tandem, quæ in concauitatem vteri committuntur, sanguis menstruus expellitur, affatim ferè ac subito, & multus, nullum inferente auxilium ipso vtero ad eius attractionem seu delationem: cum sit ei tanquam excrementum. Verum tempore imprægnationis non singulis mensibus, sed singulis diebus (ut volebat Hippocrates in libro de Natura infantium.) per facultatem attracticem ipse foetus, siue seminis pro eius alimentum trahitur tanta quantitas sanguinis, quanta ei opus est pro eius alimento, ac augmento quietè, placidè, ac paulatim prout in dies vires habet attrahendi robustiores, ac eo sanguine magis, ac magis indiget. Si ergo ad ipsum semen, seu foetum sanguis non expellitur à toto, nec transmittitur cum labore affatim, ac subito, sed ab ipso trahitur paulatim absque labore aliquo: quo modo potest semen ipsum, seu foetus ipse suffocari à sanguinis multitudine existente in ipsis vtero gerentibus, siue ea fuerit quod ad vasa, siue quod ad vires? Equidem hoc dicere est valde à ratione alienum: tanta nempe quantitas sanguinis attrahitur à foetu ipso, quanta indiget pro eius nutrimento, ac augmento. Et si per quam rarissimè talis plethora, seu sanguinis copia talis in foeminarum aliqua reperiatur, quæ concipere valeat: & si concipiat, nunquam tanta sanguinis copia aderit, ut ab ea foetus suffocari possit. Verum isti pauperelli, meo iudicio, decepti sunt, opinantes eo modo sanguinem deferri ad vterum tempore imprægnationis: quo defertur eo tempore, quo vtero non gerunt, parum exercitati in commentariis Hippocratis, & Galeni, & aliorum Medicinæ bonorum Auctorum. qua de re huiusmodi causa ab Hippocrate & Galeno conscripta non reperitur: cum ea abortum facere non valeat: nisi cum sensibiliter lædat aliquem præter naturam affectum prius pariens. Sed dato per possibile, vel impossibile, quod possit foemina aliqua plethorica adeo sanguine abundans, siue in omnibus vasis, siue secundum vires imprægnari: licet hoc contradicat Hippocrati, & quod verendum sit per dictam sanguinis multitudinem de ruptura alicuius venæ, vel de aliquo alio præternaturali affectu ipsius prægnantis potius, quam de suffocatione foetus: cur non memoriæ mandent dicta Galeni 4. 12. 14. Methodi medendi: dicebat etenim libro 4. Methodi medendi, quod si quis sanus adhuc existens in sanguinis redundan-

4. Metho.
med. cap. 6

tis concurtu sit politus, non statim huic mitti sanguinem est necesse: immo in alio satisfacit inedia, in alio cibi parcitas, & in alio soluta aluus, vel purgatio, vel frequens balneum. In aliis verò sola exercitatio, vel multa frictio abundè fuit satis. Si qua ergo vtero gerens sanguine multo redundet priusquam ab eo sensibilibiter lædatur, cur non, præcepto Galeni melius erit (non dico inedia) sed quod cibi parcitas præcipiatur: non purgatio, vel balneum, sed exercitatio, seu frictio multa potissimum superiorum partium, quam sanguinis missio pro foetus conseruatione, aut prohibitione abortus. Et eo magis, quia iis auxiliis tutius præferuabimus: nam saltem securus est medicus prægnantem non lædere: immo supradictis auxiliis tutius ab abortu præseruabit. Quod exequi iubebat Galenus 12. 14. Methodi medendi: illūque volebat fore optimum Medicum, qui tutius, & securius operabatur. Ex quibus omnibus patet, quàm parui sint momenti prima eorum ratio: & qualiter qui ita argumentantur, suam ostendant ignorantiam tum circa anatomen, tum circa ipsius foetus nutritionis modum. Ad secundam eorum rationem, cum dicebant debere fieri sanguinis missionem pro præseruatione ab abortu saltem in primis mensibus, cum vtero gerentibus sanguis redundet aliquantulum vitiosus: qui sanguis vitiosus posset abortum prouocare tanquam ineptus existens pro foetus alimento, ac superfluum. Respondeo, quod si bene perlegissent, ac intellexissent Hippocratem lib. de Natura infantium, & Galenum libro 4. de Causis symptomatum præcipuè, & in commento Aphorism. 37. quintæ particule, & libro de Attracta bile, utique cognouissent semen, seu foetum in primis mensibus, quod optimum est, ac sincerum, sanguinem ex venis matris allicere, atque attrahere, & non vitiosum, seu excrementosum: quamobrem frustra fieret sanguinis missio ab eis: verentes vitiosum sanguinem tanquam ineptum pro foetus alimento posse foetum perimere, atque abortum facere, cum semen ipsum, seu ipse foetus (ut dictum est) ex sanguine non alliciat, nec attrahat, nisi sincerum ac optimum, præcipuè in primis mensibus. Et, si diceretur ab eis, quod saltem in mediis, & vltimis mensibus posset is sanguis vitiosus abortum facere, & hac de re bonum esset pro foetus præseruatione, ac prohibitione abortus in dictis mensibus fieri sanguinis missionem: Respondeo quod quamuis in mediis & vltimis mensibus, quoniam foetus maiori indiget alimento, etiam pro eo attrahat insimul cum optimo sanguine aliquid excrementosum ac vitiosum, ut volebat Galen. in præcitato quarto lib. de Caus. symptom. tamen dicebat ipse quod absumpto ab eo sanguine attracto pro eius alimento, qui bonus est ac optimus, quæ superabundat, partem excrementosam ac vitiosam foetus ipse ad supradictas duas membranas, Amicula videlicet, & intestinale, sua expultrice facultate expellit, ac reponit vsque ad præfinitum tempus partus. Et hoc modo non potest foetus ipse taliter lædi, ut fiat abortus. Præterea his mensibus, videlicet mediis & vltimis, foetus est maior: maiori igitur indiget alimento. Sed per sanguinis missionem illud ei subtraheretur, & per consequens faceret potius abortum, quam præseruaret ab eo, prout dictum est de intentione Hippocr. Aphor. 31. quintæ particule, & Galeni in eius

12. Metho.
med. cap. 5.
14. eiusdem
cap. 13

4. de Sym-
pto. cau.
cap. 7. Lib.
de atra bil.
le. cap. 8

1. de Sym-
pto. cau.
cap. 7

comment.

comment. Vterius, cur nō tutius est tam in primis mensibus, quā in secundis & vltimis supradictis vtero gerentibus optimam victus rationem præcipere, quā sanguinē mittere, vt isti volunt? Ex qua optima victus ratione cum facilius, tum securius efficitur dicti vitij sanguinis correctio, ac ipsum gignētis iecinoris alteratio, & per cōsequens abortus præseruatio, si ab ea causa, (vt isti aiunt) fieri posset tum potissimum: cum hæc sit Galeni opinio, quam iubet exequendam in mediis & vltimis mensibus eodem lib. 4. de Causis symptomatum. Nam in primis mensibus (vt diximus) huiusmodi sanguis non potest propter prænarratam causam abortum facere. Et ita patet qualiter sit respondendum ad secundam eorum rationē. Quō verō ad tertiam, cum dicebant quōd vtero gerētibus sæpe accidit aliquis sanguinis fluor ex vasis vteri: ex quo potest abortus fieri, aut fœtum ipsum suffocando, aut propter nimiam sanguinis euacuationem alimentū fœtui subtrahendo: quo casu sanguinis missio præcipue ex venis cubiti, reuellendo, posset abortum prohibere. Pro eius solutione notandum quōd, vt dictum est suprà, quædam venæ ad vteri cauitatem deferuntur: quædam aliæ ad eius ceruicem committuntur. Ea de re primò videndum est, à quibus venis fluor iste sanguinis fiat: videlicet ab eis quæ ad cauitatem, vel ab eis quæ ad ceruicem committuntur. Secundò quantitas sanguinis, quæ expellitur, est animaduertenda. Nam si fluor iste sanguinis fuerit per venas quæ ad ceruicem vteri cōmittuntur, hic fluor vt plurimum accidit ipsis vtero gerentibus, vt volebat Galenus sexto de locis affectis, & in cōmento Aphor. 60. quintæ particulæ, fœtui ipso pro sui alimento vtente eo sanguine qui per venas eas, quæ ad cauitatem vteri deferuntur, fertur: redditq; causam Galenus in eodem cōmento, cur potissimum vtero gerentibus accidat huiusmodi fluor sanguinis ex venis ceruicis, & non ab illis quæ in cauitate sunt: nam ab illis chorium, seu secundæ pendent, vt suprà dictum est. Propter quod nihil per illas in imprægnationis tempore potest naturaliter excerni. Si itaque taliter euenerit, non oportet vereri abortum: immo, cum talis sanguinis fluor fiat per viam expurgationis totius corporis, potius ex eo sequitur conseruatio fœtus quā abortus, potissimum si modum non exceſſerit. Quapropter nullo pacto eo casu faciendū est sanguinis missio pro eius reuulsione. Quōd si modum exceſſerit taliter, quōd prægnans ex eo fluor fiat imbecillis & mamillæ incipiant graciles fieri: eo casu cum adstringentibus talis fluor est compeſcendus. Et in hoc concursus existit tota Medicorum turba ab Auicenna vsque ad nostra tempora. Neque eorum aliquis quos viderim hucusque fuit ausus talibus sanguinem mittere. Et, si diceretur quōd cum approximatione adstringentium supradictorum bonum esset quoque reuulsione gratia sanguinem mittere, maxime venis cubiti: Respondēbimus optimas fore reuulsiones: verū, quia inter eas sunt quædā quæ tutiores sunt quā sanguinis missio, illę perficiendæ sunt, sanguinis missione relicta: hæc verò sunt velut cucurbitulæ in superioribus partibus appositæ, & potissimū sub mamillis, vt iubebat Hippocr. Aphor. 50. quintæ part. Inter eas quoque sunt frictions & ligaturæ suprà dictarum partium superiorum. Quæ omnes absque timore & periculo ac sine fœtus noxa fieri possunt: non sic autem san-

guinis missio. Et hac de causa, vt mea fert opinio, nemo eorum, qui anteq̃ nos fuere, Medicorum ausus fuit in hisce casibus sanguinem mittere, certiorati siquidem illam vtero gerentibus fieri non posse absq; maxima noxa tum earū, tum fœtus. Quōd si ponatur eundem sanguinis florem ex vtero fore ex internis venis ipsius, quæ ad eius cauitatem cōmittuntur, ex quibus & cum quibus chorium ac fœtus ipsi vtero alligantur: tunc dico, quoniam magnus adest timor abortus, quōd quamprimū etiam si in quantitate modum non exceſſerit, compeſcendus venit per omnem modum administrationis applicando adstringentia, & ab extra & ab intra. Quem modum obseruauerunt omnes Medici, qui ante nos fuerunt à Galen. vsque ad nostra tempora. Et, si adhuc diceretur quōd saltem in hoc casu faciendū est sanguinis missio reuulsione gratia: Respondebitur vt suprà, videlicet affirmando ac laudando reuulsionem: verū, cum plures sint eius species & cum quā plurimis fiat modis, vt dictum est, vtendum est eis quę, cum hoc quōd nullam noxam inferunt, tutius sunt, quamuis (vt dixi) adstringentium vsus sit eius rationalis ac propria curatio: licet vbi hanc ob causam sanguinis fluor contingat, quocunque modo ex eisdem vasis profluat, difficile admodum sit abortum prohibere, quocunque vtaris auxilio, quemadmodum & ratio dictat, & nos sæpius obseruauimus. Hæc mihi videntur sufficienter dicta pro solutione prædictarum dubitationum, licet potuissim has fugere, memoriæ mandans ea quæ dixi in quinto Notando: ibi enim dicebam velle loqui de sanguinis missione faciendā, vel non faciendā vtero gerentibus pro præseruatione abortus, indicatione tātum sumpta à causa ex qua posset in futurum abortus fieri, sed adhuc ab ea non fit: & non ab ea quæ iam sensibiliter ipsum facit. Illa nanque propria ac sincera dicitur prophylactice, seu præseruatio, quæ se opponit causæ ex qua futurus est aliquis præter naturam affectus, nihilque adhuc sensibiliter lædit. Nam ea quæ est pars artis curatricis, vt in morbo fienti, se opponit causæ quæ morbum creat & ex qua sensibiliter morbus gignitur, vt inquit Galen. 11. Metho. medendi. Modò cū præsupponitur superfluis sanguinis fluor, dicitur aliquis præter Naturam affectus sensibiliter lædens esse genitus, ex quo potest abortus fieri. Et eo casu, quando loquimur de sanguinis missione faciendā, præcipua intentio est curare suprà dictum affectum præter Naturam, qui inest & sensibiliter lædit: ex cuius curatione posset secundariē, & per accidens abortus impediri: quod est præter intentionem nostram, vt suprà diximus. Nam intentio nostra, vt sæpius explicauimus, est loqui de sanguinis missione pro præseruatione ab abortu, prout pura ac sincera prophylactice dicitur, & non prout ipsa est pars artis curatricis in morbis fientibus. Et sic delētur omnia dubia, quæ fieri possent de sanguinis missione faciendā vtero gerentibus in fluore præter Naturam sanguinis ex vasis quibuscunque fiat. Sic etiam tollitur dictum Auerrois septimo colliget, cap. 4. vbi volebat cōtra Hippocr. sanguinis missionem, quando aderat repletio qua fœtus non indigebat, tutius faciendam fore, quā purgationem, vt præcipiebat Hippocrates Aphor. primo quartæ particulæ. Loquuntur enim ambo in curatione acutorum morborum, & potissimum si materia turgat: à quibus morbis possunt

tehn.
cap. 1.
vsq̃dem
3

Sym.
an.
r. Lib.
ra bis
p. 8

6. de Locis
affect. cap. 5

Sym.
an.

utero gerentes corripit: & non pro sincera præseruatione ab abortu, prout loqui nostra est intentio. Neque enim negamus nos quod ubi quispiam præter naturam affectus utero gerentibus fuerit genitus, à quo nedum abortus, sed ipsius etiam vitæ periculum imminet, & pro eius sublatione venæ sectionem desideret, quod ea utendum sit, moderatè tamen, cum maius ex ea comparetur commodum quam incommodum, licet periculo non vacet: sublato per eam eodè affectu, qui magis ac certius poterat abortum causare: idque in dies experimur, cunctis tamen aliis ritè perpensis, & feliciter semper succedat. Confugient fortasse, à rationibus & auctoritatibus destituti, ad experientiam, dicentes se multoties expertos esse sanguinis missionem in supra dictis tribus casibus, vel in eorum aliquo, præseruasit ab abortu. Verum hi velut (iudicio meo) prauis rationibus furcunt decepti, volentes eis uti: ita valde magis de experientia loquentes, decipiuntur: ignorantes primò, quid sit experientia. Quæ à Galen. libro de historia philosophica hoc modo describitur: Experientia est eiusdem rei specie plures memoria. & libro de optima secta, Experientia est, inquit, eius, quod frequenter & eodem modo visum est, comprehensio atque memoria. Nunquid ergo ea, quam ipsi dicunt, sit vera experientia, ex supra dicta descriptione patet: tum cum huic, ut dicitur cap. 1. cebat Galen. 3. Metho. medendi, longo usu opus sit: tum & tertio cum rationibus & auctoritatibus omnium Medicorum contradicat: nunquid ea possit dici vera experientia, cum eam (ut dicebat Galen. 2. meth. medendi.) recta ratio ornet. Et nono de Hippocratis & Platonis decretis, & nono meth. medendi, & octauo de compositi. medicamento- rum secundum locos, dicebat perquam infirmam & imperfectam fore experientiam sine ratione. Vltra hoc, quod periculosa est, ut dicebat Hippocr. primo Aphorif. primæ particulæ, & Galen. 10. de Simplicium medic. facultatibus. Is ergo, qui ei soli insitit, errat, ut volebat Galen. 3. Metho. medendi. Absit ergo ut (cum duo sint omnium inuentio- num instrumenta, ut asserbat idem Galenus 3. Metho. medendi. & libro de Elementis primo.) a- liquis Medicus soli experientiæ, absque ratione, insitit: quia ipse, inquit, semper artifex imperfec- tus erit, tanquam semper ad perfectionem alterum altero opus habeat, ut fateatur idem Galenus 8. de Compositione medic. secundum locos. Con- cludamus ergo quod, si fortasse aliquando huius- modi sanguinis missionem, pro præseruatione ab abortu, utero gerentibus præceperunt: valde erra- uerunt & maximo periculo se ipsos exposuere, tum cum rationibus & auctoritatibus, quibus hanc per- ficiant, careant: tum etiam cum loquentes de expe- rientia, eam ignorent: ut clarè patet ex supra dictis Hippocratis & Galeni auctoritatibus. Extirpetur ergo huiusmodi empiricorum abusus, caueat de- mum quisque Medicus rationalis ab hisce errori- bus: damnetque, si quem audit ignarum empiri- cum aliquando eam præcipere. Non immerito ergo, in Marcæ Antoni, cum rationibus & auctori- tatibus, tum etiam experientiâ persuasus, elapsis propè diebus in illustrissima Maria Cardona Mar-

chionilla Padula, cum utero gereret, nec in primo, nec in secundo, nec in tertio mense, etiam appa- rente eo tempore aliquali sanguinis paucò ex ute- ro fluore, aslucta alias in primis tribus mensibus abortum pati, mediocriter etiam ferè corpus ha- bente, absque occasione manifesta: laxa tamen, al- ba & mollis carnis, tum ratione sexus, tum ratione proprii temperamenti, regione & tempore anni calidis, cui magna copia crudorum humorum in ventriculo redundabat: cuius signum erat conti- nua subuersio & nausea, ut volebat Galenus octa- uo de Compositione medicamentorum secundum locos: sanguinem mittere prohibui. Et de nouo, si, Deo duce, iterum geret utero, prohibeo ac prohi- bebo. Et, si omnis tum ratio, tum experimentum mihi deficeret: sufficit abundanter supra dictus millies citatus Aphorif. 31. quintæ particulæ, qui nullo pacto in casu illustrissimæ supra dictæ Do- minæ ab aliquo potest refragari: eò magis, cum nec ratio vlla, aut auctoritas, vel experientia in contra- rium reperitur: quamuis non defuerint aliqui vo- lentes quod in primo & secundo mense, ante san- guinis fluorem, bonum fuisset sanguinem mittere: & quidam alij asserentes non modò ante sangui- nis fluorem, verum etiam in tertio mense apparen- te dicto sanguinis fluore, quamuis paucò (ut tu mi- hi testis es) debuisset sanguinem mitteri: licet eo casu statim supra dictæ Dominæ aliàs vena secta, post horam vel alteram abortierit. Qui quidem quan- tum deuiant ac à veritate deuiassent, si ita perfecis- sent, & deuiabunt, si fortasse in prædicta Domina in eodem casu præcipient, ex omnibus supra dictis tum rationibus, tum auctoritatibus, quilibet san- næ mentis Medicus iudicet. Et tu ipse, qui qui- dem optimi es iudicij, bonosque Medicinæ aucto- res legere ac aliis interpretari non desinis, facile dignoscere potes.

Vide, mi Falco, quanti valuerit apud me aucto- ritas tua: quanti etiam imperium. Malui enim tibi morem gerere, quàm, tuum imperium renuēs, inofficiosus haberi: etsi innumeris, hisque etiam quotidianis, curandorum morborum occupatio- nibus me poteram iuste excusare. Quibus, perinde ac fluentibus & crescentibus vndis, ita penitus ob- ruor, ut vix detur ex illis ad refocillandam vitam e- mergere. Tu tamen scribentis animum accipies potiùs, quàm doctrinam vel ingenium. Et, si nihil in hoc opusculo doctum, elaboratum, excultum, ac doctis tandem tuis auribus dignum afferam, non tam parua meæ doctrinæ, quàm tuæ variarum scien- tiarum profunditati, temporisque breuitati beni- gnè precor adscribas: ut, quando ita præcepisti, ti- bi ipsi solum ignoscas. Daturus equidem sum, si quid plus orti nactus fuero, & hæc nostra paruula hilari fronte te accepisse cognouero, fortasse do- ctiora ac meliora. Tuumque Donatum Antonium Altimarum altissimæ tuæ eruditionis studiosissi- mum, ut cæpisti, ama, amplectere & foue, ac diris maledicentium ac virulentorum moribus tuæ au- ctoritatis antidoto, ut par est, fortiter ac animosè tuere, cum potissimum veritatis inquisitioni dedi- tis, ut tu es, & non prophanis illis hæc pauca scri- pserim. Vale 15. Calend. Iulij 1543.

DE AL-

2. Meth.
med. cap. 6.
9. de Plac.
Hippocr.
et Plat. 9.
metho. me-
den. et 8.
sec. loc. cap.
6. 10. de
Simpli. me-
dic. fac.
cap. de san-
guine.
3. Metho.
med. cap. 2.
3. Metho.
med. et
1. de elem.
cap. 2. 8.
sec. loc. 1.

cap. 3

I. fa
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10.

DE ALTERATIONE, CONCOCTIONE, DIGESTIONE, PRÆPARATIONE, AC PURGATIONE, EX HIPPOCRATIS ET GALENI SENTENTIA METHODVS,

Donato Antonio ab Altomari Auctore.



HIPPOCRATES, quæ primum omnium Medicorum, ac Philosophorum, qui ad eius manus peruenerunt, Galenus ubique fatetur: non ab re Epicuri Leucippi, atque Democriti opinionem, qui ex atomis infestilibus, ac incompactilibus corpora nostra compaginata esse asserbant, libro de Natura humana primo, hoc pacto destruere nixus est asserens: Mea verò est sententia, si vnum sit homo, nullo vnquam dolore afficiatur: neque enim esset, à quo doleret, vbi vnum tantum foret: quod si doleret, etiam necessario vnum quoque medicamentum esset. Quam Hippocratis sententiam Galenus libro de Constitutione artis medicæ, cap. octauo confirmauit: cum dixit, Nam vnum immutabile in aliud est, cum in quod transmutetur, non habet. at immutabile inalterabile est, atque imparibile. quod verò est imparibile, id vacat dolore: ergo quod vnum est, id imparibile esse necessario sequitur. Qua de re, si vnum specie est elementum: nihil in omnibus vnquam dolebit: at verò dolet. non est igitur elementum vnum. Ad hæc libro primo, cap. secundo de Elementis dicebat, Nulla atomus aut alterari, aut sentire natura apta est. si igitur ex atomis corpora nostra constarent, aut ex tali aliqua natura vniformi, non doleremus: atomi nanque omnes corpora exigua sunt qualitatis expertia. Pari ratione ab eodem Hippocrate eorum opinio refellitur, qui vnum tantum ex quatuor primis elementum esse asserbant, ex quo corpora nostra, & cetera oriri volunt. quorum quidam hominem, aërem esse, aut ignem: quidam aquam, aut terram putabant. Nec minus idem esse Hippocr. eodem libro nonnullis rationibus eorū placita destruit, qui hominem vnum tantum succū esse existimabāt. quorum aliqui syncerum sanguinem, aliorū succorum expertem, vtriusque videlicet bilis, & pituitæ: quidam pituitam, aut bilem tantum esse dicebāt. Quibus sic destructis, ac penitus euerfis, ad alteram prauam hæresin diruendam accedit, quæ Empedoclis erat, his verbis: Proinde quæ verisimile est aliquid ab vno generari: cum nec à pluribus generen-

tur, nisi mutuo temperamento conueniant: Voluit enim Empedocles ipse corpora nostra, ac cuncta alia ex quatuor elementis ficta esse, non tamen inter sese confusis, sed frustulatim compactis, & sese attingentibus: quæ sententia eisdem argumentis conuincitur, quibus ea conuincebatur, quæ ex insensilibus, & imparilibus primis corporibus, corpora nostra sensilia gigni asserbant. quam etiam opinionem Galen. reprobauit lib. de Constitut. artis medicæ. Quibus ita confutatis, Hippocr. ipse primus inter omnes, mox eodem libro de natura humana, statuit elementa quatuor esse, & eque in mixto commisceri, ac temperari (vbi ab Empedocle discrepat, qui elementa nec commisceri, nec confundi in generatione asserbat, vt diximus: sed frustulatim tantum compaginari, ac sese attingere) ex quibus, inquam, elementis quatuor simul, modo, & æquabilitate commixtis, corpora nostra generari decretum reliquit. cum, si alterum alteri longè præstaret, & valentius esset infirmiori, nihil generaretur. quatuor ergo supradicta prima, omnium corporum, quæ generantur, & intereunt, simul commixta, ac inter sese mutuo temperata, nedum hominum, elementa communia esse statuit, quæ summas, ac synceras qualitates habent primas. Et propterea quadam excellentia, calida, frigida, sicca, & humida appellata sunt. propriæ autem horum substantiæ nomina sunt ignis, aqua, terra, & aër. summa caliditas igni, aëri humiditas, algor aqua, ac siccitas terræ inest, vt testatur Galen. in comment. de Natura humana primo. Nimirum ergo, vt diximus, prædictas peruersas opiniones Hippocr. destruxit, suamque veram statuit: cum nec ab vno aliquid generari valeat, nec à pluribus, nisi mutuo temperamento conueniant, ac commisceantur, modoque, & æquabilitate respondeant. Quæ de re cum omnium corporum, quæ interitui, ac generationi subiacent: tum etiam hominis naturæ eiusmodi sit, necessarium est ipsum hominem non ex vna re constare. imò non tantum ex quatuor his elementis, verum ex peculiaribus, quamuis non propriis, sed omnibus sanguinem habentibus animalibus, communibus, sanguine videlicet, pituita, flaua, tum atra bile constat. hæcque illi sunt natura corporis, & propter hæc ægrotat, & valet. valet quidem, cum ea inter se virtutem, & copiam mediocriter habet temperatas, & potissimum si permixta sint: contra laborat, cum eorum quicquam fuerit

Tex. 19
et 20
ca. 4. cō. 27

minus, ampliūve, aut in corpore secretum, neque cum omnibus confusum: prout decretum reliquit idem Hippocr. eodem libro de Natura humana. Et si omnes nostris corporis partes ex sanguine generantur, ut voluit Gale. 8. de Hippocratis, & Platonis decretis, & primo de Natura humana: tamen non ex eo sincero, atque impermixto, puro seu integro, & aliis humoribus non confuso, cum hic nunquam vtero gerentibus insit: sed ex eo, qui per excellentiam id nomen sortitus est, vtriusque bilis, & pituitæ particeps, corpora nostra genita sunt, & demum edita in lucem, ex ipso incrementum, & perfectionem accipiunt ex quadam quasi materia, ut idem Galenus sentit eodem libro octavo de Hippocratis, & Platonis decretis. Hinc patet, quod, si ex supradictorum temperatura sanitas in humano corpore efficitur, & contra, ex horum intemperaturis, morbi accidunt: nec corpus nostrum imparabile, omnisque affectionis expers est, velut adamus, aut quidvis id genus, teste Galen. 1. de Sanitate tuenda: ut cum alteratur, corrumpitur, & vertitur, neque eundem servat prioris status tenorem, propterea auxilium desiderat. nam si imparabile atque inalterabile esset humanum corpus, semper optima constitutio perduraret, neque artis praesidio indigeret, ut ait Galen. libro artis medicinalis. duabus autem transmutationibus cum subiciatur, alterata simul, ac fluente eius substantia: (alteratur enim refrigēta, calefacta, exiccata, & humectata: sicut autem, & secundum sensibiles excretionēs, ac per occultam transpirationem) duplici quoque eget restauratione: altera quæ excedentes temperet qualitates: reliqua, quæ locum repleat inanitum, ut voluit Galen. 1. de Elementis. Atque quarto de Simplic. medicamentorum facult. duplex innuit esse nostris corporibus iucundum: alterum, quod impleat id, quod evacuatum est, cuiusmodi est nutrimentum: alterum quod medeatur ei, quod alteratum est, quod quidem est medicamentum. Nostra denique substantia cum imparabilis non sit, immo continuo oportet per se totam alterari, illudque ratione primarum qualitatum effectricium elementorum, caliditatis videlicet, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis, vicissim inter se agentium, & patientium, necessum est, ut corpora nostra praesidia desiderant, ac auxiliis indigeant: cum, si ex toto integrum, illæsumque corpus duraret, talēque quale ipsum ab initio creator fabricatum reliquit, nequaquam correctore eguisset. at nunc, cum diffluat semper, ac dispareat: aliquo observatore indiget, qui & quod dissipatur, quantum, qualēque sit, cogniturus est, illicoque tale, ac tantum vicissim reponens instaurabit: & ut semel dicam, quod discutitur, atque evanescit, ingeri paulatim, atque reponi opus est, ut ait Galen. libro An tuenda sanitas spectet ad medicum, vel ad gymnasticum. velut, si eorum substantia alteratur, indiget aliquo, quod excedentes temperet qualitates, eodemmet Galeno teste libro 1. de Elementis. Quocirca ars quædam non ab re, quæ medicina nominatur, inuenta est, corporis humani gubernatrix, & licet à prima eius constituta parte denominetur, ut idem Galen. ait eodem libro ad Thrasylbulum: tamen eam et ars, quæ vna est relatione ad vnum intentum finem, qui sanitas est, circa quem omnes artes versantur, cum vnum in singulis artibus, isque bonus finis sit, eodem auctore eodem libr. ad Thrasylbulum: hanc,

cap. 13

inquam, sanitatem medica ars perpetuo procurat, siue eam tueatur, siue perditam recuperet in humanis corporibus, cum in sanis, agrotisque vna hæc ars medica modo vna vitia emendet, ea videlicet corrigens: in nullo siquidem alio eadem vitia discrepantia, quam secundum quantum. At cum ipsa perpetuo corporum vitia emendat, ac corrigit, propterea correctrix ars appellatur. Quod si exacte, perfecteque valentem hominem accipiat, in hocque gradu ipsum conseruet, euecticem eam, id est boni habitus seruatricem vocamus, si verò eos, qui iam morbum euaserunt reficiat: analeptice, seu resectricem, vel instauratricem. Inter quas ea quoque collocatur, quæ à medicis salubris proprie dicitur ac conseruatiua simul. Hæc quidem tres partes sub ea medicinæ parte connumerantur, quæ exigua vitia corrigit: inter se autem ratione maioris, minorisque dissentiant. Estque insuper quædam alia prædictæ artis pars, quæ à medicis proprie prophylactice vocatur: Cui succedit illa, quæ magna vitia tollit, quæ proprie curatiua dicitur. Cum ergo cunctæ hæc partes circa vnum ac eundem propositum finem versentur, qui nil aliud est, quam sanitas, ut voluit Galen. eodem libr. ad Thrasylbulum: sequitur, quod vna tantum sit ars medica, per quam humani corporis vitia corriguntur in nonnullas partes diuisa, prout maius, & minus est vitium, quod corrigitur: hæcque præsidia, atque auxilia, quibus indigent, porrigit, relatione tantum ad vni finem, qui, ut diximus, sanitas est: corpori videlicet, aut aliquid, ut superuacuum detrahēs: aut aliquid, quod deficiat adiiciēs, naturalēque modum ei compensans, qui nil aliud est, quam sanitas ipsa. Hinc recte arbitror ab Hippocrate relatum fuisse, quod medicina est appositio, & detractio: appositio quidem deficientium, detractio autem redundantium. verum, sicut non vnius artis est opus facere, & alterius vitiatum corrigere, sed eiusdem, ut ait Galenus libr. An tuenda sanitas spectet ad medicum, vel ad gymnasticum, ita nec vnius officis est corpora nostra creare, alterius verò eorundem corporum vitia corrigere. Atqui, cum natura primaria sit humani corporis opifex, nos autem ab initio animal creare non potuimus, nec primam eius formationem instituere: ipsaque iterum natura ægrotis sanitatem comparat, nec alia profecto ratione fortui in præsentia in lucem edito alimentum suppeditat: quin etiam similiter nunc operatur, alit, digerit, excernit, omniāque, ut semel dicam, in præsentia ut prius eadem ratione ministrat. ars ergo primaria naturæ est. Quæ de re ritè à priscis sapientibus dictum est, naturam in omnibus auxiliari, naturam morbos iudicare, naturam morborum esse medicatricem: Medicum autē eiusdem esse ministrum: ut testatur Galenus eodem libro ad Thrasylbulum, nec non libro primo de diebus decretoriis auctoritate Hippocratis asserit, quod natura omnino sufficit: pariterque Medicum ibi appellat naturæ ministrum, non pharmacopolam quendam ex triuio, sed re vera medicum. Cum denique naturæ morborum sunt medicatrices, ut ait Hippocrates libro sexto de morbis vulgaribus: ac ipsa natura corpus alit, digerit, excernit, & omnino sufficit, ut superius diximus ex Hippocratis, & Galeni mente, eaque est artifex, & animalibus consulit, ut idem Galenus testatur sexto de morbis vulgaribus, cum hoc commentariolo nil aliud dicendum proponam, quam quot,

cap. 29

in libr. ad Thrasylbulum

cap. 25. in li. de san.

prope pectus

cap. 26

cap. 26

cap. 11

sec. 5. de mor.

caj

caj

caj

caj

quot, & quibus mediis, ac quando possit ipsi natura à re vera Medico, ac ipsius ministro cum oportet opulari, præcipue in curandis morbis, prius quid per naturam ipsam intelligendum est, quidque ea sit, ac quo pacto omnino sufficiat, primum explanare licebit: deinde quomodo ea pro quibusdam functionibus perfectius obeundis, ac quibus mediis iuuanda sit, dilucidare non grauabor. At, quoniam ad artem maxime necessaria sunt, quæ hic conscribimus, præsertim quia pro tyronibus laborem hunc suscepimus: si qua sæpius repetimus (cum hoc melius sit auctore Galeno in commento aphorismi vigesimi secundi quarti libri) culpandi minimè erimus.

De natura.



Niuerſam hominis naturam eſſe ſanguinem, pituitam, & bilem geminam, ſauam videlicet, & atram ab Hippocrate, vt ſuprà retulimus, primo de natura humana decretum eſt: nam, licet, vt diximus, humana corpora ex ſanguine conformentur, non tamen ex eo ſyncero, cum hic prægnantibus nunquam inſit, verum vt particeps vtriuſque bilis, & pituitæ. Et quis inſicias ibit corporis pleraſque partes ex ſemine gigni Galeno apertum eſſe: nam ſeminis parua in vterum deſecta moles eſt, nutriturque, & amplificatur ex ſanguine. Nec verò id incognitum eſt, ex ſanguine quoque ſemen genitum eſſe. quæ de re qui ex ſanguine corpora humana generari aſſerunt, at non ex eo mero & aliorum humorum experte, ſed ex eo, qui per excellentiam id nomen fortitus eſt vtriuſque bilis, & pituitæ particeps, nihil Galeno pugnat, vt lucide videre licet apud eum libro primo de natura humana. Quam quidem hominum naturam duplicem quoque eſſe, videlicet tum omnium communem, tum cuiuſque propriam, ab Hippocrate primo de morbis vulgaribus decretum eſt. quæ de re, cum apud eundem ipſius naturæ eſſentia in quatuor elementorum temperatione poſita ſit, ſequitur humani corporis naturam idem eſſe, quod temperamentum, ſeu temperaturam quatuor elementorum, humidi, ſicci, calidi, & frigidi, vt patet Galeno ſecundo de natura humana, & in commento aphorismi ſecundi libri iij. & 34. libri ij. quæ quidem natura, licet quæ opus eſt, efficiat, inerudita, & indocta, vt ait Hippocrates ſexto de morbis vulgaribus: tamen à Galeno ponitur eam eſſe artificem, animalibus conſulere, ac vim quandam eſſe inhabitantem in ipſis corporibus, quæ ab ea reguntur, eodem libro ſexto de morbis vulgaribus: idque de mente Hippocratis. At quæ ſit ipſius naturæ ſubſtantia, quæ nos & finxit, & gubernat, ipſe Hippocrates non auſus eſt pronunciare, quanquam noſtræ creationis auctorem naturam appellat, prout omnibus hominibus mos eſt, teſte Galeno, nono de Hippocratis, & Platonis Decretis. At idem Galenus libro de temperamentis tertio, naturam ait eſſe vniuerſam ſubſtantiam, ac temperiem, quæ ex primis elementis conſtat, calido, frigido, humido, & ſicco. Quod autem hæc ea-

dem natura, quæ humani corporis particulas effinxit, ac ſenſum adauget, omnino per eas totas ſit extenſa, vt quæ totas eas per totas, non tantum extrinſecus, ſingat, nutriat atque adaugeat, dilucide idemmet Galenus declarauit ſecundo de Naturalibus facultatibus. hanc cuiuſque hominis particularem naturam, vt dilucidius loquamur, ſubdiuidere licet in totius corporis temperamentum, & cuiuſque particulæ eiufdem corporis naturam, ſeu proprium temperamentum, ipſam quidem gubernans. qua diuiſione Galenus vtitur in plerisque locis, præcipue libro primo de Compositione medicamentorum ſecundum locos in principio. verum ipſius primæ noſtræ naturæ, ſeu temperamenti tria ſunt, quæ ſubſtantiam compleuerunt, ſpiritus ſcilicet, ſanguis, & ſeminalis humiditas, vt ait Galenus in commento Aphorismi 15. primi libri. Et libro vndecimo Methodi medendi ſaretur naturam ex tribus partibus conſtare: ex ſpiritu videlicet, & ex ſolidarum partium ſubſtantia, quæ partes ex genitali ſemine condite ſunt: & tertio ex carnoſa ſubſtantia, quæ ex ſanguine gignitur. Et, ſi ſuperius relatum ſit à nobis cunctas noſtri corporis partes ex ſanguine, non tamen ſyncero, formari, idque Galeno minimè pugnare: diſtinctus ſi loqui velimus, partes, quæ carnoſæ magis ſunt, ex ſanguine: quæ verò ſolidiores in primo ortu, ex ſemine fieri atque formari ſarebimur, prout patet ex Galeni mente libro primo de ſemine, idque aduerſus Ariſtotelem concludit. His ſic dilucidatis, cuiilibet, vel parum in arte medica exercitato patet, quid per naturam tum communem omnium hominum, tum cuiuſque propriam, ac demum ſingularum partium, ex Hippocratis, & Galeni ſententia intelligere debeamus. Verum, quia ſuperius relatum eſt, naturam ipſam ab initio fuiſſe animalis opificem, eique demum alimentum ſuppeditare, digerere, excernere, ac omnino ipſi miniſtrare, vt patet Galeno ex Hippocratis mente libro nono de Hippocratis, & Platonis Decretis, & libro, Num tuenda ſanitas ſpectet ad medicum, vel ad gymnaficum: nec minus apud Galenum ſæpenumero reperimus, calidum innatum hæc eadem in animantibus perficere, vt patet in commento Aphorismi 15. primi libri ſub his verbis, Neque enim aliud quicquam animal ab initio affirmavit, ſic vt neque rursus adauxit, aut uſque ad mortem enutrit, præterquam iſte calor innatus, de quo nunc habetur ſermo. hic igitur eſt omnium operum naturalium cauſa. Verum, quoniam in nonnullis locis, vt ſuperius diximus, & pariter in commento aphorismi tertij primi libri aſſeruit ſemper naturam, coctionem, alimenti diſtributionem, ſanguinis generationem, adiectionem, agglutinationem, atque aſſimilationem operari, velut maximè neceſſarium, diſcutiendum videtur, num Hippocrati, & Galeno, velut natura, & temperamentum, vt ſuprà retulimus, idem ſunt: ita quoque calor innatus, & natura, an in aliquo diſcrepant. Et, cum ad amuſſim oſtenſum ſit, quid per naturam ſibi velint, pari ratione ſuccinctè quoad poſſumus, quid per calidum innatum ex eorum mente intelligendum ſit, dilucidabimus: quò facilius quiſque diſcere valeat, num natu-

ra, & calor innatus idem sint, vel in aliquo differe-
pent.

De calido innato.



NE quis decipiatur, de calido innato pro substantia, ac corpore calido, nō autem pro qualitate differere proponimus. appellatur autem hæc substantia innatum calidum ab efficaci-
cap. 7 luna, quæ in eo est, qualitate: vt sentit Galenus in commentario aduersus Lycum. id autem nil aliud est, quàm sanguis, & semen, vt eodem loco ab eo asseritur. necnon ab eodem auctore in commento Aphorismi 15. primi libri, facultas nos gubernans calor innatus appellatur: cuius essentia in spiritu vnā cum sanguine, sanguineisq; visceribus reposita est, vt idem Galenus quoque testatur sexto de morbis vulgaribus, & in commento 15. aphorismi primi libri. Qua de re eius substantia aërea est, & aquea, seu in sanguine, & pituita subsistit: qualitate verò est congruæ, ex frigidityte, & caliditate temperatus, prout Galenus asserit octauo de Hippocratis, & Platonis Decretis. Hinc Galenus ipse libro de palpitatione, tremore, rigore, & conuulsione, ipsum calidum innatum essentiam seipsam mouentem, semperq; mobilem esse fate-
cap. 7 *cap. 6* tur. Et, quia semper mobilis est, non intra tantum, extræ mouetur: sed alius alium motum semper excipit. quoniam, si intra solum moueretur, immobilis ocius euaderet: extrorsus verò, si tantum moueretur, dissiparetur, & periret. nunc autem modicè succensus, ac modicè adauctus perpetuò mouetur. Succenditur quidem ad ima corporis lapsus, quo alatur appetens: obtinet enim & ipse ex sanguine perseverantiam: quemadmodum ex lignis idoneis, qui in foco est, ignis, eodem Galeno teste, libro de Curandi ratione per sanguinis missionē.
cap. 5 At auctus, & expansus affatus, semē extingueretur. quòd autem extrorsus exeat, à principio proprio id obtinuit, quia calidū natura est. at interiorē, & infernum statum possidet. quòd frigoris allicuius sit particeps, quandoquidem mixtum ex calido, & frigido existit. prima itaque caliditatis ratione est sibi met motor. Magnum verò vsum ei frigiditas adiungit: nam nisi frigus obstaret, cum sursum ferri calor aptus natus est: summa peteret: simulq; cum eo alimenta ferret. hunc ergo motum caloris, ne longius protensus pereat, frigiditas ipsa impedit: dubium namque esset, ne sua leuitate, & ad superna impetu corpora defereret. quare detinet frigiditas, & impedit, & vehementis elationis impetum moratur. Verum, cum asseruimus calorem hūc innatum semper mobile esse, seipsūq; mouere duplici motu, tum ad intra ab extra, tū ad extra ab intra, horum motuum quidam caloris innati primus dicitur, teste Galeno libro tertio de Causis pulsuum, cum videlicet mouetur foras, & extra: secundus verò eius motus est; cum intro, & in seipsū mouetur. Nec ab re vnus istorum motuum primus dicitur: nam à proprio principio, vt diximus, quia calidus natura est, obtinuit vt foras, sursum, & extra moueatur. Secundus autem motus, propterea secundus appellatur, quia intro, & in se ipsum mouetur: non propter aliud, nisi propter alimentorum confectionem: & non quia

calidus natura sit, quinimmo vt alimenta conficerentur, ipseque intus detineretur diu. Vbi absolute succi confecti sunt, si neque proprium suum motum primum, quo fertur foras repetere, intra firmus, immobilis ocius euaderet, cum vtrinq; esset otiosus, atque ita permanens nil aliud esset, quàm via ad mortem, ac eius extinctionem: substantiæ enim semper mobili mors est quies. Hinc patet calidum innatum, ex Hippocr. & Galen. sententia, nihil aliud esse, quàm essentiam seipsam mouentem, semperq; mobilem, vt supra retulimus, nec quicquam aliud esse naturam animalium præter hoc calidum secundum Hippocratis opinionem, quam Galenus asserit in commento. 15. Aphorismi 1. libr. & commento Aphorismi. 37. quarti libri, ex mente eiusdem Hippocratis asserit, Quæ nostra corpora regit natura, nihil aliud est, quàm calor naturalis: qui etiam nil aliud est, quàm sanguinea substantia simulq; aërea, seu seminalis, vnā cum spiritu, vt idem Galenus ait, quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, quod iterum de natura superius dictum est. Qua de re indubitanter nil aliud esse calorem innatum concludamus, quàm naturam atque animam: immo natura, atque anima, de mente Hippocratis, nihil præter ipsum est, vt Galenus asserit libro de tremore, rigore, palpitatione, & conuulsione. calidum ergo innatum, naturam, atque animam idem esse ex Hippocratis sententia, vt supra ostendimus: nemo asserere vereatur: velut & corporis naturam, idem quod temperamentum, eodem Galeno auctore libro de Natura humana, & libro primo de Vsupartium, nosque de eorum intentione illud citra controuersiam fatemur, etsi vt Christi asserit, & vt rei veritas est, aliud de nostra anima sentiam, quam incorruptibilem, & immortalē firmiter teneo: licet Galen. de Ratiocinatricis animæ essentia asseritū loqui perpetuò veritus sit.

Quod ars medica, ac medici necessarii sint.



Verum, cum suprà relatum sit ex Hippocratis, & Galeni mente, naturam in omnibus auxiliari, naturam morbos iudicare, naturam morborum esse medicatricē: & in summa, naturam summa quadam prouidentia corpori nostro prospicere, ac prorsus sufficere, forsitan quispiam ex his suspicabitur artem medicam, ac medicos ipsos tanquam superfluos, tolli debere: cum natura ipsa omnino sufficiat, cuncta administrando seruandi animalis causa, cuius quoque primaria hæc est ars, vt diximus. At si quis verba Galeni perlegerit sexto de Morbis vulgaribus; dilucidè percipiet non mendacem esse, qui asserit à medicis morbos curari: nec eum, qui artem medicam laborantium sanatricem esse testatur: eadem ratione nec illum, qui primam naturam languoribus mederi existimat. verum ergo est dicere, naturam morbis mederi: rectè quoque, & artem medicam, ac medicum: verè insuper, & eius esse ministrum, ac auxilia ipsa congruenti qualitate, copia, & tem-
pore

pore exhibita: cum auxilia in tempore ægrotis adhibere solius medici sit, isque auctor, ac occasiones inuentor, distinguens optimè per artem, quam didicit, salubria atque insalubria. Quæ ergo primò languioribus medetur, omnia congruentia in animalium corporibus operans, alens quidem cum alimento opus est, ipsique sanguinem præparans; per quem egenas particulas nutriat, cibum in vetriculo conficiens, iterum ut sanguis ipse creari possit: & in summa, quæ quatuor facultatibus animal regens, omnia molitur, ac perficit, non modò sanum animal tuendo, sed etiam ægroto sanitatè restituendo, natura quidem est dignitate antecellens cunctas alias sanitatis effectrices causas; cum omnes materiam sibi parent, ac suggerant. Postquam secundo loco dignitate succedit ars ipsa medica, per quam medici fiunt, cuius artis vi medici ipsi videntes, morbos pellunt, ac auxilia ipsi naturæ parant, & ministrant. Tertium locum medicus obtinet: nam ars ipsa medica medicis dignitate præstat, ut asserit Galenus eodem citato loco: & propterea dignitate ultimos esse eos, qui medicis ministrant ad sanitatem comparandam: & eos, qui materias præparant, quos herbarios vocant. Hinc concludamus, naturam omnium artium, artificum ad medendum primariam, ac potissimam esse; postquam ut diximus, sequitur ars ipsa medicatiua, quæ naturæ ministra est. succedit & medicus tertio loco, quem ubique tum naturæ, tum ipsius artis ministrum Galenus appellat, præcipue primo de Morbis vulgaribus, & libro primo de Diebus decretoriis: post quem sequuntur ipsorum medicorum ministri, materias atque instrumenta ipsis medicis parantes. hi verò sunt herbarij, vnguentarij, coqui, venam scindentes, clysteres immittentes, cataplasmata adhibentes, & similes alij. Quæ de causa licet superius relatum sit, naturam omnino sufficere, eamque morborum esse medicatricem, ac ipsius primariam eam esse artem: tamen, quoniam ars ipsa medica in numero est earum, quæ effectrices nuncupantur, reparatricium tamen, ac correctricium: in quibus duo præcipue inspicuntur: efficiens causæ videlicet potentia & impotentia, & materiæ copia vel inopia, ut ait Galenus libro de Constitutione artis medicæ; rarumque est artem aliquam effectiuam inuenire nulla alia egentem, quæ aut instrumenta fabricetur, aut materiam operi idoneam reddat: hac de re, licet natura ipsa ut efficiens causæ sanitatis tum conseruandæ, tum recuperandæ admodum potens esset cuncta perficere, quantum ex se est; indigebat tamen & materiæ copia, quam extrinsecus suscipere debebat; cum in se non haberet. Hinc non ab re ipsi naturæ succurrunt & alij ministri, præsertim cum quædam in humanis corporibus fiant, quæ ipsi quidem naturæ, non tamen eius ministris negata sunt: ut superflue carnis abscisio aut luxati articuli repositio. At, cum inter eos, qui naturæ ministrant, quidam sint, qui potius mediatur, quàm immediatè ei ministrare videntur (ut hi, qui materias tantum, aut instrumenta parant, potius medicis ipsis immediatè, quàm ipsi naturæ ministrant.) quidam verò sunt, qui non tantum instrumenta, aut materias: verum qualitatem, quantitatem, occasionem, & vtendi modum ipsarum materiarum dignoscunt, ea ratione naturæ ministrant, ut potius auxiliorum, ac occasiunum inuentores

sint, quàm materiæ auxiliorum: tunc enim auxilia dicimus naturæ ministrare, cum auxiliorum materiæ in tempore, atque, ut decet, aliquibus humanis corporibus applicantur, Galeno teste vndecimo Methodi medendi. Hinc non ab re Galenus primo de Diebus decretoriis, eum medicum appellat naturæ ministrum, qui re vera medicus est: & non qui pharmacopola ex triuio; cum hic tantum absit à iusta appellatione ministri naturæ, ut etiam maxime contrarium nomen ipsi conueniat magis, iniquo videlicet, & ipsius naturæ, & ægrotantium hoste iure appellato. Is ergo, qui re vera medicus est, distinguereque per artem dedicit salubria ab insalubribus, quique vi eius artis, ac auxiliis vites morbos pellere valet; quamuis non primò ut natura ipsa, sed veluti ipsius naturæ adminiculator; atque minister; præterea nec ars ipsa medica, nec reuera medicus tolli debent pro humani corporis sanitatem seruanda, tum recuperanda; quanquàm ars ipsa, ut diximus, per quam verè medici fiunt, dignitate ipsis sit, ut ait Galenus sexto de morbis vulgaribus. Cuncti verò alij, qui medicis ministrant, materias auxiliorum parantes, aut instrumenta idonea, potius medicorum, quàm naturæ ministri appellandi sunt: cum nec qualitatem, nec quantitatem, aut occasionem, vel vtendi modum cognoscant. Quare eis digniores sunt medici ipsi, vel etiam & auxiliis: medicis verò ars medicatiua: quæ rursus, ut retulimus, naturæ ministra est, eius videlicet, qui vel curatur, vel præseruatur, vel conseruatur. Tunc ergo naturæ medicus auxiliatur, ut saepius diximus; cum auxilia in tempore, atque ut decet, ei porrigit, atque propinat. quòd si importunè oblata fuerint; non amplius salubres causæ, neque auxilia dicuntur. Porro cum in his adhibendis nonnullos nostri temporis iuniores medicos halucinari inspiciam, qui intempestiuè materias aliquas auxiliorum naturæ propinantes, ei opitulari se autumant, cum potius eam impediunt, quàm ipsi ministrent, prauosque errores committunt: non solum quia intempestiuè auxiliorum materias naturæ propinant, verum quia etiam cunctas confundunt: nam sæpenumero alterantia, aut præparantia propinantes auxilia se naturæ adminiculatori in concoctione, vel in digestionem opinantur: & contra coctioni, vel digestionem, cum fortè fortuna auxilietur, asserunt se parere expulsionem, aut præter præparationem tantum alterare putant: rogantibus amicis, ut quando, & quibus auxiliis naturæ opitulandum sit, præcipue in propulsandis morbis, aut in sola alteratione perficienda, aut concoctione, simul cum ea alteratione, vel digestionem seu præparationem, ac purgationem, dilucidare vellem; subij, ut eis gratificarer, libentur hoc onus: simulque ut ad propositam materiam styllum exercebam. Itaque de alteratione primò disserere decreui, tanquam quodam communi genere ad cuncta alia: nam absque alteratione, nec concoctio, nec digestio, nec præparatio, aut purgatio fieri valet.

De alteratione.



Elut, cum corpus aliquod ab his, sub quibus antea fuit, in nullo est immutatum, quiescere id dicimus, ut Galenus asserit primo de Naturalibus facultatibus: ita equidè; si in aliquo ab iis recesserit, secundum illud id moueri dici-

mus, & cū nōnullis modis corpus à statu, in quo erat, recedat; pari ratione multis etiam modis moueri dicetur. At, quoniam motum prioris esse habitus mutationem à Galeno asseritur libro primo Methodi medendi: ea verò immutatio dupliciter fit, eodem auctore libro secundo methodi, & libro primo de locis affectis: quorum vnus lationis, alter alterationis dicitur. atque ea mutatio, quæ in loco agitur, latio appellatur: quæ verò in qualitate, alteratio. Latio ergo prioris loci mutatio erit. at alteratio à Galeno secundo Methodi medendi asseritur, quod est generatio qualitatis, aut affectus, seu dispositio, vel mutatio eius, quod prius fuit, hæc autem fit, cum quæ prior in corpore qualitas erat, mutatur, & nunc noua gignitur. erit ergo alteratio mutatio in qualitate, seu demutatio eius, quæ prius fuit qualitatis, prout Galenus asseruit libro primo Methodi medendi. hæc ergo sunt primæ duæ, simplicesque motus differentie; quanquam enim lationis motus prior, simpliciorque sit, cum auctio, diminutio, & generatio, licet in his quoque motibus prioris habitus sit immutatio, veluti in prædictis; tamen compositi sunt, & non simplices motus, vt ait Gale. I. de Naturalibus facultatibus. Verum in quacūque re alterationes fuerint, in ipso fieri essentia suam possident: cum, si quis ex albo niger, aut ex nigro fiat albus, is in colore mouetur: & si quid prius dulce, postea fiat austerū, vel ex austero dulce: eum in sapore motum esse dicimus, amboque in qualitate moueri: veluti qui ex calidiori frigidior fit, aut ex frigidiori calidior, vel ex sicco fiat humidus, aut ex humido siccus; eum quoque moueri affirmamus, communēque his omnibus nomen alteratio est. Quoniam verò corpora nostra, velut cuncta alia, quæ ortui, ac interitui obnoxia sunt, vt superius retulimus, duabus transmutationibus subiiciuntur: vna fit, cum eorum substantia alteratur, quæ non nisi calfacta, refrigerata, exsiccata, & humectata alteratur: nam solæ hæc qualitates totam transmutant per totam substantiam, teste Galeno libro primo de elementis, & libro de cōstitutione artis medicæ: cuiuslibetque nostri corporis propria substantia, in prædictarum primarum qualitatum quadā temperie est, ac proinde substantia facultatum, quibus ea reguntur, proprietas est tēperamenti, prout Galenus asserit libro de Multitudine. Altera verò transmutatio efficitur, fluente eorū substantia, quæ nō tantum per sensibiles excretiones fluit; verum & secundum illam, quæ occulta nominatur transpiratio: nimirum si duplici quoque egeant restauratione: vna, quæ excedētes temperet qualitates: altera, quæ locum repleat exinanitum, vt superius dictum est. Verum quæ excedentes qualitates tēperat, seu exuperantiam destruit, cōtraria debet esse qualitas excedenti, atque exuperanti: quæ verò defectum supplet, non est quidē contraria, sed magis simillima esse debet substantiæ prius euacuata: nam vicem illius in animalibus obtinere oportet. hoc verò efficitur, cum ex substantia deperditæ similibus corpora enutriuntur: quam substantiam, alimentum nominamus; licet hæc quoque, quæ corpora nostra nutriunt, ea alterent, atque mutant ferè omnia, vt ait Gale. tertio de Temperamentis. hoc autem alimentū à Gal. I. de Simplic. med. facultatibus dicitur esse quicquid substantiæ nostri corporis augere potest, quanquā auctore Hippocrate,

id tripliciter dicatur: nam nutrimentum ipse appellat, quod nutrit: nutrimentum quoque, quod veluti nutrimentum est: pariter & nutrimentum, quod nutriturum est, vt ait Galenus primo de Naturalibus facultatibus. Illud verò, quod secundum solam qualitatem substantiam nostri corporis alterat, medicinam, seu medicamentum appellamus. quod medicamentum à Galeno primo de Simplicium medicamentorum facultatibus, omne id dicitur, quod naturam nostrā alterare potest, absque hoc, quod substantiam corporis augeat. & vt vno verbo dicam, ea, quæ assimulantur, omnia nutrimenta vocantur: reliquæ verò omnia medicamenta appellantur. Est porro & horum medicamentorum natura duplex, teste Galeno tertio de Temperamentis; quippe vel cuiusmodi sunt assumpta, eiusmodi etiam permanentia vincunt, ac corpus mutant. & hæc prorsus tum venenosa, tum naturalis corrupticia pharmaca sunt. Vel mutationis initiū ab animalis corpore consequuta, postea corpus nostrum alterant: quæ multis modis dicuntur, vt patet Galeno eodem libro tertio de temperamentis. nos autem de prima medicamentorum natura penitus loqui non intendimus, nec de cunctis, quæ in secunda medicamentorum natura continentur: verum secundam in duas species diuidētes, quarum vna est, quæ secundum solam qualitatem substantiā alterans, enutrire tamen animal nō valet, seu substantiam augere, aut exinanitum locum replere, velut de nutrimento diximus. Altera species est, quæ non tantum nostri corporis substantiam alterat, cum hoc quod neque exinanitū corpus replet, verum de corpore eam educit per quamcunque viam sensibilibiter euacuas: quæ medicamenta purgantia à medicis nominari solent: redundant namque in corpore quædam in quantitate, & quædam in qualitate, vt Galenus asserit vndecimo methodi medendi. Cum ergo de alteratione, ac medicamentis alterantibus in hoc capitulo disserere proposuimus; de eis loqui intendimus, quæ corpus alterare possunt absque substantiæ diminutione, aut augmento. nam licet nonnullæ aliæ alterationes dici possent: & ea, quæ naturæ in ipsis actionibus opitulatur, alterantia quoque nominari nomine generis: hic tamē de ea, quæ excedentes in corporibus tēperat qualitates, absque hoc, quod corporis substantiā augeat, aut minuat, sed eadem manente, ac seruata intelligendum est propriè sumpta, pro mutatione tantum eius qualitatis, quæ prius fuerat in corpore, & generatione alterius contrariæ, absque hoc, quod assimilet, seu distribuatur, dissipet, atque substantiam euacuet. Hæc autem excedens qualitas erit, cum nostri corporis substantia alteratur, refrigerata, calfacta, exsiccata, & humectata, aut cum ex harum qualitatum diuersis combinationibus afficiatur. quod si vnam valeremus sine substantia qualitatem inuenire; ea sola vteremur, ac eam solam adhiberemus, vbi alterare necessitas vrgeret. nunc verò, cum nec vna qualitas sine substantia inueniri possit, vt Galenus asserit libro primo, cap. septimo de Elementis; cogimur eas qualitates vnā cum earum substantiis corporibus adhibere, vt contraria qualitas in ipsis exuperans ab eis destruat. Et, si quandoque exuberans ipsa qualitas in corporibus summa sit; corpora accipimus, in quibus contraria qualitas in summo reperiatur, præcepto Galeni tertio de

I. de Elem.

cap. 7

cap. 2

cap. 1

I. lib. de a-

lim. prope

princ.

Ibidem
II. /
medeEx I.
statib.
prope

cap. 5 tio de Temperamentis. velut, si in corpore summa sit superabundans frigiditas; ignem adhibemus, quod, si superabundans qualitas summa sit caliditas; aqua alterimus. quo tempore elementis pro medicamentis utimur, vsumque ea medicinae praebent, ut Galenus praecipit libro primo de Elementis.

cap. 7 Si vero à summo paulū recedat, aut plus à summo absit ipsa, superabundans praeter naturam in corpore qualitas; non amplius ipsis elementis pro medicamentis utimur, sed mixtum aliquod ex eis eligimus. veluti, si calescere intendimus; medicinā eligimus, in qua maior sit portio ignis, quam contrarij elementi, vbi verò frigefacere volumus; vice versa medicinam eligimus, in qua maior sit portio aquae, quam ipsius ignis, quae à summo quidem paulum, vel multum declinans sit ad portionem ipsius recessus, auctoritate Galeni tertio de

cap. 5 Temperamentis, saepenumero verò contingit, quod vtriusque simul opus est, alterare videlicet, & enutrire tuncque substantiam querimus, quae & alimenti, & medicamenti afferat vtilitatem. haec autem veluti medicamenta corpus nostrum alterant, ac afficiunt toto eo tempore, quo concoquuntur. at vbi concocta, ac assimilata sunt; prorsus calorem naturalem augendo, vt alimenta omnia

cap. 4 nutriunt, Galeno auctore tertio de Temperamentis. Cum ergo duae sint primarum indicationum

cap. 3 differentiae, vt testis est Galenus tertio Methodi medendi, quod secundum naturam se habet, videlicet sui custodiam indicans, & propterea quae sibi similia sunt postulans, & quod praeter naturam est, sublationem sui, eoque contraria requirens: perit enim quicquid in contrariū, & à contrario, vt idem Galenus eodem loco, & libro vndecimo eiusdem; hinc non mirum, si ab Hippocrate hoc aureum, aeternaeque veritatis praecceptum receperimus, nempe contraria contrariorum esse remedia: hoc etenim neglecto, omnem medendi methodum confundemus, vt eodem libro vndecimo methodi medendi Galenus asserit. nam omnia, quae praeter naturam sunt; ab his, quae ipsis sunt contraria, curantur, siue morbi sint, siue morborum causae, siue symptomata morbi: quanquam morbus solus per se subsistens solus quoque curationem propria suscipit, isque praecipue contraria postulat remedia. At, ne quis decipiat, cum contraria contrariorum esse remedia dicimus; non tantum ea, quae potestate contraria sunt intelligi volumus, verum etiam quae actu, aut ex accidenti sunt talia. &

cap. 12 hoc de intentione Galeni vndecimo Methodi medendi; licet quod potestate, seu secundum potentiam tale sit, praecipue à medicis audiat: veluti, cum febris dicimus perpetuò remedia esse frigida: eoque ipsam sanare, per frigidum intelligendum est non tantum aquam frigidam, quae talis est in actu, sed alia, quae partim potestate, partim ex accidenti refrigerant, auctore Galeno: vndecimo Methodi. auferuntur ergo, quae praeter naturam sunt omnia à suis contrariis, praeccepto Hippocratis. verum, quoniam quae praeter naturam sunt, cuncta immoderata dicuntur: quae verò secundum naturam, moderata necessum est in omnibus immoderatis à contrariis immoderatis (vt diximus) ad commodum regressum moliri. Nam veluti viā quandam ire, quod praeter naturam se habet, dum ad naturam redit, eandem quidem, sed contrario itinere, remeare oportet, vt ait Galenus libro de

Constitutione artis medicae, & libro artis medicinalis. pariter libro primo de articulis dicebat. Necesse autem est, vt qui in pristinum statum rediturus est, is eadem via, vnde est digressus, reuertatur. quod perinde est, ac si dicamus, vt contrarium iter faciat. Eatenus verò iubet Galenus contraria immoderatione vt pro sublatione eorum, quae praeter naturam sunt: vt tum primum definias, vbi ad commodum peruenieris. Hoc insuper communissimum, ac generalissimum Hippocratis praecceptum, contrariorum contraria esse remedia, sempiternae veritatis est, in instrumentalium partium praeter naturam affectibus: vt Galenus fatetur libro de Constitutione artis medicae. Verum, quoniam non licet vilius artis scientiam nancisci, nisi & methodum quandam habueris, per vniuersalia vocata theoremata; & in particularibus te exemplis exercueris, auctoritate Galeni nono Methodi medendi cap. sexto, (cum cuilibet particulari dispositioni praeter naturam corporis contraria particularia inueniantur, quibus ea dispositio auferri debet, eodem Galeno teste libro de Constitutione artis medicae, loco praallegato, & libro artis medicinalis) vt in particularibus exerceamur, relictis eis dispositionibus, quae in instrumentalibus partibus eueniunt: de eis tantum, quae in similaribus verba facientes, dicimus, quod, cum calido affectui frigidum auxilium contrarium existat, frigidum autem calidum: eodem modo succo humectans, & humidum exiccans: pariter calido simul, ac sicco morbo, frigidum & humectans veluti frigidum & humidum, calidum & exiccans contraria sunt, & eadem ratione de ceteris intemperaturis, quae in vniuersum octo sunt, quibus simplicia corpora sunt obnoxia, vt patet ex Galeno libro nono, & septimo Methodi medendi, & primo de Temperamentis: his utendum esse censemus pro eorum affectuum curatione, quae per alterantia proprie dicta perficitur, quae curationis modum Galenus docuit secundo de Naturalibus facultatibus & septimo Methodi. At cum duplex corporum intemperies sit: alia sanitatis videlicet, & alia morbi. sanitatis quidem, quae paulum ad media temperie: morbi verò, quae longissime abest ab ea, vt ait Galenus secundo de Temperamentis: nos de morbosa intemperie, & non de ea, quae sanitatis est, hic verba facimus. Ea ergo alteratione bellissime utimur in eis praeter naturam affectibus, qui amplius ab aliqua causa non foventur: v. g. in hectica, & diaria febre, quae tantum contrariorum auxiliorum adhibitione curantur. nam quae contraria eis adhibentur, etiam si qualitatem, seu qualitates excedentes transmutent in alias qualitates contrarias, illud tamen perficiunt absque vlla alia concoctione, digestionem, preparationem, seu purgationem. & hoc pacto natura ipsa, siue calor innatus à medico in hisce morbis adiuuandus est: quod auxilium proprie alteratio dicitur. hanc autem alterationem per eam molimur, quae vel tota substantia, vel qualitate vna, duabusve contraria sunt, teste Galeno libro de Constitutione artis medicae, & quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, supra dictas quidem qualitates cum suis subiectis, non tantum vt materias preparando, ac ministrando, sed vt auxilia, prout decet. Quicunque ergo iam facti sunt morbi, & causa quae hos creauit, iam abiit, supra dictam simplicem primam curationis indicatio-

Lib. de
Const. ar.
in cap. 12
lib. ar. med.
cap. 59. pri
mo de arte
cur. eo. 7

Ex lib. de
flusib. ibi.
cap. 12

Lib. de cōst.
ar. cap. 12.
li. ar. med.
cap. 59

9. Metho.
med. c. ult.
et 7. eiusd.
dem cap. 3.
tum 1. de
temper. c. 8
8. de facul.
natur. cap.
vlti. et 7.
Met. med.
cap. 4

Lib. de cōst.
artis med.
cap. 19. 5. de
Simp. med.
sic. cap. 18.
13. Metho.
med. cap. 7

nem habent: velut & illi, qui alteratis tantum qualitatibus in partibus morbi sunt, nempe contrariis: semper enim pro eo, quod exuperat, inducendum eo usque contrarium est, quoad particulam in symmetriam, & naturalem habitum vindicaueris, ut præcepit Galenus septimo Methodi medendi. cap. tertio. hac insuper alteratione, ac auxiliorum præparatione sapennumero in febribus, quæ ex putrescentibus excitantur humoribus, quandoque frigidam adhibentes: nanque ipsius febris, prout febris est, aqua frigida pota perpetuo est remedium, ut Gal. vndecimo Meth. meden. asserit. præcipue, cum febris ipsa fuerit ardentissima, & magna, cunctæque vires ægroti valentes ac concoctionis notæ planè evidentes sint: tunc nanque frigidam homini putrida febre laboranti tribuere audacter debemus, decreto eiusdem Gale. eodem loco, & Pauli secundo de Arte medendi, cap. 18. quinimo id magis audebis: si frigida potioni insueverit, nullaque laborantis fuerit interna particula, princeps præsertim, inflammata, aut imbecilla; præcepto eiusdem Galeni nono Metho. nam licet tria præcipue sint, quæ in propositis febribus ob putredinem ortis agendorum indicationem nobis præbeant: vna, videlicet febris ipsa: altera, effectrix eius causa: & tertia, vis ipsa naturalis, ut decimo Methodi Galenus decretum reliquit: tamen si intolerabilis ægro magnitudo febris sit, relicta causa, à qua prima sumitur pro earum curatione indicatio (teste Galeno eodem decimo Methodi medendi) ad frigidam exhibendam, febrisque extinctionem acceleramus. quæ, nisi occurras, sui magnitudine præsentem perniciem afferet. At ipse (cum perpetuo in frigida exhibitione cuncta, quæ requiruntur, haud facile sit in febricitantibus reperire) si febris magnitudo instet; tutius, cum oportet, aqua hordei vtendum esse censem, cum hæc non tantum febribus ardentibus accommodatissima sit: quia omni ex parte ei opponitur refrigerans, & humectans: immo, quia sitim magis, quam aqua sola extinguit, cum citius digeratur, nonnullaque alia commoda ipsam sequantur, ut patet ex Galeno lib. de Ptilana: est enim ipsa aqua hordei complicata quædam res ex hordeo, & aqua, cum proba cōcoctione; velut ptilana ipsa, licet minus hordei, quam ipsa ptilana, & plus aquæ assumat. quam Hippocrates pro extinguenda siti summopere siticulosis approbat, quarto de ratione victus in morbis acutis, & Galenus in eius commento. At, cum vniuersi febrili generis intemperies sit calor, Galen. asserit vndecimo Methodi medendi; nimirum, si ea intemperies per frigida sanabitur, non tantum per ea, quæ actutalia sunt, verum per ea quoque quæ potestare, & interdum per ea, quæ ex accidenti refrigerant, aut etiam omnia simul commixta. Non ab re igitur febre ipsa indicante, ut retulimus, quæ potestate refrigerant adhibentes, eam curamus: quæ curatio alteratio tantum dici potest: quibusdam syrups vtentes, qui alterare valent, ut sunt violaceus, rosaceus, ex nymphaea, papauere, & eis, qui ex vtroque cichorio domestico, vel agrestiparantur: quanquam hi extergendi quandā vim habeant, ac constringendi, ut ait Galenus octauo de Compositione medicamentorum secundū locos. his quidem solis, tum quibusdam eorum simul textis, ac sapennumero quoque frigidam permif-

centes, aut quorundā infrigidiātiū decoctūe quorum sylua satis admodū apud medicos nota est: hac eadem alteratione interdū vtimur, cum aduersus harum febriliū causam pugnamus, à qua prima indicatio sumitur. quam causam putredinem esse testatur Gale. libro decimo Methodi medendi, & vndecimo eiusdem, ait humorum putredinem antecedentem causam esse ipsius febris. Quare qui febre curare volet, necesse est putredinē inhibeat. ut autem cuilibet liquido constet, quo pacto putredinem inhibeamus aduersus eam alteratione tantum pugnātes, primò de ipsius putredinis natura, secundo de eius speciebus, & causis differemus. Quantum attinet ad primū, relicta opinione Aristotelis, qui quarto Meteororum textu sexto hoc pacto naturā putredinis exponit, inquires, Putrefactio est corruptio quædā in vnoquoque humido propriæ secundum naturam caliditatis ab aliena caliditate: hæc autem est, quæ ambientis: ad eā quæ à Galeno ponitur, definitionē veniemus: ipsi nanque tanquam medicorum principi, pariterque Hippocrati additi sumus. Gale. ergo 11. Methodi medendi hoc pacto putredinis naturam describit: nepe mutatio totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelam à calido externo: nam cum geminū, de intentione Hippocr. vbiq; fateatur in corpore calidum esse: alterū, quod ingenuū seu innatum vocatur: alterum verò adscititium, seu non naturale, & alienū: à primo quidē cōcoctiones fieri vbiq; asserit, præcipue sexto de Morbis vulgaribus, & secundo de Differentiis febriliū: contrā verò calor ipse alienus, ac præter naturā habet corrumpere: primū quidem, si in corporibus fuerit excitatus, succos ipsos propter humiditatem, & putrefacit, & corrumpit: spacio verò tum adipem inuadit, tum etiam carnem, ut Galenus asserit vndecimo Methodi: nil mirum si putredinē ab aliena, ac externa caliditate oriri diximus: non autem à natua, cuius munus est cōcoquere, & non corrumpere. hæc autem humorum putredo, ut habetur à Galeno libro primo de differentiis febriliū, duorum generum est; licet, ut ipse refert, ex horum duorū generum miscella alia tertia euariet, quæ quidē multiplex existit, quoniam & innumerabiles miscellæ modi reperiuntur, cum alterum genus maioris, minorisque ratione superet, & superetur. Supradictorum autem duorum generum putredinis alterum sit superante natura, alterum verò superata, & euicta: superante quidem, in inflammationibus, & similibus collectioni tumoribus omnibus pus gignitur: in humoribus autem, qui in venis, aut arteriis continentur, quiddam, quod puri proportionē respondet, subsidens in vrinis. Verum hæc putredo non simpliciter putredo existit, sed aliquid in se continet cōcoctionis: immò, ut dicemus de mente Galeni, potius cōcoctio, quam putredo est appellanda; cum sit putrescētis corporis substantiæ mutatio, potius ad perfectionem quādam, quā ad corruptelam. Alterum verò genus putredinis est, cum vis concoquendi adeo imbecillis facta est, ut nullam amplius facere possit in putrescente superfluitate ad optimum transmutationem. in qua superfluitatis putredine secundum substantiam efficitur permutatio, ac multis modis euariet illud, quod putrescit: Tercium verò genus putredinis est, quod velut semiputridū appellatur, nō quidē superante omnino natura ipsa, ut in pri-

9. M.
6. 3. 3.
5. 3. 0.
6. 22.

6. epist.
com. 11.
de diff.
cap. 9.

cap. 8.

cap. 5.

sec. com. 71.

cap. 2.

cap. 8.

in primo genere: neque superata, ut in secundo, sed utrisque adhuc cooperantibus, neutro tamen eucto. quod genus putredinis multiforme, est ac multiplex, innumerabilesque differentiae, pro eo quod magis, & minus concoctionem suscipit. At tamen in commento Aphorismi 17. secundi libri, Galenus duo tantum genera dinumerat: unum, quod potius secundum qualitatem transmutatio appellatur, parua scilicet alteratione ab alieno calore in humoribus ipsis effecta, nondum tamen habente maximè effatu dignam euerfionem, ad naturam suam contrarium. Aliud verò genus est, quod tam effatu dignam habet eam, quae ad propriam naturam est contrarium euerfionem, ut non possit iterum ex naturae coctione ad primam eius redire bonitatem, adeo scilicet imbecilla facta concoquendi vi, ut nullam amplius possit facere transmutationem ad perfectionem. & haec proprie corruptio ab eo appellatur: namque non amplius ad habitum naturalem redit. At, quoniam cuncta, quae putrescunt, ex calido, & humido sic efficiuntur, teste Galeno quarto Methodi medendi; ea quoque, quae putrescunt, tum calida, tum humida esse debent, eodem auctore nono Methodi. & in super tertio de morbis vulgaribus idem Galenus dicebat, Putredinem ex materia gigni humida, ex causa verò efficiente, extraneo, & praeter naturam calore: & propterea quae omni ex parte sunt sicca, putrescere non videmus, ut aurum, & argentum: differendum planè est, quo pacto putredo ipsa, quae causa antecedens est ipsius febris, ut diximus, alterari valeat simplici alteratione, absque hoc quod concoquatur, digeratur, seu praeparetur putrescens ille succus: hoc tamen prius pro certo habito, nos non de eo putredinis genere velle loqui, quod velut corruptela humorum est, vi concoquendi omnino eucta, seu adeo imbecilli, ut ab ea nulla mutatio ad benignum putrescentis excrementi fieri possit. nam talis putredo, seu humorum corruptela euacuanda potius, quam alteranda est, ut praecipit Galenus nono Methodi, & vndecimo: nam quod corruptum iam est, id alienum à natura est. quod tale est, id se auferendum dicat, ac quam id educere tendendum est: cum nulla ratione fieri possit, ut naturae gratiam recipiat, velut idem Galenus asserit quarto de sanitate tuenda, verum de altero genere, in quo veluti semiputrescens, seu feminalis humor est, & in quod adhuc tum innata caliditatis, tum alienae operatio efficitur, vnius quidem concoquendo, alterius putrefaciendo, & corrumpendo, hoc ergo genus putredinis, in quo humor veluti semiputrescens, feminalisque est, alterandum esse alteratione, quae alia à concoctione, digestionem, seu praeparationem sit, intrepide asseremus: nam, si putrescentes humores, ex quibus febris ascenditur, duo haec indicant immutationem eorum videlicet manente substantia, & euacuationem, teste Galeno libro Artis medicinalis: ab eo, qui has febres curare volet, inhibenda prius putredo est, quae antecedens causa earum febrium existit, ut diximus. haec autem exhibitio, manente tamen humorum substantia, ut perpetuo loquimur, non nisi dupliciter fieri potest: aut adhibitis contrariis qualitatibus ipsius putredinis, aut per aliam immutationem ipsum putrescentem succum, non tantum in contrarias qualitates alterando, ac immutando, verum cōficiendo quodam modo, ac assimilando. quae quidem im-

mutatio seu alteratio concoctio dicitur. & propterea Galenus vndecimo Methodi decretum reliquit, in humorum putredine & excretionem, & refrigerationem, & ventilationem, & semiputridorum concoctionem ex aduerso respondere. Nunc verò, cum de prima immutatione loquamur, dicimus, quod cum quicunque succus putrescit, de mente Galeni calidus praeter naturam, & humidus efficiatur, ac à calido, & humido id perpetiatur, ut retulimus, necessum est (communissimi Hippocrati, praecipi perpetuo veritate seruata, quod contrariorum contraria sint remedia) tales succos feminalos seu putrescentes à medico ad contrarias qualitates, manente eorum substantia, immutari. quae immutatio à frigidis, ac siccis medicamentis ipsi naturae paratis, & corporibus adhibitis optimè perficitur. Hinc acetositatem citri, succum malorum puniceorum acidorum, ac pomorum acidorum limoncelij, & limonum, omphacium, atque acetum, & similia pro ea immutatione perficienda, putredineque inhibenda, ac pro eius male qualitatis transmutatione facienda, eligimus ex dictis nonnulla medicamenta, seu syrupos parentes, quam alterationem aliam à concoctione Galenus praecipit vndecimo Methodi medendi, cap. nono, cum dixit, Putrescentia, feminalaque sanare possunt, tum ea quae alterare, tum ea, quae concoquere valent excitando, ac firmando eius naturae facultatem, quae naturaliter concoquit. Nec minus videtur eundem Galenum libro Artis medicinalis, praedicti allegato loco, per alterationem, quae putredo inhibetur manente substantia, duo haec voluisse intelligere: & eam videlicet, quae proprie alteratio dicitur: & concoctionem, quam tanquam magis utilem, atque praecipuam immediatè exponit, praesertim cum cuncta alia praeter has alterationes substantiam euacuent, siue digestionem fuerint, siue praeparationes seu purgationes, ut infra declarabimus. Hinc patet nonnullos iuniores expositores in expositione supradictorum Galeni verborum fuisse hallucinatos: namque autumauerunt tantum de ea alteratione, quae concoctio appellatur, Galenum intellexisse; cum si de ea sola loquutus ibi fuisset, falsum penitus assereret, solam eam putredinem tollere manente substantia: nam haec alteratio putrescentis succi, quae per contrarias qualitates putredinis efficitur, idem perficit, ac putredinem, quae in generatione adhuc est substantia manente, inhibet. Insuper nec illud effugeret, quin de insufficiencia damnetur, aut pugnancia assereret, cum non tantum putrescens succus concoctione, & euacuatione curetur, immo alteratione alia, ac infrigidatione, de qua lib. ii. Methodi medendi cap. nono verba fecit, ut superius diximus. & propterea, ubi Graecus codex habet, ἀλλὰ τὸ μὲν εἰρημένον εἶδος τῆς ἀλλοιώσεως, πῶς ἐστὶν: quod Latine sonat: Sed dicta quidem alterationis species concoctio est, forte deprauatus existens, melius diceret, ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς εἰρημένης ἀλλοιώσεως εἶδος πῶς ἐστὶν. id est, sed dicta quidem alterationis species, concoctio existit. quod si velint per alterationem solam concoctionem eo loco Galenum intellexisse, si valeant; cum ab insufficientia, aut pugnancia absoluant; quamquam neque hoc quicquam nostrae opinioni, ac veritati aduersetur, quae Galeni autoritate vndecimo Methodi medendi cap. nono, fulcita, ac confirmata est. Quidam alij concoctionem cum praedicta al-

teratione confundentes frigida, & sicca propriè concoquentia esse asserunt: cum ea putredinem inhi-
beant, contrarias qualitates putrescentibus hu-
moribus inducendo. At quantum isti à veritate
deuiant, cum de concoctione tractabimus, liquido
ostendemus: frigida enim, & sicca, & si putrescentis
humoris qualitatibus opponantur, putredinemque
quodammodo alterando inhihent; concoquentia
appellari haud possunt: nec concoctionem iuuare
nisi quodammodo ex accidenti, immutatis videli-
cet putredinis qualitatibus, ex quarum immuta-
tione concoctrix facultas fortè valentior redditur.
Hinc cōcludamus putredinem, de qua modò lo-
quimur, à medico alterari posse per immutatio-
nem earum qualitatum, quæ ipsi putredini propriè
insunt, à contrariis qualitatibus, vt dictum est: ac
per ea, quæ dictas contrarias qualitates possident,
putredinem posse sisti, ac inhiberi manente sub-
stantia, in qua ea consistit, cum eis, quæ superius
conscripsimus. quæ alteratio alia est à concoctio-
ne, digestionē, seu præparatione. Et, si Galenus
concoctiones interdum alterationes appellant, &
vim concoctricem alteratricem; nunquam tamen
eas cum prædicta alteratione confundit: quinim-
mo secundo, & tertio de Naturalibus facultatibus,
concoctionem per alterationem definiuit: tertio
etiam artis medicinalis concoctionem alteratio-
nis speciem esse dixit. Sed mox obiciet quispiam,
si putredinis occasio vna, est transpirationis prohi-
bitio; quò pacto ea putredo inhiberi possit per fri-
gida, & sicca, cum ea causam putredinis meatus ob-
struendo, adaugeant? Cui responsum sit primò, nō
immoderatum debere esse infrigidantium, & exic-
cantium vsum: secundo, quòd ex his maius sequi-
tur commodum, quàm incommodum. Ad hæc
quòd eis vti debemus frigidis, & ficcis, quæ aci-
dam qualitatem participant, tenuisque sint substā-
tiæ, ac humiditatis multæ admixtionem habeant;
qualia sunt ea, quæ supra narrauimus: aut quæ acfi-
moniam possideant, vt acetum, & non eis, quæ val-
de adstringentia sunt terrena, ac crassa corporis
consistentia, seu substantia. Qua de re, cum acidus
sapor potissimum gignatur, dum quid à calido
mutatur incipiente concoquere: non tamen per-
fectè id superante, vt Galenus asserit quarto de
Simplicium medicamentorum facultatibus, aci-
damque qualitatem frigidum subtile efficiat, te-
nuumque partium sint acida, eodem auctore eo-
dem libro: sequitur, quòd quamprimum penetrā-
tia non obstruant, cum hoc quòd putredinem in-
hibentia maximum comparent commodum, ac
ex pauca adstrictione vasa corroborentur, potius-
quàm propter osculorum exiguitatem lædantur.
Vt etiam ea permisceri possunt cum aliquo infri-
gidantium decocto, aut aliquo, quod liberare ob-
structiones valeat, quorum copia magna penes
medicæ artis auctores reperitur: & hoc pacto ne-
m putredinem non adaugent, ac transpiratio-
nem prohibebunt, verum & causam oppugnabūt,
& febrem pariter extinguunt: illud, quod sine cun-
ctatione agendum est præcepto Galeni decimo
Methodi medendi. quòd, si ea putredo per se sola
subsistat, vt sapius est videre, ipsiusque putredinis
efficientes causæ nō adsint; quid prohibeat prædi-
ctis auxiliis vti pro ea immutanda? nihil sanè. &
hæc de alteratione sunt dicta satis.

De concoctione.

Cum tres in animalibus corporibus
siant alterationes, vt Galenus asse-
rit libro quinto de Simplicium me-
dicamentorum facultatibus ca. sex-
to, quarum vna secundum naturam
est, cum videlicet in ventre cibus coquitur, aut in
visceribus, & vasis, qui inibi generatur succus, vnde
pars vnaquæque nutriatur: altera contra planè
præter naturam, nempe in putrescentibus omni-
bus, ab aliena caliditate: tertia media est, ac ex vtra-
que mixta, partim primæ particeps, ac naturalis,
partim huius contrariæ, quæ est præter naturam:
dictumque satis in præcedentibus fuit tam de ea
alteratione, quæ præter naturam est mutatio ab a-
liena caliditate superante, ac vincente, quam de ea,
quæ ex vtraque alteratione mixta est, quæ mutatio
tam à calore ingenito, quàm ab alieno provenit,
restat modò disserere, cum de ea alteratione, quæ
secundum naturam est & ab ingenito tantum ca-
lore perficitur, quam alterationem concoctionem
propriè dicimus. tum de alia alteratione, quæ ab
ipso etiam calido innato, sed non omnino vincente,
verum superante quodammodo efficitur: quam
etiam alterationem concoctionem nominamus:
nempe hæc quoque alteratio à calido innato supe-
rante in humoribus putrescentibus perficitur: & si
putredinem eam dixerimus esse, ac inter putredi-
nis species denumerauerimus, cum in ea actio quæ-
dam, quamuis modica, alienæ sit caliditatis: tamen,
quia in ea alteratione naturalis caliditatis actio
superat, concoctio potius, quàm putredo appellari
meretur, Galeno auctore libro primo de Differen-
tiis febrium, cap. sexto. Verum, vt dilucidius lo-
quamur, haud ignorandum est, primò illud quod
Græci pepsin, quidam abusivè digestionem voc-
cant: nos qui per digestionē aliud quoddā Galeno
intelligi volumus, clarioris doctrinæ gratia, pepsin,
quod Græci dicunt, concoctionem appellabimus.
quæ concoctio, licet ab Aristotele curato Meteoro-
rum hoc pacto definiatur: Concoctio est perfe-
ctio à naturali, & proprio calido ex oppositis pas-
suius: eaque in tres species diuidatur, maturationē
videlicet, elixationem, & assationem: ac eis tres
insuper species cruditatis, seu inconcoctionis con-
trarias tribuat: nos, cum medici simus, Hippocrati,
ac Galeno adhaerentes, de ea velut de cunctis aliis
ad eorum mentem disseremus. De duplici autem
concoctione, quæ in corporibus nostris efficitur à
calido innato, Galenum loqui reperi: quarum vna
est, quæ penes alimenta perficitur, similis quidem
existens hepsefi, seu elixationi, & propterea elixatio
metaphorice appellatur: altera verò, quæ maturatio
metaphorice ab eo dicitur, similis existens pe-
pansi, seu veræ maturationi. At de prima conco-
ctione, quæ attenditur penes alimenta elixationi
simili, Galenus tractauit libro tertio de Naturali-
bus facultatibus. eamque hoc pacto describit: quòd
nihil aliud est, quàm alteratio in propriam eius,
quod nutritur, qualitatem. Verum luce clarius de
intentione Hippocratis, ab eodem Galeno defini-
tur, secundo de Naturalibus facultatibus, ca. quar-
to, vbi ait, concoctionem alterationem quandam
esse, ac nutritis in propriam qualitatem eius,
quod nutritur, mutationem. De altera verò con-
coctione, quæ maturationi similis est, Galenus
verba

comm. 44
cap. 19 verba fecit, secundo de Ratione victus in morbis acutis, & libro de Constitutione artis medicæ, circa finem. Verum, cum vtræque à calido innato perficiatur : de vtriusque simul loquutus est libro primo de Morbis vulgaribus his verbis, Concoctio enim naturalis maturatio est morbi : hæc autem concoctio in concoquentis substantiam deductio quædam est eius, quod concoquitur, ergo, vbi corpus bene habet, cumque ei, quod concoquitur, naturæ intercedit familiaritas cum concoquente, mutatio fit, & alteratio totius concoquentis materiæ, aut maximè partis eius, minimumque superat semicocti. at vero, quando præter naturam affecta sunt (quod accidit, vbi sint à natura immutantis, & alterantis aliena) id, quod assimilatur, paucum est, semicoctum verò excrementum multum, Iam, sicut in corporibus sanis coctionem indicant excrementa, non secus in corporibus affectis indicabunt, in quibus verbis, vt liquidò constat, voluit Galenus vtriusque concoctionis conuenientiam, ac differentiam propalare. Nos autem de ea alimentorum concoctione, quæ ab Aristotele quarto

sex. 27 Meteororum elixationi assimilatur, & propterea Metaphoricè elixatio dicitur, hic loqui non intendimus. At, quod hæc alimentorum concoctio similis sit elixationi, Galenus cum Aristotele concordat, vt patet apud eum libro sexto de Morbis vulgaribus, & tertio de Naturalibus facultatibus. Verum, cum de concoctione loquimur, de ea intelligere volumus, quæ maturatio dicitur metaphoricè, per similitudinem eius, quam Græci pepansin dicunt : Latini propriè maturationem appellant: quæ in pericarpis efficitur, vt patet apud Aristotelem eodem libro quarto Meteororum. hæc autem penes excrementa attenditur, ac crudos succos, ex sententia Hippocratis libro primo de Morbis vulgaribus, & Galeni eodem loco. Hanc autem maturationem metaphoricè sic appellatam, bifariam in humanis corporibus fieri posse Galenus asserit, secundo de Ratione victus in morbis acutis, nam concoquuntur redundantes succi in corpore, verè crudi sunt, vt acida, vel dulcis pituita, nec putrefactio in eis magna existit, immò quædam naturæ familiaritas cum concoquente, qui quidem crudi succi existentes reliquum perfectionis à calore innato assequuti, ac prorsus concocti, & exquisitè assimilati nutrire valent plus, minùsve pro modo perfectionis: cum nec ipsi nutrire valeant, quamuis concocti sint, si omnino præter naturam fuerint, seu à natura alieni, vt testis est Galenus tertio de Causis symptomatum. Verum harum duarum pituitæ specierum altera facilius concoquitur, vt quæ dulcis est, teste Galeno libro de Constitutione artis medicæ. Itaque prædicti succi in bonum sanguinem versi demum in membrorum substantiam conuertuntur, in toto, seu in parte. & hæc à Galeno propriè maturatio dicitur: natura enim semper nutritur suis viribus vtens assimilare partibus nutriendis, quicquid fieri vtile potest, excernere autem id, quod minimè istiusmodi est, eodem Galeno teste libro secundo de Differentiis febrium : Aut quæ redundant excrementa alia à prædictis succis, in corpore præter naturam affecta sunt, ac à natura immutantis, & alterantis aliena, quæ quidem, licet mutata, atque à natura ipsa euicta sint (cum videlicet ipsa eis fortior fuerit, ac suo robore ea permutauerit) mutari tamen in substan-

tiam aliti non valent, eoquæ maximè, si magna in eis fuerit putrefactio, & si similia ad quendam modum fiant membris solidioribus, verum non adeò, vt in substantiam conuertantur, cum non exquisitè assimilari valeant : vel quia ex eorum natura assimilationi exactæ pugnant, vt bilis tum flaua, tum atra: aut quia susceperunt putredinis qualitatem magnam ab aliena caliditate. Ergo cum putrefactio magna est in aliquibus succis, aut excrementum natura sua tale, vt assimilari corpori humano exquisitè, ac conuerti in eius substantiam omnino nequeat, id quidem ad quendam modum ab ipso innato perficitur, immutatur, ac similis fit aliquo pacto solidioribus membris: verum non adeò, vt diximus, vt in eorum substantiam conuertatur, sed à natura ipsa superatum per talem concoctionem aptum vt redditur, vt expellatur: & si non propterea, vt expellatur ab ea promptius, aut à medico: id euincere concoquere, ac assimilare tentat, sed vt apponatur, ac nutriat. quod, cum exactè perficere nequeat, velut superfluum, ac excrementosum secermit, & ad expellendum properat. quæ concoctio, licet etiam maturatio dici possit, non tamen propriè, vt superius dicta, quæ penes crudos succos attenditur: sed generaliori, ac vniuersaliori vocabulo concoctionis vtentes. Talis denique naturæ sunt vtræque bilis, & qui Græce ichores dicuntur, teste Galeno secundo de Ratione victus in morbis acutis. in quo causam reddidit, cur neutra bilis in sanguinis substantiam redire valeat. eiusdem naturæ est pituita falsa ex mente eiusdem Galeni libro de Constitutione artis medicæ. cap. decimonono. Ob id Hippocrates cocta quidem consuevit vocare huiusmodi excrementa, quæ à natura ipsa euicta sunt: cruda verò, quæ non sunt euicta. Pari ratione & pus in phlegmonis, quæ concoquitur, fieri ait: tanquam pars nulla ex pure alimoniam accipiat, veluti accipit ex crudis iam dictis humoribus appellatis, cum concocti sunt: eadem ratione & vrinas crudas concoqui dicimus: & si corpus ex coctis vrinis ali non possit. Sputum quoque in pulmonis, seu thoracis affectibus, lippitudines oculorum, & alia similia excrementa, de quibus Galenus mentionem fecit libro de Totius morbi temporibus. cap. tertio. Concoctio ergo & pro generaliori, ac vniuersali significato, seu propriè sumpta, quam metaphoricè maturationem nos appellamus, ea est apud Galenum, vt diximus. Proinde, cum hæc quoque concoctiones opus sint naturæ, teste Galeno primo de morbis vulgaribus, & quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, nec non prædicti succi semiputridi, seu excrementa talem maturationem à solidis corporibus consequuntur, ab ea vi naturæ, quæ per solida corpora protensa est: nimirum, si aliquo pacto ea excrementa solidioribus quodammodo assimilantur corporibus, cum ab ipsa natura euicta sunt, & propterea concocta appellantur: licet ex eis corpus nutriri non valeat: vt pus, ac quod puri similatur candidum sedimentum in vrina, aliæque nonnulla, vt disertè declarauit Galenus libro primo Prognosticorum. At, quoniam de hac concoctionis specie loquimur, quæ metaphoricè maturatio appellatur, siue propriè dicta, siue vniuersaliori significato sumpta, cum eà dixerimus esse quandam deductionem, mutationem seu alterationem, ac quodammodo perfectionem, actionesque omnes, pariterque

Secl. 2. cõ-
ment. 44

5. 4. com. 23
cap. 7

sex. 19

2. com. 44

mm. 44

sex. 14

cap. 2

cap. 19

cap. 7

cap. 5

com. 30

5. 2. com. 45
cap. 6

cap. vls.

que & alterationes, in quacunque re fuerint, in ipso fieri essentiam suam possideant, ut ait Galenus libro secundo Methodi medendi: nosque perpetuo de ea, tanquam in fieri essentiam suam possidente, intelligamus, & non in alterationis, seu in mutationis termino: his taliter suppositis, licet hæc mutatio, seu alteratio actio sit ipsius naturæ: quoniam in fieri essentiam suam possidet, ut diximus, videndum est an possit iuvari à Medico: & si possit, cum quibus. At, quod concoctio, licet à calore innato præcipue efficiatur, ab aliquo tamen exteriorum auxiliorum iuvari possit, satis dilucide Aristoteles quarto Meteororum demonstravit, & Galenus in commento Aphorismi 22. quinti libri. verum quod una concoctionis species, quæ propriè maturatio dicitur, tum ab ingenito calido, tum ab externo perficiatur, si tamen ipsorum naturæ conueniens, ac familiare fuerit, ut caliditas solis penes omnes fructus: clarum est videre apud Galenum libro quarto de Simplicium medicamentorum facultatibus. At, quod tum naturales alterationes, quæ ab innato proueniunt calore, elixationi similes, cum videlicet in ventre cibis concoquuntur, aut in visceribus, & vasis succis, ex quo rursum vnaquæque pars nutritur: tum etiam & maturaciones, quas metaphorice sic appellari diximus, ut quæ videlicet in mouendo pure efficiuntur, à simili extrinsecus calore pro ea concoctione perficienda iuuantur: ac naturæ Medicus in hoc opituletur, cum his quæ modicè calfaciant, decretum reliquit Galenus libro quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, & quarto de Ratione victus in morbis acutis. & libro de Constitutione artis medicæ. Nō verendum est ergo maturaciones ex Aristotelis, Galenique mēte, extrinsecus à Medico iuvari posse. Verum, quoniam concoctioni perpetuo calidum opitulatur, ac confert, frigidum verò renititur, & aduersatur, teste Galeno tertio de Ratione victus in morbis acutis: differendum planè est, à quibus calidis natura ipsa extrinsecus in maturacionibus iuvari possit, siue hæc fiant in dulci, vel acida pituita: siue in aliis excrementis, vel puris generatione. quod quidem insuper ipsemet Galen. optimè nos docuit eodem libro quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, asserens quod velut ventris concoctioni conferunt ea, quæ copiam innatæ caliditatis cibos concoquentis adaugent, non tamen qualitatem: pariter illud, quod ad mouendum pus adhibetur medicamentum, talem debet caliditatem possidere, qualis est in naturis temperatis calor natiuus. At si iusto calidiór natura fuerit, in eo corpore medicamen, quod pus mouebit, calidius sit oportet, tantò nimirum temperato calidius, quanto, & natura eius temperatam in caliditate exuperat. Hinc cōcludit, cuiusque singulatim hominis suum proprium esse puris mouendi medicamentum, licet emplasticum quoque eius generis medicamentum esse debeat, eodem Galeno auctore quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus. Quæ de re temperatura eorum auxiliorum, quæ naturam in maturacionibus iuuant, commodiora, ac similis ei corpori, cui admoetur, esse debet. Proinde non parum nostri temporis quidam chirurgici decipiuntur, qui cunctis corporibus, naturis, & ætatibus, ac particulis eisdem medicamentis pro iuuanda natura circa puris generationem vtuntur: iubente Galeno,

quod hæc medicamenta, quæ pus mouent, cuiusque singulatim hominis propria esse debent. At, cum nostra natura humida sit, & calida, humida, calidaque medicamenta huiusmodi esse debent: non tamen corporis natura humidiora, ac calidiora, immò cognatam, ac simillimam corporibus nostris caliditatem, ac humiditatem possidentia. hinc tum cibos, tum fomenta, ac cataplasmata, frictiones modicas, & balnea, quæ mediocriter calfaciant maturaciones efficere Galenus asserit primo de Morbis vulgaribus. & libro de Constitutione artis medicæ ait, Perducunt autem ad concoctionem quies, & calfactio moderata, bonique succi modicorum esus ciborum, & modice calfacientis vini potus: at caliditatem modicam efficere possunt frictio mediocris, & commodi aquarum calidarum vsus, cibariaque medicamenta, quæ haud magnopere calfaciant: quanquam eo loco de maturacione propriè dicta loquatur, quæ tum dulci, tum acida: pituita competit. idem & Galenus libro quarto de Sanitate tuenda insit, semicrudos humores, tum vino, tum quiete, ac somno concoquere, ac viles reddere, & eodem libro, nihil esse asserit, quod æquè concoquat ea, quæ concoqui possunt, ut somnus à balneo. Proinde toto cælo hallucinati sunt, qui quibusdam nominatis syrupis concoctioni opitulari asseruerunt: cum tantum ea ad concoctionem conferant, ac quodammodo adiuuent, quæ calorem naturalem vel fouent, vel in substantia augent. at, cum paucis aut fere nullis hoc datum sit syrupis: sequitur, ut pauci sint, aut fere nulli inter eos, quibus nostris temporibus vtimus, qui possint calori naturali ex seipsis aliquid adminiculum ferre pro concoctione, seu maturacione perficienda: nisi forte is, qui ex corticibus citri conficitur, cum cortex citri concoctioni non nihil conferat, si ut medicamento eo quis vtatur: licet ut alimentum coctioni renitatur, teste Galeno secundo de Alimentorum facultatibus. cap. 37. alij verò syrupi, cum quidam calidi vltra quàm oportet, alij frigidi, alij humidi, vel siccis sint, quidam eorum corpus alterare, quidam præparare, digerere, seu euacuare aut per ventrem, aut per vrinam, aut per cutis occultos meatus materiam educetes valent: quam ex accidenti quidam sint, qui quodammodo coctioni deseruiant: ut hi, qui adstringendi vim possident, aut hi, quibus somnum conciliamus. per se autem, ac verè intrepide asserimus tantum ea, quæ calidum innatū vel fouent, vel in substantia augēt, ad concoctionem conducere: cum hæc actio, seu perfectio solius calidi innati sit. & propterea sola ea, quæ temperatè calida sunt vt diximus, per se ei opitulantur, ac conferunt: velut etiam nostris temporibus sunt inter alimenta gallinarum iuuenum, seu gallinaceorum pullorum carnes per elixationem liquefactæ, quod ius consummatum Medicorum vulgus appellat, aut fortiter contusa, alteratæ præcipue ex hordeacea ptisana simul permixta, ac cum eis decocta, magis, & minus pro naturæ corporum ratione, secundum quàm, vt diximus, concoquentia euariari debent, præcipue cum vires quodammodo imbecilles fuerint: & quæ redundant in corpore excrementa, in substantiam concoquentis mutari non valeant. Nec minus hallucinati sunt, qui asseruerunt à frigidis concoctionem fieri, siue syrupi sint, ut violaceus, rosaceus, ex nymphaea, & vtroque cichorio, & alij nonnulli similes, siue

siue aqua ipsa frigida, cum Galenus ipse decreuerit, frigidum perpetuò concoctioni aduersari, libro tertio de Ratione victus in morbis acutis. quinimo nec humor biliosus ab eisdem concoquitur, vt aiunt, bene alteratur. at hæc alteratio nullo pacto nec concoctio, nec maturatio dici meretur. Verum, cum suprà relatum sit maturationem in acida, vel dulci pituita, seu aliis putrescentibus humoribus ab ea vi naturæ, quæ per solida corpora protensa est, perfici: ac proinde, maturantur, solidis ipsis corporibus quodammodo assimilari, nunquid quodlibet, quod eo pacto maturatur, crassius reddatur, quæret quispiam? At cui dubium est Aristotelem quarto Meteororum asserere ex subtilibus semper crassiora fieri, pepansin hoc est, maturationem passā omnia. Pariter & Alexander ait, Vniuersaliter quæcunque pepansin passā, ex tenuibus crassiora redduntur. Et Galenus libro primo de Morbis vulgaribus. ait, Humores, qui tenues sunt, omnes esse crudos: & vt concoquantur, robustum desiderare naturam. Et libro de Totius morbi temporibus asserit, tum saniem ipsam, tum vrinam, tum sputum, lippitudinesque, quinque & humores, qui à cerebro per palatum, & nares defluunt, & denique cuncta excrementa in initio aqua, tenuiaque esse: cum verò quandam temporis processu concoctionem accipiunt, crassiora euadere, atque pauciora, potissimum in his morbis, ex quibus ægri seruantur, & libro secundo Prognosticorum ferè idem ait, quod concoctio crassiores reddit, non solum vrinam, sed etiam deiectionem, item secretionem, atque etiam pituitam per distillationes, & grauedines, necnon per lippitudinem, & pus quoque in vlcibus. Ex quibus omnibus inferitur, quod quæcunque maturationem suscipiunt, cum quodammodo solidioribus membris assimilantur, necessariò crassiora, ac pauciora euadunt: non tantum ex Aristotelis, & Alexandri mente, verum etiam Hippocratis, & Galeni. At non statim sequitur, cuncta, quæ crassiora redduntur, ea esse concocta: cum crassitudinis duæ sint causæ, auctoritate Galeni secundo Prognosticorum: calidum videlicet, & frigidum: calidum quidem euaporando, & frigidum adstringendo. Cæterum quæcunque à calido innato crassiora redduntur, ea concocta esse dicimus, & non quæ à frigido, seu non naturali calore: quæ quidem nedum coctioni non opitulantur; immò penitus aduersantur: pariter & ea, quæ ab ipso crassiora sunt reddita. At iterum obstrependo insurget aduersarius dicens, Si cuncta, quæ pepansin patiuntur, hoc est, maturationem, crassiora euadere necessum est: frustra pituita ipsa, ac succus melancolicus maturantur: cum crassiores per eam maturationem redditi ad eorum expulsionem valentius reniterentur, atque aduersarentur. Cui respondemus, pituitam ipsam siue dulcis, siue acida fuerit, quibus propriè pepansin, hoc est, maturatio tribuitur, ex maturatione crassiorem reddi: quoniam pepansin passā, in concoquentis substantiam transire valet, & hoc pacto solidis membris assimilata, nulli dubium, quod crassior redditur, præcipuè si in ea putrefactio non sit. Quod, si in ea aliqua putrefactio magna sit, aut falsa fuerit pituita, vel atra bilis, siue aliud excrementum: licet eis maturatio propriè non competat: tamen, quia vniuersaliori vocabulo intelligentes ipsam maturationem, dicuntur quoque hæc

maturari, asserimus quod quodammodo pepansin passā à solidis ipsis particulis, licet ab earum natura sint aliena, cum nutrire non valeant: tamen quodammodo eis assimilantur, ac crassiora redduntur; quoniam talia cum natura ipsa maturat, necessum est vt euincat: cumque euicta sunt, maturata vocare consueuimus. & cum concoctio omnia, vt diximus, cogat & increset, teste Galeno quarto de Ratione victus in morbis acutis: necesse est ea quoque, cum concoquantur ac vincuntur, cogi & increfieri: alia tamen ratione, cum à calido innato id perpetiantur. verum enimvero, ne quis decipiat, magnam cum dico putrescentiam, non de ea intelligere volo, quæ omnino aliena sit, ac nulla ratione possit naturæ gratiam recipere: cum eam, vt suprà retulimus, quamprimum educere sit tentandum, teste Galeno quarto de Sanitate tuenda. verum de ea intelligimus, in qua natura ipsa adhuc non est euicta. Magnam autem, & paruum nominamus ratione maioris, vel minoris operationis caliditatis alienæ, nunquam tamen ipso calido innato euicto, immò semper cooperante, ac demum vincente. Verum, si ea excrementa taliter alterata, ac crassiora reddita valentius expulsionem repugnant, cum ea in concoquentis substantiam transire non valeant, ad quid natura, seu Medicus huic alterationi vacabit? non propter aliud dicimus, quàm quod concocta medicari iubet Hippocrates. nec ea crassitudo, quam à calido innato acquirunt, ineptitudinem eius parat expulsionem, velut ea, quæ à frigido, seu calore immo dico: quinimò taliter alterata, ac euicta cum nutrire non valeant: ocyus secernuntur: nam, vt Galenus asserit, in commento Aphor. 22. quarti libri, cum cruditas humorum adest: tunc aliquid bene euacuari est impossibile. Cuius rationem reddens ait, Oportere Medicum naturæ ministrum ipsam perpetuò imitari. Verum, cum ipsa non antè humores discernat, quàm prius concoxerit: nec prius expellat: quin prius discreuerit, eodem auctore Aphor. 22. primi libri, opus est; vt bona excrementorum euacuatio fiat, tam ab ipsa natura quàm à Medico, vt prius ea ab eadē natura secernantur, ac separètur à bonis succis: quæ segregatio, seu discretio exactè fieri non valet; si coctio ipsam non præeat. tunc nanque, hoc est, post concoctionē naturam ipsam habemus euacuationi adminiculantem: & cum ipsi euicti sint, ac nutrire non valeant, tanquam excrementosos ac alienos, ab eo quod familiare est, segregans, expellere tentat. quod quidem prius, cum permixti essent cum familiaribus, infeliciter tentaret: nec id esset naturæ, sed casus ratione: nil mirum denique si prædicti succi, seu excrementa, licet vt alieni à natura immutantis, ac alterantis, in eius substantiam verti non valeant: in ea tamen immutatione, cum ab ea euicti sint, crassiores aliquo pacto redduntur; non enim vt crassiores reddat natura, ipsos immutat, ac alterat; nec Medicus ipse, cum ei in hoc opitatur: verum, vt superet, ac euincat, & denique assimilet. quibus superatis, ac euictis cum nutrire non valeant, nec perfectè assimilari: promptius ac facilius à familiaribus succis eos segreget, atque discernat, eisque segregatis commodius à natura, seu à Medico expellantur. quod quidem ægrius, & non absque magna vi, ac noxa ipsius naturæ perficeretur, si prius videlicet, quàm concocti, ac euicti essent, ac segregati, tentarentur expelli: simulque familiarium cum alienis

comment. 4.

4. M. et eo-
lex. 18. & 2.
prolog. 33

cap. 3

com. 29

2. com.
cap.

lex. 19

Alexan. 4
meteoror.comment. 9
et. 1. com.
cap. 3E. loco
10.

mment. 33

mment. 38

lienens expulsio fieret: ut liquidò quisque percipere
 valet de mēte Hippocratis, & Galeni in præallegatis
 locis. Ex quibus manifestè patet, quantum de-
 lirarunt, qui asseruerunt maturationem, seu, ut ipsi
 dicunt abusiue loquentes, digestionem in aliquo
 fieri posse cum eius subtiliatione: cum perpetuo ex
 Hippocrate, & Galeno constet cūcta, quæ maturā-
 tur, crassiora euadere, ut diximus. Et si de falsa
 pituita, quā Galen. lib. de Constitutione artis Me-
 dicæ purgare iubet, oppugnetur quispiam, eam fal-
 tem concoqui non debere: Respondemus, Gale-
 num eo loco de maturatione propriè dictā, quæ
 tum acidæ, tum dulci pituitæ competit, velle lo-
 qui, de quā insuper mutuatione propriè dictā ver-
 ba fecit quarto de Sanitate tuenda, cum dixit, Cru-
 dis, & semicoctis humoribus, qui ante sanguinis
 perfectionem fuerunt, percoctionem, acribus ve-
 ro, ac mordacibus, eductionem competere. at no-
 luit eo loco de maturatione communiter dictā in-
 telligere, quæ non tantum falsæ pituitæ, verum nō
 penitus corruptæ, ut idemmet asserit quinto Me-
 thodi medendi: verum & vtrique bili, ac ichoribus
 ipsis tribuitur eomet auctore secundo de ratione
 victus in morbis acutis. De vitrea verò pituita, li-
 cet frigidior sit acidæ, tamen, quia acidæ qualitatē
 est particeps, acidæ quoque appellari potest, & pro-
 pterea non est habenda alia ratio, quam de ipsa a-
 cidæ: licet difficilior cōcoquatur, quia frigidior est,
 ut tantum tria sint pituitæ genera, eodem Galeno
 teste, secundo de Differentiis febrium, & quarto de
 Ratione victus in morbis acutis. At mox instabit &
 non ab re aduersarij, dicens, nunquid humores i-
 psi biliosi, cum calidi, & tenues sint, & ea de re pa-
 ratissimi ad excretionem, ut Galen. asserit libro 3.
 Prognosticorum, concoctione prius egeant, quam
 excernantur. Circa quod digladiantur nonnulli no-
 stri temporis Medici quidam, asserentes conco-
 ctione non indigere: nam, cum mordaces sint, cali-
 diores, ac tenuiores, transfluunt ab vna parte in a-
 liam, ægrum grauiter infestant, ac quiescere non
 permittunt. cum ergo ipsi per corpus moueantur,
 naturamque ad eos expellendos proritent, prius-
 quam in aliquam partem decumbant, præcipuè
 principem statim euacuandi sunt, concoctione
 eorum non expectata præcepto Hippocratis, &
 Galeni Aphor. 22. primi libri, & sexto de Morbis
 vulgaribus. Vtcrius, si crassos, atque tenaces hu-
 mores fluxui paratos reddimus, eos tenuando, ac
 incidendo, meatusque referando, ut patet ex Ga-
 leno Aphor. 24. lib. primi, & nono, libri secundi,
 cur biliosos humores, tenues, fluxuique paratos exi-
 stentes, ac nullum lentorem participantes, priusquā
 purgemus, concoquere tentabimus: cum ex ea cō-
 coctione, crassiores reddantur? quibus rationibus
 concludunt biliosos humores concoqui non de-
 bere. Quidā verò auctoritate Gale. primo de Mor-
 bis vulgaribus, vbi ait, humores tenues omnes esse
 crudos, & ut concoquantur, robustam desiderare
 naturam, inter quos biliosum succum tum Hippo-
 crates, tum Galenus dinumerat: necnon auctori-
 tate Hippocratis secundo de ratione victus in mor-
 bis acutis, vbi biliosa cruda appellat, non ab re opi-
 nantur biliosos succos priusquam expurgentur, cō-
 coqui debere: cum non mouere cruda idem Hip-
 pocrat. iubeat Aphorismo 22. libri primi. Hisce ra-
 tionibus quidam flauam, seu pallidam bilem, ante-
 quam ē corpore excernatur, concoqui præcipiunt.

Alij, concoctione non expectata, statim circa initia
 purgare iubent, vtrique suam fouentes opinionem
 Hippocratis, & Galeni auctoritatibus, prout ex
 prædictis apparet. Verum, ut tanti quæsi veritas
 dilucidetur, attendēda nonnulla sunt: primò, quòd
 flaua, seu pallida bilis, aut in corpore redundas ex
 vna in aliā partē transfluit, nec sedē sibi adhuc fir-
 mam statuit vel in quapiam parte firma decumbit:
 secundo, cum eam concoqui dicimus: triplici ra-
 tione posse intelligi: aut concoctione, qua familia-
 ria alimenta in corpore concoquantur, quam conco-
 ctionem, ut diximus, Aristoteles, & Galenus elixationi
 assimilant, ac hepsefis Græcè dicitur: aut de ea concoctione,
 quæ metaphoricè maturationi dicitur, simili existente
 maturationi propriè dictæ, quæ in pericarpis efficitur
 eaque Græci pepansin nominant. & cū hæc quoque duplex sit:
 quædam propriè dicta, quæ tantum dulci, seu acidæ pitui-
 tæ tribuitur, ut superius diximus: quædam verò vni-
 uersaliter dicta, quæ tum aliis succis, seu excre-
 mentis, tum ichoribus ipsis tribuitur, pariter bi-
 fariam de ea loqui possumus. His prælibatis, asse-
 rimus flauam ipsam, seu pallidam bilem, siue in ali-
 quam partem decumbat, siue de vna in aliam trans-
 fluat, seu turgat, nullo pacto concoqui debere
 concoctione, quæ elixationi similis est: cum ex ea
 alimenta conficiantur, ac in aliti substantiam con-
 uertantur. pariter nec vllus alius succus, seu excre-
 mentum tali concoctione in nostris corporibus
 concoquitur præter alimenta ipsa, quæ a caliditate,
 quæ in humido existit, conficiuntur, ex intentione
 Aristotelis quarto meteororum. Propalam insu-
 per flauam, seu pallidam bilem in corpore redun-
 dantem, siue ex vna parte in aliam ea transfluat, siue
 turgat, siue in earum aliqua firmetur, ac decum-
 bat, nullo pacto concoctionem admittit, sumpta
 concoctione pro maturatione metaphoricè pro-
 priè dicta: cum ea, ut sæpius retulimus, tantum
 competat his succis, qui mutati, ac euicti a calido
 innato, reliquæque perfectionis assequuti, & prorsus
 cocti corpus nutrire valent, ac in concoquentis
 substantiam verti, ut pituita ipsa dulcis, seu acidæ.
 ipsa autem bilis tum flaua, tum atra, cum vna ex san-
 guine plus calefacto, altera ex eodem afflato, atque
 adusto gignatur, in sanguinis substantiam redire
 non valent, prout decretum reliquit Galen. secundo
 de Ratione victus in morbis acutis. quæ de re-
 talem maturationem flaua ipsa, seu pallida bilis nul-
 lo pacto admittit. Quòd, si de maturatione loqua-
 mur generaliter ac vniuersaliter dicta, secundum
 quam aliqua cocta, seu maturata vocare consueui-
 mus, cum ab ipsa natura fuerint euicta, eaque na-
 tura fuerit causis fortior, ac ipsas suo robore per-
 mutauerit, licet permutata ac victa nulla pars ex eis
 alimoniam valeat accipere, tunc flaua, seu pallida i-
 psa bilis intra vasa, aut in alium quempiam locum
 decumbit, sua acrimonia, caliditate, ac tenuitate na-
 turā haud ita proritans ac impellens, ut ex vna par-
 te in aliam expellatur ac transfluat: & tunc asse-
 rimus eam non tantum concoqui posse, verum etiam
 debere, præcipuè si superari ac euinci ab ipsa natu-
 ra posse existimabis, præcepto Hippocratis, Apho-
 risimo præallegato, & Galeni secundo de Ratione
 victus in morbis acutis. quæ maturatione, eodē teste,
 eodem loco, nil aliud est, quam eius à natura euic-
 ctio. euincit autē, cum eam permutauerit, quæ per-
 mutatione exflaua, acris, & malè olente, cum cruda
 præ-

præxisteret, cocta postmodum, pallidior & minimè malè olens efficitur. & propterea, licet, quia tenuis, paratissima ad expulsionem sit: quia tamen cruda, & tenuis, & quilibet tenuis succus crudus sit, & vt concoquatur, robustam naturam desiderat, vt Galenus asserit primo de Morbis vulgaribus: propterea concoquenda prius est, vt concocta facilius discernatur, ac demum excernatur, velut de pituita relatum est, quam sententiam confirmauit Alexander Trallianus libro 1. cap. decimosexto, cuius hæc sunt verba, loquens de flaua bile: Humor nanque negotium faciens, dicta ratione dispositus, coctus, & tanquam subactus ad domitus, minore negotio ab euacuante medicamento profligatur & exhaustur. Quod, si denuo aduersarius oppugnabit, asserens flauam bilem ex tali concoctione crassiores euadere, & sic ægrius expelli posse: ei responsum volo, naturam non eo flauam bilem concoquere, vt crassiores reddat: immo, propterea quod à natura euincitur, ac quodammodo solidioribus corporibus assimilatur, crassior euadit, nec propterea concoquitur, vt crassior fiat: verum, cum exactè assimilari nequeat, post euictionem facilius ac tutius expellitur: cum perpetuè verum sit, vt diximus, naturam ipsam ægrè expellere, si priusquam excernat, non discreuerit: ægriusque discernere, si antea non concoxerit, quod itidem confirmauit Galenus eo commentario, cui titulus est, Quod purgare conueniat, quibus medicamentis, & quando. concoquitur ergo tali concoctione flaua bilis, si in aliquam partem decumbat, quanquam ea concoctione crassior euadat: nam non propterea concoquitur, vt talis efficiatur: nec propterea quod talis efficitur, non tutius & sine corporis noxa purgabitur: cum à calido innato, & non ab immo-dico calore, seu à frigore eam crassitudinem adeptam sit, & ea de re excretioni non aduersatur. siquidem oportet concoctionem præire, subsequi verò discretionem, & postea euacuationem, vt bona sit crisis, auctoritate Galeni in commento Aphorismi vigesimi secundi primi libri: asseruitque humores, qui sunt in aliqua corporis parte firmati, neque oportere aliquo motore auxilio, neque medicari ante concoctionem. tunc enim naturam ipsam habemus euacuationi adminiculantem. Hinc Hippocrates non ab re libro primo de Morbis vulgaribus decretum reliquit, Coctiones celeritatem iudicij portendere, securitatemque salubrem: easque coctiones fieri testatur Galenus eodem loco, natura ipsa causas noxias superante. Patet itaque flauam bilem certam sedem habentem, ac in quapiam parte firmatam, inibi que putrescentem, prædictam concoctionem, seu maturationem generaliter dictam admittere. At si ea turgat, agitetur, & de loco ad locum moueatur, ac transfluat, (quia turgere nil aliud à Galeno dicitur esse, nisi cum humores vehementi motu agitantur, ac ab vno loco ad alium confluunt, dolores & titillationes afferendo, ægrum quiescere non permittentes, vt scriptum reliquit eo commentario, cui titulus est, Quos purgare conueniat, &c. & in commento Aphorismi vigesimi secundi primi libri) eo casu asserimus flauam bilem taliter constitutam, nullam concoctionis speciem admittere: immo mox circa initia eam purgare conuenit: nam, cum in motu vehemētiore sit, ægrum infestans, fastidians, & quiescere non permittens, priusquam in aliqua sede præcipue

principe decumbat, natura ipsi in expellendo auxiliantes, purgare medicamento vtendum est, quod quidem non tantum Hippocrates, & Galenus in superius allegato Aphorismo vigesimosecundo primi, & primo quarti libri nobis præceperunt: verum hoc ipsemet Galenus iubet libro quarto de Ratione victus in morbis acutis, sub his verbis: Nā vel statim ab initio, priusquam in parte aliqua confirmentur humores, medicandum: vel postea, cum ad maturitatem perducti fuerint: præcipue si maturari valent. pariter & commentario, cui titulus est, Quos purgare conueniat, ait, In his autem qui ægrotant, si diuturnus futurus est morbus, expectanda semper erit concoctio: sin breui solvendus, inter initia, si modò à concitatis pendeat humoribus, purgare licet. & paulò inferius asseruit: Hos ergo humores euacuare conuenit in motu, agitatione, ac fluxu positos: qui verò aliqua parte corporis confederunt, neque vllò alio auxilio, nec medicamento prius mouendi sunt, quam concocti fuerint. Ex quibus omnibus lucidè percipimus Galenum sæpenumero flauam bilem concoqui posse ac debere asseruisse, priusquam purgetur, concoctione videlicet generaliter seu vniuersaliter dicta, prout videre licet apud eum libro secundo de Ratione victus in morbis acutis, vt diximus: ac de ea flauabile intellexisse, quæ in aliqua parte decumbit ac sedem propriam sibi statuit. Interdum autem compertum habemus apud eum calidos, acres, tenuēve succos turgētes, mox circa initia purgandos esse, cum nullam propriam ac determinatam sedem obsederint. qua de re flauam bilem ante concoctionem in his verbis purgare iubet, prout superius in nonnullis locis, quæ citauimus, instituit: nam cum superabundantes humores mouentur, & per totum corpus deferuntur, nondum in aliqua parte firmati: tunc ad eos expellendos natura incitatur, & aliquo indiget manum porrigente, & hunc humorum motum ad alium deducente, prout patet in commento Aphorismi primi, libri quarti. Tantæ igitur controuersie, his sic dilucidatis, veritas satis admodum liquet, ac ad mentem Hippocratis, & Galeni determinata est, ac quid ad prædictas opiniones sit respondendum, liquidò constat. At rursus aduersarius instabit, si Galenus in commento Aphorismi vigesimisecondi, quarti libri asserit, quo in tempore natura à causis morbum facientibus grauatur, adest autem cruditas humorum, tunc aliquid bene euacuari est impossibile: & in fine eiusdem commentii ait, Cum in morbi principio semper sint signa cruditas, mala erit talium humorum euacuatio: cur flaua bilis ipsa, licet turgat, in principio euacuari ante concoctionem debeat, aut quo pacto bene euacuari possit? Verum nulli non patet Galenum in præallegatis locis de Euacuatione humorum, qui in aliqua parte firmati sunt loqui: & non de eis, qui turgent: quibus, cum natura incitetur, propter eorum motum, titillationem ac mordacitatem, ad eos expellēdos: cogimur nos quoque, eam iuuando, purgationem accelerare, priusquam in aliqua principe sede decumbant: etsi nulla concoctio, nec discretio præcat. turgent enim humores ante concoctionem euacuare in Aphorismo vigesimosecundo primi libri iussit Hippocrates. quare flauam bilem si turgat, circa initia, priusquam in aliqua parte firmetur, nulla expectata concoctione, statim præcepto

Hippocratis, & Galeni purgare quispiam non ve-
reatur: velut etiam interdum, etsi non turgat, sed
in quapiam parte firmetur, eam purgare cogimar,
vt infra differatissime ostendimus de mente eius-
dem Hippocratis, & Galeni.

De digestionē.

Si nonnulli nostri temporis Medi-
ci ad pauca respicientes nullam fa-
ciunt inter concoctionem, & dige-
stionem differentiam, quantum ta-
men hi à veritate deuiant, ac quo pa-
cto hallucinat; sunt, ex Galeni, aliorumque bono-
rum artis medicæ auctorum mente dilucidare de-
creui: cum id non paruum rei medicæ tyrunculis
studiosis vtilitatem afferat. scpe enim quosdam Me-
dicos digestionē pro concoctione, ac concoctio-
ne pro digestionē æquiuoca ratione vtentes, ipsi
cum audiant, in prauos labuntur errores. At nos
veritatem inuestigantes dicimus, quod digestio
proprie idem sonat, quod distributio, distinctio,
seu compositio ordinata. hinc digerere proprie i-
dem est, quod ordinare, disponere, distribuere, vel
distinguere. vnde id, quod apud Græcos diatatto,
seu dieutheto, vel diacosmo, vel diacrino signifi-
cat, id Latine sonat, vt retuli, or dino, distingo, di-
gero, distribuo, guberno, dispono; hinc diacosmi-
sis, digestio, seu dispositio: & diacosmos digestio,
distinctio, seu ordinata compositio dicitur: & dia-
crisis separatio, diuifio, seu discrimen. pariter quo-
que, quod Græci anadosin dicunt, nos digestionem
appellamus, & diadosin distributionem. At hæc
digestio, seu distributio penes alimenta proprie at-
tenditur: cum anadosin cibi distractionem à na-
tuo calore in proprium corpus proprie appella-
mus, velut etiam & diadosin: quanquam & hæc
inter se quodammodo discrepant, vt patet apud
cap. 6 Galenum libro secundo de Naturalibus facultati-
bus. hæc autem digestio aliud non est, quam ordi-
nata alimentorum distributio. Verum, quod hæc
à concoctione discrepet, patet apud Galenum li-
bro quarto de Vfu partium. vbi talia profert verba,
cap. 17 Quod autem animalium ventriculi sedi mini-
mè cohaerint, satis magno indicio est aliud esse
oportere coquendi alimenti instrumentum, aliud
eodem cap. distribuendi. & parum infra asserit: Satis igitur
constat aliam quidem concoctionis, aliam autem
anadosicos oportuisse esse particulam. & libro, qui
cap. 3 inscribitur, Quod animi mores corporis tempera-
turam sequantur, loquens de vino ait, Nam re vera
si commodè eo vtaris: & concoctioni, & digestio-
ni, & sanguinis generationi, & nutritioni confert
cap. 2 abundè. & libro tertio de Causis symptomatum
hanc anadosin, seu alimenti ex ventriculo in iecur,
& ex iecinore in totum corpus diductionem, aliam:
ab alimentorum concoctione disertè confirmauit
ab alimentorum concoctione opera dinumeret. Ex qui-
bus cuilibet constat apud Galenum alimentorum
digestionem aliud à concoctione intelligi debere.
& si per pepsin digestionem improprie interdum
intelligere possumus, per anadosin tamen nun-
quam concoctionem significari compertum est:
quinimodò hanc digestionem, seu distributio-
nem ab aliis facultatibus perfici, quam à concoctio-
ne, quia ab expultrice, ac attractrice simul, vt pa-
tet Galeno secundo de Naturalibus facultatibus.

aliaque esse medicamenta, quæ ad digestionem, seu
alimentorum distributionem faciunt: & alia, quæ
concoctioni præsidium afferunt: ac alio, & alio tẽ-
pore exhiberi debere decretum reliquit idem Ga-
lenus quarto de Sanitate tuenda. Hæc autem dige-
stio, seu distributio hoc pacto libro de definitio-
nibus Medicis describitur. Digestio est concoctio,
ac confecti alimenti, & in sanguinem conuersi in
corporis particulas omnes attractio, quam natiuus
calor molitur. De hac autem digestionē alimento-
rum hic loqui non intendimus, sed de ea digestio-
ne, quæ circa humores, seu excrementa, quæ præ-
ternaturaliter in corpore, seu parte aliqua corporis
detinentur, à calido innato perficitur. hæc autem
bifariam fieri potest: vna, siquidem cum natura i-
psa post concoctionem mouetur, pro digestionē,
seu distinctione semiputridi, seu seminali præter-
naturaliter decenti excrementi, & demum per sen-
sibiles canales, seu aquæ ductus sensibilibus expel-
lit, per alium videlicet, vrinam, sudorem, &c. quæ
digestio, segregatio, seu distinctio proprie appel-
lari meretur: improprie autem distributio. nec mi-
nus ea à calido innato perficitur, velut ea digestio,
quæ alimentorum est mediis naturalibus facultati-
bus, attractrici quidem ex vna, ac ex altera expul-
trici, hæcque insuper alia est à dictorum excremen-
torum concoctione, eique succedit, vt dicemus:
quam fortè Græci diacrillin appellarent. Altera est
digestio, quæ penes dicta excrementa præternatu-
raliter quoque in corpore retenta ab ipsa natura
perficitur, ac ea excrementa non vtiq; sensibilibus
postea excernens velut in prædicta, sed per halitum
digerens, dispergens, atque per poros cutis insensi-
bilibus discutiens. quæ quidem digestio diaphoresis
proprie à Græcis appellatur. hinc diaphoretice i-
dem, quod vis discussoria sonat, à verbo diaphoreo,
quod idem est Latine, quod digero, discutio, seu
dispergo, & propterea à quocunque causa corpo-
ris etiam substantia propria insensibilibus dissipatur.
Hanc dissipationem per halitum digestionem
appellamus. de qua etiam veluti de ea, quæ alimen-
torum est, digestionē loqui pauca paramus. At de
ea loquutus est Hippocrates libro sexto de Morbis
vulgaribus, cum dixit vigiliam edacem: & Galenus
eodem loco ait, vigiliam edacem esse: quia corpus
digerit, ac dissoluit. & idem de vigilia duodeci-
mo methodi medendi, voluit quod corpus digerat.
Tantum ergo de ea digestionē, quæ à natuo calore
aduersus excrementa præternaturaliter detenta
seu putrescentia in corpore perficitur, tam si intra
vasa, quam extra: tam si circa partes internas, quam
externas, verba faciemus. Verum attendendum
primò est, quod velut ea digestio, quæ circa ali-
menta ab innato calido perficitur, ab eorum ali-
mentorum concoctione discrepat, ac eam concoctio-
nē, si ritè cuncta à natura in conficiendis alimentis
perficiantur, subsequi debet: pari ratione ea dige-
stio, quæ circa corporis excrementa, seu putri-
dos humores in corpore præternaturaliter deten-
tos à natura ipsa, seu calore naturali paratur, ab ea
concoctione, seu maturatione, quam circa ea
excrementa molitur, valde discrepat. Et velut ea
digestio, quæ alimentorum est, eorum conco-
ctionem subsequi debet: eadem ratione hæc di-
gestio, quæ excrementorum est, seu humorum
putridorum, si per sensibiles vias expellendi
sunt, eorum maturationem consequi debet.
& pro-

& propterea Galenus iussit, quod, ut bene aliquid euacuetur, oportet concoctionem praire, subsequi verò discretionem, & postea euacuationem, in commento Aphorismi vigesimi secundi quarti, & vigesimi secundi primi libri. Perficitur verò hæc digestio, seu segregatio, seu distinctio ab ipsa natura duabus eius facultatibus mediis: post tamen perfectam operationem ipsius concoctricis: attractrice videlicet una, & expultrice altera. per primam siquidem quod familiare est, attrahens: at per excreticem id, quod amplius in pristina naturam redire non valet, seu in alimentum transmutatum transmutari, discernens ac distinguens ab eo quod familiare est, demum expellere tentat per sensibiles excretiones, quam expulsionem si perficere non valeat eo tempore, ut infra dicemus: à medico natura ipsa iuvanda est tum preparatione, tum etiam, si opus fuerit, purgatione. Verum eam digestionem excrementorum, quæ per halitum fit, natura ipsa confestim nulla præcedente concoctione sæpe molitur: quinimo prius perficere tentat, per halitum videlicet digerere, quod si non valeat, id concoquere procurat, & demum ea, perfecta concoctione, segregat, ac distinguit, nec amplius per halitum digestionem æquè aggreditur: nam per concoctionem crassiora, ut supra relatum est, excrementa reddita, non amplius utriusque per halitum facile digereri valent, quæ concocta sunt, sed secerni & demum sensibilibus excerni postulant. & hæc de re

cap. 3 Galenus libro de Inæquali intemperie voluit esse in fluxione duplex genus curationis: vnum, quo digeratur quicquid humoris in particulam procul habuit: alterum quo concoquatur. Verum digestio, dicebat, optanda maxime est: quoniam concoctionem hæc duo necessario sequuntur, puris generatio & eius in aliquod spacium abscissio, ex quibus verbis palam ostendit, digestionem per halitum excrementorum maturationem subsequi debere, sed potissimum eam præcedere. hanc eandem per halitum digestionem primo ante concoctionem exequendam iussit Hippocrates in cura pleuritidis secundo de Ratione victus in morbis acutis in principio. Disserendum autem modò à nobis est, nunquid ea digestio excrementorum, quæ eorundem concoctionem subsequitur, distinctio, seu impropria distributio appellata, iuvare possit ab arte, & à medico: & si possit, cum quibus. Pro primo asserendum planè est, quod, velut alimentorum digestionem quibusdam auxiliis medici opulantur, ut patet de mente Galeni quarto de Sanitate tuenda, & libro Quod animi mores corporis temperaturæ sequantur, & primo de Sanitate tuenda, ac secundo, & quinto eiusdem: pari modo natura ipsa à medico adiuvare potest pro digestionem redundantium excrementorum perficienda, cum ea ab eadem natura perficiatur, eisdemque facultatibus mediis, ut supra relatum est. Quæ autem auxilia, ac qualia paranda sunt ipsi naturæ à medico pro hac digestionem iuvanda non admodum patet: nam interdum reperitur Galenum asserere, idem posse & concoctionem & digestionem opem ferre, ut de vino enūciat in libro, Quod animi mores corporis temperaturæ sequantur, loco superius allegato, & sexto de Morbis vulgaribus. sæpenumero idemmet ait, quædam digestionem iuvare, quæ tamen concoctionem impediunt, velut secundo de Sanitate tuenda, de exercitatione disseruit. quæ cum in corpus

digestionem adiuvet, ministrari tamen non debet, nisi alimenta, seu succi, qui in ventre, aut vasis continentur, optimè concocti sint: aliàs periculum esset, ne priusquam per maturam concoctionem utiles sint; in omnes animalis partes rapiantur. & libro quarto eiusdem cap. septimo dicebat post cibum non esse sumenda medicamenta, quæ ad vehementiorem distributionem faciunt: nam tunc non distribui, sed concoqui, quæ sumpta sunt, est utilius. quare melius est eo tempore ut aliquo præsidio ad concoctionem, præcipue qui egent, ex quibus Galeni verbis liquidò constat interdum eisdem medicamentis posse & concoctionem & distributionem à medico iuvare, & sæpenumero diversis auxiliis. Sed, quò veritas clarius fiat, haud ignorandum est concoctionem ipsam, ac distributionem, seu digestionem, velut & alia naturalia opera, ab ipso calore innato perfici, ut patet Galeno in Commento aphorismi decimiquinti primi libri, & in commento Aphorismi septimi secundi libri: quare nec quæpiam præterire debet ea auxilia, quæ concoctionem simul & digestionem adiuvant, talia à medico paranda esse, ut calidum innatum, seu naturam ipsam roborent atque adaugeant, vel saltem non dissipent, sed feruent, nec minus sciendum est aliquem succum, seu excrementum promptius ex sui natura posse & concoqui, & distribui, seu digereri, alium verò ægrius. His sic dilucidatis, constat cuique quod ea excrementa, quæ in corpore redundant, si facilius sint maturationis, ac digestionis ex sua natura, viribus ipsis non admodum imbecillioribus existentibus, potest à medico eisdem auxiliis iuvare calidum innatum pro eorum concoctione, seu digestionem perficienda. & propterea Galenus libro de Constitutione artis medicæ, cap. decimono pro dulcis pituitæ ac acidæ concoctione perficienda, modicè calefacientis vini potum laudabat, de quo itidè vino, ut diximus libro, Quod animi mores corporis sequantur temperaturam, sic scriptum reliquit: Nam re vera, si comode utaris, & concoctioni, & digestionem, & sanguinis generationi, & nutritioni confert abundè. Pariter ergo & ipsius dulcis, seu acidæ pituitæ digestionem vinum ipsum opituitur: cum eius concoctionem opem ferat, quod si vires ipsæ quodammodo imbecilliores fuerint, ac calor innatus non multus, simulque excrementa ipsa redundantia, ex eorum natura ægrè & concoctioni, seu maturationi, & digestionem obsequentia, non verendum esse puto aliis auxiliis digestionem iuvare, & aliis concoctionem. nam, cum ea excrementa vehementiori egent digestionem, ac ipsa natura non admodum robusta existit, eis indigent medicamentis quæ ad vehementiorem digestionem faciant, ac calidum innatum roborent & augeant. hæc autem calidiora esse debent, quam ea, quæ concoctionem adiuvant, cuius generis sunt frigidiora, ac propterea crassior pituita & atrabilis. Ex quibus patet quomodo Galeni verba intelligi debeant, cum ait, Idem posse & concoctionem & digestionem iuvare: & quò pacto intelligi debeant eiusdem verba, cum asserit quædam digestionem iuvare non autem concoctionem, immo eam impedire. Nec mirum est, si ea, quæ corpus humanum excalfaciunt, calorem innatum augendo, aut saltem fovendo, veluti alimentorum digestionem, seu distributionem, ita quoque excrementorum, seu redundantium

4. Meteor.
res. ex. cum
men. 1

cap. 1. & 3

tium putridorum succorum digestorum, seu secretionem procurent. nam teste Aristotele, pariter & Alexandro quarto Meteororum, Caloris natura est homogenea cogere, ac in vnum compulzare; quæ verò heterogenea sunt, secernere, ac separare. cum verò redundans putridus succus partes habeat heterogeneas, eas, post eius concoctionem, calor innatus secernere tentat; quod familiare est, attrahens: quod verò alienum, excernens. veluti in conficiendis alimentis in ventriculo, quicquid veluti terra, aut lapides in eis continetur, segregati quod verò velut palea & surfur, in hepate: exemplo peritorum præparandi tritici, qui si quid terræ, aut lapidum, aut sylvestrium seminum admixtum sit, quæ perniciofa corporibus esse solent, aut paleæ, & surfuris, viliter purgant, prout Galenus asserit libro quarto de Vsu partium. Hæc autem operatio perficitur à calido innato, quatenus calidum innatum est, & quatenus calidum. & propterea à calidis medicamentis auxiliari potest, quæ tamen non admodum temperamentum excedant: quia si multum excederent, imbecillum reddentia innatum calorem digestionem potius impedirent, quam iuuarent. nam, licet cuiuslibet calidi sit heterogenea segregare, non tamen cuiuslibet est secernere putridum humorem à non putrido: sed tantum hoc opus inpati calor est. possunt tamen ei opem ferre & ea, quæ ipsum calidum fouent, & quæ ipsum augent, siue in substantia, siue in qualitate. Verum ea quæ in qualitate augent, sunt vehementius digerentia. quæ de re eis vtuntur, vbi vehementiori digestionem opus est. quanquam hæc quoque calida non tantum calfacere debeant, vt ipsum innatum calorem valeant in igneam qualitatem transmutare. calor enim adausus vehementius alterat: modò tamen non eo incrementi perueniat, vt iam colliquet. tunc namque ad omnia est inutilis, auctore Galeno tertio de Causis symptomatum. & si hæc quoque caliditas ignea possit extenuare, ac dissoluere, vt patet Galeno in commento Aphorismi vigesimi sexti secundi libri, & Aphorif. quinquagesimi septimi, quarti lib. Ex quibus patet, quo pacto auxilia iuuantia digestionem redundantium putridorum excrementorum interdum ab eis, quæ maturationem adiuvant, non discrepant, & sæpenumero calidiora quàm ea, quæ concoctionem adiuvant, esse debeant, prout maiori, vel minori digestionem natura eget pro digerendis succis prædictis semimalis. Insuper & quæ vehementius digerunt, calidiora esse debent, quàm quæ cōcoquant. nam in digestionem, vel secretionem semimali succi non vna tantum facultas operantur, veluti in concoctione concoctrix, sed duæ naturales facultates eo demmet tempore, attractrix ex vna, ac expultrix ex alia. Cum autem cunctæ hæc à calido innato perficiantur; si temperatè calida adhibeantur, admodum imbecilla erit earum facultatem operatio: cum non satis sit pro duabus facultatibus eomet tempore vehementer suam actionem perficientibus tanta caliditas, quanta soli concoctrici operanti abundans esset; verum maiori indigent, vt supra retulimus. proinde segregatio absque valido calore peragi nequit, vt Galenus testatur quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus. horum autem medicamentorum materiæ admodum Medicis notæ sunt: ex quibus tum decocta, tum syrupos, tum ele-

ctaria, tum aliis modis sibi talia auxilia præparant. Est ergo hæc digestio, seu secretio opus duarum facultatum naturalium, & propterea à concoctione discrepat, quæ concoctricis tantum opus est: iuuaturque vt plurimum aliis auxiliis, quàm ab eis quæ concoctioni opem ferunt, præcipue cum vehementiori indigemus digestionem: eaq; alio tempore adhibenda sunt; quia post concoctionem, si rite natura à talibus auxiliis iuuanda sit, & præcipue eo tempore, quo sauiora cuncta symptomata apparerent, ac agri grauius se habent, natura separante à bonis mala, & ad excernendum præparante, iuxta Hippocratis & Galeni sententiam Aphorismo 13. secundi libri, si vnica expulsionem morbi causa appellenda sit: si autem non; ei vtendum est toto morbi tempore, quo concoctio apparerit, vt eis adiuta, illud, quod concoxit, facilius secernat. Differt autem hæc digestio, quæ excrementorum est, ab ea, quæ alimentorum: cum in hac attractrix non ita vt in illa operetur validius, sed expultrix. De diaphoresi autem, hoc est, per halitum digestionem, pauca admodum differemus, cum à nonnullis abundantissimè scripta reperiantur: tum quia ex his, quæ supra retulimus, & quid ea sit, patet, & quibus auxiliis perficiatur, quia calidis: quanquam & hæc tepentem calorem obtinere debeant; vt lini semen, ac chamamelum, auctore Galeno vndecimo Methodi medicandi. nec minus à balneo somnus malos succos per halitum digerit, vt idem Gal. asserit 4. de Sanitate tuenda & eodem libro oleum describit ex floribus populi, quod sine vlla morsione per halitum digerit. pariter & ex chamamelo & anetho medicameta describit, quæ per halitum digerere possunt, quæ cuncta tepentem calorem possident, vt diximus; quanquam & prædictis calidiora quoque reperiantur, quæ calfacere, extenuare, dissoluere, ac valenter digerere valent. his denique ac similibus vtendum est pro hac digestionem iuuanda, quæ per halitum dicitur at quo tempore eis vtendum sit, superius relatum est. In quo verò ab eis, quæ concoctioni opitulatur, discrepent, Galenus quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, perbellè declarauit. & hæc de digestionem sunt dicta.

De præparatione.

VM ergo in hac excrementorum digestionem, secretionem, seu distinctionem, quæ mala sunt à bonis separans, ad excernendum natura præparat, vt sentit Gal. in commento Aphorif. 13. secundi libri; consentaneum est differere quo pacto Medicorum ope possit humorum excernendorum præparationi opitulari, & quibus auxiliis. sæpe enim redundans vitiosus succus exiguis canalibus, per quos expelli debet, crassior ac viscosior existit. quare ab ipsa natura expelli nequit, ni canalium, siue foraminum hostia, per quæ debet purgatio fieri, referentur, crassities tenetur, ac viscositas eius, quod debet euacuari, incidatur. Hinc corporis præparationem, teste Galeno in commento Aphorif. 24. primi libri, nil aliud esse affirmamus, quàm aliquod corpus purgationi imparatum paratum facere. hoc autem esse imparatum bifariam præcipue fieri potest: aut ex parte succorum redundantium, qui purgandi sunt: aut ex parte viarum, per quas redundantes succi expellendi sunt, ac à pharmaco trahendi. si ex parte succorum

si. 2. &
m. 32

cap.

cap.

cap. 5. lex.
n. 29

cap. 1.

erit

erit aut eorum crassities, vel tenacitas, sine lentor, vel utraque simul, at ex parte foraminum, seu meatuum una tantum causa esse potest, videlicet eorum obstruatio: quæ omnia purgationem impediunt. & propterea non immerito eodem aphorismo 24. primi libri iussit Hippocrates. Rarò in acutis passionibus in principiis medicinis purgantibus uti, nam, cum in ipsis morbis acutis facultas nobis non detur circa eorum principia præparandi corpora; rarò circa ipsorum initia purgationes in bonum visum nobis venient. opus namque est, ut purgatio omnibus rectè procedat sine torminibus, vertigine, fastidio, difficultate, seu agrorum dissolutione. Corpora quidem prius fluida facere, præcepto eiusdem Hippocratis aphorismo nono, secundi libri. quod quoque falsim Galenus decretum reliquit eo commentario, qui inscribitur, Quos purgare cõueniat, & c. Verum, quod Medicorum auxiliis compluribus hoc perfici possit, cunctis equidem patet: nam, si nil aliud est corpora fluida facere, hoc est, purgationi præparare, quam crassos succus tenuare, viscidos incidere, ac foramina, per quæ huiusmodi succi pertransire debent, referare, ut patet Galeno in commento supradicti Aphorismi noni, secundi libri, & sexto de Morbis vulgaribus: nonnullaque inter Medicos comperta sint auxilia, quibus mediis possimus talia in corporibus, cum opus sit, operari: sequitur, Medicum humorum in corpore redundantium præparationi absque dubio opem posse ferre. quæ de re sexto de Morbis vulgaribus præcipit ante epotum veratrum lauare, ac cibum fumere, ut celerius purgatio fiat. hanc eam sententiam reliquit Aphorismo decimotercio quarti libri. Et Galen. in commento Aphorismi vigesimi quarti primi libri non tantum hanc facultatem præparandi Medicis tribuit: immo nonnulla ibi dinumerat, ex quibus ipsi Medici occasionem arripere possunt pro prædicta præparatione facienda. & insuper eodem commento, postquam declarauit quibus indiget is qui purgandus est, asserit, quia oportet eius humores quammaximè fieri potest, esse fluxui paratos, hoc est, tenues, nullum lentorem participant, & aperta esse foramina: nam & nos ista antea paramus, cum quempiam purgaturi: & ut vno verbo dicam, hæc præparatio contrario modo se habet cum cõcoctione, seu digestionem: nam hæc natura præcipue, & non arte fit: illa verò ab arte potius, quam ab ipsa natura. præparationi ergo ars medica, & Medicus opitulatur, nemine contrarium sentiente, siue per vomitum, siue per alui subductionem purgare velis. immo huius præparationis auctor præcipue Medicus est, ipsi naturæ auxilia pro ea perficienda porrigens, sine quibus ipsa fortè perpetuò omnino non assequeretur: at cum quibus, nondum liquet. Verum, si præparatio penes redundantem succos crassos & tenaces attēdatur: eis, quæ tenuant ac incidunt, utendū est: de quibus libro de attenuante victus ratione talem protulit sententiam, Si quid igitur olfactui, aut gustui, aut utrique simul acre, & mordicans, & calidum apparebit, scito id facultatem habere tenuandi, ac incidendi: pariter & quæ eidem olfactui odorem bonum inferunt, & gustui aromatis speciem repræsentant. & demum subdit, Incidunt præterea, & quæ saporem habent quendam nitrosum, aut salum. nec minus his amara, tenuandi facultate sunt prædita. at eorum facultas aceto, & melle intenditur. Ex

quibus colligo tum acria, tum salsa; nitrosa, tum etiam & amara facultatem habere crassos humores, ac viscidos tenuandi, ac incidendi, de mente Galeni: quorum si quis velit catalogum inspicere tum olerum, tum seminum, tum ipsarum arborum, germinum, ac aliorum; supradictum Galeni librum de attenuante victus ratione perlegat. Quædam verò summam in commento aphorismi 24. primi libri annotauit, ut in melicrato decoctum hyssopi, origani, tragorigani, thymi, vel pulegij. Et octauo Methodi medendi nonnulla quoque dinumerat tum in alimentorum, tum in pharmacorum ratione, ut ptisanam, mullam, calamintham, hyssopum, origanum, serpyllum, apium, pariter in mulla incocta. Verum inter omnia præcipue in febribus, ut quod nec febrem accendat, oxymel summopere extollit: quanquam & hæc pariter obstructions liberent. & libro vnde cimo eiusdem summopere ptisanam, aquam mullam, ac oximel approbavit. In immodica tamen febris caliditate, omnibus relictis, confugit ad ptisanæ cremorem, quam ptisanam & detergere, & dissecare, ac resolueret decretum reliquit quarto de Sanitate tuenda, & primo de Ratione victus in morbis acutis; & in eo commentario, quem de ptisana compilauit, talia de ptisana verba retulit, Sanè ne vllum quidem alterum datur inuentu, quod siue ut medicamentorum, seu tanquam nutrimentum exhibetur, quod horum amborum compos sit præter ptisanam: incisionis videlicet, & humectationis. præterea eodem commentario dicebat, Febribus ardentibus ptisanam esse accommodatissimam: incidit enim, ac detergit, cum hoc quod frigida sit, & humida. Hac ergo consulo, ut medicum in ardentissimis febribus utantur; cum redundantium succorum præparatione egent. nec minus tanquam præcipuo medicamento rogo, utantur oxyosaccharo ipso: secundo loco, oxymelite, vel aqua mulla, præcipue febre non existente valida: tertio loco supradictorum aliquo decocto, aut solo, aut ptisana, mullave, prout morbus requirit, ac eius causa. & si eorum facultas intendi velit; acetum addatur, & mel, precepto eiusdem Galeni libro de Attenuante victus ratione, loco supra allegato. hæc quoad præparationem, quæ penes redundantem purgandos succos attenditur, dicta sufficiant. Reliquum est de eis medicamentis, quæ præcipue detergant, poros repurgant, ac infarctum liberant, & hoc pacto foramina, vias, vasorumque oscula referant, differamus. quæ a Galeno quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, cap. duodecimo bifariam considerantur, quædam nanque poros repurgantia medicamenta appellantur ab eo, ut patet eodem libro. & hæc in duo subdiuidit, genere quidem substantiæ minimè diuersa, verum ratione maioris minorisque discrepantia: nam utraque calida sunt, tenuium partium nitrosa, ac amara. Horum autem medicamentorum quædam in superficie fordem auferunt, quæ extergentia, siue rhyptica nominantur: quædam verò abstergendo etiam poros repurgant, quæ quidem supradictis subtiliorum sunt partium, emplasticis contraria, proinde hæc ecphrastica, & cathartica quasi expurgantia, & factum liberantia dicas, appellantur. Quæcunque ergo nitrosa, amaraque

sunt, ea ad purgendos meatus omnes valere noueris: quæ verò vlcera sordes, ac cutis vniuersæ extergunt, non tantum hæc, sed & viribus minora auferre possunt, vt dulcia tenuium partium, puta mel: ex cerealibus faba: ex fructibus amygdalæ, quæ edendo sunt. quædam verò, licet meatus intus assumpta purgare valeant, porosque extergere: cuti tamen apposita, quia eis quædam adstrictio adiuncta est; repurgare non possunt. nam composita sunt ex amara, acerbæque facultate, ac occluditur meatuum exiguitas ab eorum adstrictione; priusquam in altum abstergens substantia recipiatur, ac probè meatus expurgentur: vt absinthium. at quædam sunt, quæ vtrunque perficiunt & intus sumpta, & foris apposita; vt erui, ac lupinorum farina: si amara fuerint; amygdalæ amara, vrticæ semen, scylla, & iris &c. quædam verò huius generis medicamenta, præterquam quod detergunt, ac infarctum liberant, vim quoque habent extenuendi, ac incidendi crassos, lentosque humores: vt seriphon & abrotanum. quorum medicamentorum poros purgantium, ac abstergentium, & ea de re obstructions soluentium, ac infarctum liberantium mentionem fecit Galenus octauo Methodi medendi ca. quarto, quo loco asserit vniuersale documentum, quod quæ deterforiam habent facultatem, tum intus sumpta, tum foris admota obstructions soluant: quanquam & ibi quoque nonnulla dinumeret, quæ cum hoc quod obstructions soluant, tenuant, ac incidunt crassos, ac lentos humores, de quibus supra mentionem fecimus: nec minus & quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, loco superius allegato: innumeræque talia compariuntur apud alios artis medicæ auctores. quare particulatim, vt ea hic dinumerem, non est necesse. Quædam autem poros, foramina, seu meatus referantia à Galeno appellantur, quæ pariter in duplici sunt differentia: nam quædam cutis meatus referant, quæ rarefacientia, seu areotica nuncupantur: quædam verò vasorum oscula referant, quæ aperientia, seu anastomotica appellantur. quorum medicamentorum contraria diuersam etiam sortiuntur appellationem. nam quæ poros contrahunt: condensantia: quæ verò vasorum oscula occludunt, occludentia, constringentia, contrahentia, seu obstruentia appellatur. differtque rarefacientium natura ab ea, quæ est aperientium. nam rarefacientium natura, & modicè calida est, tum minimè deficcans, tenuiumque partium: aperientium verò tum crassarum partium, tum acris, ac mordax natura est. Hæc verò cuncta licet quodammodo prædictis, quæ extergere, incidere, obstructionsque delere diximus, vicina sint: non tamen vndiquaque similia sunt: vt cuilibet ex eis, quæ retulimus, patere potest. verum rarefacientis quidem naturæ sunt chamæmelum, semen lini, althæa, & alia huiusmodi: aperientis verò facultatis sunt, quæ acris, simulque terrena existunt: vt cyclaminus, allia, cœpe, & huiusmodi. quæ omnia in Galeno quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus facilius est videre; cum hic vniuersalem quandam methodum inueniendorum medicamentorum, ac alimentorum, quibus naturæ in prædictis auxilia præbeamus, scribere intendimus, & non cuncta particulatim: & si quæ descripsimus, gratia exempli habeantur. Præter autem hos præparationis modos alter ab Hippocrate ponitur, qui laxantibus, ac mollioris corporis red-

dentibus, humoresque fundentibus perficitur: quæ præparationis modum decretum reliquit sexto de Morbis vulgaribus, & Aphorismo decimo tertio quæ arti libri. quibus locis iussit ante epotum veratrum, vt facilius ac celerius fiat purgatio; corpora præhumectanda esse cibis, ac balneis, & quiete. verum, quoniam laxantium remedium non simpliciter vna est species, vt patet Galeno quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus; ea breuitatis causa relinquo. sufficiat tamen, auctore Hippocrate, prædictis posse vt: vt corpora idonea ad purgationem reddatur; præcipue si violentissimo medicamento vtendum sit, vt veratrum est de quo Hippocrates vtrisque locis mentionem fecit. in reliquis verò, si humores purgandi, crassi, ac tenaces fuerint; antedictis attenuantibus, & incidentibus, vel similibus vtendum est. Meatus verò, per quos ipsi purgandi sunt, ac humores transmittuntur, & à medicamentis trahuntur, quæ vim purgatoriam habent; repurgandi, ac referendi sunt cum his, quæ hanc facultatem possident, quorum methodum superius demonstraui: ac ita purgatio in cunctis rectè procedet. Ex quibus patet, in quo differant ea, quæ præparandi facultatem obtinet ab eis, quæ concoctioni, aut digestionis opem ferre possunt. Sed mox, quæret quispiam, nunquid in flauæ bilis redundantia, saltem si ea non turgat; præparatio ante eius purgationem competat, vt ea citius, ac facilius e corpore educatur. Iuniores quidam in arte medica ac in Hippocratis & Galeni doctrina oppido quam eruditissimi, atque exercitatiissimi, respondēt quod, eum flauæ bilis vacuatio facilis sit, pituitæ verò, ac potissimè eius quæ crassior, & glutinosior est, itemque nigra bilis, difficilior, auctore Galeno decimo quarto Methodi medendi; ea de re præparatione haudquaquam indiget. Insuper eorum opinio corroborari potest alia Galeni auctoritate tertio prognostic. quo loco asserit, humores corporis calidiores tenuioresque paratissimos esse ad excretionem, cuius naturæ sunt biliosi succi. quæ de re præparatione non egent. Verum, pace tantorum virorum dixerim, ipse ex Hippocratis, & Galeni mente aliter sentio. ea de re, non quidè contradicendi studio, sed vt veritas patefiat, quæ mihi videntur, de ea re proferre non grauabor. Bifariam, vt diximus, corpus potest fluidum reddi, ex mente Galeni, (illud, quod Hippocrates iussit, vbi quispiam corpus purgare voluerit,) aut humoribus extenuatis, incisis, ac absterfis: vel omnibus meatibus referatis. cum ergo incisio, ac extenuatio succis crassis, ac glutinosis, seu lentis competat, vt patet Galeno vndecimo Methodi medendi, & in cōmento Aphorism. noni secūdi libri, ac plerisque aliis locis: biliosus autè succus haud talis sit naturæ, seu essentia; cōsequens est, vt talis præparatio ei præberi non debeat. At, cum ipse Gale. iubeat. in cōmento prædicti Aphorismi noni, secūdi libri, & vndecimo Methodi medendi singulari particularum meatus, qui his ad superuacuatorum emissionem sunt proprii fluxiles reddere, vt intestino, ventriculo, mesenterio, & cœcaus iecinoris, intestinum rectum: renibus, vesicæ, iecinoris gibbis, venæ cavae, arteriæ magnæ, & omnibus in lumbis habetur, eum qui vrinis est delegatus: pulmonibus & pectori, ipsam asperam arteriæ fauces: cerebro & eius inuolucris, eum qui per palatū & nares descendit; cōsonū erit hanc saltem fluxibilitatē foraminū, ac meatuum referationē, in ipsa

ipſa flauæ bilis redundantia, vbi non turgat, ſaltē Medicum parare poſſe ac debere. Ad hæc Galenus in commento Aphoriſmi vigefimiquarti primi libri in acutis morbis, cum materia turgat, non negat aliquem Medicum poſſe arripere occaſionem in primis diebus dicta corpora præparandi, priuſquam vſurus ſit medicamento purgante. in quibus quidem morbis propter temporis anguſtiam, ac morborum prauitatem ſaltem hæc facultas præparandi nobis non datur, immò nec concoquendi, vt iuſſit Hippocrates Aphoriſmo vigefimoſecundo eiufdem primi libri. ergo à fortiori, non negabitur nobis hæc facultas præparandi in his morbis acutis, in quibus ipſa flaua bilis nō turgat. Vterius, ſi in inſtrumentali morbo, qui obſtructio eſt, contraria eſt recluſio, ſeu reſeratio, vt patet Galeno vndecimo Methodi medendi, quodlibetque præter naturam ſuo medicetur cōtrario; cum pariant obſtructionem (vt Galenus aſſerit oſtauo Methodi medendi, & vndecimo) tum humorum craſſitudo, tum lentitia, tum præter hæc & abundantia: ſequitur redūtantiam flauæ bilis, obſtructionem parientem, viarum recluſione, ſeu reſeratione indigere pro eius purgatione. ſed hæc vna eſt præparationis ſpecies, vt ſuperius oſtendimus. Quare nemo eſt, qui eam eo caſu negabit, præcipuè ſi ea flauæ bilis multitudo non ad tantam peruenerit magnitudinem, vt ſtatim circa initia Medicum ipſam euacuare cogat, vt infra dicemus. Rurſus, ſi ea non turgente iuſſerunt Hippocrates & Galenus ante eius purgationem concoqui debere, ſaltem concoctione generaliter dicta, vt patet ſecundo de ratione victus in morbis acutis: nam ea euicta ac permutata à calido innato facilius educitur; quantò fortius negandum non ſit vias ac meatas, per quos tranſmittenda eſt ac à medicamento trahenda, recludendos ac reſerandos eſſe: præcipuè cum Hippocrates vniuerſaliter iubeat Aphoriſmo nono ſecundi libri, Quæ purgantur corpora cuncta prius fluida fieri debere, quàm purgentur? at non ita iuſſit concoctionem: cum perpetuò turgentiam materiæ ab ea excluſit. Verum, vt cunctis veritas hæc pateat; placuit verba Galeni oſtauo Methodi portare, quæ talia ſunt; Cernimus enim aliquando etiam quod multum eſt, cum ſimul totum conſluit, obſtruendo hære re inſigique non minus quàm ea, quæ glutinoſa ſunt, & craſſa: quod ſi per meatus anguſtos eſt tranſitus; multò proſecto magis retineri. Si denique quod multum eſt: præter id quod glutinoſum ſit, ac craſſum, obſtruit, hæret, inſigitur, ac in viis retinetur; quis adeo erit inſuſus, vt pro eius faciliore purgatione, ſeu euacuatione, reſeratione, ac reſeratione eorum meatuum, per quos purgari debet, prius non vtatur, etiam ſi flauæ bilis fuerit talis redundantia: nec minus placuit, vt, eorū quæ propoſuimus ex Galeni mente, veritas pateat, eiufdem verba in libro de purgantium medicamentorum facultatibus in medium afferre, quæ talia ſunt: Ducat aliquis ad me quempiam ſine febre, cui in vniuerſum corpus amara bili redundantauerit, ſpectetque poſt aliquos dies, cum hominem præparauero, mihi que iam tempus inſtare viſum fuerit exhibendi medicamētū alicuius, quod bilem expurget: quo pacto naturalem corporis habitum eiufmodi portione ipſi reſtituam. In quibus

præparatione vſus eſt ante purgationem. hæc quoque ſententiam confirmauit libro primo de Sanitate tuenda circa finem, cum dixit, Quod, ſi vel craſſitudinis, vel abundantia, vel lentoris excrementorum vitio obſtructi meatus ſunt; tenuatoria victus ratio his apta erit. & paulò antè dicebat, At flaua bile retenta, ſiquidem obſtructionis culpa id accidat; eo, qui extenuat, victu vtendum. Præcipit ergo Galenus his, quæ hic aſſerit, verbis, tenuatoriam victus rationem: ſi flaua bilis propter obſtructionem præternaturaliter detineatur: quo victu præparationem molimur, vt diximus. vltimò, quis negabit eam præparationem, quam Hippocrates commendat in præallegatis locis: corporum videlicet præhumectationem, ac laxationem, quæ quiete, alimentis humectantibus, ac dulcis aquæ balneis perficitur, vt facilius veniat purgatio, ac rectè procedat? nemo inquam, qui mētis ſit compos. Redundante denique flaua bile, modò non turgat, ſed obſtruendo aliqua corporis parte hæreat, ac retineatur, ſive per vniuerſum corpus, liquet ex Galeni ſententia, vt facilius purgetur, ac à medicamēto trahatur, eam præparationem parari debere à Medicis, quæ ſe tenet ex parte meatuum, ſeu foraminum, per quæ tranſmittenda eſt: ea quidem recludere, reſerare, ſeu extergendo repurgare. nec minus expurgandi corporis præhumectatione ac laxatione, Hippocratis decreto, maximū ei comparatur commodum. Ad eam autem auctoritatem Galeni, quam aſſerunt decimoquarto Methodi medendi, facilis eſt reſponſio; ait enim flauæ bilis vacuationem facilem eſſe relatione ad pituitam, & nigram bilem: nec propterea ante euacuationem præparationem interdicit: immo, ſi ea præeat: facilius fiat vacuatio: Aut ex ſua natura, quia ſubſtantia ac eſſentia tenuis eſt, facile quidē vacuatur: nec ea ratione incifione, ſeu attenuacione indiget. at, quoniam ſua multitudine valet obſtruere, hæret, ac inſigitur, & in viis retinetur; ea præparatione indigebit, quæ penes meatuum reſerationem, ac repurgationem ſe tenet: ſi ea multitudo vinci, ac ſuperari ab ipſa natura valeat. Et eadem ratione alteri Galeni auctoritati reſpondetur, cū ait tertio prognostiſcorū, Humores corporis calidiores paratiſſimos eſſe ad excretionem: nam, licet flaua bilis ex ſua natura, cū calidior ac tenuior ſit, paratiſſima ad excretionem fiat: tamen, quia ſui redundantia, vt diximus, obſtruit & in viis retinetur; hac de re, priuſquā purgetur, prædicta præparatione indiget. & propterea ad purgationem ineptos non tantum eos, qui multa cruditate laborant, aut alia extenta habent, cenſet Galenus in commento 24. Aphoriſmi primi libri: verum & quibus ignea, ac ſupra modum calida exiſtunt: nec paratos tantum exiſtimat, vbi humores fuerint tenuati, ac incifi, verum etiam vbi aperta ſint foramina, ac nullam habeat obſtructionem, per quæ purgatio fieri debet. Verum ſtatim quæret aduerſarius, quibus medicamentis talem præparationem in flauæ bilis redundantia parare valeamus; cum ferè cuncta, quæ talem facultatem obtinent, vt ſuprà annotauimus, calida ſint, eoque flauam bilem adaugeant. Cui reſponſum volo quod, licet quandoque calidis vti poſſimus, Gal. decreto in cōmento Apho. 24. primi libri; tamen, vt verius id exequamur, nonnulla in arte medica reperiri, quæ quidē facultatē habet extenuandi, & abſtergendi vias, ſeu

poros repurgandi, ac referandi, & citra calorem obstructions liberandi: nam quæ deterforiam facultatem obtinent, obstructions solunt, teste Galeno octauo Methodi medendi. inter quæ primo in alimentorum genere prisana est, vt patet cap. 4 Galeno supra allegatis locis. at inter medicamenta, vtrunque est cichorium, quod à Galeno octauo de Compositione medicamentorum secundum locos summopere extollitur pro extersione, ac reclusionem osculorū, venarū præcipue, quæ circa hepatis, siue syrupi, siue decocti, siue quouis alio modo ex eis medicamenta parentur. & non est mirū; nam amarā qualitatem participat, cum hoc quod frigida sunt, dictumque est auctoritate eiusdem cap. 12 Galeni quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, quæcunque reperiuntur tum nitrosa, tum amara ad purgandos meatus omnes valere. & septimo de Simplicium medicamentorum facultatibus decretum reliquit, Cuncta ferè amara abstergentia esse, ac expurgantia in iecinore prouenientes obstructions. Et pariter eodem libro octauo de Compositione pharmacorum secundum locos, ad iecinoris expurgationem, & meatuum refectionem, citra manifestam calfactionem, aut refrigerationem, veluti optimum pharmacum, filicem laudauit, tanquam prædominantem habentem amarā qualitatem. Ad hæc à Dioscoride libro 2. cap. 123. pariter à Galeno libro secundo de alimentorum facultatibus, & octauo de Simplicium medicamentorum facultatibus, semina peponium, ac cucumerum vim quandam habere extergendi, cuius beneficio vrinam ciunt, ponuntur. Idem pariter sentit Paulus Ægineta libro primo de Arte medendi cap. octauo, communisque vsus practiciam est hodiernis temporibus eis vti. Nec minus meo iudicio inter cuncta, quæ narraui-
mus, pro ea præparatione perficienda eligēdi sunt syrupi, tum acetosus simplex, tum oxysaccharum, quod præ omnibus tum syrupis, tum decoctis, tum aliorum generum medicamentis præferendum cenfeo. Quod, si cutis meatus referandi sint; aquæ dulcis balneis, pariterque medicamentis rarefacientibus, extergentibusque vtendum est. quā vim moderatè tum calida, tum & nonnulla frigida possidere haud difficile est reperire & apud Galenum, & apud alios artis medicæ auctores. His denique auxiliis, flaua bile redundante, si non turgeat, purgandi corporis præparatio à Medicis paranda est; vt in eo purgatio rectè procedat: cum his quæ non tantum præparāt, quinimmo & causæ aduersantur, pariterque & morbis ipsis, qui ex flaua bile gignuntur. hinc est, quod alterabunt, & digestionem opem ferent, ac præparationi: veluti & nonnulla, quæ superius annotauimus, alterationi & præparationi præstant auxilium, insimulque nutriunt ac concoquunt, vt prisana. Quædam concoctioni, digestioni, & præparationi insimul opitulantes; vt vinum modicè calfaciens moderatè bibitum: ad hæc nutrit, sudorem, vrinamque promouet, ac somnum consiliat, teste Galeno 4. de Sanitate tuenda: non tamen, si crassum sit, & nigrum. Alia alterant, digerunt, & præparāt cum extenuatione, & incisione, ac excretionem promouent; vt aqua mulsa, & oxymeli: eoq; magis, si in eis, & præcipue in mulsa cōcoquatur hyssopus, aut calaminta, organū, apiū, serpillū, aut iris. Verū perpetuò mente tenendum, priusquam obstructionibus li-

berandis vacaueris cum his quæ vehementer aperiant, aut detergant, studeas vacuare redundantis succi maiorem partem: ac demum valenter aperientibus, vel detergentibus vtaris, alioquin ipsas magis impingens, præcepto Galeni octauo Methodi medendi. & si febris adsit, præsertim valida, pro liberandis obstructionibus vtaris his, quæ citra calorem liberare obstructions valent, eiusdē Galeni præcepto, vndecimo Methodi medendi. At quo tempore pro expellendis excrementis, ac redundantibus succis, præparatione vtendum sit, nondum liquet ex dictis. verum hoc perpetuò obseruandum est, si ante concoctionē purgandi sunt, vt si turgeant, quocunque tempore, Medicus potest eam occasionem arripere ac exequi, præcepto Galeni in commento Aphorismi 24. primi libri. quod si concoctione prius egeant, quā expurgentur; illud perficere, priusquam concoctionis indicia appareant, minime tentandum est. nam nec natura ipsa, nisi post concoctionem, fecerens à bonis mala ad excernendum præparat, auctoritate Galeni in commento 13. Aphorismi, secundi libri supra allegati. & hæc de præparatione satis sint.

De Purgatione.

Actenus quo pacto ante purgationem paranda sint corpora, vt eis facilius veniant, ac rectè purgationes procedant, verba fecimus; restat modò de purgatione, ac purgantibus medicamentis discere, vt eis quoque rectè vti valeatis. Quā necessaria autem, ac peritiles sint quibusdam corporibus purgationes, purgantiaque medicamenta, cunctis liquet: at quo pacto à venæ sectione discrepent, bellissime à Galeno in eo commentario, quem aduersus Iulianum compilauit, auctoritate Chrysippi, Theophrasti, Hippocratis, Platonis, ac Aristotelis demonstrat. Insuper libro de Purgantium medicamentorum facultatibus, nec minus ab eodem Hippocrat. Aphorismo secundo primi libri, & secundo, & tertio quarti libri, quibus percipere potest. Galen. quoque eodem libro de Purgantium medicamentorum facultatibus asserit, quā admiranda opera à purgantibus medicamentis absolui. quare de eorum medicamentorum necessitate, ac vtilitate, scribere non me incrimino. Verum primò de eis discendum est, cur purgantia dicantur medicamenta, quod quidem non propter aliud, vt Galenus asserit libro de Purgantium medicamentorum facultatibus, cap. 1. quā quod sanguinem à redundantibus in eo humoribus, seu excrementis purum constituent, quouis modo illa excrementa expurgent, vt patet quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus. & propterea in commento Aphorismi secundi, primi & quarti libri, purgationem esse humorum, qui sua qualitate molestant, euacuationem asserit. Quare cunctarum euacuationem, quæ per pharmaca purgatoria fiunt, vnā esse communem intentionem retulit: vt humor videlicet redundans euacuetur. Hinc Hippocrates eis, qui salubritatem corporis habent, omnino medicationes, seu purgationes prohibuit Aphorismis 36. & 37. secundi libri. nam purgans medicamentum, proprium attrahere humorem appetens; cum is non adsit, sanguinem

guineū ac carnes colliquat, vt ex ipsis proprium attrahat humorem, & propterea Galenus in cōmento Aphorismi decimiquinti tertij libri decretum reliquit, purgantia pharmaca non nisi valde indigentibus, & ex longis intervalis vtilia esse. Verum liquet Hippocratem, & Galenum in Aphorismo 47. sexti libri, corporibus paratis incidere in morbos, quamvis nondum in eos inciderint; redundantis succi purgationem præcipere, præcipue in vere, velut & venæ sectionem his qui plenitudinis passionibus subiiciuntur, insuper & hoc idem ostendit Galenus in eo commentario, qui inscribitur, Quos purgare conueniat, quibus medicamentis, & quando: & libro de Curandi ratione per sanguinis missionem. in quibus locis, ex vobismetipsis potestis inspicere, quibus corporibus paratis in morbos incidere, ineunte vere, & quibus in fine veris, purgatio, vel venæ sectio adhibenda sit, vt ab eis morbis præferantur, in quos incidere parati sunt, nam non cuncti, qui ab aliquibus præter naturam affectibus vere præferantur, eodem tempore purgandi sunt, aut eis vena incidenda est; vt quædam iuniores nostri temporis medici ad pauca respicientes indifferenter præcipiunt, ac non parum in hac re hallucinantur. His ergo corporibus paratis in morbos incurere, pro ratione redundantis succi, priusquam actu ægrotent, purgantibus medicamentis vtendum est, si aliquid aliud non prohibeat. Quæ verò purgationes prohibeant, satis dilucidè à Galeno præsertim libro nono Methodi medendi, & libro primo de Arte curatiua ad Glauconem ostensa sunt. quare eadem hic enarrare superfluum est. Insuper quod agris corporibus sæpenumero aliquo redundantibus succo, seu putrescente, purgationes quoque competant, patet apud Hippocratem libro secundo de Ratione victus in morbis acutis, & quarto eiusdem & Aphorismo vigesimonono secundum libri 2. primi & 18. quarti, ac nonnullis aliis in locis. patet etiam Galeno in commentariis prædictorum Aphorismorum. & libro de Purgantium medicamentorum facultatibus, & eo commentario, qui inscribitur, Quos purgare conueniat &c. ac in libro aduersus Iulianum, & sextentis aliis in locis. Qualitas autem medicamenti eligenda est pro ratione redundantis succi: vt, si flaua, vel pallida bilis redundet; quæ flauam, vel pallidam bilem purgant, adhibenda sunt pharmaca: si pituita; quæ pituitam. pariter de serosis humoribus, succo melancholico, vel atra bile dicendum erit. Quod verò purgantibus pharmacis facultas quædam attrahitrix inest, qua media quemlibet sibi proprium ac familiarem eligunt succum, & attrahunt; licet aliquibus, vt Erasistrato ac Aesclepiadi, incognitum fuerit, vt Erasistrato ac Galeno libro de Purgantium medicamentorum facultatibus, & libro tertio, & quinto de Simplicium medicamentorum facultatibus, & ab eodem Galeno simul & Hippocrate libro primo de Natura humana ostensum est. At perpetuò, quoad fieri possit, purgans eligendum est medicamentum, quod præter id quod redundantem eliciat humorem, aliis, quæ præter naturam sunt, adueretur. id quod Galenus præcipit primo de Arte curatiua ad Glauconem, capite de cura ter-

tianæ his verbis: Semper enim oportet contrarias qualitates opponere his quæ præter naturam inualuerint: cum hoc multò melius sit, quàm quomodolibet euacuare. & libro decimo Methodi medendi, cap. 1. loquens de febrium putridarum curatione ita retulit: Ac siquidem in idem consentiant, & quæ febrem extinguunt, & quæ causam oppugnant, in quod vtraque conspirant; cum vnum sit, sine cunctatione agendum est. Illud, quod perpetuò in omnibus morbis ipse (velut in febribus iubet Galenus) quoad fieri possit exequendum censeo; nam contrariorum perpetuò contraria esse auxilia omnium, quæ præter naturam sunt, præceptum commune est, vt sextentis in locis de mente Hippocratis apud Galenum cōpertum est, præcipue vndecimo Methodi medendi, & commento Aphorismi 22. secundum libri. Nec minus purgantia medicamenta, quoad fieri valet, eligenda sunt, quæ mala qualitatis sint expertia: quorum ampla sylua apud Græcos, Arabes, ac Latinos facile reperitur, præsertim apud iuniores, quibus in notitiam deuenire nonnulla purgantia medicamenta prauæ qualitatis expertia, quæ quidem apud antiquos penitus incognita fuere; vt myrobalanorum plura genera, calsia fistula, tamarindi, rahabarbarum, & fortè manna, nonnullaque alia, quæ breuitatis causa relinquo. Quod verò magni etiam momenti sit, si purgantis medicamenti quantitas bona coniectura viribus accommodetur? patet ex Hippocrate Aphorismo tertio ac 23. primi libri. nihil enim æquè artem medicam in agendo coniecturalem efficit, vti cuiusque remedij quantitas: nam quod laboranti præbendum sit medicamentum, aut bilem flauam, vel atram, pituitam, aut serosum excrementum euacuans, exactè quidem nouimus. Caterum, quantum præberi debet, nescimus, teste Galeno libro de Curandi ratione per sanguinis missionem. cap. duodecimo. at intentio quantitatis euacuationis non solum humorem respicit superabundantem, sed & hominis vires, qui euacuari debet. qualis enim fuerit eius natura, qui debet præferre purgationem, ad hoc ducere conuenit: & interdum vsque ad animi defectionem, si æger tolerare possit, eodem Hippocrate auctore Aphorismo eodem vigesimotertio primi libri, in his præcipue præter naturam affectibus, qui à Galeno narrantur in commento prædicti Aphorismi. & hoc non tantum in venæ sectione, verum in purgatione seruare oportet; licet tutius in venæ sectione, quàm purgatione illud exequamur. proinde præter naturam affectus, qui valde vrgent, vt videlicet adurentem febrem, vehementissimum dolorem, ac maximam inflammationem, aut similes, perpetuò suaderem, si purgans medicamentum competat; potius secundò & tertio repetere, quàm semel euacuare, priore purgatione minus vacuando, quàm humor renundans ac ægroti vires postulant: velut de venæ sectione, nisi quid vrgcat, iussit Galeno eodem libro de Curandi ratione per sanguinis missionem loco superius annotato: & in his quoque raro exquisitissima vterer purgatione. nam quod semel in ventrem deuoratum est medicamentum, quò minus omne deuoratum sit, fieri non potest: neque possibile

de pur.
1. fac. c.
de sim.
1. facul.
2. 5. e.
2. cap.
1. de
ura bu
ra. com.

cap. 12

est, ubi plus quam conueniat iam purgetur homo, partem oblata auferre: adeo ut propter id incorrigibilis sequeretur error, ut vitare non possis, aut eius, qui purgatur maximum detrimentum, aut interitum. illud quod non tantum non comparatur ex paulo minoris quantitatis, quam redundans humor ac vires exigant, euacuatione; verum maximum viribus eius, qui euacuatur, accedit commodum. Nam, minore iam facta materia, natura facilius supra reliquum aggreditur, quod concoquendum est concoquens: quod vero excernendum excernens. at si id perficere non valeat; repetenda purgatio est: quo modo tutius curabitur, id quod fieri a medicis debere iussit Galenus decimoquarto Methodi medendi. cap. 12
com. 11 & secundo de Ratione victus in morbis acutis. quamquam, si quis etiam propter atatem, vel timiditatem permittere se medico ad sanguinem vilo modo detrahendum nolit; huic quoque delicienda largius alius est, si id quoque suspectum non habeat, auctoritate Galeni quarto de Sanitate tuenda, capit. quarto. Artificiosa denique coniectura quantitas purgantis medicamento cognoscitur, velut singulorum aliorum praesidiorum. Verum eius viri est de quantitate praesidiorum optime coniicere, qui vires omnium, quae in arte sunt, didicerit, memoria mandauerit, atque diligentia omni adhibita sese in operibus artis exercuerit, ut Galenus praecipit secundo de Ratione victus in morbis acutis. & propterea idemmet Galenus eodem secundo libro de Ratione victus in morbis acutis, de quantitate purgationis in pleuritide ita asseruit: Quibus igitur dare medicamentum purgans quadrabit, his medicamenti tantum propina, quantum in plurimis mediocriter vacuare tum nouissimi tum sis expertus. Quo pacto ergo quis quantitatem purgantium medicamentorum optime coniicere possit, plane ostendimus: restat modo de tempore pauca disserere; quia ad recte medendum plurimum temporis occasio confert, teste Galeno primo de Arte curatiua ad Glauconem circa principium. Verum, cum praeter omnibus cognitu sit difficillima; vides plerumque medicos non vulgares modo, sed praexcellentes aberrare: hanc enim praecipitem apud Hippocratem esse constat: ac velut quantitas cuiuslibet est propria. Sed, cum nihil proprium possit sermone explicari; de communium quantitate, tum temporis occasione scribere tentavi: cum ad recte medendum primum conferre videantur: adeo enim, ut diximus de mente Hippocrat. occasio non tantum purgantium medicamentorum; verum omnium fere medicamentorum operationum penes corpora humana momentaneo ac admodum praecipue est, & angustissima, ut ob id difficulter sit cognoscibilis: nec quisquam eam agnoscere valet, nisi qui diu fuerit in hoc exercitatus. nam materia, circa quam ars medica versatur, dico corpus humanum, continue fluit, mutationibus ac alterationibus, seu momentaneis, ut ita dicam, transmutationibus obnoxium, faciliusque non ab extrinsecis modo, verum etiam ab extrinsecis causis alteratur. at, ut vos iuvenes studiosi plus aliquid, quam qui arte carent, de temporis occasione assequi valeatis, ad ea quae communia sunt, scribenda confugi-

mus. erit autem opportunum purgantis medicamento tempus, quo recte eo uti possumus; si materia turgeat, confestim circa initia, prout decretum reliquit Hippocrates decimo Aphorismo quarti libri. nam, cum superabundantes humores mouentur, & per totum corpus deferuntur, nondum in aliqua parte firmati; natura ad eos expellendos irritatur: quare indiget aliquo auxilio, quo medio natura ipsa valeat hunc humorum motum ad alium deducere, ac eos foras propellere. Ut autem hoc rite perficiatur; nulum aliud praestantius est, quam purgans medicamentum propinare: alias aut robur virium dissoluatur, vel febris caliditas augebitur, aut timor adest ne in aliquod princeps membrum decumbant hi, qui per corpus vagantur, humores. Sunt itaque mox a principio turgentibus humores medicamento purgante educendi, si natura eos non valeat foras propellere. Quod, si non turgent, sed aliqua in parte sint humores firmati, non opus erit circa initia purgante medicamento uti. Siquidem quae Hippocrates dinumerat incommoda quarto de Ratione victus in morbis acutis, necessario euenient, ut qui crudi sunt, purgationibus non cedant. hac de re idem Hippocrates iussit eos medicari non debere ante concoctionem, si euinci, ac superari ab ipsa natura posse cogitabis. tunc enim praeter id, quod purgationi cedunt redundantes succi, naturam ipsam habemus euacuationi adminiculantem: siquidem ea videtur post concoctionem humores discernere, & demum eos expellere, ut superius diximus. Quod, si vbique locorum tum apud Hippocratem, & Galenum, cunctosque alios artis medicae auctores liquet ipsius naturae medicum imitatore esse debere; liquidum constat eo tempore, quo natura superfluitates vtiliter expellit, si imperfecte ipsa moueatur, purgante medicamento medicum uti debere, ac id, quod deficit, supplere medicando: ut ab utroque noxij humoris euacuatio recte fiat, natura quidem expellente, medicamento vero attrahente, prout Galenus asserit in commento Aphorismi vigesimi secundi primi libri. Hinc patet, quod, cum raro humores ab una parte ad aliam transfluant, seu turgent, frequentiusque quietem habeant, ac in aliqua parte consistant, in qua toto morbi tempore concoquantur, raro in principiis utendum esse purgantibus medicamentis: praecipue si redundans succus valeat ob ipsa natura concoqui, ac euinci: at saepenumero & frequentius post concoctionem. Est ergo princeps scopus, qui penes temporis occasionem purgantium medicamentorum perpendendus est, ipsius morbi concoctio: si eius causa non turgeat, aut quiuis aliud non urgeat. Aliud insuper aequè praecipuum, eodem Hippocrate auctore Aphorismo nono secundi libri, est purgandi corporis preparatio. propter quod verebatur ipse etiam in acutis passionibus medicinis purgantibus in earum principis uti: quia non dabatur medico facultas ista preparandi corpora, Aphorismo vigesimo quarto primi libri: alias preparatione ipsa neglecta, si quis alui subductionem procurauerit, difficiles non sine torminibus, vertigine, fastidio dissolutione, ac difficultate purgationes venient. Quo

cap. 10
cap. 9

n. 22. 69

Quo autem pacto, ac cum quibus purgandorum corporum preparatio procuranda sit, supra retulimus. Hæc ergo duæ præcipue communiter penes tempus purgationum conditiones pensandæ sunt tam in præseruatione, quam in curatione, si materia non turgat, aut quidvis aliud non vrgeat, vt infra dicemus. at particularia, quæ medicum perpendere oportet, longè plura sunt. quæ cum à Galenò nono & vndecimo Methodi medendi. & eo commentario, qui inscribitur, Quos purgare oportet &c. & lib. de Arte curatiua ad Glauconem primo aliisque plerisque locis fuscissimè tractentur, ea omittere visum est.

Quæstio, an in principijs morborum materia non turgente, purgante medicamento vtendum sit.

Varet autem quispiam, an perperuo vtendum sit, quòd materia non turgente ea medicanda non sit, neque in principiis, nisi post concoctionem, ac corporum preparationem. Iuniores quidam artis medicæ, inque Galeni, ac Hippocratis doctrina admodum eruditi ex eorum intentione in plerisque locis tueri conantur, nullo pacto ante concoctionem, ni materia turgat, vtendum esse in morborum principiis purgante medicamento: etiam eo, ex quo materia diminuitur: quod quidem hodiernis temporibus minoratum medicamentum appellant, illudque cum auctoritatibus, tum rationibus contendere non desinunt. At ipse nonnullis Hippocratis, & Galeni auctoritatibus, rationibusque impulsus contra sentire cogor. Verum, vt dilucidius rei quasitæ veritas pateat, primò quid sentiam pro palabo: secundo, rationibus, ac auctoritatibus, quæ à supradictis in contrarium ducuntur, responsiones tribuere conabor. Quantum ad primum attinet, cum Hippocrate vigesimoquarto Aphorismo primi libri dico in morborum principiis, si vtendum sit medicamentis purgantibus, illud cum præmeditatione faciendum esse, diligenti videlicet examinatione præsertim, siue ægroti præparatione, siue recti iudicii expectatione, quibusdam eorum, vel omnibus simul apprimè perpensis, prout Galenus in commento eiusdem Aphorismi declaratum reliquit, non enim periculum minimum est vt purgante medicamento in principiis acutorum morborum, sunt enim purgantia medicamenta vt plurimum potentia calida, febremque augent, vt idem Galenus eodem commento optimè declarauit. & propterea quarto de Ratione victus in morbis acutis iussit rem istam secundum Aphorismorum mentem definiri oportere, scrutarique quando in principiis purgatione vtendum sit, & quando morbi concoctio expectanda. hinc Hippocrates Aphorismo vigesimo nono secundi libri decretum reliquit: Cum morbi inchoant, si quid videtur mouendum, moue: cum verò consistunt, ac vigent, melius est quietem habere. diligens ergo examinatio in morborum initiis à medico facienda est, si debeat eo tempore vt purgante medicamento, aut non. quam diligentem examinationem summarim per capita in cunctis morbis faciendam præcepit Paulus secundo de Arte medica cap. secundo. nam si morbus ipse ex toto genere exitialis

fuert, nihil nec eo tempore, nec alio mouere oportet: deplorati enim curandi non sunt, sed eis morbi finem prænuñciare licet. in quo enim desperata omnino salus est, imprudentis consilij fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere causa salutis. quam sententiam reliquit Galen. vndecimo Methodi medendi, asseritque ibi tempora præsidiaque his, quos saluari spes est, scribere. Et insuper, si diligenti examinatione cunctorum, quæ oportet, rectum ac perfectum iudicium in morbo aliquo acuto expectatur, viresque morbo præualere, eumque superare Medicus minimè veretur absque vllò eius auxilio, præterquam conueniente ratione victus instituta, abstinentium à medicamento purgante in eorum morborum initiis censerem: nam frustra id tentaretur, cum natura ex se absque vllò alio auxilio sufficiat vincere. longe enim præstantiorem esse salubrem victum vniuersum, quam medicinam, auctore commentarij, quòd Præsagium experientia confirmatum inscribitur, circa finem scriptum reliquit. libro de Medicinis expertis compertum est, optimè nos debere laudare virum, qui curat per cibum, quam illum, qui curat per medicinam. si quis autem velit huiusmodi causam discere; eodem loco reperiet. Pariter, si morbus fuerit diutius, nullo pacto in principio medicamento purgante vtendum est: nam in longis morbis semper oportet expectare coctionem, ex sententia Galeni in commento prædicti Aphorismi vigesimoquarti primi libri. Reliquum ergo est, vt in his morbis acutis purgante medicamento circa eorum initia vtendum sit: qui, etsi haud periculo vacant; tamen non sunt ex toto genere perniciosi, verum spes est, quòd exonerata natura a purgante medicamento, quod relinquitur, facilius poterit & concoquere, & expellere, quod concoquendum, ac expellendum erit. at id non nisi in principiis perficiendum esse censent tum Hippocrates, tum Galenus; priusquam robur corporis dissoluatur, vel febris caliditas augeatur, aut ad aliquod princeps membrum decumbans, qui in corpore redundant humores, præcipue si per corpus vagantur, ac turgent: est enim eo tempore naturæ imperus, aut in toto corpore, vel saltem in partibus principalioribus ad superfluum excretionem. quare iuuandus erit hic motus naturæ medicamento purgante. age igitur. Hippocrates propterea in quorundam morborum initiis præcepit debere vt medicamento purgante: nam, eo neglecto, timor esset ne vi morbi temporis processu robur corporis dissolueretur, vel febris caliditas augetur, aut ad aliquod membrum princeps redundantes decumbant humores, vt discitissimè Galenus commento Aphorismi decimoquarti libri declarauit. At, quoniam in quibusdam morbis acutis à diuersis causis hæc pericula impendent; omnium voluit Hippocrates proferre sententiam: & cum nouisset præcipuam causam, propter quam in prædictis morbis ea nocumenta timenda essent, humorum turgentiam esse in his morbis, in quibus materia turgat: illud primò, ac præcipue decretum reliquit Aphorismo vigesimo secundo, & vigesimoquarto primi libri: pariter, cum non ignorasset ex aliis causis, licet non æquè vt ex prædictis, posse prædicta pericula in quibusdam aliis morbis imminere, ni in eorum principiis agri pur-

cap. 9

In ultimis verbis.

In ultimis verbis.

gentur, ne in necessariis in arte deficeret, immo eam totam exigeret: iussit Aphorismo vigesimo-nono secundi libri, in reliquis acutis morbis, in quibus eadem pericula impendent, circa eorum initia Medicum debere uti aut venæ sectione, aut purgatione, prout morbus ac eius causa expostularent. verum, cur illud in principio exequendum esse præcipiant, Aphorismo 30. sequenti Hippocrates declarat. Galenus autem in commento prædicti Aphorismi vigesimoini præter eam, quam Hippocrates assignat, aliam addit causam, propter quam melius est circa quorundam morborum initia euacuare: nam Minorem iam factam materiam, ait, facilius morbo consistente natura concoquere valet. ut autem coctio citius eveniat, bonum est circa principia euacuare. Ex quibus Galeni verbis facile quilibet percipere valet ex eius mente Hippocratem eo Aphorismo aliorum morborum sententiam protulisse, quam eorum, quorum materia turget: cum turgens materia nullo pacto, quoad turgeat, concoqui ab ipsa natura possit. nam quæ concoquantur, quieti permitenda sunt, præcepto eiusdem Hippocratis, ac Galeni. libro secundo de Ratione victus in morbis acutis. si ergo turgens materia concoqui ab ipsa natura non valet, & propterea statim medicanda circa initia est, præcepto eiusdem Hippocratis. tum Aphorism. vigesimo secundo primi libri, tum decimo quarti libri: frustra Galenus retulisset, propterea circa principia euacuandum esse, quod minorem iam factam materiam facilius possit natura concoquere, cum concoqui ea non possit, nec valeat. Ad hæc, si sententia Hippocratis eodem Aphorismo vigesimo-nono, de turgente tantum materia verificaretur, superfluum liquidum fuisset Aphorismus; cum id præcepisset disertè vigesimo secundo Aphorismo primi libri, & vigesimo quarto eiusdem ex Galeni mente, & decimo Aphorismo quarti libri. Insuper, si mens Hippocratis fuisset tantum, cum materia turgeat, aphorismus veritatem habere, cur nullam de turgentia mentionem fecit, prout in prædictis aphorismis? aut saltem, cur Galenus nec illud explicuit, prout disertissime explicuit in commento Aphorismi vigesimiquarti primi libri, in quo Hippocrates ipse verbum nullum de turgentia fecerat? cum ergo nec Galenus de turgentia quicquam protulerit, audacter asserendum est, de aliis morbis eos voluisse intelligere in prædicto Aphorismo 29. quam de his, in quibus materia turget. hi autem sunt, qui aut ex multitudine, aut prava humorum qualitate, aut in præcipua aliqua parte fiunt: consentaneum nanque erat, postquam in his quoque verendum est, ne robur virium eis vigentibus dissolvatur, febrisque caliditas augeatur, aut in aliqua parte principe decumbant redundantes succi, circa eorum morborum initia vacuandos esse. dico medicamento purgante si morbus ex multitudine fiat aut propter aetatem, vel timiditatem, aut quidvis aliud, permittere se Medico ad sanguinem vilo modo detrahendum nolit, aut valeat, præcepto Galeni quarto de Sanitate tuenda. & quinto eiusdem: vel si exuperans quantitas fuerit, quæ purgatione auferenda sit, cum non omnis venæ sectione auferatur. eo namque neglecto circa initia talium morborum quicquam mentis compos non verebitur in eius morbi incremento, aut summo vigore, vel virium dissolu-

tionem aut febris augmentum, vel in aliqua principe parte decubitus? Eadem quoque ratione si ex mala, seu prava qualitate humorum redundantium morbi gignantur, & circa eorum initia quis purgante medicamento non utatur: paria, ac forte maiora pericula impendent, ex eaque citius robur virium dissolvatur, spiritus quidem primo, & humores: secundo loco pinguedinem, & carnes: tertio solida membra corrumpendo. & propterea Galenus nono Methodi medendi, quod corruptum est, cum id alienum à natura sit: mox auferendum esse præcipit. & libro quarto de Sanitate tuenda, asseruit, Quod igitur omnino alienum est, nulla fieri ratione potest, ut id naturæ suæ gratiam recipiat: sed educere id quamprimum est tentandum. Idem efficit, si absque nimia multitudine, aut prava qualitate aliquis succus circa quampiam principem partem, aut in earum aliqua decumbat, quod, si hæc tria, aut duo simul hominem infestarent: purgationem circa initia præcipere quis vereatur? & propterea in horum morborum initis purgante medicamento (licet materia non turgeat) utendum esse censeo: velut in eis, in quibus turget, cum eadem pericula impendant, aut fortè in eorum aliquo longè maiora, & citius expectanda sunt. quæ omnia inspicies Hippocrates in Aphorismo vigesimo-nono superius allegato, purgationes circa initia præcipere voluit, simulatque Galenus in eius commento: nam de turgentibus & prius loquuti erant & posterius mentionem facere debebant, Aphorismo videlicet decimo quarti libri. Ad hæc, si de morbis, in quibus materia turget, tantum aphorismus ipse intelligatur, ipsiusque Hippocratis, ac Galeni mens esset, in his morbis tantum vtiliter purgare circa eorum initia præcipere, purgatio vtiq; assereret Hippocrates. namque secundo de Ratione victus in morbis acutis decretum reliquit. In pleuritide, cum sub septo transverso partes dolor infestant: ventrem vel nigro veratro, vel peplio mollire: cum hæc dolorem sedant. Sedant quoque & alia, quæ expurgant medicamenta. At nemini dubium est, cum Hippocrates pro pleuritidis cura ad venæ sectionem, seu purgationem devenit: prius fomentis usum fuisse pro materia eius in hanc digestionem: quibus si dolor non diminuat, non propter aliud id effici Galenus declaravit in Commentario primi textus eiusdem secundi libri de Ratione victus in morbis acutis, nisi propter humorum redundantiam, quæ in toto corpore est. & propterea corpus totum insigni aliqua evacuatione prævacuandum est. quæ in morbis acutis, ut ipse asserit, aut per ventrem, aut per venæ sectionem fit. Ex quibus tum Hippocratis, tum Galeni verbis liquet in acutis morbis ex multitudine dependentibus, absque hoc quod materia turgeat, circa initia debere uti purgante medicamento, cum timor adsit eorum quæ supra retulimus: velut de pleuritide, in qua materia non turget, sed ex multitudine, seu humorum redundantia gignitur, Hippocrates ipse decretum reliquit. At dicet quispiam, propterea Hippocratem purgationem præcipere: nam & in ipsa pleuritide materia turgens est. cui responsum volo longè hoc ab Hippocratis, Galenique mente abesse, ac à veritate: nam humores turgere Galenus appellat octavo de compositione medicamentorum secundum locos eos, qui nōdum firmā aliquam inclinationem,

tionem, ac stationem ad vnam partem habeant. & libro, Quos purgare conuenit, quibus medicamentis, & quando, ait: Tunc humores turgere, ac concitatos esse, cum motu vehementi agitantur, ac ab vno loco in alium consuetes hominem vexant, dolorisque ac titillationem afferendo agrum quiescere non permittunt, quod quidem fecus esse in pleuritide, quis inquam non lucide inspicit? est enim ea inflammatio succingentis membranae, in qua humor decumbit inclusus in vno loco, ac circumscriptus, non transluens, veluti in inguinum inflammatione Galenus asseruit libro primo de Differentiis febrium, & secundo de Arte curatiua ad Glauconem circa principium inflammationem fieri dixit sanguine ad particulam aliquam vniuersim flucte, atque ob multitudinem ibi conculcato, qua de re nemo audebit humores in aliqua corporis parte firmatos, conculcatos, ac praeter naturam detentos; cum ex eis aliqua determinata pars afficitur, asserere, quod turgant: quinimo ipsi turgentibus de facto pugnant. Et si aphorismo vigesimo quarto primi libri raro iusserit in principis acutorum morborum medicis purgantibus vti non propter aliud est, ut Galenus in eius commento declarauit, nisi quod omnia id generis medicamenta sunt potentia calida, febremque augent. At nostris temporibus nonnulla eius generis reperiuntur, & remissa calida, & frigida, quae febrem augere non valent, ac ab Hippocrate, si superstes esset, minime damnerentur, & propterea, cum tale non afferant nocuum in febribus vitanda non sunt, ubi eis vti oportet. Sunt praeterea corpora adeo ingluuiosa, ac eo mala victus ratione hisce temporibus vtuntur homines: vt, si eos circa initia acutorum morborum, qui ex multitudine, seu praua qualitate, aut in aliqua praecipua parte fiant, non purgabis, verendum sit, ut diximus, ne eorum vires vi morbi dissoluantur, aut in aliqua parte princeps, qui in eorum corporibus redundat succi, praecipue si vitiosi fuerint, protinus decumbant. Praeterea idem Galenus in pestilenti aeris statu corpora, in quibus superfluitates redundabant, sanabat purgationibus, nulla quidem concoctione praecedente, ut ipse testatur primo de differentiis febrium. & quinto methodi medendi asseruit, ex pestilentia propterea fuisse quoddam facile senatos, quod praexicatum his, repurgatumque totum corpus fuerit; quippe cum & vomuerint ex his nonnulli, & omnibus venter profuerit. Qua de re non verendum est in eorumdem morborum initiis vtendum esse medicamento purgante, praecipue cum valde periculosi sint, atque admodum moriferi: & ni taliter eis circa initia succurratur; natura prorsus succumbet prout optime Galenus declarauit in commento 13. aphorismi secundi libri. Vtendum est ergo medicamento purgante in aliorum morborum initiis, in quibus, etsi materia non turgat; aut multitudo, aut mala qualitas manifesta, seu occulta, ut in nonnullis putridis febribus, est: aut circa aliquod princeps membrum decumbit, prout Hippocratis, & Galeni auctoritatibus optime, ac nonnullis rationibus demonstraui. Et, si licet illud experientia comprobare, ipse, qui se decem fere annos medendi aegris vacauit, adeo nullum ex huiusmodi purgationibus in praedictis morbis, si quid aliud non prohibuit, incommodum reperi, quod maximum perpetuo commo-

dum eis comparauit, praecipue in putridis, ac malignis febribus: quae saltem citra inflammationem ex putredine ortum habent. Nec minus illud expertus sum in maximis doloribus, nulla concoctione praecedente; praecipue ventriculi & intestinorum, adhibito prius diligenti examine; quod purgatione, & non sanguinis missione indigebant, purgans propinando medicamentum: etsi eius materia minimè turgeret. ex quo maximam perpetuo vtilitatem aegro adeptus sum: instructus siquidem à Galeno in commento 23. Aphorismi primi libri. At, quoniam in morborum initiis purgantia medicamenta adhibenda esse diximus: non de momentaneis, & absque latitudine eorum initiis intelligendum esse velim. sed de eis intelligendum est, quae partes sunt totius morbi, praefiniunturque à manifestis ac perfectis signis concoctionis, de quibus Hippocratis intellexit Aphorismo vigesimo nono secundi libri, prout Galenus disertè exposuit libello de Totius morbi temporibus. vel de principio intelligendum est, ut Galenus intellexit in Commento Aphorismi vigesimiquarti primi libri, ut se extendit ad primum, vel secundum diem. Illud quoque vel me tacente vos percipere velim, cum hic de purgante medicamento mentionem fecimus, de eo, quod per aluum, seu inferiorem ventrem, & non per alias corporis partes, quocumque modo redundantia excrementa purgat, intelligendum est: quod quidem quid sit, supra definitum est. Restat modò cum auctoritates, quibus iuniores isti Medici suam haeresein tueri conantur responderetur eorum rationes diluere.

Prima, quam in medium asserunt auctoritatem, Hippocratis est libro de Medicamentorum facultatibus: ubi habet, quod his, qui validis ac magnis febribus corripiuntur, medicamenta purgantia danda non sunt. Cui responsum sit me nunquam percipere ea medicamenta purgatoria in morborum initiis, quae usu erant tempore Hippocratis. erant nanque ea valde calida, & propterea non tantum in magnis febribus, verum & aestiuo tempore sub cane, & ante canem ab Hippocrate erant interdicta: nam in febribus, praecipue magnis, necessum erat ab ignea eorum caliditate eas augeri, velut aestiuo tempore naturam ab hisce medicamentis purgantibus adeo laedi, ut non valeret eorum acritudinem ferre, ut dilucide Galenus declarauit in commento vigesimiquarti Aphorismi primi libri, & quinti quarti libri. Verum ea approbo, quae adeo remissa sunt calida, aut frigida, & si calida sint, adeo à frigidis & cum frigidis sunt quodammodo alterata & permixta, ut febris caliditatem augere non valcant. huiusmodi autem generis sunt manna, cassia, fistula, tamarindi, succus rosarum, vel violarum, aut aqua in qua ea diluta, seu infusa fuerint: myrobalanorum nonnulla genera, rhabarbarum in aliqua frigida aqua infusum ac cum praedictorum aliquo permixtum. Quo quidem licet ab aliquibus valde improbetur perpetuo ipse in morborum initiis, in quibus oportet, praecipue in putridis ac malignis febribus, vtendum censo, ac consulo; est enim purgans absque violentia, cuiuslibet magni excessus expertus, nisi calidum est, & siccum: aut mixtione & infusione aliorum in frigidatum id corrigitur adeo, ut ab eo febris non augeatur. ab eoque praeter purgationem

illud habetur, quod nec ventriculo, aut alicui alij principi membro nocuementum aliquod comparatur, prout à quibusdam describitur, ac experientia compertum est, quin potius prædictæ partes ab eo roborantur sua adstringendi vi, qua pollet: nec eius purgandi vis ex infriquantium mixtione labefactatur, aut imbecillior redditur, ut quidam malè sentiunt: nam à tota substantia, & non calidum, purgat, velut nonnulla alia medicamenta purgantia. Insuper & trisera est, quam periscam nominamus, ac ipsum diacatholicon inter cõposita pharmacæ hæc sunt ea purgantia medicamenta, quæ aut frigida sunt, aut modicè calida, præsertim si cum frigidis misceantur: quibus, cum febris ipsa non augeatur, ubi oportet, in morborum initiiis salubriter purgare præcipimus. nec Hippocrates ipse, si noisset, ea damnaisset utique, cum ex eis febris, ut diximus, non augeatur maximumque ægris paretur commodum. nam si Hippocrates, & Galenus sua tempestate in quorundam initiiis morborum acutorum purgantia medicamenta, quæ calida & acris sunt, propinabant, non verentes, quod febribus comparabatur, detrimentum pro maiori utilitate percipienda ex humorum videlicet noxiorum euacuatione, quanto magis, quæ supra notauimus, cum tali periculo vacent, non prohibuissent; imò sapius uti iussissent?

sec. 43. Secunda Hippocratis auctoritas est quarto de ratione victus in morbis acutis, quæ talis est: Quibus principio vrinæ & nebulosæ & crassæ existunt hos, annuentibus cæteris purgare conuenit. quod, si vrinæ inter initia tenues fuerint, tales non purgabis. at, si videatur, clysterem exhibebis. Cui responsum volo primo Hippocrate his verbis velle, cum vrinæ tenues fuerint, inter initia, si quid aliud non vrgeat, ac concoctio in futurum expectabitur, tales non purgari: nec ego contrarium sentio. at, si multitudo, mala qualitas, vel locus instet, hos purgare consulo; nam ex noxiorum humorum euacuatione maior fiet utilitas, quam id, quod possit ex purgante medicamento sequi, detrimentum: de quibus morbis nequaquam Hippocrates ibi intellegere voluit. Ad hæc eo loco per morborum initia, noluit intelligere de eis quæ totius morbi sunt pars vna, quæ quæ præfinitur à manifestis ac perfectis indicibus concoctionis. hoc autem eius verba ostendunt, cum dicat: Quibus principio vrinæ & nebulosæ & crassæ existunt: per quas vrinas, eas Galenus intelligit: quæ albas habent nebulas, quæ concoctionis notæ existunt. hæc autem concoctionis notæ, seu albæ nebulæ in morborum principiis apparere non possunt, sumpto principio prout vnum est de quatuor morbi temporibus, ut patet Galeno tum in commento duodecimi aphorismi primi libri, tum libro primo de crisibus. pariter in commento vigesimisecondi aphorismi quarti libri circa finem asserit, semper in morbi principio esse signa cruditatis: sed per principium primos dies ægritudinis intelligere voluit, quos primus præfinit quaternarius. quod autem principium possit hoc modo sumi, patet Galeno libro primo de crisibus. Iubet ergo Hippocrates in primis morbi diebus eos purgari debere, quibus vrinæ & nebulosæ & crassæ existunt tanquam transacto vniuersali principio, ac concoctione præcedente. quibus autem circa primos dies tenues fuerint vrinæ, tanquam summè crudo existente morbo, iubet non purga-

res: sed concoctionem expectare, eorumque corpora quieti permittere, vngere, & æqualiter conterege, quod possit natura facilius concoquere. Immo hæc sententia attestatur sententiæ secundæ partis aphorismi 29. secundi libri dicentis: Cum verò consistunt, ac vigena, melius est quietem habere. quo enim tempore natura concoquit, aut vacare concoctioni debet, superfluum est euacuare: immo concoctioni vacare debemus, & post concoctionem euacuare, si à natura non iudicentur, aut iudicata fuerint integrè, quæ concocta sunt. Etsi cruditatis indicia in morborum initiiis apparere possint, immo perpetuo appareant, ut superius diximus, tamen Hippocrates in textu præallegato quarti de Ratione victus in morbis acutis, de principio non loquitur, ut est vnum de quatuor morbi temporibus: aliàs, cum ipse asserat quibus principio vrinæ & nebulosæ & crassæ existunt, &c. falsum esset quod Galenus asserit semper, in morbi principio esse signa cruditatis: & quod perfecti principij manifestum & firmum est signum coctio manifesta, ut patet apud eum libro primo de Crisibus. Nec consonum est in vno eodemque textu nos instruentem quando purgare conueniat, & quando non, diuersa ratione de principio loquutum fuisse. At, ut ego sentio, talem Hippocrates voluit proferre sententiā, In quibus circa initia, hoc est, primos morbi dies, transacto tamen vniuersali principio, vrinæ crassæ & nebulosæ existunt, (quoniam concoctionis notæ sunt) cæteris annuentibus, purgans medicamentum propinandum est. quibus verò circa primos morbi dies vrinæ fuerint tenues, quia cruditatem summam indicant, hi purgandi non sunt, sed quieti permittendi, &c. hoc est, naturæ pro morbi concoctione auxiliandum est, si cum concoqui posse sperabis. ita quod Hippocrates velit interdicere purgationes in primis diebus eius ægritudinis, in qua summa inest cruditas: cum si eo tempore, quo natura vacare concoctioni debeat, purgans adhibeas medicamentum, præcipue si summè crudus sit morbus, præter id quod ab eo æger non iuuabitur, maximo erit impedimento: nempe corpus vehementer mouens, ac humores agitando, concoctionem impedit. at, si adiuvanda erit natura aliquibus externis auxiliis, ea esse debent quæ coctioni opitulantur. & hoc modo Hippocr. auctoritas erit extra propositum. Vel, si forte eius auctoritas de principio vniuersali morborum esset intelligenda, quod expressè negamus; dicendum erit, Hippocratem prohibere purgationem, quibus inter initia morborum vrinæ fuerint tenues, hoc est, in quibus summa inest cruditas. & hoc modo illud exponit Galenus in cõmento sequentis textus, in quibus morbis neque ipse in morborum principiis purgans medicamentum exhiberem. Fiunt namque hi ex crassis, frigidis, ac lentis humoribus: quales sunt suapte natura pituita, & nigra bilis, in quibus semper oportet coctionem expectare, velut tenues si fuerint, & aquosi, inter initia euacuandi sunt, decreto Galeni libro, Quos purgare conueniat, &c. etsi supra retulimus hos quoque concoquendos, ac præparandos quodammodo esse, cum in aliqua parte fuerint firmati, illud profecto intelligendum erit, ut ipsa natura valeat eas concoquere, ac euacuare: secus autem ubi non valeat.

Tertia Hippocratis auctoritas est quarto de ratione victus in morbis acutis, quæ talis est: Quicquid autem

autem ea, quæ inflammantur, statim morborum inter initia medicamento soluere conantur, hi non solum ab intensa, inflammataque parte nihil adiungunt, cum non cedat, obsequaturque, quæ adhuc cruda est affectio, verum quoque & quæ morbo aduersa, & sana sunt, absumunt, contabesciuntque: ductoque ad imbecillitatem corpore morbus superior euadit: qui, ubi morbus vicerit, remediū nō habet. Cui auctoritati, si quispiam Hippocratis, & Galeni verba in eodem textu, ac præcedenti inspicat, facillimè respondere valet. Nam, cum Hippocrates in præcedenti textu catalogum conscripsisset omnium præter naturam affectuum, pro quorum curatione, sanguinis missione, ac purgatione indigebant, venæque sectio purganti medicamento erat preferenda: sanxissetque post sanguinis missionem purgans medicamentum porrigendum esse mox in præallegato textu subdit, Quod, si quis relicta venæ sectione, purgatione inter initia eorum morborum vtatur. ea incommoda, quæ ipse narrat, necessariò expectabit. nam in his, priusquā sanguis mittatur, purgationes interdiceret oportet, prout optimè Galen. in fine commenti illius textus declarat, hancque fuisse Hippocratis mentem in textu superius dicto asserit. Hinc in expositione eiusdem textus rectè ait, Ad sanguinis missionem propius deuenire præcipit Hippocrates, ubi vitiosi aliqui humores in partem aliquam, conflant, atque in ea acerentur. denum concludens asserit, in tota dictione Hippocratem præcipere ad sanguinis missionem esse veniendum, deinde ad medicamentum: alias prædicta incommoda, quæ ab ipso enarrantur, abique dubio agris euenient. Erit ergo hæc Hippocratis auctoritas extra chorum, cum nos purgationes inter initia non his morbis adhibendas esse, quibus præferenda est venæ sectio, ea neglecta præcipimus: sed eis, quibus aut tantum purgatio confert, aut, si vtrunque consilium competit, ipsa venæ sectio prius fuerit exhibitā. non enim nos præterit Hippocratem hoc loco, ac Galenum sexto de morbis vulgaribus præcipere, quod si vtrique auxilio quispiam indigeat, à venæ sectione incipiendum sit, idque notissimum esse retulit. Quod autem hæc fuerit mens Hippocratis, licet ex Galeni verbis in eiusdem textus expositione admodū liqueat, si quis tamen rectè inspexit eiusdem Hippocratis verba libro secundo eiusdem de Ratione victus in morbis acutis, facillè percipere valet; nam pugnātia vtrique assereret, si hic voluisset in cunctis inflammationibus inter initia medicamenta interdiceret, cum ipsemet dolore partes sub septo transverso infestante in pleuritide circa initia purgationem, & non venæ sectionem præcipiat, eodem loco secundi de Ratione victus in morbis acutis. At, si pleuritis ipsa inflammatio est succingentis membræ, cui venerit in dubiū Hippocratem vno loco in inflammationem initis purgantia medicamenta damnare, & alio loco tanquam vtilia præcipere, & ita pugnātia asserere: Quod, si simpliciter de cunctis inflammationibus Hippocrates sermonem protulisset, damnassetque in earum initis purgantia medicamenta, (quod tamen pro falso habemus) quisnam negaret in eorum morborum initis, qui aut à multitudine, aut à mala qualitate dependent, eorumque causā in aliquo loco citra phlegmonem acornata ac firmata, & præsertim in quibusdam putridis ac malignis febribus, purgationes ipsas, cum

ex eis ea pericula, quæ in inflammationibus ab Hippocrate narrantur, non immineant: causā ipsa non adeò valenter inclusa, ac circumscripta, vt purgationibus omnino non assequatur, velut in inflammationibus tenaciter non detinetur: de quibus Hippocratis sermo tantum ibi est, videlicet de inflammationibus ipsis: quod autem putridus humor in vna quapiam parte citra phlegmonem contineri possit, ac veluti in foco quodam principium febris esse, patet Galeno libro II. Methodi medendi.

At quartam Hippocratis auctoritatem, quam in medium afferunt, & est aphorismus vigesimus secundus primi libri, Concocta videlicet medicari, &c. ex his, quæ supra retulimus, facilis est responsio. nam, licet Hippocrates in ea sententia purgationem præcipiat in initis morborum in quibus materia turget, tanquam in his, in quibus præcipue exhibenda sit: non tamen negat in initis aliorum quoque morborum, in quibus Medico mouere videtur, seu purgare, purgatione vti. in quibus etsi materia non turgeat, superari tamen, ac euinci ab ipsa natura non valet: immo ni Medicus ei circa initia openferat, prorsus superabitur, vt patet Aphorismo vigesimo nono secundi libri. nec dictæ sententiæ sibi ipsis aduersantur, immo ambæ veritatem obtinent. nam eadem ratione, vt diximus, qua turgens materia in morborum initis euacuanda est, in quibusdam aliis morbis, in quibus eadem pericula impendent, verificari debet: in his videlicet, quos supra narrauimus, de quibus voluit quoque Hippocrates ipse sententiam ferre eodem Aphorismo vigesimo nono secundi libri: cum ibi de turgentia verbum nullum nec Hippocrates, nec Galenus in commento faciat. non sunt ergo dictæ sententiæ vna, nec sibi inuicem aduersantur, quare ambæ sempiternæ veritatis. Parem similitudinem quoque in Hippocrat. Aphorismis est inuenire. nam in eodem Aphorismo vigesimo secundo primi, Concocta medicari præcipit: at Aphorismo nono secundi libri iubet, ubi quispiam corpora purgare voluerit, ea prius præparanda esse. non est idem concoctio, & præparatio, non sibi ipsis Aphorismi isti aduersantur. quare ambæ sententiæ veræ sunt. Ad hæc non est dicendum, Hippocratem prædicto Aphorismo vigesimo secundo primi libri, quæ fieri non valent, præcipere. Cum ergo nec in morbis, qui à multitudine fiunt, nec in his, qui à mala, seu praua qualitate dependent, aut in valde periculosis locis gignuntur, natura ipsa eorum causas concoquere valeat, ni prius ab ea, qua premitur, velut sarcina quadam, purgante medicamento leuetur, quin potius succumbet, nec prorsus eosdem morbos superare valebit: consonum est in eisdem morbis Aphorismum veritatem non habere, cum dixit, Concocta medicari: nec de eisdem morbis Hippocratem voluisse proferre sententiam, sed tantum de his, quorum materia à natura ipsa concoqui ac euinci possit.

Insuper quandam afferunt Galeni auctoritatem quarto de Sanitate tuenda. quæ incipit, At si in eodem homine reliqua eadem sint, cæterum in lapso corpore sanguis bonus exiguus sit, crudi humores plurimi: huic nec sanguis mittendus, nec alui deiectio, &c. Cui responsum volo, primò Galenum eo loco non de morborum curatione, sed sponta-

nearum lassitudinum loqui, in quibus corpora nondum sensibilibus laesa sunt, nec à solitis muniis impedita: nos autem perpetuo de ipsorum morborum curatione verba facimus. Secundò quis non percipiat eam auctoritatem extra propositum esse, cum Gale. supponat in eodem homine sanguinem bonum exiguum esse, crudosque humores plurimos? quo casu nec ipse sanguinem mittere, aut purgare auderem: immo præcepto eiusdem, libro duodecimo Methodi medendi, in crudorum humorum copia præcipue cum oris ventris offensione, nec sanguinis misionem, nec purgationem præciperem, cum eas non sustineant, nec ferant. tertio quis adeò imbecillis erit ingenij, vt non percipiat Galenum per crudos humores plurimos, pituitosos voluisse intelligere: cum paulò superius dixisset, vno vocabulo appellare licere, vel crudum succum, vel pituitam, quæ ex nondum perfecto sanguine gignitur? eiusque innumera sunt particulares differentia, vt ipse retulit. Cum ergo multa copia crudorum humorum, hoc est, pituitosorum in aliquo reperitur corpore, sanguisque in eo bonus ac exiguus sit, nulli in dubium veniet nec sanguinem mittendum esse, nec alium deiciendam. at, si tennes & biliosi fuerint, inter initia euacuandi sunt, eiusdem Galeni præcepto, libro, Quos purgare oportet, &c. præcipue si eorù multitudinem, aut praua qualitate, concoqui ac euinci ab ipsa natura non valeant.

Alia auctoritas est Galeni eodem libro, Quos purgare conuenit, quæ talis est: Qui verò humores aliqua parte corporis confederunt, neque villo alio auxilio, neque medicamento prius mouendi sunt, quàm concocti fuerint. cui breuiter dicamus verum esse, quod Galenus præcipit, si humores, qui in aliqua parte fixi sunt, crassi, frigidi, ac visci fuerint: non autem, si tennes, & biliosi eorum multitudine, seu mala qualitate, aut vtroque modo infestantes, seu vere crudi appellari non possunt, velut nec propriè cocti, cum à natura non fuerint euicti. Vel clarius dicendum est, Galeni sententiam veram esse, cum Medicus certò scit naturam eos succos, qui in aliqua parte fixi sunt ac confederunt posse & valere concoquere, seu euincere: hi enim neque villo alio auxilio, neque medicamento prius mouendi sunt, quàm concocti fuerint, segregati, ac præparati, vt supra, cum de digestionem, cōcoctionem, & præparationem verba fecimus, ostensum est. At, si percipiat artificiosa quadam coniectura naturam ipsam prius succubere, quàm eos succos concoquere possit, nullus equidem verebitur eos in morborum principio purgare, Hippocratis oraculo instructus, Cum morbi inchoauit, si quid videtur mouendum, moue: tales etenim purgationes non tantum, vt isti asserunt, concoctionem non impediunt, immo ipsi opitulantur ex Galeni mente in commento prædicti aphorismi vigesimoini secundi libri. &, si naturam eo tempore non admodum euacuationi adiuuicem habemus, maius tamen ex hisce purgationibus, quibus, & quando oportet, noxiarum humorum euacuatione ægris commodum comparatur, (cum ex hoc mortem euitemus) quam incommodum ex aliquorum fortè bonorum succorum simul educatione. etsi Galenus libro primo de arte curatiua ad Glauconem in exquisita tertianæ febris curatione parum purgantia medicamenta probaret, licet & hæc quoque probet, non propter-

ea dicendum erit, purgationes eas non esse probandas in prædictorū à nobis morborum aliquo: hæc etenim febris ad summum in septem periodis præfiniri solet: causam quæ eius natura ipsa, præsertim si à Medico parum fuerit adiuta, facile & concoquere & separare, ac expellere potest. quorum neutrum perficere valet in prædictis morbis, si ea, circa eorum initia, cum oportet, purgante medicamento non exoneretur. At mox obiciunt dicentes, si non tantum in morbis, in quibus materia turget, verum & in his, qui ex multitudine, aut mala qualitate, aut in loco aliquo satis periculoso fiunt, vtendum sit circa initia medicinis purgantibus: non raro, vt Hippocrates præcipit aphorismo vigesimo quarto primi libri, sed crebro eis vti debemus, cum sæpissimè hi morbi gignantur. Dicimus nos raro, immo quàm rarissime in principiis morborum acutorum eis medicamentis purgantibus vti debere, quæ tempore Hippocr. in vñ erant: cum ea valde calida existentia, propterea febrem augerent. hæc enim causam reddit Galenus in commento prædicti Aphorismi, cur raro vtendum sit in principiis acutorum morborum medicamentis purgantibus. At, si talia reperiantur, vt, præter id quod febrem non augeant, scilicet purgant: vt sunt nonnulla nostris temporibus approbata ac experta, de quibus supra mentionem fecimus: nescio cur eis vtendum non sit in his acutis morbis, quos supra narrauimus, cum tale nocumentum non inferunt. vana est ergo hæc eorum ratio.

Alia ratio est, quòd medicamentum materiam diminues, cum imbecille admodum sit, atque adeo crudis humoribus, ac copiosis existentibus, eis præualere non possit: aliàs à debiliore in fortius hieret actio, quod naturæ impossibile est, ideòque illos tantum mouet, & non educit. Cui dicendū erit nos non adeò imbecille medicamentū purgans in morborū initiis probare, vt aduersus copiosos humores præualere non possit: verum adeò valens sit, vt humoribus ipsis præualere possit, ac eorum partem aliquam purgare. nec adeo crudis ac copiosis succis existentibus illud præcipimus, cum hi, vt diximus perpetuo, prius concoquendi, & præparandi, ac demum purgandi sunt: verum in his crudis ac copiosis humoribus inter initia illa probamus, qui non verè crudi, sed nondum euicti ab ipsa natura sunt, & improprie crudi appellari merentur: vt est ipsa flaua, seu pallidabilis. nec dicendum erit aduersus eos quoque, si copiosi sint, medicamentum præualere non posse, nam, vt asseruimus, licet hoc medicamentum minoratum ac diminuens esse debeat tamen artificiosa quadam coniectura tanta quantitas adhibenda erit, quanta possit aduersus eos humores præualere, ac eorum partem aliquam educere, eam videlicet quam promptius & expeditius educere valet: cum non æqualiter, nec eodem tempore in totam redundantis humoris molem agat. quod quidem medicamentum materiam diminuens, vtero gerentibus, si febre corripiantur ex vitiosis succis, Galenus in Commento aphorismi 55. libri 5. approbare cuique liquet. Insuper medicamentū ipsum purgans efficacius ac valentius est, vt trahatur, quàm trahatur. aptiora enim, ac ad hoc efficaciora sunt purgantia medicamenta, auctoritate Galeni 3. de Simplicium medicamentorum facultatibus. &, cum ait, esse impossibile, vt à debiliore in fortius fiat actio, miror equidem tantum virum cum

cap. 8. cum Galenus 3. de Simplicium medicamentorum facultatibus velit, quod minus calidum à magis calido calidius euadat, & quod magis calidum à minus calido contra afficiatur. & libro 3. de Temperamentis, ait acutissimum ferrum manifestè obtusius fieri, si toto die ac nocte mollissimam ceram incidat: ut quod patiat ab ipsa cera agit igitur id quod debilius est in id quod fortius, Galeno auctore in prædictis locis.

Alia eorum ratio est, quod si, cum crudi adhuc sunt humores, eos purgatione dimouere tentes: nihil auxilij à natura expectes: cum ipsa post concoctionem secernat, ac post secretionem excernat, ut patet Galeno in commento Aphorismi vigesimisecondi primi & quarti libri. Cui rationi ex prædictis responsio patet: nam, licet parum admodum ipsam naturam adminiculantem habemus, cum non nisi irritata à purgante medicamento auxilietur: tamen ex horum humorum purgatione in prædictis morbis, ubi oportet, maius sequitur commodum, cum mortem euitemus, (quæ quidem ea neglecta euitari non posset) quam incommodum: quia à natura parum, aut nihil auxilietur, seu quia quorundam forte bonorum humorum simul cum eis educatione fiat.

Insuper asserit aliam noxam ad huiusmodi purgationes necessariò sequi: cum indicationes, concoctionesque ab eis impediuntur, cæteraque naturæ auxilia tollantur: illudque probare tentant auctoritate Hippo. quarto de Ratione victus in morbis acutis. Cui pariter ex prædictis liquet responsio: nam eo tempore purgationes iudicia ac concoctiones perturbant, quo natura ipsa maximè concoctioni vacat, ac iudicia tentat, cum in initiis morborum nec iudicia, nec perfectæ concoctiones ab ipsa natura fiant, ea à purgantibus medicamentis perturbari, ac impediri non possunt: quinimo valde opitulatur, dicente Galen. in commento Aphorismi vigesimisecondi primi libri: ut concoctiones citius eueniant, melius est circa principia euacuare: quo minorem iam factam materiam facilius possit natura concoquere. morbo autem consistente, cum iam natura concoquit, superfluum est euacuare, quæ de re valde absurdum est, ac Galeni dictis maxime pugnat, dicere purgationes in morborum initiis, cum medico videtur, concoctiones, ac indicationes impedire: & si Galen. in commento præallegati textus quarti de Ratione victus in morbis acutis dicat, Purgationes contrarias existere concoctioni humorum, intelligendum est, si propinentur eo tempore, quo natura maximè concoctioni vacat. id autem est transacto vniuersali principio: nam eo tempore ab his motionibus, quæ à pharmaco fiunt cessare debemus, præsertim in summo vigore: cum corpus vehementer mouentes frangant, exemplo assumpti atque deuorati in ventrem alimentum, quod ut optimè concoquatur, à cæteris motionibus cessare corpus debet, ut soli concoctioni vacet: & si imbecillitas fuerit facultas concoquendi, eo tempore aliquo externo auxilio iuuanda est, ut Galenus eodem loco præcipit. Vel dictum Gal. veritatem habet in morbis, in quibus summa inest cruditas, ut ipse exponit in commento præallegati textus: in quibus nec ipsi, nisi post concoctionem ac præparationem, purgationem probamus: cum fiant hi ex frigidis, crasis, ac lentis humoribus, ut diximus. At, si quis aliter eius dicta exponere tentabit, cum

in commento Aphorismi vigesimisecondi primi libri contrarium sentiat, in eius dictis pugnantiam soluat Apollo: quanquã Gal. dicta aliter intelligere, seu exponere deprauati sensus ac intellectus sit.

Aliam quandam rationem in medium afferunt, quæ talis est, Si in initiis febrium purgantia medicamenta exhibentur, aut febres ipsæ sunt diutinae, aut acutæ: si diutine per concoctionem, aut per abscissum finiunt. quare non medicamentis purgantibus, præcipuè in initiis, curari debent. Si acutæ, licet excretionibus finiant, illud tamen multis modis esse poterit: aut sanguinis è naribus fluore, aut sudoribus, vel vomitibus: pauca verò sunt, quæ per ventris solutionem iudicantur. cum itaque raro natura, in febribus & acutis aliis morbis, ventris deiectionem efficiat pro eorum curatione: raro etiam hanc ipsam purgantibus medicamentis medicus procuret. quæ de re noxium est febres ferè omnes alui deiectionibus per sanare velle. hæc ipsi. At nos facillimè respondemus, asserentes in principiis diutinarum febrium nunquam uti debere medicamentis purgantibus, ut sæpius diximus. In acutis verò, in quibus aut multitudo, aut mala qualitas, vel locus instat, & si natura per alui excretionem eas non finire debeat, tamen vtendum esse medicamentis purgantibus: eo magis, si soluenda erit febris ipsa per alui deiectionem, nam, licet iudiciu per alias corporis partes futurum sit, ut illud celerius, ac promptius ab ipsa natura fiat eo tempore quo decet, optimum erit ipsam exonerare, illudque non nisi in principiis, alleuata enim natura ipsa, valentius poterit per quancunque viam iudicia procurare: quæ tamen nunquam in morborum initiis criticè procuret. Nec nos per hæc medicamenta purgantia omnino febres ipsas perfectè per sanare intendimus, sed naturam ipsam, ut retulimus, per ea alleuare: quod magis possit, ac vehementius causam morbi aggredi, eamque superare, ac per quancunque regionem sibi magis conuenientem euacuare. Impedirentur autem indicationes ex alui deiectione per purgans medicamentum, si eo tempore, quo natura iudicat propinaretur, absit tamen, ut illud præcipiamus: scimus enim hoc Hippo. sententiis aduersari Aphorismi 20, & 21. primi libri. procuramus autem præcipuè ventris deiectionem: cum hæc vniuersalior sit, ac expeditius in cunctis talibus, salubriusque à nobis perfici queat. Quod verò de febre pestilentiali asserunt, cauendum videlicet esse, ne per alui medicus euacuet, quod is motus naturæ instituto ex diametro pugnet, utpote quæ venenatos humores non per aluum, sed per cutem potius excernere studet: quapropter medicus motum hunc per ea, quæ sudorem eliciunt, adiuuabit, & non per alui deiectionem: eadem quidem via refellitur, nam, licet quo tempore natura in febre pestilentiali per cutem excernere studet, medicus per eandem viam adiuuare iubet, illud tamen efficiendum erit eo tempore, quo natura criticè expellit. Illud autem esse non poterit ante secretionem, ac concoctionem. at neutrum istorum in earum initiis natura ipsa criticè perficere tentat, teste Galen. in comment. 22. aphorismi, quarti libri: ubi habet, Quod, quando aliquis incipit morbus, si quid excernitur, nihil tunc excernitur naturæ ratione, sed sunt omnia hæc casus, præter naturam earum, quæ sunt in corpore dispositionem. quo enim in tempore à causis morbum facientibus natura grauatur, adest au-

tem cruditas humorum: tunc aliquid bene euacuari est impossibile. hæc ille. purgationes ergo in initii febrium pestilentialium exhibitæ non tantum naturæ opus non distrahant, atque impediunt, immo eâ summopere adiuvant: cum nec ipsa eo tempore ad partes cutis expellat. & si expellit, illud erit symptomatis ratione, & propterea purgationem non impediet: neque tunc per eam viâ iuuanda est, cum in medicationib. talia educere oporteat, qualia sponte prodeuntia vitia: quæ verò cõtrario modo prodeunt, cohibere oporteat. Hippoc. decreto, secundo Aphorif. quarti libri. Proinde in eis quoque febribus, in quibus crisis omnino ad partes cutis expectanda est, velut in his affectibus quos Medicorû vulgus variolas, & morbillos appellat, circa initia, priusquam apparere cõperint, si admodum multa, vel vitiosa materia videatur, vt à natura ipsa superari, ac euinci non possit, cunctis purgationi cõsentientibus purgare medicamento audacter cenfeo eorum aliquo, quæ supra approbauimus, cum ex eo non modò nullum sequetur incommodum, immo natura ipsa exonerata promptius & expeditius crin aggredietur & perficiet. Sed statim instabunt, si naturam in morborum initis aliquid bene euacuare est impossibile, ergo & Medicum. Huic autem responsum sit, quod, licet natura id eo tempore critice non tentet: tamen, cum Medicus sit eius auxiliator: vt ea suo congruo tempore possit perfectè operari, in morborum initis exonerare debet: illudque non nisi purgante medicamẽto. minorata enim materia, facilius suo tempore poterit ipsa natura & concoquere & expellere, in his videlicet morbis in quibus oportet.

Ex quibus, studiosi iuuenes, liquet quanti sint roboris & momenti auctoritates, rationesque quibus hi eruditissimi viri suam hæresin tueri conantur, in morborum videlicet initis purgantia medicamenta non esse probanda; ni materia turgeat. patet insuper, quàm perpetuæ veritatis existat, ac quibus validissimis auctoritatibus & rationibus nostra opinio firmata sit, quod scilicet non tantum vitiliter in initis morborum, cum materia turget, medicamentis purgantibus vtendum sit, verum & in quibusdam, in quibus vel multitudo, vel mala qualitas, vel locus vrgeat: pariter & in maximis doloribus, præcipuè ventriculi & intestinorum, qui euacuatione per purgationem indigent, priusquam robur viriû dissoluatur. in multitudine siquidẽ, quod ea purgante medicamento minoranda sit, patet ex Galeni mente in commento Aphorifini 29. secundi libri. nec valet quicquam, cum dicunt, de turgẽtia ibi Galenum loqui, cum de ea ne verbum quidem vnum proferat. idem & quarto methodi med.

cap. 6 At mala qualitate vrgente, vt in pestilentis videre licet, quod purgationibus vtendum sit, patet Galeno l. de Differentiis febrium. vbi habet, At in quibus superfluitates redundabant, hæc purgationibus sanabamus. & libro 9. methodi medendi talia profert verba, Si igitur cum viribus imbecillis corruptela incidit, vti que quod affectus remediũ est, id cum virtutis custodia pugnat. Siquidem affectus vacuandum esse præcipit, idque vel vena incisa, vel purgatione. harum autem neutram ferent imbecillæ vires. quoniam igitur in omnibus eiusmodi repugnantiis incerta succurrendi ratio est, aliàs infanabilis omnino affectus relinquetur, aliàs spatio & agrẽ, idque si magnum nactus sit Medicum. sanari

poterit; oportet nanque, vbi indicationes ita sibi ipsis aduersantur, & paulatim, quod vitiosus est, euacuare, & paulatim, quod salubre est, pro eo reponere. vocant Medici eiusmodi vitiosi succi curationem Græcè epicrasin. Quid clarius, quod in corruptela humorum, cum viribus imbecillis præcipuè paulatim quod vitiosum est, euacuare Galen. præcipit; ea de re nulli in dubium venire debet in humorum corruptela circa initia minorante medicamento vt posse, prout Gale. hic iubet: etiam si vires imbecilles fuerint. & quarto de Sanit. tuenda, hoc idem præcipit sub his verbis: Sin vires imbecilliores dehortantur, sanguis mittendus haudquaquã est, sed deiectione mediocris adhibenda. & Paulus libro 3. de Arte medendi. cap. 1. redundantibus vitiosis succis, pro alopecie cura iubet vt euacuatione primitus, quæ medicamentis purgantibus fit, Galenũ sectatus, qui hoc idem iussit libro primo de Compositione medicamentorum secundum locos. Quod autẽ locus possit adeo vrgerẽ, vt circa initia medico vtendum sit purgante medicamento, patet ex Hippocrate tum secundo tum quarto de Ratione victus in morbis acutis; cum de cura pleuritidis verba facit. idẽque Galenus asserit in commento prædicti textus 2. de Ratione victus, cum videlicet febris vehemens non fuerit, hominisque naturam noueris, ad medicamenti purgantis potum te conferes, si dolor sub thorace fuerit, valdeque infestauerit. Et licet in hac purgatione, cum loco redundantia quoque humorum de euacuatione indicet, præcipuè tamen ex loco purgationem necessariam esse Hippocratis indicationẽ sumit. At, in si pleuritide partes sub septo transuerso infestante, adeo locus vrgeat, vt in initio medicamento purgante vtendum sit, eò magis vrgebit, si materia in loco quopiam magis principe detineatur, vt in corde, cerebro, seu iecinore: eaque non venæ sectione, sed purgante medicamento vacuanda sit. Insuper, quod maximus dolor, præcipuè circa vias cõmunes interdum adeo vrgerẽ possit, quod purgatione inter initia vtendum sit, non tantum diminuentẽ vt in prædictis, sed valentiori, patet Galeno in commento 23. Aphorifm. primi libri, & libro 2. de Ratione victus in morbis acutis. Quimò nec in his tantum doloribus, verum etiam & aliis interdum inter initia purgatione vt debemus velut in capitis dolore præcipit Paulus libro tertio cap. 4. sub his verbis: Quod, si modum qualitas potius transilerit, purgatorio vtamur medicamento. & idem Galenus 3. de Morbis vulgaribus commẽt. 3. quamprimum hominem vacuare iubet, si dolore afficiatur ex plenitudine genito: quam vacuationẽ, aut per ventrem, aut per venæ sectionem eo casu fieri præcipit libro secundo de Ratione victus in morbis acutis in principio. Non immeritò ergo tum hisce rationibus, ac auctoritatibus, tum aliis superius annotatis in hanc promoti fuimus veritatẽ, asserereque ausi sumus, in aliis plerisque præter naturam affectibus circa eorum initia, & si materia non turgeat, purgantibus medicamentis vitiliter vtendum esse, eis præcipuè quæ supra notauimus. Quapropter non video, quin magnopere extollam saluberrimum vsum, quem nostris temporis eruditissimi medici Neapolitani quotidie exercent, medicamenta purgantia, ea præcipuè quæ supra approbauimus, adhibentes non tantum in initis morborum, in quibus materia turget, verum & in

rum & in aliis, in quibus multitudo, mala qualitas, aut locus vrget: pariterque in maximis doloribus, qui curari per purgationem debent. illudque peculiariter obseruant in initiis acutarum, putridarumque febrium: quæ à multitudine, aut mala qualitate humorum fiunt (dico autem ab ea multitudine, vt supra retulimus, quæ per purgationem rescindenda est) adeoque in his nullum obseruant ægrotis incommodum, vt perpetuò ferè maximam vtilitatem ipsis comparent. Illud tamen tacere non possum, quin improbem quòd nonnulli eorum, iuniorum præcipue, in eisdem medicamentis purgantibus in initiis morborum adhibendis, perpetuò quantum obseruant diem: cum neque inter morbi initia aliquod remediorum huiusmodi æ-

gris adiungere oporteat, desumpto à numero dierum scopo. Qua de re Galenus quarto de Ratione victus in morbis acutis, & prima interdum die, & secunda, & quarta, interdum quinta, & nō in quarta solū, quomodo isti obseruant, medicamenta dedisse asserit. Cū ergo in principiis morborum purgantia medicamenta exhibenda sint à supradictorum aliquo impulso, non perpetuò quartus dies obseruandus erit: cū id à Galen. damnetur: sed, si possibile est, in prima, vel in secūda die, prout decretum reliquit idem Gale. in commento Aphorism. 24. primi libri, quòd si id possibile nō erit, in quarta, vel in quinta die, præcepto eiusdem in loco superius citato tribuendum erit, dummodò vniuersale morbi principium adhuc præfinitum non sit.



DONATI ANTONII

AB ALTOMARI MEDICI AC

PHILOSOPHI NEAPOLITANI, DE

SEDIMENTO IN VRINIS

TRACTATVS,

AD IOANNEM FILIUM.



VM nonnullos in-
spexerim non modò
iuniores, verū etiā
veteres medicos post
Galenum variè de v-
rinarum sedimentis
conscriptisse, quorū
ne vllus quidem vi-
sus est hucusque (vt
mea fert opinio) Hip-
pocratis, ac Galeni
sententiam percepisse: & tu quoque non semel dun-
taxat, sed sapius hortatus es, vt meam de eis sen-
tentiam conscriberem, ob id non ab re visum fuit,
quicquid cum eisdem de hac re sentiam, paruo hoc
in tractatu, & quoad potuerim succinctè pertra-
ctare: potissimū cum hæc disceptatio non minus
perutilis, quàm necessaria sit tibi, cæterisque neo-
tericis nostri temporis medicis: etenim nedum in
sanis corporibus, verū etiam & in morbis ipsis
præsertim acutis cum febre, ac reliquis quibuscun-
que febribus, quæ ex putrescentibus succis gene-
rantur assidue vrinas obseruantes de eis, ac earum
sedimento loquuntur, atque bonam, aut malam
coctionem significare fatentur, quid sedimētum sit,
ac quomodo generetur cū in sanis, tum in ægris
fortasse non intelligentes. Cum itaque & valde vi-
tilis, ac non minus necessaria sit medicis ipsis sedi-
mentorum notitia tam pro sanitatis conseruatione,
quàm pro morborum præsertim acutorum prog-
nostico, ac curatione: quinimmo tanta est vis si-
gnorum ab vrina in morbis acutis, vt & solis ipsis
credendum sit, vt liquet sexto de Morbis vulgari-
bus: Idcirco volentes de sedimento verba facere,

quoniam simul cum vrina excernitur, nec citra ip-
sam conspiciere, ac de eo quicquam exactè pro-
ferre valemus, vt eiusdem exquisita habeatur noti-
tia, primū quid sit vrina, & quomodo generetur,
ac secernatur, ostendemus: deinceps quid per sedi-
mentum intelligendum, ac quid sit, quis modus ge-
nerationis eius, quæue causæ, ac quo loco gignatur
tum in sanis, tum in ægris declarabimus. Quòd ve-
rò vrina (quam Græci *σπῆρ* appellant) serum sit hu-
morum in venis contentorum Hippocr. auctori-
tate, Galenus libro 3. de Morbis vulgarib. scriptum
reliquit: quemadmodum quòd ea, vt excrementum
aceruetur in venis & arteriis, quale in lacte concre-
to serum, vt ab eodem Galeno 1. de Sanitate tuen-
da decretum est: quod deinde renes à sanguine se-
cernentes ac vesicam ipsam transmittunt. Cū pri-
mū verò alimentum in chylum à ventriculo im-
mutatum est, atque concoctum, per venas à iecino-
re ortas venæ portæ dictæ ramo, ex eodem ventri-
culo ad iecur deducitur. vtiur nāque iecur eisdem
venis veluti manibus quibusdam, quæ ex ventricu-
lo ei cibum afferant, vt 5. de Locis affect. scriptum
est: eūque non solum attrahūt, sed ipsi quodam-
modo hepātī præparant: quippe, cū natura sint
eisdem assimilēs, & primum germen ex illo ducāt,
vt liquet 4. de Vsu partium, cūque iecur id nutri-
mentum susceperit ab eisdem venis veluti famulis
quibusdam quodammodo præparatum, & veluti
rudem quandam delineationem, obscurāque san-
guinis speciem referens: eidem postremum indu-
cit ornatum ad sanguinis exacti generationem:
quo tempore distributus à ventriculo ad ipsum
ζυλός, à visceris caliditate, veluti vinum musteum,
feruet, concoquitur, ac alteratur in sanguinis boni

generationem. in qua ebullitione excrementum, quod in ipso reperitur, feculentum ac crassum subfidet: Innatet verò, quod tenue est, & leue. Quibus discernendis natura instrumenta præparauit: Splenem videlicet, qui crassum & limosum attraheret: vesicam verò bilis, quæ leue & flauum exciperet. Postquam verò qui apparatur in hepate chylus, hoc est, succus, ad animalis nutrimentum, prædicta duo excrementa deposuit, & ab innata iecoris caliditate coctionem exactam est adeptus, ruber iam, & purus sursum ad gibbas eiusdem iecinoris partes ascendit. excipit autem ipsum illic vena quædam maxima ex gibbis eiusdem hepatis enata, caua vena appellata: quæ ad utranque animalis partem fertur, superiorem simul & inferiorem. diceret sane ipsam esse ceu aqueductum quendam plenum sanguine, riuos quamplurimos habentem magnos & paruos, in omnes animalis particulas distributos. In qua etiam vena adhuc humore quodam tenui & aquoso plenus est sanguis: etenim neque ex ventriculo in venas commodè transsumi poterat chylus iam ex cibis factus, neque facile pertransire venas, quæ sunt in hepate & multæ & angustæ, nisi tenuis quædam & aquosa humiditas tanquam vehiculum fuisset ei admixta. hunc etenim vsum præstat animalibus aqua, Galen. teste 4. de Vsu partium. siquidem ex ea nulla particula nutriri potest: neque distribui ex ventre, quod nutriturum est, poterat, nisi deductum fuisset à quopiam ita liquido. Quæ de re non absque ratione Hippo. humorem hunc tenuem & aquosum *εχρημα νεοφης* nuncupauit, hoc est, vehiculum nutriti, simul cum appellatione vsum quoque eius ostendens. Cum verò tennes hi, & serosi humores suo functi fuerint officio: nec amplius oportebat in corpore eos permanere, tanquam onus alienum venis futuros: non enim egebat amplius sanguis ipse sanè multo hoc vehiculo, ut qui tum per amplas vias illinc feratur, tum fluxilis magis à natura redditus sit primum ab hepatis, deinde cordis calore: proinde renes à natura fabricati fuere ad eorum attractionem, ac sanguinis ab eis expurgationem, utrinque ipsi cauæ venæ adiacentes paulò infra iecur. Attrahunt autem humorem hunc per ampla quædam orificia, per quæ neque purus, neque syncerus trahitur serosus hic humor, sed alterius cuiusdam diuersi generis admixtione adulteratus, sanguinis videlicet humidioris & tenuioris existentis, ac ipsius flauæ bilis: quæ, si non admodum crassa fuerit, cum vrinis etiam ad vesicam permeat. at sanguis cum eodem seroso humore permixtus, ubi ad renes peruenit, ipsorum carni aspergitur instar fœcis cuiusdam, & inde paulatim vaporis modo in totam ipsam dispergitur, adhærescit, vnitur, atque demum alimentum fit renibus. & propterea, ne simul cum vrinis quemadmodum tenue, biliosum excrementum, sanguis hic humidior, ac tenuior existens è renibus elaboretur, densum fuisse eorum corpus præstitit, Galeno teste 5. de Vsu partium, Trahunt itaque renes serosum hoc, ac tenue excrementum à vasculis ipsis simul cum humidiori ac tenuiori sanguine permixtum, tanquam eorum proprio ac familiari nutrimento: qui cum ad renes (ut dictum est) peruenerit; sanguis pro eorum nutrimento detentus per totam eorum substantiam dispergitur. At serosus hic humor tenuis, virenum à sanguine segregatus per meatus quosdam prælongos ac fortes, (*επνθήρας*

Græci appellant) ad vesicam delegatur. quo fit ut vrinæ (ut inquit Galenus eodem libro 5. de Vsu partium.) vi renum à sanguine segregentur, & illinc per *επνθήρας* iam dictos ad vesicam emittantur, indeque excernantur quo tempore ratio ipsa iusserit. Verum, licet, cum primum sanguis in cauam venam assumitur, confectum per riuulos quosdam ab eadem ortos, satis amplios existentes, à dicto tenui ac seroso humore vi attractricis facultatis renum, ad quos inferuntur, expurgetur propter eas, quas assignauimus, causas: tamen non nihil etiam illius retinetur, quò reliquis quoque sanguis non modò per venas in omnes corporis partes peruenientes traducatur, verum etiam per arterias, media eadem caua vena, quæ sursum ascendens ad dextrum cordis ventriculum inseritur. Quapropter renes ipsi non solas purgant venas ab eo excremento simul cum tenuiori sanguine ipsum attrahentes, sed arterias quoque. alias (ut inquit Galen. 5. de Vsu partium aduersus Erasistratum) non conueniebat arterias renibus insertas magnitudine fuisse venis æquales ad cavitatem eorum diuisas haud secus ac venas. Propterea itaque quòd arterias adeo magnas, ac venas natura renibus inseruerit: causam nullam dicere poterimus, ut inquit Galenus citato loco, nisi quòd ipsi serum sanguinis omne non modò ex venis, verum etiam ex arteriis per vniuersum corpus distributis media eorum attractrice facultate expurgant. Quæ de re idem Galenus primo de de Sanitate tuenda, (ut diximus) non ab re scriptum reliquit hoc excrementum serosum in venis & arteriis aceruari: quale in lacte concreto serum: quod deinceps renes ipsi à sanguine secernentes, ad vesicam transmittunt. nam vi renum à sanguine segregatur; cum ex venis veniat, in renibusque percoletur vrina, ac in vesica aggregetur, eodem Galeno auctore commento Aphorismi 77. 4. libri. & propterea eorum duntaxat humorum, qui in vasculis continentur, nota est vrina: neque eorum vllū planè nec manifestum, nec euident signum habemus præter solam vrinam, ut idem Galenus quarto de Sanit. tuend. faceret, quanquam ex accidenti indicia quoque esse possint vrinæ aliarum dispositionum, ut liquet secundo Prognostico. & tertio de morbis vulgaribus, com. 3. Quapropter vrinæ semper inspicendæ sunt etiam in ventris, thoracis, pulmonis, ac neruorum affectibus: nam bonæ si apparent, multum valent ad salutem: contrè, si prauæ, amplificanc simul ægri periculum, ex sententia eiusdem Galeni citato libro tertio de morbis vulgaribus, com. secundo. Cæterum anima duertere oportet quòd, licet renes ipsi assidue iam dictum excrementum ex vniuersis cum arteriis, tum venis attrahant; non tamen adeo expurgare ab eo sanguinem valent, ut nihil eius super sit, ita vt, cum primum è vasculis excidit sanguis, ac singulis animalis particulis apponitur, syncerus fuerit, & omnino ab hoc seroso excremento (quod pro vehiculo ei permiscetur) expurgatus, sed simul cum eodem sanguine nunc functum officio humidum tenueque superest aliquod, quale nimirum serosum illud iam dictum, quod ex vasculis, id est, venis & arteriis, in vesicam defluit, ex sententia Galeni citato primo libro de Sanitate tuenda. Huic excremento nullus certus à natura præscriptus meatus est, expellitur tamen facile partim in speciem halitus ab insito calore solutus, partim violèto motu confectum erumpens.

pens. appellat verò, quòd ita excernitur, sudorem. & hæc est illa pars vna alimenti, velut serosa & humida, quæ ipsi etiam gratia distributionis admiscetur: cum primum alimentum singulis animalis partibus apponitur, ut liquet comment. Aphorif. 15. 3. lib. Omnem etenim qualitatis alimenti mutationem alterum crassius, alterum tenuius excrementum sequitur: quæ etiam per vniuersum corpus semper perueniunt, ut tertio Methodi medendi scriptum est. & propterea qualiscunque fuerit in corpore redundans succus, (ut inquit Galen. quarto de cap. 3 Sanitate tuenda) tale necesse est vt appareat serum. cap. 4 ac sudor quidem succorum, qui in vniuerso corpore abundant, nota est: vrina verò eorum tantum, qui in vasis continentur. Eadem itaque est materia sudoris & vrinæ, serosa siquidem alimenti pars. Verum, dum intra vasa consistit, à renibus segregata, vrina appellatur: cum à vasis simul cum sanguine excidit, qui cunctas animalis particulas nutrit, sudor nuncupatur, si in halitum non fuerit à calore soluta, sed per exiguos corporeæ molis ac cutis meatus excernatur. Eiusdem quoque generis existit tenue illud excrementum, quod in cavis vlceribus semper colligitur & à Græcis *ἰσχυρὸν* appellatur, à Latinis sanies dicitur. ex quo cum vlcus semper humidum reddatur, nec tempus vllum erit, quo exiccantibus non indigeat medicamentis ex Galeni sententia eodem 3. Methodi medendi. Hæc quoad ea, quæ de vrina pertractare polliciti sumus: conducunt etenim non parum ad eum, quem intendimus de sedimentis tractatum. Reliqua verò, quæ faciunt pro exacta vrinarum notitia tam consistentiæ, quam coloris eandem, à veteribus Græcis, ac iunioribus quibusdam Latinis, qui de eisdem fusiusscripserunt, petas, potissimum à Leone Rhogano nostro ætatis iuvene eruditissimo, & Hippoc. & Galen. doctrinæ æmulator laborioso.

CAPVT II.

Consueuerunt Hippocr. ac Galen. ea, quæ crassiora ac corpulentiora in vrinis consistunt & nos contenta vocamus, communi appellatione *πυρρὰ* proprie verò pro ratione diuersitatis loci, in quo permanent, diuersimodè appellare. Nam, si in fundo vasis hoc resideat, ab eis *καθῶς αἰεὶ* nuncupatur: Latini sedimentum appellant. Si verò desuper in vrina supernaret: ab eisdem *ἐπιφάνων* dicitur, à Latinis nebula, seu nubecula. At, si neque in summis eius, neque in fundo vasis, sed in media sede sublime vel exquisitè medium, vel deorsum potius quam sursum existat, id consuevit Galen. *ἐν μέσῳ* nominare, vt secundo prognostico. ab eodem scriptum est: Latine autem sublimamentum, aut suspensum dicitur, quanquam Hippocr. eodem modo consueuerit nominare sublimamentum, seu suspensum, & nebulam, seu nubeculam, vt idem Galenus fatetur citato libro secundo progn. licet alicubi ipse Hippocr. sublimamentum genituræ simile dixerit. ita vt è duobus alterum sit: aut vt generalioris rei nomen existat *ἐν μέσῳ* apud ipsum, sectionem habentis in nubeculam, & id, quod genituræ simile est: aut nunquam nubecula ab eo sublimamentum appellatur, vt liquet ab eodem Galeno ibidem. Hanc quoque nubeculam Aphorif. 71. 4. libro *ἐν μέσῳ* vocauit. verum, quoniam hæc tam si ægris corporibus, quam sanis existentibus generentur, eundem habent ge-

nerationis modum, eandemque causam efficiem, ac materialem, & locum, vbi generantur, vt dilucidius infra patebit: secundum multitudinem, aut paucitatem, tenuitatem, ac crassitiem materiæ, ac perfectiorem, vel minus perfectam actionem causæ efficientis eorundem duntaxat dissidentia. Propterea quicquid de sedimento dicemus, de suspensio, ac nubecula subaudiendum erit. Nanque in sanis corporibus vrina nullo pacto sedimentum habebit, si tenuiter: copiosum verò, si largius: exiguum verò, si modicè viuitur. & si id quod naturæ, in sanguinis generatione, subterfugit coctionem, ab eadem exactè quodam modo euictum sit, in fundo vasis residet: si autem non ita exactè, sublimamentum aderit. At, si minus exactè, nubeculam in vrinis inspicimus. Etenim, cum à calore omnino, quod concoquitur, non superetur: id, quod humidius in eo existit, ac tenuius, in statum vertitur, qui eidem commixtus substantiæ eam subleuat, ac impedit ne sua grauitate deorsum descendat: & prout maior, vel minor quantitas ipsius flatus commixta fuerit, eò in suprema, vel media regione idem excrementum consistit. similis quoque ratio ferè est in ægris: nam sedimentum habet vrina copiosum, quoties morbus ex humoribus crudis fatigat: nullo verò modo aut omnino minimè, quoties ex biliosis. sed satis est, si habeat nebulam, aut suspensum, Galeno teste primo de Cris. & secundo prognosticorum. Pauca etenim portio humorum crassiorum ac crudorum, vbi à calore superantur, in fuliginosum vaporem vertitur: multa autem remanet crassa, quæ per vrinam excernitur. At, vbi biliosi fuerint humores redundantes, contrarium euenit propter causam contrariam, vt dicemus. Verum, si in vno eodemque morbo eadem contentorum differentia inspicatur, eidem causæ efficienti, quæ magis, vel minus materiam superauerit, diuersitatis causa tribuenda erit. Nam quæ minus euicta est, maiorem habebit flatuosi spiritus permixtionem, & sic in suprema parte: si mediocriter, circa mediam regionem. Si verò perfectè fuerit euicta, in infima parte, seu in fundo vasis residet. quod igitur exquisitè concoctum secretumque est, quæque ac simile, vt pote nullum habens flatum, in fundum descendit vasis vrinam continentis: quod verò permixtum est aëreo quodam, & vaporoso flatu, id subductum ab eo quod proportionale sit quantitate subducentis, minusque & magis, sursum fertur, vt secundo Prognostico. à Galeno scriptum est. Et, vt vno verbo expediam, quæ vrinis probè innatant, quantò inferius subsident, tantò magis laudantur, ex Pauli sententia cap. 13. libri secundi. Per sedimentum itaque intelligendum est id in vrina contentum, quod corpulentum existens, neque in summis eius, neque in media sede, sed in fundo vasis permanet. Hoc in corporibus sanis, de quibus primò pertractare intēdimus, nihil aliud est, quam ea alimenti pars, quæ in sanguinis generatione naturæ refugit confectionem: neque vt sanguis ab ea commutata, neque vt pus causæ præter naturam particeps, Galen. auctore primo Prognost. Verum pro notitia generationis eius, est animaduertendum primò tres fieri in corporibus nostris in tribus diuersis locis alterationes, seu concoctiones, prout sæpe sæpius in Galeni doctrina scriptum reperitur, præsertim lib. primo Prognostic. & tertio de Causis sympto. lib. de Cibis boni & mali succi.

cap. 12
com. 26

commen. 36

comment.
ult.cap. ult.
cap. 1
cap. 5
cap. 2

octauo Meth. med. ac aliis plerisque in locis: quorum prima in ventriculo perficitur, in qua cibi ad idoneum sanguini humorem commutantur: Secunda verò in iecore ac venis, in qua humor ad sanguinem transmutatur: Tertia ac vltima in singulis animalis partibus, cum alimentum ipsum singulis nutriendis partibus apponitur, agglutinatur, atque assimilatur. communis autem scopus vniuscuiusque partis, seu instrumenti alimentum alterantis ac concoquentis est, vt sibi ipsi assimilet id quod alteratur, ac ad propriam eius naturam deducat appropinquantem humorem, vt liquet ex Galeni eodem *comment. 1. Prognost. & quarto de Vsu partium.* Quapropter chylus ex ventriculo assumptus ex ipsa veluti carne iecinoris alteratur, paulatimque in illius naturam transmutatur, ac in sanguinem vertitur. Nam secundum eius carnem, quæ est proprium ipsius corpus, primum sanguinis gignendi est organum, & venarum principium. & propterea venis, quæ ad ventriculum & vniuersa intestina pertinent, inest facultas quædam sanguinis effectrix, qua succum, qui ex cibis distribuitur, eisdem in sanguinem mutare naturale est, priusquam is ad hepar perueniat, licet ea sit veluti rudis quædam delineatio, obscuramque sanguinis speciem referens. Inducit autem postremum ei ornatum ad sanguinis exacti generationem iecur ipsum, vt eodem 4. de Vsu partium scriptum est: ita, vt quicquid ad iecur peruenit alimenti, ad sanguinem immutetur, nec quicquam remaneat inalteratum omnino, atque immutatum. Verum pro diuersa alimentorum ratione, ac pro diuersitate partium alimenti quædam magis, quædam minus ad sanguinis formam immutantur. in super & quædam deteriores reliquæ alimenti, cum sanguinis formam suscipere non valeant, alterationem quandam adhuc ab eo suscipientes, in excrementorum naturam mutantur. Nam & hæ quoque partes, seu alimenti excrementa, consonum est vt alterationem quandam ab eo suscipiant, cum tota substantia alimenti, quæ ad ipsum iecur peruenit, ab ipso alteretur atque immutetur: postquam officium vniuscuiusque partis animalium (vt diximus) est ad propriam deducere naturam propinquantem humorem. Ex quibus liquet, quod, si hæ alimenti partes quæ, dum in iecinore concoctio fit, excrementorum naturam habentes, aliquam suscipiunt alterationem ac mutationem ab ipso iecinore, & non omnino immutata remanent, licet in sanguinem conuerti non valeant, quod nec reliquæ, quæ non adeo à sanguinis natura alienæ sunt, (veluti excrementa ipsa, bilis videlicet flaua, ac nigra) omnino inalterata, ac immutata permanere possunt: potissimum cum simul cum sanguine cõmixtæ, & ipsæ ad gibbam iecoris perueniant, ac cum eodem per cauam venam distribuuntur. Quapropter toto (vt inquit) cælo aberrant, qui vrinae sedimentum dixerunt esse particulam illam, quæ ex massa sanguinaria assumpta in venis, sua in specie manens euasit omnino insanguificata. impossibile nanque est vt eadem per venas permeans ad iecur adeo à natura sanguinis sit aliena, vt primò ab eis non aliquam suscipiat alterationem, & demum ab ipso iecinore, cum semper alterata ex dictis venis ab ea facultate, quam ab hepate suscipiunt, ad ipsum perueniat: ac demum in eo permanens ab eodem saltem quodammodo immutetur ac assimiletur: quamuis in verum sanguinem commutari non

valeat. & propterea quicquid in sanguinis generatione naturæ subterfugit concoctionem, dixit Galen. in vrinis subidere, addens, neque, vt sanguis, ab ea commutatum, hoc est, non adeo perfectè coctum & assimilatum, vt sanguis, & non quod omnino inalteratū ac insanguificatum (vt quispiam dixerit) permaneat: aliàs aut non alimenti, sed medicamenti omnino rationem obtineret, eius præsertim quod venenosum est, ac animalis naturam corrumpit, deleterium dictum, vt liquet. 3. de Temperamentis, saltem relatione facta ad iecur: aut omnino nulla poterit assignari causa, cur velut cætera duo excrementa in iecoris cauitate non fecernatur, sed ad gibbam cum reliquo sanguine ascendant, atque ad cauam perueniat venam; cum neque propter transita celeritatem id quoque fieri posset. Etenim, ne breuissimo tempore in hepate mansisset succus, qui ad ipsum ex ventriculo fertur, neque ipso distributionis impetu raptus celeriter totum viscus peruaderet, sed in eo diutius moraretur, vt perfectius alteraretur, transituum angustias molita est natura. & proinde venas, quæ sunt in hepate, omnium, quæ sparguntur in vniuersum corpus, tenuissimas fabricata est ex Galen. sententia, 4. de Vsu partium. Nisi quispiam temere absque vilo pudore fateatur, hanc chyli partem habere alas, & ideo velocissimè iecoris venas pertransire, ac insanguificatam permanere. Secundo animaduertendum, ac mente reuoluendum est id, quod ex Galen. sententia 3. Meth. meden. supra annotauimus, videlicet quod omnem qualitatis alimeti mutationem, alterum crassum, alterum tenuius excrementum sequitur: idque in singulis alimenti mutationibus luce clarius inspicies, exorsus ab ea, quæ in ventriculo fit: in hac etenim crassum illud excrementum (quod quidem existit veluti in tritico lapides, ac terra) fecernitur, paulatimque impellitur per omnia intestina vsque ad rectum, ac deinceps per aluum expurgatur. reliquus autem cibus humido liquori percocto iam, & prius elaborato assimilis, indigenti autem adhuc perfectiori concoctione, per tenues ac exiguas venæ portæ soboles ex ventriculo ac intestinis sursum ad hepar fertur, vt paulò antè diximus. & propterea id, quod humidum, ac tenue, & aquosum, seu serosum in eo existit, (eius sanè generis, ex quo vrina, sudorque proueniunt) fecerni haudquaquam necesse erat: præstat etenim ipsi chylo eundem, quem diximus, usum: neque enim ex ventriculo in venas commodè transumi poterat, neque facillè pertransire venas, quæ sunt in hepate, nisi tenuis quædam, & aquosa talis humiditas tanquam vehiculum fuisset ei admixta, quemadmodum supra adnotauimus ex Gal. sententia, de Vsu part. Cumque peruenit ad iecur, similem quoque iterum ipsum infert alimento purgationem, ac perfectiorem concoctionem: in hac etenim concoctione, quæ in iecore fit, aliud tenue excrementum, quale est quod florem in vino appellant: aliud crassum, quale quod fœx dicitur, etiam consequitur. attrahitur primùm à vesica, quæ iecinori subiicitur, quod leue ac flauum est, & bilis flaua appellatur; alterum verò, quod crassum graue est, à liene: & nigra bilis, fœx sanguinis, seu melancholicus succus nuncupatur, eodem Galen. auctore citato lib. 4. de Vsu part. & lib. 1. de Sanitate. Hæc sunt illa duo excrementa, quæ necessariò consequuntur ad eam alimenti mutationem, quæ

quæ in iecinore perficitur, hoc est, sanguinis generationem. Quapropter longè à veritate, ac Galen. doctrina deuiant qui in hac concoctione, hoc est, sanguinis generatione, præter iam dicta duo excrementa, quædam alia gigni consentunt, cum neque plura, neque pauciora, quàm nuper dicta duo ex Galen. reperias: neque etiam veritati consonum sit plura in hac concoctione excrementa animaduertere, quàm in reliquis. Nam & in tertia quoque alimenti alteratione, cum videlicet alimentum ipsum singulis animalis partibus apponitur ac assimilatur, similia duntaxat duo excrementa consequuntur: quorum vnum tenue existit, alterum verò crassum, vt ex eodem Galen. liquet citato lib. I. de Sanit. tuend. & commen. Aphorif. 15. 3. lib. Verùm de tenui superius verba fecimus, cum de vrina pertractauimus. Id verò, quod crassum existit, seu semicocta quæpiam reliqua alimenti, quæ assimilari nutriendæ parti nequiuit, & velut fuliginosa superfuitas est, quæ in pluribus cibis deterioribus continetur, & naturæ operationem subterfugit, vt neque assimilari corpori, quod nutritur, neque agglutinari valeat: huic nullum publicè nomen est, quod videlicet nec vulgo est cognitum: verùm eius non nihil transpiratione, seu perspiratione insensibili excernitur. & vbi expelli nequeat, ab eodem pili originem ducunt, ac sordes, quæ circa cutim semper acruantur, vt liquet ex Galen. præcatis locis. Huius quoque generis est & illud crassum excrementum, quod in cauis vlceribus semper colligitur, & sordes etiam nuncupantur, à quo sordidum vlcus redditur. & propterea nec tempus vllum est, in quo expurgantibus medicamentis non indigeat, quemadmodum & de exiccantibus supra dicebamus, ratione tenuis excrementi. quo fit, vt cauum vlcus semper exiccantia, ac expurgantia medicamenta desideret; quoniam nullum adest tempus, in quo non ambo hæc in eo colligantur excrementa ex Gal. sententia 3. Metho. med. Verùm, quoniam non exiguum quoque suscipit alterationem, seu immutationem alimentum ipsum, dum intra vasa continetur, non solum siquidem ab ea facultate, quæ à iecinore suscipiunt venæ, sed ab eorundem vasorum propria; propterea & in hac quoque alimenti immutatione, quæ est eorum propria, duo illa excrementa, quorum vnum tenue, alterum crassum existit, secerni necesse est: si Galen. sententia, quam supra annotauimus, sempiternam debeat habere veritatem. At de tenui excremento nemo veretur, quòd in eisdem vasis acruetur, & quòd venarum, & arteriarum excrementum sit, ac tale, quale in lacte concreto serum, vt ab eod. Galen., scriptum est citato lib. I. de Sanit. tuend. Idque renes facillimè ad sese trahunt simul cum tenui ac aquoso sanguine permixtum, à reliquo sanguine synceriores ac crassiores existente secernentes, ipsi videlicet eundem attrahentibus, & vasis retinentibus in seipsis crassiores sanguinem: cum primum quidem sanguis ab innata icoris caliditate coctionem exactam fuerit adeptus, ac ruber iam effectus, & à duobus excrementis purus sursum ad gibbas partes hepatis ascenderit, ac deinceps ad cauum venæ pertenerit. tunc etenim à sanguine idem serosum excrementum, tanquam suo functum officio, ac onus venarum & arteriarum existens, secernere decens erat: quanquam non nihil adhuc eiusdem remaneat intra vasa cum sanguine propter eundem vsu, vt superius dictum est.

Quamobrem putandum est non absque forti ratione Hippocr. dixisse vinam esse serum humorum in venis contentorum, & Galenum nos docuisse 5. de Simp. medic. facul. ea peculiariter & verè vinam ciere, à quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur, ac secernitur, non secus atque lac, quod coagulatur, seroso videlicet, & tenui seorsum segregato: crasso verò in sese coëunte. Siquidem quò facillimè ad se attrahant renes, quòd in sanguine aqueum, tenuèque, ac serosum est, vtrique hæc conferunt: nempe totius sanguinis primum fusio, deinde segregatio, quorum neutrum absque valido calore peragi queat. Cæterum sanguis hic rubeus, ac ab excrementis purus, quem vena caua ex gibbis iecinoris partibus excipit, etiam vbi fuerit à seroso humore expurgatus, non omnino homogeneus, ac similis existit: ita quòd singulæ alimenti partes sint à iecinoris caliditate innata æqualiter euictæ: sed quædam magis, quædam minus perfectè in sanguinis substantiam, ac colorem sunt commutata: prout magis, vel minus consentientes, ac similes fuerunt in ipsa sanguinis generatione; quæ partes alimenti minus euictæ, veluti semicocta quædam reliquæ existentes, assimilari omnino, ac perfectè in sanguinem commutari nequiuerunt: idque nò propter aliud, quàm ratione prædictæ partis alimenti, quæ suapte natura, licet quodammodo ab ea facultate, quæ sanguinem gignit, dum sanguis ipse generatur, vincatur, superetur; tamen ex ea perfectus sanguis generari non valet. Hęc, inquam, alimenti portio sic imperfectè euicta in sanguinis generatione, simul cum eo per venas ac arterias distribuitur, familiaritatem quandam, ac similitudinem cum ipso habens. quo in tempore à facultate alteratrice ipsorum vasorum propria, quæ in eorum tunicis cõsistit, ex proprio eorum temperamento orta, & non ea, quàm à iecore participant venæ, insimul cum eo sanguine, qui ab ipsis pro eorum nutrimento conficitur, assimilatur etiam quodammodo & hæc alimenti portio quandam suscipiens ab eis in colore præsertim, ac etiam substantia assimilationem. Verùm, cum in earum nutrimentum omnino verti nequeat; quoniam in sanguinis generatione non potuit omnino, ac perfectè in sanguinem commutari, sic quodammodo in colore, ac substantia tunicatum dictorum vasorum assimilata (habent enim commutatricem hanc facultatem propriam, vt liquet 6. de Hippoc. ac Pla. decret. præter eam, quæ ex iecinore ad venas prouenit) eadem tanquam superflua ac aliena, ab eorum facultate expultrice, veluti onus eorum existens, excernitur; postquam agglutinari, ac omnino assimilari pro eorum nutrimento non valuit, licet fuerit eisdem appositæ, & quodammodo (vt diximus) assimilata. Et, quoniam alia conuenientior ac magis congrua non aderat via, quàm ea quæ ad renes & vesicam tendit, ea de re, quo tempore renes excrementum illud serosum à singulis iam dictis vasis attrahunt, & ipsa quoque vasa excrementum hoc excernunt, velut onus quoque eorum existens non minus quàm tenue ac aquosum illud excrementum. quo fit, vt simul cum vrina ad vesicam descendat, ab ipsis quoque renibus tanquam superfluum quoddam expulsum. & propterea album apparet, ac in vrina subsidet, simulque cum ea excernitur sedimentum, intra vasa, & non in iecinore, in tertiâ ac nouissima concoctione

ne, & non in secunda genitum: quo tempore sanguis pro arteriarum ac venarum nutritione apponitur, agglutinatur ac assimilatur in earum propriam naturam, & non eo, quo sanguis generatur. cuius propria materia est quaedam illius semicocti alimenti portio, quae omnino in verum, ac perfectum sanguinem commutari non valuit, dum ipse generaretur. Haec nanque simul cum sanguine per venas, ac arterias permeans, (vt diximus) ab earundem caliditate innata quodammodo euicta ac assimilata, sedimenti suscipit formam, & quae ad eam consequuntur colorem scilicet ac figuram, quae prius in iecore suscipere non poterat, vt quidam falsò opinati sunt, decepti ex Galen. verbis. 1. prog. cum dicebat quòd Quantum alimenti in sanguinis generatione naturae confectionem subterfugerit, in vrinis subsidet, neque vt sanguis ab ipsa commutatum, neque in generatione, vt pus, praeter naturam causae particeps, sicut id quoque generationem obtineat, quae puri proportionem respondet: nam per haec verba Gal. noluit vrinae sedimentum generari in sanguinis generatione, quae fit in iecore, cum eius naturam subterfugerit, sed dixit id alimenti esse, quod subsidet in vrina tanquam materia: neque enim alia est materia generationis eius, quam haec. verum propriam eius generationem, ac formam, & colorem sedimentum in venis, ac arteriis suscipit. Nam propter eandem causam subsidet candidum in vrina sedimentum, (vt ipse inquit eodem loco) propter quam pus candidum efficitur. sed hoc propterea est eiusmodi, quia quodammodo solidioribus corporibus assimilatur. ergo & sedimentum propterea in vrina subsidet candidum, quia eisdem solidioribus corporibus, hoc est, tuni-
 cis venarum & arteriarum quodammodo assimilatur. etenim semicocta excrementa similia subinde sunt corporibus quae aluntur, quorum scilicet sunt
 cap. 6
 excrementa, vt liquet 6. de Hipp. & Pla. decre. Hoc itaque est illud crassum excrementum, quod in hac alimenti alteratione generatur nullam participans in eius generatione causam praeter naturam: veluti pus, & sedimentum quod in agris corporibus gignitur, vt in sequentibus suis pertractabimus. Simul itaque cum Gal. concludimus, sedimentum in vrinis sanorum nihil aliud esse quam eam alimenti partem, quae in sanguinis generatione naturae subterfugit confectionem, adeò vt perfecte in sanguinem commutari non valeat. id nanque per venas & arterias distributum, ab earundem calore innato alteratum modo quo dictum est, sedimentum efficitur, ac earundem crassum excrementum existit: quicquid alij de eius generatione sentiunt. nam, velut in reliquis animalis partibus singulis ex ipso, vnde aluntur, succo excrementum quoddam crassum nascitur ceu semicocta quaequam reliqua quae assimilari nutriendis partibus nequiverunt, vt superius adnotauimus ex Galeni sententia 1. de Sanit. tuen. ita quoque necesse est, quod in venis & arteriis ex ipso, vnde aluntur succo, eiusmodi crassum sequatur excrementum, ceu semicocta quaequam reliqua, quae omnino eisdem nutriendis partibus nequiverunt assimilari: cum non aliter, nec ex alia materia nutrimentum suscipiant, quam ceterae animalis partes: quoniam, cum haec eadem semicocta reliqua, quae assimilari nutriendis partibus nequeunt, simul cum sanguine pro earum nutrimento distributo per eadem vasa permeant, consonum

rationi existit partem quampiam in eorum nutritione similem quodammodo reddi corporibus eorundem, ac semicoctam etiam permanere, & simul cum vrinis excerni tanquam excrementum: idque non aliud est, quam quod sedimentum appellatur. Differt autem à pituita, quae simul etiam cum sanguine per vasa permeat, hoc excrementum, quod sedimentum appellamus: nam, sicut illa à Galle. veluti ex dimidio coctum alimentum 2. de Natu. facult. esse dicatur, quemadmodum & sedimentum nos esse fatemur, tamen ea alimenti pars, ex qua in sanguinis generatione pituita gignitur, consentiens magis, ac similis existit pro sanguinis perfecti generatione, quam ea, ex qua demum sedimentum oritur: & propterea illa per vteriore coctionem in sanguinem mutatur, hoc neque in sanguinem exquisitè elaboratum, neque in vasorum, nutrimentum, cum ex deteriori ac crudiori alimenti parte fuerit genitum, commutari valet. Et propterea quibus corporibus semicocta alimenti reliqua, quae perfecte in sanguinem commutari non valent, nec in alimentum venarum & arteriarum, plures fuerint, plus etiam sedimenti cum vrinis excernitur, quemadmodum in pueris ferè omnibus, & perfectam aetatem habentibus, qui otiosam vitam degunt, aut quouis alio modo pleni sunt, conspiciere licet. nam pueri ob voracitatem, & ob id quod vna ventriculi operatio non potest duobus simul sufficere, augendo scilicet & alendo, antequam in ipso sufficienter alimentum coctum sit, ipsum ad se corpus trahit. atque hinc fit, vt plurimum crudi humoris coaceruet. huius quoque concausa existit, quod à cibo ludentes profluentesque mouentur, vt liquet 1. de Cris. & 6. de Morb. vulga. Nihil enim (vt idem Galen. inquit lib. de cibis boni, & mali succi) in cibariis omnibus ad boni succi generationem tam pertinet, quam si probe in ventriculo concoquantur: namque haec & alteram, & tertiam concoctionem facilius admittunt. at, cum non probe in eo cibi concoquantur, vt in pueris propter assignatas causas, neque in secunda concoctione, quae in iecore, & venis: neque in tertia, quae singulis partibus efficitur, perfectam concoctionem admittunt. propter has itaque causas in pueris, semicocta reliqua alimenti plures superflues sunt, atque adeò vrinae eorum satis multam habent subsidentiam, quamuis eorum alteratrix facultas robustior sit, quam in ceteris aetatibus, vt liquet 2. & 3. Prognostic. & 3. de Cau. sympt. in reliquis verò plus aggregatur huius semicocti alimenti, aut propter fatietatem, aut propter desidiam vitam, vt eodem 1. de Cris. scriptum est. quemadmodum contra qui multum laborant, & pauciori cibo vescuntur, eoque facilis coctionis & boni nutrimenti, cum paucum sit, quod semicoctum relinquitur, paucum etiam habebunt in vrina sedimentum, & interim nullum, sed aut suspensum, aut nebulam. liquet insuper ex iam dictis, quod quantuncunque corpora fuerint optime constituta, & temperata victus ratione vtantur: fieri tamen nequit, vt in eorum vrinis non aliquid subsideat, aut pendeat, aut supernatet: cum perpetuo ex alimentorum natura aliquid semicocti remaneat alimenti in singulis corporibus: erit tamen in eiusmodi corporibus quantitate, & qualitate moderatum, vt 1. de Cris. & 3. art. medic. à Gal. scriptum est. quanquam in eisdem etiam corporibus, si vrina mingatur in primo tempore coctionis sanguinis, multam

1. de cris.
cap. 12

cap. 12

cap. 6
cap. 7

cap. 8

multam habebit subsidiam: si ea perfecta, minus subsidebit, ut idem Gal. inquit. nam, dum adhuc sanguis coquitur, multae superant alimentum reliquiae, quae, licet aegre coquantur, possunt tamen in toto reliquo coctionis tempore in sanguinem commutari: eadem vero perfecta, pauciores sunt, quae relinquuntur partes semicocti alimenti, ac illae duntaxat, quae omnino assimilari ac in sanguinem commutari nequiverunt propter ineptitudinem earum, ut supra adnotauimus. id quoque intelligere voluit Galenus eod. primo de crasibus per humorem, qui crudus nominatur. cum dixit: In optimis sanis corporibus, si tunc mingatur in primo tempore coctionis sanguinis, subsidiam habere albam leuem, & aequalem, sed multam, quoniam plus de humore, qui crudus nominatur, cum ea excernitur, licet coctionis sit signum exquisitum, si talis vrina colorem etiam exquisitè seruauerit.

CAPVT III.

Verum de eo sedimento, quod in agrotantium vrinis visitur, non adeo simpliciter sentiendum, nec eodem modo, quo sedimentum in sanis ipsum generari cum Galeno censemus. sed, quoniam in febribus quae sunt ex putrescentibus intra vasa humoribus, magna ex parte sedimentum animaduertimus, ac ab eo coctionis, aut cruditatis signa sumimus; hanc ob rem primò de hoc sedimento institui verba facere. Id verò nil aliud est, (ut ex Galen. colligitur primo de Differentiis febr. & 3. de Praef. ex pullibus), quam pars quaedam eiusdem putrescentis intra vasa succi, puri proportionem respondens, superante tamen natura: namque (ut ipse refert) non simpliciter hac putredo existit, sed aliquid in se continet coctionis remanente adhuc vi coquendi vasorum, à qua interim qui putrescit humor, ad talè peruenit alterationem, cum non raro etiam eueniat quòd eadem natura sit superata; quòd quidem aliud genus putredinis est. ex quorum duorum generum miscella alia tertia secundum speciem euariet, quoniam & innumera-biles miscellae modi, in eo quod magis & minus reperiuntur. de quibus duobus putredinis generibus, ac de subsidentiis eorum pertractare non intendimus, sed de eo sedimento quod fit humoribus putrescentibus intra vasa, natura tamen superante. habita namque huius notitia haud aegre etiam de reliquis haberi poterit, pro quo animaduersione dignum est, quòd licet putredinis natura (ut inquit Galenus vndecimo Methodi medendi.) sit mutatio totius putrescentis corporis substantiae ad corruptela à calido externo; tamen, dum quispiam humor putrescit, confestim duas suscipit alterationes contrarias: quarum vna est praeter naturam caloris ipsum corrumpentis, ac alienum à natura reddentis: reliqua est ab eo, qui innatus, seu secundum naturam calor existit, putrescentem humorem ad contrarium alterans, ipsum conficiens ac concoquens. At haec duae actiones, seu alterationes non semper aequales existunt, sed interim vna, interim altera actio reliquam vincit atque exuperat. Quandoque verò magis, aut minus vna reliquam superat, aut ab eadem superatur. Et propterea triplex putredinis genus in vniuersum resultat, quanquam ex tertio genere ferè innumera-biles miscellae modi reperiuntur, ut liquet eodem libro primo de Differentiis februm. cap. sexto. Caterum, quia (ut ibidem scri-

ptum est) quaecunque in abscessibus putredinis sunt differentiae, totidem in febribus, quae ex putredine accenduntur, sunt eorum, quae in vrinis apparent formae: propterea nos quando sedimentum diximus fieri superante natura; intelligere volumus ipsum fieri ab vtriusque caloribus: quoniam eius materia, putrescens humor existit: verum quòd adeo exigua sit praeter naturam caloris actio in eius generatione, quòd ipsa natura, seu calor naturalis omnino eam superauerit, atque euicerit: & propterea dissidet hoc sedimentum ab eo, quod subsidet in vrinis sanorum; quoniam in illius generatione nullo modo ingreditur praeter naturam caloris actio, ut liquet primo Prognost. velut in eo, de quo modò verba facimus ex Galeni sententia citato libro primo de Differentiis februm. cap. sexto, quo loco asseruit id, quod subsidet in vrinis, puri proportionem respondere, superante tamen natura. qua de causa talis putredo (ut ipse inquit) non simpliciter putredo existit, sed aliquid in se continet coctionis. quare sit ut, si pus praeter naturam sit causa particeps, similiter & hoc sedimentum eiusdem particeps erit. Ex quibus patet error eorum, qui tenent sedimentum hoc esse homogeneum, ac eiusdem speciei cum eo, quod in sanis generatur: namque secundum efficientem eorum causam: nam illud caloris duntaxat naturalis opus existit: hoc, licet ab eodem superante integrè extraneum fiat, tamen non adeo superatum est, ut nihil in eius generatione operetur; quamuis minima ac exigua sit eius actio. & propterea semper ad vnam speciem terminatur hoc sedimentum, vnumque suscipit colorem, odorem, ac consistentiam. quò fit ut vrina optima, quae ex tali putrescente humore, coctionem à continente vase suscipiente, perficitur, sit, quae album, leue, & aequale, & minimè foetidum sedimentum habet: pessima autem, quae in omnibus maximè contrario modo se habet: quae verò intermedia existit, quantò propius ad alteram accesserit, tantò aut melior aut deterior erit, ex Galeni sententia eodem libro primo de Differentiis februm. Cum itaque humorum putredo, quae fit in vasis, similis sit ei, quae in inflammationibus atque abscessibus accidit, aliisque collectionibus, hanc ob rem cum Galeno tenemus sedimentum hoc esse partem quandam putrescentium intra vasa succorum. nam, quemadmodum in eis ex materia putrescente, superante tamen natura sit pus, quod pars existit materiae facientis inflammationes, seu abscessus; eodem modo ex materia putrescente intra vasa, natura superante, sit id, quod in vrina subsidet, sedimentum, ut citato primo libro de Differentiis februm scriptum est. At quòd pus fiat ex tali materia putrescente, Galeni verba ostendunt Aphorismo quadragesimo septimo secundi libri, cum dixit, Pus ex sanguine ortum habet. qui semimalam, ut quispiam dixerit, habet transmutationem. nam mala simpliciter cum putrefactione fit olida: sicuti què simpliciter bona, est ipsa nutritio partium animalis. At quae pus generat, medium inter has obtinet locum, neque à solo calore extra naturam, neque à solo secundum naturam procedens: mixtum enim quodammodo ex vtriusque est calor inflammationis. Quibus ex verbis liquidò inferitur nendum sedimentum vrinae, portionem quandam esse putrescentium succorum intra vasa, verum etiam ipsum cum à calore praeter naturam, tum ab eo

E

qui secundum naturam existit procedere, veluti ipsum pus, eo tamen, qui secundum naturam est, vincente. atque iterum patefit error eorum, qui volūt hoc sedimentum esse eiusdem speciei cum eo, quod sanorum est, & quod non sit velut pars humorum. sed quādam eorum superfluitas illis cōmixta. quā quidem fuit illud ex cibis, vt ipsi fatentur, quod aut nunc, aut in prāteritis diebus refagit sanguificationem. longē etenim ac eorum chimerizata (vt quispiam dixerit) opinione à Gal. sententia, ac veritate recedunt; cum non modò differant secundum efficientem eorum causam, verumetiam & secundum materiam. neque sedimentum hoc superfluitas existit, vt ipsi fatentur, sed pars quādam putrescentis succi. nam, quemadmodum ex quadam veluti ebullitione atque exultione sanguinis, vbi is ex toto exustus fuerit, residuum eius fit pus ceu ex lignorum exultione cinis, vt liquet ex Galeni eodem comment. Aphorif. 47. secundi lib. ita quoque ex quadam veluti ebullitione putrescentium intra vasa succorum ex ambobus caloribus, vt diximus: tandem vbi naturalis calor materiam superauerit, id, quod tenue in ipsis existit, fumosum, aut fuliginosum, natura expiratione & cōtractione arteriarum expellit: quod verò crassum, & veluti cinericiū, puri simile, non perinde, cum crassum sit, potest excernere, sed per insignes quosdam meatus educit. & id est vrinae sedimentum ex Galeni sententia lib. 3. de Prāsag. ex puls. Non ab re igitur sedimentū habet copiosum vrinae, quoties morbus ex humoribus crudis fatiget, seu ex otio, & repletionē febricitet quispiam. nam in his exiguum est quod tenue existens, ac fuliginosum possit expiratione & cōtractione arteriarū excerni: multum verò, quod crassum & veluti cinericiū. Contrā verò euenit, quoties morbus ex biliosis humoribus fiat, seu ex inedia, seu ex labore quispiam febricitet; minimum etenim, aut nullo modo sedimentum habebit, sed satis erit, si habeat sublimamentum, aut nebulam propter contrarias causas. Hic itaque est modus generationis sedimenti in corporibus laborantibus febre orta ex humorum putredine intra vasa. cuius causa materialis putredo, seu putrescens succus existit: efficiēs verò, calor prāter naturam insimulque naturalis, vincente tamen naturali, qui protensus est per solida corpora, hoc est, vasorum tunicas. Locus autem vbi generatur, sunt ipsa eadem vasa. Verū nunquid pars sit eius causa febris, quā coniunctam appellant, an eius quam antecedentē nuncupant; nondum liquet ex dictis. id verò clarum fiet ex dicendis, facta prius sectione putridarum ac continuarum febrium, quā quidem in Galeni doctrina vndecimo Meth. medend. secundo de Differentiis febrium, ac 2. de Crif. & aliis plerisque locis, in duplici differē. existunt. Nam quādam vnam duntaxat habent accessiōem à principio ad finem vsque: quādam plures. In eis quā vnam habent accessiōem, quoniam in his nulla est corporis pars, quā prācipuē sit offensa, sed humores duntaxat, qui in maximis ac calidissimis vasis continentur, ob putrefactionem feruentes: & propterea vniuersum tempus earum in vna consumitur accessiōe, ex Gale. decreto, secūdo de Differen. febriū quod excernitur sedimentum, nulli in dubium venit, quod pars erit eorum putrescentium humorū, qui talium febrium immediata causa existunt, quam coniunctam appellant, cum aliam non ha-

beant remotiorem causam antecedentem, eō quia vniuersi eodē tempore putrescentes eiusdem febris causa fuerint, nec ab eisdem reliqui humores dispositionem talem participāt, vt demū & illi iterum putredinē participantē alteram faciant accessiōem. In reliquis verò continuis, quā plures accessiōes habent, cum duas obtineant internas causas, quarum vna totius morbi causa existit, & antecedentem nuncupant: altera verò cuiuslibet particularis accessiōis, quam coniunctam vocant: in dubium venit cuiusnam causae sedimentum pars existat. cui responsum volo, quod eius, quā putredinis participes est, & quoniam ea actū putredine participat, ac putrescens est, quā particulares efficit accessiōes, coniuncta à Medicis vocatur: nos verò antecedentem magis propinquam vocamus. nam Gal. 11. Method. medend. humorum putredinem antecedentem quandam febris causam nuncupauit. propterea eiusdem pars sedimentum erit, & non eius quā antecedens magis remota causa est non particularium accessiōum, sed totius morbi: quoniam eadem licet quandam aptitudinem suscipiat ad futuram putredinem capiendam semper ex ea portione, quā actū putrescit, ac particularem efficit accessiōem, non tamen prorsus putrescentem eam quispiam dixerit. & propterea sedimentum, quod quidem pars putredinis, seu putrescentis succi existit, vt superius cum Galen. concludimus, nullo modo excerni potest ex ea causa, quam ipsi antecedentem nuncupant: neque vt pars eiusdem, neque vt superfluitas, vt quibusdam falsò visum est: cum adhuc actū ipsa non putrescat, nec putredinem habeat, neque ab eadem natura adeo euicta sit, vt ex ea sedimentum excerni possit; nam roborandas esse vires prācipit Galen. 11. Methodi medendi, quod putredinem superantes, succos concoquant. quare non prius succos concoquit natura, quā putredinem superauerit: etenim hāc iugiter & magis ipsam infestat. neque eidem causa antecedenti ex aduerso respondet concoctio, sed vacuatio, si multa sit: extenuatio, si crassa: & deterfio, seu dissecatio, si glutinosa: humorum autem putredini, & excretio, & refrigeratio, & ventilatio, & semipurridorum concoctio ex aduerso respondent, vt idem Galen. inquit. Id verò luce clarius experientia comprobatur, cum non modò continentes febres, quā vnam duntaxat habent accessiōem, sed etiam eas continuas, quā plures habent, saepe numero inspiciamus per vrinas iudicari. Atqui iudicari haudquaquam possent nisi per eas, quā putrescit, causa earum excerneretur: idque non aliud, quā sedimentum est. Amplius Galen. citato libro vndecimo Meth. medend. decretum reliquit expellenda esse ea, quā putruerunt, per alium, sudorem, atque vrinas, & interim per vomitum: quotidieque illud in curandis febribus ex putredine ortis obseruamus. Frustra itaque Gal. id instituit, ac nos exqueremur, nisi quā putruerunt, per vrinas excernerentur. Ad hāc propter quid Gal. lib. 3. Artis med. in febribus, quā ex putrescentibus accenditur succis, coctionem dixisset esse, quā putredinem finit, seu quiescere facit, manente adhuc substantia: & eodem 11. Method. medend. putrescentes humores cōcoquere inter alia iussisset, vt ipsos sanes, nisi natura, eorundem putrescentium humorum coctionē prācipuē intenderet: ex quibus demū, cum fuerint ab eadem superati atque euicti, sedimentū excernitur

3. de prāsag.
puls. cap. 3

cap. 4

cap. 2.

cap. 6

cap. ult.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cernitur modo, quo diximus? Est itaque pars putrescentium intra vasa succorum, vrinae sedimentum cum ipsi à natura fuerint superati, atque euicti: & non eorum, qui adhuc putrescentes non sunt, ipsarum febrium putridarum antecedentes (vt isti dicunt) causae existentium, qui ab eadem non adhuc superati, neque euicti sunt, neque est superfluitas quaedam eorundem, vt quibusdam placuit, velut ex iam dictis liquido constat. & propterea nil mirum, si in principio dictarum febrium sedimentum in vrinis non appareat, tam in eis quae vnicam habent accessiorem, quam in eis quae plures. etenim natura adhuc putrescentem humorem haudquaquam superauit adeo, vt crassiorem partem putrescentium humorum manifestam ac notati dignam per vrinas valeat excernere, & proinde in eis quidpiam possit subsidere: quanquam id quod tenue est, fumosum, aut fuliginosum natura existens, quodammodo expiratione & contractione arteriarum in nonnullis earum expellat. & hanc ob rem maximum (vt inquit Gal.) putridarum febrium indicium existit vrinae cruditas, quanquam etiam debilis concoctio proprium earum indicium sit: etenim proprium ac inseparabile huic febrium generi est, vt vrinae prima vel omnino cruda, vel debilitate cocta principio associetur, vt liquet lib. 1. de Diff. feb. Hanc eandem sententiam videtur Arabum princeps confirmare cap. 7. lib. 4. sen. prima, tracta. 2. cum dixit, quod vrina in febribus acutis non habent in principis earum sedimen: deinde sunt habentes sedimentum, & quod sedimen laudabile aliquid aliud non est nisi humor faciens agitudine, qui iam digestus est. Sed mox obuiet quidpiam aliter, si vrinae sedimentum in continuis febribus ex putrescentibus humoribus ortis est pars eius putrescentis succi, qui particularem efficit accessiorem: quomodo indicabit supra vniuersum morbum in iis febribus, quae plures accessiones habent? Seu quomodo nobis ostendet eam, quae est totius morbi, causam, ac antecedens vocatur à Medicis, esse coctam, si eiusdem pars non existit? Cui responsum sit, quod ea portio putrescentium humorum, cuius pars sedimentum existit, (vt superius adnotauimus) licet actu putrescat, ab antecedente, quae est totius morbi causa, secreta est, quando particularem efficit accessiorem. & vbi eadem in summo feruore existit, quod huic continuu est, adeo calfacit ac disponit, vt, dum remiserit eius calor ac feruor, idem iterum incalescat, putrescat, atque effluat, quousque summum feruorem obtineat: eoque rursus deferuescente, & reliqua pars continua paulatim succenditur ac effluat, seruatque circuitus hic, quoad vniuersa totius morbi antecedens causa (quae vt talem suscipiat alterationem, aptitudinem habet) fuerit consumpta, ac in parte superfluitates generante idem feruatur effectus, vt liquet ex sententia eiusdem Gal. 1. & 2. de Diff. feb. Cum itaque ea humoris pars, quae particularem efficit accessiorem, in similem eius naturam alteret atque disponat antecedentem, quae est totius morbi causa, & potissimum ac magis id, quod sibi continuum est, & hinc reliquum: propterea quia semper ad continua disparitatem continet caliditatem, suoque contactu vicinos humores ad putredinem trahit & quod natura putrescere aptum est: atque ordo hic (prout diximus) feruetur, quousque morbus iudicetur, nec effluere desinat vnquam pars vna, quin altera

sibi continua succendatur atque effluat: alias continua non esset febris: non sine forti ratione potest vrinae sedimentum coctionem significare causae antecedentis, ac totius morbi, cum sedimentum pars sit putrescentis succi, & putrescens succus pars antecedentis causae. Qua de re qualis natura erunt partes, eiusdem quoque & totum esse conuenit. Et ob hanc rem Hipp. vrinam optimam esse dicebat non solum si sedimentum haberet candidum & lene: sed si aequale esset per omne tempus, dum morbus indicaretur; haec namque sedimenti aequalitas cum eiusdem albedine & leuitate est: quae vniuersum morbum, vniuersamque eius causam antecedentem concoctam atque euictam esse à natura indicat: similiter, si sedimentum non aequale semper appareat, sed interdum tale, quandoque diuersum existat, signum erit quod alius concoctus deuiet usque, à natura conditus in coepta culis humor, alius incoctus existat. & propterea morbus diuturnior erit, vt ex eiusdem Hipp. & Gal. sententia liquet. 2. prognos. 2. prog. Siue igitur antecedens illa causa, quae vniuersum efficit morbum fuerit homogenea, seu similis, siue heterogenea, seu dissimilis, semper sedimentum indicabit nūquid cocta sit, vel semicocta: cum eandem necessario participet dispositionem, quam in ea, quae actu putrescit, & particulares efficit accessiones, pars eius existens, per sedimentum vrinae animaduertimus, potissimum vbi non vnum duntaxat inspexerimus sedimentum, sed plura. id quod considerandum praecipue iusserunt Hippoc. & Gal. Verum quid de intermittentibus putridis febribus sentiendum sit, non ab re quaret quispiam, num sedimentum antecedens causa (vt ipsi dicunt) pars sit, vel coniuncta, hoc est, eius, quae putrescens est, & particulares efficit accessiones: quam nos cum Galeno antecedentem etiam vocamus causam, sed magis propinquam, ipsius febris putridae continentem (quam ipsi dicunt coniunctam) non admittentes. Respondemus nos, quod, cum in intermittentibus febribus putrescens humor, qui particulares efficit accessiones, haudquaquam intra vasa existat: propterea ex eo sedimentum excerni minime putamus. Nam, cum id necessum sit cum vrina excerni, & vrina nota sit eorum duntaxat succorum, qui in vasis continentur, non modo secundum consistentiam, & colorem, sed etiam cum his, quae in ea pendent, aut subsident, (vt inquit Gal. 4. de Sanitate tuenda) reliquum est, vt supra reliquos humores, qui extra vasa continentur, significare non possit: potissimum quia notitiam eorum per reliqua signa habemus partim ex sudore, ac colore: partim etiam ex temperamento, aetate, anni tempore, antea vita, & reliquis huiusmodi. Consonum itaque est idem sedimentum in quibuslibet febribus intermittentibus ex humorum putredine ortis ab ea causa scerni, quae antecedens, ac remotior febris est, & intra vasa continetur: nam, cum haec putredinis particeps non sit, à calore duntaxat naturali alteratur, euincitur, ac quodammodo concoquitur, & assimilatur praedictis tunicis vasorum, quae assimilata quodammodo, atque euicta, si de numero eorum humorum sit, qui in eorum nutrimentum commutari omnino non valeat, confestim ab eisdem vasis velut superfluum existens repellitur, ac simul cum vrina excernitur tanquam pars quaedam eorundem humorum intra vasa redundantium à calore naturali vasorum quodam-

modo euiſta. Non tamen negamus interim (quam ex accidenti, & raro) partem quampiam putrefcentis humoris extra vaſa particulares acceſſiones efficientis poſſe per vrinas expurgari, velut eiufdem ſedimentum exiſtens à ſuperante calore aliarum partium ſolidarum, quam tunicarum vaſorum, euiſtam atque aſſimilatam, ac puri ſimilem redditam. nam interdum per veſicam & renes omne animal expurgatur, aut partium aliquarum in eo excrementa quædam incidentia venis purgato ſanguine de renibus excernuntur, quemadmodum etiam & abſceſſus quoque ſæpenumero per vrinam expurgantur, vt liquet ex Galen.

2. Progn. 2. Progn. vt plurimum autem ſedimentum, quod commet. 37 in vrinis viſitur in eiufmodi febribus ex ea cauſa antecedente, quæ intra vaſa continetur, & non ex ea, quæ extra vaſa putrefcit, tanquam pars eiufdem ſecernitur. poteſt nanque eadem à naturali calore vaſorum concoqui quodammodo, ac per vrinam excerni, cum non magnopere nec continue ab hac putredine extra vaſa exiſtente natura moleſtetur, quemadmodum ab ea, quæ intra vaſa conſiſtebat. Eadem quoque ratio exiſtit in corporibus non inculpatam ſanitatem habentibus, haudquaquam tamen ægrotantibus, vbi humores in eis redundarint. nam, ſi in toto habitu contineantur, per alia ſigna, quàm per vrinas, & earum ſedimenta dignoſcimus. At, ſi intra vaſa redundantes detineantur, per vrinas: & num iſdem cocti, vel crudi ſint, per ſedimenta ſimul cum ipſis vrinis animaduertimus, earum etiam conſiſtentia atque colore perpenſis. Verùm diſſidet quoque ſedimentum hoc ab eo, quod in ſanis corporibus ſecernitur; nam illud eſt pars alimenti, vt diximus: hoc verò eſt pars redundantium ſuccorum intra vaſa, quanquam in efficiente cauſa communicent; nam vtriuſque natura, ſeu calor naturalis vaſorum, efficiens cauſa exiſtit nullam ferente opem extra-neo ac præter naturam calore: quoniam in eorum generatione eius actio proſus non ingreditur. Cæterum non ab re quiſpiam hanc noſtram opinionem impugnabit aſſerens, ſi ſedimentum in ægrotantibus corporibus alterius ſit ſpeciei, ac diuerſæ naturæ ab eo, quod in ſanis generatur; quomodo, ac quæ via valeamus in eiſdem ægrotantibus corporibus diſtinguere, quando ſedimentum ipſum ſit pars putrefcentis humoris, aut etiam non putrefcentis, ſi in eiſdem citra putredinem intra vaſa redundet, & quando ſit veluti reliquia quædam ſemicocti alimenti, quemadmodum diximus in ſanis corporibus generari. Nā & in his quoque ſemper aliqua alimenti portio in ſanguinis generatione naturæ ſubterfugit confectionem: vel dicendum erit vnum in eiſdem corporibus ſedimentum excerni compoſitum ex vtriſque. Pro quo animaduertendum, quòd in dictis corporibus licet ex reliquis ſemicocti alimenti quotidie ſedimentum aliquòd ex naturali vaſorum facultate generetur; tamen, ſi idem cum putrefcentibus intra vaſa ſuccis, aut etiam citra putredinem redundantibus qui ab eodem innato calore euiſti ſint, miſceatur, certum eſt, quòd in eorum naturam vertitur, potiſſimum cum ipſum exiguum ſit, humores verò redundantes multi. Qua de re vnicum erit ſedimentum, quòd erit velut pars eorundem redundantium ſuccorum euiſtorum iam ab ipſa natura, qualiſcunque fuerit redundans ſuccus; etiam ſi putre-

dinis, aut non putredinis particeps ſit. Nam impoſſibile eſt ſuam ſeruare naturam, cum primum iam dictis humoribus redundantibus commixtum ſit: quinimo conſeſtim in eorum naturam mutatur. Verùm, ſi contingat ſedimentum ipſum, quòd diximus in ſanis ſecerni ex ſemicoctis alimentis, haudquaquam cum humoribus intra vaſa contentis permiſceri (id quòd fieri poterit, ſi in quibuſdā valis ipſum genitum ſit, & in reliquis quibuſdā humores putrefcentes, aut non putrefcentes contineantur) putamus ipſum interim ſecerni poſſe diuerſum ab eo quòd ab iſdem redundantibus ſuccis excernitur. Qua de re tenemus duo ſedimentorum genera in eiſdem corporibus modo iam dicto affectis ſecerni poſſe: quorum vnum pars erit redundantium intra vaſa ſuccorum, tam ſi putridi, quàm non putridi extiterint. Reliquum verò portio quædam ſemicocti alimenti: immo quicquid in ſanguinis generatione naturæ confectionem ſubterfugerit, modò intra vaſa conſiſtat alia ab eis, in quibus redundantes ſucci continètur, & cum vrinis excernatur. Sed porrò non ab re adhuc quiſpiam queret, qui fieri poſſit, vt vnū ab altero ſedimento in hiſce corporibus diſtinguere valeamus. Huic reſponſum ſit, quòd notitia habita qualis nam naturæ ſint redundantes ſucci, ac quantum fuerint ab ipſa natura euiſti, cuius item conſiſtentia, ac coloris ſit vrina, qua cum ſedimentum excernitur, ac quale ſit ſedimentum ipſum, ſimiliter quale, ac quantum fuerit alimentum aſſumptum, haud ægrè quiſpiam diſtinguere poterit, num quòd excernitur ſedimentum, ex humoribus redundantibus, vel ex ſemicoctis alimentis fuerit genitum. Nam, ſi quantitate & qualitate aſſumptis alimentis proportionè reſpondeat, ſitque conſimilis conſiſtentia, ac coloris vrina ipſa, tanquam pars ſemicocti alimenti, ipſum ſecerni putandum eſt, potiſſimum ſi neque eiufdem ſedimenti conſiſtentia, nec color proportionè reſpondeat qualitati, ac diſpoſitioni, & naturæ tum morbi, tum etiam redundantis ſucci. At, vbi ſedimentum ipſum naturæ, ac diſpoſitioni redundantium ſuccorum, ac morbi coſimile ſit tam conſiſtentia & quæritate, quàm colore: ſitque eiufdem rationis vrina colore & ſubſtantia, nulli in dubium venit ſedimentum hoc tanquam partem eorundem redundantium humorum à natura euiſtorum excretum eſſe. Nec cuiſpiam à ratione alienum videri debet, quòd interdum mingatur vrina, cuius ſedimentum ſit ex ſemicoctis alimentis exortum: interim verò cum ſedimento, quòd pars ſit redundantium ſuccorum intra vaſa, cum neque Hippocrati & Galeno alienum viſum ſit, interdum alium concoctum, atque deuictum à natura conditum eſſe in vaſis humorem, alium verò concoctum, & propterea interdum in vrinis ſedimentum apparere candidum ac leue: interim verò longe diuerſum exiſtat ita, vt aliquis hanc ob rem poſſit vna die vrinam inculpabilem: altera verò ſequenti nocte, vel die culpabilem emittere, vt liquet ſecundo Prognostic. Similiter quoque non inconuenit, quòd in ægrotantibus corporibus quandoque vrina cum ſedimento, quòd pars ſit redundantium humorum, mingatur: interdum verò cum eo, quòd ex alimentis ſecernitur: cum in diuerſis vaſis, & ab alia quoque materia, aliòque tempore vtrunque generetur. Eadem quoque ratio habenda erit de nubeculis, ac ſuſpēſis, ſi cum vrinis eadem

cap.
eiufd.
p. 3

eadem excernantur, & non sedimenta: aut si interim vnum, quandoque alterum in vrinis inspiciatur. Neque obiter hæc animaduertenda erunt, sed per accuratè perpendenda: nam sæpenumero euenit, vt etiam nō vulgares medici in hac re valde cæcutire videantur, ita vt sedimentum ex alimentis fecretum putet partem esse humorum in vasis redundantium. ac eorundem coctionis signum existere. Qua de re in prædictionibus valde decepti sunt, ita vt quos prædixerat ægrotos euasuros, non sine maxima eorum ignominia quādoque interire conspexerint. Hæc de sedimentis sanorum, ægrotorumque corporum, cum Hipp. & Gale. sentimus intelligentes de eis, quæ secundum naturam & vera sedimenta existunt, & non de his, quæ æquiuocè & præ-

ter naturam sedimenta appellantur, veluti ea quæ similia sunt farinæ crassiori, squamosa, seu fursuracea, aut, vt quispiam dixerit, arenulosa, ac orobo similia, & reliqua huiusmodi. nam de his aliter cum eisdem auctoribus sentimus, neque de eis pertractare nunc proposuimus. dabitur tamen fortasse de his, & aliquando scribendi locus, quanquam de eorum generatione nulla ferè adlit differetia inter auctores qui de eis verba fecerunt. Si qua verò hoc in tractatu studiosi sæpius repetita animaduertint, nos consultò illud fecisse putent: res etenim perutilis, ac ad artem necessaria, & cum tyronibus agenda erat: quod neque Hippocrates neque Galenus in similibus veriti sunt facere.



DONATI ANTONII

ALTIMARI

TRIVM QVÆSITORVM NONDVM IN

GALENI DOCTRINA DILVCIDATORVM COMPENDIVM.

Primum: Quòd functiones principes iuxta Galeni decreta, Anima non in cerebri sinibus, sed in ipsius corpore exerceat.

Secundum: Quòd naturalis spiritus in Galeni doctrina admitatur, & non omnino sit dimittendus, vt quibusdam visum est.

Tertium: Quòd exquisita Tertianæ ad eiusdem Hippocr. & Galeni sententiam in genere acutorum morborum contineatur.

Quòd functiones principes, iuxta Galeni decreta, Anima non in cerebri sinibus, sed in ipsius corpore exerceat.

TRES esse animæ partes Platonis auctoritate Galenus quinto de Hippocræ & Platonis Decret. & septimo eiusdem scriptum reliquit, substantiis, naturis facultatibus, ac functionibus non tantum differentes, sed corporis sedibus. quò fit vt tres quoque, quæ vitam nostram gubernant, facultates, ac tria principia sint in tribus diuersis corporis sedibus, velut apertè ex eiusdem sententia liquet. Horum principiorum vnum in capite collocatum esse asserit: idque munus habet per se quidem, vt imaginationem, memoriam, intellectionem, cogitationemque causet: per aliud verò, vt sentientibus animalis membris sensus, iis autem, quæ per appetitionem mouentur, motus originem præstet. Alterū in corde situm esse voluit, eiusque opera, vt ex illius sententia constat, sunt animæ tenor, quem Tōnon dicunt, & in his, quæ ratio iusserit innicta constantia. Eiusdem in perturbationibus est quasi feruor quidam insiti caloris,

cum anima vindicta de eo sumere cupit, qui videtur offendisse, quæ ira appellatur. per aliud etiā id efficit, vt mēbris sigillatim omnibus calorem, arteriisq; illam micationis pulsus agitationem suppediet. Reliquum & tertium principium, seu facultatem, in iecore sedem obtinere dixit, vniuersam in animali nutritionem procurans, cuius maxima pars & nobis & sanguineis omnibus sanguinis est procreatio. Ad eandem hanc facultatem pertinet iucundarum rerum fruitio, in qua cum vehemētius, quā par est, mouetur, incontinentiā intemperantiāq; efficit. In hoc tamē hæ facultates, seu virtutes inter se discrepant, quòd prima rationalis, aliæ verò duæ irrationales appellantur: & quòd quæ in irrationalibus partibus existunt virtutes, habitus quidam tantum, & potentia sunt: in rationali autem non habitus modo, ac potentia: sed scientia etiam est virtus: cum hæc sola animæ pars scientiæ capax, participetque habeatur, reliquæ verò potentias quidem, & habitus siue bonos, siue malos possunt acquirere: scientiā verò, quoad rationis fuerint expertes, minimè possunt. At relictis irrationalibus partibus, seu potentiis ad eam, quæ rationalis est, accedemus. huius sedes ad Galeni mentem in cerebro existit, atque ob id inter tria principia principalissimum est: huic enim natura tribuit imperare, dominari, corpusque hominis regere, cum opus est, velut liquet 3. de Hippocræt. & Platon. deeret. & si alia quadam ratione cor principatum obtineat, vt patet 5. de Loc. aff. quamuis vtrum in eo tanquam in domicilio, seu arce sit, an tāmquam corporis forma ab ipso inseparabilis, hucusque decretum non reperi, vt dicemus, nisi quòd cerebrum cōtinet in se ipso rationalem animam, veritus perpetuò quid esset eius substantia: quam, tanquam inuestigari non necessariam pro his quæ dicturi

sumus, adhuc nos subicentes, ad ea, quæ tractanda petiisti deuenimus: An. s. principes animæ functiones iuxta Gal. doctrinam in vna cerebri parte, vel diuersis perficiantur, seu in vno, vel diuersis finibus, aut ventriculis. Pro huius dilucidatione animaduertas oportet principes functiones propter ea appellari, Gale. teste lib. artis medic. non quod initiata in cerebro, aliis committantur partibus, vt motrix & sensibilis operatio: sed, quoniam à solo principio proueniunt, has quoque proprias ipsius cerebri. 2. de Loc. aff. nominauit, vt quæ à nulla alia parte, vt instrumento, fiant. & 7. de Hippoc. & Plato. decre. has functiones asseruit esse per se munera eius principij, quod in capite collocatum est, cum non per aliud eas causet, velut motum, & sensum. Harum verò differentiarum & si quamplures ab Auer. & Auer. ponantur, quia tamen nec cum his barbaris, nec aliis quibuscunque etiam Græcis, seu Latinis, sed cum Galen. tantum res agenda erit, vt petiisti: ideo ad eius mentem tres statuendæ sunt, vt patet 7. de Hippoc. & Plat. decret. lib. Artis medic. & lib. de Differ. sympt. quarum vnam phantasiam, seu imaginationem, alteram cogitationem seu intellectum, & tertiam memoriam appellat. Has functiones cum in sua propria sede, hoc est, in cerebro anima ipsa perficiat (vt dictum est) citra aliam partem, seu organum, ipsumque cerebrum in plurimas discriminatum sit partes, nonnullisque in se contineat sinus, ac ventres, duos quidem in eius anteriori parte, vnum in media, & reliquum in eius postrema parte: aut sunt quidam, licet temerè, asserere ad Galeni mentem animam in diuersis finibus operari, vt potè in anterioribus cerebri finibus, seu eius anteriori parte imaginationem, in medio cogitationem ac intellectum, in postremo memoriam. At nos, quam parum hi Galeni doctrinam gustarint, qui talia fatentur, ostendere conabimur, supponentes prius, quòd per imaginationem nil aliud velit Galenus intelligere, quam specierum, seu formarum receptionem à sensibus representatarum, siue presentibus ipsis, siue absentibus obiectis sensibilibus. & propterea nullum modò facio discrimen in eius doctrina inter sensum communem, & imaginatiuam: licet perspicaciores quidam velint eò discrepare, quòd sensus communis recipiat presentibus obiectis sensibus: phantasia autem seu imaginatio conseruet absentibus ipsis. pariter per cogitatiuam intelligo discursum, seu ratiocinationem, qua mediante anima discurret, ratiocinaturque componendo, seu diuidendo ea, quæ in phantasia seruata sunt, nullum similiter discrimen faciens modò inter cogitatiuam & intellectum: per memoriam verò intelligens illam formam, seu speciem reuocationem hætenus impressam, seu sigillatam in ipsa phantasia, seu imaginatiua, siue ea fuerit perfecte sigillata, & impressa; & proinde promptè reuocetur, siue amissa ferè & abolita, vt agrè reuocetur, ex quacunque causa illud fiat: quæuis Aristot. vnam memoriam, alteram verò reminiscenciam appellet, intelligens per memoriã tantum reuocationem illius formæ, seu speciei hætenus in phantasia impressæ, veluti pictura quædam, à qua passionem quandam recipiens ipsa imaginatiua sigillatur, velut cera à sigillante annulo. huius autem passionis habitum memoriã appellat Arist. asserens, memoriam esse phantasmatis habitum. ea verò est præteritorum, sed non presentium, nec fu-

turorum. Hac facultate etiam participes sunt (ad eius sententiam) alia quædam animalia præter homines. inter quos quidam non ab re difficulter memorantur, aut immemores sunt, vt ratione ætatis diuersa, pueri & senes, vtrique propter motum: tamen illi in augmento, hi verò in decremto multo sunt. Et proinde illis humidioribus existētibz, tãquam in aquam fluentem incidente motu, & sigillo, non manet phantasma in anima, inquit ipse: his verò, propter esse frigidos ac duos, non inest impressio, nec tangit, licet eam accipiant. At per reminiscenciam, eam animæ functionem intelligit, qua ad venandum formam mouetur hætenus in phantasia impressam, verum nunc oblitam. & cum magna ex parte hoc difficile sit, potissimum si longum fuerit interpositum tempus: propterea vt à simili, vel à contrario, aut propinquo, ac velut quodam vtens syllogismo reminiscitur: est enim, vt ipse inquit, reminisci, vt syllogismus quidam. hoc autem eis solis accidit, quibus & deliberatiuum inest natura. Reuertendo igitur ad id, vnde digressa oratio est, dicimus cum Gal. tres esse principes animæ facultates: quarum munera, vt diximus, sunt imaginari, cogitare, & memorari. at, cum ipsarum operationes circa phantasmata sint, quæ quidem in organis habet describi propter eorum cum materia dependentiam, necessario has facultates organis perfici existimandum est. Qua de re non immerito de hoc ipsarum organo in dubiū venit, non siquidem vtrum sit cor, aut cerebrum: quoniam luce clarius est apud Gal. cerebrum esse, vt retulimus, sed an diuersis, vel vno cerebri sinu, aut in ipsomet corpore cerebri perficiantur. Pro quo iterum animaduertas oportet, ratiocinatricem animam, siue ea in cerebro sit tãquam in arce, seu domicilio, siue velut quædam eiusdem corporis formam, seu ipsiusmet cerebri temperamentum; cui fortè sententiæ potissimum adherere videtur Galen. eo libro, qui inscribitur, Quod animi mores corporis sequantur temperaturas, cum plures habeat facultates, seu efficaces causas, eas medio animali spiritu perficere, qui neque est eius substantia, nec eiusdem quasi domicilium, vt Stoici senserunt, sed primum eius instrumentum: nam qualiscunq; sit animæ ratiocinatricis substantia, siue corporea, siue incorporea, eius habitaculum est in ipso cerebri corpore, vt eidem Galen. placuit 7. de Hippoc. & Plat. decret. Spiritus autem animalis eius est primum instrumentum pro sensibilibus, ac voluntariis motibus perficiendis, vt ipse testatur. & proinde, si exinanitus fuerit, minime animal vita priuat, sed stupidum, sensu motuque erepto, tantisper redit, quoadusq; collectus restituitur. Is, si animæ esset substantia, fieri nullo modo posset, quin simul atque ipse esset euacuatus, cõtinuò quoque animal interiret. est denique animalis spiritus non animæ substantia, ac velut domicilium, sed eius primum instrumentum ad Galeni sententiam: qua ratione & animalis dicitur, qui ex vitali spiritu perfectius concocto (vt Galen. visum est eod. 7. de Hippoc. & Plat. decret.) oritur. Oportuit nanque ipsum exquisitissimam omnium immutationem adipisci, quòd aptum fieret animæ instrumentum. qua de re non immerito natura, cum è vitali animale hunc spiritum efficere studeret, reticularem quandam contextum, quem Græci *πλέγμα δικλωρόν* dicunt, quæli varium quandam labyrinthum iuxta cerebrum ad eius basim fabricauit, velut propriis oculis non

semel, dum eius anatomen administraremus, inspe-
xisti, & si quidam falsò contrarium senserint. Con-
struxit, inquam, hunc plexum quadam non parua
portione soporiarum arteriarum assumpta, ac in
tenuissimas partes discissa, cancellatis fibris ad re-
tis formam. Ex hac textura iterum tam magnum
exoriscens arteriarum par, quantum id, quod è soporariis processerat, à principio in cerebrum ingre-
ditur, & cum alias partes, tum ventriculorum ain-
bages multis ramulorum implicationibus inuexit:
quibus & in ventriculos ipsos, ac in eiusdem cere-
bri corpus elaboratus iam vitalis spiritus distribui-
tur, ac in animale m vertitur. Eius nanque genera-
tio materiam habet propriam vitalem, inquam, spi-
ritum, prout Galen. testatus est. de vsu partium.
Nam quoad in arteriis continetur, vitalis est & di-
citur prout idem Gal. scriptum reliquit 7. de Hippoc.
& Plat. decre. velut is qui in cerebro animalis est &
dicitur. Ipsi nanque veluti fons cerebrum existit
vt patet 12. metho. medendi, rigaturque hic spiritus
animalis ac alitur non tantum ex eo, quem reticu-
laris plexus suppeditat, verum etiam & ex aëre in-
spirato ac per nares attracto, vt patet lib. de Vsu
puls. & de vili respir. qui verò spiritus cerebri ven-
triculis incidunt prioribus, denuo conficiuntur ac
præparantur in eis noua quadâ præparatione præ-
ter eam, quam fieri in reticulari plexu diximus: ac
tum primum incipit nomen animalis spiritus sub-
ire, quamuis imperfectus adhuc sit, ac incoctus:
ea de re conficitur prius in eis, ac præparatur, & de-
mum à posteriori sinu excipitur per medium me-
atum, seu ventriculum ipsum transiit, vt Galen.
placuit. 8. de vsu partium. & ita demum exquisitè e-
laboratus animalis spiritus primum existit ratio-
nalis animæ instrumentum cum in sensibilibus a-
ctionibus omnibus perficiendis, tum in his quæ à
consilio & voluntate prodeunt, prout patet 7. de
Hippocr. & Plato. decre. & 4. de lo. aff. quamuis po-
tissimum eo vtatur spiritu, qui in postremo ventri-
culo continetur tanquam exquisitus elaborato,
& eo qui in medio, vt liquido constat 3. de Locis
affectis, cum dixit animam in sensibilibus actioni-
bus omnibus, ac in his quæ à consilio & voluntate
prodeunt, spiritu vt animali tanquam primo i-
psius instrumento, qui in ventriculis, maxime-
que postremo, continetur: quamuis non contem-
nendus sit medius ventriculus, perinde quasi non
principalissimus, seu valentissimus sit: multis enim
rationibus inducimur, vt hunc amplectamur: duos
verò anteriores deferamus. Ex quibus Galeni ver-
bis constat, quod quamuis anima ratiocinatrix pro
instrumento vtatur animali spiritu contento in ce-
rebri sinibus, dum sensum & motum perficit: ta-
men eo maxime vtitur, qui in posteriori conti-
netur ventriculo, ac medio, vtpote qui perfe-
ctior, ac maioris facultatis existat, eo posthabito,
qui in anterioribus tanquam impuro adhuc,
ac imperfecto existente, & materiali magis, ac
ad eius vsum inepto, cum in eis elaboretur, ac
purgetur, vt diximus. quo fit, vt posterior cere-
bri ventriculus merito anterioribus minor factus
sit, vt idem Galenus asseruit 8. de Vsu partium.
Insuper propter hoc, si cerebrum ipsum quomo-
docunque incidas, non prius sensum & motum
amittit animal, quam ad aliquem ventriculum
vulnus penetrauerit: quin etiam patet quòd postre-
mi quidem ventriculi vulneratio maxime omnium

animal ledit: secundo loco medij, & minima ex an-
terioribus vtrisque noxa contrahitur, eodem Gale-
no auctore 7. de Hippocrat. & Plat. decret. illud
quod etiam experientia cōprobauit in adolescen-
te in Smyrna Ionia, qui suscepto vulnere in altero
anteriorum ventriculorum superstes tandem eua-
sit, vt tum 8. de Vsu partium, tum comment. A-
phorism. 18. 6. lib. testatus est. Hic denique vsus
habetur ab eo spiritu, quem arteriæ à retiformi
plexu exortæ in cerebri sinus eructant. At quo-
niam nonnullæ earum progerminationes præter
predictas ad tenuem membranam per cerebri cor-
pus penetrantem inferuntur, ad has quoque par-
tes portionem non minimam vitalis illius spiritus
prius in prædicto plexu elaborati eas deferre cen-
sendum est, vt etiam testatus est Galenus 9. de vsu
part. & 7. de Hippocr. & Plat. decret. illudque li-
quidò in dissectionibus spectari potest. Ea de re
animalem quoque spiritum in ipso cerebri corpo-
re contineri alienum à ratione non est: nam, cum
primum ex arteriis decidit in cerebri corpus, non
amplius vitalis, sed animalis est & dicitur: cum ille
in corde & arteriis tantum locum habeat: hic verò
in cerebro, vt paulò antè retulimus. Nec id quoque
Galenus latuit, cum 8. de Vsu partium talia protu-
lit verba: Postea verò quàm in toto cerebri corpo-
re, non in solis eius ventriculis, quemadmodum ali-
bi demonstraui, spiritus animalis multus con-
tinetur: existimare oportet plurimum etiam in cere-
bro posteriore ipsum contineri, vt quod omnium,
qui in totum corpus distribuuntur, nervorum fu-
turum erat principium, mediæque illa interualla,
quæ partes eius connectunt, spiritus esse vias. Ex
quibus Galen. verbis constat spiritum animale, eumque multum, in cerebri corpore contineri præ-
ter eum, qui in eius sinibus habetur, de cuius vsu
nullam vsque adhuc habemus prolatam à Gal. sen-
tentiam: etsi perpetuò compertum sit apud eum spi-
ritum animale primum esse animæ instrumentum:
& quòd eo, qui in cerebri sinibus continetur, ipsa
vtatur pro sensibus & motu perficiendis. at huius,
quem in toto cerebri corpore esse fatetur, hucus-
que vsum ab eo declaratum non reperi, præter id
quod in prædictis verbis habetur, de quo quid sen-
tiam, in his quæ consequenter dicemus, pronun-
ciabo. nunc autem tempestiuum est ventriculorū
omnium cerebri vsus propalare, & demum ad pro-
posita rei veritatem accedere. inter quos antio-
res iuxta Galen. doctrinam. 8. de Vsu part. præter id
quòd spiritum animale conficiunt ac præparant
ipsi cerebro, inspirationem & expirationem effla-
tionemque efficiunt, atque etiā infernis suis parti-
bus, quæ spectant ad nares, simul quidem sunt olfa-
ctoriū instrumentū, simul etiam veluti ductus qui-
dam ac canales ad superfluo-ū efflu-ctionum acco-
modi: ex partibus nanque sibi propinquis necessa-
rio excrementa affluentia, cum loco inferiori sint
siti, sæpenumero excipiunt. At, cur eos duos esse o-
portuit, eodem citato loco à Galeno declaratu est:
nos verò, vt breuiloqui simul simus, derelinquimus
modo. Eius autem ventriculi, qui in posteriori par-
te existit, munus est ipsum spiritum animale ante
iam in anterioribus ventriculis confectum trans-
sumere, simulque spinalis medullæ principium ef-
se. Et, cum non liceret duas in animalia facere spi-
nas, neque duas spinales medullas, propterea du-
plex esse non potuit, velut anteriores duplices esse

oportuit. Et, si Herophilus, cui assentire videtur Gal. omnium ventriculorum existimari hunc esse principalissimum: cum maiorum virium, maiorisque facultatis materias contineat. licet omnium sit minimus: prædictos autem spiritus in prioribus sinibus elaboratos nequaquam transsumere poterat, ni inter ipsum & eos meatus quidam esset: per quem cum spiritus fieret in ipsum transsumptio, tum cerebri cum parencephalide, seu cerebello communicaret, & esset connexus: cum vnum ab alio crasse meningis duplicatione diremptum sit, necessariumque esset aliqua parte cerebrum cerebello coniungi. Talem ergo præstat hic meatus usus, siue meatum ipsum, siue quartum totius cerebri ventriculorum, siue perforationem duorum ventriculorum anteriorum nominare velis. Excipiens enim hic spiritum ex anterioribus ventriculis, parencephalidi ac posteriori ventriculo transmittit, simulque cerebellum ipsum cum cerebro connectit. His ita iactis tanquam fundamentis firmis, reliquum est eorum opinionem diruere, qui ad Galen. sententiam asserere ausi sunt principes facultates in cerebri sinibus perfici, easque nec in vno tantum: sed diuersis, in anterioribus videlicet imaginatione, in medio cogitationem, & in postremo memoriam, simul etiam nostram opinionem, ac veritatem iuxta Gal. doctrinam statuere. Ignoro equidem quo pacto Galeno illud adscribere non erubescant: cum vbiq; locorum velit cerebri ventriculos spiritu animali plenos esse, quo ratiocinatrix anima vitur ad sensus perficiendos, ac voluntarios motus. Quod si in ipsis talis contineatur animalis spiritus pro prædicto usu, continueque eius portio aliqua dissipetur, quæ regenerari desideret, (qua ratione, ut diximus, alimentum ei suppeditatur & per inspirationem & per plexum reticularem.) quo pacto loca esse possunt principum facultatum, dissipato ac denovo genito alsi due alio & alio animali spiritu: cum nec species sigillari, nec memorari possint, nec super eas ratiocinari anima valeat propter continuum eorum motum; Adde, quod nec idem spiritus à Gal. ponitur instrumentum animæ pro his principibus facultatibus obeundis, sed pro sensu & motu perficiendo, ut liquet quouis loco, quo de his verba facit, nec valet, si dixerit quispiam citra hos spiritus animales in prædictis sinibus prædictas functiones perfici: cum perpetuo his spiritibus pleni sunt, neque anima ipsa quicquā operatur citra animalē spiritum quem primum eius instrumentum semper Gal. appellat. & hac ratione animalis dicitur, ut patet 4. de Loc. aff. & 7. de Hip. & Plat. decre. nō ergo perficiuntur in cerebri sinibus principes animæ facultates. at, si quispiam velit nō in eorum cauitate, sed corpore, seu substantia eas perfici, quid aliud queso erit dicere, quā quod perficiantur in cerebri corpore: cum ventriculorum substantia alia non sit, & diuersa à reliquo cerebri corpore: nec maior ratio erit de hac, quā de tota reliqua cerebri substantia: id quod probare intendimus. Amplius, si animalis spiritus propterea talis dicitur (ut Galen. visum est: 7. de Hippocr. & Plato. decret.) quia primum est animæ instrumentum, cum non tantum in cerebri ventriculis contineatur, verum & in toto eius corpore, Galeno teste octauo de Vsu partium. superfluum hic esset, si principe facultates in cerebri sinibus perficerentur. nam eo vteretur anima, velut in aliis sensibilibus & motricibus functionibus uti-

tur. Verum, cum ipsam frustra in cerebri corpore contineri erroneum sit asserere, decens erit fateri quod eo pro obeundis principibus operationibus vitur anima. & sic non in cerebri ventriculis, sed in ipsius corpore eas perficit, animalique spiritu in eo contento vitur pro primo instrumento, velut in externis functionibus vitur eo, qui in ventriculis est, & reperitur: cum non alia ratione huic animalis dicatur, quā is, qui in ventriculis est, nec alium possit præstare usum ipsi cerebro. Nam pro alimento innati spiritus eius abundans est quæ per venas substantia ad ipsum distribuitur: & inspirationis usus, velut, pro eius symmetria seruanda, ea quæ per arterias suppeditatur. Adhuc octauo de Vsu partium Galenus aduersus Erasistratum, qui propter variam cerebri compositionem ac magis perplexam volebat homines cetera animantia mente, & ratiocinatione superare, dixit eum non recte sentire: nam & asini habent cerebrum admodum perplexum, quos oportebat simplex omnino, ac sine illo plexu & varietate habere, si verum esset quod Erasistratus assererat. Et exinde aduersus eum concludens ait quod melius fuisset existimare intellectum sequi nō compositionis varietatem, sed corporis (quod cogitat atque intelligit) quodcumque id sit, bonam temperiem. neque enim bonitas ac perfectio intellectus multitudinis spiritus animalis potius videtur attribuenda, quā qualitati. Ex bona ergo temperie corporis, quod cogitat atque intelligit, ac spiritus animalis qualitate optima, sequitur intellectus & bonitas, & eius perfectio. quare & in corpore cerebri perfici, & intellectum, & ratiocinationem, ac medio animali spiritu, qui in eo continetur, his verbis concludit Galenus, de hoc animali spiritu, qui in toto cerebri corpore continetur, cum Erasistrato verba faciens. Sed quid clarius quā quod ipsemet Galenus testatur 3. de Locis affect. asserens, Sanè cum ea, quæ per dissectiones apparere solent, accuratè consideraremus, rationi consonum videbatur, animam in cerebri corpore sedē obtinere, atque in ipso & rationis vim & sensibilibus imaginum memoriam residere, ac primum instrumentum ipsius cum in sensibilibus actionibus omnibus, tum in his quæ à consilio & voluntate prodeunt, spiritum esse qui in ipsius ventriculis, maximeque postremo continetur? In quibus verbis sole clarius patet principes animæ facultates, ac earum functiones Galenum velle in cerebri corpore residere & perfici, & non in ventriculis. Et hoc non sine valida ratione, cum & ipsa anima rationalis, ut eidem Galeno placuit, in prædicto cerebri corpore collocetur, ac sedem obtineat, cuiuscūque ea sit substantia: ventriculi verò ipsi fabricati sint pro gignendo ac continendo eo animali spiritu, quo tanquam instrumento ipsa anima vitur ad obeundas reliquas eius functiones, sensibiles videlicet, & motrices voluntarias. Ut verò quilibet hanc Galeni sententiam percipiat, eiusdem verba prout in Codice Græco iacēt, inspiciat: nā nos breuitati indulgentes hic ea transcribere recusauimus. Id ipsum confirmauit quarto de Locis affectis cap. secundo, dicens quod, si aliquando tota anterior cerebri pars afficiatur, necessum est & quæ existunt circa supremum ipsius ventrem compati: lædi autem discursivas ipsarū actiones. quibus verbis ostendit Galenus, (si quis ea sano modo intelligere velit) quod affectus toto cerebro: anteriori videlicet, & postrema

cap. 2. & 7

cap. 3.

cap. 13

postrema eius parte, necessum est quod discursiua eius operationes lædantur: cum iuxta eius sententiam in ipsius corpore resideant. quare eo affecto, & eas affici necessarium erit, prout ipse in prædictis verbis concludit. Nec quispiam decipiatur, quod per hæc verba voluerit Gal. prædictas functiones principes perfici in supremo cerebri ventre, cum non propterea dixerit lædi discursivas operationes quia supremus venter afficiatur: verum quia, cum læsa est tota anterior cerebri pars, & reliqua posterior consentit, cerebrumque ipsum propterea totum affectum, necessum est discursivas quoque functiones lædi: hæ enim partes, quæ sunt circa supremum ventrem, posteriores sunt cerebri partes. Nec idem Gal. asseruit, quod necessum sit lædi supremum ventrem: propter quod quispiam fortè coniectari potuisset, eo loco prædictas functiones principes perfici: verum dixit necessum esse ea quæ sunt circa supremum ipsius ventrem, cõpaticea autem posteriores cerebri partes sunt, in quibus supremus venter fabricatus est, ut cuique in Anatome experto patere potest. At, quilibet percipiat hanc esse Galeni mentem, grecum codicem perlegat: nam nos, ut breues simus, eadem græca verba hic transferre nolumus, cap. 12 Libro quoque artis medicinalis, cum de cerebri signis verba facit, loquens de his, quæ ex principibus sumuntur operationibus, reulit virtutem & vitium earum esse seorsum indicia tantummodo ipsius principij, scilicet cerebri, cum à solo ipso principio proueniant: & addidit, Promptitudo igitur intellectus, seu ingenium promptum subtilem quidem cerebri substantiam indicat: tarditas verò intellectus crassam: discendi verò facilitas formarum facile susceptiuam, memoria autem stabilem ac firmam: sicut & discendi difficultas formarum non facile susceptiuam, & obliuio fluidam. Ex quibus Galen. verbis duo ad eius sententiam excipere licet: Primum quod, cum principes operationes, earumque virtutes & vitia tantummodo indicent supra ipsum cerebrum, eius videlicet indicantes subtilem, vel crassam substantiam, mollem, vel duram, cum à solo ipso principio proueniant, in ipso quoque, ac ipsius corpore exerceri, non autem in eius sinibus, velimus, nolimus, annuere opus est: cum supra substantiam ac temperamentum arguant corporis totius cerebri, & non ventriculorum cerebri, prout eius verba sonant. Secundum, quod, si veritatem eius dicta habere debeant, cogimur fateri neque in diuersis sinibus eas perfici posse, etsi in eius quispiam assentiat fieri. Nam, si discendi facilitas indicat substantiam cerebri facile formarum susceptiuam, & per consequens subtilem: memoria verò, eius substantiam crassam, & propterea stabilem & firmam: velut tarditas quoque intellectus iterum crassam indicat cerebri substantiam, necessario sequitur ad eius dicta quod qui facile discunt, difficulter memorantur: & qui difficulter discunt, promptè memorantur, prout etiam cap. 16. Aristot. visum est libro de memoria, & rem. quam vellet ipse has facultates manifestari tantum in cerebro, initium autem habere à corde, velut de reliquis quoque sentit animalibus functionibus. at hoc veritatem nequaquam habere posset, ni supponerent ambo in eodem loco ac sede, hoc est, in cerebri corpore, vel in vno eodemque ventriculo, prædictas principes facultates perfici nam pone in diuersis perfici ventriculis, utpote in anterioribus imaginationem, ut isti volunt: in medio

cogitationem, in postremo memoriam, nonne simul compati possent facilis disciplina, & stabilis memoria: cum in anterioribus ventriculis subtilitas & mollities, in postremo crassities & duritia seruari posset: pariter & instabilis memoria cum discendi difficultate, oppositam scilicet seruantibus prædictis ventriculis temperaturam, ac substantiam? nullus, inquam, hoc formidaret, ut verum ac possibile admittere. Reliquum est ergo, ut veritas verborum Gal. & Aristot. seruetur, principes animæ functiones in cerebri corpore perfici: aut saltem, si qui velint quod in eius ventriculis fiant, (etsi falsum sit) vitare non possunt, quod in vno tantum omnes, & non in diuersis, perfici debeant. aliàs falsa omnino Aristot. & Gal. assereretur, ut ostendimus. cap. 6 Quin etiam libro secundo de motu musculi. idem Gal. inuestigans causam cur pleraque actionum voluntarium mente non assequamur, asserit quod, si insignes impressiones rerum in imaginationibus suscipiat anima, eas perpetuo conseruat: sin obscuras & superficiarias penitus, non conseruat: atque illud est memoria tenere, alterum verò obliuisci. & demum concludens, causam dixit eam esse: quia non intenti actionibus tota mente fueramus, & propterea earum non recordamur. nam quod phantasiatur anima, quodcumque vtiq; sit, hoc idem & memorari videtur. At, si quod phantasiatur animæ, hoc idem memoratur, nec de vlla re præterita qualis naturæ sit, considerare possumus, ni eius meminimus, & illud nequaquam fieri liceat, nisi prius conseruetur, quis, noua dogmata introducens, velit fateri has functiones in diuersis partibus ac sinibus perfici: cum eiusdem animæ sint munera: immo illud idem ipsius quod phantasiatur etiam, & memoratur? cur vnū velit in anterioribus ventriculis ipsam, alterum in postremo exercere? quæ tradeda est diuersitatis locorum causa? nulla inquam, quæ alicuius momenti sit. non ergo perficiuntur prædictæ functiones in diuersis cerebri ventriculis. Viterius, nec in ipsis anterioribus ventriculis imaginatio fieri potest, cum dictū sit eos, ad Galeni mentem, inspirationem, efflationemque ex cerebro efficere, ac animalem spiritum conficere & præparare. Quomodo phantasmata in eis excipi ac seruari valent, si perpetuo inspirationem & expirationem operentur, ac nondum confectum spiritum animale suscipientes conficiunt ac præparant? Si per eos quoque notatu digna excrementa ex cerebro suscepta, ad nares expurgantur, ac suis infernis partibus, quæ ad nares spectant, olfactorij sunt instrumentū, ignore quo pacto quispiam sibi persuadere valeat & quæ ratione audeat illud Galen. adscribere, qui, cum tot horum sinuum conscripisset vsus in plerisque locis, & præsertim octauo de Vsu partium, nec per somnium talis vsus meminisse hucusque compertus est. Satiū denique erit dicere, cum eum vsum eis Galen. non tribuat, ipso carere, quam temere asserere, & de insufficientia Galenorum damnare: aut quod nunquam ipse somniavit, ei falso adscribere. &, si libro de oculis illud scriptum reperiat, quisnam ignorat eum eiusdem auctoris non esse, sed falso ei adscriptum: cum nec phrasin sapiat Galenicam, ut cinque patere potest ex eiusdem cõmentariorum lectione: & quædam reperiantur, quæ eius doctrinæ sunt aduersa, & præsertim ea quæ de prædictis functionibus ac cerebri ventriculis ibi conscripserunt? At quod nec in postremo ventre adsit me-

Lib. art.
med. cap. 12

8. de Vsu
partium, lo-
cis citatis.
& 7. de
Plac. Hipp.
& Plat. c.
3

moria, nec perficiatur, eiusdem ventriculi situs demonstrat: cum in cerebello, & non in cerebro, collocetur. cumque anima in cerebro, & non in cerebello, habitet, iuxta Galeni mentem: tunc non ex se ipso cerebrum hanc functionem perficeret, sed medio aliquo, cerebello videlicet, & eius sinu. quare memoria princeps functio dici non posset, cum non à solo principio proveniret, cerebro videlicet, sed ex eo medio cerebello, ac eius ventriculo, aut ex cerebello duntaxat tanquam principio: quorum utrumque & falsum est, & Galeno pugnat. Accedit ad hæc, quod idem Galen. libro artis medicinalis ex his principibus functionibus non supra cerebelli, sed cerebri, temperamentum voluit arguere, ut ex intellectu eorum verborum cuique patere potest. Unde frustra de memoria disseruisset ex ea sumens indicia pro cerebri temperamento, tanquam eiusdem facultate, si in postremo perficeretur sinu. Adde, quod cum his sinus in parencephalide situs, spinalis medullæ sit principium, receptaculumque animalis spiritus, prius in anterioribus elaborati, quo anima ipsa pro sensibus & voluntariis motibus obeundis vitur, ut prius dictum est, memoria in eo perfici nequit, utpote semper prædicto animali spiritu pro motu & sensu consumpto, & recentem alio genito: nec quisquam alius usus, præter iam dictos, postremi ventriculi à Galeno unquam scriptus est. Quare nullo modo ad eius sententiam dicendum erit ipsum esse memoriarum sedem, nec cuiusvis alterius principis facultatis. & si quis hoc asserere audeat, iterum aut de insufficientia Galenorum accusabit, vel temere ei, id, quod nunquam falsus est, ascribet. Quod autem in medio ventriculo, seu meatu, cogitationis, aut intellectus munus obire anima nequaquam valeat, facile erit intelligere, si eius usus animadvertatur. est namque via, seu meatus, per quem spiritus in anterioribus ventriculis confectus in postremum transmittitur, & quia cerebellum à cerebro media crasse meningis duplicatione erat diremptum, ut diximus, necessariumque erat ea connecti, cerebrum quoque is meatus parencephalidi connectit. transitus ergo, via, seu meatus est hic sinus animalis spiritus, quo assidue pro sensu & motu perficiendo anima, seu instrumento, vitur. quare cogitatio, discursus, seu intellectus in eo nequaquam perfici potest propter continuum motum prædicti animalis spiritus, ac eius assiduam recentemque renouationem & instaurationem. quod, si talem præstaret usum, cum alios huius ventriculi usus Galenus conscripserit octavo de Vsu partium. tertio de Locis affectis. & septimo de Hippocrat. & Plat. decret. ac aliis plerisque locis, cur talem perpetuo subiecit, etsi sapius de cogitatione & intellectu verba fecerit; cogitis, velis, nolis, fateri aut insufficientem fuisse, aut usum hunc non novisse, vel, quod rectius est, talis sententiæ nequaquam fuisse. Ex his constat quam parum Galen. doctrinam gustarint, qui eius decreto, ac ipsum in patronum sibi ipsis adhibentes, ausi sunt asserere principes animæ facultates in cerebri sinibus perfici, earumque munus animam in diversis ventriculis obire, utpote in anterioribus imaginationem, in medio cogitationem, seu intellectum, & in postremo memoriam, sedibus atque instrumentis ipsas sciungentes. simulque liquet nostra opinio & veritas, cum satis admodum ostensum ac probatum sit iuxta eius

sententiam, nec in sinibus, nec eiusdem diversis eas perfici posse, sed in ipsomet cerebri corpore, in quo & ipsa residet anima, cuiuscunque substantiæ sit, ad metem eiusdem Galen. siue incorporea quædam res sit, & in eo velut in domicilio, seu arce, resideat, siue corporea, & si corporea, siue sit ipsius cerebri insita caliditas, aut insitus spiritus, aut tota eius constitutio; quodcumque denique sit anima, ipsa in ipso cerebri collocanda corpore est, in Gal. doctrina, ut sexcentis in locis scriptum reliquit, in ipsoque eodem cerebri corpore has functiones eam operari liquet 3. de Loc. affect. Valeant ergo, qui has functiones secundum diversas sedes sciunxerunt, opinantes hanc fuisse Galeni sententiam. Valeat insuper Auer. qui in suo colligit, & libro de Memo. & remi. hoc idem sentit, potissimum si illud ad mentem Aristot. vel Gale. fateatur. nam neque ipse Aristot. secundum diversas cerebri sedes eas perfici, seu manifestari vlllo in loco asserere ausus est: quinimo eodem libro de memo. & remi. oppositum sentire constat, velut supra ostendimus. Non ergo perficiuntur facultates principes in cerebri sinibus, eisque diversis, sed in ipsomet ipsius corpore, in quo & ratiocinatrix anima residet iuxta Galen. sententiam, ut abundantissime probatum est. At, si qua constituenda esset determinata ipsius cerebri pars, in qua prædictæ omnes functiones perficerentur, ut quibusdam visum est, autumantibus se Galenum in patronum habere: et si (mea quidem sententia) nulla fortitudine freti, aut auctoritate, illud sibi ipsis persuaserunt: erit tamen ea unus ventriculus, & non diversus, in quo omnes perficerentur, at propter assignatas à me causas nec posterior, nec anteriores esse potuerunt. probabilius propterea videretur esse medius, utpote qui minores habeat causas prohibendi, ne in eo perficiantur. Ex diversis insuper eius constructione ac varia illud quoque coniectari posset, cum & corpus psaloides, conarion, vermiformis, epiphysis, & duo glutia circa ipsum appareant. Idque de novo foueri posset ex verbis Galen. qui 3. de Hippo. & Plato. decret. & 3. de Locis affect. hunc ventriculum principalissimum appellavit. Adhuc persuaderi id quoque posset ex his quæ à Galen. habentur 4. de Loc. affect. cum dixit. Quod, si aliquando tota anterior cerebri pars efficiatur, ea, quæ sunt circa si. premum ipsius ventrem, ei consentire necesse est, atque discursus quoque actiones vitari, quo loco per supremum cerebri ventrem medium ventriculum intellexit, ad cuius læsionem videtur istis, qui hæc asserunt, quod discursus cerebri operationes lædantur. quare quod in ipso perficiantur, non erit omnino absolum credere. at nos quoque patet hæc Gal. sententia intelligenda sit, supra ostendimus. Vltius persuaderi hoc idem posset ex his, quæ Gal. asserit eodem 4. de Locis affectis, cum de sopore verba facit, qui privatio est sensus & motus, spirandi facultate manente illa. dixit enim eum quandoque provenire posse, cum quis inter perforandum membranam negligenter, ac ultra quam res postulat, meningophiliacem. i. meningis custodem premendo violaverit ita, ut os caluaria vehementer attritum cerebri ventriculos comprimat, maximeque medium. Ex quibus verbis iterum patet medium ventriculum esse principalissimum inter cerebri ventriculos: hoc autem esse, quia in eo principes perficiantur operationes, alienum à ratione non erit credere.

credere. Hæc itaque opinio, etsi (vt retuli) non sit ad Galen. mentem, vt ipse sentio: probabilior tamen esse videtur, quam ea quæ vult animam prædictas functiones in diuersis cerebri sinibus obire. hæc nanque penitus abscondita ac aliena à Gal. doctrina est, vt supra probauimus: & tanquam erronea, & omnino falsa abiicienda erit. quam opinionem cur quidam fortè ad Gal. mentem tanquam veram sibi persuaserint, post pauca declarabimus: ea autem quæ nos pro vera ac firma statuimus, iuxta Gal. decreta habenda erit. huic nanque eius dicta videntur esse consona, vt ex veris ac lucidissimis assumptionibus & auctoritatibus locupletius supra demonstratum est. Huius autem dissidij in Galeni dictis causa, quod videlicet in corpore cerebri, aut in medio ventriculo principes perficiantur operationes nulla alia esse poterit, quam quod nullibi in eius commentariis reperitur liquidò suam explanasse sententiam: fortè quia non satis illud perceptum ac cogitatum ei fuerat, nec linealibus demonstrationibus confirmare potuisset. quare sine vlla demonstratione illud confirmare indecens erat, ac philosophi grauitate auctoritateque indignum: vt enim de ipsius animæ rationis substantia vbique locorum veritas ac firma proferre sententiam: pari ratione de eius principibus facultatibus: cum, si incorporea ea sit, ac in cerebro velut in arce resideat, eas functiones alio modo operari forte celsendum esset, quam si insitus calor, vel spiritus, aut tota ipsius cerebri constitutio, vel temperamentum sit. Qua de re indubitè asserere audeo (si anima incorporea quædam substantia sit, ac in ipso cerebri corpore velut in domicilio habitet) ad Galen. sententiam, in ipso quoque cerebri corpore, vt diximus, eam principes operationes operari. & cum incorporea res quædam sit, pro præcipuo organo ad eas obeundas, quia circa phantasmata operatur, quæ dependentiam quandam cum materia habent, eo vtitur animali spiritu, qui in cerebri corpore dictus est contineri, per ipsum principes facultates cerebri corpori dispensans: velut eo, qui in ventriculis continetur, vtitur (vt supra retulimus) pro sensibus & voluntariis motibus perficiendis in propriis eorum instrumentis, ad quæ facultatem transfinit. consonum nanque est huic spiritum animale, qui in cerebri corpore continetur, otiosum non esse, ac non alia ratione animale dici, quam quod animæ sit primum instrumentum: velut milles declarauit Galen. nec insuper animam eo vti oportet pro externis operationibus: cum abundans is sit, qui in ventriculis habetur ad perficienda hæc munera destinatus: aptius siquidem existens instrumentum, ac promptius pro ipsis obeundis, quam is qui in cerebri corpore existit. Reliquum ergo est quod pro obeundis principibus functionibus anima hoc vtatur spiritu animali, qui in cerebri corpore continetur, velut primo eius instrumento, si incorporea ea sit, ipsaque functiones in eodem cerebri corpore perficiat, quo loco habitat. at, si corporea quædam res ipsa existat, & hæc aut insita caliditas, vel spiritus cerebri, aut tota ipsius constitutionis species, seu temperamentum ex seipso has facultates habens, in semetipso quoque prædictas functiones principes operari censendum est: cum nulli alteri parti eas intiet atque committat vt prius diximus, & ita pro obeundis ipsis nullo indiget animali spiritu, nec etiam eo, qui in ipsomet corpore

cerebri continetur. suscipit nanque phantasmata in seipso, quæ & memoratur in comet, & super ea discurrit absque alio animalis spiritus auxilio: cum eo non indigeat pro facultatis vehiculo, velut indiget in reliquis functionibus externis. habet namque eas in semetipso in propria eius constitutione, seu temperamento. & propterea ex se operari potens est, prout operatur citra alicuius animalis spiritus subsidium. At mox instaret quispiam, spiritum asserens animale in cerebri corpore consistentem otiosum fore necessarium, si eo anima non indigeat pro obeundis principibus functionibus. Cui responsum sit, non propterea supernacaneum ac otiosum esse, quia pro perficiendis prædictis functionibus principibus nullam fert opem, si anima corporea quædam substantia sit: nam eo vtetur anima pro sensibus perficiendis, cum longo tempore, aut vehementer ipsos in propriis instrumentis operatur, & eo, qui in cerebello, vtitur in diutinis ac vehemensis motibus voluntariis. quod quidem olfecisse videtur Gal. 8. de Vsu part. cum aduersus Erasistratū de varia cerebri constructione ac perplexu verba fecit. Quare, licet eo spiritu animali, qui in ventriculis residet, pro obeundis prædictis externis functionibus, tanquam primo instrumento, vtatur anima, vt vbique locorum testatus est Gal. non tamen propterea indecens erit, quod in huius defectu, cum scilicet vehementer ipsa sensum & motum voluntarium operatur, ad eorum instrumenta facultatē transmittens, quod hoc quoque animali spiritu, qui in cerebri corpore est, tanquam instrumento, vtatur. Illud quod nec vnquam visus est Gal. negasse, mediæque illa interualla, quæ partes tum cerebri, tum cerebelli conneunt, eiusdem spiritus esse vias, vt idem Gal. testatur 8. de Vsu part. Nec insuper hoc quicquam pugnat his quæ supra diximus de huius spiritus usu: cum, si incorporea sit anima, eo præcipue, tanquam primo instrumento, ad exercendas principes iam dictas functiones in cerebri corpore vtatur: interimque eo pro externis operationibus perficiendis abutitur: licet eo primo, qui in cerebri ventriculis continetur, pro instrumento vtatur, vt prius diximus. at, si anima res quædam corporea sit, & eo non indigeat pro obeundis principibus functionibus, cum cerebrum in seipso has habeat facultates, ac in semet eas perficiat: reliquum est vt hoc spiritu animali, qui in eo residet, pro reliquis eius operationibus externis exercendis vtatur: nam propterea animalis dicitur, quia animæ instrumentum existit. & quamuis eo primo vtatur, qui in cerebri ventriculis continetur, pro vehiculo facultatem ad externa organa sensus & motus, vt Gal. visum est: quia tamen sæpenumero euenit vt hic in vehementioribus ac diutinis sensibilibus & motricibus operationibus consumatur, ac ei paruum nutrimentum ex inspiratione & plexu reticulari suppeditetur: ea de re tunc hoc, qui in eius corpore est, pro eodem usu, vt alienum à ratione non est. Hic ergo tribuendus erit usus huic animali spiritui, qui in cerebri corpore continetur, tam si incorporea, quam si corporea quædam res sit anima, iuxta Galen. doctrinam, quæ principes operationes, cuiuscunque sit naturæ, seu substantiæ, in cerebri corpore (vt relatū est) operatur: quod satis rationibus & auctoritatibus, tanquam verum ac Gal. decretis consonum, abundantissime fulcitum est. Si qua tamen cōiectari, seu cōstitui possit ipsius cerebri pars, in qua

cap. 13

Locus cit.

cas perficiat, illa, quod medius sit ventriculus opinari, non nimis præter rationem est Galeni placita supponentibus nobis de anima nostra: quanquam de ea perpetuo, quod de foris corpori organizato adueniat, quodque ei delegata à Deo benedicto immortalis & corruptibilis creata sit, & credam & firmiter teneam. Persuaserunt verò sibi quamplurimi, vt dictum est, ex Galen. sententia has principes facultates secretas, ac locis sedibusque seunctas esse, decepti quidem ex his quæ de earum operationū laesione asserit. cum etenim audissent phantasiam alias lædi posse, salua ac constante ratione & memoria: alias verò aut rationem, aut memoriā conturbari, reliquis duabus illaesis atque valentibus: statim concluderunt isthæc provenire non posse, nisi, quæ effectrices earum sunt facultates, locis ac sedibus disiungerentur. Quod verò vna earum lædi possit, altera illaesa permanente, phrenitidis exemplo. 4. de Loc. affe. idem Galen. confirmavit. cuius duas conscripsit species, seu simplices differentias, ex quibus deinceps tertia componitur, vt ipse asserit: in quarum vna imaginatio tantum deprauatur, vt non modò in aliis, verum in seipso expertum fuisse testatur. cum nanque æstate febre ardente laboraret, putaretque festucas atrii coloris ex cubili eminere, & floccos similiter in vestibulis esse, eos auferre dum properaret, nihil sub digitis eductum inueniens, accuratius rursus, vehementiusque id efficere conabatur, cumque amicos audisset, qui secum aderant dicentes eum floccos euellere, & festucas colligere, illaesa in eo manente adhuc ratiocinandi facultate, respondit eos rectè dicere. proinde, vt ei auxilium ferrent, rogauit: ne phrenitis ipsam arriperet, adhibitisque auxiliis curatus fuit. In altera verò phrenitidis differentia accidit quod cogitatio, seu rationalis discursus, à naturali iudicio aberret: veluti Romæ cuida, qui cum lanifico puero continebatur, euenisse scriptum est. hic intus ianuis obseratis à cubili surgens ad fenestram accessit, per quam & ipse videri, & prætereuntes videre poterat. ex vitreis itaque vasis singula ostendens, interrogauit, imperarentne, vt ea proiiceret. illi verò ridentes annuebant. tū ipse deinceps proiecit omnia cumque interrogaret iterum puerum ne proiici iuberent, eo illi iussu, & illumner proiecit. Huic nec imaginandi functio erat oblata, cū singula vasa propriis nomēclaturis probè nominauerit, neque nominum memoria erat deleta: tantum ergo cogitandi functio erat deprauata. Quod autem ex his duabus differentiis tertia componi possit, licet exemplo non comprobauerit, eo tamen loco asseruit Galen. confirmavitque lib. de Diff. Sympt. cum dixit: Accidit plerumque vt delirium ambas actiones obturbet, vt neque benè procedat imaginatio, neque debita fiat ratiocinatio. Interdum vna duntaxat læditur, veluti Theophilo Medico ægrotanti euenit, cui imaginatio tantum oblata fuit: ac illi, cuius historiam supra narrauimus de lanifico scilicet puero, iterum ibi facta mentione, cogitationem, seu discursum duntaxat aberrasse asseruit. Ceterum, quod memorandi facultati idem quoque accidere possit, Thucididis testimonio eodem loco confirmavit: qui nonnullos è pestilentia seruatos, adeo omnium, quæ antea nouerant, fuisse oblitos commemorat, vt non solum suos familiares non agnoscerent, sed ne seipsos quidem. Ex his denique omnibus sibi ipsis fortè persuaserunt quidam ex Gal.

sententia in diuersis sedibus atque locis prædictas functiones principes ab ipsa anima exerceri: cum vnam lædi, altera illaesa permanente, fieri haudquam posset: si in vno duntaxat loco cerebri perficerentur. Verum, cum nos aliter sentiamus, rationes quoque assignare conabimur, quomodo, etsi prædictæ functiones in vna eademque sede perficiantur, velut supra probauimus, possit interdum vna lædi, quæuis earum sit, aliis permanentibus illaesis, in ducem tamen, atque patronum Galen. perpetuo adhibentes. Pro huius ergo dilucidatione illud pro comperto in eiusdem Gale. doct. habendum erit, quod, siue corporea res quædam, siue incorporea sit ratiocinatrix anima, eius functiones principes, cum in cerebro ab eadem exerceantur, ex quauis eiusdem cerebri intēperie lædi possunt, siue ea per essentiam sit, siue per consensum, quinimo non tantum ex eiusdem intemperie, verum ex quouis alio vitio in prædicto cerebro exorto: & vt summatim dicam, à quibusvis ferè malis ipsius cerebri. Hoc non tantum percipi potest ex his quæ Galen. dixit lib. de Diff. Sympt. de phrenitide, & 4. de Loc. affe. vt supra annotauimus, per ea quæ asserit de sopore, verum etiam lib. 2. de Cau. Sympt. circa finem, & lib. Quod animi mores corporis sequantur temperaturam, prolixo sermone illud comprobauit, cum dixit, Porro à corporis malis vim animæ afferri, luce clarius in melancholiis, & phrenitidibus, & furoribus apparet: namque vi morbi neque seipsos, neque necessarios agnoscere. quod Thucidides quoque pluribus vsu venisse ait, & in morbo pestilentia non multos iam annos defauiente, quam vel ipsi vidimus. proinde esse videbitur, atque ob oculorum fordes, seu suffusionem facultate ipsa videndi nequaquam percella, non cernere, ac pro vno tria videre: ipsius visoriae facultatis non mediocris affectus est. id quod phrenitidis est similis. Quod quidem Hippocratis, Platonis, & Aristotelis, auctoritatibus confirmare non piguit, veluti per otium quilibet videre poterit: Hippocratem videlicet lib. de Aëre, regio. & aquis, & in Aphorismis quamplurimis: Platonem verò in Timæo præsertim, ac in aliis eius libris: Aristot. libro de Parri. anima. ac de eorundem historia, etsi Arist. in sanis tantum corporibus fortè loquatur. Hippocratis tamen, atque Platonis dicta tam in fanis, quam ægris veritatem habent, vt ex eorum decretis quiuvis percipere poterit. Immutantur denique animæ functiones à cerebri vitiis præsertim principes, ac quouis modo non tantum vitiuntur, verum, si eius vitia supra modum augeantur: valent ipsam, si incorporea res sit, à corpore seiungere, & tandem dirimere. Si verò quoddam cerebri temperamentum sit, quæ ratiocinatur anima, cum eius facultates ex eiusdem cerebri essentia, seu substantia consequantur, oblata ipsius temperamento, necessario principes vitiuntur functiones oportet. & si criminum affectio creuerit, delstrui omnino temperamentum est necesse, deleri facultates, & interitum sequi: vt idem Galen. præallegato lib. Quod animi mores corporis sequantur temperaturas, decretum reliquit. At quid in hoc testes adhibere Hippocr. Platon. Aristot. Gale. opus est: cum id quotidie obseruare experientia liceat: conspiciamus enim quolibet ferè die à diuersis corporum malis diuersas quoque noxas animæ afferri, diuersimodèque principes animæ functiones lædi, ipso præsertim cerebro

rebro quomodolibet affectio: interdum vna, sepe numero duabus, & quandoque cunctis oblata, et si quidam eruditi viri aliter sentire videantur. nam & imaginationem, & memoriam lædi posse affirmant, nondum ratione deturbata; verum quod ratio lædi possit, seu ratiocinatio, constante cum memoria, tum imaginatione, nequaquam cōsentiunt: cum neque argumentario vlla, ut ipsi fatentur, neque euentus vllus, nec vlla prorsus experientia illud cōmonstret. Quomodo naque fieri poterit (inquiunt) ut mens ratiocinando labatur, atque vacillet, nisi cōmentitia quadam illusio ab imaginibus irrepat, quæ illam obturbet; quod si afferatur phreneticus fictilia vasa ab alto detrudens; dicunt, quod hic si læsa mente malè ratiocinabatur, necesse simul erat eundem perperam phantasia comprehendere: nam quo ordine, quæve connexion in veram rerum cognitionem; similiter etiam in turbulentis errores, falsamque opinionem inducimur atque rapimur, si qua horum efficiens causa non præcesserit: non igitur fieri potest (ut isti inquiunt) quod ratiocinatio, seu mens offendatur, quin primus communis sensus, qui omnium interiorum primus ac infimus est, seu phantasia turbetur, seu lædatur. At, qui cur in hanc ipsi sententiam proruperint; non parum miror: cum eius oppositum & ratio, & auctoritas, & experientia cōmonstret. Ratio quidem: nam licet hæc operationes quendam inter se ipsas ordinem obtineant, utpote qui ratiocinari non valeamus, ni imaginatiua opus præcedat: discurret nanque mens, seu intellectus super ea, quæ in phantasia seruata sunt phantasmata, tam si valeat, quam si non: interdum tamen discursus obledì potest in sua propria essentia, cum actio & facultas sit separata atque seiuncta à cōmuni sensu, & phantasia, nulla suscepta offensa ab ipsius imaginatiuæ oblatione, nec à falsis imaginibus illusa, seu decepta. nā quid quæso obest, quod imaginatio rectè procedat in apprehensionibus simplicibus, ipsa verò mēs, seu intellectus diminutè, seu deprauatè, aut nequaquā circa ea operetur eius propria facultate læsa, & nō à fictis simulacris, seu imaginibus illusa: velut accidit, cum primò imaginatio læditur, & ei discursus cōsentit. depēdet enim mentis operatio à phantasia eo videlicet, quod ratiocinari nequit, nisi super ea, quæ in imaginatiua detinentur, phantasmata discurrat. at, quod bene, vel malè illum perficiat discursum, ex se ipsa habuit primò. nam, cum valet, bene: cum verò malè afficitur, non rectè ratiocinatur, interdum per se, sepe numero verò secundariò oblata, nulla prorsus offensione suscepta à cōmuni sensu, seu phantasia; cum facultas & actio sit (ut diximus) separata omnino, ac seiuncta ab ipsa imaginatiua. Nec propterea quod omnium interiorum sensuum primus & infimus sit communis sensus: perpetuò is prius debet turbari ac offendi quàm mens & discursus; nā, quamuis in vera rerum cognitione, cum hæc facultates valent & naturaliter operantur, is seruetur ordo ac connexio, ut ratiocinari quicquam nequeat mens, ni phantasia prius operetur, ac in seipsa phantasmata & simulacra detineat: in morbois tamen affectibus perturbari potest hic ordo, ac connexio solui cum ex offendentiū causarum, seu affectuum diuersitate, tum ex maiori, vel minori prædictarum facultatum præparatione. ex quibus sit ut modò vna, modo altera, aliàs verò cun-

ctæ functiones lædantur, ut paulò post declarabimus. Testatur hoc idem Galen. in quamplurimis locis, potissimum lib. de diffie. Sympto. quod scilicet ratiocinandi functio lædi possit, imaginandi & memorandi facultatibus illatis permanentibus, id quod phrenetici exemplo, qui obseratis ianuis singula vasa per fenestram protulit, comprobauit. at, si velint quod huic quoque imaginandi actio fuisset oblata; Gal. eodem loco oppositum sentit inquiens, Illi phrenetico neque imaginandi functionem fuisse læsam, neque nominum memoriam deletam: cum singula vasa propriis nomenclaturis probe nominauerit. quibus verbis & id quoque destruitur, quod ipsi afferunt, quod videlicet, cum quispiam malè ratiocinatur, de eisdem saltem opus est sensum cōmunem, seu phantasiam nō rectè fingere; licet de aliis rectè imaginari contigerit; nam Gal. prædicto loco dicebat, quod prænarato phrenetico circa illa, quæ malè ratiocinabatur, imaginandi functio non erat læsa, nec nominum memoria deleta. quo fit ut circa eadem, iuxta Gale. decreta, contingat quæpiā non rectè ratiocinari, memoria & imaginandi functione permanentibus illatis. Ad hæc 3. de Loc. aff. cum de memoria deperdita, ac stultitia verba facit, asserit stultitiā esse intellectus, seu discursus amissionem: & quod interdum accidat, ut vitiata ratione, memoria quoque lædatur, velut læsa memoria rationem quoque interdum lædi cōtingit. Nam vtraque affectio ex frigida cerebri intemperie ortum habet. Quibus verbis liquidò ostendit Gale. rationem duntaxat posse interdum vitiari, quandoque simul cum memoria, imaginandi functione nequaquam oblata, ut in stultitia: quam etiam in numero affectuum cogitandi functionem lædentium libro de Symptom. differentiis connumerauit, & non imaginationem. Hanc eandem sententiam scripsit Aëtius tetrabibli. sermone, & cap. 2. tractans de phrenitide, dum dixit: Differentia autem phrenitidis plures sunt, sed tres principalissimæ: aut enim imaginatiua facultas solum læsa est, seruatur autem ipsis ratiocinatiua, & memoria: aut ratiocinatiua solum læsa est, seruatur autem imaginatiua, & memoria: aut etiam imaginatiua læsa est, seruatur autem memoria. Quid clarius, quàm ratiocinatiua solum lædi posse in quibusdam phrenitidibus, imaginatiua, & memoria illatis permanentibus, ut testatur Aëtius; quod quidā etsi nulla ratio, vel auctoritas cōmonstrasset; quotidiana experientia comprobatur. vidimus etenim nos non semel, velut & alij quidam non vulgares Medici frequenter obseruauit, in ægris non paucis mentis læsionē, imaginatiua haudquaquam, nec memoria affecta: nuperque, dum hæc conscribere, iis, qui mecum aderant, obseruari feci in quodā Francisco Raimo nobili Capuano; cui cum ratiocinatio omnino propter febrem deprauata esset; nulla in imaginatione offensa aderat; cum simplicia cuncta rectè cōprehenderet. Quod si ratio, auctoritas, ac experientia non imaginatiuā duntaxat, aut memoriam, verum & rationem, seu discursum solum affici interdum posse cōmonstrent: quoniam cunctæ hæ functiones iuxta Gal. sententiā in vna eademque sede perficiuntur, in ipso videlicet cerebri corpore, ut probatū est: non ab re in dubium venit qua ratione id fieri queat, cum sedibus non seiungantur. Cuius quidem cum non facile sit ratio-

nem tradere, non mirum si nonnulli non vulgares profecto, sed eruditi viri prædictas facultates ad Gal. mentem locis sedibusque sciungere ausi sunt, ut prius diximus. At nos ex eiusdem Gal. monimentis edocti conobimur huius rei causas assignare, quamvis eodem loco, eademque sede prædictæ functiones perficiantur: in memoriam rursus reuocantes primo, quod ex cerebri vitiiis (ut probauimus) eadem facultates lædi possunt interdum vna, interdum altera, quandoque duæ, vel omnes simul: cum ab ipso solo principio proueniant, in eiusque proprio temperamento consistant, velut cunctæ aliæ functiones eius, (etsi non tantum ab eo perficiantur) cuiuscunque substantiæ sit anima, proinde nihil aliud esse facultatum essentiam, seu substantiam, quam temperamenti proprietatem, quæ quidem cuilibet parti propria ac peculiaris inuenitur, à Gal. scriptum reperitur lib. de mult. & lib. 5. de Loc. aff. quo fit ut, si contingat hanc peculiarem temperiem à quauis causa, potissimum ab vna octo intemperaturarum perturbari: ipsis quoque viribus noxam accidere necessario oporteat, magisque peculiarem offensam viribus excitari, prout illi debetur intemperantæ, quemadmodum Gal. 5. de Loc. affe. & 3. de Cau. sympto. docuit. proinde euenit, ut, quamuis in vna et alicuius partis temperamenti proprietate plures sint facultates, ac eas strenue exerceat ubi temperatissima fuerit, & male fungatur ubi intemperata fuerit pars: & hæc tenus male, quatenus intemperata fuerit, velut patet primo de Præfagitione ex pulsibus: videre tamen liceat non omnes illico offendi, cum intemperata pars efficitur, verum sæpe vnam, interdum aliam, quandoque plures lædi conspiciamus: quemadmodum in naturalibus quoque facultatibus cuiusvis partis quotidie obseruamus: vna videlicet, vel duabus effectis, aliis illæsis permanentibus. Cuius rei testimonium pariter reddit Gal. eodem 5. de Loc. aff. cum de iecmoris affectibus verba facit. & 6. ubi de renum affectibus, & propriè de diapete. pertractat, & magis vniuersaliter 3. de cau. Sympto. Illud quoque mente concipiendum, quod, licet quædam facultates, cum valet pars, cuius sunt propriæ, quodam ordine, quadamve connexionione, diuersis temporibus ab ea exerceantur, ut videre licet in naturalibus ipsis viribus: nam primò pars vititur familiarium attractione, deinceps eorundem retentione, & alteratione, vltimo loco, quod alienum est, excernit; peruertitur tamen ordo sæpenumero, soluiturque connectio, cum eadem pars intemperata reddita est. quod quidem effici posse nequaquam arbitrandum est, nisi propterea quod, cum à diuersis causis ipsa effici intemperata queat, pro ratione maioris, vel minoris præparationis dictarum facultatum, ac pro causarum diuersitate, modò vnam, modò alteram, vel plures lædi contingit: velut non tantum in facultatibus ipsis, verum etiam in febrium subiectis quotidie obseruamus. nam quamvis spiritus paratiores sint, quam humores partesque solidæ, ad calorem præter naturam suscipiendum, cum tenuioris sint substantiæ: omnisque tenuis substantia prius alteretur, quam crassa, primo de Differentiis febrium, & insuper humores, quam membra: non tamen perpetuò, quæ incipit febris, diaria est, sed putrida interdumque hectica esse potest, ut eodem primo de Differentiis febrium patet. cuius euentus causa assignatur prædictorum subiectorum maior,

vel minor præparatio; cum magis lædi possit ab vna, vel altera causa, à qua primum homo cepit febrire. Pari modo nec illud mirum videri debet, quod cerebro diuersimode affectos, quamvis in eodem loco, eademque sede principes eius facultates perficiantur, in proprioque eius temperamento consistant, vnam interdum, aut alteram, vel plures earum lædi contingat. & quamvis, cum ipsum cerebrum valet, imaginandi functio præcedat, subsequaturque ratio, & memoria, paratiorque sit imaginatio, ut lædatur; non propterea, cum intemperatum redditur, necessario à quauis causa imaginandi functionem primò lædi oportet: verum indifferenter) ut de naturalibus facultatibus diximus) possunt vna, vel altera, aut plures lædi, prout paratior vna facultas inuenitur, ut lædatur magis ab vna, vel altera causa. Pro maiori ergo præparatione vnius, vel alterius facultatis ad hanc, vel illam offensionem suspiciendam, ac pro lædentis dispositionis varietate contingit vnam modò, vel alteram, plures, aut omnes principes facultates lædi, quamvis in vna eademque sede perficiantur, ut diximus. Cocomiratur insuper hæc, diuersa ipsius cerebri pars, quæ primò afficitur. nam omnium principalium virium animæ affectus in cerebro consistere apud omnes Medicos in confesso est, velut 3. de Loc. aff. testatur Gal. Et, ne tyrannorum ritu hæc affirmare videamur circa eiusdem Gal. auctoritatem, ad ipsum confugiemus. 13. de Loc. aff. dinumeratis quibusdam capitis ac cerebri affectibus, ex quibus diuersæ principes functiones turbantur, dixit eos differre tum pro diuersitate dispositionis & causarum, aut eo quod magis, vel minus eadem intenduntur: vel veritate mixtionis dictarum dispositionum, & hoc totum ex parte efficientium causarum, ac lædentium morborum, namque ex infrigidantibus cerebrum causis, eiusque intemperie frigida memoriam lædi contingit, & si eadem vehementius intendatur, simul cum memoria læditur ratio: quæ affectio stultitia nominatur. Similiter quoque accidit in lethargo ac omnibus soporosis affectionibus, etsi ex his imaginationem quoque veluti resoluam contingat. consuevit namque (eodè Gal. auctore) frigida intemperies animales actiones torpidas efficere; id quod animalia, quæ per frigora latere coguntur, haud obscure declarant, ac in frigidis medicamentis & cibis videre licet. Ex quibus concludo ad Gal. sententiam, stultitiam & obliuionem à frigore ortum habere: cum videlicet ex his cerebri corpus refrigeratum est ut idem testatur 2. de cau. Symp. Verum, si non vehementius intendatur frigiditas, obliuionem causat, memoriamque lædit, si autem intendatur, stultitia oritur, atque mens, seu cogitandi functio impeditur ac torpida efficitur, eodem auctore 3. de Loc. affe. ex oppositis verò causis, calfacientibus videlicet, velut oppositi morbi in cerebro excitantur, ipso immodicè calfacto, ita & opposita vitia, ut vigilia, delyria, phrenitides, diuersimodeque principes functiones læduntur: non tantum quia ex calidis afficiuntur dispositionibus, sed etiam quia leuiiores, aut vehementiores existunt. Namque ex biliosis succis febrem ardentem generantibus, si vapores ad caput ascendant non multi, nec admodum acres: delyrium oritur, eaque princeps facultas potissimum læditur, quæ minorem habet oppugnandi vim, ut lædatur. hæc verò phantasia est, quare imaginandi functio tunc offenditur. At, si multi, acresque, & vitiosi fuerint, non imaginatio,

ginatio, sed cogitatio aberrabit. Quod si multi ac admodum acres sint, utraque deprauantur. Nec diuersa quoque ratione, orta phrenitis nonnunquam mitior est, utpote cum a pallida bile ortum habuerit, imaginandique facultas turbatur, ceu promptior ac paratior ut a leuioribus causis lædatur, præsertim calfacientibus. At, si vehementior fuerit, cum videlicet flaua bilis camparis; præptius mens, seu ratio vitatur, utpote magis apta ut ab hac offensionem suscipiat. ubi vero fuerit vehementissima ex eadem flaua bile excitata, adeo tamen acri & calfacta ac ferè præassata, ut velut serina sint deliramenta; euenit ut tum imaginatio, tum cogitatio deprauentur. Ex his denique dispositionibus calidis non modo alia; atque alia facultates læduntur principes, eò quòd magis minusque intenduntur, & secundum quòd magis minusque obnoxia sunt hæc facultates his lædentibus causis: sed ipsarum læsionis modus alius est ab eo qui a dispositionibus frigidis excitatur, ex ipsis namque minus intellis memoria primò: quòd si intenduntur, ratio quoque læditur ut diximus ac imaginatio interdum, ut in veterno & lethargo, læsionisque modus velut deficiens est, torpidus, seu resolutus. At ex calidis dispositionibus, non quidem vehementer auctis, imaginandi facultas primò, & si intenduntur, mens & ratio, ac: si vehementius intenduntur, utraque afficiuntur: eritque earum læsionis modus non deficiens & resolutus, sed deprauatus & errans, & proinde cerebrum, ubi in morbosam intemperiem incurrerit, necessario symptoma, quòd intemperiei familiare est, inducit, ut 4. de Prælag. ex pul. patet. nec tantum ex oppositis, seu dispositionibus diuersis cerebrum offendentibus, contingit diuersas principes functiones lædi, easque diuersimodè (prout promptius, aut ægrius quaque earum parata est) offensionem suscipere, quinimmo ex veritate mixtionis prædictarum causarum: quæ cum multiformiter commisceri queant, varia cerebri vitia pariunt pro mixtionis modo, varias insuper ex ipsis noxas contrahunt functiones principes. nam modò vna, modò altera, vno, vel alio modo, pro earundem etiam

diuersa præparationis ratione, lædi conspiciuntur. quæ quidem abnegare extremæ esset dementia, cum in dies illud quiuis in ægris curandis etiã parum exercitatus observare valeat. Et, quamuis hæc functiones principes (ut diximus) in ipsius cerebri corpore periciantur: non ex qua tamen oritur in earum læsione differentia, cum videlicet cerebrum ipsum secundum diuersas eius partes primò afficitur. Cuius rei non immemor Gale. 3. de Loc. affect. testatus est cerebri effectus non tantum inter se differre mixtionis varietate, aut eo quòd magis, minusve intenduntur eorum causa, verum etiam, quia ventriculi cerebri interdum afficiuntur, interdum eius vasa vniuersa, interim humiditas, quæ per eius corpus dispersa est, aut eum ipsummet cerebri corpus intemperatum redditur. non enim verendum est, quòd pro ratione diuersarum cerebri partium primò affectarum possint & ipsius varia oriri vitia, ac diuersa functiones lædi, quamuis hæc in ipsius cerebri corpore ab anima exerceantur. nam alia ratione consentit cerebri corpus, cum eius ventriculi primò afficiuntur, alio modo cum eius vasa, seu humiditas, quæ per ipsum dispersa est. Diuersa quoque ratione ipsæ functiones læduntur, si ipsius cerebri corpus præter naturam primò afficiatur. quæ insuper ratione euenit, ut interdum vna, interdum alia noxam suscipiat, et si sedibus non seiungantur. Ex quibus satis admodum demonstratum esse censeo, Gal. duce atque auctore, quæ ratione contingat vnam interdum, vel alteram functionem principem turbari, aut quouis modo offendi, altera illa permanent; quamuis in vno eodemque loco consistent, ut diximus, ac ab ipsa anima in cerebri corpore exerceantur. quæ cum hucusque à quibusdā percipi non potuerint, conati fuerunt ad Galeni mentem, ut ipsi fatentur, licet falsò, prædictas functiones locis ac sedibus seiungere, maximam Galeno iniuriam inferentes: cum id apud eum scriptum nullibi reperiatur, quinimmo ab eiusdem monumentis alienum, eiusque sententiæ pugnans omnino est, ut ex his, quæ suprà diximus, liquidò constare potest.



DONATI ANTONII ALTIMARI,

Quod naturalis spiritus in Galeni doctrina admittatur: & non omnino abolendus sit, ut quibusdam visum fuit.



VI naturalem spiritum in Galeni doctrina, tanquam non necessarium abnegant, hac prima ratione id probare conantur. Spiritus naturalis, (inquiunt) si necessarius sit, non propter aliud vtiq; nisi ut vehiculum naturalium facultatum existat, altricis præsertim, ad membra ipsa. Atqui hæc cognatæ cunctis partibus sunt, veluti magneti lapidi vis qua

ferrum attrahere potest, Galeno auctore primo de Locis affectis circa finem. quare ut eis ab aliqua parte vis hæc influat, superuacaneum est. Non ergo spiritus naturalis ad partes ipsas naturales facultates suppeditat; & propterea neq; necessarius existit. Potest & hæc eorum ratio corroborari Galeni auctoritate libro Artis medic. ca. nono, ubi de partium differentis loquutus, quasdam dinumerauit, quæ nec aliarum gubernationi præfunt, nec aliunde gubernantur: cum insitas habeant à natura potentias, à quibus reguntur: ut cartilago, membrana,

os, ligamentum, &c. At, si spiritus naturalis nutriendi vim ad corporis partes deferat; nulla daretur præarrata differentia pars, & Galen. tanquam superflua ponens condemnandus esset. Insuper, cum partium essentia permanens non sit, sed continuè diffusetur ac mutetur, venis & arteriis (Galeno teste primo de Locis affectis) indiguerunt, ut nutrimentum eis deferatur, ac innati caloris temperies seruetur. At per venas nutrimentum eis distribuitur, per arterias caloris symmetria seruatur. nullo ergo alio tertio, nec spiritu naturali opus erit. Deficit quoque materia pro spiritus naturalis generatione, ut hi opinantur. Nā, si qua esset materia, ex qua naturalis procrearetur spiritus, ea vitalis spiritus esset, materia, ex quo animalis gignitur. Eius verò generatio prima in corde fit, & ab eo in vniuersum corpus per arterias diffunditur. qua de re, cum multo plures sint nostri corporis partes, quæ vi egent naturali quàm quæ animali: necessarium utique esset magnas, immo maximas arterias ad iecur peruenire, tantam vitalis spiritus copiam suppeditantes, quæ pro naturalis materia sufficere posset. At per corporum dissectionem, & Galen. quarto de Vsu part. cap. decimotertio, constat ad finem tantum iecinoris partes, & eas quidem valde paruas, arterias inferi, per quas tanta spiritus vitalis copia, ut ex ea naturalis gigni posset, non defertur: quam tamen multam esse oportuisset si ex ea naturales spiritus gigni deberent. At, si quispiam dixerit non hanc esse spiritus naturalis materiam, sed sanguinem, qui in iecore fit: eum esse non posse arguunt, cum is crassus ac turbulentus, necdum ab aliis humoribus emundatus sit, ut idoneus fiat ad eius generationem: deficit ergo materia. Sed nec locum in iecinore esse, in quo possit naturalis spiritus generari, utpote cum nulla in eo sit cauitas, veluti in corde & cerebro manifestè cernitur. qua de re deest & locus pro eius generatione. Præterea nec canales, seu meatus, suppetunt: per quos, ubi genitus iam fuerit, valeat ad membra deferri: Nisi quispiam dixerit per venas vnà cum sanguine spiritum transire. quod tamen nec corpus venarum patitur, vnica tantum tunica contentum: nec motus, seu pulsus indicat, qui venæ non secus ac arteriæ adesse deberet. Vltimo loco non dari spiritum naturalem probat, cum nulla via pateat aëri quo is nutriti valeat, veluti animalis & vitalis. deficeret ergo vnus eius nutrimenti modis. Qua de re, cum nec finis addit, ob quem eum gigni oporteat nec materia, ex qua vel generari, vel conseruari possit: nec locus idoneus, in quo gignatur: nec via, per quam ad membra mittatur, ex prædictis probabilibus rationibus iure omitti ac negari ad eorum mentem potest. Vt autem rei propositæ dilucidius veritatem assequi valeas, quid per spiritum intelligendum sit animaduertas oportet. Est autem, ad Gal. mentem, corpus quoddam calidum, tenuissimæ ac leuissimæ substantiæ, ex aëre & tenuissima, leuissima ac syncerissima parte sanguinis, seu feminis genitum. Quod corpus sit calidum, patet 5. de Simplic. med. fac. quo loco innatum spiritum calidum appellauit: & commentario aduersus Lycum. ita de aliis dicendum, cum ab eo calidaque materia originem ducant. At, quod substantia eius sit leuissima ac tenuissima, apud eundem auctorem patet 3. de Nat. facul. ubi asseruit omnium, quæ in corpore sunt, leuissimum tenuissimumque esse spiritum. Quod ex aëre ac sanguine halituofo & tenui

gignatur, decretum reliquit Gale. 6. de Vsu part. II. ac 12. Met. med. ac fœcētis aliis locis. Quod verò ex semine, 14. de Vsu part. & lib. aduersus Lycum, patet. Huius spiritus duæ primæ differentiæ iuxta eiusdem auctoris sententiam assignari possunt: nam quidam fixi ac stabiles sunt, qui innati ab eo appellantur 5. de Simplic. med. fac. quidam verò vagantes ac errantes sunt, & influētes. Hi vero spiritus, qui infusi ac innati dicuntur: cum in omnibus animantis partibus contineantur, non tamen vndequeque similes, veluti nec etiam sanguis, adeo in simplicibus ac primis solidisque animalis partibus fixi ac implantati sunt, (ex sanguinis, ut diximus, & feminis leuissima ac tenuissima parte geniti) ut toto vitæ curriculo iidem permaneant. etsi eorum substantia quolibet ferè momento tum minor, tum maior cōspiciatur, nunquam tamen in totum dissipatur. Nec parua eorum substantia in spatiis inanibus dictarum partium inest: immo potius ea veluti materia quædam, leuissimam etiam mutationem exposcens, est ad innati spiritus qualitatibus suis absolui generationem. poterit autem hæc substantia spiritus innatus appellari, cum admodum ad naturalia opera perficienda conducatur, prout 5. de Simplic. med. fac. Gale. visum est. Hunc spiritum innatum in semine contineri, spumosoque corpore, elemento stellarum proportionem respondentem, primumque fœtus principium esse Arist. 2. de Gener. anima. scriptum reliquit. At Galen. qui & semen non tantum effectuum generationis fœtus principium voluit esse, sed & materiale, sic nec sanguinem menstruum materiale tantum principium, sed effectuum quoque: licet validissimè sit in semine effectiuum, materiale paucissimè, in sanguine contrà, quod ad materiam spectat plurimum, quod ad vim & facultatem imbecillimum: hunc innatum spiritum non tantum ex feminis parte leuissima ac tenuissima, verum & sanguinis menstrui simili substantia gigni voluit: licet ex semine magis. qua ratione sæpe apud eum reperies (ut 1. de Sani. tuen. & 2. de Nat. fac.) semen opificis rationem obtinere, sanguinem verò materiam ab eo quod in eis præualeat, ipsis principiis denominationem tribuens: ita ut ex vtriq; simul permixtis velut vnum fiat agens, vnum motus principium seu effectiuum, ut vtrumque in vnum motum conspiret, ac principium motus sit idem: ut patet ex eius mente tum 2. de Sem. tum 14. de Vsu part. quāquam hæc vis, seu facultas in semine magis principatum obtineat, ut diximus: est nanque ipsius animæ instrumentum primum, etsi Stoici ipsius substantiam esse autement. Hic spiritus est, qui omnes actiones naturales adauget, qui, cum in pueris copiosissimus sit, caliditate symmetrus ab Hipp. Apho. 24. 1. lib. calor innatus appellatur; etsi is verè in triplici substantia cōtineatur: ea quæ diximus, ac reliqua tū sanguinea: ex qua carnosæ partes generantur: tū serosa feminis parte, ex qua solida finguntur. Quapropter Gal. hoc innatum calidum, quod *αρχή* voc. i. primogenitum vocare Hipp. cōsuevit, nil aliud esse, quàm sanguinem menstruum, semenque; retulit lib. aduersus Lycum, asserens se nihil nouisse, præter hæc, tertium: & propterea iis, qui crescunt, plurimum inest: & iis, qui consenuere, minimus. Errantium autem spirituum differentię a Gal. 7. de Hipp. & Plat. decretis duæ conscribuntur: quarum vna vitalis spiritus, altera animalis dicitur. Vitalem appellat eum, qui in corde & arteriis continetur: est enim cor eo-

dem auctore 6. eiusdem, sicuti arteriarum, ita & vitalis spiritus, feruensque sanguinis principium, & fons. quo spiritu vitali medio cor, seu fons (ut diximus) insiti caloris facultatem quādam singulis partibus transmittit: per quam & earum possit intimi caloris temperies seruari, cuius gratia spiritus is à corde confluit caloris delator. Quāquam & alia quoque ratione, pulsū videlicet, prædictum innatum partium calorem custodiat, prout patet lib. de Vsu puls. Proinde actiones suas perficiunt singula partes peculiari cordis temperie, qua pereunte ipsarum quoque actiones perire necesse est: prout ipse 5. de Loc. aff. testatur. Altera differentia animalis spiritus appellata, nō quod substantia animæ sit, ut Stoicis placuit, sed quod is primū eius instrumentū in cerebro continetur, præsertim in eius ventriculis, posteriori & medio: hoc liquidē (cū ipsa voluntariis actionibus vnā cum sensibus præsideat) ad sensus omnes, cū eos motus, qui à consilio & voluntate prodeunt, vititur, ad prædictū instrumentū eo medio facultatē suppeditans. An verò tam vis, seu facultas, quā substantia ad prædictā sensus & motus instrumentū insinat, vel vis tantum, aut ad quādam vis, ad quādam verò & substantia & facultas, cū ad rem propositam scire non conferat: iure prætermittam. At lib. 12. Method. med. cum de prædictis spiritibus verba fecisset; asseruit quod, si naturalis quoque aliquis est: utique is in iecinore & venis continetur. Quo loco etsi ipsum dari non affirmet, nec omnino negauit: locum tamen signauit diuersum à prædictis, iecur videlicet & venas, si daretur. est namque & ipsum inter tres principes partes dinumeratum, quibus animal gubernatur, altericis facultatis principium & veluti fons, sicut cor caloris, & cerebrum sentiendi atque mouendi ab electione, Gal. teste cū 9. Meth. med. tū 5. de Loc. aff. & 7. de Hip. & Plat. decr. De hoc ergo principio altericis, seu naturalis, facultatis in dubium venit, nūquid instat aliorum duorum principiorum, cerebri videlicet & cordis, aliis corporis partibus spiritū aliquem suppeditet, loco & vsu ab animali & vitali diuersum, genere tamen eis consimilem, ut qui vagans & errans dicatur, qua ratione ab innato discrepet: naturalis appellatus, ut qui à principio naturalis facultatis genitus, iecore videlicet, per eiusdem proprios canales, venas scilicet, in totum corpus distundatur, quo medio naturales partium potentia, seu facultates, conferuntur, quemadmodum à vitali à corde transmissio intimus earum calor in symmetria conferuatur. Quod autem spiritus hic naturalis tantum necessarius in Gale. doctrina concedendus sit, ex infra dicendis, cuius non tantum tibi, si admodum dura ceruicis non fuerit probare conabimur, præsupposito prius eo, quod Gal. 11. Meth. meden. decretum reliquit, Naturam ex tribus partibus constare: spiritum, substantia carnosa, & ex iis quæ verè solida dicuntur: singulaque istarum triū propriam habere pro sua natura cum qualitate, tum quantitate, ac qualitas earum ex congrua temperie calidi, frigidi, humidī, & sicci consistit: quantitas vero solidarum partium par semper manet numero duntaxat his, qui inaguntur: qui verò aboluti sunt, etiam magnitudine; sed carnosa substantia magnitudo variatur, etiam si animal non augeatur: pari modo & ipsius substantia tantum non quolibet momento tum minor, tum maior conspicitur. Virtus quoque dictarum partium, vel in

his tribus simul enumeratis additur, vel in eorum proprio temperamento consistit perpetuū sui custodiam requirens: custodia verò similitum exhibitionem incidat, velut sublatio contrariorum. Proinde virium substantiam (quæ ex spiritu, ut diximus, carnosa specie, ac solidis ipsis completur) si custodire velimus, ex iis, quæ similia sunt, moliri cuique suam custodiam conuenit: nempe ei, quæ terra est, ex iis quæ magis sunt terrea: & ei, quæ humida, ex iis quæ sunt humidiora. ad eundem modum & ei, quæ magis aërea, ea, quæ plus huius substantiæ in se habent, ut propria cuique mensura feruetur, adhibenda sunt, Galeni auctoritate eodem vnde cimo Metho. medend. Ad hæc nulli in dubiū venit (prout primo de Sanit. tuend. & 12. Method. Galen. scriptum reliquit) fieri non posse, ut continuū nostri corporis substantiæ quicquam non vacuetur, aut immutetur, veluti nec vllō alio generabili corpori contingit. Proinde Medici officium est ut, quæ substantiæ portio defluit, eam apponendo resarciat: quod alterascit, in debitam temperiem per contrariam alterationem vindicat, utrorumque materiam naturæ propriam subministrans. Harum porro trium substantiarum nulla prorsus & alterationi & dissipationi promptius subest, quàm ea quæ spiritus, ut quæ tenuior & halituosior sit. quæ de re si assidue ab ipso calore aliqua portio digeritur, simulque ab aliis causis, & alteratur, simili corrigenda venit substantia: alias verendum sit ne (ea assidue dissipata, nec per aliquod simillimum substantiæ prius euacuata resarcita, vel alterata & in debitam temperiem per contrariam alterationem non deducta, ut tum quantitas, tum qualitas, quoad fieri licet, naturaliter se habeat) virium essentia quibus corpus regitur totum, & quauis eius pars, vitietur, ac animal pereat, vel pars aliqua deperdatur. Ea de re libro vndecimo Method. Galen. spirituum custodiam moliri ex respiratione, ac transpiratione, & qui ex sanguine attollitur, vapore, vel eius attenuatione, seu in halitum solutione, & quasi aëratione, inquit, tanquam hæc sit eorum spirituum omnium substantia sumillima. Particularim autē vitalis spiritus irrigatur ac alitur, siue nutritur ex inspiratione & sanguine: animalis verò ex inspiratione ac sanguine tenuiori, quem reticularis plexus suppeditat, prout 12. Method. patet. & 7. de Hippo. & Plat. decr. dixit spiritum animale ex vitali perfectius coniuncto oriri. Ac 6. de Vsu part. hunc animale spiritum asseruit exhalationem quandam esse sanguinis benigni. Ex quibus patet quod, quamuis ex respiratione, seu transpiratione, simulque & sanguinis exhalatione; ut ita dixerim; spiritus quicunque gignitur, nutritur, ac custoditur, præcipua tamen eius custodia ac nutritio est ex eiusdem sanguinis attenuatione, seu aëratione: in quo (mea quidem sententia) tum insiti, seu innati, tum vagantes omnes, seu errantes, spiritus quodammodo conueniunt: cum hæc sit maximè similis ac familiaris eorum materia, potissimum innati. vnumquodque enim ea substantia, qua primum genitum est, ali etiam perpetuū consuevit, prout Galen. asseruit libro primo de Semi. circa finem, licet ex aëre eorum qualitas aëquæ, vel fortè magis, custodiatur. quod voluit Hipp. innuere lib. de alimento, dum dixit: Principiū alimenti spiritus, os, guttur, pulmo, & alia respiratio. Nec te præterit innatum spiritum, velut in aliis corporis

partibus, ita in iccinore contineri: non enim fas est in aliis, & non in iccinore, reperiri, eisque iccinoris naturam facultatemque in hoc potissimum spiritu consistere, velut de aliis partibus supra relatum est. Quinimo consonum est iecur ipsum, velut altricis seu naturalis facultatis principium, vnum ex tribus corpus nostrum gubernatibus, multam copiam spiritus innati in seipso continere: non enim sibi ipsi duntaxat gubernando dat operam, sed tanquam principium obtinens aliis partibus materiam ad alimentum idoneum procurat. Amplius scio te non ignorare, quod innatus hic spiritus tam in iccinore, quam in aliis corporibus partis assidua custodia egeat: cum tota moles animalium in perpetuo fluore sit, & ni similis altera substantia, pro ea quæ defluxit, restituta sit, vt diximus, ac Galenus primo de Sanit. tuend. testatur, euaporabitur certè, atque dissipabitur vniuersa, præsertim substantia hæc spiritus, quæ promptè propter sui tenuitatem euaporat, ac dissipatur. Verum eius non tantum in quantitate iustus modus seruandus est, sed etiam in qualitate, quæ similis eius temperiei subministrari debet, quoad fieri posset. & si quale erat ipsum quod effluxit, tale prorsus adiungere agglutinareque ei per totum liceret; optimum id, saluberrimumque planè esset. Hic autem iustus seruandi modus non aliter fieri valet Gal. teste primo de Sanit. tuend. quàm cibi, potionis, respirationis & arteriarum motus ope. Vltimò non te fugit quòd, licet cor veluti principium & fons (vt prius diximus) innati caloris, mediis arteriis ab eo ortis aliarum partium innatum calorem seruet, non tantum earum arteriarum motu, verum etiam mediis spiritibus, in sinistro eius ventriculo ortis, qui veluti vehiculum caloris à corde confluent, Gale. auctore lib. de Vsu puls. ex his tamen spiritibus calorem vehentibus nullum aliud commodum partes, ad quas deferuntur, suspiciunt, quam in intimi caloris temperies in eis seruetur. Hæc custodia non tantum pulsu, verum etiam ex abundante naturæ gratia à prædictis confluentibus spiritibus fit: nam propter hoc naturam in partibus inseruisse arterias Galen. ostendit 4. de Vsu part. Quare non ab re eundem vsum præstabit hic spiritus vitalis innatus spiritui, & non alium, ipsum in propria temperie seruans, ac qualitate decenti, propterea voluit 7. de Hipp. & Pla. decret. eo probe concocto animalè spiritum generari, & innatum. Immo 6. de Vsu part. propterea purum sanguinem, inquit, ac tenuem in arteriis contineri oportuit: quoniam spiritui animali, & non aliis partibus alimentum erat suppeditaturus. Excipiendæ sunt tamen fortè partes quædam, quamuis paucissimæ, vt pulmo, qui vaporosiori ac tenuiori sanguine pro eius nutrimento indiguit. Is nanque sanguis spirituosus & feruens in corde genitus, non etiam, velut qui è iecore ortus est, in alimentum proficiscitur omnibus corporis partibus 6. Hippoc. & Plato. decre. pari ratione nec vitalis spiritus, qui veluti cordis caloris vehiculum, partium, ad quas deferuntur, symmetriam proprii calidi custodit: & proinde innati spiritus earum, in quo potissimum essentiam habent, in alimentum non proficiscitur, sed eum contemperando seruat, animalis tantum materia ac alimentum iuxta Gal. sententiam præcitato loco, nec solum ipsius innati spiritus, sed etià carnosarum, ac solidarum partium caloris symmetriam conseruat, à corde transmissus. Nec quispiam fa-

teri audebit animale spiritum à cerebro diffusum in innati spiritus alimentum transire: nā hic (vt Galen.) primum animæ instrumentum est, ad Gal. mentem 7. de Hipp. & Pla. dec. tum ad sensus omnes, tum ad motus, qui ex appetitione fiunt, perficiendos. Reliquum est, præter eam, quam ex aère habet, custodiam, insitus spiritus, vt aliqua substantia ei quàm simillima reperitur: postquam ea, quæ est vitalis aut animalis spiritus, non est: velut animalibus spiritibus inuenta est. nec minus & ipsius vitalis spiritus materia ac simillima substantia inueniri debet, ex qua, præter aërem, gignatur ac custodiatur. His iactis fundamentis pro spiritus naturalis necessitate, talis prima potest erigi ratio: In quacunque corporis parte spiritus innatus reperitur, is præter aëris inspirationem, seu transpirationem, quadam sanguinis exhalatione, aut (vt ita dixerim) aëratione, pro eius nutrimento ac custodia, indiget velut quicunque alius spiritus Galen. decret. 11. Metho. Sed in iccinore, quod vna est corporis pars, eaque princeps, innatus spiritus reperitur, in quo potissimum eius natura consistit, ac virtus, vt superius ostendimus, quare & custodia & refectione eget, vt, quæ diffatur portio eius, quoad fieri liceat, reficiatur. hæc non est alia à sanguinis exhalatione quàm spiritum vocamus: nec is vitalis est; quia non nisi in corde & arteriis continetur, & symmetriam tantum partium seruat: nec animalis, propter prædictas causas. quare iure naturalis appellandus erit; cum præter hos nullus alius reperitur spiritus, & ipsemet Galen. 12. Metho. asseruerit Quòd, si naturalis quoque aliquis spiritus est, vique is in iccinore & venis continebitur. Præterea, si iecur principium altricis seu vegetabilis facultatis est, propterea quòd materiam procurat idoneam ad alimentum, toti corpori, ad Galeni mentem sexto de Hippoc. & Plato. decret. iure omnibus eius partibus id suppeditare debet. At cum partium essentia in triplici substantia consistat, vt prædiximus, spirituosæ, carnosæ, & solidæ, singulis simillimum alimentum impartiri debet. quare insito spiritui idoneam præstat materiam veluti & carnosæ, & solidæ parti. Sed hæc non est alia, quàm tenuissima, & leuissima sanguinis pars, quam etiam spiritum nominamus. nec is vitalis, aut animalis est: iure ergo naturalis appellandus. At, si quispiam dixerit iecur idoneam materiam ad alimentum procurare tantum carnosarum & solidarum partium, & non insitorum spirituum: præter id, quòd minus scitè dixerit, duo sequentur incommoda. Primum, quòd iecur non sit sufficiens principium altricis facultatis, cum singulis partibus sufficiens alimentum nō suppeditet: & præter hoc, aliud assignandum sit principium, quod spiritui innato materiam præstet. hoc autem quantum à ratione alienum sit, cuique patet, præsertim in Galeni doctrina exercitato; vniuersam nanque in animali nutritionem iecur procurat, vt septimo de Hippocr. & Plato. decret. scriptum reliquit. Ad hæc accedit, quòd sicut se habet ad animale spiritus vitalis, qui perfectius concoctus in ipsum vertitur, vt patet septimo de Hippocrat. & Plato. decret. sic se debet habere, respectu vitalis, alius spiritus: ex quo perfectius concocto vitalis ipse oriatur. Sed hic non potest esse alius, quàm naturalis. ergo pro ortu, generatione, ac custodia vitalis spiritus, præter aërem, necessarius est spiritus naturalis, præsertim cū is quoque animalis spiritus generationis materiam habeat

habeat, præter eam quæ ex inspiratione, & humorum exhalatione, vt Galenus testatur eodem loco. Amplius, sicut sanguis tenuis, purus & vaporosus, in corde & arteriis contentus, ex eo gignitur sanguine, quâuis crassior sit, qui prius in iecinore confectus, ad cor per venas distribuitur, perfectus tamen in eo elaboratus, ac concoctus: sic spiritus vitalis, præter aërem, materiam ei quàm simillimam prædicti sanguinis exhalationem suscipit, perfectiusque elaborat cor: inque ipso gignitur, septimo de Hipocrat. & Platon. decret. quæ non nisi per easdem venas ad ipsum peruenit in iecinore genita, & per venas distributa, quanquam crassior & caliginosior sit. At, quòd hanc sanguinis exhalationem intra venas contentam spiritum naturalem non minime, alienum non est: cum & animale 6. de Vsu partium, Galenus dicat esse exhalationem quandâ sanguinis benigni, qui tamen & syncerior & tenuior naturali existit. Insuper, si nihil in nostro corpore planè est syncerum, sed omnia omnibus mixta: non tamen æqualiter, vt Galenus testatur auctoritate Hippocratis lib. de Alimento. 6. de Vsu partium: iure in venis ipsis non tantum sanguis, verum etiam spiritus continebitur: velut in arteriis non tantum spiritus, sed sanguis, prout ipse aduersus Erasistratum probauit. At is, qui in venis spiritus continetur, nec animalis, nec vitalis dici potest: cum vnus in cerebro, alter in corde & arteriis contineatur. merito ergo naturalis dici debet. Vltra hæc, si in venis aliquis continetur spiritus, is naturalis dici debet: cum duodecimo methodi mendendi Galenus dixerit, Si naturalis aliquis spiritus est, vtique is in iecinore & venis continebitur: sed in ipsis spiritus continetur, vt idem 6. de Vsu part. scriptum reliquis, dum asseruit arteriam, tunc ac purum & vaporosum sanguinem continere: venam autem paucum, eundemque caliginosum aërem, seu spiritum. consuevit namque hæc Galenus confundere, vt patet primo de Different. febr. merito ergo naturalis est, & dici debet. præsertim cum eodem libro inquit quòd reliquæ particule omnes omniū sunt participes, & venæ & arteriæ: quarum hæc quidem exigui, & eiusdem tenuis, atque vaporosi sanguinis: illæ verò paucissimi, & ipsæ, spiritus, verum caliginosi & crassi. Cum præterea tria sint principia, quæ, ad Galeni mentem, corpus gubernant, & quodlibet ipsorum propriam cōtineat facultatem diuersi generis inter se, at toti corpori quæuis ipsarum ex suo veluti fonte distribuitur, vt patet. 9. Meth. 1. de Arte cur. ad Glauc. si cerebrum & cor propriis spiritibus velut instrumentis vtentes suas proprias suppeditat facultates, iecur pariter suam dispensans facultatem suo vtetur proprio spiritu tanquam instrumento, cum & ipsum inter tria principia non minus, quam reliqua, corpus gubernet. At, cum naturalis facultatis sit principium, etiā spiritu naturali medio toti ministrabit: velut cerebrum animali, & cor vitali. hepar enim, cor, cerebrum, & testes communiter vniuerso corpori principia sunt virtutū: vt Galenus inquit 2. de Arte cur. ad Glauc. At, si quispiam dixerit contrarium sentire, lib. Artis medi. & primo de Locis affect. ex his, quæ paulò post dicemus, responsio patebit. Spiritum ergo naturalem ad Galeni mentem & dari & necessarium esse prædictis hisce rationibus probatum esse reor, cum propter insiti iecinoris spiritus & aliarum partium instaurationem ac custo-

diam, tum vt materia sit vitalis spiritus, velut & is animalis, in iecinoreque generari tanquam naturalis facultatis, seu altricis, fonte ac principio, aliisque partibus per venas transmitti pro earum prænarato vsu. At, si quispiam adhuc eum inficiabitur, asserens propter quid de eo ambiguit Galenus loquutus fuerit 12. Method. med. cum dixit, Quòd, si naturalis quoque aliquis spiritus est, vtique is quoque in iecinore & venis continebitur: Ei respondit, si, primò eo loco Galen. spiritum naturalem non negasse: secundò sub conditione loquentem, locum, in quo contineretur, assignasse: tertio quòd non mirum, si sub conditione de eo verba fecit; nam, si de vitali spiritu, qui euidentior erat, non æquè asseruit euidentem esse demonstrationem, veluti de animali, eo minus euidentem demonstrationem esse poterat ipsius naturalis: qui & puritate & tenuitate ab ipso vitali deficit. est namque crassior ac caliginosior, veluti & sanguis, qui in ipso iecinore generatur, crassior & rubrior: at qui in corde, tenuior & flauior est, sexto de Hippoc. & Plato, decret. neque euidentis alicuius motus (vt cerebrum & cor) existit iecur ipsum, eodem teste præcitato libro, quo euidentem quoque naturalis in eo pateret spiritum. non ab re igitur sub conditione de eo verba fecit, propterea quòd de eo satis euidentem demonstrationem non haberet, & non vt ipsum penitus negaret, vt quidam volunt. Consuevit namque de his rebus, quarum euidentem demonstrationem non haberet, nil temerè pronūtiare: sed sub dubio loqui, veluti & de animæ substantia, & causa foetuum formatrice, vbique locorum, & præsertim lib. de Foetus formatione, & nono de Hippocra. & Plato. decret. ambiguit loquutus est. Non igitur in Galeni doctrina abnegandus est naturalis spiritus: quinimo, propter prænaratas causas ac vsus, tanquam necessarius admittendus. Et, si linearibus exquisitis demonstrationibus, ac euidentibus confirmari nequit, satius est probabilibus credere & acquiescere quàm ipsum penitus negare, præsertim cum nec veritati, nec Galeni doctrinæ repugnet. Quinimo cum nono metho. fateatur, tres diuersi generis facultates animal gubernare, qualibet toti corpori ex suo veluti fonte distributa, de naturali facultate minimè id verificari posset: cum singulis partibus sit cognata ad eius mentem: nisi spiritus hic naturalis vniuersis à iecinore suppeditaretur, quo innati earum spiritus, quibus potissimum operationes naturales perficiunt, ac proprias functiones, seruentur, vt paulò post dicemus. Reliquum est rationes eorum qui contra sentiunt, quas supra posuimus, diluere: quod quidem admodum erit facile. Nam ad primam, qua tentant spiritum naturalem destruere, propterea quòd vehiculum non est naturalium facultatum, cum nutriendi vis cuiunque parti insita sit, dicimus ad Galeni mentem, quòd è vestigiò cum nostri corporis partes cōstruete sunt, cognatas habent eas, quas diximus, vires naturales. & propterea, vt eis à iecinore per naturalem spiritum deferantur, opus non habent. At, cum earum essentia & natura permanens non sit, iure, præter id quòd à corde eis confluit, iecinore indiget, quòd alimentum eis suppeditat: est enim ipsum propterea altricis facultatis principium. Hoc alimentum, vt supra probatum est, non tantum carnosum, & solidis partibus, immo etiam innatis earum spiritibus, suppeditare debet, ex quo distributo alimento

conuenienti & simillimo, vt opus est, partium tum natura, tum virtus, quæ in prædictis tribus consistit, potissimum tamen in spiritibus, conseruetur. Naturalis ergo spiritus appellatur, non quod naturalis potentia sit vehiculum, sed quia ad ipsas partes distributus alimentum præstans innato spiritui, quo præcipue operationes naturales perficiunt, ipsas facultates naturales seruare, ac in partibus custodire videtur. Ex quibus dicta Galeni nono Met. primo & secundo de Arte cura. ad Glauc. etsi pugnancia asserere appareat, cum his, quæ primo de Loc. affe. asserit, & lib. Arte. medic. concordari possunt: nam, licet insita sint partibus quatuor naturales facultates, quas ex propria earum essentia & natura perficiunt, præsertim spiritu eis insito, tamē quia talis natura, seu essentia permanens non erat, aliquo indiguerunt principio inter reliqua, quod idoneam alimenti materiam suggerens tam carnosa & solida quam insiti earum spiritus substantia, essentiam ac naturam earum conseruaret, & per consequens vires ac naturales facultates earum, quæ in his consistunt. hoc autem iecur est, hac ratione naturalis, seu altricis facultatis principium, ac spiritum naturalem suppeditans, & quodammodo vim, seu naturalem facultatem toti corpori distribuens, vt septimo & nono method. & primo de Arte curati. ad Glauc. sentire videtur Galenus. suppeditatur denique ab hepate spiritus materia propriè, & non naturalis facultas: velut à cerebro animalis facultas, & non materia, præterquam ad oculos: & à corde, pro caloris symmetria conseruanda, veraque materia videlicet & vis, seu facultas princeps. namque principium nuncupamus non modò quod vim, seu facultatem, verum etiam quod materiam suppeditat, vt patet sexto de Hippoc. & Plat. decret. Pariter ad Galeni auctoritatem libro Artis medic. liquet responsio: nam neque nos negamus quasdam partes à seipsis gubernari, insitas à natura potentias habentes, à quibus reguntur: verum eas alimento non indigere alienum à ratione est asserere, cum iecur ipsum toti corpori idoneam procurer materiam ad alimentum: nec eas innato spiritu carere quispiam dixerit, cum in hoc earum potentia præcipue essentiam habeant. Non immeritò ergo, cum huic quoque spiritui innato alterum iecur pro eius alimento ac conseruatione naturalem pariat, eo indiguerunt pro seruanda earum partium natura. At, si quispiam obiecerit non posse hunc ad eas peruenire, cum vasa ad ipsas non perueniant. Respondum volo, eas permanere non posse citra alimentum: conspicimus namque in dies eas nutrire. quare ad eas illud deriuari necessum est: et si neque vena eis inferi conspiciatur, prout Gale. asserit tertio de Naturali. facultatibus. circa finem: per quamdam tamen quasi traditionem, vel porrectionem, quam Græci *διὰ δόσιν* appellant, alimentum ad eas transmittitur, seu transfertur: quare eo magis spiritui innato earum diffunditur naturalis pro eius alimento, quo tenuior ac leuior est, quam reliqua sanguinis pars, quæ pro carnosa ac solida earum reficienda substantia transfunditur, quanquam parentes ductus nō sint. Quod autem Galenus scriptum reliquit primo de Locis affe. asserens, quod si partium essentia permanens fuisset: neque arteriis, neque venis indiguissent: verum, quia nutrimento egent, seruareque oportet intimi caloris temperiæ, hanc ob causam & venis & arteriis indigebant: ni-

hil obstat, quod naturalis spiritus dari non debeat; nam per venas, per quas carnosæ & solidis partibus alimenti materia distribuitur, per eandem spiritibus ipsis innatis idonea diffunditur materia, quæ alantur: nec minus & spiritui vitali, vt diximus, quæ sanguinis in ipsis contenti exhalatio quædam est, purioris ac syncerioris substantia, quam substantiam spiritum appello naturalem, simillimam existentis & pro innati & vitalis alimento. hæc ergo congrua fuit eorum spirituum nutrimenti via, (per venas videlicet) velut & aliarum partium nutrimenti. Pro eo etiam, quod materia desit pro spiritus naturalis generatione, vt ipsi opinantur, ipsum negare ausi sunt. At nos ipsis assentimur spiritum vitalem nec posse esse, nec esse spiritus naturalis materiam: immo contrà hunc illius materiam esse sentimus: verum, cum asserunt neque sanguinem, qui in iecore conficitur, posse esse, cum is crassius ac turbulentus sit, longè dissentimus: nam, licet qui in iecore generatur sanguis ex propria eius carnosa parte, quæ rectius parenchyma dicitur, ac in venis continetur, crassior & turbulentior sit, quam is, qui in arteriis conspicitur: tamen negandum nequaquam erit ex eo posse naturalem generari spiritum, qui pari ratione à vitali declinat, qui in corde & arteriis continetur, velut & sanguis. nam & proprio eius temperamento, ac natura, peculiarique cordis temperie, quæ mediis arteriis participat, etsi exigua sint, quia tamen seruant caloris in eo symmetriam, vt patet 4. de vsu part. potest propterea propriis suis viribus vtens, quæ non minus in eius spirituosâ potissimum parte consistunt, alimenti materiam ad seipsum delatam assimilare pro eius alimento primo secundariò verò quod in eo redundat, velut ipsi superfluum toti dispensans. In hac assimilatione quis negaret simillimam spiritui innato ipsius substantiam conficere pro prædicti insiti spiritus custodia ac alimento? hæc autem ab eiusdem sanguinis, qui in eo conficitur, exhalatione alia esse nequaquam potest: nam hæc sexcenties dicta est simillima esse spiritui substantia ex sanguinis tenuiori, ac synceriori parte genita. At quæ sufficiens est, pro ipsius insiti spiritus alimento ab eo reponitur: quod autem redundat, velut & reliquum sanguinè ab eius parèchymate genitum, ad alias partes propellit tanquam superfluum. qua ratione ipsum re-cur in numero trium principiorum corpus dispensantium reponitur. Hæc est illa materia conformis ac simillima pro generatione ac alimento innati ac vitalis spiritus. qua de re non tantum sanguis, qui in iecinore conficitur, idonea potest esse materia pro naturali in eo spiritu generando, verum & eius causa efficiens similis ac proportionata pro eiusdem spiritus generatione in eo reperitur. Spiritus siquidem innatus eius, in quo eiusdem iecinoris natura præsertim consistit, qua ratione spiritus quoque naturalis appellari meretur, ab ipso quoque spiritus vim accipiens: veluti & is, qui à propria cordis natura, & potissimum ab eius spiritu insito gignitur, vitalis: & qui à cerebro, animalis dicitur. adest ergo pro spiritus naturalis generatione iecinori abundans, ac apta materia, nec minus, & potens causa efficax. Cum autem nulla adsit in iecinore cauitas, veluti in corde, & cerebro, in quo posset naturalis spiritus generari, illum quoque ac ratione negarunt. At nos dicimus, quod, velut in eo viscere pro sanguinis generatione natura magnum

vnam finem veluti cisternam quandam non fabricauit, ne breuissimo tempore in eo ad ipsum transfusus succus mansisset, ac in sanguinis absolutionem transfusari non potuisset, raptus liquidem ab impetu distributionis: & propterea, vt diutius in eo perfleret, ac perfecte alimētum alteraretur, ac in sanguinem mutaretur, machinata natura est transfusum, seu viarum angustias, quemadmodum in aliis locis hoc machinata est: vt in ventriculo pyloron, in intestinis inuolucra ante testes, arterias, & venas inuolutas, in capite plexum retiformem. In quibus partibus, cum natura voluerit diutius materias morari, transitum ipsis difficilem molita est, vt tradit Gal. quarto de vlu par. Pari ratione nec pro spirituum naturalium generatione talem in iecinore finem natura fabricauit, cum materia eius diutius in eo non mansisset, tum quia attingi minimè potuisset ab omnibus insitis iecinoris spiritibus, à quibus ipsam naturalem gigni oportebat. Et propterea aut prædicti naturalis spiritus generatio prohibita esset, aut deterior fieret. Non ab re ergo permanens diutius sanguis in tenuissimis iecinoris vasis, & perfecti sanguinis generationis causa fuit, & absoluti spiritus naturalis. Quinimmo, & in generatione animalis spiritus ex ipso vitali hoc idem natura machinata est, reticularem plexum constituens, in quo diutius vitalis spiritus permanens valeat perfecte in animale transfusari. Sicut ergo ex iecinoris propria carnosa substantia, seu parenchymate alimētum in tenuibus eius vasis detentum potest perfecte in sanguinem verti: sic ex eiusdem iecinoris insito spiritu tenuiori prædicti sanguinis pars diu in ipsis detenta valet in naturalem spiritum verti. Accedit ad hæc, quod nec ipse adeo lucidus, & synchroscus esse debebat, velut animalis, aut vitalis: sed quantum vitalis ab animali deficit, tantum naturalis à vitali: vt possit ille arthreus, vitalis æreus, hic (cum vaporis similitudinem gerat) vaporosus appellari, non ergo deficit locus pro eius congrua generatione. Dum autem spiritum naturalem destruere conantur, quoniam canalis, aut meatus aliquis non suppetit, per quem valeat ad membra deferri, cum genitus fuerit, satis admodum ad hoc responsum patet. Nam, veluti per arterias à corde ortas vitalis spiritus ad membra deferretur, & ita per venas à iecinore ortas naturalis ad eadem membra pertransiret. Et, si dixerint in venis eum contineri non posse, cum vnica tantum habeant tunicam, dicimus nos eam sufficere pro naturalis spiritus detentione: nam, cum is non tenuis, ac æreus sit, veluti animalis, ac vitalis, sed turbulentus, ac vaporosus, vtpote ex crassioris sanguinis attenuatione, seu halitu genitus, propterea dissipari ac diffili per venarum tunicas nequit, & cum asserunt oportere insuper easdem

tunicas pulsare, veluti & arterias, non possum tantos viros non mirari, supponentes per hæc verba propterea arterias continuo motu agitari: quia spiritus continent. at hoc quantum à Gal. mente alienum sit, quilibet ex lib. an sanguis in arte. natura contineatur, & 6. de Hippo. & Pla. decret. percipere potest. quibus locis aduersus Erasistratum arterias non propterea quod spiritus in earum cavitatibus continet, moueri, scriptum reliquit: sed ob virtutem à corde in tunicas ipsarum transmissam. Nam, veluti substantiæ ipsarum initium cor existit, ita ab eo illico motrix facultas ad ipsas delegatur, quæ ipsi cordi innata est. At, cum innatus motus distentionis videlicet, iecinori non addit, pariter nec venis ab ipso ortis: est spiritum naturalem in eo genitum contineant, haudquaquam eo motu agitantur: cum nec arteriæ, propterea quod spiritus sunt receptacula, distentionis & contractionis motu moueantur: sed quia talem suscipiunt in earum tunicis a corde facultatem, vtpote ab eo ortis. Sufficientes igitur canales ac meatus naturalis spiritus venæ sunt: cum & crassiusculæ naturæ is sit: nec propterea eas continue distentionis motu agitari opus est, veluti nec arteriæ, quia spiritus vitalis receptaculum sunt, propterea mouentur, vt diximus. Vltimo loco, quia nec aëri patere viam conspicitur, vt eo, veluti & reliqui spiritus, is, qui naturalis dicitur, nutriatur: hæc quoque ratione ipsum destruere conantur. Cui responsum volo, quod nec hæc nutritionis via spiritui naturali deficit: nam ad finas eius partes arteriæ inferuntur, vt Galeno patet 4. de vlu partium, non propter aliud, nisi vt refrigerationem eis partibus suppeditent. quem vsum, & gibbe hepatis partes quodammodo ex continuo septi transuersi motu eis vicino suscipiunt, quod quidem abundans esset spiritui naturali in iecinore contento pro aëris participatione. nam, cum crassiusculus ac vaporosior is sit, sanguinis potius exhalatione, quam aëre alitur, & præter hæc nemo vnquam negabit apertiones orificiorum arteriarum ad venas, quas Græci *ἀναστροφάς* appellant, præter alios, quos præstant vñs, propterea factas esse, vt respirationis ac pulsuum utilitas non tantum cordi & arteriis, sed, cum eis, venis etiam distribueretur, prout decretum reliquit Galenus 6. de vlu partium: per quas iecur quoque promptè & respirationis & pulsuum utilitatis particeps esse poterit. Per dictas ergo referationes possunt & naturales spiritus in venis & iecinore contenti tanta aëris utilitate participare, quanta egent pro eorum alteratione ac alimento. Ex his ergo patet, quanti momenti sint eorum rationes, qui naturalem spiritum ad Galeni mentem penitus negarunt.

DONATI

DONATI ANTONII ALTIMARI

Quod exquisita tertiana ad Galeni sententiam in genere acutorum morborum reponenda sit.



HAUD in iuriā medicorum plurimis hesitare contingit, num tertiana febris in acutorum morborum numero connumeranda sit: cum & tertiana ipsa non vno modo dicatur, nec acuti morbi simplicis, ac vnus tantum natura in Hippocr. & Galeni doctrina esse reperiantur. Duo hæc igitur primam, atque præcipuam dubitandi causam præbuerunt. Adde tertium, quia nec alicubi fere compertum est Hippocr. aut Galen. de hac re certam proferre sententiam. Quapropter volens ipse præpositi quæsitū veritatem indagare, simulque ab eorundem decretis non decedens, quid sentiam asserere: terminorum primò exactam notitiam tradere, rationibus deinceps, & prædictorū præsertim auctoritatibus, quam sentio, veritatem fulcire conabor, & demum quas aduersus in medium afferre consueuerunt dubitationes, soluere non grauabor: vt exinde irrefragabilis propositæ rei veritas cunctis pateat. De febre ipsa (quoniam eius essentia iuxta Galeni sententiā sexto de Morbis vulgarib. non secundum Hippocrat. modò, ac præclarissimos medicos, sed etiam secundum communem omnium hominum consensum est præter naturam caliditas, maximè quidem in totum animal diffusa, sin minus, aut omnino vel in pluribus partibus, vel in nobilissimis accensa) velle nos modò, vt rem longissimis verbis tractare videamur dissuadere, num eius caliditas fuerit eadem, vel diuersa cum naturali caliditate: & si eadem, nunquid numero vel specie, aut genere eadem: & si diuersa quibus differant, penitus abstinere decreuimus: cum & præter morem nostrum sermonem protelare opus esset, studiosisque confusionem potius, quam doctrinam pareremus, & quæ ab aliis sexcentis in locis prius tradita sunt, nulla exinde utilitate percepta, hic conscriberentur. Iure igitur hæc res Consultatori, Gentili, Nicolo, ac huius classis aliis tractanda relinquatur. Tantum cum Galen. lib. de ca. morb. dicamus febrem esse totius animalis calorem immodicum, vel, vt octauo meth. med. asserit, febrem calorem esse adeò immodicè auctum, vt & hominem offendat, & actionem laedat: vel, vt Comment. aphor. 16. primi libri, vbi febrem retulit esse conuersionem naturæ caliditatis in igneam. Huius tria esse genera primo de Differ. febr. scriptum reliquit pro ratione triplicis substantiæ, quæ nostri corporis naturam constituit. Hippocr. auctore quas substantias continentia, contenta, & impetum facientia nominauit. Continentia appellans ipsius corporis partes solidas: contenta humores: & impetum facientia spiritus: febrilis namque dispositio aliàs ex alio de prædictis incipit, prout vna magis, quam altera substantia ab vna, vel

altera causa præter naturam calorem suscipere parata est. In quacunque enim earum primum suscipitur præter naturam caliditas, genus aliquod febrium constituitur: vt, si in spiritibus diaria dicta febris generatur: si in humoribus, putrida: si in partibus solidis, hæctica gignitur. spiritus, dico, humores, & partes solidas cordis, & non aliarum partium, cum et si spiritus omnes totius corporis, & humores, vel solidæ partes præter naturam calfactæ sint, quæ verò in corde continentur, non adhuc, neque febris dici potest, neque est: prout Galen. sexcentis in locis, præsertim eodem libro primo de diff. feb. testatus est. ipsius namque cordis aliquam prædictarum substantiarum calfactam esse præter naturam opus est, si febris gigni velit: spiritum videlicet, si diaria: humores, si putrida: & partes solidas, si hæctica: quamuis non semper vt prædictæ cordis substantiæ pro febrium generatione primò efficiantur oporteat. Contingit namque sæpenumero non in diaria dumtaxat, vt spiritus alij primò calfacti sint præter naturam, aut animales, aut naturales, vel vitales illi, qui in arteriis continentur, ex quibus deinceps ad eos pertransit, qui in corde continentur: quo tempore & diaria febris constituitur. Quemadmodum de ea diaria, quæ ex inguinum inflammatione, æstu, vel frigore ortum habet Galen. scriptum reliquit primo de Diff. feb. ac primo de Arte cur. ad Glauc. & ea, quæ ex cruditate excitatur. 8. meth. meden. ex his namque causis alij spiritus primò, præter naturam caliditatem suscipiunt, demum per consensum ad eos, qui in corde continentur, transfluente calore diaria generatur febris. At, si ex ira diaria febris excitetur, hi, qui in corde spiritus continentur, primò afficiuntur: verum hoc idem obseruare licet in putridis febribus, quoties putrescentes succi aut intra vasa continentur, vel in vna determinata parte, aut inflammationem parientes, vel citra phlegmonem, in ea veluti in foco quodam detenti febrem efficiunt. Nam cunctis hæc modis putrida febris generari potest, Gal. teste 11. Meth. med. Hi namque putrescentes succi primò præter naturam caliditatem excipientes, iis, qui in corde continentur, humoribus deinde impatiuntur: ac proinde febris generatur putrida. Quo fit vt in hac febre ea pars primò afficiatur, in qua putrescens succus continetur, aut inflammatio oritur, ex qua cor demum simul afficiatur oportet: dico secundum humores eius, quomodo de diaria quoque de qua supra narrauimus, existimandum est. Pari modo de hæctica febre dicendum erit: nam hæc interdum sit præter naturam calore, primò partes solidas, iecinoris videlicet, ventriculi, aut renum, vel aliarum partium, depascente, & demum ipsius cordis: quo tempore hæctica febris dicitur, vt Galen. visum est. 10. meth. med. Licet igitur nullum febrium genus generari valeat, nisi cordis substantia aliqua in calfacto

6. Epid. 5
com. 29

cap. 2

cap. 1

cap. 1

facto esse posita sit, ut spiritus eius in diaria, humores in putrida, & solidum corpus in hecticis; non tamen perpetuo in dictarum febrium generatione prædictæ cordis substantiæ primo afficiuntur, neque ipsum cor, sed sæpenumero enenit (velut in singulis febrium generibus ostendimus) ut affectus spiritibus, vel humoribus, aut partibus solidis aliarum partium primo, ad eas, quæ in corde sunt, substantias communicata affectione, febris pro ratione substantiæ diuersæ præter naturam calfactæ generetur. Hoc tanquam valde necessarium ac utile pro dictarum febrium curatione, nec a quamplurimis hoc sæculo obseruatum prætermittere nolui, cum eam partem, quæ primo afficitur, omnino inuestigandam esse, pro optima cuiusque vitii curatione, Galen. ubique præcipiat. 2. præsertim, & 3. lib. de loc. affe. ei namque auxilia adhibenda sunt, ut morbus curetur. Curationem verò pro ratione diuersæ partis affectæ variandam esse. to. metho. med. Gale. docuit, dum de hecticis verba faciens asserit, alia debere remedia adhiberi, si cor: alia si iecur, vel ventriculus, aut renes primo afficiantur. Aliis quoque partibus sic topica remedia applicanda sunt: & semper ei, quæ primo affecta est. Hoc etiam in putrida diaria febre obseruandum est, saltem pro topicis applicandis remediis: quia ratione tot tantaque topica remedia pro curandis febribus deseruiencia inuenta fuerunt. non enim indistincte partibus applicanda sunt, prout maior Medicorum pars huius temporis conuenit, sed cognita parte, quæ primo afficitur, eidem, cum opus est, adhibeantur, non tamen propterea ipso corde, tanquam in febribus aut per essentiam, aut per consensum necessario affecto, ac membro existente principe, derelicto: sed ipsi semper in febribus succurrendum quoque fore censemus: verum non ut perpetuo eo primo affecto, ut male quidam sentiunt, asserentes in febribus semper eam primam partem affectam esse. Nam neque in diariis, nec putridis, aut hecticis sempiterna id veritatis esse supra ad Galeni mentem ostendimus. Interest itaque Medici exquisitè in qualibet febre partem, quæ primo afficitur, dignoscere, ut ei etiam primo curatio dirigatur: nec in omnibus indistincte asserendum est (ut ex his, quæ diximus, constat) cor primum esse semper, quod afficitur: ut nostro auctore maior Medicorum pars vno ore fatetur: semperque de eo solliciti nos esse debemus, vix quod princeps membrum existat, necessarioque in cuiusvis febris generatione afficiatur, licet non semper primo. In numero verò febrium quæ quidem ex humorum putredine consistunt, tertiana existit, neque enim magnus earum numerus est, ut Galen. inquit secundo de Crisibus, & secundo de differentiis febrium, sed omnes tres existunt: biliosa videlicet, melancholica, & pituitosa, hoc est, tertiana, quartana, & quotidiana. Harum verò cuiusque differentia duplex existit, intermittens videlicet, & continua, ita ut omnes simplices febrium putridarum differentia sex numero sint: quamuis aliquæ alia differentia illis accedant: ex humoris scilicet copia, quantitate, & qualitate putredinis, modo motus, & parte, in qua humor putrescit, ut idemmet Gale. testatur eo 2. de diff. feb. Et ut ad tertianam veniamus, de qua verba facit sumus, aliis derelictis, præter id quod quædam est continua, sic dicta nomine generis, multas tamen circuitiones particulares continens, & non vnâ tantum, sicut vera continua, quæ conti-

nens dicitur febris, cuius omne tempus vna accessio est ab initio vsque ad finem, siue ea æqualis persistat, aut paulatim decreseat, vel paulatim crescat, quædam verò intermittens, seu ad integritatem desines: ipsam intermittentem, quæ tertio quoque die infestat, pro ratione diuersæ longitudinis, vel breuitatis accessions eius, & intermissionis, variis nomenclaturis appellari apud Gal. inuenio, cum 2. de diff. feb. tum primo, & 6. de morbis vulga. Nam cui & accessions tempus breue est, & initium cum rigore, & cum sudore solutio, bilisque vomitu, vel etiam infernè, alio biliosa deficienti huic exquisita tertiana nomen inditum est. Cui autem horum aliquid deest, non amplius exquisita, sed tertiana simpliciter vocatur. Verum, si & intermissionem minorem habuerit, scilicet longiore accessione, tertianam hanc productam nominare licet: tamen si hæc maioris, minorisque ratione differentiam magnam obtineat: cum & magis productam vnâ, admodum productam aliam, & maximè, seu plurimum productam reliquam nominemus. Verum eas hoc modo definire quodammodo obscurum est, cum & recentiores Medici de eis quotidie certent atque contendant, ne id quidem agnoscetes se de nomine contendere. Talem igitur nominum subtilitatem quærere necessarium Medicis non est, cum & rectè curare tertianam valeant, ac eius euentum præsentire, inspecta tantum accessions & intermissionis longitudine & specie seu forma eius, quam in ipsis tertianis variari contingit, velut in aliis quoque febribus per circuitum repetentibus, aut ex parte redundantis succi, & hoc vel quantitate vel qualitate ipsius: nam, velut copiosior bilis longiores, pauca breuiiores efficit accessiones, sic tenuis, quam crassa, breuiiores; crassa verò, quam tenuis, longiores parit: Vel virium ratione: nam virium robur breuiiores, eæ verò imbecillæ multo longiores accessiones efficiunt. Totius quoque corporis constitutio causa est, ut interdum breuiiores, sæpenumero longiores fiant accessiones: corpus namque rarius quantum in se est, breuiiores, densius aut longiores efficit: facultas namque valida promptius a se expellit id, quod alienum est; corporis autem raritas minimè detinet id, quod effertur, quocirca ita affectis cito euacuari excrementum necesse est, si etiam alia similia existunt. Pari ratione quibus e contrario corpus afficitur, iis necesse est longiorem esse excrementorum excretionem, debiliter expellente facultate, detinente autem ea, quæ effertur, meatuum angustia, ac corporis densitate: omnibus autem prædictis infusum concurrentibus aut breuissima, aut longissima accessio fit: nam ob paucitatem, bilisque tenuitatem, robur virium, & viarum amplitudinem, seu corporis raritatem breuissima fit accessio, longissima autem ob copiam, eiusque crassitiem, virium imbecillitatem, meatuumque angustiam, seu corporis densitatem. Si verò prædicta omnia haud concurrant, sed eorum quædam, pro communicantium causarum diuersitate, accessio magis, vel minus longa erit, vel breuis vel in medio longissime, & breuissima, non parua secundum magis & minus differentia suscipies. liquet igitur ex his tertianæ accessione propterea non semper esse æqualem, quia non perpetuo eadem bilis copia, eiusdemque substantiæ putrescit, nec in corporibus eandem semper constitutionem ac vires æquales habebitis, & propterea hæc inspicies me-

2. de Diff.
feb. cap. 8.
1. epid. 5.1.
com. 23. &
5.2. com. 25.
6. epid. 5.2.
com. 23.)

cap. 9.
cap. 2.
cap. 8.

dicus causam promptè inueniens longitudinis, vel breuitatis accessions eius, ritè eam curabit, eiusque finem prænuntiabit, quouis nomine ipsam appellet. At, vt clarior nostra euadat oratio, quia lingulis tertianis iuxta Galeni doctrinam, suum cuique nomen imposuimus, prout magis, vel minus earum accessio prolongatur, cum sermo noster de ea erit tertiana, cuius accessio duodecim horas non pertransit, quæ maxima est eiusdem accessions longitudo, eam vel exquisitam tertianam, vel absoluto sermone simplicique appellatione tertianam nominato, prout & Græcorum consuetudo est altero duorum modorum indifferenter eam appellare, vt sexcentis in locis præsertim commen. aphorif. 59. 4. libro testatur Galen. Huius insuper differentia quædam ex longitudine & breuitate accessions eius oritur habet. Næque accessio interdum vsque ad duodecim horas prolongatur, sæpenumero ad decimam, & quandoque ad sex, vel octo tantum, vel etiam ad pauciores, prout dicta flaua bilis, ex qua excitatur, in maiori fuerit, vel minori copia, crassioris, vel tenuioris substantiæ, ac in corporis dispositione rara, vel densa: & vires robustæ, vel imbecillæ fuerint. Verum, quoniam hæc tertiana de numero est morborum, qui per circuitus repetunt, quærendi propterea occasio oritur, quamobrem febres quædam (in quarum numero tertiana est) per circuitus repetant. Huic Gale. 2. de diff. feb. paucissimis verbis satisfacere videtur. Circuituum repetitio, inquit, aut oritur ex fluxione quæ ex robustioribus partibus ad imbecillimas fit, cum videlicet in aliqua parte excrementum ex quouis causa generatur, demum eiusdem partis expultrice facultate valida existente, referatis viis, ac eodem excremento non admodum crasso, nec multo existente, ad alias transmittitur, ac ex illis ad alias, quoad vnam quandam deueniat, quæ cunctis aliis imbecillior sit quo loco decumbens, præter naturam calfactum ac putrescens febrem excitat, tantoque tempore per circuitus repetit, quanto eadè dispositiones in mittentibus, & suscipientibus partibus permanent. Interdum, etiam si pars, quæ excrementa transmittit, amplius non mittat, neque ab aliis suscipiat, remanet tamè in ea parte, quæ prius excipiebat imbecillitas quædam, ea ratione fit, vt febris oriri possit: quoniam sibi ipsi excrementa generat, etsi ab aliis non excipiat, velut si ea ab initio imbecilla fuerit, sibi ipsi excrementa generat, eaque expellere non valens. Cum enim imbecilla ea sit, excrementum verò fortè multum, aut crassum, viæque obserata, fit, vt sibi ipsi initium febricitandi afferat, serueturque non minus eiusdem febris circuituum repetitio quoad in prædictis partibus similes dispositiones permanserint. Accidit & tertio, quod quædam partes nulla ab aliis suscipiant excrementa, vtpote nulla existente parte, quæ ea transmittat, verum præter naturam affectæ, vt cum supra modum calefiunt, aut dolent, ad seipsas excrementa trahant. proinde fit vt, vbi putrescunt, qui trahuntur succi, febrem excitent. hoc modo, fluxione orta tam si corpus plenum sit, excrementis que refertum, quam si eisdem vacet, admodum tamen largæ existente fluxione, vbi plenum, pauca verò, vbi excrementis vacet. non secus tādum per circuitus repetet dicta febris, quandiu calor, aut dolor in eisdem partibus perseverantiam habet. Tribus igitur modis, iuxta Galeni sententiam 2. de Differ. febr. quævis putrida febris generari potest,

Loco citato.

quæ per circuitus redit, quamuis interdum eueniat, quod non vna tantum, sed plures prædictarum causarum communicent in febrium putridarum generatione, quæ circuitione fatigant: vt puta si fluxio in aliqua parte ab aliis mittentibus excipiat, & eiusdem adsit imbecillitas, ita vt non tantum suscipiat, sed & sibi ipsi excrementa generet, quibus in ea parte putrescentibus si febris gignatur, duplicem habebit & generationis & per circuitum repetitionis causam: prout Galenus secundo de Differentiis febrium, scriptum reliquit. Causæ igitur, quod febres quædam per circuitum repetant, ac quouis alij morbi, tot ac tales sunt. At, quod ad integritatem aliquæ earum accessiones definant, non difficile est inuenire: nam, cum prioris accessions tempus adeo breue fuerit, vt, priusquam secunda incipiat, iam prima desierit: medium intervallum inter secundæ accessions principium & prioris finem, totum sine febre existit. at, vbi secunda prius incipiat, quam prior omnino soluitur, nihil harum medium relinquatur. quare ad integritatem non desinet. quærimus itaque nos de ea tertiana febre, nunquid sit morbus acutus, quæ tertio quoque die per circuitus cum repetat, eius accessio duodecim horas non pertransit: quod tempus longissimum est, omninoque intermittit. eam pro clariori doctrina indifferenter, aut absolute tertianam, aut cum additione exquisitam, quod ab aliis differat, nominabimus. Hæc causam habet flauam bilem superabundantem in toto corpore latantem, ac motam. quod fit, vt in ea vehemens fiat rigor, bilis superueniat vomitus, aut alui deiectio biliosa, vrina ac sudores biliosi, ab acutissimis continuis, maximeque adurentibus febribus hoc tantum discrepans, quod in illis biliosus succus vna cum sanguine intra venas contineatur, in hac per totum corpus deferatur, ac per singulas eius partes disseminatur. distant ergo hæc febres inter se locis tantum, in quibus superfluous contrahitur humor: conueniunt verò in causa. vtraque enim à flaua bile gignitur, vt Galenus inquit secundo de Crisibus. primo de Morbis vulgaribus com. Aphorif. 59. 4. lib. & sexcentis aliis in locis. Num autem hæc, & quælibet alia febris interdum symptoma, & non morbus dici & esse possit, adeo quod, vt vulgus Medicorum asserit, febris accidens, & non morbus dicatur, non minimam difficultatem habet: cum apud Galenum compertum sit, nonnunquam febrem symptoma nominari, præsertim cum inflammationes sequitur, vt patet commento Aphorifino 44. lib. 6. cum de ea febre loquitur, quæ ad inflammationem vesicæ consequitur: asserit enim eam esse casum eiusdem inflammationis & tertio de Locis affectis, de febre phrenitidis orta inquit eam vnum quoddam symptoma, seu casum censeri cerebri dispositionum, idem quoque fateri videtur & primo de Arte curand. ad Glauc. circa finem, & secundo eiusdem circa principium. & primo de Differentiis febrium, circa finem, cum de diaria differunt, quæ ex æstu, vel frigore ortu habet, febrem dixit interdum esse symptoma solius in capite dispositionis: prætermittendo pro nunc ea, quæ scripsit comm. Aphorif. 66. & 73. quarti lib. & 43. septimi lib. cum ad mentem antiquorum, & non iuxta propria sententiam illud conscripserit, velut liquidò cuilibet eius scripta inspicienti patere potest. At nos prædictis haudquaquam obstantibus cum eomet Galeno indubitan-

cap. 2.

capit. 1. p. com. 2.9 cap. 3.

cap. 2. lib. 2. 20

cap. 3.

lib. 6.

cap. 4.

3. res.

cap. 1.

Glauc.

lib. 2.

Glauc.

lib. 6.

lib. 6.

lib. 6.

lib. 6.

lib. 6.

lib. 6.

lib. 6.

lib. 6.

lib. 6.

indubitanter affirmare audemus nullā febrem quouis modo genitā posse nec dici, nec esse symptoma, sed semper, quæcunque ea sit, morbus est, & dicitur: illud tantum animaduertentes in eiusdē Galeni doctrina, quod, cum de symptomate bifariā loqui possumus, generatim scilicet, & speciatim sumpto, ut patet lib. de Differentiis sympto. quando dicimus febrem non posse dici, nec esse symptoma, de eo intelligendum erit speciatim, & non generatim dicto. nā neminem præterit non febrem tantum, aut quævis alium morbum symptoma dici posse generatim sumptum, sed & morborū causas, & vniuersaliter quicquid præter naturā corpori accidit, siue morbus sit, siue causa, siue symptoma propriè dictū fuerit, verū de eo symptomate intelligendū erit, quod speciatim sumitur, hoc autē trifariam distinguitur à Galeno eodē libro de Differentiis symptoma. aliud nāque affectus nostri corporis est, aliud functionum noxa, & reliquum excrementorū immodica excretio, aut suppressio. Quo supposito tanquam vero Galeni decreto, quod quouis febris perpetuò morbus sit, & non symptoma, sumpta ipsius morbi definitione, quæ à Galeno nō modò lib. de Differentiis morb. & sympto. verum sexcentis aliis in locis conscribitur, absque vlla difficultate probari potest: nā, cum morbus sit præter naturā affectus, à quo primò actiones impediuntur, febrisque perpetuò humilior di sit: semper enim functiones per se primò lædit: necessario sequitur semper esse morbum. Ad hæc, si omnium medicorū cōsensu febris essentia, est præter naturā caliditas in totū animal effusa, vel in plurimis, aut saltem nobilissimis partibus accēsa, ut 6. de Morb. vulg. Gal. testatur, ergo perpetuò morbus erit in intemperie, velut ipsemet lib. de Diff. morb. sentit. hæc autē intemperies vniuersi febrū generis est calor, eodē teste 11. Meth. quo fit ut frigidis semper curetur tanquā contrarius ei existentibus. Erit igitur quouis febris semper morbus in intemperie, eaque calida: talis namque est eius propria essentia, ut diximus. Rursus, si symptoma sit febris speciatim sumptum, cum id triplicem habeat differentiā, necessario in earū aliqua reponi debet. at, quod in nullo symptomatum genere ea collocari possit, facile deducitur: cum nec in genere noxæ functionū esse poterit: nā ipsa per se primò functiones lædit, & nō est aliqua functionū noxa, ut patet per omnes functiones discurrenti: nec in genere affectus corporis cōnumerari poterit, cum hæc symptomata functiones nō ostendant, nec per se primò: verum febris ipsa est, quæ per se primò functiones lædit. In genere autē retentorum, vel excretorum immodicè quis adco erit insulsus, ut febrem reponat: nemo inquam, etsi per cuncta excrementa discurrat. Cum igitur in nullo symptomatum genere reponi febris valeat, relinquitur ut nullo pacto, quocunque modo ipsa oriatur, symptoma propriè dictū appellari possit, sed semper morbus in intemperie, eaque calida. Et, qui eam quandoque morbum, interdū symptomata appellant, id faciunt, quoniā febris essentia atque propriam naturā ignorāt: nec minus eos præterit, quibus morbus a symptomate distet. & propterea vnam eū altero confundunt. Quod, si Galen. præcitatis locis, & aliis quibusdā, interdū febrem symptomata alicuius præter naturā affectus appellari, non propterea illico febrem esse symptoma dicendum erit speciatim dictū: cum hoc & eius doctrinæ, & veritati satis pugnet, ut supra monstratum est.

Sed attendendum Symptoma nomen Græcum à Græco verbo συμπτω deductum, apud eosdem Græcos nonnullas habere significationes: nam, velut verbum ipsum συμπτω significat quandoque contingere, concidere, interdum incurro, competo, consequor, &c. sic symptoma id, quod cōtingit, cōcisionem, concasum, incursum, vel alicuius rei assecclam significat. Quo fit, ut, cum symptoma dixerit febrem esse, alicuius dispositionis præter naturam, nil aliud voluerit intelligere, quàm eam contingere cum dicto affectu, vel eiusdem esse assecclam, seu ad eum consequi, ut dilucidissimè cōstat ex eius verbis in fine primi libri de Arte curan. ad Glauc. & principio secundi cū de febribus, quæ inflammationibus accidunt, seu contingunt, verba facit. Illud quod nec ignorauit doctissimus Leoniceus, qui hoc modo nomen illud Symptoma lib. 1. de Different. febr. iuxta finem, interpretatus est, cum dixit: Eorum verò nonnullas febres solum capitis dispositionem consequi: & non dixit eiusdem dispositionis esse symptoma, velut Laurentianus, quod parū doctis non parui erroris causa esse potuit, prout quibusdam vsque ad nostra tempora fuit. Febrem igitur aliquam esse symptoma propriè & speciatim dictum, tanquam erroneum in Galen. Doctrina, à veritateque valde alienum quivis asserere caueat. Nam qui arbitrantur interim eam symptoma censendam esse, ob id sunt accusandi, ut Galen. inquit libro de differen. morb. quod non expectantes donec ab aliis confutentur, ipsi seipsos reuincunt. quod si illud reperiatur conscriptum, modo, quo exposuimus, erit intelligendum, nisi forte Galenus ad aliorum mentem loquatur, ut in quibusdā prædictorum locorū patet. erit denique propterea tertiana febris morbus. num vero acutus, vel non acutus nondum liquet. Pro huius dilucidatione animaduertas oportet, Galen. tertio prognost. scriptū reliquisse duas esse temporum præfinitiones in morbis, quæ ratione acuti, aut diutini dicuntur, qui quidem sic ab eo sæpenumero illustrioris discipline gratia nominantur. verum, cum non duæ tantum re vera morborum differentie sint, sed multæ admodum, idcirco nec eos laudat secundo de diebus decreto, qui duas vniuersas morborum species ponunt, neque vtranque deinde diuidunt: nec illos probat, qui tot esse dicunt, quot dierū decretoriorū circuitus: acutos propterea sub hac ratione subdividens eodem loco asseruit quosdam acutos esse, quosdam verò peracutos, iterum peracutos subdividit in exacte peracutos, qui quartam diem attingunt, & peracutos non exacte, qui ad septimam vsque producuntur. deinceps inter acutos ait alios esse exacte acutos, qui vsque ad decimam quartam producuntur: alios non exacte, qui vsque ad vigesimam durant: quanquam & hi quoque acuti sint. Est insuper aliud morborum genus, quod ex delapsu acutum ad quadragesimam vsque diem peruenit, ita vocatum, quod acuto quodam imperfecte iudicato intra diem vigesimum, deinde vehementia eius contracta, reliquum eius intra quadragesimum diem dissolui consuevit. nonnulli autē statim ab initio velut prohibiti, tardeque mori, & nullam interea subitam mutationem moliti ad quadragesimum diem producuntur. duplex autem horū quoque natura est, vel enim accessionum remissiones in integritate finiunt, vel continua febris semper perdurat: tales etenim (ut ipse asserit) acutorum morborū

cap. vlt.

cap. vlt.

cap. 5

cap. 10

cap. 12

cap. 12

naturæ adhaerere videtur. iā alij manifestò sunt utique diuturni, qui iterū pro diuersa secundum tēpus eorū præfinitione diuersas habere possunt species seu differentias, quas omnes, in variis tamen locis Hipp. in omnibus admirādus cōscripsit, ab ipsis euidētibus sermonē capiēs. Exactē nāque peracutorū memoriā habet aph. 7. 1. lib. dum dixit, Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extrēmē tenuissimo victu vtendū est: per extremos labores, vt Gal. fuit interpretatus, intelligēs accessiones, & casus omnes maximos atque vehemētissimos, cū in ipsis statim morbi incidat vigor, in primis videlicet eius diebus, hoc est, circa primos quatuor dies, vel paulo vltius: in quo morbi summo vigore prædicta duo maxima ac vehemētissima sūt, accessiones scilicet, & casus vniuersi. Per acutorum autē, nō tamē exactē, lib. 1. de ratione victus in morbis acutis sub his verbis meminit, Sorbitionē dare oportet neque multā, neque crassā, sed post septimā, vel nonā, si validus sit, & iterum, Quibus utique vel quinto, vel septimo, vel nono fieri debeat morbi iudicatio, &c. At de exactē acutis in apho. 23. secundi lib. sub his verbis scripsit. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicātur. acutorū verò non exactē. 3. prog. oblitus nō fuit, cū inquit, Itaque primus impetus hunc in modū finitur, secundus verò ad septimū producitur, tertius ad vndecimū, quartus ad decimumquartū, quintus ad decimumseptimū, sextus ad vigesimū. Hi ergo ex morbis acutissimis per quatuor ad viginti ex additione terminantur. at eorū, qui ex delapsu, siue decidētia acuti nominantur. 1. prog. mentionem fecit, dum talia protulit verba, Spirationis facilitatem existimari oportet, perquam magnā vim habere ad salutē in omni morbo acuto, qui cum febre infestet, & quadragesimo die iudicetur. quinetiam sexagesimi, octuagesimi, & centesimi rursus primo de morbis vulg. meminit, & apho. 28. tercij lib. scriptū reliquit nōnullos puerorum affectus diebus xl. finiri, quosdam septem mensibus, reliquos septē annis, nōnullos verò ad pubertatē vsque peruenire. quæ omnia simul ad clariorem disciplinā, & agrorum vsum admodum vtilia sunt: etenim sua cuiusque vitæ species est. At quoniam Medicorum plurimis, qui ex sola temporis præfinitione morbos diffiniūt, aberrare contingit, non tantum circa eorum appellationes, verum & rerū quoque ipsarum dignotiones confundunt: nam paruas & à periculo remotas febres diarias ex frigore quodā, seu æstu, vigilia, ebrietate, vel ira, aut alijs similibus causis ortas, etsi circa primos dies terminētur, nemo tamē vel idiota, vel Medicus peracutas febres, seu morbos peracutos vocare consuevit. nec secus morbū aliquem cum segni lētoq; motu cū interuallis à febre remissis, si vsque ad quadragesimū extēdatur, nec, si in decimoquarto finitur, acutū quicquam nūcupabit: quos tamē, si nudas tēporis præfinitiones obseruari, acutos, vel peracutos quibus appellare cogetur. propterea Gal. 2. de Dieb. decr. Archigenē laudabat, qui nō solis nudis temporibus, sed motu & natura, magis acutū, vel peracutū morbū appellauit, eum talem esse asserens, qui propter motus velocitatem periculosus existit. quapropter lucidissimus Gal. cunctos, qui in hac re prouenire potuissent errores cuitans, eodē loco dicebat, Vides igitur nos, cū solutio interdum eandē temporis præfinitio-

nem habet, vel acutū morbum, vel nō acutum nūcupare eodē modo quādoque: aliū acutum, aliū diuturnum ipso solo motu distinguentes. contingit nāque morbos quosdam quarto, septimo, decimoquarto, vigesimo, vel quadragesimo die terminari, qui nō statim acuti, vel peracuti dicendi sunt, nisi eorum motu prius obseruato. hic si celer, seu velox, motus fuerit, sic appellandi sunt iuxta Gal. sententiam: si autem segnis & lentus, nullo pacto acuti dicendi, sed alio nomine nūcupandi sunt, etiam si intra terminū acutorum (vt diximus) finiantur. Quare ex motu præsertim, & nō ex tēpore tantum, morbos præfiniri iubet Gal. vt 3. de Dieb. decr. circa finē, decretum reliquit. nam qui breui tempore terminatur morbus, non autem celeriter mouetur, vt diaria febris, hunc Græci *σπαραγγόνοιν*, hoc est, brevis temporis morbum, non autem acutū appellant. huic contrarius est, quem Græci *ποδυγγόνοιν*, nos diuturnum, siue longi tēporis morbum appellamus, siue quomodoque aliter quis vocare ipsum malit. At acutus morbus, licet omnino brachychronius quasi exigui temporis sit; non tamen hac ratione acutus nūcupatur, sed propter eius motus celeritatem acutus dicitur. quia verò ipsum celeritē quiescere oportet, vt qui ad propriū finem properat, (nam idem est celeriter moueri, ac ad terminū properare) erit propterea acutus morbus omnino & brachychronius, hoc est, exigui tēporis. Propter motus ergo celeritatem acutus dicitur: quod verò diu morari, eo quod celeriter mouetur, non potest, brachychronius appellabitur. ipsi verò acuto morbo tardus appositus est, vt qui non celeriter, sed segni & tardo motu moueatur, hic omnino polychronius non est, etsi quilibet polychronius morbus sit tardus. accidit enim, vt propter virium robur, aut corporis raritatem, paucitatem, ac tenuitatem humoris ex quo fit, interdum brachychronius sit: ita nec quilibet brachychronius acutus est; licet quilibet acutus exigui temporis omnino sit: febres nāque diariæ morbi sunt exigui tēporis, non autē acuti morbi dicuntur: cū nō celerī motu moueatur, neq; magni sint. Liqueat igitur ex his, quod licet quilibet morbus acutus sit exigui tēporis, seu brachychronius: non tamē hac ratione acutus appellatur, sed talis dicitur, quia celeriter mouetur, velociter scilicet tempore eius propria pertransiēs, ac ad summū vigore properans. hac ratione is morbus ei opponitur, qui tardus dicitur: quoniam segni & lento motu mouetur. & propterea vnus ab altero iuxta Gal. sententiam solo motu distinguitur. quod quidē confirmauit 6. de Mor. vul. cū dixit, Acutos morbos dicimus, quicūque propria tēpora vsque in finem velociter pertrāseunt. & propterea nō mirū, si iūdem ipsi acuti morbi, pro diuersa motus eorum celeritate, magis & minus acuti dicantur; nam vbi statim, circa primos videlicet quatuor dies, extremos labores habeat, in summoque vigore constat: talis morbus, cū velocissimū, seu celerrimū motus sit, exactē peracutus morbus dicitur. quod si in septimo consistat die; peracutus, non tamen exactē, nominatur, velocioris quidem & ipse motus existens, non tamen adeo vt is qui in quarto, vel paulo vltius cōsistebat. si autē in 14. die casus vniuersos, ac accessiones extremas habeat, & proinde in summo vigore consistat: simpliciter acutus morbus nūcupabitur, celeriter quidē & ipse propria tempora pertransiens; verū non adeo vt qui in quarta, vel septima

prima consisteret. At, si quidam morbi debiles ac parui circa primos dies exstant verum quarta, aut quinta de continui vehemens, acuti, seu celeres fieri incipiant, aut sexto, vel septimo die tales fiant, acuti, sed non simpliciter dicuntur ad 20. vsque diem, vel 17. iudicari: adeo ut morbi continui acuties nunquam possit plures, quam quatuordecim obtinere dies, ut liquet com. Aphorif. 23. lib. secundis; & propterea hi quoque acuti sunt. quidam vero celeriter à principio moti, imperfecteque intra dies vigesimū iudicati, deinde contracta eorum vehementia, reliquum intra quadragessimū diem dissolui consuevit. & propterea acuti ex delapsu, seu defidentia, aut acuti, qui in quadraginta diebus iudicantur, appellari consueverunt. Sola itaque motus specie acutus morbus quacunque modo talis dicatur. à diuturno, seu tardo distinguitur iuxta Galen. doctrinam 2. & 3. de diebus decreto. & 6. de morbis vulgaribus cum ille veloci, seu celeri, hic vero segni & tardo motu moueatur: quamuis omnis acutus morbus exigui temporis sit, ac celer, omnisque diuturnus, id est, longi temporis, necessarii tardus: non autem est contra, ut supra diximus. Proinde cum Galen. citra omnem ambiguitatem ac controuersiam, audacter fateri audeo, tertianam febrem esse acutum morbum. nec scio, si quispiam vel idiota, vel Medicus reperiatur, qui hoc idem confiteri vereatur. nam, si apud eum acuti morbi solo motu à diuturnis distinguuntur, & propterea hi acuti dicuntur, quia propria tempora vsque in finem velociter pertranscunt: quod tertiana fit huiusmodi cunctis liquet; etenim celeriter mouetur, adeoque velociter propria tempora pertransit, ut interdum suo motu celeri septem periodos non expectans, (quod tempus ei longissimum est, ut patet Aphor. 59. 4. lib.) neque etiam ultra tertium progrediatur circuitum, velut Gale. inquit. 2. de Crisibus. quare erit tertiana febris morbus acutus. At, si quispiam dixerit adhuc eam non esse morbum acuti; quæritur, in quo morborum genere debeat reponi: non quidem inter polychronios: cum hi multi temporis morbi sint, tertiana vero exigui: non in numero eorum, qui tardi appellantur: nam ea celeri motu, hi vero tardo & segni mouentur. neque brachychronius morbus dicenda erit: quia, præterquam quod exigui temporis tertiana morbus sit, etiam celeriter mouetur. quod brachychronius nullo pacto competit: hi enim pauci & breuis temporis sunt tantum, non autem celeriter mouentur, ut est videre in diariis vocatis febris. Qua de re, cum neque brachychronius, neque polychronius morbus tertiana sit, neque tardus, qui verè acuto opponitur iuxta Gale. sententiam. 3. de diebus decreto. necessarii sequitur, quod in numero acutorum sit: nam præter has nulla alia reperitur morbi differentia apud eum. Quod si hi morbi, qui celeriter iudicantur, & ad suum vigorem celerissime properant, ac magni sunt, à Galen. in commento Aphorif. 19. & 23. 2. lib. acuti dicuntur, atque sunt, tertiana nam quis negabit acutum morbum & esse & dici, cum celerissime iudicetur, & magnus morbus sit: quod autem celerissime iudicetur, cuius patet. magnum verò morbum esse ei patebit, qui quos magnos morbos Galen. appellat 4. Method. medendi, considerabit. trifariam enim dicit morbum esse magnum: vel propter afflictæ partis præstantiam, vel propter affectus magnitudinem, vel quia cacoe-

thes. At tertiana non vna tantum ratione magnus morbus dici debet, ut puta quia princeps pars in ea læditur, cor videlicet: cum hæc cuius generi febrim communis sit: ac propterea, quia febris, ei hæc magnitudo aduenit, Gal. auctore octauo Meth. med. verum & propter affectus magnitudinem morbus magnus appellari debet. est siquidem tertiana magna & vehemens febris. quare, præter id quod febris est, illi quoque magnitudo adeo notabilis accedit, ut, relatione aliarum februm, magna & vehemens dici possit, præsertim si ad diarias, hecticas, & putridas eas, quæ ex frigidis succis ortum ducunt, comparetur. Cum igitur duplicem habeat magnitudinis causam, & non vnam tantum, tertiana ipsa, celerissimeque sua pertranscat tempora, ut prius diximus: iure morbus acutus appellanda erit, si quæ Galen. asserit commen. Aphorif. 19. & 23. 2. lib. de acuto morb. vera esse concedemus. Eodem quoque commen. Aphorif. 19. 2. lib. duplicem fateretur esse acutorum morborum naturam, cum febre præfertim; nam vel in humoribus calidis solis, qui nullum obfedere locum, sed æqualiter in omnibus animalis partibus apti sunt ex sua natura generari, vel loco aliquo patiente fiunt, ut in morbo laterali, pulmonis inflammatione, & angina. cum igitur ipsa tertiana ex calidis succis, biliosis videlicet, generetur, calidioribus existentibus cunctis aliis, qui in corpore sunt: qui nullum obfedere locum determinatum, sed per totum corpus deferuntur, ut patet 2. de Crisi. quis adeo erit insulsus, qui ipsam negabit esse morbum acutum, secundum primam saltem eorum naturam? cum Gal. huiusmodi morbos acutos nuncupet, qui ex calidis humoribus solis generantur citra aliquem determinatum locum patientem, quamuis non ipsis secundum naturam se habentibus, sed putrescentibus tertiana fiat, ut Gal. visum est 2. de Crisibus, cum dixit, Quod febris acuta vel aliquo humorum putrescente, vel mæbro inflammatione patiente generatur. Verum, cum nec pituita, nec melancholicus, succus putrescens acutas febres pariat, ut cuique liquet: ex his namque morbi longi, seu diutini fiunt eodem Gal. auctore com. Aphor. 19. secundi lib. sequitur, quod ex bile putrescente febris acuta generetur. quæ de re tertiana febris acuta erit, cum ex bile putrescente ortum habeat. Ad hæc quis vnquam tertianam esse morbum acutum dubitabit, si Gale. verba inspiciet & intelliget, quæ com. Aphorif. 59. 4. lib. scripsit: sunt autem talia: Sicuti igitur in morbis continuis acutorum quidem morborum terminus est quartusdecimus, peracutorum verò septimus, sic in intermittentibus longissima tertiana febris terminum habet circuitum septimum. Rursus autem sicuti in peracutis morbis poterat iudicari quinto, quarto, & tertio die, sic & in tertiana eiusdem circuitibus fieri solutio potest non expectante natura septimum. Cum igitur Galen. dixerit, Sicuti in morbis continuis acutorum quidem morborum terminus est quartusdecimus, peracutorum septimus, & demum addidit, Sic in intermittentibus: quæ est dum est, de quibus intermittentibus loquatur, de acutis, videlicet, an de tardis, & diuturnis. Non est dicendum de tardis & diuturnis, cum tertiana non sit huiusmodi: præter id, quod falsum esset illud, quod asserit, longissimum scilicet terminum earum esse circuitum septimum: cum multæ non exquisitæ tertianæ reperiuntur, adeo tamen diuturnæ, ut non modo ultra septimum circuitum

tum protendantur, sed ultra decimum, vigesimum, & interdum quadagesimum. Nec valet, si dixeris, de intermittētibz brachychroniis eum fuisse locutū: quoniam & comparatio frustra esset, & nihil vile concluderet Gal. in prædictis verbis acutos morbos continuos cū brachychroniis intermittētibz cōparans, qui alterius generis sunt morbi: præter id, quod iā probatū est tertianā de numero eorū non esse. Quare velis, nolis, fateri cogaris quod de intermittētibz acutis loquatur, cū dixit, Sic in intermittētibz longissima tertiana febris terminū habet circuitū septimum, tertianā ipsam exquisitam acutum morbum intermittentem nuncupans. quod insuper verba eius sonant: nā, cur prius oportuisset dicere Sicuti in morbis continuis acutorū quidem morborum &c. frustra vtiq; apposuisset verbum illud Cōtinuis, sed satius fuissebat Gal. quod in numero acutorum morborum comprehenduntur & continui & intermittentes; propterea utrosque cōparauit, significās quod velut se habet decimus quartus dies in acutis continuis, quia vltimus est eorum terminus, sic in intermittētibz acutis, vt in tertiana ipsa, vltimus terminus est circuitus septimus, quod enim in cōtinuis vna dies valet, hoc in intermittētibz accessio. & propterea tertiana poterit ante septimum circuitum iudicari, vtputa in tertio, quarto, vel quinto circuitu, velut peracutus morbus in eisdem diebus septimum diē non expectans. erit denique tertiana exquisita acutus morbus intermittens, si præposita Galeni verba veritatē contineāt. Rursus, si verum est biliosum succū semper acutos morbos operari Gal. decreto com. Apho. 22. 7. lib. qui tertianā negabit esse morbum acutū, eius sententiā ac veritatē ex aduerso pugnabit: cum & ipsa ex bile ortū habeat. quinimo, si quis valet ex syn-cera bile morbus gigni, ille præcipuus erit exquisita tertiana. At forte dices, Gal. pro semper intellexisse, vt plurimū, vt sensus sit verborum eius biliosum succum semper, hoc est, vt plurimū operari acutos morbos; posset forte Gal. verba hoc modo exponi, nisi vsus fuisset aduerbio Græco *æter*, quod nullibi compertum est aliud Latine significare, quam semper. quapropter hic pro semper exponere, vt plurimū, siue magna ex parte, penitus falsum est, vt cuiuslibet, qui Græcas literas callet, manifestū liquet. Erit itaque ob id acutus morbus tertiana; quia biliosus succus semper acutos morbos operatur. Quod insuper tertiana feb. acuta sit, patet iis, qui Gal. verba inspiciētes 6. de Morb. vulga. ea intelligere velint: nam tex. Hipp. exponens, in quo febriū differētiās conscribit super Hipp. verba, Aliā verō acutā, inquit Gal. de caliditate celeriter manui occurrentē, suūq; ipsius velocē motū ostendente intelligere opus est. Ex quibus verbis constat, quod eas febres acutas Hippo. & Gal. appellant, quæ sua caliditate celeriter manui occurrūt, suūq; velocē motū ostendūt. Atqui tertiana huiusmodi est: ipsius nāque caliditas nō velociter modo, sed velocissimē manibus occurrit. quod cū pateat ad sensum, alia probatione minimē indiget. tū igitur quia suū ipsius velocem motū ostēdit, hacque ratione eius caliditas celeriter manui occurrit: tum etiā quod septenis circuitibus, quod tēpus longissimū est, iudicatur, Hippo. auctore Aphor. 59. 4. lib. erit tertiana febris acuta. Libro quoque 8. de Hippo. & Plat. decr. redar-
cap. 6 quēs Plat. Gal. de causis generationis febris tertiana

nā atque quotidianā, inquit acutissimas & ardentissimas febres à flaua bile oriri, & tertianam ex ardentium genere esse. at, si tertiana ex genere est ardentium feb. necessario & acuta febris erit: neque enim vna ardens febris est, quæ nō acuta dici possit, vt in expositione febris acutæ patet. hoc idē cōfirmavit lib. de Palpi. trem. rigore, & conuulsione, dū dixit: Tritæi quidem exacti si qua nota euident sit, est à rigore: quod cum vehementibus rigoribus inuadant paroxysmi. nullus autē vel non sanæ mentis febrem hanc in succo frigido fieri assermet: cum genere ardēs sit 2. cap. Vides igitur, quo pacto tertiana, cum genere sit ardens, acuta quoque febris dicenda erit, nisi asserere audeas ardentem aliquā febrē nō esse acutam, quod penitus Hippo. & Gal. doctrinā ac veritatē pugnat: nam quæuis ea sit, ex calidis procreatur succis biliosis, præsertim quorum natura est acutos morbos generare, qua ratione sit, vt, cum ardens febris à Gale. dicatur tertiana, nō minus & acuta dici debeat: cum enim ex bile ortū habeat, febris vtiq; erit multam & acrem habens caliditatem, eodē teste quarto de Ratione victus. cuius natura acuta febris est. Amplius, cum qualibet continua febris idem habeat genus cū singulis intermittētibz, vtputa quotidiana continua cum intermittēte, & quartana continua cum intermittēte, & exquisita febris ardēs cum exquisita tertiana, vt decretum reliquit Galen. 2. de Crisib. & cum quatuor in vniuersum sint morborum genera, ex motu & tempore distincta, eodem Galeno teste, tertio de Diebus decr. duo videlicet ex motu præcipuē, & duo ex tempore; de necessitate sequitur, quod in eo genere, in quo reponitur qualibet prædictarum continuarum febrium, in eodem & intermittens reponatur sibi correspondens, at, cum in genere acutorum morborum, acutarumque febriū, quæ exquisita ardens est, omnium consensu contineatur: in eodem quoque genere exquisitam tertianam contineri oportet: aliā diuersum haberet genus ab ipsa exquisita ardenti febre. quod manifeste Galeni dictis pugnat, præter id quod in nullo aliorum genere contineri posset, vt superius ostensum est. quapropter optimē Galen. eodem secundo libro de Crisibus dicebat, acutissimas maximeque adurentes febres hoc solo à tertianis differre, quod in illis flauæ bilis humor in vasis vnā cum sanguine continetur: in tertianis verō, cum vehementer moueatur, per singulas corporis partes diffeminatur: quamuis in eo, qui vtrumque facit morbum, humore communicent. Idem est ergo earum genus, eadem ambarum causa, ambæ ex necessitate acutæ secundum magis & minus tantum ratione locorum diuersorum discrepantes. qua ratione exquisita febris ardens poterit acutissima, atque ardentissima nuncupari, prout Galenus eam appellat: ipsa verō tertiana, acuta atque ardens, prout vbiq; locorum eius verba sonant. Nec minus tertianam esse acutum morbum ex his, quæ Galenus secundo prognostic. asserit, percipere possumus quō loco discrimen afferens inter extremarum partium refrigerationem in diutinis morbis, & eam quæ in acutis accidit circa accessionum principia, duplicem naturam acutorum conscribens, qui cum febre fiunt, vnā cum inflammatione in visceribus, & reliquam sine ea, dixit quod in morbis acutis cum inflammatione, propter inflammationis magnitudinem in visceribus fatigantis, parum sangui-

6. epid. 5. p.
com. 29

2. pro
com

4. 75

com

1. epid. 5.

tex.

1. epid. 5.

com. 34. 1.

2. tex.

1. ad Gl.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

sanguinis in omne permeat corpus, plurimum verò eius in parte inflammatione affecta includitur. & ob eam rem, licet extremæ partes frigida sint: mediæ tamen corporis partes, quæ sunt thorax & venter, admodum calent. Horum morborum idemet Gal. meminit commento Aphorismi 48. quarti libri, & primo septimi libri eandem eorum afferens rationem. Demum subdit, At verò per morbos acutos interdum accessio cum rigoreprehendens, aut refrigeratione, non solum extremas corporis partes, sed etiam eutem circa costas ac ventrem, frigida reddit. ea quidem circa viscera vitium non offendit. Cum in hac verborum serie acutorum morborum Gale. meminerit, in quibus accessio cum rigoreprehenditur, querendū ab eo de qua febre loquutus sit. Non erit dicendum, quòd de quartana: quoniam, licet cū rigore inuadat, inter diuturnos morbos connumeratur. Ergo de tertiana: nam hæc duæ tantum febres cum rigore inuadunt. At si de tertiana, quæ cum rigore inuadit, Gale. intellexerit, cum hoc propriū sit ipsius exquisitæ tertianæ: quis audebit eam negare esse morbum acutum? Dicit fortè quispiam Galenū per rigorem horrorem voluisse intelligere, & propterea per acutam febrem cum rigoreprehendentem semitertianam significasse: quæ quidē ex Hippocratis sententia primo de morbis vulgaribus acuta est: aut de aliqua alia cōtinua, quæ cum horrore inuadit intellexisset, possunt enim quædam esse huiusmodi. Hippocrate auctore primo de mor. vulg. & Galeno primo de arte cur. ad Glauc. Huic obici volo, nullibi Gal. per rigorem horrore intellexisse: immo inter eos lib. 10. Meth. meden. & secundo de causis sympto. discrimen non minimū conscripsit, asserens rigore propter multitudinem, ac excrementorum acrimoniam, impetusque celeritatem, cum per sensibilia corpora ferantur, atque ob laborantis virium infirmitatem fieri: contra horrorem excitari, vbi & qualitas eorum, & impetus velocitas est remissa, tum etiam copia minor, ac vis naturalis transiit obfistit. ex diuersis denique causis omnino cum fiat rigor & horror, nequaquam poterit nec à Galeno nec ab alio quouis alterum cum altero cōfundi. quæ de te nec de semitertiana Gale. dicta verificari possunt: cum eius non tantum cum horroreprehendat accessio, immo horrida sit, maiori scilicet accessions parte ab horrore occupata, qui medium est rigoris, & frigoris: nec de continuarum aliqua intelligi possunt: cum omnis continua febris (vt idem testatur secundo de diffc. feb.) suapte natura, si exquisita est, horrorem non habeat, neque rigorem: quamuis Hippo. 1. de morb. vulg. & Gal. primo de arte cur. ad Glauc. aliquam ex continuis febrem incipere posse cum paruo rigore affirmauerint: qui tamen rigores paucissimi ac minimi sunt vt Hippo. eodem loco testatur, quem Galenus exponens asseruit per paucissimos rigores Hippocratem horrore voluisse indicare. cum nanque scriptū reperitur paruos, seu minimos, aut paucissimos, rigores: possumus, immo debemus, horrorem intelligere: at non possumus, si simpliciter Rigor committitur sit. Cum rigore igitur retulit Gal. 2. prog. accessiones per morbos acutos interdumprehendere, & non cum paucissimo, siue paruo rigore. quare de horrore minimè intelligendum erit, sed de vero rigore, qui non, nisi in tertianis & quartanis, cum earum accessiones inuadunt, conspicitur. at eum nequeant eius dicta de quartana veritatem habere,

non enim est ipsa morbus acutus: necessariò de tertiana verificabuntur. & propterea inter acutos morbos connumeranda erit. Vterius, si Hippo. 1. de morb. vulg. semitertianā febre appellat horridam, continuā, & acutam, cum horrore suscipiat à quotidiana & tertiana simul, quoniam medium quoddam est inter tertianæ rigorem & frigus quotidianæ eueniens, continua autem sit propter quotidianā, quæ cōtinua est: quæret quispiam, à qua istarum febriu acuitatē habeat. & non erit dicendum, quòd à quotidiana: nam ipsa inter tardos morbos ac diuturnos comprehenditur, etiam si continua sit, & non inter acutos: quoniam non est celeris motus. nec ab vtraque simul velut horrore, sic etiam acuitatem, suscipit: nam quod ex sua natura quotidiana sola non habet, etiam cum alteri coniungitur, ex se tribuere nequit. at acuitatem ipsa nequaquam habet, cum nec ipsa febris acuta sit, vt tum ex eius motu, tum ex eius caloris qualitate constat. ergo nec, cum alteri febris copulatur, acuitatem illi præstabit. relinquitur ob id propterea acuta febrem semitertianā dici, quoniam tertianā habet coniunctā. quæ ratione fit vt, si per eam semitertiana acuta febris dicatur, ipsa quoque tertiana febris acuta sit. congruū insuper erit, cum tria in se cōplectatur semitertiana: horrore videlicet, continuitatem, & acutiē: vt vñ habeat à quotidiana, continuitatē videlicet: reliquum à tertiana, acutiē scilicet: tertium verò, horrorem ab vtraque. Quæ omnia confirmare videtur Gale. 2. de diffc. feb. dum inquit, Quod vbi tertiana exuperat febris, magis erit horrida semitertiana, & aliquid rigoris in accessione assumit. statim itaque calidior talis est, & ardentior, ac celerius peruenit ad consistendi vigorem. vbi verò pituitosus exuperat succus; frigus extremarum partiu exuperabit, & horror paruos erit, pulsusque contractio fortior, ac diuturnior est, & lentè accessio increfcit, multoque post tempore viget: non tamen sitim efficit, neque ardorem. & post pauca subdit, Incremētum verò post initium propter tertianam facile suscipit & caliditatem, atque ad consistendi vigorem festinat: propter pituitosum autem succum tardè citius igitur, aut tardius deuenit ad summū vigorem semitertiana, potissimū quæ non exquisita est, prout tertiana magis, vel quotidiana in ea exuperat: nam exuperante tertiana celerius ad summum vigorem accessio deuenit, statimque calidior, & ardentior erit talis febris, ac, si quotidiana; & diuturnior erit, lentēque accessio increfcet, & multo post tempore vigeat, vt ex prædictis Galen. verbis constat. quo sit vt nullo modo acuta appellari possit semitertiana propter quotidianam, cum ab ea oppositas penitus conditiones accipiat: tardum videlicet motum, diuturnitatem, & neque sitim, neque calorem causet: à tertiana verò celeritatem motus, ardorem, caliditatemque maiorē, ac sitim suscipit; quæ omnia acutis febribus insunt, quare, cum propter tertianam, quam coniunctam habet, semitertiana, acuta febris dicatur, ipsa quoque tertiana acuta febris erit. Quod si dixerit quispiam copulatam tertianam cum quotidiana, quando semitertiana sit, non esse exquisitam. sed notham; in idem incidet; nam nec acuta dici potest notha tertiana, nisi propter biliosum succum, qui in ea redundat. qui cum syncerior sit in exquisita tertiana, quam in non exquisita: acutior erit semitertiana, quæ cum exquisita tertiana composita est, quam, si cum non

1. epid. 5. p. 23

cap. 8

exquisita componatur. & si cum non exquisita co-
puletur quotidiana, licet ab ipsa tertiana acuitatem
habeat, quæ non exquisita est, præcipue tamen eam
acquirat propter flauam bilem redundatam in ipsa
tertiana notha, & non propter permixtionem ali-
cuius alterius succi, melancholici videlicet, vel pi-
tuitosi: ex quibus, vt declarauimus, in Gal. doctrina,
diutini & non acuti morbi excitantur. Idem quo-
que Hipp. 3. Prog. tertianam morbum esse acutum
apertè innuit: nam, cum de dolore capitis per febrē
acutam non exitiofam verba faceret, ait, Hæc acci-
dunt viris & mulieribus potissimum in tertianis.
Minoribus natu accidunt etiam in illis, magis verò
& in feb. cōtinuis, & in veris tertianis. tertianas ita-
que absque cōtrouersia hoc loco Hipp. inter acu-
tos dinumerauit morbos. est etenim liber progno-
de Morb. acutis, vt ipsemet in principio dicti lib.
fateatur, & Gal. primo de Crisib. ac eodem lib. Pro-
gnost. confirmauit. At quid amplius in hoc tempus
terere opus est, diuersiq; rationibus & auctorita-
tibus veritatē hanc fulcire tento, cum ipsemet Gal.
eam cōmento Aphor. 29. tertij libri apertissimè fa-
teatur: quo loco, cum Hipp. in Aphorismo conscri-
psisset nōnullos morbos, qui iuuenibus eueniunt,
inter quos febrium meminit acutarum, exponens
Gale. Hippo. verba inquit: Non sat plenè de acutis
febris dixit: neque enim dicere simpliciter opor-
tebat acutas, quæ & in pueris nihilominus fieri vi-
dentur, sed ex acutis tertianas maximè, & febres ar-
dentes: hæ enim præ cæteris febribus sunt biliosissi-
mæ, & plurimum iuuenibus accidunt: quoniam &
flaua bilis hac ipsa superabundat ætate, ex qua mor-
bi tales in summo ætatis vigore consistentibus ac-
cidunt. per quæ verba liquido ostēdit Galenus ter-
tianam esse in numero acutorum morborum, acu-
tarumque febrium. & reddens causam cur ipsa & ar-
dens febris plurimum iuuenibus accidunt, dixit,
Quoniam tertiana & febris ardens inter cæteras fe-
bres sunt biliosissimæ: bilis vero plurima iuueni-
bus, ratione ætatis, redundat. Ex quibus verbis col-
ligo biliosas febres esse acutas omnes, & quantò bi-
liosiores fuerint, tantò acutiores. At, si quispiam for-
san dixerit Gal. de cōtinuis, tertianis & nō de inter-
mittentibus loqui, cū dixit, Sed ex acutis tertianas
maximè; Ei responsū sit, nullibi cōpertū esse apud
Gal. per tertianā absolutè prolatā intellexisse con-
tinuā, veluti neque per quotidianā, vel quartanam,
sed perpetuā cum appositione continuā, vt in sex-
cētis locis patet. immo cōmento Aphor. 59. quarti
lib. asseruit non modò Hippocratis, sed omnium
Græcorum consuetudinem esse tertianam ipsam a-
liquando cū adiectione exquisitam, aliquando sim-
plici appellatione, tertianam scilicet tantummodo,
nominare: velut ipse quoque consuevit primo de
Morbis vulgaribus, & secundo de Differ. feb. non
semel duntaxat eam simplici appellatione nomina-
re. Qua de re, si quis vellet in prædictis Gal. verbis,
per tertianas, continuas intelligere, nō modò Hip-
pocr. & omnium Græcorum consuetudinem euer-
teret, verum eundem Galenum destrueret, eum nō
intelligendo, cuiusque dictis falsum omnino, ac con-
trarium sensum tribuens. cum igitur per tertianam
absolutè prolatam, in Hippoc. & Galen. doctrina
continuum intelligere omnino quispiam nequeat,
eamque dixerit esse Galen. acutum morbum, ac
acutam febrem, velut etiam fusissimè nonnullis ra-
tionibus probauimus, valeat perpetuò, qui eā non

esse huiusmodi pertinaciter sibi ipsis persuaserunt,
suum ipsorum opinionē quibusdam Gal. dictis fo-
uere cogitantes: quæ, quo veritas pròptius pateat,
in medium afferre ac exponere nō piguit, simulque
eorū rationes, quibus ea tueri conantur, soluere nō
prætermittā. interim Arabum principem, qui Ga-
leni opinionē ac veritati adhæret, non prætereā, po-
tissimum cum Gal. se esse interpretē fateatur. libro
enim quarto, sen prima, tracta primo, cap. 4. inquit:
Et tertiana pura & caufon sunt de acutis valde, &
eodē libro & sen, tractatu secundo, cap. quarto di-
cebat: Et tertiana quidem pura est acuta propter
subtilitatem materiei: & eius caliditas est magna,
mordicatiua propter fortitudinem cholera. Qui ta-
men tertianā contendunt non esse morbum acutū,
hac prima ratione credunt id confirmare: de ratio-
ne nāque morbi acuti, si cum febre sit, inquit, est,
quòd sit cum febre continua: sed tertiana non est
huiusmodi. igitur non est morbus acutus. maiorem
esse Gale. asserunt in commento Aphor. 30. quinti
libri, quo loco dixit: Si enim sit cum febre morbus,
necesse est ipsum febres habere continuas: talis e-
nim est morbus acutus: Huic primò responsū sit
falsum esse, quòd de natura omnium morborum a-
cutorū, etiam eorū qui cum febre sunt, sit, esse cum
febre cōtinua. & cum illud confirmant Galeni au-
thoritate, dicimus quòd velut apud Hipp. illud ver-
bum Græcum ἀνὰ χρόνον, quod Latine sonat necessa-
riū, non facit enunciationem talem, quòd impossi-
bile sit aliter se habere, seu perpetuam, vt idēmet
Gale. testatur Aphor. 58. sexti libri, sed quòd magis
ex parte soleat ita accidere: & propterea non tantū
in Aphor. sed in aliis quibusdā eo vtitur, quāuis res
ipsa non semper eodem modo eueniant: etsi figura
dicendi perpetuitatem quandā indicet: sic apud Ga-
lenum dicendū erit, quòd per illud verbum ἀνὰ χρόνον
voluit intelligere quòd magna ex parte consuevit
accidere, vt sensus verborū eius sit: Si enim sit cum
febre morbus, necesse est, hoc est, magna ex parte
accidi, ipsum febres habere cōtinuas, non propter
hoc abnegās febrem aliquam intermittentem esse
morbum acutum. vel rectius dicendum falsum esse
id, quòd primò asserunt, ac Gal. auctoritatem haud
esse ad propositum. nam, cum duplex sit acutorum
morborum cum febre natura; vna, cum in humori-
bus calidis, qui nullam obsedere propriam sedem:
altera, cum loco aliquo patiente fiunt, vtpote ortis
in visceribus inflammationibus quibusdam, eodem
Gale. auctore commen. Aphor. 19. secundi lib. cum
Galen. dixit, Si enim sit cum febre morbus, necesse
est ipsum febres habere continuas: talis enim est
morbus acutus: de eis intellexit morbis acutis, qui
aliquo loco patiente fiunt, inflammatione videli-
cet viscus aliquod, & præsertim princeps, frangente.
quorum morborum natura est, quòd necessario at-
que perpetuò sint cum febre continua: & nō de eis
verba fecit, qui in humoribus calidis fiunt, qui nul-
lum obsedere proprium locum. id autem ostendit
apertissimè verba eius, dum asseruit, Si enim sit
cum febre morbus: vt secluderet eos ab his qui sine
febre fiunt, parte etiam aliqua patiente, vt apo-
plexia; necesse est, inquit, hunc eundem morbum
febres habere continuas. præsupponit itaque pri-
mò aliquem fieri morbum acutum, ad quem fe-
bris sequatur; illam demum asserens ex necessita-
tate debere esse continuam: quòd quidem in nul-
lo alio acutorum morborum genere veritatem
habere

1. epid. sect.
2. com. 19
cap. 8

habere posset nisi in his, quas suprà diximus, inflā-
 tionibus, ortis videlicet in viscerū aliquo, vt in
 morbo laterali, pulmonis inflātionē, angina, &
 aliis huiusmodi morbis quas dā determinatas se-
 des fatigantibus. Ex quibus constat. Gal. non id asse-
 rere, quod isti putāt, in prædictis verbis febrē vide-
 licet omnē acutam necessariō esse continuā: sed eā
 dixit necessariō esse continuā, quæ ad aliquē mor-
 bum acutū sequitur, vtputa qui aliqua determinata
 parte patiente sit, velut in alicuius visceris inflāma-
 tione conspicitur, non propterea negans per hæc
 verba, q̄ aliqua febris acuta, vt diximus, possit esse
 intermittens. & propterea hoc falsum est, quod isti
 dicunt, omnī acutorum morborum naturam pro-
 priā esse vt febrē continuam habeat: cum in ea acu-
 torū natura, & in humoribus calidis fit solis, qui nul-
 lum obsedere locū, sed æqualiter in omnibus ani-
 malis partibus apti sunt ex sua natura generari, ve-
 ritatem haud habeat, veluti suprà probauimus. At
 mox, quæ diximus, oppugnat quispā, nullibi as-
 ferens horum morborū Hipp. nec Gal. meminisse.
 Cui responsum dābimus & horū ambos mentionē
 fecisse, vt liquet his, qui non corticē tantum, sed in-
 ternam medullā eorum verborū gestarunt: nā, cum
 Hippo. primo Prognost. ait, Spirationis facilitatem
 exultimare oportet perquā magnam vim habere in
 omni morbo acuto, qui cū febre infestat, & quadra-
 gesimo die iudicatur, nonne eorū morborū memi-
 nit acutorū, qui etiā cum febre intermittente fiunt,
 dum asseruit: Qui cū febre infestat, non addens cō-
 tinua? At fortē diceret quispā quod, licet illud
 non apposuerit, tamen de continuis tantum voluit
 intelligere: verum hic, præter id quod verba Hip-
 poc. peruerteret, ac eā falsō intelligere ostenderet,
 Galeno quoque ē directo pugnaret: cum, si de eis
 tantum loqui voluisset, apposuisset utique cōtinua,
 haud ignorās, q̄ per febrē simpliciter dictam, in-
 mittentem & continuā, ac fortē magis intermit-
 tentem, quicquid intelligere posset, pugnaret quoque
 Galeno, qui secundo de Diebus decreto. Hippo-
 crates à quorundā calumniis defendēs, qui eīdē im-
 posuerāt sibi pugnantia scripsisse de morbis acutis:
 cum aliter in Aphorismis, aliter in prognosticis ab
 eo scriptum reperitur: ponderans prædicta Hipp.
 verba de facili spiratione in morbis acutis inquit,
 Quod nisi ipse Hippoc. cognouisset acutorū dupli-
 cem naturam, nō sanē distinxisset cum appositione
 quadam suā sententiā: verum simpliciter dixisset,
 quod facilis spiratio in acutis morbis magnū valde
 momentum ad salutem habere putanda est, nunc
 autem, cum huiusmodi dictionem simpliciter acu-
 tos declaraturam sciret, non tamē ita, verum, cum
 his etiam alia completi vellet, non sine ratione ap-
 posuit primum, quibus febris copulatur, non adscri-
 bens continua, quod absolutē acutorum erat pro-
 prium. quibus verbis causam Galen. reddit cur in
 prædicta dictione, cum dixit, Qui cum febre infe-
 stat, non addidit continua, inquit: Quia volebat
 Hipp. id non tantum verificare in absolutē acutis,
 verum in aliis: nam, si voluisset eius dicta veritatem
 habere in absolutē acutis tantum, apposuisset illud
 verbum continua, quod absolutē acutorū erat pro-
 prium. cum igitur illud non absolutē adscripserit,
 & propterea, vt inquit Gale. dictum Hippoc. quod
 de facili spiratione scripsit, in aliis etiam acutis ve-
 rificatur, necessariō sequitur aliquem acutorum
 morborum, non tamen absolutē & simpliciter,

esse cum febre intermittente iuxta Hippocr. sen-
 tentiam. Sed mox quispā rursus instabit, in-
 quiens hoc, quod diximus, Hippocr. pugnare: qui
 primo de Ratione victus in morbis acutis fatetur
 acutorum morborum febres omnino esse con-
 tinuas. huic respōsum volo. Primō Hipp. eorū me-
 minisse acutorū morborū, quos prisci acutos nomi-
 nabāt vt sunt pleuritides, peripneumoniæ, phreni-
 tides, &c. & propterea, ad eorū mentem, dixit horū
 omnino febres esse cōtinuas: nā hi tantum à priscis
 acuti morbi nuncupabantur. vel dicas, si ex propria
 sententiā illud fenserit, verbū τὸν αὐτὸν; nō semper
 omnino, sed interdū magna ex parte Latine sonat.
 quare in morbis acutis magna ex parte febres esse
 continuas Hippo. retulit. id quod nec nos suprà ne-
 gauimus. vel, & rectius, quod de his acutis morbis
 ibi loquitur, qui propriē & absolutē acuti nomi-
 nantur. hi sunt, cum determinata parte affecta, in-
 flammatione videlicet ortā in aliquo viscerum, ve-
 lut series verborum eius sonat, vt quicquid poterit
 videre: quos insuper idem Hippoc. primō de
 morbis vulga. acutissimos nuncupat, maximos
 ac grauissimos: in his namque omnino febris est
 continua. at in aliis, qui alterius sunt naturæ, non
 inconuenit interdum febres esse intermittentes,
 velut supra declarauimus. Non verbo Hippocrati
 pugnat dicere aliquem morbum esse acutum cum
 febre intermittente, modō de absolutē acutis non
 intelligatur, maximis ac grauissimis morbis, velut i-
 pse primo Prognost. in prædicta dictione tacitē
 confessus est, vt Gal. placuit. Verum quouis loco
 cum fateri inueniatur, acutos morbos omnino esse
 cum febre continua, de absolutē acutis, maximis,
 grauissimis & acutissimis intelligendum erit. hi nā-
 que sunt, qui omnino cum continentibus febribus
 fiunt, ac propriē acuti nominantur, vt Galen. visum
 fuit libro tertio de Difficu. respi. ea parte, qua Hip-
 poc. verba primo de Rat. vict. conscripta hoc mo-
 do exponit. Quod verō aliqua intermittens febris
 acutus morbos sit, apertissimē Gal. ostendit secun-
 do prognost. vt diximus suprà, insuper & secundo
 de diebus Decre. dum inquit, Nonnulli autem sta-
 tim ab initio morbi, velut prohibiti, tardeque mo-
 ti, & nullam interea subitam mutationem moliti ad
 quadragesimum producuntur. Duplex autem ho-
 rum quoque natura est: vel enim accessionum re-
 missiones in exactam integritatem finiunt, vel con-
 tinua febris semper durat. & subdit, Tales etenim
 acutorum naturæ adherere videntur; nam alij ma-
 nifeste sunt diuturni. Connumerat hic, vt liquet,
 Gale. morbos acutos cum febre intermittente: nam
 de his sermonem faciens vltimo loco dixit alios ab
 his, quos conscripserat, omnes esse diuturnos. hoc
 idem parte poterit cuius eius verba inspiciēt, quæ
 asserit de acutis morbis in commento Aphorif. 19.
 secundi libri, & quæ de tertiana scripsit comment.
 Apho. 59. quarti lib. Sed circa hoc iterum hæsitare
 contingit: nam idem Gale. com. Aphor. 7. primi li-
 bri fatetur febres ab acutis morbis esse inseparabi-
 les, & commento præcitati Aphorif. 19. secundi li-
 bri in acutis morbis dixit febres omnino esse con-
 tinuas. commen. quoque Aphorif. primi septimi li-
 bri auctoritate Hippo. scriptum reliquit acutos vo-
 cari morbos, quorum febres omnino sunt conti-
 nuæ. at, si eorum, quæ mox diximus, non fuerit o-
 blitus: promptissimē hæc Gal. verba conciliabis:
 nam, cum dixit à morbis acutis febres esse insepa-

1. reg. acuti
tex. 8

1. epid. f. 3
text. 3

text. 25

cap. 9
com. 4
cap. 12

2. Aphorif.
8. text.

rabiles: de absolute, ac exacte talibus loquutus est: ut de causo, synochis, vel aliquis morbis, qui cum parte patiente fiunt, inflammatione videlicet orta in visceribus, qui quidem absolute acuti dicuntur. & propterea nec cum eis nos febrem intermittentem copulamus, verum in alia acutorum morborum natura illud fatemur, ut supra ostendimus. Ad reliquas Galen. auctoritates bifariam quoque respondere possumus, ut puta similem offerendo responsionem cum acutorum distinctione, & insuper asserentes ipsum uti verbo *ἡ ἄνθρωπος* quod non modo Latine significat omnino, sed plurimum & magna ex parte, ut velit Gal. non omnino, sed magna ex parte febres continuas a morbis acutis esse inseparabiles, quamvis prima responsio congruentior sit. Atqui rursus dices Galen. tertio Pronostico, voluisse morbum acutum intelligi cum magnitudine quadam, ac febre continua. & subdit: Si enim non ita sit, quamquam circa decimum quartum solvatur diem, aut etiam citius, eiusdem appellationis nequaquam censemus. At dicemus nos Gale. eo loco narrare differ. morb. secundum diversas temporum praefinitiones. quapropter circa ea ambigit, tum de morbo acuto, qui interdum decimum quartum die pertransit, protenditurque usque ad vigesimum: tum etiam quod nonnulli alij morbi etiam si in quatuordecim diebus finiant, aut citius, acuti non sunt appellandi, nisi hi & magnitudinem quandam habeant, & sint cum febre continua: verum nanque fateatur, quoniam hi proprie acuti ab eodem Gale. nominantur, tertio de Difficul. respira. & absolute acuti nuncupantur 2. de Diebus decreto. quod alij sunt, qui non ita proprie, absolute, seu exacte acuti dicantur non negans: quinimmo & 2. Prognost. & 2. de Diebus decreto, ac commento. 19. Aphorif. secundum lib. sapius citati, sexcentis que aliis in locis illorum meminit. qui autem exacte, seu absolute acuti dicuntur, hi & magnitudinem habeant, & febre continuam oportet. at, qui non ita absolute sunt, satis erit, quod ad summum vigorem celerrime properant, ac magni sunt, iuxta eiusdem Galeni sententiam comment. Aphor. 23. secundum libri, siue continua fuerit febris, siue intermittens. Et, ne sapius eadem repetantur, dicimus, quod ubicunque in Hippo. & Gale. commentariis fuerit compertum acutos morbos omnino esse cum febre continua, perpetuo de exacte seu absolute acutis intelligendum erit. quos morbos Hippoc. 1. de Morbis vulga. acutissimos, maximos, ac gravissimos nuncupavit: & ut Gale. exponit, tum in febribus eveniunt, quae vocantur proprie synochi, tum in aliis, iuxta quae singulis progrediuntur accessionibus, ac initia efficiuntur, incrementa, vigores, & inclinationes manifestas, nec tamen ad integritatem veniunt. inter quos nolumus tertianam connumerari: verum fatemur in alia acutorum morborum natura comprehendendi, nec id eorum dictis pugnare, immo satis consonum esse censemus, ut abundantissime probatum est. Non est igitur de ratione cuiuslibet acuti morbi, quod sit cum febre continua, iuxta Hippo. & Gal. decreta. sed eorum tantum, qui exacte, seu absolute tales dicuntur: quamvis quidam sibi ipsis falso illud persuaserint. Amplius tertianam non esse morbum acutum alia ratione probare tentant: nam, cum acuti morbi ex eorum natura periculosi sint, ipsa vero tertiana periculo vacet, ut patet auctoritate Hippo. Aphorismo 43. 4. lib. & Gal. cum

in eius commento, tum etiam primo de Arte cura. ad Glauc. dum assererit eam esse mitissimam, & minime periculosam, utpote quae nec ex inflammatione aliqua, neque ex maligna humorum putredine occasionem habeat, propterea quia intermittit: ea de re non erit morbus acutus. at quod periculosi sint acuti morbi, cum Hippoc. confirmare conantur, qui primo de Rat. vict. inquit eorum plurimos enecare. & primo de Morbis vulg. eos asserit praeter ceteris omnibus esse lethales. hoc insuper corroborant Gal. auctoritate secundo de Diebus decreto, qui Archigenem summopere laudabat, quod acutos morbos non nudis temporibus solis, sed motu & natura, appellauerit, eos videlicet, quibus motus velox & subito pericula adveniunt. hos quoque cum periculo coniunctos esse testatur idem Gale. ex propria sententia eodemmet. lib. primo de Morbis vulga. At, si eorum memineris, quae paulo ante diximus de acutis morbis, facillime huic rationi, velut friuola & exigui momenti, responsio patebit. diximus namque eorum morborum naturam duplicem esse: vnam circa aliquem determinatum locum affectum: reliquam cum loco aliquo patiente, seu inflammatione affecto, praesertim si princeps viscus fuerit, & inflammatio magna. his itaque, qui sunt prioris naturae, ut qui non ex inflammatione originem ducant, sed ex humoribus calidis solis, si neque ex maligna humorum putredine occasionem habeant, qui plurimi sunt, proprium non est cum periculo esse: quinimmo fere cuncti, qui huius naturae sunt morbi, periculo vacant, praesertim si intermittant, velut Galeno visum fuit com. praecitati Aph. 43. quarti libri. horum quoque accessio interdum cum rigoreprehenditur, aut refrigeratione, velut Gale. sentit secundo libro Prognost. reliqui vero acuti morbi, qui loco aliquo patiente fiunt, & prorsus febres habent continuas, absolute ac exacte appellati: immo ab Hippo. primo de Morbis vulg. acutissimi, maximi & gravissimi dicti, non modo periculosi sunt ut placuit Archigeni & Galeno, verum praeter ceteris omnibus sunt lethales ac interficiunt, eodem Hippocr. auctore primo de Morbis vulg. & primo de Ratione vict. in morbis acutis. cuius naturae acutos morbos cum periculo coniunctos esse nemo sane mentis negare audebit. At quod de his, & non de aliis loquatur Hippo. ex verborum eius lectione praecitatis locis cuilibet, vel parum erudito liquet, velut etiam doctissimus Gale. exponit. Quod vero Archigenes 2. de Diebus decre. de his quoque sermonem faciebat, cui non patebit, si Gale. verba inspiciat, ac intelligat: dicebant enim quod Archigenes laudandus erat, qui non solum temporibus solis nudis, sed motu & natura magis acutum, vel peracutum morbum appellauerit, cui videlicet motus velox, & subito pericula adveniunt: non enim Archigenes quemlibet acutum morbum, sed magis acutum, vel peracutum his conditionibus describebat, ut Gale. phrasim indicat. atqui huiusmodi morbos neque nos negamus cum periculo coniunctos esse: sed alterius naturae morbos acutos, qui non ita absolute ac proprie acuti sunt, & propterea nec acutissimi, maximi ac gravissimi appellantur, qui quidem in humoribus calidis solis fieri consueverunt, qui nullum obsedere locum: hos, inquam, fatemur interdum periculo vacare, praesertim si intermittant, ut tertiana, (de qua loquimur) propter iam traditas causas. Non est igitur de ratione cuiuslibet morbi acuti esse

esse cum periculo, velut quidam imaginati sunt: sed tantum, quod sint velocius motus, & magnitudinem habeant, Gal. decreto cō. Apho. 19. & 23. 2. lib. sepius citati. Et, si apud eius scripta compertum fuerit quandoq; asserere acutos morbos cum periculo esse coniunctos: de his intelligendum erit, qui absolute tales sunt, acutissimi, maximi & gravissimi, velut Hippo. & Archigenes quoque sentit. At de novo aduersus ea, quæ diximus, instabunt, Hippo. dicentes, ac Galen. nullibi horum acutorum morborum, qui sine periculo sunt, meminisse: immo semper de acutis verba facientes illos periculo coniunctos esse dixisse. Respondemus nos & horum quoque non omnino esse oblitos, sed interdum sermonem fecisse: nam Hippoc. 3. Prognostic. cum inquit, Simplicissimæ enim febres, hoc est, placidissimæ ac mitissimæ, vt Gal. exponit, & signit firmatæ securissimis, quarto die, aut citius desinunt, de acutis febribus simplicissimis ac securissimis loquutus est, dixit iudicari quarta die aut citius. Sed dicent fortè non de acutis febribus intelligere per hæc verba, sed de diariis. Atqui hoc asserere est Hippocr. non quod non intelligere, sed eius omnino verba pervertere: cum & ipsemet, vt superius annotauimus, circa finem eiusdem libri fateatur se cuncta eo libro conscripsisse de acutis morbis, & aliis quicunque ex his consistunt. cum verò febres diariæ nec acutæ sint, vt diximus, nec ex eorum morborum numero, qui ex acutis consistunt: quoniam nec quarto die, aut citius desineret, sed ultra protèderentur, sequitur ergo, quod inter acutas connumerari debent prædictæ febres, quas simplicissimas ac securissimas Hippo. nuncupauit. At quid alia opus est ratione ad probandum Hippo. de acutis febribus in ea verborum serie loqui: si Gal. hoc modo eadem verba exponit 1. de Crisibus asserens, ea de acutis febribus intelligi debere? quod si ita est, meminit igitur Hippo. febrium acutarum, quæ sine periculo sunt, in prædicta verborum serie, quapropter apud eum non omnis febris acuta erit cum periculo coniuncta; immo, si liceat Hippoc. per Gale. exponere: fortè per prædictas febres exquisitæ tertianæ intelligendæ sunt: cum has Gal. 1. de Arte cur. ad Glaucō. mitissimas ac breuissimas appellauerit, præter id quod minimè periculose sunt. aliàs dicant quæso, de qua alia febre Hippoc. dicta verificari valeant, nisi de tertiana ipsa exquisita, seclusis diariis, de quibus, vt diximus, impossibile est Hip. loqui: cum inter acutas febres nulla alia reperiatur, quæ mitior & simplicior (vt ita dixerim) ac securior ea sit? præsertim si febres quarto die, aut citius desināt, vt tradit Hip. At si velis aliquam aliarum acutarum febrium voluisse Hippo. intelligere, & non exquisitam tertianam: satis erit me monstrasse Hippo. febres acutas circa periculum interdum scripsisse, & non cunctas, eius sententia, periculo coniunctas esse, velut quidam ad eius mentem falso sentiunt. Galen. insuper Hippo. ac eorum, quæ diximus, non immemor, primo de diebus decreto. talia verba retulit: Si quis primo die acuta febre infestetur, nullum autem periculosum signum ipsi attulerit, sed in vrinis aliqua concoctionis nota inuenta fuerit, non extra quartum diem morbus soluetur: quin etiam, si multa lethalia signa primo die statim deprehendantur, morietur planè non extra quartum diem & subdit,

At, si acutè febricitet, nullum verò signum lethale adsit, immo nec aliqua concoctionis nota: fieri nō potest vt hic quartanus decedat. Et lib. 1. de Crisi loquens de præcognitione futuri vigoris, quem quidem Medicus minimè ignorare debet: aliàs permultum errabit: inquit ipse, Quid enim, si aliquis primo statim die nullum habens signum periculorum, verum insuper omnia salutaria, acutè quidem febricitet, vrinam autem mingat bene coloratam, ac mediocriter crassam, an non in propatulo est Medico qui in artis operibus est exercitatus, hūc in primis quatuor diebus crisin habiturum? & eò magis, si nebula aliqua, vel suspensio ibi adesset: atque etiam tantò plus, si bona subsidencia. & post pauca iterum dicebat: Sicuti igitur, quæ omnia habet signa tutissima, febris acuta, in prima periodo decretoriorum dierum solutionem habet: sic quæ isti proximè adiacet, diem septimum non transcendat. Non igitur proprium est acutarum febrium omnium esse cum periculo, sed earum quasdam esse simplicissimas ac tutissimas satis admodum cum Hippoc. & Gal. probatum esse censeo, velut nec eas aggritudines penitus cum febre continua esse nisi acutissimæ, maximæ vehementissimæque sint: namque de his veritatem habent Hippo. Gal. vnà & Archigenis dicta, si apud eos compertum sit acutos morbos cum periculo coniunctos esse, ac cum febre continua, non de his qui alterius naturæ sunt, vt probauimus. Hac itaque ratione conciliari possunt quæcunque in eorum commentariis scripta de acutis morbis comperta sint; cum non vno modo de eis vbique locorum sentiant, ac pugnancia asserere videantur; nam interdum, de absolute acutis verba facientes, eos pericula & febres continuas habere asserunt: sæpenumero citra periculum ac febrem continuam morbos quosdam acutos esse affirmant: cum videlicet non de absolute, seu exactè acutis loquuntur, quamuis ipsi decimumquartum diem non excedant, in quorum numero exquisitam tertianam connumerari audacter affirmamus. Est namque ipsa in numero acutorum morborum simpliciter dictorum, non tamen absolute & exactè talium, sed eorum qui non absolute tales dicuntur: cum non sit febris continua, quapropter & periculo vacat, vt diximus, & septem circuitibus, quod tempus longissimum est, terminatur: quod etenim in continuis vna dies potest, hoc in intermittētibz accessio Gal. auctore 3. Prog. & commento Apho. 59. 4. lib. illud namque, quod omnium acutorum morborum naturam complectitur, est motus celer & magnitudo: cuncti etenim & magni sunt & celeriter indicantur, velut superius ex Galen. sententia commen. Apho. 19. & 23. 2. libri probatum est. quod namque cum febre continua sint, vel non, cum periculo, vel absque eo, magis, vel minus acutum morbum denuntiant, seu absolute, vel non absolute talem, vt patet apud Gale. 2. de Diebus decret. cum ex propria, tum ex Archigenis opinione. Quibus igitur rationibus tertianam non esse morbum acutum quidam probare nixi sunt, tot & tales existunt. quæ quantum valeant, quidue momenti obtineant, ex prænarratis liquet: per quæ non modò facilè rationes hæc delentur: sed, si reliquas innumeras præ manibus habuerint; his, quæ conscripsimus, promptè responsio patebit.



DONATVS ANTONIVS
ALTIMARVS, ANELLO
TVRBOLO ET PADVANO
GVLIELMINO

S. P. D.



Et iustis quamsepiſſimè summa, qua fieri potuit, diligentia, iuvenes per-
ritiſſimi, vt scriberem, quid ſentiam de ſanctatis latitudine, quam Gale-
lenus breuiſſimè ac abſolutiſſimè tradidit: ex quo factum eſt, vt tot,
varia, minimèque ſibi conſtantes extarent ſententia, quæ veſtros ani-
mos Euripi more paulo momento huc, vel illuc impulerunt. Quamobrè,
ne meo ab officio diſcedere viderer, huic iuſta petitionis veſtre, ami-
cisque aliis ad hoc ipſum nos hortantibus, ſatiſfacere conſtuiti: & Gale-
leno addiſtus ſucceſſus (vt aiunt) operis hæc ſcripſi: non enim inter-
mittere ſtudia ſeria poſſum, ſed ne remittere quidem, aut relaxare in-
genium: tantum abeſt, vt otiaſci valeam: & ſi quid otij ſuper eſt, id in ægrotis curandis (vt noſtris)
conſumere oportet. nec propterea meum inſtitutum non tenui. Verum quò vobis ſatiſfaciam, ea ſcripta
ſunt via & ratione, vt facile quæcunque Gale. olſecerit, percipere poteritis. Sed, ſi qui ſint, qui barbaro-
rum, aut etiam recentiorum opiniones imitari, ab eorum ſententia diſcedere nequeant, & noſtra huic
opinionem, nulli poſt Galen. memoriam ſcripta, repugnauerint: Galen. ſe repugnare ſciam: vòſque ex
illius ſententia omnia poteritis aſſerere. Valete.

ANELLVS TVRBOLVS

LECTORI S.



Olent, Lector, quæ ab altomari aduehuntur, noua eſſe,
hominumque curioſitatem, quæ noua ſemper exoptat,
allicere. Ecce ſanctatis, quam vocant, latitudo ab Alti-
maro ab nos transfretata, te nunc ad legendum inuitat
atque alleſtat. ea certè ſi Galenum ſpectes, vetus eſt: ſin
poſt Galenum ſcribentes, noua. Ne mirere, nec temerè
deſpicias, priuſquam rem aſſequaris: ſcio enim te nec montes parere
mures, nec Ægyptiorum templa viſurum. Interim admirabile de febribus
opus propediem in apertum proferendum expecta. Vale.

DONA-

DONATI ANTONII
ALTIMARI MEDICI
AC PHILOSOPHI NEAPOLI-
TANI, DE SANITATIS
LATITVDINE.

SI QVIS exactè velit iuxta Galeni sententiam numerum ac ordinem salubrium corporum, neutrorum, ac insalubrium dignoscere, quæ sanitatis latitudinem intelligere, opus est nonnulla pro hypothesis prius assumere: quorum primum est, quid per sanitatem intelligendum sit.

1. de Sanit. tuen. cap. 5. & cum eodem Galeno dicimus, quod nil aliud, quàm cam corporis constitutionem intelligere volumus in qua nec doloribus cruciamur, nec in vitæ actionibus impedimur. quam si quis vellet alio nomine appellare quàm *εὐταρίαν*, ut ipse inquit, non reclamamus. Satis sit omnium consensu comprobatum esse, quod homines tunc se sanos existimant, quum partium corporis ministerio, ad eas, quæ in vita necessariae sunt, actiones, sine aliquo vitio, perfungi possunt. At cum corporis partes quædam ex ipsis elementis primò fiant, quæ similes dicuntur; quædam verò ex compositione dictarum similium partium, quæ instrumentales appellatur, sint: quæ actiones quædam primæ & similiarum partium: quædam secundæ & instrumentariarum: animaduertas oportet secundò, sanitatem non solum nec absolute consistere in medio temperamento, seu debita convenientia, quam *εὐκρασίαν* & *συμμετρίαν* appellant, elementorum, ex quibus constamus: sed eam duntaxat, quæ est similiarum partium, in ipsis consistere: nam neque minùs sanitas consistit in instrumentalibus partibus. constat autem ea ex numero, figura, magnitudine, ac compositione dictarum partium. Tertiò scire licebit sanitatem, quemadmodum etiam & morbum, in corporum affectione, seu constitutione consistere, nò in actione, siue actionis læsione, ut liquet primo de Sanit. tuen. Et propterea dicebat Galen. lib. de Differ. morb. [Hinc perspicuum existit, quod sanitas non in operatione, sed facultate & potentia potius est definienda.] ut autem operari possimus, structura efficit naturalis. in hac ergo consistit sanitas vnde & hæc ipsa ad operationem vim obtinet causæ. Siue igitur naturalem omnium partium corporis constitutionem sanitatem appellare libuerit, siue operationem causam, in idem vterque incidit sermo, ut ipse Galenus faceret. Erit itaque sanitas affectio, seu constitutio naturalis, seu secundum naturam, actionem perficiens. Neque enim, si affectus secundum naturam se habeat, omnino etiam sanitas existit, ut Egyptiorum nigritia, Gallorum candor, Scytharumque ru-

fus color, quorum nullum sanitas est: quoniam ad aliquod opus edendum nullus talis color causæ rationem obtinet, ut eodem primo de sanitate tuenda patet. Quartum pro hypothesis præsumptum esto, quod cum sanitas, ut dictum est, symmetria quædam sit, & omnis symmetria duplici ratione nò solum perficiatur, sed etiam dicatur, ut Gale. inquit eodem loco: nam aliàs quæ ad summum peruenit & verè prorsusque symmetria est, aliàs quæ ab huius absolutione perfectioneque paululum deficit: ita & sanitatis symmetria duplex vtrique fuerit, hæc quidem exacta, optima, absoluta, & summa: illa verò paulum ab hac deficiens, non tamen eatenus ut animal sit grauis, sed vñbus nostris adhuc non sit inepta. Prima sanitas, quæ insectilis simul est, & dicitur, cogitatione potius in animantium corpore usurpatur, quàm solidè subsistat. & esto quod reperiri possit de hac haudquaquam noster erit sermo, sed silentio prætereunda: nam si hos duntaxat sanos esse dixerimus, quorum singula membra suas absolutissimè obeunt functiones, frustra tentaremus sanitatis latitudinem condere, quum ea vna sola sit, & insectilis, ut prius diximus: de qua asserbat Gale. eodem primo de sanitate tuen. quod si ea sola, sanitas diceretur, & eos duntaxat sanos esse diceremus, quorum singula membra functiones suas obeunt absolutissimè, ceteros, qui minus probè sunt affecti, non esse sanos, inutilis, irritaque esset ars de Sanit. tuenda. nam tali ratione nemo nostrum sanus existit. quare nec etiam nobis quærenda talis sanitas est, sed, ut diximus, silentio prætereunda. De hoc etiam corpore lib. de optima nostri corporis constitutione, asserbat Gal. quod quàm rarissimum est, & tanquàm imago quædam normæ Polycleti, longissimoque temporis intervallo gigni solet. de eaque itaque sanitate verba faciemus, quæ nec planè absoluta, optima, summaque est, sed paulum ab hac deficit. Et, quoniam sanitas hæc neque angustum quippiam est, aut insectile, aut omnino simplex, verum extendi ad idoneam latitudinem potest, maioris, minorisve ratione diuidua: propterea huius affectus, quem sanitatem dicimus, notabilem quandam latitudinem esse, cum Galeno asserimus, eodem libro de Opt. corpor. constit. primo de Sanit. tuenda. lib. Artis medic. & lib. de Differentiis morborum. Verum sanitates hæc, licet multæ variæque sint, ut dicemus, ratione, qua sanitates sunt, & comuni omnium forma, vnde sanitates dictæ sunt, haudquaquam inter se dissident, sed maioris minorisque ratione: velut niuis candor ab eo qui in lætæ visitur, quatenus candor est, non dissidet, sed

tonis

maioris, minorisve ratione differt. ita quoque Platonis sanitas ab ea, quæ in Socrate est, quatenus sanitas, non differt: sed & eadem cum ipsa. differunt autem altero quopiam, quod aliud planè non est, quàm maioris minorisque ratio. quæ dissimilitudo non ab alio nascitur, quàm ab ipsa constitutione, unde actio proficitur: respondent etenim constitutionibus opera. quæ de re quot sunt functionum differentiarum, tot erunt constitutionum discrimina: Sed illarum numerosa sunt. erunt ergo & constitutiones æquæ multæ. Nec inconuenit quòd omnium, qui sani sunt, membrorum constitutio in symmetria consistat, & quòd propterea multæ variaeque constitutionum symmetriae sint. Nam cuiuslibet sectæ sanitas symmetria quædam est: hæc autem symmetria, seu eucrasia, omnino insectilis atque indiuisibilis non existit. Præterea neque cuiquam violentum apparere debet medium temperamentum, seu debitam conuenientiam, posse dici quòd medio ad vnguem temperamento non sit. nam ut potionem & balneum *εὐπαρεον*, hoc est, temperatum dicimus, non solum cum alterum huic, alterum illi tale est, sed etiam quum ad eundem hominem in latitudine tale est, similiter aërem nos ambientem temperatum dicimus, etiam si in alterutram partem paululum sit propensus: ita quoque de medio temperamento sentiendum est. Insuper eodem primo de Sanitate tuenda, exemplo lyrae illud idem comprobauit Gale. In lyris enim consonantiam ipsam, quæ summa exactissimaque sit, vnicam atque insectilem probabile est: quæ verò in vsu hominum venit, certè latitudinem habet. Sæpe nanque quam percommode temperasse videaris, alter superueniens Musicus exactius temperauit. Nil miri itaque si eucrasiam in satis amplam latitudinem extendunt omnes: siquidem nobis ad omnia vitæ munia sensus ubique iudex est, ipsoque etiam eucrasiam & discrasiam iudicabimus, eodem Galeno teste. Quapropter non immerito in naturali corporis nostri constitutione illa maxime seruanda sunt, quorum beneficia functiones obimus. Est nanque simularium quidem partium eucrasia: instrumentariorum verò ipsarum conformatio, quæ constat ex earundem simularium forma seu figura, positura, numero, & magnitudine, functionum causa. Interim illud quoque haud ignorandum, quòd cuncta hæc quoque in latitudine quadā spectanda sunt; & quòd longè melius est, satis amplam latitudinem sanitati tribuere, quàm omnes homines perpetuò urgentibus morbis premi: neque enim functionum imbecillitas morbis statim nota est, absolute ita, citraque exceptionem loquenti, nisi adiectum sit, quæ præter naturam cuiusque sit: ut liquet eodem primo de Sanitate tuenda. Et secundo de Temperamentis idem confirmauit Gale. de sanitatis latitudine, asserens alteram esse sanitatis & alteram morbi intemperiem: morbi quidem ea, quæ à media temperie longissimè abest: sanitatis, quæ paulum. & septimo Meth. med. ait, Imbecilla verò actio, prout magis, minusve talis est, aut ad sanitatis tuendam, aut ad medendi tractationem pertinet: leuiter quidè impedita, ad priorem: grauius, ad posteriorem. discernitur vtraque ex eo quòd à consuetis actionibus obeundis, propter noxæ magnitudinem, vel desistatur, vel nò desistatur. Quantū igitur intervallū est inter id, quòd perfectissime functione obit, & id quòd manifestè functione aliquā habet oblesam, tanta est pro-

fectò & sanitatis & distemperantia quæ intra sanitatem consistit, latitudo. Ab hac, proxima est intemperies morbosa, ut liquet eodè secundo de Temperamentis. Quæ de re in eo statu, siue constitutione, quæ sanitas dicitur, non parua necessariò statuenda est latitudo. & ob id idem Gal. secund. artis Medic. inquit [Quo fit ut tota sanitatis latitudo in tres partes, quarum singulæ latitudinem habet non parua, diuidatur.] Erit autem prima quidem salubrium corporum, Secunda neutrorum, Tertia insalubrium. Nec minus scire opus est quòd habitus nihil aliud significat, quàm stabilitatem, seu permanentiā affectionis: nam cuiusque rei, cum affectio bene adhaerens, altiusque defixa fuerit, habitus nominatur, ut patet lib. ad Trasyb. quemadmodū, quòd bonus habitus nil aliud est, quàm benè se habens habitus: nam, cum habitus stabilis quædā affectio sit, bonus habitus nihil ei plus quàm bonitatē adiciat, ut idem Galenus inquit. Loquor autem de bono habitu, qui naturalis existit. Contrario modo se habet habitudo: nā non stabilitatem ac firmitudinē, sed lubricitatem & instabilitatem affectionis facile solubilis & mutabilis significat. Quapropter nō ab re Galenus eodè lib. concludebat geminam esse sanitatem: hanc videlicet, quam cum latitudine consideramus, quarū altera secundum habitum, altera secundum affectionem appellatur. Et iterum quæ in habitu dicatur sanitas, alia in habitu duntaxat est: alia secundum bonum habitum. atque hæc insuper bifariam dicit potest, ut libro de Differentiis morborum liquet: quoniam alia dicitur simpliciter boni habitus, alia optimi habitus, quem summè bonum habitum appellabat idē Galenus lib. ad Thrasyb. Hic etiā summè bonus habitus æquiuocè dictus ab Hippocrate scribitur aphori. 3. primi libri. ita, ut à Gal. habeamus sanitatē in habitu, aut esse optimi, siue summè boni habitus, aut non optimi, sed simpliciter boni, aut in habitu duntaxat citra adiectionem optimi, siue boni. Reliqua verò relinquatur sanitas, quæ secundum affectionem dicitur eodè lib. ad Trasyb. libro autem de Differentiis morborum appellatur sanitas minus valens: & 5. de Sanit. tuen. fallax & incerta *καὶ ὀφθαλμὸν* dicta, differens à firma & constante, quæ *κατὰ τὴν* nominatur. Has etiam sanitates quandoque duas dicit esse eodem libro ad Thrasyb. ut diximus, quando videlicet suprema accipit earum genera: quandoque verò tres, quum sanitatem secundum bonum habitum non ita exquisitè considerat, diuidens optimum à simpliciter bono habitu: quarum vnam dicit esse propter imbecillitatem inutilem, & hanc appellat secundum affectionem: alterā sanitatem in habitu, quæ non amplius imbecilla est, verum adhuc non robusta dicitur, sed actionibus media est inter sanitatem secundum affectionem, & secundum bonum habitum. tertiam appellat sanitatem secundum bonum habitum, quæ quidem robusta sanitas appellatur. Quibus ita suppositis vnā cum Gal. bona fronte concludimus eū nō de aliis corporibus sanis, signis, & causis sermonem habuisse in lib. Artis Medic. neque aliam diuersam ab his sanitatem considerasse, quàm considerauit in lib. ad Thrasyb. aliās aut hinc superfluas, aut ibi (hoc est libro ad Thrasyb.) fuisse diminutas: licet diuersis vocib. vsus fuerit ut qui artē sub alio docēdi genere tractauerit lib. Artis medic. At, quomodo tales sanitates diuersæ diuersaque corpora sana ordine quodam collocari possint, ita ut Gal. verba ubique locorum

locorum inter se consentiant, non admodum facile mihi videtur, potissimum cum quotquot sunt auctores, qui de hac re scribere (quos viderim) tot in eis diuersas reperiam opiniones. Nos vero breuiter & facile cuncta Galen. dicta concordare conabimur: ut pauperculi artis medicæ tyrones, saltē Gal. opinionem ac veritatem valeant intelligere: quam hucusque eos non intellexisse puto. Sanitas ergo quam in latitudine contemplamur, ea medijs temperamenti exquisitē dicitur, seu optima constitutio appellatur: quæ nec vlli vitio obnoxia est, quod saltem sensu percipitur: & qui talem habent sanitatem, ex eo dignoscuntur, quod robustas habent operationes, & causas, quæ agritudinem pariunt, magis quam cætera corpora, resistunt. hoc etenim est illud corpus, quod magis vicinum existit corpori absolutissime temperato ac optime constituto: quod corpus diximus potius cogitatione inueniri, & esse veluti exemplar quoddam, nuncupatur autem simpliciter salubre, & est illud quod ab ipso naturæ ortu bonam habet temperaturam in simplicibus & primis particulis, atque in iis, quæ ex illis componuntur, instrumentis est commensuratum. est verò & ipsum in duplici differentia: nam vel tale est semper, & ita simpliciter semper appellatur, quod quidem est optima temperantia præditum, ac maxime est commensuratum: vel ut multum, quod à constitutione optima non valde admodum deficit, sed exiguum & breue aliquid, & propterea simpliciter ut multum dicitur. Distinguitur autem ab eo quod semper tale est, quoniam re vera hæc corpora salubria ut multum, in aliquo sunt offensa, non tamen id sensu comprehenditur, sed ex eo quod magis, minusve in operationibus existit: ac quia causas, quæ agritudinem pariunt, non æquē resistunt, ut illa semper talia. Hæc sunt illa corpora, quæ Galenus dicebat lib. de Differentiis morb. esse optime constituta, & optimi habitus, & lib. ad Thraib. summē boni habitus: neque mirum, nam, si in bono habitu non naturali, sed apparenti, ut qui Athletarum existit, Hippocr. considerauit summē bonum, ut patet Aphor. 3. primi lib. eo magis in eo, qui verē & naturalis & bonus est, reperitur is qui optimus, seu summē bonus existit. Conueniunt itaq; hæc duo corpora, semper & ut multum salubria, in optimo habitu: licet exquisitior reperiatur in vno, quam in altero. omnia etenim hic cum latitudine contemplamur, & propterea primum corpus in latitudine sanitatis erit simpliciter salubre semper; secundum verò salubre simpliciter ut multum, quod à constitutione optima non valde admodum deficit, ut inquit Galenus primo artis med. Succedunt tertio loca corpora, quæ à Gal. salubria nunc appellantur: salubre nunc corpus est, ut ipse refert, quod in presenti est sanum. est verò & hoc eo tempore, quo sanum existit, bonam habens temperaturam, & commensurationem, non tamen optimam, at sibi propriam. de iis nanque corporibus, ut mea fert sententia, idem Galenus intelligebat textu quarto secundi libri Artis medic. postquam optimæ constitutionis signa declarauerat, hoc est, corporis simpliciter semper salubris, cum dicebat [Eorum autem, quæ ab ipsa deficiunt, & adhuc tamen salubria existunt, nonnulla quidem in cōsimilium temperata lapsum aliquem paruum habent: nonnulla verò in instrumentarium cōmensuratione, & hunc quoque per exiguum.] deinde

subdebat [Accidit autem hoc vel in omnibus, vel in aliquibus, aut vtrisque.] In cuius textus expositione cuncti, quos viderim, cæcutiunt, opinantes Galen. per ea verba intelligere salubria ut multum quod quidem multis rationibus falsum esse ostendam: primo quoniam corpora salubria ut multum, nec errorem, neque lapsum aliquem habent in temperatura cōsimilium, aut in instrumentorum cōmensuratione, licet re vera & ipsa quoque in aliquo sint offensa: verum non adeo ut error, seu lapsus, verē appellari possit. Rursus, si de salubri ut multum intelligere voluisset, frustra addidisset illa verba [Et adhuc tamen salubria existunt.] nam satis fuisset dixisse. [Eorum autem, quæ ab ipsa deficiunt,] si voluisset nobis ostendere in breue, seu exiguum, quod deficiunt salubria, ut multum à salubribus semper, & non etiam addidisset illa verba [Et adhuc tamen salubria existunt.] Per quæ verba voluit potius vltimū gradum salubritatis nobis propalare, qui est corporis salubris ut nūc. Ad hæc textu 6. reddi causa non poterit, cur iterum de eodē corpore ut multum salubri verba fecerit, si in 4. de eodem loquutus esset: nec non in paucis quibusdam verba diuersa de eodem corpore protulisset. nam eodem textu 6. volens nobis ostendere corpora salubria ut multum, assererat [Quæ verò ab optima corporum constitutione breue aliquid deficiunt] id quod non dixit in textu 4. Per hæc verba [Breue aliquid deficiunt] manifestauit salubre ut multum: ipsum namque breue aliquid deficit à salubri semper. Deinceps dicebat [Re vera quidem & ipsa in aliquo sunt offensa, non tamen id sensu comprehenditur] Per quæ verba luce clarius demonstrauit hanc offensionem minorem esse ea, de qua loquutus erat textu 4. nā ibi dicebat lapsus, seu errorem aliquem habere, licet paruum: modò in plus se habet lapsus aliquē habere, quam breue aliquid deficere, licet ille quoque paruus sit. Vterius in hoc textu 6. differentiam tradit inter hæc corpora salubria ut multum, & semper, docetque modum distinguendi, ostendens nobis quā difficile sit ea dignoscere: quoniam, licet re vera quidem in aliquo sint offensa, seu oblata salubria ut multum, non tamen id potest sensu comprehendī, id quod haudquaquam est necessarium in corporibus salubribus ut nunc, quia eorum lapsus non est ita exiguus, & propterea per alia verba ipsum figurauit, dum dixit ea lapsus aliquē parū habere, & non dixit breue aliquid deficere: neque addidit hæc verba [Re vera quidem & ipsa in aliquo sunt offensa, non tamen id sensu comprehenditur.] Docuit insuper modum distinguendi hæc corpora salubria ut multum à semper talibus, asserens [Distinguntur verò ex eo quod magis minusve in operationibus existit: ac quia causas, quæ agritudinem pariunt, non æquē resistunt] Minus itaque deficiunt salubria ut multum à salubribus semper, quam salubria nunc. & propterea illorum offensa, seu defectus, licet re vera sit, non tamen sensu comprehendī potest: lapsus verò, seu error corporum salubriū ut nunc, non adeo exiguus est, nec adeo insensibilis, cum magis recedant à salubribus semper. Vterius, si de salubribus ut nunc non tractasset Galen. eodem textu quarto, utique esset diminutus, cum hæc corpora definisset in primo libro, diuisisque signis in principio secundi adhuc illorum meminisset, sicut ceterorum salubrium, cum dicebat: Cum verò sint salubria corpora, hæc quidē

Loco cit.

cap. 7

H

simpliciter, hæc verò ut nunc, quæ & bene valentia dicuntur &c.] cur denum ea silentio præterisset, ratio nulla assignari posset, postquam de cæteris omnibus verba fecit, salubribus, neutris, & insalubribus usque ad textum 10. potissimum cum textu nono epilogo dixerit [Hæc quidē signa sanorum corporum, sed, siue salubria siue insalubria, siue neutra existant, quantitate distantia differunt:] & deinceps textu 10. Optima igitur constitutionis corporis, inquit, indicia explicauimus: eorum verò, quæ ab ipsa deficiunt, totidem sunt numero generis, quæ in magis & minus secari possunt.] Vbi itaque esset enarratum hoc genus corporum salubrium ut nunc, quomodo eius signa duobus inuicem contrariis terminis statuti possent per quantitatem distantiam discerni: cum potissimum dicendum non sit ea extra cœtum corporum in latitudine sanitatis positorum reperiri, & sic esse extra eiusdem sanitatis latitudinem, neque cōfundi possunt, ut quidam falso imaginantur, cum neutris simpliciter, aut insalubribus simpliciter: nam prima corpora sunt exquisitè media, atque æqualiter distantia, ut dicemus, ab utrisque extremis: in medio autem amborum, inquit Galen. hoc est, salubrium, & insalubrium corporum collocantur ea, quæ neutra simpliciter appellantur, & quæ cum latitudine quadam. Cum ergo salubria ut nunc in numero salubrium contineantur, non possunt sub neutris contineri, neque neutra appellari sub illo neutrorum significato, neque eorum constitutio similis est alicui neutrorum constitutioni, ut liquet discurrendo per omnia neutra: nam neque corpora sunt, quæ neutrius dispositionis participant, neque simul contrariarum, neque aliquando vnius, aliquando alterius vicissim. Hæc etiam & fortiori ratione longè distabunt ab insalubribus simpliciter: nam corpus salubre nunc, ut dictum est, bonam habet temperaturam, & commensurationem, non tamen optimam, at sibi propriam, ut Galen. ait. sed insalubria simpliciter ab ipso ortu naturæ vel in consimilibus habet malam temperaturam, vel in instrumentariis incommensurationē, vel utrunque vitium. & semper tale corpus est, quod ab ipso naturæ ortu, vel pessimā in simplicibus habet temperaturā, & primis particulis omnibus, vel aliquibus, vel principalibus, aut in instrumentariis incommensuratum existit, similiter vel omnibus, vel quibusdā, vel illis quæ obtinent principatū: ut multum verò tale est, quod ab huius quidē vitio recedit, nondū tamen mediocritatē attingit, ut Gal. refert. Quare, cum corpora salubria nunc, bonā habeant temperaturā & commensurationem: insalubria verò simpliciter, pessimam, nullo modo coincidere inter se possunt: nam & ipsa insalubria multum, etsi non ita habeant pessimam, habent tamen saltem malam, cum parum à semper talibus recedant. Non itaque bonam habebunt, quomodem salubria nunc. & propterea coincidere nō possunt. quod si coincidere valerent ac simul confunderentur, cur est quod Galen. illud subtraheret, nec ullibi illud scriptum reliquerit? Illud quoque vitari non posset, si confunderentur, quod neutra simpliciter primi significati esse nō possent, exquisitè media saluberrimi & insaluberrimi, neque æqualiter distare ab utrisque inuicē contrariis terminis, optima scilicet corporis constitutione, nuperque facta ægritudine, si salubria nunc corpora, separatim à neutris & insalubribus in sanitatis latitudine non

statuerentur: sed quispiam diceret propterea salubria nunc, confundi debere cum neutris ac insalubribus simpliciter: nam, cum sint nunc, talia ab ortu esse non possunt, quare cogere, velis, nolis, asserere quod hæc corpora ab ortu erunt aut neutra, aut insalubria simpliciter, hoc est, talem habebunt constitutionem, quam habent vel neutra, vel insalubria simpliciter, ut pote quæ ab ortu sunt talia. Nos verò dicimus, non propterea corpora salubria ut nunc, appellari, quia in præsentī solum tempore sunt sana, neque pugnare ut nunc salubria, quod à generatione tale sit: quemadmodum neque etiam ut multum talia dicuntur, quia multo tempore sana sunt, sed potius quia talem habent ab ortu constitutionem, ita quoque ut nunc talia dicuntur, quod in quodam tempore, seu aliqua ætate, & non semper nec ut multum, sana existunt: quoniam talis est eorum temperatura, & commensuratio bona, talem habent potentiam, in qua suppositus sanitatem consistere à naturæ ortu, & non in tempore acquisitam: quæ quidem licet ipsis propria sit, non tamen optima est, ut ipse Galen. inquit: quam bonam temperaturam, ac commensurationem à naturæ ortu habent, verum hæc constitutio dicitur salubritas ut nunc, quia non est sicut ea quæ simpliciter semper: neque sicut ea quæ simpliciter ut multum: sed ab veraque deficit, licet exiguum quoddā. Erit ergo salubre nunc corpus id, quod in præsentia bene valet. est autem sanū & hoc, in eo quo bene valet tempore, bonam habens temperaturam & commensurationem, non tamen optimam, sed sibi propriam, ex Galen. sententia, non à tempore acquisitam sed ab ortu talem: nam neque in præsentī sanum existeret, nisi talem hoc tempore temperaturam, & commensurationem bonam ab ortu naturæ sibi propriam haberet: qua ratione salubre nunc appellatur. Id quod probatur eiusdem Galen. auctoritate. §. de Sanitate tuenda. quo loco asserbat quod corpora, quæ ab optima sanitate deficiunt, tribus de causis proveniunt: aut quod statim in utero, vitioso statu fuerint: aut quod qualibet de causa in non naturalem affectum post conceperint: aut ætatis ratione. sed hæc corpora salubria ut nunc, nō dicuntur ab optima sanitate deficere ætatis ratione, ut cuiuslibet in confesso est, neque etiam post ortum ab aliqua causa talia reddita sunt. (nam si hoc esset, à neutris, & ægris ut nunc, non discrepant: hæc namque sunt illa corpora quæ ab optima sanitate deficiunt, à qualibet causa in tempore contingente: illud quidem quàm alienum esset asserere, nedum in Gal. sed omnium Medicorum doctrina cuiuslibet planū esse potest.) Relinquitur ergo, quod talem lapsum seu errorem, per quem à perfectione, seu optima sanitate deficiunt, statim in utero & ab ipso ortu naturæ habuerint. Quapropter non repugnat corpori salubri ut nunc, esse à natura tale. quin immo magis repugnat ipsum asserere non esse ab ortu naturæ tale, tam Galeni doctrinam, quàm veritatem. id quod nonnulli haudquaquam intelligere potuerunt. ob id dicimus nos salubria nunc corpora diuersam habere constitutionem à neutris, & insalubribus simpliciter, ea quæ à naturæ ortu: licet in eorum definitione illud Galenus non apposuerit, nam satis sibi erat apposuisse in simpliciter salubri: quoniam neque in definitione ut multum salubris, neque ut multum insalubris addidit illa verba [ab ortu naturæ,] nec etiam illa verba conscripsit

cap. 2

cap. 8

scripsit in definitione neutri simpliciter tertij significati. & tamen subintelligenda sunt, præter id, quod clarius intelligitur etiam natura salubris ut nunc, si illa verba non apponantur: namque eius naturam ac constitutionem longè melius intelligemus, quando in præsentia bene valet, & cum hoc etiam eodè tempore bonam habet (ut inquit Galen.) temperaturam & commensurationem, quàm si dixisset: tale corpus bonam duntaxat habere temperaturam & commensurationem à naturæ ortu. neque etiam illud satis fuisset pro eius natura manifestanda: nam opus est & quod in præsentia sanum sit, & quod talem habeat temperaturam, & commensurationem bonam, ut salubre nunc sit corpus. hoc etenim, quod in præsentia bene valet & sanum sit, præsupponit illud, quod bonam habeat & sibi propriam temperaturam, & commensurationem ab ipso naturæ ortu. aliàs neque bonam, neque sibi propriam dicere tur habere eo tempore, quo talis existit, quemadmodum sunt neutra, & insalubria nunc, quæ ab optima sanitate deficiunt à causis in tempore contingentibus. talè itaque à naturæ ortu corpora hæc sortita sunt constitutionem, quæ quo tempore bene valent, & salubria nunc appellantur, non modo sana sint, sed bonam etiam, ut sæpius diximus, & sibi ipsi propriam temperaturam, ac constitutionem habeant, quæ nulli ex aliis corporibus propria sit. & propterea à neutris & insalubribus simpliciter corporibus differunt, differunt etiam, quoniam hæc corpora salubria nunc, quod bonam habeant temperaturam & constitutionem, iure dicuntur habere sanitatem in bono habitu: reliqua verò, neutra & insalubria simpliciter, licet sanitatem habeant in habitu, ut liquet ex Galeno in eorum definitionibus, non tamen quispiam dixerit ea sanitatem habere in bono habitu, veluti salubria nunc. Hæc insuper corpora salubria nunc, appellata sunt illa, de quibus dicebat Gale. lib. de Different. morb. quod alia sunt corpora simpliciter boni, non tamen optimi habitus: quæ etsi ab ipsa optima constitutione deficiant, adhuc tamen salubria existunt, & bene valentia dicuntur, ut idem secundo artis medic. asserbat. Collocantur etiam tertio loco in sanitatis latitudine propter eas, quas diximus causas, quibus simul cum corporibus simpliciter salubribus semper, & ut multum, præest ea pars conservatiuæ artis, quæ *ὑγιαίνουσα* à Græcis nuncupatur, hoc est, boni habitus seruatrix: nam præter iam dicta tria genera salubrium corporum nullum aliud reperitur, quod in bono habitu sanitatem habeat: quæ ratione & salubria corpora appellantur non modo quæ optimam corporis constitutionem habent, sed quæ eadem proximiora sunt: hæc etenim salubria corpora appellari præcepit Galenus textu nono secund. artis medic. quemadmodum ea, quæ magis accedunt ad ea quæ agrotant, insalubria: intermedia verò neutra, quæ etiam ratione & salubria nunc in sanitatis latitudine constitui cōsentaneum est. neque enim dixisset Galenus quod quæ corpora proximiora sunt optimæ constitutioni, salubria sunt & appellantur, nisi per salubria subintelligisset ut multum, & ut nunc salubria: sed dixisset salubre, si ut multum salubre duntaxat intelligere voluisset. alienum siquidem à ratione esset, si cuiusque hominis priuatim sanitatem ut multum esse intelligere voluisset, hoc est, singula corpora salubria ut multum.

Cum verò, ut prius dictum est, vniuersa sanitas latitudo in tres partes diuidatur: quarum prima erit salubrium corporum, & secunda neutrorum: declarata prima decenter est, ad secundam accedamus & deinceps ad tertiā, quæ est insalubrium: nam hæc quoque sanitatis pars, ut inquit Galenus, latitudinem habet non paruam. In medio verò salubrium & insalubrium collocantur (ait Galen.) ea corpora, quæ neutra exquisitè, seu simpliciter appellantur, & quæ cum latitudine quadam: habent etenim & hæc corpora talem constitutionem, ut imbecilles edant actiones. Sed, quoniam neutra tripliciter dicuntur: quædam videlicet, quæ neutrius dispositionis participant: quædam, quæ vtriusque: & quædam quæ aliquando quidem huius, aliquando illius, & vnumquodque horum potest esse semper, & ut multum, & ut nunc tale: de his quæ semper, & ut multum talia existunt, primò verba faciemus. nam hæc sunt, ut demonstrabimus, quæ salubria corpora in sanitatis latitudine immediatè consequuntur: reliqua verò, ut nunc talia, postponemus: cum alter sermo de iis habendus sit. Asserimus itaque, quod, licet secundum diuersam neutri consideratione trifariam neutrum dici possit: quodlibet tamen eorum ad aliud comparatum secundum eandem rationem in eodem gradu dicetur sanum, nec vnum magis altero. Exempli gratia, neutrum simpliciter primi significati comparatum ad simpliciter secundum & tertium, sub eadem ratione, hoc est, semper ad semper, & ut multum ad ut multum, eiusdem sanitatis participabunt, adeò quod vnum non dicetur esse altero salubrius. sunt etenim omnia talia neutra in medio salubrium & insalubrium collocata, & imbecillas edunt operationes, magis quàm salubria, minus autem quàm insalubria, æqualiter ab vtriusque extremis distantia, modò simpliciter seu exquisitè neutra sint. id verò dicimus propterea, quia, licet neutra primi significati semper sint exquisitè talia: reliqua tamen duo genera possunt & exquisitè esse, & non exquisitè, cum sint cum quadam latitudine. namque possunt neutra secundum significati plus de vno extremo, quàm de altero participare, & tertij significati constitutionem habere quod maiori tempore & longiori, seu pluribus ætatibus participant vno, quàm altero extremo, hoc est, talem habere à natura potentiam. & propterea non amplius erunt simpliciter & exquisitè neutra, sed cum latitudine quadam. id quod voluit intelligere Galenus citato textu 6. secund. artis medic. cum dixit [In medio autem amborum collocantur ea, quæ neutra exquisitè, seu simpliciter appellantur, & quæ cum latitudine quadam.] Nam siue *ἀρετὴ*, seu *ἀνάλω*, textus habeat, non solum neutra primi significati, sed secundum & tertij, quæ simpliciter & exquisitè talia existunt, intelligi debent per neutra quæ simpliciter, seu exquisitè appellantur. Quod verò neutra secundum significati, duobus dicantur modis, patet primo artis medic. tex. 12. quum inquit [Horum autem ipsorum secundum duobus dicitur modis, aut quia vtrumque contrariorū ex æquo participat, aut quia aliquando plus alterū.] Id quod simili ratione contingere neutro tertij significati decens est, postquam aliquando quidem salubre, ut in vna ætate, aliquando verò insalubre, ut in altera ætate, vicissim est, ut Galenus inquit: & propterea non refert, si illud particulatim non explicauerit, breuitati indulgens. Attamen dissident in sanitate,

neutra secundi & tertij significati semper & vt multum dicta, à neutris primi significati, quando eadē non fuerint exquisitē talia, sed cum quadam latitudine, ita vt vno magis, vel minus participant, si fuerint secundi significati: vel, si fuerint tertij, vno, vel altero extremorum maioris, vel minoris temporis spatio vicissim, seu in pluribus ætatibus, participant. qua ratione dicuntur neutra cum latitudine: nam ea, quæ sunt primi significati, semper sunt exquisitē talia, ac neutra semper dispositione participant, siue simpliciter, siue vt nunc talia dicuntur, vnde dicebat Galenus primo artis medic. [Neutrum iuxta primum significatum esse corpus, quod exquisitē medium est & saluberrimi & insaluberrimi corporis, & huius significati hoc quidem simpliciter tale, quod ab ipso ortu naturæ ita est constitutum: hoc verò vt nunc, quod in præsentī tempore mediū exquisitē existit saluberrimi atque insaluberrimi corporis. ipsum autem simpliciter semper quidem tale est id, quod in omnibus ætatibus tale perdurat: vt multum autem, quod nonnullas recipit mutationes.] Patet itaque neutra simpliciter exquisitē media secundum quemlibet trium modorum eadem participare sanitate, ac insequi in sanitatis latitudine salubria nunc, tam si fuerint semper, quàm si vt multum, verum quæ vt multum sunt talia, cum non adeo exactè sint media, quemadmodum quæ semper neutra sunt, sed parum quodammodo ab eis recedant, ambigua fortè quispiam fateri poterit, & interim ad vnum, quandoque ad alterum extremū accedere, vel recedere magis. Nos verò, quò facilius Tyrones intelligant, in latitudine simul reposuimus, præsertim cum exiguus valde sit hic recessus. At, vbi simpliciter seu exquisitē nō sint neutra secundi & tertij significati, verum magis, vel maiori tempore salubritate participabunt, quoniam talem habent à natura potentiam: ad salubria nunc, magis accedunt, vbi talia semper fuerint, quàm si vt multum. Insuper præcedent etiam in latitudine non solum neutra vt multum, sed etiam semper, primi significati. & quæ multum sunt talia, præcedent etiam alia multum & semper talia exquisitē dicta, sed insequuntur eorum semper talia. Vbi verò æqualiter vtriusque extremi participantia fuerint, aut magis insalubritatis, quàm salubritatis, seu maiori tempore: eo modo se habebunt vt diximus. nā, si exquisitē talia fuerint. siue vt multum, siue semper, æqualiter vtrique recedunt, vt neutra primi significati. si verò magis, vel maiori tempore insalubritate participabunt, præferuntur in latitudine sanitatis neutra primi ipsi neutris secundi, & tertij significati, tam si multum, quàm si semper sint talia, sed vt multum præcedunt eorum semper talia: semper tamen facta relatione ad duo extrema, neutra omnia mediocriter dicuntur ædere imbecillas actiones cum latitudine quadam, & in hoc genere noxæ continentur etiam neutra primi significati, quamuis neutris contrarium actionum participant, scilicet neque eis, quæ in magnis distantiis, neque eis, quæ in parvis existunt imbecilla: habebunt tamen imbecillas actiones, quæ etiam neutris contrariarum actionum participes exeunt. & hoc voluit dicere Galenus 2. artis medic. tex. 8. hæc quoad secundam partem latitudinis sanitatis, quæ neutrorum est.

Sequitur tertia, quæ est corporum insalubrium. quæ iterum primo sunt in duplici differentia: sim-

pliciter videlicet, & vt nunc. de corporibus vt nunc insalubribus, quæ quidem actu ægrotant, non loquimur nisi quatenus ad sanorum corporum dignotionem conducunt: cum sint extra sanitatis latitudinem, vt liquet secundo artis medic. quanquā vitia omnium insalubrium corporum iuxta quodlibet significatum, vt ipse Galenus refert eodem loco, consistunt aut in temperatura consimilium partium, aut structura seu commensuratione instrumentalium vitata, formatione videlicet, numero, magnitudine, seu situ: aut in continuitate ipsarum, quæ communis vnitas appellatur. Distinguuntur autem hæc vitia, seu hæc corpora, inter se ex sensibili operationum læsione. quare, vbi fuerint sensibiles operationes oblectæ, tunc insalubre nunc dicitur, & hoc corpus actu ægrotare fatemur, extraque latitudinem sanitatis contineri, neque aliud reperiri corpus, præter hæc insalubria nunc, quod non sit intra sanitatis latitudinem, vt dicemus. At insalubria simpliciter, de quibus loquimur, à reliquis intra sanitatem collocatis distinguuntur: quòd facile à causis, quæ morbos contendendi vim habent, superantur, & quoniam in vigore operationū plurimum deficiunt. Et propterea nemo mentis compos dicet hæc corpora coincidere cum salubribus nunc: cum hæc, licet ab optima sanitate deficiant, adhuc tamen salubria existant, & paruum aliquem habeant lapsum, errorem, aut in temperatura consimilium aut instrumentariorum commensuratione, & hunc etiam per exiguum in omnibus, vel quibusdam, aut in vtrisque, vt patet citato textu quarto secundæ artis medic. habent etiam bonam temperaturam & commensurationem: insalubria verò simpliciter, malam. nam insalubre simpliciter corpus, inquit Galenus, est quod, ab ipso ortu naturæ, vel in consimilibus partibus malam habet temperaturam, vel in instrumentariis commensurationem, vel vtrunque vitium. Cum verò hoc etiam corpus insalubre simpliciter bifariam dicatur, aliàs semper, aliàs vt multum, vt cætera iam dicta corpora salubria & neutra, propterea semper tale est, quod ab ipso naturæ ortu, vel pessimam habet temperaturam in simplicibus & primis partibus omnibus, vel aliquibus, vel iis quæ obtinent principatum, vel in instrumentariis incommensuratum est: similiter autem in his vel omnibus, vel aliquibus, vel illis quæ obtinent principatum. Vt multum verò insalubre est, quod ab huius quidem vitio recedit, nondum tamen mediocritatem attingit. quo fit vt, absque controuersia, quæ multum insalubria existunt, immediatè neutra corpora consequantur in sanitatis latitudine: deinceps quæ simpliciter semper talia dicuntur, quæ sunt velut vltimis terminus eius sanitatis, quam secundum habitum esse diximus. nam licet eam non habeant in bono, nec optimo habitu, vt corpora salubria: habent tamen tam neutra, quàm insalubria simpliciter, sanitatem in habitu. de quibus omnibus intelligere voluit Galenus libro de Differentiis morborum, cum dixit. [Alia sunt, quæ, etsi sana dicuntur, non tamen boni sunt habitus:] quasi velit dicere quòd, licet habeant sanitatem in habitu, non tamen eam habent cum hac adiectione, Bono. nam habere sanitatem in habitu nil aliud est, quam permanentem & stabilem: habere autem in bono habitu, est addere huic permanentiæ & stabilitati bonitatem, vt patet lib. ad Thrasylb.

^{cap. 12} ad Thrasyl. Conueniunt ergo in hoc neutra simpliciter & insalubria simpliciter: quoniam utraque dicuntur habere sanitatem in habitu, & pro tanto deficiunt à salubribus corporibus simpliciter, & ut nunc quæ sanitatem habent in optimo, & bono habitu. Verum hæc etiam sanitas in habitu cum sit in latitudine quadam, magis stabilem ac firmam eam habebunt simpliciter neutra, quam simpliciter insalubria, minus quæ semper sunt talia, quam quæ multum: quemadmodum etiam, inter neutra, magis firmam ac stabilem habent sanitatem ea, quæ ad salubria magis accedunt, tam semper, quam ut multum quam illa neutra, quæ simpliciter & exquisitè sunt media: & hæc magis quam ea, quæ ad insalubritatem plus vergunt. semper enim eandem seruabunt sanitatis rationem, quam participant eo, quo scriptum ordine in sanitatis latitudine. Istis insuper corporib. neutris, & insalubribus simpliciter, propiciat ea pars artis conseruatiue, quæ salubris nominatur: communi autem vocabulo, ut Galen. refert eodem libro ad Thrasylb. conseruatiua simul & salubris dicitur.

Cum verò totius sanitatis latitudo in tres partes diuidatur, ut sæpius dictum est: quarum prima est salubrium corporum, secunda neuroorum, & tertia insalubrium, post quæ, ut inquit Galenus 2. artis medic. sequuntur, quæ iam ægrotant corpora, quæ sensibilibus operationum læsionibus distinguuntur: opinati sunt quidam, eorum, quæ reliqua sunt, corporum nullum in sanitatis latitudine situari, propterea quod Galenus, post tertiam latitudinis partem, quæ quidem est insalubrium simpliciter, dicebat sequi corpora, quæ iam actu ægrotant. quare inquit illi neutra ut nunc, secundum huiusmodi, contineri debere extra sanitatis latitudinem. Sed pace eorum dixerim, præter iam dicta corpora adhuc in sanitatis latitudine continentur cuncta tria neuroorum genera ut nunc. id quod cum Galeno demonstramus, primus in memoriam reuocantes, quod ^{cap. 6} supra cum Galeno supposuimus lib. ad Thrasylb. duplicem videlicet esse sanitatem, quarum vna dicebatur secundum habitum, altera secundum affectionem. sanitatem itaque secundum habitum, ut longissimis verbis declarauimus, diuisit Galenus ^{cap. 8} secundo artis medic. in tres partes: post quam, si tali ratione sanitas consideratur, ægrotantia corpora sequuntur. At, quoniam, ut ipsemet testis est, sunt quædam corpora, quæ licet actu non ægrotent, neque etiam sanitatem in habitu habeant, eam tamen habet secundum affectionem, hoc est, instabilem, infirmam atque inutilem: ea de re & hæc quoque corpora, licet neutra à quibusdam fuerint appellata, ut ipsemet Galen. fatetur eodem lib. ad Thrasylb. adhuc asserit sana dici & esse, eisque competere partem quandam conseruatricis artis, quoniam in his etiam paucillum quiddam corrigimus: quæ verò pars artis paucillum quiddam corrigit, conseruatiua appellatur, ut contra distinguitur ei parti artis, quæ multum semel corrigit, & medicatiua, seu curatiua nuncupatur. Verum, inquit ipse, inter hanc artis partem quæ magna vitia & illam quæ exigua vitia corrigit, quæque in tres alias subdividitur partes: in euecticem scilicet, salubrem, & Analeptice: quidam quartam particulam adiecerunt, quæ ab ipsis propriè Prophylactice, id est, præseruatoria vocata fuit, facultatem oppositam habentem ei, quæ à morbo proximè liberatos recreat, hoc est, Anale-

ptice. & demum inquit [Hæc autem ambas ancipitis quodammodo esse naturæ inter contrarias totius artis parte nemo ambigit. Dico autem inter eam quæ magna vitia & eam quæ parua corrigit. curatiua sanè pars, quod magna vitia, Euectice autem atque salubris quod parua discutiant, id quoque perspicuum est: in medio autem ambarum interstitio instauratiua nominata atque præseruatoria posita sunt. nam, si ad salubrem euecticemque comparentur, non exigua vitia emendant. si ad curatiuam, non magna. propterea & quicunque ambas has partes neutras appellauerunt, haud malè mihi sensisse visi sunt.] Hæc Galen. quibus verbis clara luce videtur asserere has duas partes artis medicæ Analeptice videlicet, & Prophylactice contineri sub ea, quæ exigua vitia tollit, & conseruatiua dicitur, differreque inter se maioris minorisque ratione. magis enim parua castigat euectice: quæ ratione nos diximus eam prospicere corporibus salubribus simpliciter & ut nunc: minus parua castigat salubris: quam partem neutris & insalubribus simpliciter, competere diximus. Hæc adhuc minus parua castigant Analeptice & Prophylactice: quam Prophylactice quidam adiecerunt tanquam quartam partem conseruatiuæ artis. Deinceps subdebat Galen. [quod, cum hæc ambe partes sint ancipitis quodammodo naturæ, dico inter eam quæ magna, & eam quæ parua vitia dissoluit, in medio interstitio ambarum posita: propterea haud malè senserunt, qui ambas neutras appellauerunt. Nam si ad salubrem & euecticem comparentur, non exigua vitia emendant: si ad curatiuam, non magna.] Comprobat itaque Galen. eorum opinionem, qui has artis partes, neutras appellauerunt. Verum non propterea negat id, quod paulò antè concluderat, eas videlicet contineri sub ea artis parte, exigua vitia corrigit, ac conseruatiua nuncupatur, licet non adeo per exigua vitia corrigant, quemadmodum salubris & euectice. Si itaque conseruatio per eundem Galenum non nisi sanis corporibus debeat, non ab re & hæc corpora, quibus hæc artis partes competunt sub conseruatione contentæ, adhuc sana esse asserendum, quauis neutra nuncupentur. Hæc igitur sunt illa corpora, quæ sanitatem habent secundum habitudinem, neutra ut nunc appellata. Quare post pauca idem Galen. concludens assererat. [In præsentia autem contemplatione de conseruatrice artis humanum corpus gubernantis parte, tria diuisionis membra supponantur: vnum de corporibus secundum habitudinem valentibus: alterum de iis, quæ in habitu sana sunt: tertium de bono habitu præditis.] Nemo ergo ambigat hæc corpora, quæ sanitatem secundum habitudinem habent, connumerari debere inter ea quæ sunt in latitudine sanitatis: quæ quidem, ut dictum est, iure neutra ut nunc appellantur. Dico, quod contineantur sub sanitate, & sana dicantur secundum affectionem: quam etiam sanitatem adhuc cum latitudine esse asserimus, quæ admodum sanitatem secundum habitum diximus esse. quapropter poterit dici secunda hæc sanitas latitudo, de qua haudquaquam voluit intelligere libro 2. artis medic. ea parte qua dixit. [Post quæ deinceps sequuntur quæ iam ægrotant corpora.] Nā de hac sanitate adhuc verba non fecerat, sed de ea duntaxat, quæ est secundum habitum, ac propria est eorum corporum quæ à natura sunt talia: licet hæc quoque postea non dereliquerit. siquidem

cap. 82. &
nls.

de eisdem neutris corporibus, quæ talem habent sanitatem secundum affectionem lib. 2. versus finem, & tertio, verba fecit, signa pro dignotione eorum, ac modum correctionis nobis tradens: quanquam non sub sanorum, sed neutrorum genere collocarit. sunt etenim re vera hæc corpora neutra ut nunc. & ob id comprobavit eorum opinionem qui volebant eas artis partes, quæ his corporibus præfunt, cum sint ancipitis quodammodo naturæ, neutras appellari. quæ ratione libro artis medicæ sanitatis latitudine hæc corpora seclustilibro verò ad Thrasylbolum, ea sub sanitatis latitudine contineri voluit, coactus de omnibus corporibus, quibus salubris quomodolibet pars artis prospiceret, seu conservatiua, quæ exigua vitia corrigit, verba facere, ne in aliquo aduersus gymnastias deficeret, largius sanitatem usurpans tam in habitu, quam in affectione. nam, cum hæc sanitas in affectione, infirma ac parum constans sit, neque ab ipso naturæ ortu, sed in tempore adepta, interim à Galeno sanitas & ægritudo, interim affectus medius morbi & sanitatis nuncupatur. ita etiam & corpora, quibus ea inest, interim sana, interim neutra appellat: & partes artis eisdem prospicientes sæpe neutras, quandoque inter conservatrices salubres connumeravit. Cum autem hæc corpora in duplici sint differentia: nam quædam corpora neutra conualescentiæ, quædam verò neutra decidentia nuncupantur: in quo dictorum trium neutrorum genere contineatur utraque, non utique facile est differere, cum adhuc videamus nonnullos inter sese dissentire. Præterea, num in vno eodemque neutrorum genere ambo, vel in diuersis contineantur, non minus inter se digladiantur. Nos verò, cum aliorum opiniones recensere non decreuimus; nostram, quam veram esse cum Galeno putamus, statuere conabimur, asserentes cum eo, quod gemina existente sanitate, vna secundum habitum, altera secundum affectionem, quemadmodum illa secundum habitum latitudinem habet: ita quoque & hæc, quæ secundum affectionem dicitur. & propterea plura corpora sub ea contineri opus est, quemadmodum in ea, quæ iam dicta est. Sunt autem hæc corpora singula neutrorum tria genera, quæ ut nunc appellantur. Verum illa non amplius sub neutro primi, secundi, aut tertij significati nominantur; sed quædam, quæ quidem iam iam morbum euaserunt, seu à morbo conualescunt, conualescentiæ neutra nuncupant: quædam verò, quibus ægritudinis iam iam imminet periculum, neutra decidentia dicunt. Videndum ergo, in quo neutrorum genere hæc duo neutra sic appellata contineantur, & quomodo in participatione, seu ordine huius sanitatis secundum affectionem dictæ se habeant. Quod verò non in vno eodemque neutrorum genere, ut nonnullus visum est, ipsa contineantur, liquet ex Galen. primo lib. ad Thrasylb. quo loco dicebat quod præseruatoria vocata ars facultatem oppositam habet ei, quæ à morbo proximè liberatos recreat. Cum ergo inter se oppositæ sint hæ partes conservatiuæ artis, non poterunt in vno eodemque neutrorum genere conuenire. & si dixeris in eodem genere neutrorum contineri, reliqua duo neutra ubi collocabis: ac ubi etiam erit istius sanitatis secundum affectionem latitudo? Dilucidius verò illud declarauit Galenus 2. artis medicæ. tex. 92. 93. & 94. ubi loquens de signis futuræ ægritudinis, dicebat. [Ne-

cap. 30

que in ambiguo est, quod quæ signa sunt vtutorumque significatiua, neutra dicantur secundum vnum quoddam neutri vocabuli significatum.] & post pauca subdit [secundum verò alterum significatum quæcunque his, qui à morbo reficiuntur, insunt, signa neutra appellamus: neque in alio significato accipiunt ea, quæ senibus insunt.] Quibus verbis luce clarius ostendit Galen. quod quemadmodum signa, ita & corpora neutra decidentia & conualescentia, quorum sunt signa, in diuerso neutri significato contineantur.

Caterum, in quo significato neutri contineantur ea quibus ægritudinis periculum imminet & decidentia neutra vocantur, & in quo ea quæ à morbis conualescunt, neutra conualescentia dicta, hic labor est. Verum nos proculdubio cum Galeno asserimus neutra decidentia dicta, quibus pars ea artis prospicit, quæ verè Prophylactice dicitur, simulque conservatrix, dici & esse neutra secundi significati, dico verè & propriè Prophylactice: cuius officium est causam adimere, à qua morbus futurus est fieri. Hæc enim pars conservatricis quædam existit: quemadmodum illa quæ non verè Prophylactice dicitur, cuius officium est causam adimere, quæ morbum iam creat, sub curatrice continetur: immo ipsam curatricem etiam nominant, ut patet vndecimo metho. meden. Quod verò hæc neutra sint iuxta secundum significati, quicquid velint alij, eiusdem Galen. verba ostendunt, citato loco secundo artis medicæ. siquidem dicebat [horum corporum signa nonnulla quidem esse ex eorum genere, quæ secundum naturam sunt, sed permutata vel quantitate, vel qualitate, vel temporibus: nonnulla ex his, quæ præter naturam, verum minora iis quæ ægritudinibus adsunt. Atque propterea (subdebat) hæc corpora decidentia seu eorum dispositiones, quæ sunt in morbos casura, esse ex neutrorum genere, atque vna ea, quæ ipsa indicant, signa.] Si ergo propterea sunt ex neutrorum genere, quia eorum signa quædam sunt ex genere eorum quæ secundum naturam sunt & quædam ex genere eorum quæ præter naturam, cui dubium quod velut signa vtriusque extremis participant, ita & corpora participare debent, cuius rationis sunt secundi significati neutra? Idem confirmauit paulo infra in verbis supra citatis, cum assererat. [Neque in ambiguo est quod quæ sunt vtutorumque indicatiua, neutra dicuntur secundum vnum quoddam neutri vocabuli significatum.] Quodnam, inquam, erit istud neutri vocabuli significatum, nisi secundi, postquam dicit esse vtutorumque indicatiua, hoc est, vtriusque extremi, salubritatis videlicet, & infalubritatis? Quicquid itaque alij sentiant, cum Galeno concludimus ac firmiter asserimus neutra decidentia esse neutra ut nunc, secundi significati. & licet eorum signa median habeant formam inter ea quæ sanis, & quæ ægrotantibus eueniunt, non propterea non dicuntur vtutorumque indicatiua: quoniam vtriusque extremi participant. & idcirco neutra sunt, ut Galen. scriptum reliquit. Rursus qua ratione quispiam dixerit neutra decidentia esse neutra primi significati, si eadem neutra primi significati exquisitè media sunt saluberrimi & infaluberrimi, nec latitudinem habeant, æqualiterque distent ab vtriusque extremis, etiam quæ ut nunc sunt alia, ut Galen. visum est: ista verò neutra decidentia, neque exquisitè media sunt

cap. 82.

cap. 30

sunt saluberrimi & insaluberrimi, amplamque latitudinem habent, prout contingit vno, vel altero extremorum magis, aut minus participare, & quod magis, vel minus accedunt, vel recedunt ab vno, vel altero extremorum? Non enim semper æqualiter participant decidentia neutra salubritate & insalubritate, sed quædam magis salubritate, quædam insalubritate magis, & contra. Hoc item magis & minus adhuc plures habet gradus. Quamobrem hæc neutra decidentia inter se magnopere discrepant: qua scilicet ratione recedunt magis, vel minus à salubritate, acceduntque ad insalubritatem; & propterea exquisitè neutra esse non possunt. Sub hoc neutrorum genere etiam sanitas continetur, seu bonus habitus, athletarum, magis quoque & minus suscipiens; vt liquet Hippo. & Gale. quibus quoque præest ea artis pars, quæ Prophylactice dicitur: habent etenim hæc corpora eadem ratione sanitatem secundum affectionem, qua ipsa neutra decidentia dicta. & propterea eorum habitus statim solvendus est, inquit Hippo. potissimum vbi ad summum bonitatis peruenit.

cap. 82. Cum verò eodem secundo artis med. hæc verba subscribat Gale. [verum in altero significato quæcunque conualescentibus ex morbis signa adsunt, neutra appellamus] nulli in dubium venit quod quæ à morbis rescinduntur corpora, conualescentia neutra appellata, in alio neutrorum significato quam in secundo, contineri debeant, & non in eodem, vt quidam volunt. Quare cum Gale. dicimus hæc corpora dici & esse neutra primi significati: nam hæc sunt exquisitè media saluberrimi & insaluberrimi corporis, tam si fuerint simpliciter, quam vt nunc talia: atqui conualescentia neutra sunt huiusmodi. cap. 30. erunt ergo neutra primi significati. Quod verò neutra conualescentia sint exquisitè media saluberrimi & insaluberrimi corporis, liquet libr. ad Thrasyl. cum dicebat [In medio verò ambarum interstitio, instauratiua nominata, atque præseruatoria posita sunt: nam, si ad salubrem, euecticèque comparentur, non exigua emendant vicia: si ad curatiuum, non magna] Si itaque in medio interstitio posita sunt instauratiua & præseruatoria: & corpora, quibus præseruatoria præest, neutra secundi significati sunt, sequitur quod corpora, quibus instauratiua prospicit, cum non sint in eodem neutrius significato, sint primi significati: quæ quidem exquisitè media dicuntur saluberrimi & insaluberrimi. Nam corpora quæ instauratiue, seu refectione indigent, neque morbo amplius participant: quoniam ab eo sunt liberata: neque sanitate in habitu: quoniam eorum sanitas adhuc imbecilla est, alterius generis existens, quam sanitas quæ est secundum habitum. Quamuis ergo amba hæ artis conseruatoriæ partes in medio interstitio posita sint; non tamen amba secundum eandem rationem. Nam corpora, quibus ars præseruatoria debetur, vt declarauimus, latitudinem habentia exquisitè media esse non possunt. Hæc verò neutra conualescentia dicta eandem latitudinem non habent. Nam confestim, quod à morbo liberata sunt, absque vilo medio ac latitudine conualescentia appellantur, sanitatem habent secundum affectionem, & refectione indigent: quoniam propter imbecillitatem inutilis quodammodo est eorum sanitas, & debiles habent actiones. Neque fateri possumus, cum primum à morbo liberantur hæc corpora esse magis,

vel minus conualescentia nisi postmodum temporis progressu, quando illorum sanitas desit esse inutilis, atque sunt ab imbecillitate liberata; & in habitu sanitatem acquisierunt. quo tempore non amplius conualescentia neutra appellabimus. Quare dicimus hæc corpora esse neutra primi significati: etenim neutro extremorum participat. & propterea, licet eorum signa neutra etiam appellentur, tamen alio neutrorum significato, vt Gal. asserbat, quam ea quæ indicat corpora, quibus periculum ægritudinis imminet, & neutra decidentia dicuntur. Quod si quispiam dixerit illa non esse exquisitè media saluberrimi & insaluberrimi, & propterea non posse dici neutra primi significati: respondebimus quod hoc quoque verificatur in illis corporibus; nam, cum in medio interstitio posita sint inter corpora salubria secundum habitum, & corporea ægrotantia, vt Gal. cap. 7. inquit eodem lib. ad Thrasyl. non ab re exquisitè media esse dicentur; quoniam neque ægritudine, à qua iam liberata sunt, amplius participant: neque sanitate in habitu, ad quam nondum peruenerunt. Et, quoniam hæc neutra dicimus esse vt nunc primi significati: intelligimus quoque nunc exquisitè media esse saluberrimi & insaluberrimi: quoniam medium obtinent locum inter vniuersa corpora quæ sanitatem habent in habitu, & corpora ægrotantia. Et hac ratione hæc etiam sanitas secundum affectionem, quæ in hisce corporibus reperitur, media exquisitè dicitur. si verò quispiam dixerit hæc corpora non esse ita exquisitè media, velut ea quæ simpliciter neutra appellantur eiusdem primi significati, non prohibebimus, vt sophisticas vitemus rationes: sunt etenim, quoad fieri potest, exquisitè media saluberrimi & insaluberrimi, neutro extremorum participantia, hoc est, neque sanitate in habitu, neque ægritudine. Et propterea senes quoque sub hoc neutrius significato collocavit Gal. cap. 82. eod. 2. ar. med. & 5. de San. tuen. Habent etenim & ipsi senis affectum, qui planè non est exacta sanitas, hoc est, sanitas in habitu, quemadmodum iam dicta corpora conualescentium: sed eorum affectus, vt ipse inquit, tam scilicet eorum qui ex morbo conualescunt, quam senum, vel morbi & sanitatis quidem medii sunt, vel omnino eorum affectus non est eius sanitatis, quæ firma constansque est, quam cap. 4. appellat: sed eius potius, quæ fallax incertaque est, quam *ἡλικίαν* nominat. quanquam partem artis, quæ senum sanitati prospicit, Gerocomicen, hanc verò Analepticen Græci nuncupant. Si quis etiam velit, poterit proculdubio cum Gale, tenere quod neutra conualescentia, (quæ neutra vt nunc, primi significati diximus esse) in præsentī tempore sunt exquisitè media saluberrimi & insaluberrimi corporis: nam, licet sana sint, sanitate secundum affectionem, quæ in tempore acquiritur, duntaxat, possunt etiam dici exquisitè media saluberrimi & insaluberrimi: cum eorum affectus medius sit morbi & sanitatis, vt Gal. inquit citato lib. 5. de Sanit. tuend. & propterea exquisitè media eo tempore dici possunt, cum neque vnius, neque alterius corporis conditionem aliquam participant: talia enim sunt corpora exquisitè media, quocunque modo neutra primi significati sint: perpetuò per insaluberrimum corpus intelligens cum Gal. id quod actū ægrotat, hoc est, insalubre vt nunc.

Sed quid sentiendum sit de neutro vt nunc, tertij significati, postquam hæc duo conualescentia

lib. art.
med. cap. 6
in fine.

scilicet, & decidentia; primum esse primi significati, alterum verò secundum conclusum: Neque etiam apud Galen. adhuc reperio de hoc neutro ut nunc, tertij significati mentionem factam esse, nisi in fine primi libri artis meden. Quod, si ipsum sanitatem etiam haberet secundum affectionem; hoc utique dictum fuisset ab eo. lib. ad Thrasylb. Vel forte dicendum est extra sanitatis latitudinem reperiri. Dicimus breuiter cum Galen. aut hoc neutrum non dari: quoniam, ut ipse inquit, in vno tempore, quod ita est neutrum exquisitè quidem consistere non contingit: aut, si concedatur, vtpe tempus accipiendum cum latitudine, dicemus quod quæ corpora neutra talia sunt, indifferenter continentur sub neutris tam decidentia, quam conualescentia: modò dicta corpora diuersis rationibus fuerint considerata, nam, si neutrum decidentia consideretur, non amplius vt vtriusque extremorum particeps est solum, sed etiam vt habet quandam dispositionem, secundum quam ex qualibet leui causa quamprimum in morbos incidere potest & ad sanitatem redire; possumus dicere quod habebit quandam dispositionem nunc, secundum quam aliquando sanum & aliquando ægrum esse potest. ita quoque de neutro conualescentia asserendum: nam, si ipsum non amplius consideres vt corpus neutra dispositione participans: sed vt eius affectio, cum infirma ac instabilis sit, potentiam quandam nunc habet, vt à quauis leuissima noxa, si non rectè tractetur, iterum incidat in morbum: & si rectè tractetur, paucotempore acquirat sanitatem in habitu, & deinde in bono habitu, vt Galen. sentit libro ad Thrasylb. dicemus sub hac consideratione posse etiam dici neutrum tertij significati: quoniam in eodem tempore, cum latitudine videlicet quadam, aliquando sanum, aliquando ægrum esse poterit, talem potentiam habes. Etenim, sicut neutrorum signa sub diuersa consideratione possunt diuersimodè appellari, vt liquet secundo artis medic. ita & hæc neutra sub diuersa ratione possunt dici diuersimodè neutra vt nunc. Hæc sunt denique ea corpora, quæ dicimus sanitatem habere secundum affectionem. Verum inter hæc illa primò collocari debent in sanitatis latitudine, quæ conualescentia neutra nuncupantur. Sunt enim ab ægritudine magis remota, cum ab ea liberata sint: illa verò decidentia dicta, magis propinqua, cum eandem participant. & propterea eis magis imminet periculum ægritudinis. Adhuc, si eadem corpora neutra conualescentia appellata contingat in morbos iterum incidere, necessum est, prius fiant neutra decidentia, & demum actu ægrotent, quemadmodum contingit reliquis corporibus in sanitatis latitudine collocatis. Illa verò decidentia dicta confestim in morbos incidunt, oportet: nec aliud habent medium, per quod pertranscant, vt actu ægrotantia fiant. igitur post insalubria simpliciter semper, reponi debent neutra conualescentia, & postea neutra decidentia: quæ in sanitatis latitudine, vt communis existentis ei quæ secundum habitum & ei quæ secundum affectionem dicitur, vltimum gradum possident. Et ob id non ab re diximus in hoc eodem gradu reponi habitum athletarum: nam Hippocr. dicebat affectus athletarum non esse secundum naturam. Et Galen. in oratione sua foris ad artes neminem inquit, reperiri, qui in ratione sanitatis magis sit, quam athleta, miser. & propterea nomine ab eo

lib. artis
med. cap. 7

cap. 82

cap. ult.

non degenerarunt, siue à misero, siue à miseria denominati sint: quorū primum Græci ἀδύνατος alterum ἀδύνατος nominant. Hæc insuper neutra vt nunc, sunt illa corpora, de quibus Gale. dicebat libro de Differentiis morborum cap. secundo, [quædam verò minus valent.] vltimo loco posita in tota latitudine sanitatis ibi descripta, simul complicans corpora & secundum habitum, & secundum affectionem sanam: nam postea dicebat [quædam autem iam ægrotant.] quasi velit quod post dicta neutra vt nunc, quæ minus valent, sequuntur corpora, quæ iam ægrotant, hoc est, vt nunc ægra. Hæc eadem neutra decidentia & conualescentia vulgus medicorum appellat neutra transitus: non ab re quidem. nam neutra decidentia ita appellantur, quoniam quodlibet corpus sanum, vt actu ægrotet, opus est transcat per neutra decidentia: eadem ratio est de neutris conualescentia: licet contrarium sit in tex. Nam cum primum corpora à morbis euadunt, neutra conualescentia appellantur: sunt tamen reuera (vt dictum est) sana, saltem sanitate secundum affectionem. Sed quoniam nullus, vt inquit Galen. libro ad Thrasylb. cap. vndecimo, proculdubio mutilam inutilēque sanitatem exoptat, sed, quā fieri potest, absolutissimam ac firmissimam: propterea facta relatione ad sanitatem secundum habitum, quam possunt & debent acquirere, & deinde ad eam, quæ est boni habitus, possunt adhuc quodāmodo dici media transitus. Qua etiam ratione & sanitas secundum habitum media dicitur inter sanitatem secundum affectionem, & sanitatem secundum bonum habitum: quoniam hæc duæ in melius ducendæ sunt, tertia in optimo statu conseruanda, vt eodē lib. ad Thrasylb. liquet.

Sequitur post dicta corpora, morbosa affectio: qua laborant quæ iam ægrotant corpora. Vocantur autem à Gal. lib. primo artis med. insalubria nunc. Nam insalubre nunc corpus (vt ipse inquit) est quod eo tempore, quo tale dicitur, ægrotat. Neque obscurum est quod & hoc ipsum eo, quo tale dicitur, tempore ægrotans, vel in consimilibus malam habet temperaturam, vel in instrumentariis incommenurationem, vel vtrunque. Hæc verò corpora quæ iam ægrotant, distinguuntur ab aliis insalubribus, sensibilibus operationū lationibus, vt 2. artis med. patet. nam terminus, qui vtrūque insalubritatis modū distinguit, vt Gal. inquit, est operationū lesio sensibilis. neque alia nobis tradidit indicia, quibus eadem fecerni inuicem possint. Id etiam paulo post confirmauit posita sanitatis latitudine, ac diuisa: cum dicebat [Post quæ deinceps sequuntur, quæ iam ægrotant corpora, quæ sensibilibus operationum lationibus distinguuntur.] libro verò de diff. morborum describens hæc corpora & eorum gradus, ita dicebat. [Quædam autem iam ægrotant, atque horum quoque ægrotatio quandoque leuior, quandoque periculior: & hæc ipsa quandoque vehemens, nonnunquam periculum mediocre affert.] Neque enim omnia corpora (subdit Galen.) sana, vel ægra, æqualiter affecta esse existimare debemus. quæ de re horum etiam corporum tradi potest latitudo non parua, quæ tamen non est presentis negotij. Illud autem non præteream de his corporibus insalubribus nunc, quod, licet dicantur ægrotantia, ac actu ægrotent eo tempore, quo talia dicuntur, semper tamen propter id, quod addidit Galen. [neque obscurum est, quod & hoc ipsum

cap. 75

cap. 8

cap. 1
lib. art. m
lib. cap. 75

lib. art.
med. cap. 6

cap. 8

ipsum eo, quo tale dicitur, tempore agrotans, vel in consimilibus malam habet temperaturam, vel instrumentariis incommensurationem vel vtrunque possunt etiam esse hæc corpora ab ortu naturæ talia, quemadmodum diximus de salubribus vt nunc, id quod in dies experimur. oriuntur etenim nonnulla corpora actu agrotantia, sensibilibiter operationes læsas habentia: quæ, cum insalubria non sint, nec semper, nec vt multum, propter iā dictam causam, necessariò, vt nunc insalubria dicuntur: quinimò hæc corpora verè & propriè insalubria vt nunc appellantur, in nullo alio ab aliis insalubribus dissidentia, quàm sensibili operationum læsione, vt cum Galen. dictum est. Quòd si cætera corpora etiam salubria simpliciter semper, possint actu agrotare, dicimus, quòd talia non dicuntur insalubria nunc: quia non habent neque in consimilibus, neque in instrumentariis, neque in vtrisque malam temperaturam, aut incommensurationem, neque etiam à naturæ ortu, sed bene dicuntur agrotantia, & ægra nunc: quemadmodum etiam neutra, & insalubria simpliciter, licet dici possint sana nunc, non tamen salubria nunc esse dicuntur: cum neque bonam, neque à naturæ ortu in simplicibus habeant temperaturam, & in instrumentariis commensurationem, id quod est de ratione corporum salubrium vt nunc. Si quis autem velit, quamuis impropriè, omnia etiam corpora, quæ iam ægritudinem patiuntur, etiam non à primo ortu, vt nunc insalubria appellare, quemadmodum videtur olfense Gal. 2. artis med. 78. cum dicebat [quæcunque verò vt nunc insalubria sunt, hoc est, ægritudinem patiuntur:] nos non reclamabimus, modò substantia, seu rei natura non immutetur, vt scias videlicet alia esse corpora insalubria nunc ab ortu naturæ, quæ verè & propriè ita appellantur: & alia, quæ in tempore sunt talia, impropriè sic dicta, propriè verò agrotantia, seu ægra nunc appellata. De primis loquitur est Gal. 2. artis med. circa principium, quo loco de aliis quoque corporibus à natura talibus verba faciebat. de reliquis verò præcitato textu 78. vtraque tamen corpora agrotantia, hoc est, quæ actu agrotant, & insaluberrima quoque ab eodem Galen. nuncupari consueuerunt: vt liquet text. 17. primi lib. Neque enim fas est hoc loco aliud corpus intelligere per insaluberrimum, vt quidam putant, quàm insalubre nunc; cum hoc corpus posue-

rit pro vno contrario termino in tex. 9. secundi lib. cuius relatione, neutrum primi significati dicitur exquisitè medium semper: alioqui exquisitè diceretur medium relatione ad diuersa corpora insalubria, quod omnino esse non posset, posita pro altero cōtrario termino optima corporis constitutione: quemadmodum Gal. vbiq̃ censet: quamuis eadem sit habenda ratio de corporibus insaluberrimis, quæ de insalubribus, vt nunc habetur: neque etiā insalubre corpus simpliciter semper insaluberrimum appellari poterit, vbi pro contrario termino optimæ constitutioni nuper facta ægritudo ponatur: quemadmodum Gale. visum est, cum multò insalubrius eo fuerit insalubre vt nunc, vt liquet in eiusdem Gale. doctrina. ad vtrōque enim hos cōtrarios terminos relatione habita, docuit idē Gale. intermedia omnia corpora quæ sana sunt, seu sanitatem participant, dignoscere, quantitate distantie inter sese dissidere, ac diuersimodè etiam appellari citato tex. 9. sec. artis med. Sed quæres qui fieri possit vt salubria & insalubria nunc valeant à naturæ ortu esse talia, neutra verò nunc nullo modo: Dicas priora talem habere posse dispositionem ab ortu, vt demonstrauimus. At neutra vt nunc necessariò opus est, vt talia sint ac dicantur, aliam prius habuisse dispositionem: ita vt eandem neutralitatem vt nunc, semper aliæ dispositiones præcedant, vt-pote sanitatis, vel ægritudinis. nam, si primi significati neutra vt nunc fuerint, vel ægritudo præcessit, vt in conualescentibus: vel diuersa ætates, vt in senibus. Si verò secundi sint significati neutra vt nunc, sanitatis dispositio melior præcedet tam si neutra decidentia verè dicta sint, quàm athleta. & hac ratione neque vnus, ne alterius generis neutra nunc, possunt à naturæ ortu esse talia, quemadmodum salubria & insalubria nunc.

Hæc sunt (iuuenes studiosi) quæ de sanorū corporum ordine ac numero, seu, vt inquirunt, de sanitatis latitudine, cum Galen. sentio, quamuis non propterea verear, quòd ob multas, quæ de ea proditæ sunt opiniones, non paucos etiam habebit oppugnatores. illud tamen pro certo habeatis, quòd si qui sint, qui aliter sentiant, ad eorum, vel aliorum opinionem, non autem Galeni, id sentire videntur. Vt verò nedum vos, sed & cæteri omnes hanc, quam Gale. putamus esse, sententiam facilius intelligere valeatis, sequentē tabulam exarauimus.

F I N I S.

IOANNIS FRANCISCI

LOMB. NEAPOLITANI

Ὁδὸν δὲ διὰ τοῦ διδασκαλοῦ

Ad docilem Lectorem.

Sectio venarum in gravidis, ne fiat abortus,

Num bene conveniat:

Cochio morborum vis fiat, succusque paretur,

Functio & utrum anime

Princeps, in cerebri sinibus, vel corpore detur:

Spiritus an valeat,

Admitti phisicus: Febrisve Tritæa in acuta

Sede libens sedeat:

Mox sit in urinis sani, & quid in urinis ægris

Quomodo sese habeat

Corporis humani Eucraseos Πλάτος ἢ δὲ Πλάτυς μὲν,

Differit iste liber

ALTIMARI, longo vivet qui tempore Roma

Dum caput orbis erit.

Diuinam iamiam expecta de Febris artem

Lector adhuc Medicam.

O opus excelsum. Iouis ira abolere, vetustas,

Quod nequit ignis edax.

O opus egregium. Quod solum linida Momi

Obstruere ora potest.

O opus eximium, elaudit quod scripta Galeni

Hippocratisque senis.

At decet ut taceam. calamus nam deficit omnis

Sepia, charta, manus.

Expedi ut fileam; vitam ne Thessalus ira

Finiat ante diem.

Præclara interea hæc capias quesita libenter,

Lector amice precor.

IOAN. FRANCISCI NEAP.

LOMB. DACTYLICON CVM SENA-

rio Iambico ad Lectorem.

Ἱερὸς ὅστις βίβλος κατέχει μυστικὴν ἀειδοῦ
 Μὲν ἀναγνώσας ὅστις ἐδοῖτο δαυμασῶς,
 Τὸν λαβὴν νύκτερ πνέουσαν δαυμασῶς,
 Ψυχὴν ἢ ὅστις ἡδονὴν καὶ σώματι,
 Αἰσώσις Πυρετῆς μὲν δὲ οὐκ ἐστὶν ἀκήμας αἰμυλῶς
 Σὺ προσηύδα καὶ νῦν ἐστὶς ἐν πάχαι,
 Ἡ γὰρ ἐκτίδω κύματος, ὅστις γὰρ γελῶσι,
 Ποιῖται αἶμα, πᾶν τὸ ἐν ὑμῖν παρὰ γὰρ
 Ἀρ' ἀναγνώσας ποδῶς εὐχεται πρὸς Θεὸν ἄντι
 Πολυπόνος Αλτιμάρου τῆς βίβλου.


F I N I S.

Sensus est confinitio naturalis ad locum perficiens: ut non quia
 finitudo: sed quia naturalis: et finitudo.


LATITVDO SANITATIS SECUNDVM HABITVM.

95


PRIMA PARS LATITVDINIS SANITATIS SECUNDVM HABITVM.




SECUNDA PARS LATITVDINIS SANITATIS SECUNDVM HABITVM.



TERTIA PARS LATITVDINIS SANITATIS SECUNDVM HABITVM.



LATITVDO SANITATIS SECUNDVM AFFECTIONEM.



LATITUDO SANITATIS
TIS SECONDA HABITUM

PRIMA PARS LATITUDINIS SANITATIS
SECONDA HABITUM

I.	Latitudo sanitatis habitum
II.	Latitudo sanitatis habitum
III.	Latitudo sanitatis habitum

SECONDA PARS LATITUDINIS SANITATIS
TIS SECONDA HABITUM

I.	Latitudo sanitatis habitum
II.	Latitudo sanitatis habitum
III.	Latitudo sanitatis habitum
IV.	Latitudo sanitatis habitum
V.	Latitudo sanitatis habitum
VI.	Latitudo sanitatis habitum
VII.	Latitudo sanitatis habitum
VIII.	Latitudo sanitatis habitum
IX.	Latitudo sanitatis habitum
X.	Latitudo sanitatis habitum
XI.	Latitudo sanitatis habitum
XII.	Latitudo sanitatis habitum

TERCIA PARS LATITUDINIS SANITATIS
TIS SECONDA HABITUM

I.	Latitudo sanitatis habitum
II.	Latitudo sanitatis habitum

LATITUDO SANITATIS SECONDA
TIS SECONDA HABITUM

I.	Latitudo sanitatis habitum
II.	Latitudo sanitatis habitum
III.	Latitudo sanitatis habitum
IV.	Latitudo sanitatis habitum
V.	Latitudo sanitatis habitum
VI.	Latitudo sanitatis habitum
VII.	Latitudo sanitatis habitum
VIII.	Latitudo sanitatis habitum
IX.	Latitudo sanitatis habitum
X.	Latitudo sanitatis habitum
XI.	Latitudo sanitatis habitum
XII.	Latitudo sanitatis habitum

PAVLO IIII
ACTISS

DONATI
ANTONII AB
ALTOMARI MEDICI,
AC PHILOSOPHI
NEAPOLITANI.



De medendis humani corporis malis
ARS MEDICA.

Nunc denuò ab eodem Auctore diligentissimè recognita.

*Cui addita sunt tria capita De Hemorrhoidibus, De Raga-
diis & Procidentia ani, quæ in aliis additionibus desi-
derabantur. Necnon loci omnes in margine,
maximo cum emolumento studio-
rum omnium.*



ANTONII AB
ALTONARI MEDICI
AC PHILOSOPHI
NEAPOLITANI.



De cunctis humani corporis malis
ARS MEDICA.

Nunc deinde ab eodem Auctore diligentissime recognita.

Cuiusmodi sunt tria capita P. H. et morborum, De Reg-
dis & Prodigibus, que in aliis editionibus des-
derantur. Ut cunctos loci omnes in marginibus
maximo cum emolumento studio-
rum committantur.





PAVLO IIII. PONT.
MAXIMO ATQVE SANCTISS.
DONATVS ANTONIVS
AB ALTOMARI.



*V*M maximam, precipuamq, meæ atatis partem, in Medicina studiis consumpsissem P.M. atque Sanctiss. vidererque omnia meæ professionis spatia decurrisse, ad ea demum me contuli, quæ (paucis demptis) totam penè Medicinam absoluerè viderentur. In quibus non succisuiis (ut aiunt) operis, sed diu, multumque versatus perfeci, ut singularum humani corporis partium morbos cognoscendi, primum breuè modum, deinde in eis prædicendi, curadique omnibus indicarem, via quadam, ac methodo usque à Galeno intacta, à nulloque absoluta. Quæ dum mecum commentarer, non defuere, qui in me turpiter essent maleuoli, meoque de nomine & fama detrabere arbitrantes, variis calumniis, non religione, sed maleuolentia, ut nigro notarer carbone, à patria non tantum eicere, sed etiam arcere conati sunt: perfeceruntque, ut & solum verterem, Romamque adirem. Quamobrem meas lucubrationes omnes detraxi, & meridiationes, nec addere potui, quibus uti solebam. Vnde effectum est, ut opus istud, quod in manibus tunc habebam, iam diu esset imperfectum, atque inelaboratum. Qua in calamitate cum te unum præter ceteros, tua, qua es in omnes singulari humanitate, acerrimum mei defensorem, præstitisses, meque pro virili tueri non destitisses, non modò domum, & ad patriam, verum etiam ad pristinam dignitatem, quam semper te fautore seruauis, sum restitutus. datique sunt mea ad studia reditus, & quæ in illa calamitate propè oblanguerant opera, oculos sustulerunt. Cumque in illis noctes & dies urgerer, quæ prius fuerat imperfecta, perfeci. Quòd cum ita sit, quicquid est hoc Medicæ artis, tibi uni acceptum referre debeo. Tu igitur patrocinio, cui me totum tradidi, fretus, illud in apertum proferre constitui. Per te enim absolutum, per te etiã inuidorum calumniis vindicandum æquum esse duxi. Suscipe igitur munusculum hoc tran-

quillo animo, serenâque fronte, tanquam signum quoddâ meæ erga tuam
sanctitatem iusta, ac debita seruitutis: velut etiam me illius auctorem in
rebus aduersis semper suscepisti, in quo animum, non rem inspectes oro,
nec alienum a tua dignitate ducas. Est enim sapientis, & prudentis lite-
ras, eorumque cultores utcunq, amplecti. Nec me præterit, te arte Me-
dica potius, quam medicis ipsis oblectari. Huc accedit, quod cui magis in
hac re sit tribuendum, video neminem. Nam ut omittam, quæ te omni-
bus numeris absolutum à pueritia reddiderunt, quid dicam de animi for-
titudine? quam in maximis rebus gerendis, dubiisq, sustinendis, & sem-
per declarasti, & nuper præcipuè, cum tota Italia intestino bello ardere,
cœpisset (cum & bella vitari interdum nequeant, ubi res urgeat, pax
autem semper seruanda, si fieri potest) sicut initia illius obiter admisisti,
ita extrema libèter, honorificètissime, & fortiter, es persecutus, paceq, ex
omniũ sententia desperata, tua vigilantia, maximaq, authoritate effecisti,
ut omnia pacè essent habitura, & Philippum Regè nostrum Serenis. ea
beneuolentia tibi recôciliasti, ut te unũ, præter omnes (quot fuere unquã)
Pontifices Maximos, & ipse admiretur, & nostra etiã memoria: adeo,
ut quacunq, tuo nutu, consilioq, gesta sunt, præclare sancteq, gesta omnia
arbitretur. Itaque omnes Pontificè talem habuisse latamur, nec iniuria.
Quis enim unquam in Deum ea religione fuit? Sanctaq, Romanæ Ec-
clesiæ defensor adeo assiduus, & veluti sui patrimonii vehemens fortisq,
propugnator? Quid dicam de vitæ integritate, summæque in omnes cha-
ritate? Quid de domesticarum rerum ordine, & publicarum admini-
stratione? Quæ omnia, ut in terris ad hunc magnum dignitatis gradum,
atque amplissimum te extulerunt: sic apud Deum æternam sedem tibi
parasse omnibus est exploratum. Ad quam ne quamprimum, sed multis
post annis proficiscaris, omnes, pro Reip. Christianæ commodis, maximaq,
pro illius fidei seruandæ necessitate, cupiunt, & optant. Vale Pontifex
Sanctiss. & meæ, quamuis indigna tanto Pontifice seruitutis, eiúsque
semper augendæ voluntatis, ex animo tuo nunquam disce-

dat memoria: meam enim tuorum erga me merito-
rum nulla unquam delebit obliuio. Nea-

pol. V. Kalend. Februarii.

M. D. LX.

10. MAR.



JO. MARTINVS EVSTACHIVS
TEPSANVS ARTIVM, ET MEDICINÆ
Professor, Authorisq; discipulus, Artis
medicæ candidatis S.



Ccipite studiosissimi iuvenes Altinari Medicam
Artem nunc denuo excusam, quæ ob multa ad-
iecta, tam diuersa exit ab illa, quæ altera æditione
prodierat, vt penè alia esse videatur. Nam præter-
quam quòd emendatissima nunc apparet, infini-
tis mendis, quibus illa altera scatebat, soluta, tum
recognita diligentissime prima æditione, tum cu-
ra addidita, ne inter imprimendum noui (id quod sepe accidit) erro-
res orirentur. Accedit nunc in vestri gratiam margineus noster labor
non inutilis (vt spero) nec contemnendus, vbi Galeni præcipuè, alio-
rumque authorum locos, quos consulte author omisit, sigillatim ve-
luti digito monstramus. Quid quod & author nunc primum tria ca-
pita de Hæmorrhoidibus & de Rimis & de procidentia Ani, quæ prio-
ri deerant, adiecit. Adde quòd multa nunc adfunt locupletius decla-
rata, lucidius exposita, quamplurima passim apposita, vt facillè cuius
conferenti cum altera patere potest. Hanc ergo nostram operam bo-
ni consulite, & si qua legentibus occurrerint, quæ nostram hanc
quantumuis maximam diligentiam fugerint, librario notas inurite:
qui ob id quòd volumina superiori anno excusa, ad vnum omnia
(pro vendibile opus) vendita fuerant, recentem impressionem acce-
lerabat. Valete igitur nostri memores, & magno Altinaro
Nestoreæ vita dignissimo, febrium tractationem
interim ingenti conatu parturienti, mul-
tos annos felicesque precaminor.
Rursus valete.



IOAN. FRANCISCI LOM
BARDI NEAPOL. ART. ET MED. DOCT.

πρὸς Αναίνωσιν τὸν εὐφυῆ, καὶ εὐπειθῆ τὸ Δι-
γλωττασκληπιδιόν. ἔδει τῷ
Αυσονίᾳ Γάλλῳ.



SI Lector cruciat magna sitis tuas
Fauces, huius aquas nunc MARIS haurias
ALTI; sume libens pocula dulcia,
Vincunt quæ Ambrosiam, & Nectar Olympicon.

Morborum citius nam omne genus fugant;

Galenī ut placita, ac Hippocratis iubent.

Hinc sit Barbaries en procul, & chorus,

Servat qui fatui dogmata Θεοσάλε.

Felix tēque quater, cui superi dabunt

Gustare hos latices. ALTIMARVS meus

Preceptor (procul ὅ sis reuerentia)

Nanque est Italia gloria totius.

Εὐδ' εἴξεις Πυρετῶν Γράφει ὁ αὐτὸς ἄν,

Γαλλῶν μετὰ μηδ' εἰς τὰ χα Γράφει ἄς,

Γνείαν προθύμως λήψεται ὃν ἄνευ

Ὅς πάσχει πυρετῶν ὥμα παθήματα.

Δείξει τῆς Μαλέας λαμπρότερον τ' ὁδόν,

Πᾶ κρύπτεισι κέραν' οἱ ἔλαφοι ὁρῶν,

Ευρεῖν ἄς τις ἀνὴρ ἐχέῃ διωήσειται

Γαλλῶν φανερώς Γράμματος, ἐν ἑδαμῶς.

Σχῶν πασῶν ἀκριβῶς ἔρπον ὅλον Νόσον,

Ὁξείας, χρονικαὶ εἴτε μὲν ὅσον αὖ.

Τέτω δ' ὅς χάριτας ῥ' ἀνδρὶ φθόνη βέλη,

Καὶ λειπτῶν φθονεῖ τραύματα ζωῆς.

DONA-

2. de Lu
aff. cap.
9. Met
cap. 6

cap



DONATI ANTONII
AB ALTOMARI MEDICI
AC PHILOSOPHI NEA-
POLITANI.

De medendis humani corporis malis,
Ars Medica.

METHODVS.



M V M de singulis humani corporis locis male affectis dignotionem, prognosticū, ac curationē rationabili via, & Gale. Methodo post eum hucusque intacta, à nulloq; in lucem edita conscribere proposuerim, efflagrantibus quibuldam amicis studiosis, artisq; medicæ candidatis, quò facillimè in singulis malis quiniis eorum viam hanc assequi valeat, vniuersalem methodum vno capite contentam prius describendā fore putavi, sub qua demum promptius in particularibus se exercent. Fit nanque exercitatio omnis cum particularia sub eadem viam, ac rationem ducuntur. Vig siquidem, & rationes vbi solè sine multifaria secundum ipsas exercitationes cognoscuntur haudquaquam possunt perfectos efficere discipulos, velut secundo de Locis affectis Galen. scriptū reliquit. Quapropter nono Methodi medendi non ab re decretum est ab eo, non licere vilius artis scientiam nancisci, nisi & methodum quandam habueris per vniuersalia vocata theoremata, & in particularibus te exemplis exercueris; nanque in vniuersalibus methodus, in particularibus exercitatio consistit. Et libro nono de Hippocratis & Platonis decretis dicebat, Vniuersalis methodus sine exercitatione multa in singularibus artificem bonum efficere non potest. Quæ ergo via, ac ratione valeat quispiam affectam sedem omnem, ac quemuis præter naturam affectum, eiusq; causam dignoscere, & eis cognitis quid deinde futurum sit præsentire, & prædicere, ac demum si affectus is curati valeat, curare, iuxta Hippocratis & Galeni monimenta potissimum hoc loco scribere aggrediar. In his nanque tribus continentur omnia quæ ad artem medicam spectant; nam commoda ea sunt vel ad dignotionem, vel curationem, vel prognosticum. Curatio autem per se à medicis exercetur, prænotio verò & dignotio propter curationem, vt Galenus inquit primo de ratione victus in mortis

acutis, comment. tertio, & proinde in tres primarias partes artem medicam diuidi asserere melius erit, quàm in quinque, vt quibusdam visum fuit ex eiusdem Galeni sententia. Sub eandem deinceps viam, & rationem particulares omnes affectas partes, ipsosq; affectus, & eorum causas proprias docere conabor, prout in singulis his patebit; cum nō satis sit, vt diximus, methodum nouisse, sed multifaria insuper exercitatione in his quæ particulatim occurrunt, opus est, vt liquet primo de Causis symptomatum, cap. tertio. propterea quòd pro locorū differentia, ac affectuum præter naturam curationem quoque variari contingit. Quamuis oportet, vt Erasistrato placuit, hominem exercitatisimæ considerationis esse, qui voluerit non solum ipsius affectus qualitatem, sed affectū quoque locum probe dignoscere, præsertim si in imo corporis lateat. Nam quæ in superficie sunt constitutæ partes vnâ cum affectuum suorum specie faciliè sensibus deprehenduntur. Sunt verò morbi non in manifesto loco hærentes multi, atque hi qui ad interna vertuntur, vt Hippocrates inquit, libro de Arte, quorum nullus est, quem oculis conspicienti videre, ac cognoscere contingit, & ab arte quoque obscuri esse iudicati sunt, & proinde obscuri morbi appellati sunt; qui cum oculorū conspectum effugiant, mentis tamè oculis obtinentur, & superantur, vt ipse refert. Primum denique quod in ægris medicum inspicere oportet, vt Galeno visum est primo, & tertio de Locis affectis est, quænam corporis pars sit affecta, & nunquid ea per se afficiatur, vel alteri cōsentiat. Quapropter semper incipere oportet à lesæ actionis instrumento, eiusdem Galeni præcepto eodè primo de Locis affectis. Quo iuuento, ipsam deinceps dispositionē querere opus est. vt ex vtrifque simul totius curatiui generis indicatio sumatur, vt apud eundè Galenum; liquet tertio de Locis affectis. Verum quænam pars afficiatur, priusquàm eius natura, seu essentia sit cognita, actio, seu vsus eius, & compositio, cum qua & societas, quam cum aliis habet, comprehenditur, ratione quadam, ac via rite

Vide 3. de
loc. affect.
cap. 2.

Paulo post
medium.

Quid pri-
mo inuesti-
gandum sit
in ægris.
1. de loc. af-
fect. cap. 2.
et 3. 3. de
loc. aff. cap.
1. et 3.
cap. 2.
cap. 3.

1. de loc. af-
fect. cap. 2.
Lib. de cōst.
art. med. c.
16
Ars secū-
di corpora
non igno-
randa.

2. de Vsu
part. cap. 3.
c. 7

Quibus sue
vis hoc opus
conscriptū.

Lib. de cōst.
art. med. c.
4. c. 5

1. de Vsu
part. c. 8
Anato-
mes visus.
cap. 1

inuestigabit nemo, ut primo, de Locis affectis & li-
bro de Constitutione artis medicæ parer. Nihil au-
tem interest, si positionem aut compositionem, vel
cum proximis locietatem dixeris. Hæc autem per
artem secandi corpora accurate cognoscere oportet,
præsertim qualis sit cuiuslibet partis essentia, ac
compositio, ut exinde earum cuiuslibet, cum actio-
nes, tum usus manifestentur, non siquidem solis a-
natomicorum libris fidem adhibendo, qui magna
ex parte infinitis erroribus pleni comprehendun-
tur, sed propriis oculis diligenter inspiciendo. Co-
gnita namque hoc modo cuiusvis partis substantia,
ac compositione, actionem cuiusque earum, quin-
etiam earundem utilitates nullo negotio inuenies,
ab ipsa partium natura doctus; cum videlicet ex-
actè, ut diximus, partium essentiam, ac totam earum
constructionem noueris, iuxta Galeni sententiam,
secundo de Vsu partium. Hæc namque corporum
dissectio, ut ipse refert, se ipsum Gale. docuit, ut pa-
tet primo de Locis affectis, cap. primo. cū alia per-
multa, cum cuiuslibet partis essentia proprietatem.
Hæc igitur anatomen propriis oculis, ac sepius re-
ctè inspicere ab his, qui eam callent, conemini, ut
quæ dicturi sumus promptè intelligere valeatis.
Nam iis, qui eam ignorant, fortè quæ dicemus, et si
ratione dicta sint, veluti in somnia quædam vide-
buntur. Nos verò his qui corporum dissectionem
haud ignorant, sed propriis oculis mecum, vel ab
aliis administratam probè, ac sapius inspexerunt,
has lucubrationes scribere paramus. Hi namque,
partium essentia, ac compositione cognita, earum
cuiuslibet, cum actionem, tum usum haud ignora-
bunt, cum singula nostri corporis partes aut pecu-
liarem habeant actionem, aut aliquem præstent usum
pro comperto etiam habeant actiones partium du-
plices esse pro duplici earum natura, alteras sim-
plicium & simularium, reliquis compositarum, seu
instrumentalium, quæ siquidem partium actio motus
est earundem factiuius. Insuper non præteribit
eos quemlibet partium usum aut gratia conserva-
tionis, & tutelæ fuisse, velut causam sine qua nō po-
test actio perfici, aut, ut melius eadem perficiatur:
quorum omnium Galen. pro teste habent tum lib.
de Constitutione artis medicæ, tum primo de Vsu
partium, & ut vn̄ perstringam verbo, Medico u-
sum præstant confectiones anatomicæ, non modo
ad effectus noscendos, sed ad eos curandos ac ad il-
lorum præfagia; ut secundo de anatomicis admini-
strationibus ab eodem Gal. dictum est. Quid igitur
cuncta quæ diximus exactè nouerit, nonnihil v-
tilitatis ex his, quæ dicemus, exportabit. Ut autem
& hi mentem exerceant in affectorum locorum no-
titiâ, tres exercitationis modos, Erasistrati auctori-
tate, Galen. secundo de Locis affectis proposuit.
Quorū vnus est circa singulas corporis partes, quas
locos vocant. Alter circa causas, & dispositiones.
Tertius circa symptomatum differentias. His nan-
que rite cognitis, ac inter se distinctis, facile propo-
sitæ rei veritas percipi potest, singulorum per eam
facta contemplatione. Verumtamen nos, ut quæ fa-
cilior sit, & ne eadem bis repetamus, ea exercita-
tionis via præcipue utemur ad affectorum locorum no-
titiâ, quæ quidem ex symptomatibus, ac eorū
differentia procedit, cum hoc tamē, & reliqua quæ
diximus, non negligentes. Ex hoc namque genere
eorum, quæ præter naturam sunt, sperandum est cō-
parari posse exactè dignoscendarum partium affe-

ctarum iudicium, velut Gale. scriptum reliquit lib. c. 15. c.
de constitutione artis medicæ. Quantum autem
præstet usum affectorum locorum, notitia in curā-
dis singulis corporis vitiis, Galen. passim in cunctis
sere suis commentariis meminit, præsertim lib. pri-
mo de locis affectis. Nam quod quilibet præter na-
turam affectus suo auferatur cōtrario, communis.
Hippo. decreto, cap. 1. affectus ipse indicat, ut si ca-
lidus, frigidus, & si frigidus, calidis. At quouque,
quomodo, aut quā materia id exequi liceat, affectus
ipse non indicat duntaxat, sed ipsa pars affecta com-
monstrat: quemadmodum de phlegmone in diuer-
sis partibus orta, pro ipsarum partium diuersitate
libro 13. methodi Galen. docuit terminum, modū,
ac diuersam medicamentorum materiam eligere.
Quare ad usum dextrum adiumentorum necessa-
rium esse exactè scire partis curandæ substantiam,
formationem, ac situm libro de constitutione artis
medicæ decretum reliquit. Quam in super vim
habeat hæc notitia in ea artis parte, quæ progno-
stica dicitur, & si sexcentis in locis consueatur Gal.
quarto tamen de præfagitione ex pulsibus per hæc
verba palam ostendit, cum dixit, Proinde cui sta-
tus facultatis perspectus ad vnguem sit, locusque
affectus, & eius affectus, hic ad futura præsentenda
est peritissimus: & tertio methodi medendi affe-
ruit, primum artis opus esse ut intelligas sperare ne
id, quo tendis, debeas, an fecus. Cuius rei cum du-
plex possit haberi cognitio, altera per experientia,
cui longo usu est opus, altera per ipsius rei natu-
ram; hæc siquidem cuiusque particulæ substantiam
exstimabit, tum actionem, & usum, ac situm ipsum,
a quibus procedens non solum quod sanari non
potest, præuidebit, sed etiam quod recipere sanita-
tem potest, de inueniendis ei remediis deliberabit.
Habes igitur ex his quantum conferat, cum ad cu-
rationem, tū ad prognosticum partium affectarum
notitia, ex Galeni monumentis. Præter id quod
nonnihil etiam afferat utilitatis ad affectus digno-
sitionem ipsius loci natura, cum ea fuerit cognita, ve-
luti primo de locis affectis liquet. Reliquum deni-
que erit postquam ea primo venit inuestiganda, do-
cere quomodo, ac qua via partem quampiam affe-
ctam dignoscere valeamus. Cū vero ex nonnullis
notis ipsa deprehendi possit, ut testatur Galenus
primo de Locis affectis, a læsa tamen actione prius
eius dignotio auspicanda est; ex qua sola, cum nul-
la alia pateret via, idemmet Galenus confessus est
inuenisse partem affectam tertio de Locis affectis
est namque cuiuslibet partis affectu proprium sym-
ptoma, propriæ actionis eiusdem noxa, siue simi-
larium, siue instrumentalium partium actio fuerit,
singularum etenim animalis corporis actionum v-
nam esse propriam particulam, per quam fiunt, om-
nibus medicis in confesso est. Reliquæ vero quæ
instrumentali parte continentur, eidem præstant
usum, ut liquet secundo methodi medendi. Qua-
re actionem ledi necesse est, instrumento ipsam ef-
ficiēte quomodolibet affecto, ut decretum reli-
quit Galen. eodem primo, & secundo de locis af-
fectis. Quæ verò actiones simularium, duntaxat
partium sunt oblatæ earum proprio temperamen-
to, & ipsas offendi necesse est. Non ab re igitur ex
actione læsa diximus primo inuestigari debere ip-
sam partem affectam, quomodolibet ipsa affi-
ciatur. Nam velut naturalis actio, necessario com-
mitatur corporis statum naturaliter se habentem
sic contra

fic contra, si à natura recesserit actio, statim præter naturam se habet, vt patet primo Methodi mendedi; quæ aut non fit, aut male fit, diminutè videlicet, aut deprauatè. Nam si ventriculus affectus sit, & eius propria actio, quæ est chylificatio, seu assumptorum ciborum coactio, ac propriæ eius qualitatis assimilatio, vitata erit, si iecur, hamatosis, hoc est, sanguinis generatio necessariò erit oblata. Quod si pars, quæ afficitur, peculiari careat actione, verum aliquem præstet vsum, is non ignorandus erit; cum & ipse magnificè conducit ad affectorum locorum inuentionem. Hic enim omnibus partibus, vel nihil agentibus inest, Galen. teste primo de locis affectis. At vbi vnica duntaxat actio laesa est, & sedes affectæ plures, tum nostri instituti est, vt reliquorum varietate symptomatum eas discernendo, inueniamus, velut liquet quarto de locis affectis. Indican secundo partem affectam ipsæ excrementorum species, quorum excrementorum, quædam ad exquisitam perducunt partis affectæ notitiam, vt quæ affectæ partis essentia proprietatem declarant, quædam verò artificiosam coniecturam producant: quæ nobis perquam utilis est, vt pote media existens quodammodo inter exactam notitiam, & omnifariam ignorantiam, teste Galen. primo de locis affectis. Licet ea aliquando aberret, vt patet commento aphorismi secundi quarti lib. Sumitur autem artificiosa hæc coniectura ex ea excrementorum natura, quæ in ipsa parte affecta continentur, siue natura, siue præter naturam. Declarant verò partis affectæ essentia proprietatem, si ea excernantur, quæ sunt de propria eiusdem partis substantia seu essentia. Vt si tussiendo aliquando aliquid expuatur bronchion, vlcus maximum in pulmone esse existimamus ab erosione, vel putredine ortum, cum pars esse non possit arteriæ asperæ, quæ inter fauces & pulmonem existit, vt pote tam grandi ulceratione haudquaquam potente in ea fieri, quin prius mors animal præoccuparet in ipso pulmone talis fieri potest, propter causas primo de locis affectis à Galen. traditas. Pariter ex ramentis cum alui deiectione per dysenteriam excretis, intestina affecta esse dignoscimus. Haud aliter si cum vrina carunculis similia excrementa excernantur, renes affectos esse dignoscimus. At si lamarum speciem referant, in vetrica vlcus esse ostendunt, prout Hippocr. aphorismus 76. & 77. & 81. quarti libri scriptum reliquit. Quod si magnitudinem quoque eorum interdum considerabis, haud obscure, & affectam quoque sedem indicabunt. Nam frustum vasis tussiendo reiectum, si magnum fuerit, pulmonem affectum esse vlcere indicat. Etenim quæ ad asperam arteriam in collo existentem proueniunt vasa, capillorum fere speciem referunt. Sic si tunica intestinorum per dysenteriam erecta magna conspiciatur, sitque latitudine, & crassitudine his, quæ tenuia constituunt intestina, multo maior, non abs re coniciendum est, ulcerationem in crasis intestinis consistere. Interdum etiam ea, quæ adnascuntur, affectam sedem ostendunt. Nanque res adhærentes, essentia proprietatem obtinent, quemadmodum fungi capite fracto, membranam esse affectam indicant. Cuius præterea generis est crustula quædam, quæ ephelcis Græcè dicitur. Nanque eius particula, à qua excernitur, ulcerationem portendit, vt vrina mea-

tum, si cum vrina; spiritalium instrumentorum, iussiendo; gula, & ventriculi, si vomitione, aliquid intestinorum affectum esse ostendit, si per alui deiectionem excernatur. Ex alia excrementorum specie, quæ in affecta parte quouis modo continentur, ipsa quoque deprehenditur, licet non exacta notitia, vt ex prædictis, sed artificiosa quædam coniectura: Vt si per vulnus aliquod vrina excernatur, vrinarios meatus, vel vesicam; si stercus, intestinorum aliquod; si cibus, ventriculum vulneratum esse ostendit. Sanguis quoque per vulnus saliendo reiectus vulneratam indicat arteriam. Effusus spiritus inter respirandum per thoracem, membranam costam succingentem vulneratam esse, indicat. Est præterea alius notitiæ modus ex his excrementis, quæ in affecta parte præter naturam continentur, velut in renibus, aut vesica, lapis, aut pus in thorace, vel sanguinis grumus, qui Græcè thrombos dicitur, vbicumque contineatur: aut alius quidam humor molestus, in animalis corpore genitus, vel extrinsecus ei adueniens. Conferunt igitur modo quo diximus ad affectæ sedis notitiam excrementa, cuiusvis generis sint. At ipse positus affectam partem ipsam nimirum sufficienter demonstrare potest. Quippe durus in dextra hypochondriorum parte tumor, non lienis, sed iccinoris affecti nota est. Quemadmodum si in sinistra fuerit, non hepatis, sed splenis affectum portendit. Positus insuper, vbi similiter se habeant excrementa, interdum affectam partem demonstrat. Nam si membranosæ tunice frustulum excernatur, vlcus alicubi esse ostendit: verum in qua sit particula, ex positu discernere necbit. Nam si vomendo fuerit reiectum, gula, aut ventriculi, si tussiendo gutturis, seu asperæ arteriæ, si screando, faucium, si per sedem alicuius intestinorum, si per mulieris pudenda, vteri affectum portendit. Intelligere nec minus opus est ipsius partis societatem, quam cum proximis habet, quæ etiam in positionis vocabulo comprehenditur. Conducit namque & hæc non nihil ad affectorum locorum inuentionem: constat insuper, quod singuli dolores pro positus varietate, affectum locum ostendere possunt. Quippe apparentibus per vomitum vlcis notis, vt diximus, animaduertendum erit, vtrum anteriores partes circa hypochondria, aut posteriores circa dorsum, dolor infestet. Etenim, qui in anterioribus percipitur, ventriculum, qui verò in posterioribus, gulam affectum occupare censendum est. Sic si in dextra hypochondriorum parte dolor addit, iecur, si in sinistra, lienem affectum esse indicat. Atqui ex diuersa doloris specie, licebit quoque affectam partem comprehendere, prout Galeno placuit secundo de Locis affectis. Nam pulsatorius dolor non nisi affectis arteriis per inflammatorios affectus prouenire potest: modo pars ipsa, in qua arteriæ consistunt sentire nata sit. Quo fit, vt neque in peripneumonia, neque in laterali morbo pulsatorius dolor prouenire possit, pulmo namque sensum non habet, quoniam nullus per totum corpus eius dispersus est nervus: similiter neque in hepate, aut renibus, propter similem causam, talis apparet pulsatio. Membrana vero costas succingens, cuius affectus lateralis morbus est, arteriis minimè participat, vt pote quæ per inter costalia vocata spacia extendantur

Ex positu.

Ex specie
doloris.
Cap. 2. &
sequenti lib.

& ad eam haudquaquam attingant. Qua de re nec ipsa taliter affecta, pullatorius sentitur dolor. Punctorius tamen dolor membranas affectas esse indicat. Nam ad eas proprie pertinet hæc doloris species, vt patet secundo de Locis affectis. & libro de Constitutione artis medicæ. At grauis dolor in renem, & iecinoris inflammatione nõ ab re sentitur. Nam vtrorumque horum viscerum, velut etiam pulmonis adiacens membrana sensu potitur, per quam neruus dispergitur, & propterea cum tumore, qui in aliquo prædictorum viscerum continetur, membrana ipsa distenditur, talis speciei dolor sentitur, qui grauis dicitur. Proinde Hippocr. primus omnium sexto de Morbis vulgaribus scripsit: In renem dolor grauis: & post eum optimorum medicorum non pauci. Neque ipsorum dolorum vehementia, seu magnitudo, remissio, seu mediocritas spernenda erit, pro affectarum partium notitia. Sæpenumero enim affectum locum coincidunt, si Galeno credendum sit, commento Aphorismi quinti sexti libri. Quo loco Hippocr. scriptum reliquit, Dolores qui fiunt in lateribus, & pectoribus, atque aliis partibus, si multum differant, perdiscendum. Innotescit insuper affectus locus ex propriis quibusdam symptomatibus ipsarum partium affectarum. Nam ore ventriculi affecto, fastidium infestat. Propter hepatis imbecillitatem excrementa, quæ per aluum deiciuntur, aquæ, in qua carnes nuper mactatæ ablutæ, simulantur. Maxillæ item rubræ apparent in peripneumoniciis. Ex his igitur omnibus, vel si cuncta ea haberi non possunt, ex ipsorum nonnullis, vel quibusdam, pars ipsa affecta comprehenditur. Quamuis nec totius corporis dispositio, natura, seu consuetudo despicienda sit, veluti nec ea, quæ præcessit victus ratio, omittenda erit: vt quiuis affectus locus facile patefiat. Qua habita notitia, num ipsa proprie, seu primò, aut per consensum afficiatur, perquirendum erit. Quod quidem non ex his quæ diximus, sed ex aliis deprehenditur. Voco autem partem proprie affectam, cum in ea permanens sit dispositio: Quem affectum Græci Idiopathian nominant. A nulla enim parte tunc afficitur, sed in seipsa continet permanentem dispositionem. Veluti ex aduerso dicimus per consensum aliquam partem affici, cum ab alia, vel cum alia afficitur, adhuc permanentem dispositionem non continens, licet ea ab affectu nõ sit penitus libera. Hanc partis affectionem Sympathian Græci appellant. Primarium autem partis affectum, qui secundario, seu posteriori opponitur, Græci Propathian dicunt. Sæpenumero autem contingit, vt pars aliqua per consensum afficiatur, & propria affectione laboret, cum in ipsa permanens fiat dispositio: quam nõ primario affectam, sed secundario, & proprie ipsam tunc affici dicimus, Galeni auctoritate primo, de Locis affectis. At quicquid sit, propria pars affecta dignoscenda erit, ac exactè distinguenda ab ea, quæ per consensum, & secundario afficitur. Nam huiusmodi speculatio, vt Gal. testatur secundo de Locis affectis in fine, non parum ad curationem conducit, cum ad curandi rationem non sine manifesta vtilitate imprimis pertineat, cuiusmodi sint remedia adaptanda, cognouisse: quæ non, nisi ei, quæ proprio, seu primario affectu laborat, proponenda sunt. Namque ea curata, nullus relinquitur in ea, quæ per consensum, & secundario affici-

tur præter naturam affectus, quoad in ea aliqua permanens fiat dispositio. Cum ergo permanere in quapiam parte aliquis affectus conspiciatur, tunc dicimus ipsam proprie esse affectam, velut primario, seu primogenio affectu laborare affirmamus; cum à nulla alia prius affecta parte, affectione participet, sed ipsa primò affecta sit. Secundario autem affici partem dicimus, cum alia ante eam prius afficiatur à qua demum, seu cum qua afficiatur & ipsa, velut per consensum quoque afficerimus partem affici, quando cum alia, vel ab alia sic afficitur, vt vna irritata, altera vehementius molesteretur: remissa verò irritatione, quiescat. Hæc siquidem coniectura communis est in omnibus affectis partibus, prout Galen. secundo de Locis affectis decretum reliquit. Quamquam in quibusdam propria sumantur indicia, velut de cerebro ipsemet eodem loco dicebat. Num verò eadem pars, vt similis, aut vt instrumentalis afficiatur, ex cognitione affectus, ac qualitatis eius dependet. Quare tempus erit, vt ad ipsius affectus notitiam accedamus; ac qua via quibusve indiciis is dignosci debeat, ostendamus; cum non solum an aliqua afficiatur pars, vt ventriculus, vel iecur, aut alia huiusmodi, à medico considerandum sit, verum etiam quis affectus vrgeat, atque distinguere, quænam notæ affectibus propriæ sint, & quænam partibus affectis, iuxta Galeni sententiam primo de Locis affectis, cap. 5. quamvis pauca: admodum sint ipsorum affectuum notæ, quæ non similiter affectum locum ostendant. Vt verò hunc pariter via quadam, ac ratione inuestigemus, primum sanè definiendum esse censeo; cum tria sint in vniuersum rerum præter naturam genera, ex quonam eorum sperari possit, vt comparetur iudicium dignoscendi prædictos præter naturam, affectus, seu morbos. At quoniam omnium symptomatum causa est ea corporis dispositio, quæ morbus, vel affectus nominatur, nihil enim refert, siue morbum, siue affectum pro nunc eam quis nominet, iure ex symptomatibus ipsis morbi cognoscuntur, vt que ipsorum sint effectus, ac ipsi morbi, seu affectus, ad ea symptomata causa rationem habeant, vt patet lib. de Differentiis symptomatum, & lib. de Constitut. artis medicæ. Ex his denique symptomatis affectuum, siue morborum notitia inuestigabitur primò haud aliter, quàm de partis affectu inuentione differuimus. Nam quod species morbi ex propriis symptomatibus dignoscatur, tertio de Crisibus Galen. testatur. Cum verò eorum symptomatum genus in tres dirimatur differentias, actionum videlicet offensam affectus corporis, & excernendorum immoderationes; ex his omnibus sumi notæ possunt pro affectus, seu morbi notitia comparanda. Licet nonnulla eorum ex necessitate eos consequantur, quæ symptomata pathognomonica, hoc est passionis significatiua appellantur: siquidem certa sunt morborum indicia, & vnà cum morbo inuadunt: eiusque, vt ita dixerim, essentiam constituunt, vt patet libro de Constitutione artis medicæ, & tertio de Morbis vulgaribus. Quædam verò symptomata, non ex necessitate, sed vel sæpius, vel raro, vel ancipiti opinione morborum consequuntur: quæ morbi aut differentiam, aut moritem, aut magnitudinem indicant: & hæc quandoque simul inuadunt, aliquando superueniunt nonnunquam

2. de locis
affect. cap.
5.
Lib. de Co-
stitut. art.
med. cap. 15

Comment.
4

Ex sympto-
matu pro-
prietate.

Ex his, quæ
præcesserunt,
ac consensum
tantum.
Nunquid
proprie, &
primò, aut
per consen-
sum, & se-
cundario
pars affici-
tur.

cap. 3

cap. 7

cap. 8

nunquam verò nullo pacto veniunt. Neque enim sunt à morbo inseparabilia, velut pathognomonica appellata: nec eius veluti substantiam constituunt: appellantur autem assidentia. Quapropter siue hanc præter naturam dispositionem, morbum appellaueris, cum videlicet ea permanens sit, siue affectum, cum videlicet motus alterationis sit permanens, ipsam dignoscere, præsertim si abditis partibus consistat, ex dicendis tentandum est. Neque enim cuiusvis est morbosam singularum, tum simplicium, tum instrumentalium partium dispositionem reperire: cum in profundo sint abditæ, Galeno teste, libro de Constitutione artis medicæ, cap. 15. Quæ de re speculationem quandam inuenire oportet, quæ dispositione dignoscamus vniuersas; præsertim eas, quæ circa partes intimas conditæ fuerint. Proinde Galenus primo de Locis affectis, cap. quinto, ratione quadam, ac via docuit eas dignoscere. Primo quidem ex excrementis; ut si viciis sit, excrementis, ex fabulosa quoque vrina lapidem deprehendimus. Excrementa verò seminibus cucurbitæ similia, latorum vermiu indicia sunt. Denique ex diuersa excrementorum specie interni affectus deprehenduntur: nec minus ex doloris proprietate: quamvis singulorum dolorum species nemo conscribere possit, nisi ipse met passus fuerit, sitque medicus, qui interpretandi facultatem habeat, & qui prudenter, & sine mollicie comprehendere suos affectus possit, dum laborat, ut Galen. testatur secundo de Locis affectis. Potest tamen affectus aliquis ex ipsa doloris proprietate dignosci. Inflammatorii namque affectus ex pulsatorio dolore deprehenduntur. Quamuis non singulis hæc doloris species eueniat: est tamen eorum propria. Ab accidentium quoque proprietate affectuum, siue morborum indicia oriuntur. Nam quibusdam, ut Galen. placuit, per tabificos morbos, vngues adunci euadunt. Intempestiuus horror cum febre inflammationis ad suppurationem transiens, indicium est. Lingua nigricans ardentem febrem portendit. Ab ipsorum quoque locorum affectorum natura, morborum indicia sumuntur, eo quod quibusdam solis partibus quidam morbus accidat, quibusdam verò solis nunquam eueniat. Nanque soli oculi suffusione laborant. Lapis in renibus, & in vesica duntaxat nascitur, atque etiam, ut nonnullis placet, in colo Lumbrici in intestinis gignuntur. Rursus impossibile est, ut ab eodem cor sustineat, quemadmodum nec pulmo, neque syndesmi dolorem. Caterum pauca admodum sunt, ut diximus ipsorum affectuum notæ, quæ non simul locum affectum ostendant. Etenim, ut actionum noxæ affectum duntaxat particulam, ita earum differentie ipsius affectum declarant; quæ solè ipsorum affectuum sunt propria signa: per accidens tamen ipsos sequuntur. Variantur namque noxarum differentie pro affectus tum specie, tum magnitudine, ut patet secundo de Locis affectis. Cuius autem, & quæ præcesserunt, perpendenda sunt. Nam & ea non parum conferunt pro partis cum affectu, tum ipsius affectus cognitione, ut liquet primo de Locis affectis. Qualis ergo præcesserit victus ratio, quæ consuetudo, ætas, anni tempus, regio, aeris constitutio, seu calis status, ac reliqua consideranda sunt, totius corporis dispositione non neglecta, ut valeamus quoad artificiosa coniectura permiscuit, distinguere, quis affectus vrgeat, cum ali-

qua pars non abdita affecta fuerit; quamuis quidam eorum scientifica notitia deprehendi possint, ut patet tertio de Locis affectis, cap. 3. Separandique ac discernendi sunt, ut diximus, qui nam affectus fiant in partium propria essentia, & qui ipsis veluti instrumentis accidant, ac qui facti iam sint affectus, seu morbi, & qui adhuc fiant, seu nondum pertinaciter inhæreant, quorum singula ex qualitatis affectus notitia promptè elucescunt. Interim ipsius morbi vis, seu magnitudo, ac mos ignoscari non debent. Nam cum triplici genere morbus quilibet grandis, seu magnus sit, aut propter præcellentiam partis, aut propter affectus magnitudinem, vel propter ipsius malignitatem, Galen. teste quarto Metho. cap. 6. quorum omnium primam indicationem inuenit Hippocr. propter ea medicus nec ea spernere debet; verum cognitio affectu, hæc singula de eo perpendat; ipsam siquidem affectus magnitudinem ex dispositionis magnitudine, ac ipsam frequentium propriorum symptomatum. Quod si magnus propter præcellentiam partis fuerit morbus, ex præstantia, partisque affectæ natura dignoscet. Morem verò, seu cacoethiam, cum ex eorundem morborum differentia, tum ex symptomatibus, quæ ipsam consequuntur, seu superueniunt. Iis denique cognitio distinguere oportet eos, qui per consensum fiunt, à propriis affectibus. Nam cum aliqua vitia propriis accidentibus exactè discernuntur, ac eadem fuerint perpetua, neque aliis præcedentibus superueniunt, tunc ea propria, ac primogenia appellamus. At cum propriis accidentibus discerni nequeunt, nec perpetuò permanent, & ad alias affectiones consequuntur, per consensum ipsa oriri dicimus: quod tribus modis fieri contingit, ut testatur Galen. primo, & tertio, de Locis affectis. Nam aut ex primo affectu humor quidam, vel vapor eleuatur ad aliam quampiam partem deueniens, in qua demum quipiam generatur præter naturam affectus, ut similia suffusioni symptomata, vel capitis dolor humoribus in ventriculo contentis, ad oculos, vel caput ex eis vaporibus delatis. Aut propter defectum materiæ, quam ab aliis partibus præparatam suscipere aliqua pars consuevit. Per consensum quoque affectus gignitur, si ea priuatur, ut vox vitata, cum flatus, seu efflatio, materia vocis existens, deperditur. Vel prohibita facultate aliqua: quæ ad quasdam partes descendit, cum naturaliter operantur, propter aliquem affectum primarium illius partis, à qua facultas transmittitur: velut accidit crura resolui propter spinas medullæ inflammationem; & manus digitos sensum amittere, ea parte spinæ prius affecta, quæ est circa dorsi initium. Læditur namque vocalium instrumentorum, crurum, ac digitorum officium, quamuis ad ea quicquam præter naturam non perueniat; sed quoniam carent eo, quod secundum naturam ad ipsa peruenire debet. Cutur namque efflatum spiritum non recipit: nec vis sentiendi digitis, aut mouendi cruribus impartitur, atque influit, & propterea eas partes affectas esse dicimus, per consensum tamen. Nam quoties alicui deest illud, sine quo secundum naturam munere suo fungi non valet, ipsum iure affectum esse putandum est, Galen. teste tertio, de Locis affectis. cap. primo. Tot igitur modis per consensum pars aliqua affici potest. Fieri autem hæc consortia

Trifariam
affectus
redduntur
magni.

Modus
dignoscendi
eos.

Quibus
distinguantur
affectus per
essentiam
ab his, qui
per consensum
fiunt.

1. de loc. aff.
sect. cap. 6.
3. de locis
affect. cap. 1.
Affectus
per consensum
quot
modis fiat.

1. de loc. aff.
sect. cap. 6.
3. de locis
affect. cap. 1.
Affectus
per consensum
quot
modis fiat.

1. de loc. aff.
sect. cap. 6.
3. de locis
affect. cap. 1.
Affectus
per consensum
quot
modis fiat.

1. de loc. aff.
sect. cap. 6.
3. de locis
affect. cap. 1.
Affectus
per consensum
quot
modis fiat.

tribus modis; aut propter viciniam, aut propter familiaritatem, vel generis, vel operis; liquet 3. de Morbis vulgaribus comment. primo, ac confirmatur 2. de ratione victus, & primo de Causis symptomatum, ab eodem Galeno. His prædictis indicibus, qui proprii affectus dicuntur; ab his, qui per consensum excitantur, separandi, ac discernendi sunt. Vbi verò connexi duo, trësve, aut plures fuerint morbi, haud aliter dignoscendi erunt, quàm ex incrementis, locorum natura, proprietate doloris, ac propriis symptomatis, diuersis siquidem existentibus pro complicatorum morborum numero, ac natura. Quibus ritè perceptis ad ipsius affectus, ac affectarum partium causæ cognitionem deveniendum erit. Eo indemonstrabili axiomate ductus, quòd nihil videlicet absque causa fiat, præsertim si is quoque nunc fiat. Deinde inuestigandum erit, num causa, quæ affectum efficit, in ipsa affecta parte contineatur, vel per ipsam transeat. Est namque causa vnum genus eorum, quæ præter naturam sunt; quæ dispositio quidem est præter naturam, velut morbus actiones lædens, licet non primo, sed secundario. Neque enim ipsam per se, sed morbo interueniente actionem lædit; vt patet lib. de differentiis symptomatum, quo solo à morbo distat. Dixi autem causam inuestigandam esse, præsertim si affectus nunc quoque fiat, non ab re. Nam hanc propriè causam in confesso est apud omnes Medicos appellari. Id enim quo tangente afficimur, & quo separato quiescit affectus, causam esse apud omnes homines in confesso est, dicebat Galen. primo de locis affectis. Sic enim ignem vtilationis, & gladium sectionis causam esse credimus. Quamquam consueverunt Græci causam etiam quodammodo appellare, si nondum quicquam agat, sed eo solum, quod possit agere, velut incoctio, auditor, & causa morborum dicitur, quamuis morbum nondum afferat, quemadmodum lib. de constitutione artis medicæ Galen. scriptum reliquit; nec minus, & id quod egit, desit verò agere, causam nominant, vt idem testatur libro de differentiis symptomatum. Quicunque igitur affectus præter naturam morbos præcedunt, causæ rationem obtinent, ac morbificæ causæ nominantur, ex Gal. sententia eodem lib. de differentiis symptomatum, & secundo methodi. Quas morbificas causas in duplici esse differentia, primo methodi medendi his verbis ostendit. Quantum verò ab his genus statuito, quod sit morbificarum, seu insalubrium causarum. Atque harum, quæ in ipso animalis corpore consistunt, internas nominant. Quæ extrinsecus, externas; nisi maius, vt nunc vulgus Medicorum consuevit, illas antecedentes, has primarias vocare. Illud idem confirmavit libro de morborum causis, dum dixit, Redeamus igitur ad id, quod propositum nobis erat, Nempe, vt singulorum simplicium morborum causas explicemus, tum præcedentes, tum primitivas. Neque enim fuerit absurdum dilucidioris doctrinæ gratia, eas huiusmodi nominibus distinguere, eas siquidem quæ in animali ipso consistunt, siue affectus sint, siue motiones præter naturam, causas nominant morbos præcedentes. Quæ verò extrinsecus adueniunt, si vehementer alterant, immutantque corpus, eas primitivas appellant. Ex quibus Galen. verbis luce clariùs liquet, eum non nisi duplex statuisse insalubrium, seu morbificarum causarum ge-

nus, nec præter eas dinumerasse, quas Arabes, & Medicorum vulgus, coniunctas, seu continentes appellant. Et si interdum de eis meminert non ex propria sententia, sed Stoicorum more loquutus fuit, vt idemmet in lib. aduersus Iulianum faceret, quamquam nec easdem inter causas posuerit: nisi reponantur in numero eorum, quæ essentiam habent in fieri, quemadmodum aliæ causæ. Neque enim ex iis sunt, quæ absolute esse dicantur: quamquam earundem affectus, seu habitus ex permanentium, constantiumque numero sunt; vt liquet 2. meth. meden. ubi internæ fuerint præsertim. Nam tunc verè aliquā esse causam alicuius dicimus, cum agit, vt prædictum est. Quæ ratione si in numero eorum, quæ in generatione essentiam habent, numeretur continens causa, ab antecedente non discrepabit. At si aliquo quodam modo ea sumatur, vt pote quod habeat esse permanens, & absolute, penitus à Galeni sententia secludenda erit, qui morbum dispositionem esse præter naturam retulit: qui per se primò functionem lædit: quare coincidet cū morbo. Siue ergo externa, siue interna causa aliqua cuiusvis morbi fuerit, via quadam, ac methodo ea inuestiganda erit, parte affecta ipsoque affectu, seu morbo prius cognitis, tam si adhuc agat, quæ verè causa appellatur, quam si egit, desit vero agere, velut externa: quamquam hæc tantum pro affectus cognitione, qui actionem vitiat, cum videlicet rationem, & sensum lateat, inquirenda sit, vt quarto methodi medendi liquet, non enim solum affectum locum, verum etiam causam illi noxam inferentem considerandam esse decreuit Galen, secundo de locis affectis. Quæ si adhuc agat, ab ipsius affectus, seu morbi specie, ac symptomatibus, eorumque diuersitate dignoscitur, non modo quæ causa sit, verum etiam verum ea, quæ affectum efficit, in parte contineatur tanquam in propria essentia, vel tanquam in instrumento, aut per ipsam pertranseat, ex symptomatum inquam differentia, vt ex diuersa noxa diuersarum functionum, excrementorum varietate, ac corporis diuersis affectibus, colore præsertim, seu saporibus, ex morbi specie. Nam hæc præcipuè causam indicat, vt si tertiana fuerit, bilis; si quotidiana, pituita; si quartana, atram bilem causam esse indicat; aut si erysipelas, bilis; si edema, pituita; si scirrhus, melancholiam. Quòd si morbus similis fuerit, & ipsa causa tanquam in propria essentia partis continebitur; si verò in compositione morbus erit, permanebit potissimum, & causa in parte affecta, tanquam in instrumento. At si permanens non fuerit affectus; nec ipsa causa in parte continebitur, sed per ipsam veluti transibit partem, velut nec ipse affectus permanens, seu constans erit. Hunc affectum Archigenes vnam affectus appellare consuevit. Totius quoque corporis dispositio, temperamentum, seu ægrotantis natura, ætas, regio, tempus anni, victus ratio, consuetudo, & vt vno verbo perstringam, cuncta, quæ præcesserunt, causam interim morborum opificem ostendunt. Nam præteritorum cognitio nihil aliud est, vt Gal. inquit, quarto de prælag. expul. quam inuentio causarum, quæ affectus inducunt. At cum his addenda erit, cum ciborum, potionumque, tum medicamentorum quotidiana experientia, vt exquisitè, cum morbos, tum eorum opifices causas inuenire valeas. Quæ experientia

cap. 4 vsus Galen. in quibusdam coli dolore, laborantibus, eos sanauit, vt testatur primo de locis affectis. Haud dissimili ratione ea morbi causa inuestiganda erit, quæ, licet egit, desijt tamen agere. Nanque ex ipsa affectus specie, natura ægrotantis, ætate, tempore anni, regione, aeris constitutione, præcedenti victus ratione, & aliis prædictis, inuestiganda erit. Sed præsertim inquirere oportet, qui præcelsus in animantis corpore affectus, vt dignoscas euidentes causas extrinsecus aduenientes, quas procatacticas appellant. Quare, vt summam dicam, intueri oportet cuncta, tam præsentia quam præterita symptomata; præsentia quidem ex se ipso Medicus inspicere debet, præterita vero non à laborante solum, sed ab ipsius familiaribus interrogando perdiscere; quò promptius, non modò locus affectus, ac morbus ipse, sed morbitica quoque causa, quæcunque ea sit, comprehendatur. Quamuis præteritorum cognitio magis necessaria fuerit pro causarum, quæ affectus inducunt, inuentione: velut præsentium, affectuum, pro & partium affectarum inuentione: vt patet eodem quarto de præfagitione ex pulsibus. Quibus iam cognitis finem imponet Medicus ei artis medicæ parti, quam dignoscitiuam appellant, quæ reliquas duas, prognosticam scilicet, & correctiuam meritò præcedere debet. Nanque ex ea, & hæc oriuntur; vt nec prædici quicquam, aut corrigi valeat, nisi prius singula, quæ diximus, Medicus optimè distinguat, ac primo cognoscat. Mox ad prognosticam accedere debet, cum venientium præfagia, seu futurorum prognostica ex præsentibus sumantur, inuento scilicet affectu, ac parte affecta, qui præsentis sunt, cognitisque eorum causis, ex eisdem nanque iis, quoniam terminatur morbus sit, præcognoscimus, & vsus dexter suppetit nobis adiutorum Galen. auctoritate libro de Constitutione artis medicæ. Medicus namque futura præfagiendo, ac prædicendo, triplicem comparat vnum, res artis Hippo. ac Gale. testibus primo prognosticorum. Na cum fieri nò possit, vt omnes ad sanitatem ægri perducantur, mortis culpa eum vacare ostendetur, si futura prædixerit; obtemperantesque ægrotos reddit, cum propensius ipsi pereant; & de longinquo ipsi morbo obuiam it, multò ante remediorum tempus, oportunum edocens. Quapropter hæc pars artis spernenda non erit, quæ in dignoscendis euentis, quæ in morbis expectantur, consistit. Quorum vnum ac primum quidem est, quò erumpet morbus ad exitium ne, an ad salutem præcognoscere. Alterum ab hoc, quo potissimum tempore illud accidat. Tercium autem, quoniam erit modus mortis, aut salutis; quæ omnia ex affectibus præfagiuntur, ex quibus morbi genus, & facultatis imbecillitas, vel robur dignoscitur. Hæc namque si inter se conferantur, futura præfagiuntur, vt quarto de Præfagitione ex pulsibus. tertio de crisi, primo de arte curatiua ad Glauconem, & libro de constitutione artis medicæ testatur Galenus. At cum non omnia, quæ sunt circa ægrotantem origina, necessariam generatione obtineant; eorum, quæ non habent necessariam generationem: neque erit firma prædictio, cum de eis certam non possit Medicus habere præcognitionem; vt si propter vicinorum tumultum, canes latrantes, aut inuicundos quosdam nuncios infomnis redda-

tur æger, nullo horum morborum ratione effecto, quinimò nec eorum omnium, quæ morbi ratione efficiuntur, certam præcognitionem habere poterit. Nam si superfluis intra corpus humor aliquis in partem quampiam principem repente influat, aut ab ea in viliorem transeat, quò fit, vt eum, qui in princeps membrum ilatus est, summum periculum; eum vero, qui non in primariam, sed in viliorem partem transigrauit, subita, ac inexpectata salus laborantis necessario sequatur; in his itatibus, quò terminatur sit morbus, non exactè comperit Medicus; sed tantum prænosce in his licebit instantiam, ac lubricitatem. At si permanentiam habuerit morbus, in quo non amplius disfluunt excrementa, sed in locum vnum quendam grassata, illum occuparunt, præfagiri in his futurum potest, si videlicet rectè omnia circa ægrotum gerantur. Na quæ perperè à quopiam aguntur, ex causæ existunt, vt aut morbi solutio prorogetur, aut mors anteuerat. Propterea meminisse semper oportet, vt Galenus tradit libro de Constitutione artis medicæ, cap. decimo octauo. sola optimi Medici præfagia, curante quidem ipso, euenire, ægrotò autem nihil delinquente. In hoc igitur morbi genere, cum virtutis imbecillitate, vel robore collato, futura præfagiri possunt; cum summa totius præfagitionis in morituris, conualiturisque sit, quoties vis ægrotationis cum ægri facultate conferatur, Galeno teste secundo prognosticorum. Cognita namque morbi specie ex propriis symptomatibus, vt ostendimus, ac eius magnitudine, ex quantitate eorumdem symptomatum, aut partis affectæ præstantia, cognitaque benignitate, vel malitia, seu, vt ita dixerim, more, quem dignoscis ex ipsius morbi differentia, ac superuenientibus symptomatis, quod quidem maxime inspiciendum esse iussit Galen. tercio de crisi, cap. quarto; adiuncta consideratione temporis anni, naturæ, regionis, & similibus, nunquid æger seruabitur, aut morietur, inuenies; potissimum tamen si hæc tria respicias, speciem videlicet, morem, ac morbi magnitudinem, partis affectæ notitia non posthabita, si qua est, quæ præcipue afficiatur: post quæ virium robur, vel imbecillitatem, cum ex earum propriis actionibus, tum ex commodo temperamento, vel intemperie partium, ex quibus vires proueniunt, dignoscere oportet, tam eius, quæ ex corde prodit, quam quæ ex hepate oritur, quam etiam quæ ex cerebro originem ducit. Quamuis naturæ robur præcipue ex pulsuum actionibus agnoscatur, vt patet libro de constitutione artis medicæ, & libro de curand. rat. per venæ sectionem. Tamen per quam potissimum facultatem ægro periculum imminet, Medicus perpendere debet ipsius facultatis indicia bona, vel mala inspiciens, velut Galeno placuit tercio prognosticorum. Nanque veluti oblectatoribus quibusdā, semper duobus his Medicus attentus esse debet, nempe morbo, & naturæ, seu viribus: & proinde sanitatē, vel mortem non ex aliis meditationibus præsentiet, quæ ex morbi, & naturæ robore exactè cognito, ad hæc inquam duo capita cuncta rediguntur, eodem Galeno auctore lib. primo de arte curatiua ad Glauconem, & lib. de constitutione artis medicæ. Quibus ignoratis minimè poterit exactè prænosce, ac prædicere. Deinde, & futuri status præcognitionem per-

In quibus morbis præfagiri futurum possit.

Que regiuntur, ut præfagia eueniant.

Vires ex quibus dignoscantur.

De const. art. medic. cap. 18. De cur. rat. per sangui. miss. ca. 14. com. 37.

1. ad Glau. cap. 8. De const. art. medic. cap. 18.

Primum
quod in
morbo pra-
sagiri de-
bet.

cap. 5

tex. 39
Secundum.

com. 2
tex. 44. &
45

discere studendum est; potissimum si crisi terminaturus morbus sit. Neque hoc difficillimum fuerit, cognita morbi specie, ac magnitudine. Horum denique cognitione habita, exacte quicquid de aegrotante futurum sit, inuestigare contingit, nūquid seruiabitur, vel peribit. Nam utrum aliquis portando oneri sufficiat, sciri minimè poterit, hominis robore, oneris magnitudine, & itineris longitudine antea non perspectis. Aegri namque vires portanti onus, morbus verò oneri, tempus autem, quod visque ad statum extenditur, itineris longitudini respondet, prout Galen. tertio de crisi bus asseruit. Euadendum ergo, vel pereundem homini esse ex horum duorum altero robustiore cognito, morbo videlicet, vel natura, seu viribus praedictio facienda erit. Nam si vires adeo validae fuerint, ut possint morbum superare, necesse est aegrotum euadere. Si verò contrà, omnino morietur. Vires tamen nec omnium indiciorum exactè interfingere oportet, inter se comparando, non probè dignoscere, & indicia certa, ac alia signa. Sunt namque ea certa indicia, quae indicant vires corpus gubernantes, quo pacto robore valeant, vel deficient. Haec namque perpetuò si mala sunt, malum; bona verò, bonum denuntiant, ut patet tertio prognosticorum. Ex eisdem quoque & terminis utriusque inueniet Medicus. Quod tanquam secundum euentum in morbis expectandum praedignoscendum esse dicebamus, morbi videlicet, ac naturae robore exactè cognito. Nam eo tempore aegri euadent, cum morbum semel superatura est natura. Morientur verò tunc temporis, cum facultatem morbus adeo prosterneat, ut functio aliqua ad vitam necessaria, pereat. In propinquo autem morbi solutio erit, cum bene valuerit facultas, ac morbo fuerit valentior; is vero imbecillis: quod si ea fuerit imbecilla, morbus vero validior, mors maturabit. Praescriptionis autem tempus indicat magnitudo excessus. At quantum alter alterum superet coctionibus, ac incoctionibus, hoc verè ex propriis excrementis percipies. Quae quidem in vasis continentur, per vrinas; quae in toto corpore, per sudores; quae in thorace, & pulmone, per ea quae extus iunguntur; quae in ventriculo, & intestinis, per alui excrementa; quae in vesica, & renibus, per ea quae in vrinis deferuntur; quae in superiori ventre, ac stomacho, per ea quae vomuntur; quae vero per palatum, nares, vel aures excernuntur, quomodo cerebrum robore affectum sit, declarabunt. Ita & de reliquis iudicandum excrementis. Nam commune in omnibus est, non prius dissolui morbum posse, quam aliquod in exeuntibus excrementis coctionis iudicium apparuerit. Coctiones namque omnes crasium celeritatem, securitatemque salubrem portendunt. Cruda autem, & incocta, & quae in malos conuertuntur abscessus, infectas iudicationes, vel labores, vel tempora, vel eorundem recidivas, aut mortem significant, auctore Hippocrate. primo de morbis vulgaribus. Praefinitum ergo tempus, quo vel per eundem, vel euadendum sit homini, ex eo intelligas, quanto videlicet alter altero valentior sit. Id vero coctionibus, & incoctionibus propriorum excrementorum percipitur. Namque, ut dicebat Galen. primo de crisi bus, cap. decimono, summopere necessarium est, exquisitè scire dignoscere, quantum inuicem superant, & superantur, & coctionis, & cruditatis signa. Habent enim

utraque non paruum inter se differentiam. Nam possunt, & integrè crudelitatis signa, & debilis, mediocriter, aut parua satis apparere: velut & coctio debilis, seu obscura, aut manifesta, vel perfecta, & integra. Haec igitur vniuersa in primis etiam morbi diebus, quos primus praefinit quaternarius, praefertim si acutus sit, exactè dignoscenda sunt, pro notitia temporis, quo potissimum salus, aut aegri exitium expectetur. Namque visus praedictionis est agnoscere diem, quo morbus iudicandus est, Galeno auctore tertio prognosticorum. Verum cum nec scribit, neque sermone edoceri omnino singulorum quantitas possit, ut patet primo de arte curatiua ad Glauconem. cap. octauo, ex nulla tamen re possumus adeò ad exquisitam eius peruenire notitiam, quantum ex crebra exercitatione circa quantitatis coniecturam. Neque enim bene praenoscere valebimus, nisi horum singulorum magnitudinem diligenter pensitemus, eiusdem morbi motu, nunquid videlicet acute, aut tarde moueatur, non neglecto. Modus autem salutis, aut mortis ex eisdem fere patebit. Nam cognita morbi specie, ac motu, naturaeque inclinatione (cum necessario, ut animal pereat, aliquam facultatem, pro vita necessariam aboleri oporteat) cum ea aboletur, vel ipsam suffocans morbus, vel prosterneat, vel partim proportionem suffocans, & prosterneat, eandem auferet. Id vero ex morbi natura, seu specie, ac loco affecto perdisces. Sunt namque morborum quidam, quorum natura est suffocare, ut thoracis, pulmonis, aut gutturis affectus, seu asperae arteriae, qui vitalem suffocant facultatem, & nonnulli etiam qui statim ipsum cor occupant, quemadmodum longi, seu vehementes dolores, stomachici affectus quidam, aut iocinoris affectus diuturni ipsum prosterneant, ac haec febres omnes, & ipsius corporis cordis (quoquo modo fuerit genita) ingens intemperies. Ex ingenti quoque cerebri intemperie animalis facultatis imbecillitates excitantur, ex impletionibus ventriculorum eius, & obstructionibus meatuum, qui in eos penetrant, suffocationes oriuntur eiusdem animalis facultatis. Pari ratione de alterice, seu naturali facultate sentiendum erit; etsi petre omnino animal non possit, nisi cor afficiatur: & propterea semper mors sequitur ad immodicas cordis intemperantias, ut quinto de locis affectis patet. Similiter si euasurus sit aeger, quis nam erit salutis modus, ex eisdemmet intelliges, potissimum naturae inclinatione, seu motu exactè perspecto, viribus ipsius bene valentibus, ac morbo valentioribus existentibus. Proinde merito cum Galeno iterum concludamus quarto de praesagitione ex pulsibus quod cui status facultatis perspectus ad vnguem sit, locusque affectus, & eius affectus, hic ad futura praesentienda est peritissimus. At si libuerit praecognoscere, nunquid crisi, vel non crisi terminandus sit morbus, ac ex quibus id praenoscere liceat, librum tertium de crisi bus consulas: ubi Galenus illud scriptum reliquit; nos vero hic breuitati indulgentes praetermissimus. Inuentis denique affecta parte, ipso affectu, & causa eorumque notitia selecto prognostico, reliquum erit, si curari affectus valeat, ad eius curationis modum accedere. Etenim medicinam esse inquit Hippocrates. libro de arte, morbos ab aegris in totum tollere, & morborum vehementes impetus obtundere, & eorum qui à morbis victi sunt, curationem

*Prosumitur.
Prima in-
dicatio.*

*cap. 11
Secunda in-
dicatio.*

*Tertia in-
dicatio.*

*Quarta in-
dicatio.*

*2. ad Glau.
cap. 2
5. meth. c. 11
13. meth.
cap. 15*

*Quinta in-
dicatio.*

rationem non aggredi. Quorum itaque curatio-
nem aggredieris, communissimum eiusdem Hip-
pocrati axioma, libro de flatibus praefertim, ac non-
nullis aliis in locis conscriptum, perpetuo pra-
o culis habeto: Quod omnia videlicet, quae praeter
naturam sunt, ab iis, quae ipsis sunt contraria, cu-
rentur. Verum cum eorum duplex sit prima dif-
ferentia, ut ex Galen. patet vndecimo methodi, a-
liis, per se subsistentibus, aliis vero in ipso fieri,
ut ita dicam, suam essentiam habentibus, non om-
nibus tamen ipsis ex usu est semper mederi, sed
iis quae verae per se subsistunt: ex his namque cura-
tionis indicio praestatur. Nam id quod curatio-
nem desiderat, aliud plane non est, quam affectus,
qui vitia actionem, ut Gale. placuit primo metho-
di medendi; & secundo eiusdem dicebat, non
functionis vitio, sed morbo ipsi, id est, affectui pra-
ter naturam, qui actioni incommodat, applicamus
remedia: & proinde necesse est remedium inue-
niendum initium ex morborum ipsorum natura
sumi, ut eidem Galen. visum est tertio methodi me-
dendi. Siquidem absurdum sit, ut ipse fateatur, aliud
esse, quod curandi rationem praescribat, aliud quod
curetur: indicare enim de se quicquam magis po-
test, quam de alio. Semper igitur comparandum
est remedium, quod affectui fit contrarium; ab ip-
soque affectu prima indicatio sumenda; ac illi de-
mum remedium indicatio, quae a laborantis na-
tura sumitur, addicienda ex Galen. sententia septi-
mo medendi. Namque minima est ea, quae ab ipso
sumitur affectu, & tantum initium, & ut sic dicam,
cancer, unde medendi ratio promouetur; cum is
merito morborum curator sit, cui facultas adest il-
la inueniendi: ex quibus perfici possit quod a pri-
ma indicatione suggeritur, ratione quadam, & metho-
do, si rationalis, & methodicus sit Medicus.
Nam si per experientiam inuenerit, observator,
& empiricus est nominandus. Vnum itaque est
in omnibus curationibus principium, tum & via,
quae ab eo principio ad finem usque ducit, in om-
nibus particularibus morbis similis est. Quare & si
in singulis morbis priuata quaedam methodus san-
nandi videatur, commune tamen in omnibus ge-
nus vnum est: auspicari etenim perpetuo oportet
ab indicatione, quae ab affectu, cui mederi para-
mus, accipitur, quemadmodum quarto methodi
Galen. scriptum reliquit: & demum examinare, ac
discernere, an causa, quae affectum excitauit, iam
desierit, an ipsum quoque nunc tum augeat, tum
faciat. Methodos propterea de medicamentis dis-
scas oportet, si consummate morbos sis sanaturus,
ac, ut quae particulatim sunt agenda, prompte in-
uenias, doctus tum ab eo, quod prima indicatio di-
cat, tum vero ab aegri partis natura, tum ambien-
tis temperie, ac aliis his cognatis, ut eodem quarto
methodi medendi liquet. Quanti vero momen-
ti sit ea, quae ab affectu partis praestatur indica-
tio, pro ipsorum morborum curatione, sexcentis in
locis Galen. testatus est ita ut in decimotertio metho-
di scriptum reliquerit, nihil obstar quo minus
medicinam non sex mensibus tantum, sed sex die-
bus totam addiscas, si quis eam, quae a partibus ipsis
praestatur, indicationem adimat. Atqui ex ipsa af-
fecta parte pro morborum curatione non vna tan-
tum indicatio sumitur, etenim ab ipsius tempera-
mento prima sumenda erit. Ipsa namque mensuram

praescribit adhibendorum medicamentorum pro
morborum abolitione, quando videlicet vberius,
& diutius, & quando minus, ac breui tempore, ca-
lida, vel frigida, humida, vel sicca medicamenta ad-
hibere debeant; cum eatenus redeat ad naturam
eorum quodque necesse est, quatenus a natura re-
cesserit: ac veluti quadam via retroferatur, quae in
diuersum agat ei, quae facta est in ipso, transmuta-
tioni: quamuis & ipsa etiam partium substantia si-
mul cum affectu, medicamenti genus common-
stret quoque, ut patet quinto methodi medendi:
velut modus vtendi ab ipsius forma, ac situ desu-
mitur. Secunda indicatio ab eius actione sumitur:
Nunquid videlicet cunctis animalis partibus utilis
sit, aut paucis quibusdam, aut sibi vni. Verum haec
in iis intemperiei generibus deseruit, quae ex hu-
moribus sunt orta. Nam audacter euacuare lice-
bit, si pars sibi soli inferuiat, prout affectus suade-
bit, virtuti tamen eius attendendo. At si opus par-
tis necessarium sit omnibus animalis particulis, ve-
luti ventriculi, & iocinoris, non leuis adhibenda
diligentia de robore virtutis est, ne hanc, magna
semel vsus euacuatione, dissoluas, quare cum cau-
tione euacuandum, ut ne quid virtutis officias. At
cum non par sit actionum dignitas, ad portionem
actionum dignitatis etiam cuiusque partis prospici-
endum est robori: & propterea intelligenda sunt
omnium particularum tum functiones, tum vsus,
ut supra retulimus, ex quorum intelligentia haud
difficulter inuenies, quatenus cuiusque robur cu-
stodiri oporteat. A figura etiam affectae partis indica-
tio ipsius modi euacuandi extremi suggeritur. Na-
venter vomitu, deiectioneque inanitur. Intestina
deiectione tantum, sicut iocinoris caua. Renes ve-
ro, & iocinoris gibba, vesica, si multo vitioso suc-
co sint referta, per deiectiones, & pharmaca deie-
ctoria expurgantur, si modico sint referta, per vi-
rinarios meatus. Cerebrum vero per palatum, na-
res, & aures. Pectus, & pulmo, per asperam arte-
riam, & fauces. A situ quoque affectae partis indi-
catio dabitur sane non leuis, cum ad solidarum par-
tium intemperiem tum, ad succorum vitium. Nam
qui per summa corporis intemperie laborant, iis
medicamenta, quae intemperies requirit, applica-
bimus. Quibus autem in profundo corpore intem-
peries est, in his rationem interualli habebimus,
vehementioribus vtentes medicamentis, quam in-
temperies requirat. Nam si eis vtaris, quae intempe-
ries requirit, multo imbecilliora quam vsus postu-
let ad locum peruenient. Ad euacuationes quoque
situs non nihil indicat, societate cum aliis particulis
laborantis partis docens, & propterea per quae, ac
quomodo euacuare oporteat, ipsa partis positio
praecipue demonstrat, ut liquet secundo de arte cu-
ratiua ad Glauconem, & quinto, ac decimotertio
methodi. Nec spernenda erit indicatio, quam sen-
sus partium acuitas, hebetudoque suppeditant, quan-
do omne medicamentum contemnunt, quae tardi-
sunt sensus, etiam si non leuiter rodant. At quae a-
cuti sunt sensus, eorum vires dolore resoluuntur.
Expedi igitur his non confertim, nec semel valen-
tioribus auxiliis mederi, sed tuto potius in tem-
pore. At ubi tardus est sensus, in is etiam celeriter
obire, quod iustum est, licet semel vtendo re-
medio, quod sit idoneum. Sumpta igitur ab ipso
morbo prima indicatione, ac praedictis omni-

Victus ratio.

com. 44

*Complicatio-
torum affe-
ctuum cu-
randi ra-
tio.
Primus mo-
dus compli-
cationis.
3 me th. c. 9
7 meth. c. 12*

*cap. 6
Secundus
mod.*

*cap. 9
Tertius
mod.*

bus de affecta parte optime perspectis; seu ipsarum nonnullis, quæ contraria sunt morbo, una, vel duabus qualitatibus, aut tota substantia pro eius abolitione, propinanda sunt, victus ratione primum instituta: quæ iterum ex ipsius morbi simulque affectæ partis notitia, præstatur. Etenim vniuersa morbo pugnare debet, quoad eius qualitatem spectat. Similis vero ætati, consuetudini, ac naturali temperamento instituitur, etsi veræ alimonie scopus vnus tantum sit communis prorsus cum sanis, tum languentibus, facultatis scilicet vitalis custodia, vt patet apud Galen. primo de ratione victus in morbis acutis. Nanque morbus, suæ affectionis indicat auxilia, venæ sectionem videlicet, clystima, cataplasma, oxymeli, aquam mulsam, atque aliorum vnumquodque. Virtutis vero custodia solam indicat alimoniam. Quanquam morbi affectionem in cibandis ægris, non tantum cibi indicatricem, sed tanquam prohibetricem contemplamur. Vbi igitur non prohibuerit morbus, facultasque præceperit, tunc nutrimus. Neque enim cibus morbi affectionem sua ratione inuadit, nisi vim etiam medicamenti obtineat, quæ contraria velut ipsa medicamenta, morbo esse debet, vt diximus. Ipsi vero quantitas metienda erit, prout magis, vel minus vires indigent, ac morbus ipse à cibo maiorem, vel minorem noxam suscipere paratus est, quod id est, ac si dixeris promptius, aut ægrius alimoniam prohibeat. Similis quoque ratio habenda erit in singulis aliis morbis, non ex intemperie tantum, sed ex quauis alia causa ortis, cum non alia ratione curentur, quam per contrariam victus rationem, ac medicamenta contraria parte ipsa affecta, ac eius indicationibus non neglectis, vt supra decretum est. At si non vnus tantum fuerit præter naturam affectus, sed duo, vel plures, primum existimare licebit, à quo maxime discrimen ægro impendere videatur, vt ab eo non leue periculum immineat. Nam affectus, à quo primum, maximeque impendit homini periculum, hic primus curari debet, vt patet tertio, & septimo methodi medendi. Quanquam interdum non primus modò, verum etiam solus. Ad id verò quod magis vrget, dirigi primum curantis consilium debet, non tamen alterius cura omnino posthabita, cum etiam aliquando omnibus pari studio auxiliemur, si æqualiter vrgeant. Vrgebit autem maxime affectus, vbi ipse magnus fuerit, aut ex eius propria essentia, seu magnitudine, vel quia cacoethes: aut propter affectæ partis præstantiam, quam occupat, vt diximus Galen. auctoritate quarto methodi medendi. Hac igitur via curari debent complicati affectus, vbi alter magis vrgeat. At si ita se habeant, vt vnus sanari nequeat, nisi prius alter curetur, ad id, quod ordo dicat, est respiciendum, eo scilicet primo curato, quo non curato, reliquus affectus curari non valet. Veluti si vlcus vnà cum phlegmone consistat, quamuis phlegmone ab vlcus cõsequatur, curari tamen non valet vlcus, nisi prius phlegmone curetur, prout scriptum reliquit Galen. tertio methodi medendi. At si vnus affectus causæ rationem obtineat, alter vero effectus animaduertendum erit quis nam eorum augere, aut gignere reliquum possit: quive rursus, vel signatur, vel incrementum ab eo suscipiat, illud pro comperto ha-

bens non posse ad perfectionem vllum affectum sanari, manente adhuc ipsa, vnde natus est, causa. Quanquam fieri aliquando potest, vt tanta sit morbi, qui se habet vt effectus, magnitudo, vt præsentem perniciem, nisi occurras, afferat: quo casu oportebit huic primò occurrere, deinde ad causam redire: vt à Galen. decimo methodi medendi decretum est, licet non amplius complicati tunc affectus à medico, vt causa, & effectus considerentur, sed vt vnus magis vrgeat, quam alter. Qua de re idem erit curationis modus, velut in prima affectuum complicatione diximus, qua ratione interim fit, vt quamuis symptoma nullum seorsum curationem exigit, vt pote cum affectu vnde nascitur, vnà cessans & proinde nullum symptoma, qua symptoma est, curationis rationem indicat, nec primam immutat: ex accidenti tamen symptomata quædam interdum curationem immutant, causæ scilicet locum eo tempore habentia, quando adeò aucta sint, vt lædant aut virtutem, aut affectionem: quò fit vt curandi ratione mutata, symptomata primum summouere cogamur. Quod iterum non, vt symptoma, sed tanquam magis vrgens affectus à Medico consideratur. Complicatur nanque non modò morbus cum morbo & symptoma cum symptomate, sed morbus cum symptomate, seu symptoma cum morbo interdum. Cum videlicet grauiora adeò sint symptomata, vt eis prospici maiore medendis sollicitudine debeat. Nam ea, quæ necessario morbis succedunt, tanquã affectus eorum, ceu prorsus non sint, relinquimus. Sunt etenim & morborum signa, & vnà cum effectu, vnde oriuntur, cessant, ipsum vmbra ritu comitantia, vt patet vndecimo methodi medendi. Cum igitur eo complicantur affectus, vt vnus causæ rationem obtineat, reliquus verò effectus, qui vel gignatur, vel incrementum ab eo accipiat (nam si genitus ab eo fuisset, nec amplius generaretur, aut incrementum susciperet, nulla sumeretur ab ipso curatiua indicatio, tanquam alterius causa, vt pote eo non amplius lædente) ab eo affectu prima sumenda erit indicatio: ac is primò curandus, à quo alter gignitur, aut incrementum suscipit, non alio inquam modo, quam, vt superius demonstrauimus, si morbus ille fuerit, ac ex se ipso functiones quædam primo offendant (subinde nanque morbus ex morbo nascitur, vt testis est Galen. libro de differentiis morborum) demum ad reliquum accedere, qui vt effectus se habet, cuique nanque eorum sua erit cõtrarietas, & si plura sint morborum genera, vt liquet vndecimo metho. Ita omnis excessus per contrarium excessum sanetur, vt ipsemet Gale. testatur octauo eiusdem. Vbi vero qui generat, vel auget affectum, non morbus, sed morbi causa fuerit, ipsa causa spectanda erit, Gale. præcepto septimo meth. med. Nanque hæc dum ledunt, curandi rationem immutant, ac interpellant, vt liquet duodecimo eiusdem, cum ex eis prouidentia indicatio, & non curationis veræ, & propria præstetur, quò fit vt in iis nec affectus simplex, nec sanatio sit: tamen prima indicatio ab ipsa sumitur causa, ac procul dubio hac primò sananda erit. Interim tamen nec eius affectus, qui per eam genitus est, ratio non habenda erit. Quinimò si in idem consentiant, & quæ morbum curant, & quæ causam oppugnant, sine curatione id peragendum erit. Animaduertendum ta-

me in huiusmodi implexibus, quod nonnunquam à causa quapiam oritur affectus, sed ita oritur, ut separata causa, haudquaquam affectus ipse permanentem habeat dispositionem. Interdum autem partim iam affectus est, partim etiam dum fit. Sæpenu-
 micro, quanquam fieri desinat ablata causa, perseverans tamen manet dispositio, ut primo de locis affectis, & octavo method. meden. testatur Galen.

Proinde si talis naturæ erit, qui à quapiam causa affectus oritur, ut ea sublata permanere non valeat propter eius exiguitatem, propter quam interdum non apparet esse, summouenda tunc tantum causa erit, nulla demum ipsius affectus habita ratione, cum propter eorum exiguitatem, separata causa faciente illico tales affectus finiantur, natura videlicet ipsos sanante, nullo adhibito medicamento. At si non adeo exiguis affectus sit, sed pars eius iam genita sit, pars in gignendo, & etiam dum fiat, vtrique consulendum erit. Primū quidem summoeduo, quæ ipsum efficit, causam: deinde quod factum iam est ipsius auferendo, utpote natura propter eius magnitudinem absque medicamento externo ipsum vincere non potente. Quod si in idem consentiant, & quæ causam rescindunt auxilia, & quæ affectum oppugnant, cum vnum sit in quod vtrique conspirant, sine cunctatione, ut diximus, id peragendum erit. Quanquam prima indicatio perpetuo ab ipsa sumitur causa, eaque nimirum prima sananda erit. Etenim dum ipsa lædit, curandi morbi rationem interpellat, ut ostendimus. Interim tamen nec ipsius affectus, seu morbi ratio non habenda erit, ut diximus, quinimò semper quoad fieri possit, medicamentorum materia eligenda est, quæ cum hoc, quod causam rescindant, affectum saltem non augeant. Si ex eisdem amborum sublatio provenire non poterit, commune præceptum Galen. perpetuo observantes lib. artis medicæ, ut vnamquamque prius, quæ efficit causam rescindamus, deinde ita ad illam, quæ ab eadem causa facta est, ægritudinem accedamus, salubrium causarum intentionem facientes: quod quidem Medici opus mixtum iam est ex præseruatione, & curatione. Nam per causæ morbum efficientis abolitionem, illud quod factura erat causa illa, prohibitum est fieri: & hoc pertinet ad artem præseruatiuā. Quod vero iam factum est ex morbo, propriam exigit curationem. Quare non immerito cum talia mixta sint ex præseruatione, ac curatione, interdum alias alia vtuntur appellatione, cum proprio hoc opus nomine careat. Semper enim curatio prophylacticem sibi quoque permittit habet. Nec secus exequendum esse censerem, cum perseverans permaneat dispositio, quanquam ablata causa fieri desinat. Quinimò ipsa causa prius sublata, vniuersa Medici intentio (quamuis affectus fieri desinat, quoniam perseverans manet dispositio) pro ea dispositione auferenda suis contrariis occupari debet, modo quo supra reculimus, neglecta eo tempore causæ indicatione, utpote non amplius lædente, ipsa iam sublata. Ut vero ipsius efficientis causæ congrua fiat abscissio, ea animaduertenda erunt, quæ in nostra methodo breuiter conscripsimus, utpote si opus fuerit, ipsam prius concoquendo, ac præparando, & demum euacuando. Interim autem statim circa initia ipsam euacuabis, prout vltus vergebit, utpote si materia turgeat, aut ea quæ ex tur-

gentia imineant pericula, etiam si non turgeat. Quantitas vero quæ auferri debet, tum eiusdem quantitate mensuratur, tum ex virium robore, vel imbecillitate maiori, vel minori: quod quidē sum-
 mopere perpendendum iussit Galenus nono Method. meden. Semper enim ad vires collatio facienda erit, ut quantum ipsæ permiserint, aut prohibuerint, tantum ipsius causæ morbi auferamus, & non auferamus. Pro magnitudine etenim imbecillitatis impeditur vacuantium auxiliorum vsus, ut patet
 decimo eiusdem Metho. meden. Quod si cum viribus imbecilibus corruptela humorum incidat, oportet ut paulatim, quod vitiosum est, euacuare, & paulatim inuicem quod salubre est pro eo reponere, ut nono Method. medend. scriptum est: vocant autem Medici eiusmodi vitiosos succi curationem

Græcè epicrasin. Naturæ autem robur, prout superius diximus iuxta Galen. sententiam libro de curatione per venæ sectionem, & libro de constitut. artis medicæ, ex ipso præsertim pulsu dignoscimus. Si vero adeo imbecilles interdum vires fuerint, ut omnino causæ abscissionem prohibeant, ipse prius roborandæ sunt, tãquam magnopere vergentes causæ, eo tempore, ac morbi indicatione posthabita; ac demum ad causam, ipsumque morbum redeundum erit, ut patet decimo Method. medend. Nam virtus omnium prima custodienda hominibus est, ac omnium ea prima indicatio est, quæ à virtute sumitur, licet non sit prima, ut quæ curationem doceat, cum ex numero curatricium indicationum non sit, quamuis ex accidenti aliquando virtutis roboratio ad affectus curationem conducat. Verum prima est earum, quæ ad vitæ custodiam pertinent. Nam neque ut valeamus, nec ut à morbis liberemur, ab ea quicquam proprium desumimus, sed vt
 viuamus, ex eiusdem Galen. decreto nono Method. meden. Quod si affectus, seu morbi causa non amplius lædat, ac ipsum efficiat morbum, licet prius fecisset, cum nō amplius causa sit, nec in corpore persistat, aut actiones lædat, nulla ab ea sumenda indicatio erit, pro eius sublatione, aut eiusdem affectus curatione, sed tantum pro ipsius affectus notitia, ut diximus ex Galeni sententia quarto Method. meden. Si verò ea nondum efficit, aut lædit, poterit tamen olim lædere, aut actu morbum efficere, hæc ad eam attinet artis partem, quæ verè prophylacticè dicitur: de qua hoc loco sermonem facere non intendimus. Nam quomodo sanitas, quæ iam deperdita est, vendicanda sit, & non quo pacto ea in corporibus seruanda, aut eadem corpora à morbis præcaueri debeant, pertractare aggre-
 dimur.

EXERCITATIO.

Πρεὶ μνήμης ἀπολωλώς.

Id est, De memoria deperdita.

CAPVT I.



VM caput, seu cerebrum, quod in capite continetur, aut velut arx, sedes, & domicilium fit animæ ratiocinatricis, vel ipsa anima forma sit, aut temperamētum eiusdem cerebri, ut

2. de loc. aff.
3. de loc. aff.
cap. 9
se. c. 5. 6. &
7. 7. de Pla
citis cap. 3

Gal. visum est tanquam in hac re anticipari, in 2. & 3. de locis aff. ac septimo de Hippocratis & Platonis decretis, & sexcentis fere aliis in locis, non ab re ab eiusdem affectionibus exordiemur. Verum de eis, non velut ceteri, qui indistincte scripserunt, tractare, intendimus. Quicquid enim sit ad Galeni mentem anima ipsa, cum semper de eius substantia anceps fuerit, & proinde confessus fuerit ipsius essentiam non nouisse, illud tamen, non modo eiusdem auctoritate, sed Hippocratis, Platonis, ac Aristotelis, pro comperto habetur, eam obfcriptentem ipsam corporis alterationem immutari posse, & proinde interdum laedi; velut etiam experientia in dies comprobari videmus, animae scilicet functiones à diuersis præter naturam affectibus oblaedi, quantum eam incorruptibilem ac immortalem, ut Christi affecta, firmiter teneam. Propterea ratione diuersarum læsionem animae functionum, quæ ex diuersis causantur præter naturam affectibus, eorundem ordinem quandam statuimus. Nam cum quædam per se ac propria actiones sint, quas ex se ipsa operatur, velut imaginari, cogitare, ac memorari; quædam vero munera per aliud exequatur, tanquam instrumentis quibusdam, ut sentire, mediis instrumentis sensus, & moueri, instrumentis motorii, principium, ac originem, & sentiendi, & mouendi eis præstans, ut liquet in Galen. doctrina; propterea cum duxi ordinem seruandum, ut primo de iis affectibus sermo habeatur, ex quibus principes animae functiones læduntur. Secundo loco, de iis, qui sensibiles operationes offendunt. Tercio vero, de iis vitiiis, quæ quomodocumque voluntarios motus impediunt. Vltimo, si quis sit præter naturam affectus in capite orti, in quibus, aut cunctæ prædictæ animae functiones, aut plures offendantur, de iis etiam tractare non grauior: quibus tandem enarratis, absolutus erit sermo de capitis affectibus. Et licet omnes fere difficilis sint cognitionis, cum nullum habeant loci affecti signum, quod sensibus dignoscatur: nam neque tumor præter naturam, neque dolor, neque excretio, aut aliud quippiam apparet, quo valeamus partem affectam in eis dignoscere, in memoria quidem deperdita id potissimum conspicitur. Quapropter cum non admodum facilis sit in ea affectione partis affectæ dignotio; cumque sit ex numero earum affectionum, quæ raro euenire solent, ut testatur Galen. tertio de locis affectis, in quibus remedium inuentio ex vera demonstratione procedens, quam hic sectari potissimum intendimus, experientia longe præstat, non ab re cum Galen. tertio de locis affectis, ab hac exordium esse censui: cuius dignotionem, prognosticum, ac curationem, via quadam, ac ratione, iuxta eiusdem Gal. monimenta præcipue, & Hippocratis, ac aliorum Græcorum, veterumque Latinorum, Arabibus omnino posthabitis, velut & aliorum quoque affectuum præter naturam, conscribere paramus, illum, quem in præcedenti vniuersali capite proposuimus ordinem perpetuo seruantes. Proposito namque quolibet vitio, de quo differendum erit, quis locus afficiatur primo inuestigabimus, deinceps quis affectus præter naturam sit, & quibus indicis, cum ipse, tum eius causa dignoscantur, dilucidabimus. Quibus exacte cognitis, ad eiusdem vitij prognostica primum & deinde curationem rationabili quadam methodo

Ordo seruandus in capitis affectibus.

Cur primus de memoria deperditus.

cap. 4

cap. 3

Auctores quos sectabimur.

Quis ordo seruatur in singulis affectibus.

deuenimus. Cum itaque quispiam omnium eorum, quæ prius nouerat, oblitus fuerit, huic memoriam deperditam esse fatemur, adeo, ut interdum eueniat, ut quidam eorum, & literarum, & artium in tantum obliti fuerint, ut ne nominum quidem suorum meminissent, prout Galenus testatur libro de differentiis, & secundo de causis symptomatum, Thucydide pro teste inducens. Huius affectionis, quæ pars in ea affecta sit, cum omnes affectuum partium notione indigeant, primo inuestigabimus. Quæ quid quod ea sit, quæ princeps animæ vis continetur, nulli dubio est, quam sola actionis læsio satis conducit ad dignoscendum. Hæc namque, cum nulla alia pateret via, Galeno satis erat, pro affectuum partium intentione, velut scriptum reliquit tertio de locis affectis, potissimum in hac affectione, in qua nullum affecti loci signum, quod præcipue eiusdem sit, haberi potest, videlicet neque tumor præter naturam, neque dolor, neque excretio, neque aliud quippiam tale, nec ea affectio, si caluaria tantum affecta sit, fieri posset, ut patet eodem tertio de locis affectis velut quod nec cerebrum ipsum secundum eius ventriculos afficiatur, idem Gal. secundo de causis symptomatum decretum reliquit. Nam nec eius generatio, nec solutio subitanea est: relinquitur ergo iuxta eius doctrinam, quod cerebrum ipsum secundum proprium eius corpus, in quo principes exercentur functiones in obliuione, seu deperdita memoria, affectum sit. Ipsa verò affectio symptoma est in genere noxæ functionum animalium principum: in qua memorandi facultas non deprauata est, nec imbecilla reddita, sed omnino abolita: quod promptè ex modo læsionis ipsius facultatis, ac ab ipsius notione patere poterit. Verum cum cuiusvis symptomatici causa morbus sit, ut liquet libro de differ. symptoma. cumque præcedere necesse sit, ad quæ cerebri morbum consequatur, inuestigandum erit: hunc verò omnino intemperiem, eamque frigidam ipsius cerebri, quæ animales actiones torpidas efficit, Gal. tertio de locis affectis, ac secundo de causis symptomata. asseruit esse, medicamentorum exemplo, quæ hoc symptoma facere possunt, quibus refrigerandi facultas inest, illud comprobans. Siquidem calida causa motum excitat, frigida autem ociosum, & ad motiones pigrum reddit animalia: id quod animalia quoque per se gora latere coguntur, haud obscure declarant: perinde enim ac si mortua essent, hyeme ob frigoris vim latitare solent, ut ipsemet Galen. asserit secundo & tertio de locis affectis. Illud idem confirmauit Hippocrat. tum libro, de morbo sacro, tum in epistola de insania, cum dixit, Obliuiosos fieri dum cerebrum perfrigeratur: hoc verò à pituita petiuntur, cum præter solitum morem compingitur. Verum nunquid ea sola frigida cerebri intemperies sit, vel cum humiditate, seu siccitate copulata, ex alijs quibusdam signis deprehenditur, somnos siquidem obseruando, utrum videlicet vehementer, an modice somnolenti sint, aut omnino non somnolenti, sed quantum ad somnum pertinet secundum naturam se habeant. Nam si vehementer somnolenti sint, frigidam ac humidam cerebri intemperiem, si omnino non somnolenti, frigidam ac siccam, si verò modice somnolenti sint, frigidam tantum intemperiem esse significabit. Præterea considerandum est, num quippiam excernant, vel ex naribus, vel ab ore, quod quidem à capite defluat, aut sicca appareant partes hæ: nam

hæ: nam si multa excernatur, pariter humidam cum frigida copulatam intemperiem: at si aridiores huiusmodi partes sint, siccam, & frigidam: si vero quantum ad hæc pertinet, secundum naturam sese habeant, frigidam tantum intemperiem deperditæ memoriæ causam esse ostendunt. Nunquid autem hæc cerebri dispositio ipsius primaria sit, vel per consensum, nam sic quoque exoriri potest, ut in quibusdam morbis in abscessum declinantibus. Gale. testatur secundo de causis symptomatum; discerni illud potest, si obseruaueris, num prædicta affectio propriis accidentibus dignosci valeat, perpetuoque permaneat, ac ad alias affectiones non cōsequatur: nam tum primario affectu cerebrum labore constabit. Quod si propriis accidentibus discerni non valeat, neque perpetuo permaneat, atque ad alias affectiones consequatur, per consensum memoriæ offendi dicemus. Sunt qui velint aliis quoque cerebri partibus affectis, ac ex quibusdam, præter dictas intemperiebus, eam oriri posse; quos, siue Græci, seu Arabes, vel Latini fuerint, cum à Galen. doctrina, ac Hippo. magnopere deuiant, Galenus inquam, ut liquet tertio de locis affectis, & secundo de causis symptomatum. Hippocrates verò, ut præcitat is locis patet, præsertim cum eodẽdem tanquam duces præcipue sectari intendamus, breuitati modo indulgentes, missos faciemus. Huius autem affectionis causa cum interna, tum externa esse poterit: quod si interna fuerit, vel redundans pituita, vel succus melancholicus erit. At si pituita, non tantum ex modo dictis somnis, ac cerebri recrementis illud percipies, verum ex ægri habitu, ætate, ac temperatūra, anni tempore, regione, & calis statu, ac præcedenti victus ratione; omnibus siquidem, aut saltem pluribus ad frigidum & humidum vergentibus. Pariter, si redundans melancholicus succus prædictæ affectionis causa fuerit, ut diximus, aderunt somni, tum excrementa, ac cuncta alia, quæ præcesserunt ad frigidum, & siccum inclinabunt. Si verò nullum affuerit prædictorum humorum redundantia signum, ex aliqua externa causa ortum ducere coniectandum erit; præsertim si ex extrema senectute obliuio originem non ducat: idque potissimum percipies ex ægri, vel astantium relatione: ut si quipiam morbus prius præcesserit, solutusque in totum in obliuionẽ trãscrit: vel ex assumptione quorundam medicamentorum, quæ ingentem refrigerandi facultatem habeant: seu capiti quomodocunque adhibita fuerint. Ex immodicis quoque laboribus in studiis, atque vigiliis, vel in aliis quibusdam, ortum habere poterit; veluti in eo, qui circa disciplinas, & in alio, qui vites colebat, propter labores Galen. nouit: ut patet tertio de locis affectis. Ex aliis quoque infrigidatibus, quæ extrinsecus accidunt, si immoderatus occurrant, velut sunt tum cibi, tum potiones suapte natura frigidiore, excitari poterit. Quod si modica fuerit ipsius memoriæ offensio, ob minorem eueniet cerebri refrigerationem, & veluti quidam torpor eius erit, ac habes, nec omnino ex abolita erit, sed diminuta, seu imbecilla. Si verò simul cum memoria ratio, quoque deperdat, quæ affectio sanitas, siue stultitia nominatur, à Græcis *μᾶλλον* dicta licet ab eadẽ dispositiōne procedat, vehementius tamen in hac intenditur iuxta eundem Galenum eodem tertio de locis affectis, ac secundo de causis symptomatum. At quoniam totius præfationis summa in morituris, con-

ualiturisque est, quoties vis agrotationis cum ægri facultate conferatur; si enim morbus vehementior est, æger omnino morietur; si debilior quàm æri facultas, haudquaquam morietur, ubi nihil erroris committatur Gale. teste secundo prognosticorum; propterea cōsiderata hac affectione, quæ suapte natura cerebrum, membrum siquidem princeps, lædit, perpena quæ eius magnitudine, quanta videlicet fuerit, facta quæ demum relatione ad vires ipsas, tum ipsius cerebri, tum etiam totius corporis, vitalesque, ac naturales, si affectus eis superior inueniatur, utique morietur æger; sin contra, seruabitur: potissimum si alia consenserint, ætas videlicet, temperamētum, tempus anni, &c. Tempus autem coniectari poterit ex maiori, vel minori robore virium, & prædicti affectus, ac magnitudine excessus eorundem. Quæ, & si in aliis non dicantur, in cunctis tamẽ subintelligi affectibus debere volumus. Hippocr. verò libro primo prædictiōnum, obliuionem malam esse reulit. Insuper ex Aëtij sententia, capite de memoria amissa, valde timendum erit, quibus ea derepente deficit, alia vero sana esse videntur, ne comitialis morbus eis superueniat, aut sideratio, vel resolutio, aut quoddam aliud magnum cerebri malum. Pro cuius curatione illud primò animaduertendum erit, nō tantum in hac, sed in singulis sequentibus affectionibus nos earum tantum curationes docere, quæ per essentiam ortum habent, ac primariæ & propriæ sunt, & non earum, quæ per consensum: cum eæ nullam propriam curationem requirant, sed sublatis primis, ac propriis affectibus, quos insequuntur, statim & ipsæ auferuntur, ut liquet primo & secundo de locis affectis. Quemadmodum si obliuio ad lethargum, vel ceteros soporiferos affectus insequatur, aut ad morbum quempiam in abscessum declinantem. Summa verò huius affectionis medela est in calfaciendo vniuersum ipsorum corpus intrinsecus, & extrinsecus, iuxta mensuram euariationis habitus naturalis, Aëtio auctore. Proinde tam si ab interna, quàm si ab externa causa ortum ducat, aër ad calidum inclinet oportet. Nam cum sine eo nec sanitas tueri, nec morbus tolli possit, Gale. teste nono meth. med. non immerito is primo alterandus erit; isque sit luminosus, alienus ab aquilone, ac austro, cum vnus infrigidet, alter verò caput repleat. Caueat à multo somno, præsertim diurno, ac super repletionem; sed is sit moderatus; velut & vigilie moderatæ quoque esse debent, cum & superflua spiritus dissoluant. Exercitium quoque moderatum, & pedum, & manuum, & interdum capitis cum frictionibus ex asperis linteis magnopere confert: velut quies immodica, ac desidiosa vita valde offendunt. Alui excrementa singulis diebus, si non à natura, ab arte educenda erunt: eorum nanque retentio caput offendit. Caueant ab immoderatis animi affectibus, præsertim in celsitudo, cura, ac solitudine: nam iræ excitatio forte eis nō nocebit. Capenda est multa repletio alimentorum, & potuum, vitanda quæ sunt: edulia infrigidetia, crasse facientia, & infantia; multusque aqua, adhuc magis vini potus. Ab oleribus propterea omnibus refrigerantibus abstinendum, fructibus, ac bellariis, caseoque, ac lacte. Verum, ut Aëtius testatur, alimentum conuenit friabile, & aliquo modo calefactorium, ac attenuatorium. Acriora autem alimentum, velut sunt allia, thymbra, origanum, pulegium, ex interuallis exhibeantur. Sed & horum etiam co-

comment. 6

Que seruanda sint in singulorum affectionum prognostico, est non dicantur. *tex. 28 Aëtius lib. 6 cap. 23 Curandis ratio.*

1. de io. aff. cap. 6

2. de lo. aff. cap. 9

Viciu-
tio.

cap. 14

pia vitanda erit. Cruditas quoque omnino cauenda, cum omni re magis mentem vitiet. Vinum his conuenit tenue, album, non valde vetus. Nam per moderatam caliditatem, vt ait, Aëtius, tum alia nō pauca potest, tum animam mansuefacit, & motum ei præbens concinnum, ac sedatum, ad tripudium aptam facit. Veneris verò vsus sit rarissimus. neque enim ad totius corporis sanitatem conducit, neque ad animæ rationationes, si immoderatus fuerit, confert. Verum illud memoriæ tenendum erit, quod si à frigida, & humida causa obliuio ortum duxerit, non tantum ad calidum, verum & ad siccum vniuersa victus ratio declinabit. Si verò cum frigiditate siccitas fuerit commista, non modo ad calidum, verum etiam ad humidum vergat oportet; cum ex calido & sicco prorsus læderentur taliter affecti, velut experientia comprobauit Gal. in eo, qui ob laborem in studiis effectus erat obliuiosus; simulque in eo, qui vites colebat. Hoc autem cum non magno negotio fieri possit, breuitati indulgentes bona fronte omittimus. Medicamentorum verò ratio ea seruanda erit. Nam si ex pituita redundantia obliuio ortum duxerit, eam prius concoquendo, ac præparando, demum euacuare oportet: pro cuius concoctione, ac præparatione vtaris rhodomelle, accipiens eius vnc. j. & s. syrupi de infusione rosarum vnc. j. aut tantundem oxymellis cum eodem syrupo de infusione rosarum cum aqua betonice, sampsiuchi, vel hyssopi vnc. iij. vel iij. aut sampsiuchum, hyssopum, betonicam, serpillum, vel thymum in aqua mulsæ decoquito: de qua vnc. iij. vel v. ægro tribuantur: quibus pluries adhibitis secundum totum, vel partem concocta, ac præparata materia, eam euacuare licebit ex decocto myrobalanorum chebulorum pondere drac. iij. agarici trochiscati drac. i. vel scrup. iij. florum stœchadis drac. s. cui adde syrupi de pluribus infusionibus rosarum rubearum, aut rosarum persicarum vnc. ij. vel iij. diacatholicon vnc. s. aut confectionis de dactylis drac. ij. vel iij. & si vnica vice tota causa auferri nequeat, quod sæpius euenit, tum superte natura, quia crassus, & lentus humor est, tum ratione partis affectæ, iterum is præparandus, ac concoquendus erit cum eisdem, vel valentioribus, vt syrupo de stœchade, aut oximelle scyllino, iterum addendo syrupum de infusione rosarum, permiscendoque decoctum aliquod ex supradictis, & miscendo, si videbitur, in eo pulgium, organum, vel stœchadem; quo denuo concocto, ac præparato ex catapotii arabicis, aureis, sine quibus, vel aggregatiuis cum agarico permistis, euacuari poterit: drac. j. vel scrup. iij. excipiens ex dictorum catapotiorum aliquo, addendo insuper agarici trochiscati scrup. ij. aut drac. j. redactisque in formam catapotii cum aqua sampsiuchi, vel betonice, rhodomelle, seu syrupo de stœchade: post quæ per duas vel tres horas exhibeatur potio ex decocto myrobalanorum prædictorum drach. iij. in quo aut syrupum ex pluribus infusionibus rosarum, aut mel aëreum ponderis vnc. ij. vel iij. dissoluatur. Auxiliatur etiam iis summo opere purgatio ex hiera, præsertim Rufi, vt Paulo & Aëtio placuit. Verum quæ de quantitate medicamentorum hic scribimus, gratia exempli habenda erunt, cum nec dici, nec scribi, nec præcipi ea possit, ex Gal. mente tertio Metho. meden. quare coniectura qualem assequi licet. Nam nihil æquè artem medicam in agendo coniecturalem afficit, vt cuiusque remedij

De quantitate medicamentorum quid sentiendum sit. 3. meth. ca. 3. cap. 12

quantitas, eodem Gale. auct. ore lib. de Curandi ratione per venæ sectionem. & si quid in nobis est, & ex nulla re adeo possumus ad exquisitam eius peruenire notitiam, quantum ex crebra exercitatione circa eiusdem quantitatē coniecturam, eodem Gal. teste primo, de Arte curatiua ad Glauconem. cap. 8. Minui igitur potest, vel augeri singulorum, quæ diximus, ac in singulis affectibus, quæ dicemus quantitas, pro diuerso tum virium robore, temperamento, natura, ac ætate laborantis, & consuetudine, regione, anni tempore, ac cæli statu, & aliis. Nec aliter sentiendum erit de modo eorum vsus, ac temporis occasione; quæ præ omnibus est cognitu difficillima, vt liquet eodem libro primo, de Arte curat. ad Glauco. nam ad recte medendum plurimum conferre videtur, & temporis occasio, & auxiliorum quantitas. quod quidem perpetuo memoria tenendum consulo. Placuit insuper Paulo cap. vndecimo libri 3. pro cura huius affectionis vt acribus clysteribus, veluti si hieram compositam, vel Rufi apponas, agaricum, hieralogodion, aut aliquid tale in quantitate opportuna, miscendo vnc. ij. vel iij. mellis rosacei, & iij. vel iij. olei, vel communis, vel amygdalarum dulcium, chamæmelini, aut anetini cum decocto maluarum, mercurialis, foliorum betæ, storum chamæmeli, surfuris, & salis. At si quid reliquum fuerit in capite prædicti redundantis succi, ad particulares ipsius cerebri euacuationes te conferas oportet, apophlegmatismis vtens iis, qui pituitam à capite attrahunt, compositis ex chiamastiche, & vna passa vinaceis detractis, interim addas zinziber, pyrethrum, aut nigellam, aut cubebas: ex quibus figurari possunt mansiles pastilli. Interdum errhinis vtendum erit liquidis, præsertim ex decocto hordei cum corticibus, manipuli vnius sampsiuchi, hyssopi, betonice, ana vnc. iij. quo secundum artem concocto, ex eo sumantur libræ duæ, vel tres, & additis succi foliorum, & radicum betæ vnc. ij. aut tantundem succi brasice; vel, si validius quæras, succi cyclamini vnc. ij. quibus comistis calidis moderate, aut tepidis, naribus infusis: vtaris & si fortiori indigeas, addere decocto poteris castorei, aut nigellæ drach. vnam, calaminthæ, origani, seu stœchadis vnc. ij. Nec omnino sternutatoria spernenda erunt, quæ ex pipere, castoreo, seu albo helleboro, diuisim, vel coniunctim fieri possunt. Placuit etiam Aëtio post purgationem, ramentum eboris drach. j. pondere, aut cornu cerui tantundem, seu castoreum similiter vnc. j. pondere potum cum aqua mulsæ magnopere huic affectioni prodesse, ac opitulari. Simili modo & ipse laudarem drach. j. aut amei, vel succi rutæ, seu seminis vrticæ cum prædicta aqua mulsæ, similiter tantundem confectionis anacardine, aut aureæ alexandrinæ, confectionis diambra, diamuschi dulcis, mithridati, aut theriacæ cum aqua mulsæ, aut paucio vino albo. Ab extrâ verò irrigationes, quas Græci, ἐμβροχας vocant, ex alto cadentes torrentis ritu capiti prius abrafo administrari possunt præsertim iuxta coronalem commissuram, qua parte cum ea laxior sit atque os tenuius, & rarius, promptè nō tantum qualitates, sed etiam substantiæ medicamentorum, præsertim si teneus fuerint, intro transmittuntur, Gale. teste, ac in seipso experto decimotertio Metho. tum secundo de Compositione medicamentorum secundum locos. Quæ ex aliquibus prædictorum medicamentorum parari possunt, veluti ex decocto hyssopi, serpilli, thymi ana pug. s. betonice,

nica, sampfuchi, florum chamæmeli ana pug. j. florum stœchadis vnc. iij. fiat decoctum, cui adde castorei drachm. j. aceti vnc. j. Nènon tum parte eadem, tum posterioris capitis partis in occipitio videlicet, ac iuxta primam & secundam vertebram, vñctiones ex oleo nardino, nucis muscata, ac de castoreo, costino, vel de piperibus fieri poterunt, pariter & sacculi approximandi; vt Recip. hyssopi, sampfuchi, & florum stœchadis ana drach. j. castorei, nucis muscata, spica, macis, ana scrupul. j. corticum thuris, maltiches, & ligni aloës ana drach. j. & s. rosarum rubearum siccarum æquali pondere omnibus, contundantur, & formentur sacculi. Illius tamen semper meminisse oportebit, etiamsi aliquando in sermone relinquitur; non prius adhibenda esse topica vocata remedia; quam præmissa fuerit vniuersi corporis curatio ex Galen. primo de compos. medic. secun. loc. & tertio de locis affectis. Id enim commune præceptum est; quod in omnibus morbis obseruare oportet. Quod si iis non cesserit affectio, vltimo loco sinapismo vtendum erit, vt Aëtio placuit non modò in occipite, vt ipse refert, verum potius in scynipite, propter signatas causas. Frigida verò & sicca cerebri intemperie existente, ex qua obliuio gignitur, si fortè cum quapiam succi melancholici redundantia fuerit, is parandus primò erit expulsioni, id quod cum syrupo ex succo boraginis, vel fumariz, permisto cum syrupo ex infusione rosarum, aquis betonica, lupulorum, & melissæ perficies; quibus prout visum fuerit pluries assumptis, infra scripto medicamento purgante ducendus erit. Rec. myrobalanorum Indorum drach. iij. fenæ, epithymi ana drach. ij. florum lupulorum, fumariz, & boraginis ana drach. ij. & s. fiat decoctum in aqua fontis, in cuius expressionis quantitate dissolue mannæ electæ vnc. ij. diacatholicon drac. vij. aut diasenæ vnc. s. vel syrapi domini Augustini vnc. iij. fiat potio. Reliqua demum topica remedia ad humidum magis, quam ad siccum vergant, tum vñctiones, de quibus mentionem fecimus, eis addendo oleum chamæmelinum, anethinum, ac amygdalarum dulcium. Irrigationibus autem prædictis iterum humectantia addendo effusantia demas, pariter & sacculos pares oportet. Quod si frigida tantum, & sicca, aut solum frigida intemperies sit, calfaciente, & humectante victu, ac eiusdem qualitaris medicamentis alterantibus tum intus, tum extra vtendum erit, frigida, & sicca existente. Si verò frigida, tantum calfacientibus. At si ob extremam senectutem euenerit obliuio, non oportet curiose senectutem euenerit obliuio, non oportet curiose aliquid moliri, sed sola conueniente victus ratione contentus esse. Si ex immodicis laboribus, ac aliis euacuationibus, resectoria diata vti conuenit. Si ex frigidis medicamentis absorptis, aut capiti adhibitis, & intus, & extra calida medicamenta approximanda erunt, ex iis, quæ supra diximus. Ex quibus omnibus diligens Medicus poterit non modò quamlibet obliuionem rationabili methodo curare, verum etiam & ipsius labem, seu, vt ita dixerim, torporem, in quo non abolita sed imbecilla redditur memorandi functio: prouenit siquidem ex eisdem serè causis, quamuis non admodum auctis, velut si ipsa deperdat. Quapropter cognita causæ diuersitate eisdemmet medicamentis vtor, ea tamen seligendo, quæ mitiora fuerint. At si cum ipsa memoria deperdita, ratio quoque deperdatur, quò fit vt stultitia, seu fatuitas

generetur, pariter obseruando, quæ prius à nobis dicta sunt pro causâ dignotione, absque labore pro eiusdem affectionis ablatione iam dictis medicamentis vti poteris, ex eis tamen, quæ valentiora sunt eligendo, cum ex vehementiori cerebri intemperie gignatur, Galeno teste tertio de locis affectis, velut superius dictum est.

Περὶ ληθαργίας.

De lethargo. CAP. II.

Lethargus, VM maximam habeat cum deperdita memoria affinitatem is affectus, qui à Græcis ληθαργος, à Latinis interdum lethargus, interim veteribus à quibusdam appellatur, non ab re de eo hic verba faciemus. Nomē siquidem nactus est ἀπὸ τῆς λήθης, quod obliuio interpretatur, & ἀργός hoc est, iners: proinde ληθαργος, obliuio iners Latine dici posset, cum in ipso marcor, & inexpugnabilis penè dormiendi necessitas percipiatur, velut Paulo, & Celso visum est cap. nono libri tertij, & cap. vigesimo libri tertij. Quod autem cerebrum in prædicto affectu afficiatur, liquet Gale. auctore decimotertio metho. Paulo præcitato loco, ac Tralliano lib. primo cap. decimoquarto. Et insuper quoniam nequeunt taliter affectu eorum quæ dicuntur meminisse, vt eidem Tralliano visum est, illud potissimum patere potest. Quinimò cum ipsa memoria, ratio quoque perit, auctore Galeno tertio de locis affectis, & lib. de differentiis symptomatum. In lethargo imaginationem lædi idem scriptum reliquit. Iure igitur cerebrum, in quo princeps pars animæ residet, in hoc affectu læditur, velut ex eius principum functionum læsione ostendimus; & id ipsum nò secundum eius ventriculos, sed secundum propriam eius substantiam, vt eodem tertio de locis affectis, liquet. Verum quis affectus præter naturam sit, nec inter Græcos, nec inter Latinos quempiam determinasse hucusque reperi, quamuis Aui cenna velit eum esse apostema phlegmaticum factum intra cranium. Galenus autem lib. decimotertio metho. interim λήθημα, ipsum appellat, interdum ipsum sub nomine παθος comprehendit, quem admodum etiam commento aphorismi tertij secundum lib. libro autem de sympt. differentiis, inter ea symptomata, quæ principibus functionibus animæ eueniunt, ipsum connumerat, & propterea decimotertio meth. dicebat, hoc παθος contrarium quodammodo esse secundum ideam phrenitidi. Verum cum & ipse lethargus, vt dicemus, non tantum ex cerebri inflammatione orta à pituituoso succo excitari possit, verum etiam ex ipsa pituita citra inflammationem in cerebro putrefacta, propterea inter symptomata ipsum connumerabimus functionem principum, memoriæ videlicet, ac rationis abolita, imaginationisque infirma, & veluti deficientis, simul cum Galen. tertio de locis affectis, & lib. de differentiis sympt. Quod quidem affirmare videntur Pauli verba, dum asserit, lethargum esse noxam aliquam ratiocinatricis animæ: & Aëtius lib. 6. ca. 23. cap. de memoria amissa dicebat, Pereunt autem ambo hæc, de memoria, & ratione loquens, in lethargo. Inducant hanc affectionem obliuio ipsa, vt diximus, cum inertia. Omnium namque veluti amentes obliuiscuntur; palpebris semper conuiere volunt, conuiescere. Vix respondent quocumque

Vnde natus sit nomen.

Quæ pars afficitur. 3. meth. cap. 21

3. de loc. aff. cap. 5 De diff. sympt. cap. 3

cap. 5 Quis affectus præter naturam sit. Aui. lib. 3. sen. 1. trac. 3. c. 7. ca. 21 De diff. sympt. cap. 3. cap. 21

3. de lo. aff. cap. 5 De diff. sympt. cap. 3 Aëtius lib. 6. ca. 23 Affectionis signa.

modo interpellentur. Oscitant crebro, & hianti ore aliquandiu persistunt, tanquam claudere id obliiti. Cum violenter ab assidentibus excitantur, rursus in somnum deferuntur; & dum ab mictione vrgentur, porrecta ipsis matula, sese in manibus ipsam habere obliuiscuntur. Febris lenta eos comitatur, pulsusque magni, molles, languidi, tardi, ac rari, & turbulenti, intermittentes potius, quam intercurrentes; respiratioque rara, & imbecillis. Deiciunt per aluum lethargici magna ex parte liquidiore, quibus valde exigua vitæ spes est Hippoc.

Circa prim. teste lib. tertio de morbis. Nonnullis contra venter inarescit, urinam redunt iumentis similem: quidam ex eis tremiscunt, & sudoribus vndeque madet, auctore Paulo. Comitatur autem is affectus frigidam, ac humidam cerebri intemperiem, cum obliuio, segnitia, ac altus somnus ex ipsa proficiscantur, Gale. teste eodem decimotertio metho. Hoc idem testatur Paulus, cum dixit, ex nimio frigore, ac cerebri humiditate hunc affectum contrahi. Quod autem ea intemperies ex redundante pituita, eaque putrescente originem ducat, idem Trallianus affirmat, dum asserit lethargum ex pituita superante nasci, quæ cerebrum humectat, ac valde madefacit; & Paulus hoc idem asseruit, dicens, Ex pituita, quæ frigore nimio, & humiditate cerebrum imbuerit, ipsum oriri. At quod ea putrescat oportet ut lethargus contrahatur, decretum reliquit Gale. decimotertio metho. & proinde cum febre incidit, nec sine ea gigni potest. Propter quod non mirum, cum in capite humor frigidus redundat, si insensibilitas, immobilitasque hominem opprimat: ex frigore enim segnitia, velut ex calore immodico motus provenit, ut patet eodem decimotertio met.

Quem cerebri morbum comitatur. Loco citat. Ex quibus liquet, etiam si alia, quæ non præcesserunt non consideraueris, ut regionem, ætatem, anni tempus, victus rationem, &c. Lethargi causam pituitam esse in cerebro redundantem, eamque necessariò putrescentem, iuxta Galeni monumenta, siue cum inflammatione, siue circa inflammationem ea putrescat. Proinde ipsum non perpetuò subsequi ad cerebri inflammationem ex pituita ortam, sed interdum citra inflammationem: ea tamen putrescente ortum ducere cum Gale. audeat asserimus, quicquid velit Auicenna, ac reliqui simul cum eo sentientes. Quod quidem clarè ostendunt verba eiusdem Gal. commento aphorismi tertij libri secundij, dum dixit, quæ refrigeratio quando fortis facta fuerit, cum humiditate quidem mixta facit τὰ ληθαργικὰ, hoc est, lethargicas affectiones, seu passiones, & primo prorrheticorum, cum asseruit lethargum fieri, cum locum eundem, in quo princeps animæ pars residet, humectat, dilueritque pituita. liquet insuper, quod licet lethargus quandam habeat cum obliuione propriè dicta affinitatem, nonnullis tamen inter se dirimuntur. Nam in obliuione memoria duntaxat ablata est, in lethargo nedum memoria, sed etiam ratio aboletur, ut patet tertio de locis affectis, & secundo de causis sympt. præter id quod imaginatio infirma, seu deficiens redditur, eodem Gal. teste lib. de differ. sympt. proinde obliuio cum iners seu ociosa, lethargus dicatur, necambo omnino eadem sestantur cerebri dispositione. Nam obliuio ad frigidam, tum frigidam & humidam, ac frigidam, & siccam, indifferenter cerebri dispositionem consequi potest; at lethargus ad frigidam, & humidam tantum, ut præcatis locis liquet. Quapropter non nisi à redundante pituita excitatur lethargus. Obliuio verò ab humore melancholico etiam, ac à sola frigida cerebri intemperie, ut præcedenti cap. ostendimus: adde quod quamuis utraque affectio à pituita excitari possit, in obliuione tamen non oportet, quod ipsa putrescat, velut in lethargo: nec quod febris eam sequitur, ut lethargum consequitur necessario. & si Trallianus, & Aëtius non viri lethargi mentionem faciant, nos tantum de vero, ac genuino, qui per essentiam in cerebro gignitur, verba facimus. Hic affectus, nisi ei succurratur, cum ex genere acutorum sit, Celfo auctore, celeriter iugulat. Galenus autem quarto de causis pulsum inspiciens cum eius causam, tum partem ipsam affectam, asseruit, lethargum longè letaliorem esse peripneumonia. At Hippoc. lib. secundo de morbis scriptum reliquit, quod lethargicus in septem diebus moritur, si verò hos effugerit, sanus euadit. Cum autem ex iis, quæ diximus de hoc affectu, eius causa, ac parte affecta, maxima quædam similitudo esse reperiatur eius cum memoria deperdita, licet in quibusdam discrepent, ut cuiuslibet rectè insipienti ea quæ scripsimus, patere poterit, propterea & eius curatio ferè similis erit cum prædicta, paucis quibusdam mutatis. Locandus proinde æger est in domo tepida, ac lucida, & splendida: ita ut aer parum ad calidum & siccum inclinet. A somno potius excitandi sunt, quam is prouocandus sit. odoramentis ex castoreo, funiculo lucernario extincto, galbano, sagapeno, sulfure, pice liquida, aut bitumine, Aëtio auctore: vel ex thymo, pulegio, hyssopo, & origano in aceto decoctis, additoque castoreo, odoramentum fiat. Eluatur alius efficaciore clystere, ex hiera videlicet, agarico, aut ex eiusdem figuratæ glandes cum melle subdantur. Pedes, & manus fortiter confricentur, ligentur, & interdum pungantur; nonnunquam etiam pili in ipsis vehemētius euellantur. Cibi autem extenuantes esse debent, Tralliano teste, ut cremor ptisanæ, aut ptisana ipsa, interdum sola, interim cum oxymelite permistæ; aut in qua hyssopi coma fuerit decocta, vel pulegij, seu thymi, præsertim valida non existēte febre. Sauræares etiā sunt panis micæ ex apomelite, vel hydromelite datæ. Quod si vires requirant, carnibus quoque vescatur æger oportet, pullis videlicet gallinaceis, perdicibus, starnis, phasianis, turdis, merulis, ac motanis auiculis, quæ cinnamomo, vel caryophyllis condiantur. Oleribus uti poterunt sceniculo, oreoselino, & asparagis, vel in iure prædictarum carniū bulliat parum samspuchi, hyssopi, thimi, betonicæ, aut serpilli. Pro potu, vtantur hydromelite, vel vino albo aquoso, tenui, & astringenti. Nam ipsum cum tempestiuo cibo datum, non mediocriter adiuvat, ut Celfo visum est. Acibo autem non ab re extremæ partes, præcepto Pauli, vinciri debent per aliquod spacium, ne videlicet vapor ad caput ascendat. Statim autem ab initio, si nihil prohibeat, in tali affectu incidenda vena est. Quod licet præceptum sit Galeni decimotertio meth. cum eo itidem conueniunt Paulus, Aëtius, Trallianus. Vena autem incidenda est media, aut interna. Quantitas sanguinis pro viribus euacuetur. At si sanguinis missionem vires prohibeant, ætas, aut aliud quippiam, acribus clysteriis alius ducēda erit Pauli præcepto. Demum redundans succus hyssopi decocto in hydromelite, thymo, vel pulegio, rhodomelle, aut oxymelite, solis, aut permixtis cum syrupo borraginis,

Quibus conueniat, & differat lethargus ab obliuione, seu memoria deperdita. 3. de loc. aff. cap. 5. 2. de causis sympt. c. vi. De differ. sympt. cap. 3.

raginis, vel ex infusione rosarum, & aquis betonicæ, hyssopi, vel sampluchi, & borraginis præparetur; ac demum purgetur aliquo purgante medicamento eorum, quæ conscripsimus præcedenti capite pro cura deperditæ memoriæ ex frigidityte, & humiditate cerebri prouenientis. Interim capiti admoendum erit oxorrhodium, idque in principio, cum repellendus à capite humor sit quisquis is fuerit, ut eodem decimotertio meth. liquet. At procedente tempore miscere, & incoquere poteris oxorrhodium, quæ extenuare simul possint, ut castoreum, pulegium, calamintham, thymum, & alia huiusmodi. Fronsque illinienda erit, Tralliano auctore, aut castoreo, aut plus humanis crematis, læuigatisque ex aceto, incoquantur etiam in aceto thymum, pulegium, & origanum aut aliqua id genus, ac naribus sic affectorum admoventur, miscetoque cum eis castoreum: habent namque vim huiusmodi medicamenta calfaciendi, attenuandi, ac dissicandi humoris crassitudinem, ac lētiem: humiliter si cornua capræ leui flamma torreantur, ac naribus fumus excipiat, grauem somnum depellent, ut inquit Q. Serenus, idem labrum Veneris, si teratur prius, & cofusum vino liquecat, ac bibatur, commendauit. Asperis frictionibus utendum, ut diximus erit, ac extremarum partium vnctionibus, & vinculis: nonnunquam pilos etiam in ipsis vehementius euellere oportet. Sternutamentis quoque interdum utendum ex castoreo, pipere, seu helleboro; & si admiserint, apophlegmatismis quoque iam dictis in præcedenti capite. Mox palatum etiam, ut Gal. placuit, valentibus, & acerbis medicamentis vngemus, velut mithridato, theriaca, diamoscho, diambra, aut eclegmate pliris archoticon dicto, aut sinapi cum melle. Quod si iis nec affectis discutiat, caput radendum erit, & ex alto, velut torrentis ritu, medicamentum infra scriptum fundendum erit, præsertim in sinapitis loco. Sumito serpillum, hyssopum, ac thymum cum paucis castoreo, & in aceto, ac oleo coquito, & vtare: aut castoreum cum modico aceto terito, additoque oleo communi, vel irino, & caput irriga, vel fouendum erit aqua in qua laurus, aut ruta decocta sit, & altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, si Celso credendum erit. Saturata quoque cum aceto frequenter infusa capiti adhibita, aut ex vino pota lethargicos etiam lethalter dormientes excitat, ut Plinius secundus refert lib. quarto de re medica cap. decimonono. Excitat item eos ruta trita ex aceto infusa, & fronti admota, ut Apuleio Madaurensi visum est cap. 90. Occipicio quoque cucurbitæ sunt affigendæ cum multa flamma circa primam & secundam vertebra: interimque sanguis ex his detrahendus erit, si opus fuerit. Quod si neque hæc suffecerint, sinapisinus adhibendus erit ex caricis cum sinapi aceto macerato. Summopere Trallianus extollit assumptionem castorei, præsertim vna hora ante accessiōem per se exhibitum, aut cum oxymelite: ex cuius assumptione nouit ipse multos hoc solo remedio euasisse, propterea ipsum præterire nolui: poterit eius quantitas esse drach. j. cum oxymellis vnc. j. aut tantundem vini albi fringentis, aut hydromellis. Similiter recrementorum copia non existente, coctioneque morbi apparente, balneum summopere laudauit, illud quod nec Aëtius, affectione tamen declinante, negauit, nec Paulus. Verum nullo pacto agri caput est madefaciendum. Modus autem

usus eius ab eodem Tralliano prædicto cap. decimo quarto describitur. Oportebit præterea frequenter eos sollicitare ad naturæ excretionem, ut inquit Paulus, ad alui excrementa cum glandibus, ac clysteriis; ad vrinam verò irrigando pubem cum oleo rutaceo; aut irino, cui adiectum sit castorei paululum. Hæc pro huius vitij curatione sufficiant: quod si quis mauult, non symptoma, sed morbum appellare, à symptomate tamen nomen assumens, modò in curatione non erret, non reclamabimus.

Nec naps.

De caro.

CAP. III.

DE CREURAM DE EA AFFECTIONE, QUÆ À GRÆCIS *napsos*, ab Arabibus subeth appellatur, quam etiam & nos ut quauu-
mlet vitemus, carum nominabimus, nondum verba facere: cum in eo, ut patet, non tantum principes animæ functiones vitentur, verum sensibiles, atque voluntariæ motrices, Galeno teste secundo de articulis, dum dixit, in caro omnes animæ operationes lædi, ut neque sentiat, neque moueatur homo, neque intelligat, sed & rationem & memoriam, & sensum, & motum, qui per appetitionem fit, oblaesos habeat. At quoniam maximam ipse habet similitudinem cum lethargo, Græci quæ omnes ferè post eum de caro mentionem faciunt, de eare hoc loco & nos de eo tractabimus. Est namque is veluti resolutio quædam principis facultatis, imaginatricis præsertim, Gal. auctore lib. de diff. sympt. à priuatio sensuum, vniuersarumque motionum, spirandi tamen facultate manente illa, ut ab eodem scriptum est quarto de locis affectis. In qua affectione quod cerebrum afficiatur ex operationum eius læsione cuique patere poterit, confirmaturque à Gal. eod. quarto de locis affectis: quo loco non modò in eo cerebrum affici asseruit, verum ipsum magis affici secundum ventres, quam secundum corpus, & magis secundum totam anteriorem partem eius, quam posteriorem, scriptum reliquit. Symptoma hoc affectus est in genere noxæ functionum animalium principum, præsertim imaginatricis abolitæ, sensibilibus, ac motricum, spirandi tamen facultate excepta, quo ab apoplexia discrepat, quantum interdum & ipsa quoque lædatur quodammodo, ut patet quinto de locis affectis, ut in minori apoplexia, cum videlicet carus magnus fuerit, intellige, alias Gal. sibi ipsi pugnaret; & si Aëtius velit in cunctis soporiferis affectionibus memoriam: ac rationem perdi cap. de memoria amissa. Indicant ipsum non modò prædictarum functionum læsio, verum quod taliter affectorum oculi semper sunt clausi, ac somno profundissimo detinentur, ut dum punguntur, sentiant quidem, non tamen loquantur, neque oculos aperiant, Aëtio teste. Propter quod à lethargo differt, quoniam lethargici interrogati respondent, & non omnino sine voce decumbunt. Præterea carum febris præcedit, ut Paulus testatur, eaque vehementior, lethargum verò subsequitur ignauior. Item carus ad nonnullos superuenit affectus, ut dicemus, lethargus autem peculiarem causam obtrinet, ut dictum est. Neque ad cerebri frigidam intemperiem, præsertim secundum eius ventres, à frigido, crasso, aut omnino viscido humore ortam, insequitur carus, Gale. auctore quarto de locis affectis: quæ ra-

commen. 18

Caros quid

t

De diff.

ren. symp.

cap. 3.

4. de loc.

aff. cap. 2.

Quæ pars

in eo affi-

ciatur.

Loco citato.

Quis præter

naturam

affectus sit.

cap. 1.

Lib. 6. cap.

23

Lib. 6. cap.

Lib. 3. cap.

cap. 2.

tione à lethargo non discrepat; verum hic ut pituitosus humor putrescat, non requirit; lethargus vero nisi putrescat fieri nequit, ut decimotertio methodi liquet; quod fit ut propterea à lethargo differat etiam, hac de causa genitus carus. Superuenit etiam aliis cerebri affectibus, aliisque causis, à quibus nec lethargus gigni potest, ut masculis temporum affectis, ac quibusdam acutis morbis, ut Hippoc. testatur secundo de articulis. Item cum ossis copiam terebra perforato, medius ventriculus fuerit attritus, carus hominem occupat teste Gale. eodem quarto de locis affectis. quemadmodum etiam si quis inter perforandam membranam negligenter, ac ultra quam res ex postulat, premendo violauerit, carus accidere solet: sic ubi os calvariae vehementer attritum ipsius ventriculos comprimat, maximeque medium, carus superuenire potest: veluti etiam ad vehementes dolores hic affectus sequitur, confidete robore spiritus animalis. Superuenire insuper consuevit febrium accessionibus, ac comitialibus. Ex quibus omnibus causis liquet cerebrum ipsum non uno modo semper affici, sed diuersimodè pro diuersitate causarum, cum hic affectus gignitur. Verum quoniam verus carus à frigida, ac humida cerebri intemperie à pituita orta, ut diximus, originem ducit, isque praesertim curari solet, quem etiam facile dignoscere, tum ex iis, quae diximus, tum quod nullam habeat aliarum, quas retulimus manifestam causam; ideoque aliis postpositis de hoc sermone facimus: etsi quilibet morbosus carus, de quo modo loquimur, malus semper sit, Gale. auctore secundo prorrheticorum. Et ubi breues sinus, Aetij auctoritate curandi sunt taliter affecti, similiter ut lethargici, valentioribus tamen attenuantibus, ac incidentibus utendum erit. Stomachi quoque cataplasmata vna cum hoc, quod calfaciant, etiam corroborandi vim habere oportet; si is quoque pituita refertus, aut immodicè frigidus sit. Aliorum verò curationem nunc scribere tempestiuum non est; peculiare etenim curationes requirunt: quae suis locis fortasse olim dicentur.

De catoblepsia, vel de catalepsi.

CAPITULUM III.

Refrigerato item primo sensitiuo, hoc est, cerebro, alius quidam affectus fieri consuevit, verum non tantum eo refrigerato (ut dicemus) sed aresfacto simul, Galeno teste commento tertij Aphorismi lib. 2. Affectus hic à Græcis inter *καταληψία* interdum *καταληψία* dicitur, velut qui eo affectu laborant, *καταληψία*, quæ *καταληψία* veteres Græci appellabant; Latine verò ea affectio, deprehensio, detentio, seu occupatio dici potest, à quibusdam congelatio dicitur. Qui verò taliter affecti sunt deprehensi, detenti, seu occupati, ac cogelati possent nuncupari. Est namque affectus hic, subita quædam detentio, seu occupatio tum animæ tum corporis, qua qui corripitur repente in illo permanet habitus, quo correptus est. Paulo auctore cap. 10. tertij lib. Ex cuius verbis liquet cerebrum affectum esse, cum is affectus gignitur, nec illud alia via indagari opus est, quam ex eiusdem operationem latione: quam Gal. quarto de locis affect. velit posteriores

cerebri partes magis in hac affectione molestari, veluti in caro anterior pars magis afficitur, symptomaque existit (ut Gal. placuit lib. de diff. sympt.) in genere noxæ functionum animalium principum, & propriæ imaginationis resolutæ, seu absolutæ; quam & reliquæ quodammodo animæ functiones in eo vitiantur, velut, ex eiusdem indicis comprehendendi potest, seruata tamen secundum naturam spiratione, velut in caro, ex sententia eiusdem Galen. quarto de locis affect. Adeo enim hi mente detenti, seu occupati sunt, ut veluti fixos oculos, ac palpebras babeant penitus immobiles; aliquando & easdem apertas habentes, aut nictitant, aut intente vident, adeo ut neque siquis manus oculis ipsorum obtendat, eos claudant, ut testis est Aetius. Voce insuper, ac sensu priuantur, neque audientes, neque respondentes: admovent autem manus suas aliquando ad caput, & oculos, ac nares, velut qui vellicentur, atque hoc non sentiunt. Pulsus similis quodammodo lethargicus est, non tamen ita languidus, nec mollis, iuxta Gal. sententiam lib. de pul. ad tyrones, & quarto de causis puls. præterea horum pulsus æqualis est, lethargicorum verò inæqualis. Alius, & vrinæ supprimuntur iis propter sensuum stupiditatem. Spiritus eorum aliquando densus, aliquando rarus, & per interualla quædam magnum spiritum ducunt. Quo malo quidam ex Gal. condiscipulis correptus fuit, v. z. prorrh. liquet. Iacebat enim (ut ipse inquit) veluti lignum prostratus inflexus, rigidusque atque extensus, videbaturque oculis apertis astantes ita intueri, ut ne conuinceret quidem, nihil tamen loquebatur, verum quæ loquerentur audire se dixit, quamquam non euidenter, clareque; nonnulla item & memoria tenens referebat, præfentesque omnes sese conspiciere dicebat, ita ut quorundam actiones recordatus exponeret, fed neque loqui posse, neque membrum vllum mouere fatebatur, cum videlicet conualuisset. Consequitur autem frigidam, ac siccam cerebri intemperiem, ut diximus, auctoritate Gal. com. aphor. tertij, lib. 2. ex frigidiore, siccioreque materia ortam, veluti Paulo placuit præallegato loco. Verum ut homonymiam vitent, qui eius verba perlegunt, animaduertant in primis eiusdem auctoris verba, cap. 10. tertij lib. non de vera catalepsi, sed de vigilanti comate verba facere: quod vitium assererat idem auctor ca. 6. eiusdem lib. antiquiores Galeno Medicos *καταληψία* vocasse; à quibusdam autem Græcis *καταληψία* dicitur, de quo in sequentibus tractabimus. Denique verò alterum, atque diuersum ait fieri *καταληψία* à vigili comate, simplicem quidem non mixtā habentem causam, nimirum frigidiorē, siccioremque materiam: quæ posteriore cerebri ventriculo repleto malum hoc excitat: quo qui corripitur, ut ipse facit, repente, in illo permanet habitus, quo correptus est, stans scilicet, vel sedens clausis oculis, aut respiciens, quibus verbis de eo catoblepsia, de quo modo mentionem facimus, meminit, illud quod hucusque pauci animaduertunt, quamuis ad obstructionem potius posterioris ventriculi, quam ad intemperie posteriorum cerebri partium consequi ipsum velit. Eiusdemmet causam attulit Aetius, dum dixit ex atri bilis humore contingere. Præter autem iam dictos casus, id comprehendere valebis ex vietus ratione præcedenti, consuetudine, ætate ac laborantibus nativitate, tempore anni, regione, ac cæteris ad frigidum & siccum vergentibus. At quoniam vniuersum

Catalepsi
quid sit.
Que pars
afficiatur.
cap. 2.

dam in cap. de perdita memoria, ac lethargo:

*Περὶ νοσήσεως, ἢ κατὰ φασὶς.
De comate seu de cataphora.*

C A P. V.



Icet nonnulli variè de cataphora, ac comate tractant, nos tamen Hippocratem, ac Galenum, in hoc velut in reliquis sectabimur: nanque consuetudo est Hippocrati quamlibet cataphoram *κατὰ φασὶς* appellare, vt lib. de comate, ac prorrheticorum primo Gale. testatur. Verùm quod ab Hippocrate *κατὰ φασὶς*, à Gal. *κατὰ φασὶς* nuncupatur, nihil aliud volentes significare per cataphoram, seu comam, quàm quandam in somnum delationem, seu proptionem, vt liquet cum præcatis locis, tum tertio de morbis vulgaribus: qua somni delatione, vt Galenus fatetur, nequeut qui taliter affecti sunt, vigilantium munia obire, non apertos habentes oculos, sed coniuventes, ac palpebras claudere cupientes, simulque dormire sperantes. Verùm quoniam horum quibusdam contingit interdum, vt licet clausas palpebras habeant, dormire tamen nequeant, sed plurimum vigilent: quibusdam verò euenit, vt mox dormiant, & profundè, & diu: propterea nõ immerito duas, iuxta Hippocratis sententiam, cataphoræ species lib. de comate Galenus statuit: quarum commune est, quòd eleuare non possunt oculos laborantes, sed mox grauantur, & dormire volunt. Propterea velut commune amborum specierum, coma, seu cataphoram (vt diximus) appellare licet. Quamuis coma somno magis familiare fuerit, ac eius naturæ magis assimiletur. Harum verò specierum eam, in qua dormiunt mox ægri, & profundè, & diu, Coma, seu cataphoram simpliciter interdum, interim verò cum hac adiectione somnolentam, mos est ab Hippocrate, & Galeno nominari propter assignatam causam. Ea verò in qua licet non apertos habent oculos, sed palpebras clausas spe somni conciliandi, tamen dormire nequeunt, sed plurimū vigilant, non amplius simpliciter coma, seu cataphora ab eisdem nuncupatur, neque cum hac additione somnolenta, sed coma vigil, seu cataphora non somnolentia dicitur. Hanc comatis speciem Galeno antiquiores catochon appellabant, Paulo auctore, cap. sexto libri tertij: de quo affectu cum capite decimo eiusdem libri tractasset in primis verbis eiusdem capituli: de alio quodam diuerso catocho à vigilantia comate in fine meminit: quæ Pauli verba malè à quibusdam intellecta nonnullis iunioribus propter homonymiam maximi erroris causa fuisse, veluti in præcedenti ca. notauimus. propterea nos, ne posteris erroris ansam tribuamus, coma vigil, aut cataphorā non somnolentam, relicta catochi appellatione, nominabimus. Cuius in somnis cataphoræ gemine insuper sunt species, iuxta Hippoc. & Galeni doctrinā, quarū altera pigra dicitur, reliqua verò nomine generis nuncupatur. Commune autē amborum est, propter quod & maxime differūt à somnolenta, quoniam loquantur, & delirant, nulli hærentia mēti, & ad assurrectiones promptissimi sunt, si phreniticis coincidat præsertim, quorum nullum somnolentis existit cataphoris. At quicquid sit earum differentis, illud tamen liquet in earundem quauis parte cerebrum esse affectum, vt patet Galeno, tum libro prorrheticorum primo, tum tertio de morbis vulgaribus. Quod insuper coniectari licet ex animalium functionum latione in

Lib. de comate. cap. 2.

1. prorrhetic. com. 1.

Coma, seu cataphora.

quid sit.

3. de morbis vulg. com. 1.

Coment. 7.

Cataphoræ due species cap. 2.

In quo communit.

Prima species.

cies.

Altera species.

cies.

Pauli verba iterum perpendantur de catocho.

In somnis cataphora duplex.

Commune utriusque.

Quis locus in cunctis afficiatur.

Locus affectu.

cap. 3.
Somnolen-
te catapho-
re signa.

Lib. de co-
mate. cap.
2. & 3

Insomniis
signa.

De puls. ad
tyron. cap.
11. 3. de
morb. vulg.
commenta-
rio 3. c. 39
Vigiliis co-
matis, quod
nomine ge-
neris nun-
cupatur si-
gna.
Insomniis ac
pigra cata-
phora si-
gna.

commen. 1.
Cōment. 7.

Diuersa co-
matis cau-
se.

Lib. 6. ca. 7

Si ex viriis
infirmi-
ta.

prædictis affectibus, præsertim principum, & maxi-
mè imaginatiuæ. Quod autem quoduis prædicto-
rum comatum symptoma sit, ab eodem Galeno in
præcatis locis decretum est: verum quod hoc
symptoma imaginationi præsertim tribuatur, defi-
cienti videlicet, & infirmæ existenti, liquet libro
de diff. sympt. Cùm autem qualibet cataphoræ
seu comatis species ex propriis, ac diuersis signis di-
gnoscat distinctè, decreuimus cuiusvis propria
indicia conscribere. Dignoscitur namque quæ
somnolenta est cataphora, præter prædicta signa
communis nō solum ex grati somno, sed quoniam
difficilem habet expurgationem, Galeno aucto-
re commento aphorismi tertij lib. secundi: & pro-
inde libro de comate dicebat, quod si dormiunt
mox, & profunde, & diu; propriamque esse huius-
modi cataphoram lethargicorum, ac semper eis
inesse fatetur, & quod immobiles præterea semper,
& inuocibiles iacent, eis qui profunde dormiunt,
assimiles. At qui insomni comate grauatur, vi-
giles, & versuti sunt, & si phreniticis aliquando co-
incident, audientes vocem, & sonum, facilius sur-
gunt; & si tetigeris partem corporis eorum, mox
oculos cleuant, & ad tangentem aspiciunt; in ipsa
in somnum delatione, vel manum mouent, vel crus,
vel vniuersum corpus eiciunt irrationabiliter, &
repente, & desipienter exiliunt, instar spasmi:
hæcque omnia faciunt, cum eo, quod loquuntur
aliqua non congruè. Hunc affectum medio lo-
co statuendum esse inter lethargum, & phreni-
tim Galeno visum est libro de pulsibus ad tyro-
nes, & tertio de morbis vulgaribus, velut medios
intercedentes inter planè vigiles, & dormientes,
comate vigili affectos asseruit esse. Quod si eo vi-
gili comate capiantur (quod nomine generis ap-
pellatur) ita facile, & multum mobiles existunt;
ut neque deficiant clamantes valde, & moueant a-
liquam particulam vehementer; & si excitaueris
eos, aut loquaris, aspiciunt inconuenienter, & ma-
gis egrediuntur à se, & malum facere tentant, ac
omnino in audiendo promptissimi fiunt, nihil re-
linquentes ab iis, qui summè desipiunt. Si verò
insomni, ac pigra cataphora corripiantur, surgen-
tes magis intelligunt, & non multum mouentur:
& quamuis desipiant, tamen tunc magis, quando
commiseris eos comati, secundum quod maxime
licet eos discernere à cataphoris lethargicis. Ex
quibus omnibus liquet rectè à Galeno tertio de
morbis vulgar. decretum esse comatosos omnes, vel
altis somnis, vel tenuibus, vel vigiliis detineri, pro-
ut diuersimode cerebrum ipsum fuerit affectum.
Nanque eo immodice irrigato, coma sequitur, ut
nonnullis vsuuenit ebriis repleto in ipsa ebriatione
capite, ac humectato valde; interdum autem ex so-
lis vaporibus calidis, & humidis à subiectis partibus
ad caput in febribus delatis, ut Aëtio visum est, i-
psumque implentibus affectio comatosa excitatur.
Subinde ob solam cerebri frigiditatem oritur: est
insuper cum ad ambas has intemperantias cerebri
somnolentum coma succedit: quo casu profundior,
& soporosior somnus erit; velut tenuior, si ab ali-
qua sola frigida, vel humida cerebri intemperantia
ortum fuerit: quas varias cerebri intemperies pro-
ptissime dignoscet, si ea quæ conscripsimus cap. de
memoria deperdita, ac de lethargo consideraue-
ris. Si vero propter virium infirmitatem talis af-
fectus fiat, adeo iam languentium, ut aperta genæ

agri seruari non valeant, præter id, quod ex iis, quæ
præcesserunt, prompte dignoscet, ex iis quoque fa-
cile deprehendet, quoniam ita affecti, postquam
conniuerint, aut nihil profus, aut parum dormiunt,
sed vigilant, nec attollere tamen genas queunt, eo-
rumque pulsus languidissimi, tardi, rari, & parui e-
runt: quo potissimum distinguuntur ab eo coma-
te, quod committit humiditas, & alior. vigil autem
coma oritur, cum tam biliosus, quam pituitosus hu-
mor cerebro molestus fuerit: & propterea mixtam
ipsi permanere affectionem est putandum, ut Gale-
placuit, primo prorrheticorum. Interim verò præ-
copia sanguinis, cum bilis permistione acris, ac mor-
dentis, poterit æger reddi tum comatosus, tum vigi-
lans, grauata quidem ob sanguinis copiam cerebri
facultate, sed à bile vsque adeo irritata, ut somnus
inhibeatur, ut idem præcatis loco testatur, quem
admodum, & libro de comate sæpenumero ebriis
euenire dixit, ut vigiles simul, & comatosi sint re-
pleto in ipsa ebriatione capite; deinde præ graui-
tate ad coma tracto, simul autem & à somno prohi-
bito, multitudine indigesta caput comprehendente.
Vnde quemadmodum causam, sic appellationem
acquisiuit compositam, vigil siquidem coma
appellatur, Paulo teste, cap. 6. lib. tertij, & vniuer-
saliter quidem bilioso humore prædominante,
phrenitizant tales vigilantes: pituitoso autem do-
minante, comatosi rursus deferuntur, ut ipse testa-
tur; & quoties ad finem vsque, tum desipientia, tum
coma persistunt, velut phreniticis euenire solet,
tunc affectionem hanc ex phrenitide, & lethargo
mixtam appellat. Gale. eodem lib. prorrheticorum
quidam vero Typhomaniam vocauerunt. Con-
traria vero hominem prehendent symptomata, ita
ut tum vigilet, tum leuiter in somnum deferatur, &
prout magis, vel minus desipit, seu vigilat, aut ad
somnum deferatur, quoniam prædictorum succorum
magis prædominetur, ac ex aliis vtriusvis humo-
ris redundantis propriis indiciis prompte digno-
scet. Pro causarum autem ipsius comatis diuersi-
tate, diuersa quoque eius prædictiones fieri pos-
sunt; exitiosissimum siquidem est, propter infir-
mitatem virium talis affectus oritur: nec minus
exitiosum erit, si cum calidis, & ficis morbis infi-
gnem cerebri refrigerationem sequatur, ex Gale-
sententia 3. de morbis vulg. si vero frigidam ac hu-
midam cerebri intemperiem comitetur, quæ de le-
thargo prædiximus, de eo prædicenda erunt: mi-
nus tamen periculosum erit, si ab vna tantum cere-
bri intemperatura ortum ducat: velut si ex contra-
riis, magis. Diuersa insuper pro causæ ratione eius-
dem curatio intentanda erit: nam si ex humiditate
tantum somnolentum coma originem ducat; his,
quæ excitant, capiti admotis, curari debet ex acer-
rimo videlicet aceto cum rosas, ac chamæmelo per-
mixto, eo irrigato, ac eiusdem medicamenti euapo-
ratione per nares suscepta. Si ex frigiditate, anchi-
num oleum, seu chamæmelinum calfactum adhibe-
ac in quantum intenta frigiditas sit, intantum cale-
factoria augeantur, ut etiam pulegium, & rutam li-
ceat aliquando in oleo coquere, Aëtio auctore. At
si ex frigiditate, & humiditate simul exciteretur, simili-
curatio, qua & lethargus. Ex virium autem imbe-
cillitate ortum cum iis, quæ eas instaurare valent,
curare tentabis. Coma vero vigil, seu phreniti-
cum, cum ex permixta, ac contraria causa ori-
ginem ducat, contrariis quoque medicamen-

tis curare oportet: partim lethargi, quæ prius diximus: partim phrenitidis, de qua deinceps dicemus. Vtrum autem eorum superare debeat, exuperante humore dignoscitur: nam si pituita bilem superaret, ad lethargi remedia declinandum erit magis: si vero bilis pituitam, ad phrenitidis magis: de cuius tum dignotione, tū curatione decens est, ut consequenter tractemus.

Περὶ φρενιτίδος. De phrenitide.

C A P. V I.

Mortales omnes (ut Galen. inquit i. Prorrheticor.) phrenitim appellant eam affectionem in qua *φρένας*, id est, mentem læsam esse vident, quam *φρένις*, tum *δ' εἰς φρένας* Græci vocant. Proinde ab Hippocrate, eodem Galeno teste præcitato loco, omnes qui mente læsi continue fuerint, phrenitici vocantur, sola febre, ab iis qui *μακρόμενος* appellantur, discrepantes, quoniam continuam demeritiam cum febre acuta phrenitidem appellant. Hunc affectum Aëtius (Polsidonij auctoritate) inflammationem esse membranarum cerebri cum febre acuta, delirium, & mentis perculsionem inducentem, asseruit. Paulus vero cap. 6. lib. tertij ait, quod phrenitis inflammatio membranarum cerebri est, aliquando quidem & ipso cerebro coïnflammatum, aliquando vero præternaturali caliditate existente in ipso. Trallianus autem cap. 13. libri primi inflammationem testatur phrenitim esse cerebri, aut membranarum eius. Nos vero Gale. sectantes cum eo 2. de causis sympto. dicimus phrenitim inflammationem esse secundum cerebrum, & membranas eius: quod quidem ex eiusdem Galen. verbis colligitur, quæ talia sunt. Phrenitis nanque neque simpliciter in calidis consistit succis, sed cum eo, quod inflammationem efficiat secundum cerebrum, & membranas, & i. de Morb. vulg. scriptum reliquit, quod ubi in cerebrum, eiusque, membranas flava bilis fuerit impacta, phrenitides inducit. Qui vero cerebri naturaliter habentis munia nouerit, is ex hominum offensa, quod affectū sit primum, deinde qualisnam is morbis sit, inuenire valebit (eodem Galeno teste prorrheticorum i.) cum exacte definire, vtrum cerebrum, an membrana ipsius primitiue afficiantur, haud magnum vtilitatem asserere potest. In vtraque enim dispositione, ut Galen. 2. de Locis affectis, cap. 9. visum est, capiti succurritur. Quapropter huic rei non ita vehemens studium adhibere oportet; præsertim cum ipsemet testetur phrenitim ipsam potius ex tenui meninge, quam ex cerebro gigni, ut patet 4. de Causis pulsuum. quæ 4. de Præfagitione ex pulsibus, fateatur tenuem meningem, ut quæ cerebrum amplectatur, nisi vnâ cum eo nullum ferè affectum subire posse, nec etiâ cerebrum citra meningem, sed statim impartiri vnius affectus alteri oportet: & si dura meninx, quoniam longissimè à cerebro disita est, affecta esse sola possit. Quare exquisita phrenitis in loco, in quo princeps animæ pars residet, generatur, ut liquet eodem i. prorrhetic. siue autem is qui primo afficitur locus, cerebrum sit, aut membrana tenuis, cum exigui sit momenti querere, ac nullius vsus, iuxta Gale. doctrinam, iure nos inquirere prætermittimus, tantum studiosis liqueat cerebrum in ea affectum esse, illudque constare ex earundem functionum principum læsione, quæ in ipso cerebro

perficiuntur. Dixi autem non ab re exquisitam phrenitim, nam quæ exquisita nō est, ex septi transuersi inflammatione oritur; cuius vitio excitatum delirium parum ab eo, quod in vera apparet phrenitide, distat, adeo ut veteres putarint eodem septo transuerso inflammatione affecto (ut Gale. testis est quinto de Locis affectis, cap. 4.) homines phreniticos euadere; atque ob eandem suspicionem *φρένας*, hoc est, mentem eam partem appellauerunt, tanquam sapienti parti conferat quippiam. Verum nos quo pacto hæc non vera phrenitis, ab exquisita, de qua verba faciemus, distinguenda sit, deinceps ostendemus; cum de vtriusque signis pertractabimus. Illud tamen pro comperto habeatur, quod quævis functio in exquisita phrenitide lædatur, cum & diuersæ lædi possint, in ea ut dicemus, pro varia phrenitidis specie, seu differentia, eius læsio, & perpetua, & prima erit, cum necessario cerebrum læsum esse oporteat primo, aut cum eius meninge. Quisnam autem præter naturam affectus sit phrenitis, ex iam dicta eius notione patere poterit; diximus nanque eam inflammationem esse. At cum in inflammatione duplex particulis affectus oriatur, ut libro de Differ. morb. & tertio de Temperamentis liquet, vnus videlicet in quantitate, alter verò in qualitate; erit ergo phrenitis, cum de genere inflammationum sit, morbus in compositione, primo, & propriè in magnitudine, velut quælibet alia phlegmone est, iuxta Galeni sententiam, decimo tertio Metho. Poterit secundariò dici morbus in intemperie, & ea calida; & 3. in continui solutione. Verum quomodo intelligenda sit inflammatio, cum phrenitim inflammationem dicimus esse, in explorandis eiusdem causis enucleabimus: nunc verò tempus est de eiusdem indiciis pertractare. Exordiemur autem ex propriis eiusdem signis; quæ quidem cerebri affectionem ostendunt: nam propria morborum signa sunt, cum vel perpetuo, vel solis contingunt: cum autem neque solis insunt, neque perpetuo, propria illorum signa non sunt: ob eam rem phreniticorum signorum ea sunt certissima, quæ perpetuo, & solis insunt phreniticis: deinde ab his, quæ perpetuo, sed non solis, velut Gale. primo Prorrheticorum fatetur. Quapropter neque vrinis, ut ipse testatur, neque in deiectionibus, neque in sudoribus, neque in vomitibus signa phrenitica sunt. Adhuc autem & hæc signa phrenitidis bipartita sunt: nam quædam eorum imminentem ipsam, seu iam exordientem, vel futuram dixeris, indicant: quædam vero ipsam factam, seu completam ostendunt, iuxta Tralliani sententiam præcitato loco, & Galen. 5. de loc. affectis, cap. 4. Verum quæ exordientis affectionis notæ sunt, iure prognostica signa eius, quæ iam completa est, esse dixeris, ut liquet primo Prorrheticorum: quamuis & ea quoque phrenitica indicia vocentur. Interim nanque vigiliæ præcedunt, siue etiam somni manifestis imaginibus turbati; ita ut & clament nonnulli, & exiliant: interdum vero adeo agrestis accedit obliuio, ut laborantes aliqui cum matellam petiuisent, meiere tamen neglexerint, aut cum lotium emitterent, matellam ipsam prodere haudquaquam meminerint. Interdum maiori cum tumultu, aut temeritate respondent, præsertim ubi antea fuerint mansueti; atque hi omnes exiguo vtuntur potu propter mentis læsionem, spiratioque ipsius rara est, & magna, pulsus parui, & nervosiores;

In non exquisita qua pars primo afficitur.

Quis affectus præter naturam sit. Lib. de diff. mor. cap. 12. 3. de icter. cap. 5. cap. 1. & seq.

Signa.

Quæ sunt phrenitidis certissima signa, & quæ non.

Hæc quæque bifaria sunt. comment. 4. Imminentis phrenitidis signa.

*Facta iam
phrenitidis
signa.
cap. I.*

nonnunquam occipit dolor infestat. Febris verò semper est continua. At cum ipse affectus increuerit, seu inualescat, oculi eorum vehementer euadunt squallidi, aut ex altero ipsorum acris lachryma effunditur. ac deinde lippitudo innatat, & venę ipsorum sanguine plene videtur: sanguisque ex naribus stillat, quo tempore nihil (quod ex arte ad prudentiam pertinet) respondent. Floccos auellunt, & festucas carpunt, aridioreque febre torquentur, cui non ita magnę in alterutram partem mutationes accedunt: quemadmodum in aliis quibusdam febribus videre est, quę per vigorem quidem grauissime infestant: inclinationes vero habent mitiores. Ad hæc lingua salebrosa quoque est: nonnulli interdum audiendo falli videntur, ac interim mœsti iacent, vix quicquam respondentes; atque dolorifica dispositione affecti, vel acris premente aliquo, haudquaquam sentiunt. Hoc inquam modo exquisita phrenitis paulatim euenire solet: quiescere vero neque subito, neque assatim cōsuevit, prout Gal. visum est, eodem 5. de Locis affect. cap. 4. Proinde licet perpetuum delirium septo transuerso quoque inflammato, excitetur, & propterea quoquomodo cum eo, quod ad exquisitam sequitur phrenitum, conueniat, distinguitur tamen ea (iuxta Gal. sententiam) ex oculorum accidentibus, & sanguinis à naribus stillis, ac spirationis specie, quę in phreniticis magna est, & rara. Vbi vero à septo transuerso delirium ortum fuerit, inæqualis est, vt modo exigua sit, at frequens, modo magna, & angustiosa. Rursus præcordia intendi proprium indicium est illico ab initio septi transuersi affecti, id quod affecto cerebro posterius accidit, parato iam eo, non autem incipienter. Calor quoque circa caput & faciem vehementior est iis, qui ob cerebri vitium delirant: & (vt summam dicam) eorum signorum, quę phrenitidem antecedere diximus, aut nullum apparet, aut si apparuerit aliquod, quid perexiguum est in his, quibus septum transuersum inflammatione laborare incipit. Distinguantur vero phrenitici à reliquis delirantibus, per consensum reliquarum partium cum febre acuta: quoniam in his non adeo valida fiunt deliria, non perpetua, seu assidua permanent, sed auctam febrem sequuntur, remissa verò ea, quiescunt, vt patet secundo de Locis affectis, cap. nono, quemadmodum & ab ea infania, quę Græcè *μωρία* dicitur, sola febre discrepat, vt antea meminimus. Huius autem exquisitę phrenitidis tres inquam inueniuntur species, seu differentię: quarum duę simplices sunt, ex quibus deinde tertia componitur, vt patet quarto de Locis affectis, cap. secundo. Quippe sunt quidam phrenitici, qui de iis, quę oculis afferuntur, recte quantum ad sensitiuam notitiam pertinet, seu ad imaginatiuam spectat, iudicant; cogitando vero à naturali iudicio aberrant. Alij rursus cogitatione quidem minime falluntur, cum eis veluti errans sit imaginationis motus: plerumque vero in vtriusque simul delirium consistit, sensus videlicet, seu imaginationis, & cogitationis vitio laborantes, parum probè imaginando, ac parum aptè ratiocinando. Attulitque idem Gal. ex eplum lanifici pueri tum prædicto loco, tum lib. de Different. symptom. pro declaranda prima differentia. Secundam autem differentiam non solum in alijs, verum in seipso, cum puer adhuc esset, expertum esse testatur. Illud quod Theophilo medico ægrotanti contigit, vt eodem lib. 4. de Locis

*Quibus in
dicis ipsa
distingua
tur ab ea
quę ex sep
to transuer
so oritur.
Loco cita
to.*

*Quibus à
ceteris de
lirantibus
distingui
tur.*

*Quibus à
furore.
Exquisita
phrenitidis
differentia
tres.*

*De differe
ntiis
cap. 3.
4. de locis
affectis. ca.
2.*

*De diffe
rentiis
cap. 3.
Quomodo
dicitur tres*

affect. & de Differ. sympto. patet. Quomodo autem quispiam valeat prænominatas differentias, seu phrenitidis species, sigillatim dignoscere prolixa oratione opus non est; cum ex deprauato cuiusque functionis motu, aut ex vtriusque, si composita fuerit, prompte percipiat, si quis prius norit, quid sit vtriusque facultatis munus. Euenit autem interdum, vt illa se feructur memoria, interim vero vt simul cum eis afficiatur: at non propterea sic temere in Gale. doctrina asserendum est has functiones in diuersis cerebri partibus perfici, cum & vna lædi possit, altera illa permanente, quamuis Aëtius illud sentiat, cum valde alienum sit ab eius sententia, vt in quodam nostro compendio longiori discursu ostendimus, ac qua ratione illud fieri possit demonstrauimus: quamuis in vno, eodemque loco, hoc est, in cerebri corpore, perficiantur. Illud tamen non omittam, priusquam ad narrandas phrenitidis causas deueniam, cum ea sit inflammatio, vt diximus, sub quo inflammationis significato comprehendatur. Nanque Gale. communissimo eius significato vtens secundo de arte curatiua ad Glauconem, dixit aliam esse siccam, aliam esse humidam inflammationem: nec ab ea sub sicca contineri potest, cum ex quibusdam oriatur succis, vt dicemus. Insuper & hæc, quę humida est, fieri potest ex cuiusvis humoris superabundantia, potissimum cum sanguine, vt secundo de locis affectis, ac commento aphor. 33. sexti libri patet; communi quodam significato ea vtens, quomodo nec ipsa phrenitis inflammatio dici posset, cum ea oriri non valeat ex cuiusvis succi redundantia, etiam cum sanguine permixti, vt dicemus. Interim vero inflammationis nomine vitur, velut etiam communi quodam non ad omnes inflammationes, sed ad eas tantum, quę ex calidis succis ortum habent, siue is sanguis fuerit, siue bilis flaua, aut ex ambobus simul humoribus genita fuerit: sub quo significato, & ipsa phrenitis comprehenditur: nam ex calidis succis, quamuis non omnibus, originem ducit, vt infra patebit. Quę ratione sit, vt quamuis Gale. alio modo inflammationis nomine vtatur, & quanto magis propriè ipsam sumendo, vt sit tumor quidam ex sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem obtinente, præter naturam excitatus, cum vehementi dolore, calore, tensione, ac pulsu; phrenitis tamen ipsa ab hac inflammationis appellatione secludatur, cum nec ipsa à sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem habente excitari possit. Ex quibus liquet phrenitum ipsam exquisitam propterea inflammationem dici, quoniam ex calidis succis ortum habet, non siquidem omnibus, sed ex ipsa bile, cum videlicet locum, in quo princeps animę pars residet, prehenderit, eodem Galeno teste primo prothreticorum. At quoniam ea non vnam tantum habet denominationem, & differentiam, cum alia pallida bilis dicatur, alia flaua, seu rufa, quę iterum immoderatus exalfecta, assata flaua bilis nominatur; ex qua istarum exquisita phrenitis excitetur, non iniuria quæret quispiam, cui respondebimus nos cum Galen. tertio de locis affectis, ac Tralliano, præcitato loco, eam oriri posse ex quauis prænominata bile: nam interdum à pallida ortum contrahit: interim flaua eam parit: nonnunquam ab eadem flaua præassata dignitur. Illud verò hoc modo inuestigare debebit, quando ex prædictarum aliqua excitetur: namque

nanque ex pallida bile si generetur, mitior erit, & phrenitis, & delirium, & febris; illudque non absque ratione: nam cum seroso recremento flaua bili commisto pallidam constitui contingat, ut Galen. visum est decimo de simplici medicamento- rum facultatibus, non mirum, si mitior ea fuerit. Si vero ex flaua bile excitetur, multo vehemientior phrenitis erit, febres maiores inducet: cum & ipsa flaua bilis propterea colore flaua sit, quoniam plusculum exalfecta est, ut praecitato loco Galen. placuit. At ubi flaua bilis immoderatus exalfecta, & plus aequo adusta fuerit, seu praeslata, phrenitis efficiens, dementia occurrit ferina, & melancholica: & propterea efferata dicitur: cuius ratio cunctis facile patere poterit. Patet denique ex his, quae bile phrenitis gigni possit, ac quibus indicis eiusdem causa inuestiganda erit. At si quis dixerit, Pauli auctoritate fretus cap. 6. libro tertio, ex redundante sanguine phrenitis oriri posse; respondimus nos, aut Paulum non de exquisita phrenitide intellexisse, quae ex sanguine, cui admista fuerit flaua bilis gigni posset, vel de sanguine feruescente, & tenuissimo secundum substantiam intelligere voluisse, qui flaua quidem bili similis existit, assimileque parit affectus, Gal. teste secundo de arte curatiua ad Glauconem, quinimo & ipse flaua bilis dici propter. Quapropter cum Gal. concludamus, exquisitam phrenitidem, quae inflammatio cerebri, & membranarum eius exilit, ex pallida bile, aut flaua, seu eadem flaua praeslata originem ducere. Quo autem pacto diuersae eius causae dignosci valeant, ex iam dictis liquet: reliquum est igitur, ut eius prognostica describamus; deinceps vero curationem. Quod autem ea acutissimum, periculosissimumque sit affectus, omnibus in consensio est, iuxta Tralliani sententiam, & Gal. progn. vniuersum phrenitidis genus exitiale esse testatur, simul cum Hippoc. Verum idem Hippocrates aphorismo 53. sexti libri asseruit, desipientias, quae cum risu fiunt, securiores esse: quae vero cum studio, periculosiores: quo loco per securiores intellexit minus periculosas: cum nulla desipientia secuta sit, velut Gale. eodem loco exponit. Quod fit, ut haec sententiam non aduersetur ei, quae dicta est primo progn. Hoc idem Celsus confirmavit lib. 3. ca. 18. dum dixit, interdum in accessione aegros desipere, & loqui aliena: quod non quidem leue est, neque incidere potest, nisi in febre vehementi; non tamen aequae pestiferum est, ut phrenitis. Idemmet Hippoc. aphor. 72. quarti lib. vrinam albas, & perspicuas malas esse in delirantibus dixit: & Gale. 3. de morbis vulgaribus acutissimam esse phrenitidem testatur, quae primo statim die vna cum febre inuadit: atque omnes fatetur, qui ita phrenitide perciti essent, infra septimum diem mortuos esse: per paucos autem, hosque raros, hunc superasse. Grauiissima quoque phrenitis est, quae ex perusta bile gignitur, ut Paulus inquit. At tempus est ad eius curationem accedere: pro qua, aer primo alterandus, hyeme quidem, ut Aetio visum est, ad tepidum, aestate vero ad frigidum: nam dixit, Ager igitur decumbat hyeme quidem in domo tepida, aestate vero frigida. At Paulus voluit, quod aeger decumbat in loco tum lumine, tum temperie moderato, & variis quibusdam picturis libero. Ut vero hi conciliantur, prohibendus est, mea quidem sententia, aer extreme frigidus, etiam in aestate: de quo noluit Aetius intelligere: quoniam & inflammationi

nocua sunt impense frigida, eiusque causam denudando, prohibent digestionem: nec impense calidus eligendus erit, etiam in hyeme, cum inflammationem & irriter, & foueat, ac eius causam adaugeat. Quod vero ad lucem, seu tenebras spectat, voluit Aetius, quod hi qui ad lucis splendorem respiciunt, in lucida domo degant: at qui ad lucem efferantur, in tenebrosa domo decumbant. Trallianus autem iussit aerem magis lucidum, quam tenebrosum eligendum esse, ut aeger per huius sensum ad consuetorum perceptionem, ac conscientiam perueniat. Quod vero ad aeris qualitates primas eligendas, quod temperatus existat, voluit quod animalis spiritus temperie ipsius refocilletur, ac relaxetur, vitandusque sit admodum crassus, humidus, frigidus, aut calidus, propter assignatas causas. At Celsus quod ad tenebras attinet, aut lucem, hisce vitur verbis, Fere vero antiqui tales egros in tenebris habebant, eo quod eis contrarium esset exterreri, & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades tanquam tenebris ipsis terrentibus, in lumine habendos esse dixit. Neutrum tamen perpetuum: est alium enim lux, alium tenebrae magis turbant: reperiunturque, in quibus nullum discrimen deprehendi, vel hoc, vel illo modo possit. Optimum itaque est utrumque experiri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce; eum qui lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, aeger, si vires habet, loco lucido; si non habet, obscuro continendus est: quam Celsi sententiam perpetuo seruandam esse censerem, quanquam praedicti omnes veritatem asserant, si eorundem mens rite percipiatur. Quantum vero ad motum, & quietem spectat, iussit Paulus phreniticos in quiete, quoad eius fieri licet, contineri, si diuites fuerint, a famulis, si pauperes, vinculis conuenit; nam inordinata motio vires prosternt, ac aegrotos macilentos reddit, potissimum delirantes. Galen. teste commento aphorismi 28. secundi libri. Alia etiam de causa pedes deligaturis constringi debent, nempe quo humores deorsum reuellantur, ut eidem Paulo placuit: huius quoque sententiae est & Trallianus: qui propterea inhibendum esse violentum motum asseruit, quoniam praeter iam dicta, & morbum excitat, & somnum impedit: de vinculis similia proferens, quae Paulus. De somno autem dicebat Celsus, Omnibus vero sic affectis somnus, & difficilis, & praecipue necessarius est: sub hoc enim plerique sanescunt: propterea quae somnum moliantur, adhiberi debent intus, ac extra, de quibus in sequentibus mentio fiet, ac omni ratione vigiliae excidendae sunt Tralliano auctore. Subluenda interim alius est leuibus clysteris, decocto videlicet maluarum, violarum hordei, papaueris capitum, ac foliorum betae, & paucis sale additis vnc. iij. vel iij. olei violacei, vel de papauere, seu amygdalarum dulcium, duabus mellis violacei, & j. calidae tractae, seu calidae fistulae: licebitque interdum, si haec non suffecerint, drachm. iij. vel iij. diacatholicon addere. Ventris vero alitudo penitus vitanda erit, cum & morbum, & causam adaugeat. Ad locum autem quo aeger decumbat, amici & quidem gratissimi ingrediantur, qui nunc blandae aegrotum alloquantur, nunc acerbius corripiant, ut inquit Paulus. Celsus vero aduersus omnium insanientium animos asseruit necessarium esse gerere se pro cuiusque

5. de loc. af-
fe. cap. 6.
12. meth.
cap. 4.

non sit, at tutius tepida potius vti, vt placuit Tral-
liano, & potissimum si septum transuerfum coas-
ctum sit. Phrenitici vero statim ab initio venam
incidendam esse, modò valens virtus sit, vt sine no-
xa missionem sanguinis tolleret, ac nihil eorum
prohibeat, quæ de secunda vena perpendenda sunt,
cuncti ferè artis medicæ auctores cum Galeno 13.
meth. consentiunt, præter Asclepiadem; qui perim-
de esse dixit his sanguinem mitti, ac si trucidetur,
rationem hanc secutus, quòd neque insania esset,
nisi febre intenta, neque sanguis in remissionis eius
rectè mitteretur: quem Celsus, & rectè quidem in-
probauit tum propter alia, tum quoniam continua-
ta quoque febris habet tempora; quibus & si non
remittit, non tamen crescit. Sanguis ergo absque
controversia, aliis consentientibus, statim iis mit-
ti debet, tanquam primum omnium, & maxi-
mum futurum præsidium, prout omnes cõueniunt.
Verùm Aëtius mediam cubiti venam secandam ef-
se præcipit. Paulus verò protinus & cubito sangui-
nem mitti debere iussit, ex qua autem vana, nõ in-
ueniunt: quanquam illud ratione determinare haud
difficile erit: nam si ab initio vsque ad partum diè
phrenitis irruat vigenti ætati, bonæque corporis
habitudini, ac cuncta sanguinis multitudinem in-
dicent, secunda primò erit præcepto Aëtij media
vena. At si non adeò fuerit sanguinis cum bile re-
dundantia, & ex transmutatione alterius morbi
phrenitis succedat, potissimum si alia euacuatione
præcesserit, tunc humeralis, seu externa vena in-
cidenda erit: quòd si phreniticus manum non por-
rigat, quòd saepe accidit, ex recta in fronte ven-
a sanguinis missio molienda erit, ex Tralliani, & Pau-
li sententia. Facies autem id rectè, si collum arti-
ciosè fascia lanea, seu linea constringas, vt vas at-
tollatur. Quantitas autem pro viribus detrahatur,
& minus quam oporteat auferatur, ob plurimam,
quæ in ipsis ex vehementi motu contingit, dissipati-
onem, ac exhalationem, & propter laxitudinem,
at si videbitur, iteranda potius erit, vt si prior ex me-
dia facta fuerit, secundo loco ex externa, & tertio, si
opus fuerit, ex frõtis vena sanguis detrahatur. Quòd
dem frõtis vena secetur, & vltimo, si opus fuerit,
cucurbitulæ in occipitio figendæ, ex quibus sanguis
scarificatione trahatur: aut si noluerit æger bra-
chium porrigere, & propterea recta in fronte vena
fuerit incisa, secunda vice, si oportebit, ex eadem
sanguis mittendus erit: & demum si intererit, cu-
cubritulæ in occipitio figendæ. Post sanguinis eua-
cuationem, caput oxyrrhodo madefaciendum erit,
sed ex communi omnium consensu, illudque in prin-
cipio admoendum: nam repellendum à capite hu-
mor est ipsi quæ alterandum, ne immodi-
ca caliditate liberalius humores attrahat, atque
iccirco eis repleatur: quamquam nec illud capi
admoere tentandum erit, nec aliud quodpiam
medicamentum, nisi vniuersi corporis curatio-
ne præmissa: id quod commune præceptum est
in omnibus morbis, ac observare oportet in
cunctis topicis, hoc est, localibus vocatis re-
mediis, Galeni decreto, cum primo de com-
positione medicamentorum secundum locos, &
tum tertio de locis affect. vt supra retulimus, quo
etiam tempore odoriferum parari potest eundem
præstans vsum, excipiens aquæ rosarum, & myr-
tillo-

tillorum ana vnc. iij. sandalorum rubeorum, citri-
norum, & corallorum rubeorum ana drac. j. aceti
rosacei vnc. j. & s. misceantur simul. Interim non-
nulli alterantes syrups competunt, vt rosaceus, vio-
laceus, ex nymphaea, ex cichorio, seu endiuia, ac de
papauere. Verum nunquid purgatione, vbi opus
fuerit, vtendum sit, non admodum liquet, cum ne-
minem Græcorum inuenim ipsam præcipere:
quamuis Celsus videatur ipsam osciscisse, dum di-
xit, Nec minus deliberari potest an alius ducen-
da sit. Inter Arabes, Auicenna proprio capite de
cura phrenitidis, redundante flaua bile, magis quam
sanguine, purgationem laudauit. Verum nos (li-
cet Græci auctores de ea mentione non fecerint,
forte quod purgantia medicamenta sint natura ca-
lida, humoresque commoueant, & propterea in-
flammationem augeant, tum etiam quod cum ea
febris sit vehemens) ipsam tamen non negabimus,
vbi vltus fuerit, nec propterea tantis pugnabimus
viris, cum nec ea medicamenta purgantia, quæ talis
sint natura, ac eorum temporibus reperiebantur,
admittimus, sed tantum ea, quæ cum hoc, quod
feliciter purgant, ac fluentes succos ad infernas
partes reuellunt, nec inflammationem, nec febrem
adaugent, imò & vtriusque mitigant, ac curant,
quæ si nouissent, approbassent vtrique, quamquam
nec eam, quæ ipsi nouerunt purgantia medica-
menta, damnent, licet non præcipiant. Nam &
ipse Galenus quarto method. medendi, auctoritate
Hippocratis, interdum in morbis magnis, non
modo venæ sectione, verum, & purgatione reuul-
sionis tantum gratia vtendum esse præcipit, etiam
nulla humorum plenitudine existente, aut redun-
dantia vitioli succi. Qua de re vtendum esse pur-
gantibus medicamentis, quæ aut calida non sint,
aut parum caliditate participant, cum ipsis tamen
frigida miscenda medicamenta censerem: ea sunt
manna, cassia fistula, saccharum violaceum, seu sy-
rupus ex pluribus infusionibus violarum, aut ro-
sarium, tamarindi, & interdum diacatholicon, aut
triphera persica, seu rhabbarum, modò cum ali-
quo prædictorum permista sint, poterit autem sic
componi. Recipe tamarindorum vnc. j. fiat deco-
ctum cum florum violarum borraginis, buglos-
si, & hordei mundi ana drac. iij. in aqua: in cuius
decocti iure dissolvas mannæ electæ vnc. ij. s. vel
iij. aut cassiæ fistulæ vnc. j. & s. vel sacchari viola-
cei vnc. ij. seu syrupi ex pluribus infusionibus viola-
rum, aut rosarum vnc. iij. adde demum rhabbari
vigorati infusi drac. j. vel scrup. iij. diacatholicon,
seu triphera persicæ drac. iij. vel iij. & fiat porio.
Verum si quis rhabbarum aueretur propter cor-
poris temperaturam, ætatem, aut habitum, seu anni
tempus, regionem, ac cæli statum calidum, poterit re-
liquis bene vti, eorum quantitatem accommodando,
prout ritè videbitur. Interim quoque frictionibus
vtendum leuibus pro reuulsione, eo potissimum
tempore, quo & delirium, & febris non valde auctæ
fuerint, sed potius remiserint, & præsertim inferio-
res fricentur partes. Caput autem rosaceo cum mo-
dico aceto irrigetur, ætate quidem tepido, hyeme
verò moderate calido, quod in cunctis aliis medi-
camentis seruandum erit topicis: & si ambiens frigi-
dior fuerit, commodum est & chamæmelinum ex
a quo ipsi admittunt, velut ipse illustrem Indicum
Piccolhomineum, Ducis Amalfæ filium hoc medi-
camento à phrenitide, cum à cunctis medicis esset

destitutus, liberaui, facta ex eo irrigatione supra co-
ronalem commissuram, capillis prius tonsis. Po-
terit insuper parari decoctum ex rosis, violis, hyo-
scyamo, lactucis, nymphaea, ac corticibus papau-
ris, cui miscendo rosacei, & chamæmelini quanti-
tatem moderatam, aut rosacei solum in aëris con-
stitutione calida, seu æstate, & albi aceti parum, ir-
rigatio similiter fieri potest: odorem quoque na-
ribus obiiicimus: ac nares ipsas intus, vel frontem
ex similibus medicamentis illinimus, etiam cum in
summo incremento phrenitici fuerint, teste Gale-
no 13. method. Quippe sopire, vt ipse asserit, ac stu-
pefacere principem facultatem oportet, cerebrum
scilicet, quod supra modum incaluit, refrigerando:
ex quibus etiam assidue facies proluatur, vt Aëtio
visum est. Vbi verò diu hoc vitium moram traxe-
rit, Galeno, & Aëtio testibus, ea adhibenda medi-
camenta sunt, quæ discutiant, ac crassos vapores
transpirare faciant, velut si serpillum, thymum, aut
spondilium, melilotum, & althæa oleo coquantur
rosaceo, vel chamæmelino, quo demum caput irrigan-
dum, aut madefaciendum erit, atque vapor per na-
res suscipiendus. Verum in hoc magnopere ani-
maduertant Medici rogo, ne sic temerè prædicta,
seu alia, quæ discutiant medicamenta calida phre-
niticis admovent, nisi transacto eius incremento,
inclinanteque vigore summo; nam si prius appro-
ximentur, maximum parabunt discrimen, & fortè
ægotantis perniciem, inflammationem siquidem
augendo: nec minus animaduertant queso in ap-
proximandis, velut vulgus Medicorum hodierno
tempore vtiur, catellis, seu gallis: cum si in princi-
pio, ac summo incremento eis vtaris, inflammatio-
nem irritabunt, & febrem. In fine verò summi vi-
goris, ac inclinatione rectè fortè eis vtaris: quo et-
iam tempore aque potabilis balneo temperatè ca-
lido, præsertim vbi siccitas, & vigilie plurimæ vr-
geant, lauare eos non nocebit, & si febricitent:
cum ad bonam temperiem ex eo reuertantur, & in
posterum delirio, & febri liberentur, Tralliani de-
creto: post quod & liberaliter vngere conuenit. Il-
lud præterea menti tenendum, quod in quacunque
phrenitidis differentia, seu quauis principe func-
tione affecta, perpetuò medicamenta iuxta capitis
commissuram coronalem approximanda sunt; tum
propterea, quod non in diuersis cerebri partibus
prædictæ functiones exerceantur, sed in eademmet
se, iuxta Galeni sententiam, vt alibi fusius decla-
rauimus; tum etiam quod per eam partem prom-
ptius non modò facultas, sed etiam substantia me-
dicamentorum penetrare valet, velut prius in capi-
te de lethargo ad mentem Galeni, dictum est. At
cum dixerimus somnum solum, & maximum esse
delirantium remedium, propterea non immeritò
commemoranda hinc duxi, quæ ipsum moriuntur,
tam intus, quam extra adhibita: nam pro oxyrrho-
dino, ac iam dicta irrigatione, posset caput irrigari
cum oleo de nymphaea, violaceo, seu ex papauere,
paucò aceto addito: aut decoctum fieri ex lactuca
ac foliis violarumq; , tū floribus, tū foliis, hyoscy-
amo, rosis, solano; capitibus papaueris, albi & nigri
mandragoræ pomis, seu radicibus, semper aceti pa-
rum miscendo, ex eoque vel caput irrigando, vel
ipsum olfaciendo. Naribus insuper, ac temporibus
cum paucò aceto populeone vnguento vti poteris,
ac fronti. Sub cervical papaueris capita, aut mād-
goræ mala subdantur, vt præcipit Aëtius. Confer

etiam aliquid ad somnum filanus iuxta eadens hoc est, aqua riuus, ut inquit Celsus, faciemque assidue proliui præcipito ex aqua, in qua papaueris tum albi, tum nigri capita sint cocta; in potu insuper danda est aqua, in qua papauer, aut hyoscyamus decocta sint, ut idem Celsus refert pondere vnc. iij. aut drac. j. alicuius somniferi antidoti, ut triphera magna, aut eius quæ requies dicitur, seu philonij Romani, vel perlici tribuas: in quorum assumptione illud obseruandum, ne in vigore, sed in exacerbationis declinatione dentur. Carterum assiduum visum stupefacientium pharmacorum, potionum, irrigationum, ac illitionum vitare oportet; facile enim in his, ut Aëtius refert, qui immodicè perfrigerantur; transitus fit à phrenitide in lethargum: quod fit, ut quem obdormire volumus, excitare postea non possumus. Si etiam vires imbecillæ fuerint, tunc maximè vitabis nequid torpori, somnoque inducendo accommodum exhibeas: nam in his, qui infirmas vires habent, Trallianus teste, non vulgaris noxa; imò interdum mors talium potionum comitantur. Liqueat igitur ex his non modò phrenitidis curandæ ratio, verum & immodicæ vigiliæ, necnon & delirij quouis modo in febribus geniti, cum videlicet adeo urgeat, ut & ipsi quoque quamuis per consensum excitetur, ac febrium symptoma sit, non absque ratione succurrere oporteat, ne videlicet ex eo cerebrum ipsum per se facile afficiatur.

Que obseruanda sint in exhibendis anodynis medicamentis mentis torporem infertentibus.

Περὶ μελαγχολίας.

De melancholia.

CAP. VII.

2. de causis sympto. cap. 7.

Sub delirij nomine, quod Græci *ῥαφροσύνῃ* appellant, non modò phrenitis, ac quod in acutis febribus excitari consuevit, continentur, Galeno teste secundo de causis sympto. verum etiam duæ aliæ species, seu differentie, quæ quidem citra febrem oriri solent: quarum una melancholia tum à Græcis, tum à Latinis dicitur, reliqua vero *μανία* Græcè, Latine insania, seu furor nuncupatur, de his propterea non immeritò pertractabimus, de melancholiâ prius verba facientes: quæ quoniam inter eos connumeratur affectus, ut Galeno visum est secundo Methodi medendi, & tertio de locis affectis. qui à causâ nomen sumpserunt, propterea melancholiæ nomen impositum ei est, quod fit, ut Paulo lib. 3. cap. 14. sic describatur. Melancholia delirium quoddam est sine febre, ex melancholico humore maximè nascens, qui mentis sedem occupauerit: nam quamuis non vnus sit eius generationis modus, ut dicemus, cunctis tamen melancholicis commune est, quòd cerebrum eis afficiatur, siue per essentiam, siue per consensum: quod inspiciens Paulus in eius descriptione innuit cerebrum in ea affici. Hoc idem Galenus ante ipsum tertio de Locis affectis cap. septimo, decretum reliquerat. Patere insuper poterit ex principis functionis læsione aliqua, cum dictum sit eam quandâ esse delirij speciem: & propterea in ea necessarium esse aliquam lædi functionem principem, quæ non nisi in cerebro perficitur, quæ de re & ipsum affectum erit; nam quòd in cerebro consistant omnes principalium animæ virium affectus, in confesso habent omnes medici, ut tertio de Locis affectis cap. 5. liquet. Nunquid autem ut instrumentalis, vel ut similis pars, cerebrum ipsum in me-

2. meth. c. 2. 3. de loc. aff. cap. 7.

Melancholia quid sit.

Que pars in ea afficitur.

Nunquid ut simi-

lancholia afficiatur, idemmet Galenus eodem tertio de Locis affectis testatur, cum dixit. Vbi verò in ipso cerebri corpore melancholicus succus abundat, eam insaniæ speciem quam Græci *μελαγχολίαν* vocant, efficit: quod fit, ut neque subito eueniat, neque affatim solutur: nam totius substantiæ cerebri temperies mutata est. ex quibus liquet cerebrum, ut similem partem, & non ut instrumentalem in melancholia læsum esse: quod quidem ante Galen. Hippocrates sexto de Morbis vulgarib. confessus est, cum dixit, Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur, & contra, morbo comitiali laborantes efficiuntur melancholici; atque horum vtrumlibet magis accidit, prout vel in hanc, vel in illam partem infirmitas repit: si enim in corpus, epileptici, si verò in mentem, melancholici redduntur. Cum verò in hoc affectu cerebrum per essentiam læditur, propria ipsius melancholiæ symptomata, quæ infra narrabimus, auctiora videbuntur, nec alia symptomata in aliqua aliarum partium prius apparebunt. At si prima symptomata in aliqua corporis parte, vtpote circa vētriculum inceperint, & demum ipsis auctis melancholica sequatur affectio, haud ab re existimandum erit, primitiuam affectionem non in cerebro consistere, sed ipsum per consensum affici: quo casu nec propria melancholiæ symptomata grauiora apparebunt, ut fusi infra dicemus. Sufficiat autem modò non ignorare cerebrum necessario esse affectum in ipsa melancholia quomodocunque ea excitetur. At nunquid morbus sit hic affectus, vel symptoma, non omnes consentiunt: quidam nanque, quod in morborum numero reponatur, existimant, qui licet magnæ auctoritatis viri sint, parcant mihi, si aliter sentiam cum Galeno, dicamque symptoma, & non morbum esse in genere noxæ functionum principum, cum earum quædam deprauata sit functio, velut tertio de Locis affectis, ac secundo de Causis sympto. cap. 7. liquidò ostendunt, dum dixit, Melancholicæ autem mentis variæ sunt species, prout in ipsis particulatim dolose imaginationes apparent. Patet ex iis verbis, imaginandi functionem, non cogitandi, nec memorandi læsam esse, hoc idē confirmauit Aëtius proprio capite de melancholia, dicens, Melancholica deliria multiformia quidem sunt, ob particulares corruptas imaginationes. & Trallianus cap. 17. lib. 1. assererat, quod non omnes melancholici eadem symptomata sustinent, neque similiter eisdem imaginationibus agitantur. Quòd igitur imaginatio tantum melancholicis lædatur, eaque deprauata sit, ac veluti errans, ex iam dictis patet, cogitandi functione, ac memorandi manentibus illæsis, cum circa visâ decipiantur, & propterea cuiusvis melancholiæ propria indicia sunt, metus, & mœlinitia, absque manifesta causa quemadmodum si propter causam manifestam: hæc incipiant, longoque tempore perseuerent, adhuc melancholiam significant, prout Hippocrates, & Galenus decretum reliquerunt, Aphorismo 23.

melancholia est morbus comitialis.

melancholia est morbus comitialis.

melancholia est morbus comitialis.

melancholia est morbus comitialis.

melancholia est morbus comitialis.

melancholia est morbus comitialis.

melancholia est morbus comitialis.

melancholia est morbus comitialis.

melancholia est morbus comitialis.

rismo 23. sexti libri. Metuunt enim, & tristantur omnes, odioque habent homines, vt inquit Paulus, nec si roges eos, quamobrem mereant, reddere causam possunt: nam sine causa omnes mesti sunt, vt Galenus inquit, ac frequenter coguntur in lachrymas, & deserta loca potius appetunt, hominumque incipiunt vitare consortia: aliquando rursus suam sententiam redamnantes vitæ solatio delectantur, Theodoro Prisciano teste, libro secundo, cap. 5. ad Timotheum: timent insuper cuncti melancholici, nec aliquo tempore timor eos deserit, licet non cunctis idem sit timoris modus: quoniam præter naturam eis visâ non semper eodem genere continentur, vt Galeno visum est tertio de Locis affectis, cap. septimo. Cæterum nihil mirum si eis timor, merorque accidat, siquidem eorum, quæ extra corpus sunt, nihil videmus, quod nos perinde terreat, ac tenebræ. Ergo cum tenebræ rationalis animæ parti sunt circumfusa, necesse est hominem timere, vt qui semper vnâ cum corpore suo timoris causam circumferat. Quod enim nobis extrinsecus sit, vt inquit Galenus secundo de Causis symptomatum, cap. vlti. altissimis tenebris circumdatum nobis ærem ad tempus aliquod occupantibus, id melancholia vitio laborantibus ab interno, & ipso corpore contingit, vel nigra bile cerebrum occupate rationalis animæ sedem, vel aliqua melancholici halitus exhalatione, qua ratione fit, vt nonnulli ipsorum mortem, atque alia quædam haudquaquam timenda, timere videantur: si quidem alius, vt Gale. tertio de Locis affectis testatur, testam se factum putauit: atque iccirco obuiatibus cedebat, ne collideretur. Alter gallos cantare audiens, vt hi halarum, sic ille brachiorum plausu, latera quatens, animantium sonum imitatus est. Fuit item alter timens ne Atlas, qui mundum sustinere dicitur, grauatus sub tanto onere, ipsum à se excuteret, atque ipse cum illo collideretur, ac nos quoque cum ipso periremus. Sunt autem alia huiusmodi infinita eorum visa, seu phantasmatum, vt propterea Trallianus dixerit, Nouimus autem eiusmodi humorem etiam alias infinitas peregrinas, & multiplices imaginationes inducere posse. Differunt autem inter se melancholici; nam licet omnes timeant, mereant, vitam damnent, odio habeant homines, non tamen omnes mori cupiunt: nam nonnulli mortem perimeunt: quidam etiâ adeo alieno, atque extraneo animo sunt, vt qui simul & mortem metuunt, & tamen mortem sibi consciscant: cum præter naturam eis visâ, vt Galen. inquit eodem tertio de Locis affectis, cap. 7. non semper eodem genere contineantur. Excitatur autem melancholica dementia, quauis ea fuerit, ratiocinatricis animæ sede, hoc est, cerebro intemperato, ac tenebris simili reddito; porro nigrescit aliquando hic humor supercalefactus, aliquando superfrigidus. Aetio teste: quæ intemperies rationabiliter frigida, & sicca erit: quoniam melancholicus succus hanc efficiens, talis est naturæ; quò fit, vt non modò, quòd tenebris simile à melancholico succo reddatur cerebrum, propterea melancholia gignatur: vt quidam falsò ausi sunt Galeno imponere; verum etiam quia frigidum ipsum, & sicum ab eo redditum est, vt patet eodem secundo de Causis sympto. cap. 7. Nam quamuis nigra bilis in duplici sit differentia, vt liquet tertio de Locis affectis, cap. 7. 14. meth. cap. 9. lib. de atra bile, cap. 3. & sexcentis aliis in locis; alia nanque est

veluti fax sanguinis, quæ admodum spissa est, facibus vini haud absimilis: quam nigram bilem melancholicum succum, seu melancholicum sanguinem nominare consuevit Galen. & hæc non rectè atra bilis appellari potest; nominibus verò abutentes aliquando atram bilem vocamus; quoniam si non prius euacuetur, paulò post atra futura est, Galen. auctore comment. aphorism. 53. sexti libri. Alia verò multò est essentia tenuioris, quàm prædicta; videntibusque eam, & olfacientibus acida videtur: etiam terram radit, attollit, & fermentat, atque ampullas, quales feruentibus iusculis supernare videmus, excitat: quæ ex præstata flaua bile, seu sanguine, vel prædicto melancholico succo oriri consuevit: & hæc propriè atra bilis nominatur: ex qua melancholica iam dicta affectio non excitatur: nam hic humor ubi in cerebro continetur, ferina deliramenta induceret, vt dicemus, cum de mania pertractabimus. Verum ex altera nigra bile, quæ rectius melancholicus succus nuncipatur, melancholici fiunt, vt patet tertio de locis affectis, & commeto aphorismi vndecimi sexti libri; quamuis quidam licet temerè ex hac quoque atra bile melancholiam oriri ad Galeni sententiam fateri ausi sint. Sed quoniam iam dictus melancholicus succus nonnunquam in toto corpore redundat, vniuerso videlicet in venis sanguine melancholico effectus; & propterea ipsum quoque cerebrum læditur: nonnunquam verò reliqui corporis sanguine prorsus innocuo, solus is, qui in cerebro contentus est, alteratur, siue in ipsum aliunde derigetur, aut in ipsum genitus sit. Interim contentus in ventriculi vas sanguis crassior, ac melancholicus, sublataque ex eo ad cerebrum euaporatione, melancholica prius dicta symptomata excitat. Propterea earundem specierum, quæ tres sunt, vt liquet, sciuntim propria indicia conscribemus, vt earum exacta habita notitia, præcognoscens quando cerebrum solum ipsum per essentiam afficiatur, seu simul cum toto corpore, vel ab ipso ventriculo coafficiatur. Nam si & vniuersum corpus melancholicus sanguis occupauerit, cerebrum simul cum toto corpore affectum erit. Euenit autem hoc, vt patet secundo de arte curat. ad Glauconem: cum iecur ad generandum hanc superfluitatem sit aptum, & ratio victus per tales fuerit adhibita cibos, qui crassum, & sæculentum humorem præcreare natura apti sint: ac ipse splen sit natura imbecillior, vt quicquid de eo generetur, ad se minimè trahere potens sit. Quo fit vt eorundem corpora sint macra, nigra, & hirsuta: ac venas latas habeant, qui ex tota melancholici sunt natura. Qui verò ex acquisititia, per sollicitudines, aut vigilias, hæmorrhoidorum, aut menstruorum suppressiones, seu prauorum ciborum usus, tales facti sunt: qui autem cibi suapte natura melancholicum sanguinem pariunt, quive potus, tertio de locis affectis fusissimè à Galeno enumerantur, qua victus ratione si quis fuerit educatus, maximam quandam licet coniecturam facere, succum melancholicum in totum redundare. Si verò boni succi cibi usus fuerit, reliqua considerare oportet; vt ipsius exercitationes, mæstittiam, vigilias, sollicitudines: & ad efficacioram notitiam non parum confert anni tempus, præterita, ac præsens aëris constitutio, regio, ac laborantis ætas: & vt certioram habeas cognitio-

Ex qua nigra bile generetur, cū duplex sit.

3. de loc. aff. cap. 17.

Tres melancholia species.

cap. 10.

Signa melancholia ex toto.

Loco citato.

nem, cubiti venam secca, præcipue mediam, quæ communis est humerali, & axillari: & si fluens sanguis melancholicus videatur, in vniuersi corporis venis melancholicum sanguinem contineri iudicabis: ac proinde ea vtaris, vt dicemus. At si fluens sanguis non videatur melancholicus, iudicia melancholicum succum non in toto redundare corpore, ac statim eum supprimas, vt iterum paulo post docebimus. Quæ de re inquirendum erit, nunquid circa ventriculū prima inceperint symptomata, ipsisque auctis melancholica sequatur affectio: nam tunc licebit coniecturam facere in ipso ventriculo sanguinem ipsum melancholicum, tanquam in parte quadam inflammata contineri: ex quo facta ad cerebrum euaporatione, eoque intemperato, atque tenebroso reddito, melancholia ipsa excitatur, cerebro ipso per consensum affecto. Hunc affectum hypochondriacum, ac flatuosum, libro tertio de locis affectis Galen. nominauit. Testantur autem cum hæc symptomata: nam præter metum, & mœsticiam, cruditates, acidiq; ructus accidunt, æstus in præcordiis, flatus, interdū vetriculi vehementes dolores, sumptoque cibo, maximè coctu difficili, sputum humidum, idemque multum sequitur: præcordia ei sursum conuellantur: deinde alui deiectione, vomitu, proba concoctione, ructibusque eleuatur is, qui ita laborat. At si neque circa ventriculū aliquid apparuerit prædictorum indicium, aut si apparuerit, paruum admodum sit, neque signa affuerint redundantis in toto corpore sanguinis melancholici, propria autem melancholice symptomata extiterint, metus videlicet, & mœsticia, quæ veluti caractere quodam ipsam designant, Galen. tertio de locis affectis, auctore, cerebrum ipsum primario affici, ac tertiam melancholice speciem ortam esse, existimandum erit ob melancholicum succum in ipso cerebro congestum, siue in ipso genitus sit, siue aliunde in ipsum deriuatus. His quippe sic declaratis ad prognosticum deuenientes dicimus, periculosas esse permutationes ipsis melancholicis, cum vel apoplexiâ, vel conuulsionem, vel furem, vel cæcitatem significant, vt Hippocr. inquit 56. aphor. lib. sexti. Interim verò, eodem teste, in morbum comitalem permutatur, vt patet sexto de morb. vulg. propterea non negligenda erit eius curatio circa initia, ne diutius protrahatur, ac in prædictos vergat affectus. circa initia nanque facilis est eius curatio: inueteratus enim & veluti in naturam conuersus affectus, vt Alexander inquit, incurabilis propemodum euadit. Vltius cum ex melancholico succo excitetur, qui si non prius euacuetur, paulo post superaffatus in atram bilem vertitur, vt Gal. visum est comment. aphor. 53. sexti libri, & maniam, hoc est, furem efficit: hac quoque ratione confestim curanda melancholia erit. Cauendi insuper sunt timor, atque mœsticia immodici ex externa quauis causa orti: nam si longo tempore perseuerent, melancholiam significabunt, vt liquet apud eundem Hippocr. aphor. 23. sexti libri. Verum si ipsis melancholicis hæmorrhoides superuenerint, bonum erit; & si varices, vel hæmorrhoides superuenerint, eiusdem melancholice fit solutio, vt idem Hippo. inquit aphor. 11. & 21. sexti lib. Frequentant autem in masculis magis, & mediis ætatibus hæc affectiones, difficile verò in fœminis, vel aliis ætatibus, Cælio Aurel. teste, cap. 6. lib. primi. Vt verò singulæ iam dictæ melancholice species, seu differentie, ritè curari valeant, vi-

ctus rationem cunctis communè instituemus, deinceps earum cuiuslibet propriam curationem præcipiemus. Sit itaque aer ad calidum & humidum vergens, non tenebrosus, aut grauiter olens, sed lucidus, ac suaue olens. Interdicenda est vigilia immodica, quinimo somnus consueto paulo longior conciliandus: omnique conatu, vt dormiant melancholici tentandum erit: nam magnopere confert pro eorum curatione. Debèt etiam mediocriter per loca viridia, & amena exerceri conuenienti tempore, exercetis prius naturæ, vel arte alui excrementis: quæ diu detineri nullo pacto est permittendum. Pròdest insuper coram eis, non quæ metum & mœsticiam afferre possunt, loqui; verum quæ his contraria sunt, gaudia, hilaritates, bonam spem, ac animi constantiam, & securitatem, vt ægri gaudeant, & letentur in hocque cantu, aut aliis musicis instrumentis vtendum: & vt inquit Cels. querenda delectatio ex fabulis, ludisque, quibus maximè capi sanus assueuerat, laudanda si qua sunt ipsius opera, & ante oculos eius ponenda: leuiterque obvianda vana tristitia. Eorum cibi sint prohi succi, medicriter humidi, & coctu faciles, ac flatu exortes: attendendaque est in iis, ægri dispositio; cum non omnes ad omnes cibos similiter dispositi sint. Plerunque tamen conueniunt panes cibano cocti, probe præparati. Carnes non virosæ, nec pingues, gallinarum videlicet, pullorum, caponum, perdicum, phasianorum, & stammarum, præsertim iuuenum, oua gallinarum mollia, pisces petrosi, & molles carne. Erinacei verò marini plurimum præstāt ad iucunditatem, & vtilitatem, Aëtio teste. Conueniunt iterum hæc sinæ carnes. Ex oleribus conferunt ad communem victum dulcia cum prædictis carnibus decocta, vt borrago seu buglossum, interrim lactuca, intybi, & malua comedendæ sunt, ex Plinij secundi auctoritate lib. 5. cap. 8. Acriora verò loco pharmaci aliquando danda sunt. Ptisana quoque potissimum vtendum: quæ cum aliquo prædictarum carniū iure paranda erit. Ex fructibus interim vt poterunt viuis, ac malis dulcibus, & vicia passis. Vino vtantur tenui, albo, non valde veteri, pro potu, optimè diluto, non tamen acruatim eo vtantur; & vt summatim dicam, victu humido, bonique succi, ita affecti vtantur: quo simul cum frequentibus balneis (vbi non diuturnus factus fuerit hic affectus) Galenus se curasse tertio de Locis affectis testatur. Virent autem cuncta, quæ melancholicum succum generare possunt, quorum sylua locupletissima habetur a Galeno eodem tertio libro de Locis affectis. nos verò breuitati indulgentes iure hoc prætermittimus: vnum tamen non omittam, quod valde ab Aëtio, & Paulo extollicur, aceti videlicet sorbitio quàm acerrimi post omnem cibum, vbi iam dormire velit æger, idque modicum esse debet, vt voluit Paulus, aut cochlearij mensura, vt placuit Aëtio fortè quoniam attenuat, ac melancholicum succum discutiat, vel quod assumptorum ciborum vapores humidos confestim ad caput deferat; somnūque propterea conciliet, illud probant. Quæ de re siue iam dictis rationibus promoti, siue aliis fuerint, absomni non erit eo vt, cum & tanti viri ipsum approbarint. Prædicta communi victus ratione instituta, decens est singularum curationis proprium modum deferre, incipientes ab ea, in qua melancholicus sanguis

Loco citato.
Signa melancholice hypochondriacæ.

Citato loco.
Eius, quæ solo affecto cerebro accidit, signa.
Melancholia prognostica.

Loco citato.

guis vniuersum corpus occupauit, ac ipsum cerebrum. In hac principium curationis à venæ sectione exordium erit, viribus ægri, ac aliis consentientibus (iuxta Galeni sententiam tertio de Locis affectis, & aliorum Græcorum omnium, ac Celsi) præcipueque media, seu communis appellata incidenda erit, tantumque sanguinis extrahendum, quantum pro laborantis corporis habitu satis esse conieceris; sin autem vires multam prima vice euacuationem non tolerant, necesse est tunc non modo semel, sed etiam bis, & sæpius quantum licet paulatim auferre, præcepto Tralliani: & si à brachio vacuatio fieri nequit, tentandum est à poplite, vel tali partibus moliri, idque potissimum in muliebribus corporibus, aut in viris, quibus mēstruæ purgationes, vel hæmorrhoides detentæ fuerint: nam pro prædicti affectus curatione sanguinis euacuatione est necessaria. Quare cum cubiti venas non manifestas inueneris, nihil minus iuuabis, si ex prædictis venis, vel quacunque alia parte sanguinem detraxeris. Est namque, vt Hippocrates libro de Alimento asserit, confluxus vnus, conspiratio vna, omnia consentientia. Interposito deinde à venæ sectione tempore, viribusque recollectis per inferna purgare conuenit, Paulo auctore, ac Possidonio. Verum prius concoctionis, ac præparationi redundantis succi vacandum erit: pro quibus syrupi adhibendi sunt, vt de pomis, de corticibus citri, de succo borraginis, seu buglosi, de succo fumarie, aut lupulorum, vel violaceo cum aquis melissophylli, lupulorum, aut buglosi, vt Recip. Syrupi de pomis, & violacei, vel de corticibus citri ana vnc. vnā, aut de succo fumarie, & violacei, vel de succo lupulorum, & fumarie, violacei, vel de succo lupulorum, & fumarie tantundem, & additis aque melissophylli, & buglosi, aut lupulorum vnc. quatuor, pluribus vicibus exhibeantur. Per interpositos autem dies alius per clysteres euacuari poterit, parato prius decocto ex foliis maluarum, violarum, betæ, mercurialis, borraginis, fumarie, & lupulorum, fursure, ac pauco sale adiectis, atque interdum addita fenæ, polypodij, vel epithymi vnc. s. in eo dissoluas vnc. tres vel quatuor olei violacei, communis, vel amygdalarum dulcium, mellis rosacei vnc. ij. pulpæ calsiæ fistulæ vnc. j. diacatholicon drac. vj. vel vij. interim loco eius drac. iij. vel iiij. diafenæ, vel compositionis hamech. Facta autem humoris coctione, ac præparatione, purgetur corpus hoc purgante medicamento, Quod recipit florum violarum, borraginis, fumarie, & lupulorum ana drac. ij. hordei mundi, drac. iij. fenæ, epithymi ana drac. ij. & s. myrobalanorum Indorum drac. j. & s. vuarum pasfarū vinaceis detractis vnc. s. pruna num. iij. ex quibus parato decocto, ac per colum transfuso, in eo dissoluas vnc. ij. vel iij. mannæ Calabriæ, vel vnc. j. & s. calsiæ fistulæ, vel iij. sacchari violacei, aut syr. ex pluribus infusionibus violarum tantundem, diacatholicon drac. vij. seu diafenæ, vel confectionis hamech. drach. iij. vel iiij. & fiat potio. Quod si nec huic purgationi cedat affectus, iterum parandus humor erit ex prædictorum syruporum aliquo, addita vnc. j. syrupi de epithymo, aut parum fenæ aquis syruporum decoquere; quibus sæpius (prout videbitur) assumptus, iterum æger purgari poterit, aut prædicto medicamento purgante, vel valentiori, si opus fuerit, vt picra, quæ epithymum accipit, velut Themison iubet, & Aëtius eius auctoritate descri-

bit. Exhibet autem ipse ex ea cochlearium magnū cum aqua multa: & ex modicis interuallis iterum, atque iterum dari præcipit. Confert insuper epithymo, ac fenæ, in aqua lactis maceratis purgare, vel drac. j. catapotius de lapide lazuli: seu de lapide armenio, quem summopere Trallianus extollit prius præparatum, videlicet exhibeas: quod si ea assumere noluerit, aut inuitus capiat, cum vino, aut ouis mollissimis excipiat, ita vt virelli membrana leuiter aperta in medio illa coniciantur, præcepto Tralliani pariter scrupul. iij. pilularum arabicarum exhibens, post quæ sorbeat mannæ dissolutæ in aqua lupulorum, vel borraginis, aut hordei vnc. ij. vel tantundem violacei sacchari. Conducit etiam & lactis sero aluum subducere, vt Aëtio placuit quod quidem per cocturam à lacte separetur. Sit autem equinum, aut bubulum, ac præparatum eo modo, quo ipse iubet: ex eo non infra quinque heminarum mensuram æger accipiat. Ab omni verò euacuatione, idem Aëtius, iussit vtendum esse maluæ semine leuissimè trito duarum drachmarum pondere, cum aquæ cyathis iij. Interim verò, vt aëris læticia paretur, sæpius pauca quantitas infra scripti medicamenti danda erit, vt quæ animi tenebras abigere valeat, ac vires quodammodo recreare. Recipit autem sacchari & buglosi, & fumarie, & lupulo, & violacei ana vnc. j. sacchari rosacei vnc. ij. syrupi de pomis, & de infusione rosarum, ac de corticibus citri ana vnc. j. & s. dianthus drac. iij. confectionis diambæ drac. ij. vel diamargariton frigidi drac. iij. cum iij. vel v. auri foliis conditum paretur. Post purgationem, dulcis aquæ balneis vtendum erit; cum non modò aliquam melancholici succi partem discutiant; verum & totum corpus contemperent, & propterea melancholicis magnopere opitulantur. At eorum caput tepida potius, quam calida dulci aqua superfundendum erit: luteisque ouorum abstergere, vt Trallianus præcipit. Quod si maus eorum caput torrentis ritu irrigare, poterit hoc modo parari, Rec. Foliorum maluarum, violarum, althææ, borraginis, & lupulorum, singulorum pug. j. florum chamæmeli manip. s. florum stœchadis, drac. tres, fiat secundū artem decoctum, & vtere capite prius abraso: post quam irrigationem caput oleo amygdalarum dulcium, violaceo, chamæmelino, seu anethino vngendum erit. Odoramenta similiter parari possunt, aquæ rosaceæ, & florum citrangulorum vnc. iij. assumens, in quibus florum nymphææ, violarum, melissophylli, maluarum, & althææ ana drac. duas decoquito, partemque aceti adiecto, & per nares ex eo vaporem suscipiat æger. At si hæmorrhoidibus, aut mensibus suppressis, malum hoc fuerit concitatum, horum quoque purgationem moliemur, inquit Paulus. Si verò ex primario cerebri affectu melancholici fiât, assiduus balneis, victuque boni succi, humido, ac flatu experte citra illud efficax auxilium curare oportet: cum videlicet humor, qui molestat, nō dum ob temporis longitudinem, ægrè euacuetur, iuxta Pauli & Aëtij sententiam, quam ex Galeno tertio de Locis affectis, cap. septimo sumpserunt, dum dixit, Interim monendi sunt mihi amici, qui me curantem viderunt; frequentibus balneis, victuque humido, bonique succi, nullo alio adhibito præsidio huiusmodi me affectum curasse, vbi nondum ob longum temporis tractum nocuus humor multum euacuationi resisteret. Cum enim diuturnus

Medicamē
ta post pur
gationem
sumenda.

Balneæ.

Vnguentæ.

Odoramen
tum.

Melanlico
lie, quæ so
lo affecto
cerebro o
ratur cura
tio.

Quando ijs
vena secū
da sit

Purgatio.

Hypochon
driaca &
flatuosa me
lancholia
curatio.

Vena se
cūdo.

5. de loc. af.
cap. 6

iam factus fuerit, fortiora prædictis oportet adhibere remedia. Verum ipsemet eodem loco asserit, quod ubi solum cerebrum affectum sit, quod ad hanc dispositionem attinet, sanguinis detractione non indiget, quamvis ob aliam quampiam causam, sanguis mitti possit: ut pote si æger (ut Aëtius inquit) multo sanguine redundarit, & præseruationes gratia sanguinis detractionem faciamus. Quo casu præciperem & ipse venam secari (quamquam solum cerebrum melancholicum habuerit sanguinem) diuturno etiam existente affectu: qui nec balneis, nec victu humido curari potuerit, nondum in uariis, hoc est, furorem verso. Deinceps præparato, ac concocto redundante succo purgans medicamentum exhibendum erit, id quæ si opus fuerit, iterandum; ac aliis paulo ante dictis medicamentis utendum erit. At si multo sanguine æger non redundarit, venæ sectione opus non habet: verum ommissa ea ad reliqua, quæ diximus medicamenta, confugiendum erit: quibus omnibus probe uti poterunt. Pro viribus autem nitendum erit omni modo, omnique artificio uti (cum in prædictis, tum in iis, quibus malum à manifesta quadam, & veluti primaria causa occasionem habuerit; quæ tristitiam, metum, aut solitudinem quandam efficere poterit, diu perdurantes, pro diuersa deprauata imaginationis specie) ut ab eadem reuocentur: aut ratione persuadendo, aut aliud quiddam agendo eorum, quæ subitam, & assatim mutationem efficere possunt. Plurimi nanque (ut Trallianus asserit) curati sunt quodammodo, vel cum vidissent, audiissentque ea, quæ consequi desiderabant. Ita nanque Philodorus medicus quendam, qui sibi caput amputatum esse putabat, quod tyrannus factus fuisset, curauit, imposito repete capiti ipsius plumbeo pileo, ut grauitatem sentiens, caput se recepisse rursus putaret: quo plurimum gaudium, vana imaginatione liberatus est. Pari ratione idem Trallianus fatetur duas mulieres curatas fuisse, quarum vna imaginās serpentem se deuorasse, citavit ei medicamento vomitum, ac anguem extinctum in vas, quod vomitionem excipiebat, immisit: quem videns mulier, putans se vomitu reiecisset, nimirum gaudens, à vana illa imaginatione liberata fuit. Reliqua verò ex longa viri peregrinatione melancholia correpta est, & iracunde omnibus respondens, eodem modo sanata est: nam eius vir peregre reuersus, nulli prædicens, sed subito ingressus seipsum illi ostendit. Præter spem igitur ipsum mulier conspiciens, atque ita amplexa, multoque gaudio affecta, subito omni metu liberata est, ac ad statum naturalem rediit, ut nulla alia indigeret curatione. Hypochondriaca vero, ac flatuosa melancholia cum ea, quæ primario affecto cerebro oboritur, communia habet auxilia ventrem subducentia, ut Aëtius Rufi auctoritate testatur. Propterea primum bonæ coctionis curam habere oportet, postea vero purgare: & velut in hoc conueniunt, ita in venæ sectione (mea quidem sententia) sentiendum erit: cum nō nisi multo sanguine si redundarit æger, seu præseruationis gratia faciendū erit, aut si melancholicus sanguis, qui in ventriculo, seu vasis eius continetur, ex aliquo viscerum, liene videlicet (ut placuit Galeno quinto de Locis affectis, & sexto eiusdem circa principium) aut iecore ad ipsum fuerit deriuatus: tunc nanque reuulsionis gratia seruans rectitudinem, præseruationis item, interna vena v-

nus, vel alterius brachij secanda erit. Deinceps aliquem prædictorum syruporum pluribus vicibus (prout opus fuerit) exhibere, cum quo adicere poterimus syrupum de corticibus citri, de infusione rosarum, aut de absinthio. Ut Recipe syrup. de succo fumariz, borraginis, vel de pomis vnc. j. & v. ex infusione rosarum, corticibus citri, vel absinthio vnc. v. aquæ melissophylli, & lupulorum vnc. iij. post quæ talis exhibetur purgatio. Pulueris hieræ simplicis Galeni excipe drac. j. pulueris senæ, epithymi ana drac. v. aut diacatholicon drac. vj. vel vij. cum drac. j. casia fistulæ, formetur bolus, vel loco casia fistulæ (formatis ex prædictis catapotis) drac. ij. manna, vel iij. syrupi domini Augustini cum aqua lupulorum exhibeantur. Huius classis medicamentis, ubi vigeat necessitas, iterum, atque iterum iteratis vtaris, à valentioribus, atque à vehementioribus protinus abstinendo: ne eorum, tum calore immodico, tum à remotis partibus attractione augeatur affectio. Prodest insuper iis moderate, & paulatim, velut etiam cunctis aliis melancholicis, aluum subducere. Verum in hac affectione hypochondriorum quoque sollicitudo habenda erit; præsertim ne status in ipsis generetur. Propterea optimum est (Aëtio auctore) pulegij decoctum sæpe bibere, aut minoris centaurei, & ante purgatoria, & post ipsa. Absinthij autem decoctum assidue præbendum erit, verum postquam purgatus fuerit æger, Aëtij, & Pauli decreto; adeo enim huic medicamento confusus est Aëtius ipse, ut ex folijs vlu nouerit quosdam ab hoc affectu liberatos. Danda insuper eis sunt, quæ vnam mouent, anisum, daucus videlicet, petroselinum, nardus, sceniculi sylvestris semen, & radix: nec prætermittendum est chamæpityos, & chamædryos decoctum; aut ipsæmet herbæ arida trita porioni inspergantur. Exterius autem fovebuntur & ipsa hypochondria ex oleo, in quo decocta fuerint ruta, anethum, absinthium, pulegium, serpillum, agni semen, bacca lauri, aut folia eiusdem tenera: hæc nanque dolores mirigant, & status discutiunt. Interdum in stomachi inflationibus, cuminum, & pulegium, vel anisum in aceto coquere oportet, & per spongas stomachū fovere, ex Aëtij sententia; vel ex prædictis, faccellos parabis, excipiens foliorum, & baccharum lauri, ruta, absinthij, serpilli, & pulegij ana vncias ij. vel iij. florum chamæmeli, fœni græci, anethi ana vnc. iij. cumini, anisi, seminis sceniculi ana drach. j. rosarum rubearum manip. j. contundantur, & fiant faccelli: qui irrorati pauco aceto, vel vino albo, calidi approximantur, sæpius eos mutando, supra ventriculum. Caterum præter hæc, cataplasma adhibeas, in oleo decoquens anisum, cuminum, apium, absinthij, & artemisiz folia; quibus demum addatur cyperus, & rosmarinus leuissimè triti; admoneasq; ipsum, diutiusque permittas & ante, & post cibum adherere: quo ablato, locus contegatur operimento quodam accommodato, ut lana, vel stipula leuissima præillito loco ex nardino. Ad status quoque dirigendos cucurbitulis uti poteris: nam veluti incantamentum quoddam, ex flatuoso spirititu dolorem ortum confestim leuant, Galeno teste duodecimo Methodi medendi, cap. vltimo. Quibus etiam vitium hoc diutius perdurauerit, præsentissimum remedium est ex longioribus interuallis, etiam à cibis vomitus, non tamen fortioribus vomitorijs utendum: sunt enim talia nociua, in aliis his ærumnam

his ærumnam ventri, ac stomacho addentia, ut Aëtius inquit. Utaris autem aceto, aut syrupo acetofo, seu oxymelite cum aqua tepida pro vomitu ciendo: prætermittendus quoque erit vomitus ei, cuius ventriculus, seu stomachus debilis existit. Interim nec melancholicorum caput, etiam si ea hypochondriaca, & flatuosa sit, omnino omittendum erit, quin ei opituleris eum his, quæ ipsum roborare, ac humectare valent: irrigationibus videlicet inunctionibus, ac odoramentis superius descriptis, quamvis à ventriculo ortum habuerit. Postremo visum est syrupum nostrum, quo in prædicta affectione uti consuevimus, non prætermittere: præsertim cum nonnullis, Deum testor, ex eius usu melancholico tales curauerimus, potissimum facta prius purgatione quadam. Is autem excipit hyssopi, sampsuchi, serpilli, melissophylli, & betonica, singulorum manip. v. borraginis, lupulorum, scelopendrij, fumariæ, capillorum veneris ana pulg. v. radicum cichorii, borraginis, fœniculi, & caprarorum ana vncias iij. ablinthij, corticum citri, ana manip. j. senæ, epithymi ana drach. iij. pulegij, florum chamæmeli, & minoris centaurei ana drach. ij. chamædryos, chamæpityos ana vnc. duas & v. iuncti odorati, spicæ, anisi, dauci, feminis fœniculi, asari ana drach. j. passulorum vinaceis detractis vnc. j. pariter ex his secundum artem decoctum: cuius excipe lib. iij. adiecto succi pomorum dulcium, & acidorum, succi rosarum, & malorum puniceorum acidorum ana lib. v. succi borraginis, & fumariæ, depurati ana lib. j. addito saccharum quantum satis sit, & fiat syrupus: de quo sumat æger vnc. iij. vice quilibet, desuper bibens parum aquæ lupulorum, vel borraginis. Poterit insuper, si videbitur, dictus syrupus cum pauco aloës, vel cinnamomi odoratus reddi. Detur etiam melancholicis, præsertim hypochondriacis, ex quibusdam intervallis, potissimum hyeme, & inchoante vere drach. j. antidoti theriacæ post purgationes.

Περὶ μανίας. De furore, seu insaniam.

C A P V T . V I I I .

Affectus, qui *μανία* Græcè, Latine insaniam, seu furor nuncupatur, nō minus sub eius delirij specie continetur, quod quidē sine febre est, quam ipsa melancholia, ut tertio de Locis affectis, & 2. de Causis symptom. liquet. Quinimo tantam inter se cognationem eæ affectiones habent, ut interim furor pro melancholia, & melancholia pro furore sumatur apud artis medicæ auctores, præsertim Galenum, qui aphorismo vigesimo primo sexti libri, per *μανίαν*, hoc est, furorem, de quo Hippocrates in aphorismis mentionem fecerat, non vere furorem, seu insaniam, sed melancholiam propriè dictam voluit Hippocratem intellexisse, & idemmet tertio de Locis affectis, cap. septimo, de melancholia verba faciens, dicebat, quod cum ea diuturna facta esset, fortiora exigebat remedia, fiebat autem affecto prius calidis dispositionibus cerebro. Quod quidem de melancholia propriè dicta veritatem habere haud quaquam potest, cum ea ex frigida cerebri intemperie, ac frigidiori succo ortum habeat, ut in præcedenti cap. declaratum est. Verum eiusdem verba de furore intelligenda sunt, qui & à mordacibus succis, & interim à calidiori cerebri intemperatura nascitur, eodemmet

Galeno teste secundo de Causis symptomatum. Proinde non ab re nil aliud esse insaniam, seu furorem Trallianus cap. 7. tertij libri dicebat, quam intensiorem melancholiam ad maiorem feritatem. Intensior namque melancholia est non symptomatum modo, verum ipsius cerebri affectus, ac causa ratione, ut infra patebit: & si quodammodo secundum omnia hæc asimiles esse videantur. Propterea quod nonnulli haud rectè auctorum verba, ac sententias Hippocr. præsertim, & Galen. intelligentes, in hac re non immerito hallucinati sunt, putantes quod perpetuo per *μανίαν*, furorem propriè dictum, intelligendum sit, & per *μελαγχολίαν*, melancholiam propriè dictam, iuxta eorum doctrinam, quod quidem falsum esse ostendimus. Nos igitur *μανίαν* vitantes, cum de mania, seu furore loquimur, de eo propriè dicto, ac à propria melancholia seuincto intelligemus. Hunc quoque licet Plato in Phædro duplicem dixerit esse, quorum unum mentis intentione ex corporis causa, vel origine fieri, alterum diuinum, siue immisum, cuiusque Apollinem inspiratorem esse asseruit, vocatur autem nunc diuinatio. de primo tamē scripturi modō sumus: qui, ut inquit Celsus Aurel. alienatio mentis est sine febris, libro primo chronicarum passionum cap. 5. siue alienatio tardans in febris, quo à phrenitidis discernitur. Afficitur autem in hac affectione cerebrum, & ut patet similis existens, velut & ipsa melancholia, ac cunctis aliis deliriis, etiam cum febre existentibus, ut patet tum tertio de Locis affectis, tum commento aphorism. 53. sexti libri. Laborat autem cerebrum in hoc affectu, modo per consensum, modō primaria affectione, quo iterum cum melancholia conuenit, ac à phrenitide distat: in qua non nisi primaria affectione cerebrum læditur, ut eodem tertio de Locis affectis liquet. Quamquam & ipse furor tum à phrenitide, tum ab aliis deliriis in ardentibus febribus ortis distet, quoniam in his perpetuò febris adest, ipse verò furor omni tempore sine febre reperitur. Præter hæc percipi potest cerebrum in furore læsum esse, quoniam principales animæ vires oblatae sunt. Nūquid autem ipsum cerebrum per essentiam, aut per consensum afficiatur, ex iam dictis indicijis, & in Methodo, ac cap. de memoria perditâ relatis dignoscere studendum erit. Quod verò furor symptoma sit principum facultatum, discere licebit ex secundo de Causis symptom. velut etiam quod non diminutè, nec ablata, sed deprauatè lædatur. Verum hucusque in Galen. doctrina non reperi, quæ functio princeps in furore oblata sit: quamquam Aëtius cap. proprio de insaniam illud fateatur: ait namque læsam esse insanientibus imaginationem, & rationem, seruari autem in ipsis memoriam, velut coniecturæ licet ex cantilenis, quas familiares habet, præsertim si ex feruenti sanguine originem ducat insaniam. Cum ergo in insaniam tum imaginatio, tum ratio, seu cogitatio lædatur, hac quoque ratione ab ipsa melancholia discrepat: in qua non nisi imaginatio, ut diximus, oblata est. Quò fit, ut in hac affectione præter deprauatas imaginationes, errent quoque ægri in cogitandi functione. Ex quarum functionum læsionis modo, cum febris non adfit, & ipse furor dignosci poterit. Nam nunc iracundia, nunc hilaritate, nunc inestudine, siue vanitate occupat mentem, nunc timore comminante inanium rerum: horum plurimis accessionis tempore oculi

M

cap. 7.

Quid sit furor, Aëtianus an dicitur.

versus finem dialogi.

Ex Celsi Aurelii, quid sit furor.

Quæ pars in eo afficiatur. 3. de locis affectis.

Loco cit.

6. cap. 8.

Quis affectus præter naturam sit. Aët. lib. 6. cap. 8.

Eiusdem signa.

sanguinolenti fiunt, atque attenti: accidunt etiam vigilie iuges, venarum extensio, genarum rubor, corporis durities, atque aliena fortitudo; ex Cælij Aureliani testimonio præcitato loco: præsertim, si prius cerebrum ipsum calidis dispositionibus fuerit affectum, aut sollicitudo, mœstitia, ac vigilie immodicæ præcesserunt, seu horum familia: quibus quoque optime perpensis, ad quem cerebri affectum furor consequatur, percipere poteris: namque non nisi ad calidam ipsius intemperiem, ut testis est Galen. eodem secundo de Causis symptomatum, cap. 7. siue sola ea sit, siue ex calidioribus succis orta, ut ipse testatur. Propter quod insuper à melancholia distat, quæ à frigidiore cerebri intemperie ortum habet, ut diximus, ac cum phrenitide, aliisque deliriis cum febre ortis communicat. Percipies autem si hæc cerebri calida intemperies præter calidos, ac vitiosos succos redundantes fuerit: quoniam nullum eorum vitiosorum succorum redundantia signum aderit, ac fortè, quia ex aliqua externa causa cerebrum calfaciente infania orta sit. At si calidorum, ac vitiosorum humorum occasione cerebrum calfacientium furor genitus sit, ex propriis indiciiis illud percipere poteris. Verùm cum hic affectus ex melancholico succo fieri nequeat, ex eo nanque melancholia propria dicta gignetur, Galeno teste tertio de Locis affectis, neque ex sanguinis, seu bilis redundantia, nisi prius præfessentur, ac in veræ atræ bilis naturam vertantur, ex qua atræ bile mania ipsa excitatur, inuestigandum erit prius, nunquid ex atræ bile ex sanguine orta, seu ex flaua bile, aut succo melancholico, præfatis ipsa generetur. (Nanque pituita nunquam ad tantam deuenire potest assationem, ut ex ea atræ bilis fiat, iuxta Galeni doctrinam, quicquid Arabes, & eorum sectatores sentiant.) Deinceps si ab omnibus, vel quibusdam, quibus indiciiis illud percipere poterimus. Quod ad primum attinet, Aëtius cap. de infania fatetur eam oriri posse aliquando à multo sanguine non putrefacto ad cerebrum conflante, qui purus sit, & multitudine solum affligat, velut in ebriis, interdum flaua bile ei admista. Paulus vero cap. 14. libri tertij furorem excitari asserit, cum flauæ bilis supra modum exultet in atram sit mutatio. At nos Galenum sectantes asserimus interdum maniam ipsam ex feruenti sanguine delato per totum corpus, ac caput præcipue petente excitari posse: quoniam sanguis talis caput occupat, ut patet commento aphorif. 40. quinti libri. Interim vero ex melancholico humore sit, licet ex eo non semper, sed cum supra modum exustus fuerit, aut putrefactus malignam induerit acritudinem, ut liquet apud eundem commento aphorif. 56. sexti lib. Quod autem ex præfata flaua bile furor ipse excitari possit, idem auctor testatur tertio de Locis affectis, dum dixit, Quemadmodum alter atræ bilis succus, qui præfata flaua bile nascitur, ferina deliramenta inducit, modo sine febre (innuens maniam) modò cum phrenitide indicans (in cerebri corpore abundans) & demum post pauca dicebat, Atque insuper alia nonnunquam dementia occurrit ferina, & melancholica, flaua bile præfata. Quinimo ex hac flaua bile præcipue furor gignitur, ut patet secundo de Causis symptomatum, & commento aphorif. 22. tertij lib. Ex his liquidò constat cuius ex Gale. monimentis, quod ex feruenti sanguine, & flaua bile præfata, supraque modum exusto melancholico

succo mania ipsa, seu furor generari potest. Restat modo ut ad id, quod secundo loco inuestigandum erat, satisficiamus, ac distinctiua indicia cuiusvis redundantis succi conscribamus. Nanque si ex feruenti sanguine originem ducat infania, erit cum immodico risu, videntibus agris sæpe ob oculos imaginuculas quasdam risu dignas, & hilaris est ipsis facies, ac assidue canunt. Aliquando enim ex contingentibus euaporationibus sonitus circa aures adiunt, ut putent se tibicines quosdam audire: & ipsis præsertim memoria seruatur, quantuis imaginatio, & ratio oblata sint; ac similes erunt desipientiæ ipsis quodammodo cum eis, quæ ex ebrietate contingunt, siue ortis ex sola caliditate, siue humore vitioso: cum his quoque indiciiis totius corporis temperamentum, ætas, ac laborantis habitus, tempus anni, regio, æris constitutio, ac præcedens victus ratio consideranda erunt, si simul cum prædictis signis feruentis sanguinis redundantiam attestentur. Quod si ex flauæ bilis præfata redundantia oriatur infania, ferarum modo redduntur effrenes; ut etiam eos, qui imprudentius ipsis occurrunt, manu violenter tractent, ut inquit Paulus: ferina erit dementia, & melancholica, ut Galen. inquit tertio de Locis affectis, & quanto magis exulta fuerit, eo magis infania fatis furiosa erunt, velut ipsemet commento aphorif. 53. sexti libri cap. 7. scriptum reliquit, ut iracundi sint ægri, temerarii, percussores, & iniuriosi fiant, sicut Aëtio visum est; ita ut eorum quidam iam propriam carnem gustarunt, & domesticos velut insidiatores tractarunt, occiderunt, percusserunt, & vulnerarunt. Temperamentum quoque eorum ætas, habitus, & præcedens victus ratio, æris constitutio, tempus anni, & regio redundantem bilem coindicabunt. Ex ipso autem melancholico succo immodice exusto si fiat furor, deliramenta cum immodicis metu, ac mœstitia erunt, diutius interdum taciturni fiunt, ac loqui auersantur. Interim cum loqui incipiunt, & si diu locuti fuerint, silere tamen nequeunt. Pariter eorum cum temperamentum, tum ætas, ac habitus ad melancholicum vergunt, tempusque anni, regio, æris constitutio, ac præcedens victus ratio, melancholici succi redundantiam commonstrabunt. Cum singulis autem prædictis tribus mania causis præcedere solent ea, ut paulo ante dictum est, quæ cerebrum duntaxat, aut totum corpus simul cum eo, ac redundantes humores valeant calfacere, ac intantum exurere, ut possit furor ipse generari. Sunt autem ea, sollicitudines, mœstitia, ac vigilie immodicæ, præcedens phrenitis, aut alia inflammatio, seu æstus, ac quæuis alia ipsius cerebri calida dispositio. Nam plures visi sunt, ut Galeno visum est commento aphorif. 23. sexti libri, furore correpti, qui ab excandescencia, vel ira, vel mœstitia principium habuerunt, promptè se habente corpore eo tempore ad incidendum in tales affectiones. Si autem velis delapsuros in hanc affectionem discernere, quæ præcedunt signa, attendere oportet. Præcedit namque capitis debilitas, risus præter rationem non assuetus id facere: ex facili occasione irascuntur, aurium sonitus adest; & splendores oculis obuersantur: præceduntque vigilie immodicæ, & curæ per vices repetentes, ac peregrinæ; grauitas item, & vibratio capitis. Progressu verò temporis omnia hæc intenduntur; & appetentiæ ipsis putidiores fiunt, sed

ad venerem prompti sunt, & ideo assidue feminis in fornibus effusiones ipsi sunt, oculi cauantur, simulque intenti, ac fixi consistunt: propter quod doctus medicus his apparentibus, aut quibusdam ex ipsis, poterit eis adhibere, quæ oportet: priusquam ad perfectam desipientiam ægri perueniant. Nanque nulla desipientia, vt testatur Galen. commento aphorism. 53. sexti libri, secuta est: licet minus periculosa sit, quæ cum risu sunt, quoniam ex sola sunt caliditate, sine humore viciosa: periculosa vero omnium temeraria. In medio autem ambarum sunt, quæ cum studio sunt ex flaua bile ortum ducentes: quæ cum multum exulta fuerit, vt iam magis ad atræ bilis naturam accedat, insaniam ex ea sunt temeraria, & satis furiosa, & propterea omnium sunt periculosissima. Ea autem insaniam, quæ ex superaffato atro humore contingit, licet periculosa sit, non tamen adeo perniciofa est, velut quæ à flaua bile præaffata gignitur. Nam tanto perniciosior est hæc atræ bilis censenda ea, quæ generatur ab exulto humore atro, quanto nimirum & humor humore efficacior, ac strenuor est. Gale. teste lib. de Atræ bile. cap. 3. Generatur autem furor frequentius in iuuenibus, ac mediis ætatibus, diffiliciter in senibus, atque diffiliciter in pueris, vel mulieribus, Cælio Aurel. auctore eodem libro primo cap. 5. Hippo. vero aphorism. quinto septimi libri, scriptum reliquit. A furoris difficultas intestinorum, vel aqua intercus, vel mētis alienatio, bonum: quorum causam Galen. tradidit in commento. Pro quorum curatione, aer ad humidum vergat oportet, caliditate temperatus, aut ad frigidum parum vergens: mutare item regiones debent, vt inquit Celsus, nec oportet eos esse vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant. e-runt præterea, vt idem Cælius inquit, multorum ingressus prohibendi, & maxime ignotorum. Somnus eis procuratur per quamcunque viam, siue exterior, siue interior adhibitis iis, quæ ipsum promouent. Quorum syluam in præcedenti cap. reperias. Ante omnia verò, vt ait Paulus, in lecto vincendi sunt, ne vel sibi, vel alteri noceant, aut gestandi lectulo pensili intra cubile quoddam insanientibus dicatum. Communia namque sunt, vt testatur Celsus, insanientibus vehementer exerceri debere, & multa frictione vti. Alium quoque humidam habere eos oportet: quod si non sponte fiat, clysteribus subducatur lenibus, iam dictis in præcedenti cap. quo loco etiam requiras, quomodo circa animi accidentia se habere debeant. Victum autem tenuem exhibere conuenit, Aëtij decreto, præsertim circa initia, forbilem, liquidum, non multum, ventri commodum & qui parum sanguinis generare potest. A vino penitus abstinendum est, nisi ex metu insaniam orta fuerit, nam in hoc insaniam genere solo, rectè vinum datur, Celsi auctore. Vniuersa ergo diæta statuatur tenuis, concoctu facilis, ventri commodi, status exors, habensque vim contemperandi, hoc est, humectandi, magis quam infrigidandi. Propter quod præsana vtendum, intybo, borragine, malua, cucurbita, & interdum lactuca. Procedente tempore, postulantibus viribus, carnibus vti poteris, potissimum contusis gallinarum, pullorum, perdicum, phasianorum, & castrarum, in quarum carnium iure præsana optime parari possent. Pro potu fumant aquam hordei, aut decoctum, cum qua permisceatur succus malorum

punicorum dulcium, aut parum acidorum. Quod si prædictos potus auersentur, vires indicent, ac assueti fuerint ægri vini porioni, illud quoque non omnino denegandum erit, præsertim si ex succo melancholico exulto mania fuerit genita; sit autem album, tenue, aquosum, ac subastringens, optimeque dilutum, potissimum inclinante malo. Admonendi insuper sunt, vt ab omnibus eduliis, & potibus bilem gignentibus abstineant, Aëtio teste. prædicta verò victus ratio cunctis insanientibus communis existit, paucis quibusdam mutatis pro diuersa causæ ratione. propriam autem curationem vnaquæque expostulat, licet consimilem melancholicis curationem recipiant, Paulo teste. Nanque si ex seruēti sanguine furor excitatur, ante omnem aliam curationem sanguinis missio adhibenda est, secundaque erit cubiti vena media, seu externa; aut si hæc non appareant, tali vena incidenda erit, præsertim in mulieribus; quod si neque hæc appareat, ad eas, quæ in summis manibus, ac pedibus, transeundum, Aëtio auctore; & si vires robustæ sint, quantum satis esse putaueris, statim detrahito, prout Frallianus cum Aëtio conuenit. Sin autem vires multam prima vice euacuationem non tolerant, necesse est non modò semel, sed etiam bis, & sæpius, quantum licet paulatim auferre. Post hæc caput irrigare oportet rosaceo, cum paucis aceto, aut polygoni succo, vel oleo anetino, seu melino, imbuta videlicet pecia lanea seu linea oleo syncipiti imponatur, & frequentius renouetur: aut accipe rosarum, violarum, solani, foliorum lactucæ ana p. v. corticum papaueris albi drac. duas, florum chamæmeli drac. iij. florum stæchadis drac. j. & cum prius bullierint in debita aquæ quantitate, additoque paucis aceto, iuxta coronalem commissuram, loco prius abrafo, caput irrigato, cuncta verò non frigida actu, sed tepida capiti applicentur. Hoc interim tempore post venæ sectionem, omni modo somnus procurandus erit cum his quæ cap. de phrenitide retulimus. Confidit autem Aëtius valde pharmaco ex papaueris capitibus cum præsana succo, aut aqua exhibitio pondere cochlearis vnius, interdum non vna vice, sed intermissa die vna, sursum exhibendo. Asserit enim quod vel solum hoc medicamentum solet post venæ sectionem perfecte liberare ab affectione, vna cum conuenienti diæta. At si res postulauerat, vena quoque in fronte secunda erit, eodem Aëtio teste, præsertim si infraactus, impectusque sanguis in cerebro fuerit. Orta autem insaniam ex præaffata flaua bile, ad ea, quæ huiusmodi humorem vacuant, statim veniendum est Tralliani præcepto, prius tamen eo concocto, ac preparato; tunc namque purgatio commodè tibi succedet. Perficies autem id, si syrupum violaceum, aut rosaceum exhibeas, aut è succo fumarie, intybi, seu borraginis confectum, cum aquis appropriatis præcedenti capite, & cap. de phrenitide prædictis: purgabis quidem eos, aut aliquo eorum medicamentorum, quæ in curatione melancholice approbauimus, vel infra scripto, quod excipit florum violarum, fumarie, lupulorum, borraginis, & hordei decorticati, nymphææ, singulorum drac. ij. passularum vinaceis detractis, & tamarindorum ana vnc. j. ex quibus facto decocto extrahatur cum eo amygdalarum dulcium succus, in quo per decem, vel duodecim horas macerentur, drac. ij. myrobalanorum citrinarum, & drac. j. in-

Si ex seruēti sanguine furor excitatur, ante omnem aliam curationem sanguinis missio adhibenda est, secundaque erit cubiti vena media, seu externa; aut si hæc non appareant, tali vena incidenda erit, præsertim in mulieribus; quod si neque hæc appareat, ad eas, quæ in summis manibus, ac pedibus, transeundum, Aëtio auctore; & si vires robustæ sint, quantum satis esse putaueris, statim detrahito, prout Frallianus cum Aëtio conuenit.

Si ex seruēti sanguine furor excitatur, ante omnem aliam curationem sanguinis missio adhibenda est, secundaque erit cubiti vena media, seu externa; aut si hæc non appareant, tali vena incidenda erit, præsertim in mulieribus; quod si neque hæc appareat, ad eas, quæ in summis manibus, ac pedibus, transeundum, Aëtio auctore; & si vires robustæ sint, quantum satis esse putaueris, statim detrahito, prout Frallianus cum Aëtio conuenit.

Si ex flaua bile præaffata generetur curatio, prædicta.

esse videatur temporis quo non doleant; relinquatur certo aliquo tempore, quo scilicet excitatur in eis crucians affectus, necesse esse ea dolere: nam citra alterationem non fit dolor, cum citra eam sensus non fiat: neque in iis quæ ad perfectionem sunt alterata, ut in hecticis febribus, dolor adest. Galeno teste libro de inæquali intemperie. Non enim cum mutata particularum temperies iam est, siue, ut sic loquar, in ipso mutatum esse, dolent, sed dum mutantur, siue in ipsa mutatione, quemadmodum mirus dixit Hippocrates. Verum cum ex alteratione, ac alterationis dignotione sensus fiat, ut liquet septimo de Hippocratis & Platonis decretis, & primo de elementis, non tamen alteratio ipsa, ut quidam putant, sensus est, sed ipsa alterationis dignotio: namque sensus instrumenta alterari etiam sine sensu potuissent, ut puta si nervos non haberent, ac per eos alterationis dignotionem. Et propterea non satis est ad voluptatis, dolorisque creationem, ut vel levis, vel grauis, seu aspera in corpore motio efficiatur, sed vtriusque his agitationibus earundem dignotio quoque accedat necesse est, quæ propriè sensus dicitur, quinimò interdum hæc duntaxat alterationis dignotio dolor appellatur, ut patet aphor. sexto libri secundi, dum dixit, dolorem non sentiunt. Hunc ergo sensum dolorem nos dicimus esse, qui penes alterationis dignotionem potissimum attenditur, & non penes alterationem ipsam: quamvis in eius generatione ea quoque necessaria sit; cum neque sensus hic sine patientis corporis immutatione vlllo modo esse possit. Inpropriè verò interdum appellauit Hippocrates ipsas dispositiones, seu affectus, qui cum dolore apti sunt natura fieri, dolores, ut in principio iam dicti aphor. sexti lib. 2. liquet, cum inquit. Quicumque dolentes partes aliqua corporis; sexto de morbis vulgar. quod in cratione antiqui dolores frigidi, noui autem calidi, dicebat. Caterum nec ex quauis immutatione, seu sensibilibus corporum alteratione progigni dolor consuevit: quoniam si levis, & exigua fuerit corporum immutatio, sensum quidem efficit; qui facultatem & vim agentis dignoscit, ac percipit, & propriè naturalis sensus dicitur, non tamen dolorem inducit: nam promptè vnumquodque sensorium leuem hanc ex cognatis patitur mutationem, seu alterationem. Insuper quod nec alteratio ipsa sensum, paulatimque facta dolorem asserre animantipossit, primo de causis symptom. & duodecimo method. a Galeno decretum est. Et propterea non cuiuslibet immutationis sensus dolor esse dicitur, sed eius, quæ grauis, vehemens, ac tristis est ut diximus, tum confertim, tum etiam violenter facta. Huius nanque immutationis sensus existere nullo modo potest sine patientis corporis immutatione præternaturali, ut eodem septimo de Hippocr. & Platonis decretis liquet. Hoc itaque intelligere volumus per tristem, ac grauem mutationem; quæ quidem omnium: dolorum communis causa existit, prout Galen. eodem 1. de causis symptom. testatur est, illudque tum Platonis auctoritate in Timæo, tum etiam & ipsius Hippocr. confirmauit. Platonis inquam, dum dicebat, quod pathos præter naturam violentè, & affatim incidens dolorem excitat: cum verò ad naturalem habitum redit, idque rursus affatim, delectationem inducit: in delectatione, licet affatim ad natura-

lem habitum mutatio fiat, non tamen ea violenta est: nam si violenta quoque foret, similiter dolorem excitaret, ut idem Galenus testis est 12. metho. med. Qua ratione conciliantur eius dicta prædicto loco cum his, quæ asseruerit 1. de caus. symptom. de doloris, ac delectationis generatione. Hippocratis verò auctoritate, qui fatetur, quod ab his, quæ naturam mutant, ac corrumpunt, dolores excitantur, hac quidem voce corrumpunt & celeritatem; & vehementiam transmutationis indicans, quemadmodum Galenus ipse exponit. Quod verò dolor præcipue in sensu consistat mutationis tristis, hoc est, affatim, & violenter facta, & nō in ipsa mutatione, palam ostendunt medicamenta, quæ à Medicis excogitata sunt pro eiusdem curatione, quando intendimus contra ipsum, velut symptoma pugnare, & non eius causam adimere: sunt namque ea torporem inferentia, ac sensum auferentia à Grecis anodyna, quasi indolorosa dicta: nam si causam eius auferendo, ipsum curabis, ita vtiq; ut Galenus inquit 12. metho. contra symptoma non pugnabis. His quippe sic declaratis, reliquum est, ut ad id, quod secundo loco proposuimus, accedamus: videlicet quot, quæue sint tristis huius, seu grauis mutationis, ac denum doloris cause declarare; cum iam ostensum sit vnam esse communissimam, ac immediatam omnium dolorum causam, immutationem videlicet confertim, ac violenter factam corporibus sensibilibus. Hæc verò immutatio fit, ut quidam Galeno ascribunt, à duabus causis, solutione videlicet continuitatis, aut alteratione aliqua: quidam alij asserunt vnam tantum meminisse causam ipsum Galenum, continuitatis videlicet diuisionem. Si qui verò sunt, qui velint eum alterationem aliquam duntaxat dolorem excitare, hi velut apertum mendacium asserentes, ac Galeno, id quod nullibi somniauerit, attribuentes, seponendi sunt, nulla alia confutatione egentēs, sed tanquam mendaces condemnandi: quamuis Auerrois tertio colliget, illud sentiat, ac nonnullis rationibus idem tueri conetur aduersus Galenum, & Auicennam cap. 31. at illi, qui continuitatis solutionem duntaxat doloris causam esse ex Galeni sententia contendunt, illud tueri conantur ex eiusdem Galeni verbis quarto de simplicium medicamentorum facultatibus. Quo loco frigidum, ac calidum propterea mordacitatem inducere asserbat: quoniam vnum diuellendo, reliquum verò erodendo continuitatē soluebat, ac continuū corpus distrahebat, qua de re nec frigidū, nec calidum præter continuitatis solutionem, auctor doloris erit, vti isti asserunt. Confirmant illud eiusdem Galeni auctoritate tertio de fracturis cap. 1. quo loco volens non prorsus à probabilitate esse alienum, omnes morbos appellare vlcera, quemadmodum Hippocr. ibidem asserbat, repentinam dicebat quoque mutationem in intemperatura solutionem ipsam continui efficere. Non erit ergo intemperies aliqua (ut isti volunt) doloris causa ad Galeni sententiam, nisi & continuum soluat: & proinde concludunt cum eo vnam tantum esse doloris causam, solutionem videlicet continui. Veruntamen nos, qui Galenum vbique locorum inspicimus quæ euidencia sunt sectari tanquam verum, ac summum Medicum, cum eo asserimus non vnam duntaxat, sed duas esse primas omnium dolorum causas. Quemadmodum & ipse sexcentis in

Locus citat.

Hippocr. 2. aphor. 47.

cap. 7. Quot, quæue sint doloris causa.

cap. 3

Rationes eorum, qui solutionem duntaxat continui causam esse doloris, ex sententia Gal. continent.

Cōment. 34

Opinio nostra de causis doloris, cū Galeno.

2. de art. locis luci dissimè confectus est, præsertim lib. secundum art. medicin. 2. 4. & 6. de locis affectis 12. meth. & 2. de ratione victus in morbis acutis, ac lib. de inæquali intemperie. Immodica namque intemperies, quæ inæqualis sit, confertim sensibiles partes alterans, seu immutans, & violenter easdem partes dolore afficit, ac efficere valet citra unitatis dissolutionem: quemadmodum ipsis nullo modo præter naturam immutatis; ac à naturali statu delapsis omnino dolorem non sentimus, tanquam propria temperie fruuntibus eisdem partibus; & eodem modo si & ipsæ sensim alterentur, aut æqualiter alteratæ sint, indolorosæ permanēt. Si igitur propriam temperiem sensibiles partes possidentes, aut leuiter, seu æqualiter alteratæ indolorosæ sunt, consonum erit eisdem præternaturaliter, inæqualiter, ac violenter intemperatas redditas dolorem sentire: quod confirmauit Gale. primo de caus. sympt. cum de dolore loquens dixit: Porro vehementes eueniunt in tactu à naturali habitu transmutationes ob violentum calidi, frigidiq; occursum. Similiter libro de inæquali intemperie de calida fluxione in musculis loquens, dicebat arterias, & venas ipsorum præter cæteras partes eorum, vario dolore affici; cum interius à fluxione tum excalescunt, tum extenduntur, ac diuelluntur; exterius non modo excalescunt, sed etiam premuntur, ac degrauiantur: reliquæ particulae aliæ comprimendo solum, vel incallescendo, aliæ utroque genere laborant. Quid clarius quod Galenus in his verbis asserit quasdam musculi partes, quod incallescunt duntaxat dolorem sentire? quædā verò quod distendantur, seu diuellantur; nonnullæ propterea quod utroque modo afficiantur, doleant: amplius 2. de loc. affectis dicebat. Verum in erysipellate, & inflammatione, atque in totum in affectibus inflammatoriis non solum, quia intentæ sunt partes laborat, seu dolent, verum etiam quia intemperantia affecte sunt: ac ne hac quidem exigua ad dolorem inducendum vim habente. & sexto de locis affectis de coli dolore verba faciens dicebat, frigidum crassum, aut viscosum humorem, seu statuosum spiritum in corpore crasso, densoque genitum, sed egredi nequeuntem, dolorem excitare: vehementem quidem geminam ob causam, intemperantiam videlicet, & corporum, quibus continetur, tensionem. His quippe locis cuius patere poterit Galenum intemperantiam, eamque inæqualem confertim, ac violenter factam, præter continui solutionem dolorem excitare, absque dubio voluisse, & solutionem continui citra intemperantiam, ac ambas simul. Reliquum est eorum opinionem, qui cum Galeno putant solutionem duntaxat continui doloris causam esse, eorundem rationes soluentes diluamus. Ad primam eorum rationem quam afferunt auctoritate vtentes Galeni 4. de simplic. med. facult. dicimus primo quod quamuis ibidem Galenus doceat modum, quo calidum & frigidum media solutione continui mordacitatem efficiant, nequaquam tamē negauit posse dolorem eadem excitare confertim, ac violenter sensibiles partes alterando, prout sæpius in eius doctrina compertum est. Quæ de re licet vnū docuit; non propterea alterum, quod in plerisque locis scriptum reliquerat, negasse videtur, vt cuiuslibet patere poterit eius dicta sanè intelligenti. Ad hæc non quodlibet calidum, aut frigidum media solutione continui mordacitatem inducit, vt eodem loco patet: sed illud tantum, quod

immoderatus auctum est, calidum videlicet adeo auctum, vt nostram substantiam diuidat, distrahat, atque secet; frigidum verò quod supra quam quod contrahat: ac condensat, etiam diuellendo partes mordicatione infestet, ac continuum soluât. Quæ de re quis negabit; quod quauis vehemens repentina, ac violenta alteratio esse debeat, vt dolorem excitet, quod priusquam ad tantam deuenit immoderantiam, quam exigit continui solutio ex ea orta, valeat confertim duntaxat, & semel totas sensibiles partes alterans, citra continui diuisionem dolorem efficere: datur inquam immoderato immoderacius; vt proinde fiat, quod ex inæquali intemperie, calida potissimum, vel frigida immoderata non extreme tamen, dolor excitetur, præter continui solutionem dolentis partis. Immoderatus autem aucta, de qua Gale. 4. de simplic. med. facult. loquutus est, dolorem gignit interueniente continui solutione: cum immodici calor, ac frigoris hic terminus statui potest, vt lib. de inæquali intemperie patet, quod sit, vt vnus minor, alter verò maior dolor existat. Ad secundam eorum rationem, pro qua Galenum potest inducere lib. 3. de fracturis, facilius est responsio: nam quærens ibi Galenus tanquam probabile, ac verisimile Hippocratis dictum seruare, qui asserbat posse quempiam omnes morbos vlcera appellare, licet non tanquam verum, quamquā non prorsus à probabilitate alienum, vt ipse asserit, pro sustinenda hac probabilitate subiunxit, omnem intemperaturam aliquam omnino continui dissolutionem, si non sensui euidentem, ratione tamen contemplabilem, efficere; allegans se in præallegato loco quarto de simplic. med. facultat. demonstrasse repentinam item mutationem in intemperatura solutionem quoque continui efficere: tanquam probabile ergo, ac verisimile illud asseruit, non tamen omni quaque verum; & cum dicit repentinam mutationem in temperatura solutionem continui efficere, cōcedimus nos modo, quo supra diximus; dum verò subdidit, eam omnino continui solutionem, si non sensui euidentem, ratione certè contemplabilem progignere, asserimus nos illud fateri, nō quod re vera sit, sed vt à calumniis Hippocratis dicta liberet: propterea ait illud posse ratione contemplari tanquam probabile, & non penitus absurdum. Nanque in hoc ea, quæ sensui euidentia sunt, præter eius morem, vt liquet, transgreditur, & vt cunctis pateat me non infomnia, sed vera fateri, Gal. ipsum legat lib. de inæquali intemperie, dum huius Hippocratis dicti etiam meminit: ait nanque, Quippe vlcus unitatis est diuisio, immodicus verò calor, ac frigus proximè accedunt, vt unitatem soluant, & non dixit, quod re vera soluant unitatem: licet ea quoque euidentem sensui non sit, velut fatetur prædicto libro de fracturis: quamuis etiam de immodica loquatur intemperatura, & non de omni; cum de his quæ immodicæ valde non sunt, fortè nec illud veritatem habeat, quod proximè accedant, vt unitatem soluât. Quare licet proximè accedat, vt continuitatem soluant immodicæ intemperantiæ, potissimum calidæ, vel frigidæ, iuxta Galeni sententiam, dolorem tamen efficere possunt citra cōtinui solutionem: quamuis probabiliter loquendo, à veritate prorsus alienum non sit, cum proximè accedant, vt continuum soluant, eas asserere continui dissolutionem efficere: quemadmodum philosophi mobile quoddam quiescere asserunt, etiam si non verè

verè quiescat, sed quieti proximum sit, ac eundem motum, qui quieti proximus est, quietem appellare consueverunt, licet improprie. Ex quibus liquidò constat in Galeni doctrina non modo continui solutionem (vt quibusdam visum est) dolorem excitare, verum etiam ipsam intemperiem inaequalem, ac interdum ambo concurrere pro doloris generatione: & propterea rei euidentiam consecutus in omnibus fere locis tum præallegatis, tum aliis sexcentis illud testatus est. Hanc etiam sententiam confirmat 2. lib. de composi. medic. secundò loc. dum dixit, Vehementissimi igitur capitis dolores fiunt iuxta caliditatem, & frigiditatem, maximè cum inaequales existant. Moderati verò iuxta siccitatem: at ad humilitates nullus consequitur dolor. Nò enim propterea duntaxat, quòd efficacissimæ qualitates sint caliditas, & frigiditas, ea de re cum inaequales sint, vehementissimos excitant dolores similium partium affectiones proritantes simplices, ac inaequales, verum etià quòd cum immodicè valde fuerint, faciunt etiam quodammodo continui solutionem, vt ab eodem Galeno decretum est. Excitant igitur dolores vehementissimos, & quia intemperatas inaequaliter reddunt partes sensibiles, & quoniam erodendo, seu diuellendo continuitatem earum solunt, cum immodicè valde fuerint, vt diximus. Siccitas verò moderatos infert dolores, quoniam nec efficacissima qualitas est, velut prædictæ: & propterea suo occurrit non valet adeo violenter corpus contingere, vt media intemperie dolorem proritet, sed tantum media solutione vnitatis, tendendo videlicet partes, quæ continuæ sunt; & si neque tensionem valde repentinam, & violenter molitur. At humiditas nec vno, nec alio modo dolorem inferre potest ex ipsa, cum nec mutationem repentinam, ac violentam partis alicuius vt similis efficere valeat, neque continuitatem soluere possit, velut siccitas ipsa, aut alio modo, contundendo scilicet, secundo aut erodendo. Nanque ex hisce causis solui continuitas consuevit, vt patet tum 5. tum 12. metho. meden. & secundo de causis sympto. quo loco etiam decretum reliquit, humidum, & siccum nisi calori, aut frigori coniungantur, citrà violentiam corpus contingere: quia nec affatim, nec violenter ipsi immutare possunt, inefficaciores cum sint qualitates. Hanc diuersam ex variis qualitatibus doloris generationem cum Galeno facit Aëtius cap. de dolore capitis, Trallianus cap. 10. lib. 1. & Paulus cap. 4. lib. 3. Ad tertium autem deuenientes dicimus cum Galeno primo de causis sympt. quòd delectatio, & dolor omnibus sensibus contingunt, non tamen pari euidentia, sed in oculis minus euidenter, quam in ceteris: in tactu autem, & gustu maximè luculenter, ab his deinceps in odoratu, & post hunc in auditu. At relicta delectatione, quæ nihil aliud est nisi reditus ad naturam, simul, & celeriter factus: hic nanque est, qui voluptatem affert, dicimus, ex maximis splendoribus visum ipsum propter nimiam secretionem non modo laborare, sed etiam corrumpi quandoque, afficitur quoque gustus instrumentum dolore ab acutis, amaris, acerbis, ac acerbis succis. Corristant verò olfactu qui ex istis succis exhalant halitus. Auditum autem infestat vox aspera, & maxima, & celerissima. Verum tactui accedunt magnæ mutationes naturæ ad frigidi, calidi quæ violento tactu: præterea ab his, quæ contundendi, vel secandi, vel distendi, vel exedendi vim habent. Quæ

propter cum quærimus nos quis affectus præter naturam sit dolor, non de omni dolore loquimur, qui singulis sensibus contingit, sed de eo, qui omnium euidentior est: hic verò erit qui sensui tactus accidit ex vna, aut pluribus prædictarum causarum ortus, molestus quidam sensus existens, vt volebat Plato, compositus ex violento simul, & quòd confertum fit pathemate, sensitiuis corporibus accidente: nihil autem refert dicere vel molestum, vel dolorosum, vel dolorificum, vel laboriosum sensum: quemadmodum neque ipsum pathos, si tristitiam, vel molestiam, vel dolorem, vel laborem, dolentiamve appellaueris. Nam Plato, vt Galenus refert, pro eadem re in Timæo, & in Philebo dictis nominibus omnibus promiscuè vsus fuit, ac in aliis libris: similiter & Hippocrates tum de nominibus, tum de rebus prædictis in eadem fuit sententia, quanquam & hoc etiam pathos in aliis quoque sensibus deprehendi possit, vt prius diximus, in hoc verò videlicet tactu euidentius est. Verum cum tactus in dolore afficiatur ex præternaturali quadam patientis corporis immutatione, is nec morbus, nec causa morbi erit, sed symptoma. Offensa nanque est ipsius tactus actio ex his, quæ ipsum contristant: verum non adeo offensa est, vt ea penitus ablata sit: nam sentit utique non naturaliter tamen, sed cum tristitia, neque adeo imbecilla, ac difficilis est tactus actio, velut in torpore, seu stupore est videre. Relinquitur ergo, quòd cum non ablata, nec imbecilla, seu difficilis sit sensus tactus actio in dolore, quòd necessariò ea deprauata sit propter violentam, vehementem, ac repentinam immutationem eius instrumento occurrentem: & propterea molestum, ac malum hunc sensum, seu laboriosum, qui ex prædicta immutatione perficitur, sensitiuis corporibus accedere necessariū est, iam dictam immutationem sentientibus: omnè nanque prauam, seu malam sensationem bifariam dici à Galeno lib. de diff. sympt. patet: nam vel idem quòd debilitet, vel idem quòd deprauatè significat: at cum in dolore non debilitet tactus sentiat, reliquum est, vt cum mala sit eius sensio, quòd ea deprauata sit. Habet enim tactus ipse insigne hoc symptoma, & proprium præter reliquos sensus, nempe dolorem: vt eodem lib. de differ. sympt. liquet. His quippe sic declaratis reuersi iterum ad id, à quo nostra oratio diuerticulum sumpsit, de capitis videlicet dolore dicimus, quòd licet de eo variè reperiantur apud medicorum vulgus differentiae, apud Grecos tamen omnes quos vidi, præsertim Galenum, tres duntaxat dolore capitis species, seu differentias reperi: quarum vna à Græcis κεφαλαλγία, à Latinis non aliter quam capitis dolor nuncupatur, nomen siquidem sumens ab affectu, & parte affecta, teste Gale. 2. met. Altera κεφαλαία. Reliqua, & tertia ημικεφαλγία dicitur, vt patet 3. de loc. aff. De his igitur tribus differentiis nos separatim verba faciemus ab ipsa cephalalgia exordientes: quæ nihil aliud est, quam recens laboriosus sensus totius capitis, propter grauem eius mutationem, seu tristem. A dhibitum autem est illud verbum recens, vt differat à cephalæa quæ, vt dicimus, capitis dolor diuturnus est, difficulterque solubilis, teste Galen. eodem 3. de loc. aff. totius autem dictum est, quo ab hemierania discrepet. At cum diximus capitis, eam nunc significamus partem, quæ capillo regitur: hoc in quâ intellexit Celsus sub nomine capitis, lib. 4. cap. 2. illud quoque per iam dictam descriptionem constat, quæ afficitur in hac

Quis affectus præter naturam sit dolor. Gal. 1. de caus. sympt. ca. 6. Plato in Timæo post mediū.

Plato in Philebo ante medium.

cap. 3.

Loco citato. De capitis dolore sermo iterum. Quot sunt eius species seu differentie.

2. met. c. 2. 3. de loc. aff. secti. cap. 9. Cephalalgia quid sit.

cap. 9. Quid per capitis intelligendum sit.

Quia pars
a iudicatur.

2. de comp.
medic. ca. 1

Lib. de mul-
titudine. ca. 11

3. de loc. af-
fectu. cap. 9

Yn uer-
satis causis do-
loris capitis.

Particula-
res causae in-
fide.

cap. 1

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

cap. 9

affectione, partem, caput esse: quod coniectare li-
cet ex ipso dolore cum positum. At quoniam inter-
dum extra caluariam affectio est, aliquando intra, &
quandoque quidem omnium exteriorum, aut inter-
riorum, interim non omnium, sed vnius tantum cor-
porum generis, arteriarum videlicet, aut venarum,
aut nervorum, aut membranarum, aut cutis, vel ipsius
denique cerebri, propterea difficillimum est, Gale-
no auctore 2. de compositione medicamentorum
secundum locos, affectum locum dignoscere, siue
vnus, siue plures vno existant, aut qui tandem hi ipsi
extent. Illud tamen non ignorandum erit, nunquid
intra caluariam affectio sit, vel extra. Dignoscet ve-
ro ex ipso dolore, si vsque ad oculorum fundamen-
ta, seu radices extendatur necne: nam si non exten-
datur illucque dolor, extra caluariam erit affectio,
vt Galen. 3. de loc. affect. visum est. Si vero ad oculo-
rum fundamenta is extendatur, intra caluariam erit
dispositio, nam ab ipso cerebro, & ab vtraque mem-
brana, atque a vasis, quae in ipsis continentur veluti
germina quaedam ad oculos deducuntur, vt facile
possit propterea vsque ad eos dolor extendi; etiam
si ipsummet cerebrum in eius propria substantia af-
fectum sit: nam id quoque grauem, ac tristem im-
mutationem sentit: & propterea dolore afficitur, vt
testis est Galenus eodem secundo de compositione
medic. secundum locos. lib. de multitudine, & 3. de
locis affect. Excitatur autem hic dolor, velut & re-
liqui omnes, vt diximus, aut ab inaequali intempe-
rie confertim facta calida potissimum, seu frigida,
aut à cōtinuitatis solutione, seu ab vtriusque. Verum
non satis erit, hoc scire, sed si velimus cuilibet capi-
tis dolori auxilia rationabiliter adhibere, & non in
discriminatum, & citra distinctionem, opus est, cun-
ctas affectiones, ex quibus capitis dolor excitari cō-
suevit, praenoscere. Neque enim omnes ob vnam af-
fectionem caput dolent, sed tum ipsae affectiones
plures sunt, tum curatio ipsarum singularum pro-
pria existit, ex Galeni sententia, eodem 2. de com-
positione medic. c. 1. secundum locos. Vna etenim af-
fectio est, vt ibidem ipse asserit, iuxta intemperiem
simplicem citra humerum complexum. Alia secundum
humorum qualitatem, quaedam iuxta multitudinem
duntaxat ipsorum humorum contingit: quibus etiā
accedit ea, quae sit, cum humores transitus liquorum
ac vaporum obturatur. Et ad haec alia est, cum ob
imbecillitatem in quibusdam capitis partibus flatuo-
sus spiritus innascitur: quandoque etiam ob aliquam
externam causam, apud Galenum Græci appellant,
capitis dolor contingit, velut est externus ardor, fri-
giditas, ebrietas, plaga, & alia huiusmodi. Ex hisce
ergo sex diuersis causis, vt Galeno visum est, capitis
dolores excitari possunt, ex quibus ipsum propter
imbecillitatem suam facillime affici consuevit: inter-
terim ob sensus exuperantiam, seu totius corporis
plenitudinem: quamuis diffusi, & veluti effervesce-
ntes humores interdum, ac vapores à magnis febris-
bus ad caput ascendant, & capitis dolorem efficiant,
vt dicemus. Proinde docebimus nos quo pacto sin-
gulae ex propriis earum indicibus dignosci valeant, vt
demum eis cognitiss, ratione, ac methodo curari pos-
sint, initium sumentes ab eo, qui ex simplici duntaxat
intemperie citra humorum complexum ortum
habet: quamuis nec illud inuenire promptum sit,
sed & exercitato homine indigeat, qui tum per ra-
tionis exercitum, tum per multam, & assiduam
affectionis ægrotum inspectionem eam cognoscat.

Namque proprietates aliqua quidem omnino dici
non possunt, quaedam vero ægre circa ægrotantium
corpora ostendi valent, utpote quae tantum iis, qui
eas saepe viderunt, cognitae sunt: & propterea quod
coniecturalis artis est, id maxime in affectionum co-
gnitione consistit, vt patet eodem 2. lib. de comp.
med. secundum locos. Si autem ex simplici intempe-
rie capitis dolor proritetur calida, vel frigida, dol-
or vehementissimus erit, vt dictum est: namque ex
his duntaxat qualitatibus vehementissimi sunt capi-
tis dolores. Verum si calida fuerit intemperie, pre-
ter vehementissimum dolorem, capitis aderit calor
quampimum ei manum admoueris, ac oculorum
rubor: frigidis asperginibus oblectatur ægri, ex qui-
bus maximum percipiunt adiumentum, praecelsit-
que alia extranea calfaciens causa. At si ex frigida ex-
citetur intemperie, licet vehementissimus dolor
quoque sit, tamen caput tactu calidum non depre-
henditur, neque facies, & oculi rubescunt, nec ari-
da, & collapsa apparet, sed è contrario plena, & pal-
lida, Traiano teste, eodem cap. 10. primi libri, praecelsit-
que externa quaedam infrigidans causa, & fri-
gidis neque iuuantur ægri, neque gaudent, vt Ga-
leno visum est. Quod si ex siccitate ortu habuerint,
moderati erunt capitis dolores, aridior deprehen-
detur capitis cutis citra alia indicia, quae de calida
intemperie diximus: aliquaque praecelsit excitans
causa, & à siccis medicamentis non modò non iu-
uantur ægri, sed noxam suscipiunt. Ad humidam ve-
rò intemperiem, quod nullus consequatur dolor,
iam ostendimus. Quod si non ex simplici tantum in-
temperie capitis dolor excitetur, sed cum humorum
complexu, si biliosus is fuerit, dolor praeter vehem-
entiam mordax quoque erit: similiter cum totius
capitis calore immodico, ac faciei pallore. Interim
etiam os amarescit, quemadmodum Paulus testatur
eodem cap. quarto lib. tertij, instructus à Galeno se-
cundo de compositione medicamentorum secundum
locos, & quae praecelsit victus ratio flauam bil-
lem coaceruauit, pariter temperatura calidior, atas
vigens, immodicaeque sollicitudines praecesserunt.
At si pituita redundante is fiat, praeter iam dicta fri-
gidae intemperiei signa, tum victus ratio praecedens,
tum reliqua concurrentia firmabunt, cuncta namque
pituitam ipsam coaceruauerunt. Nec minus ab atra
bile ortu ducat, cuncta aderunt indicia redundantis
atrae bilis, quae requiras cap. de melancholia. At si
ex plenitudine quatuor humorum ex aequo, seu ex
sanguine dolor capitis proritetur, aderit grauitatis
sensus, aut tensionis: faciei color rubeus, tempera-
mentum, atas, victus ratio, & reliqua concomitan-
tia sanguinis incrementum, seu humorum omnium
ex aequo indicabunt. Quod si eadem humorum mul-
tudo cum obstructione quapiam, seu obturatione
caput dolore infestat, siquidem ea moderata fuerit
cum grauitate praedicta, moderatus erit dolor; sin
fortis, fortiter dolebit, & si mordacem quantita-
tem humorum multitudo complectatur, etiam iux-
ta hanc dolorem augebit, prout Gale. testatur praecel-
sitate lib. 2. de comp. medic. secundum loc. cap. 1.
Verum si cum grauitate, aut tensione, pulsus quo-
que aderit, inflammationem indicabit. Quemad-
modum si tensio aderit sine grauitate, ac pulsus, spi-
ritus flatuosi multitudinem ostendit, vt liquet pri-
mo de Arte curatiua ad Glauconem, cap. 5. aderitque
aurium sonitus, & quae praecelsit victus ratio, corpo-
ris natura, ac reliqua, ad spiritum flatuosum genera-
dum

Ex es-
nu cau

Loco

te.

Signa

toris

ex

intem-

perie

Ex

pro-

ifica-

Ex

tem-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex

pro-

ifica-

Ex exte- dum fuerint idonea. Qui demum ob causam quam-
 nu causi- piam externam proritantur. capitis dolores; vt ex-
 terno ardore, frigiditate, ebrietate, plaga, odoratis
 item calidis, ac reliquis huiusmodi, promptè ex æ-
 gri, seu altantium relatione percipi possunt. Quare
 vt diu in his dignoscendis immoremur non oportet:
 quemadmodum si ob sensus exuperantiâ dolor
 capitis infestet, velut in ore stomachi accidit qui-
 buldam, qui ipsum exactè sensilem habent, facil-
 limè à quavis causa in eum incidere parati sunt, præ-
 fertim ab ipsis odoratis, adeo vt nonnulli ne thuris
 quidem odorem ferre possint, Galeno auctore 3. de
 locis affectis cap. 9. At tempus est doloris capitis pro-
 gnostica enunciare: cuius primum ab Hippocr. apho-
 rism. 70. lib. 4. scriptum est, dum dixit, Quibus
 febricitantibus urinæ sunt perturbata, quales sunt
 iumentorum, iis dolor capitis vel adest, vel aderit.
 Quoniam, vt inquit Galenus in commento, spiritus
 fluosus, vnâ cum calore promptè fertur ad caput.
 Secundum prognosticum eiusdem Hippocr. aphor.
 51. 6. libri scriptum est, cum inquit, Quicunque sani
 dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt,
 & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris ap-
 prehendit. Nam cum sanis (vt Galenus asserit eodem
 commento) dolor in capite repente aduenerit,
 causam referre oportet non modò ad spiritum
 fluosum, sed etiam ad materiæ vniuersim fluentis
 multitudinem: quam ad cerebrum fuisse delatâ in-
 dicant symptomata, quæ post dolorem superue-
 runt; ab Hippocrate in aphor. annotata: per quæ
 etiam symptomata, quod sit quædam materia pitui-
 tosa, commonstratur: atque scicirco febris superue-
 niens dispositionem soluit. Aphorism. autem deci-
 mo eiusdem sexti libri. idem Hippocr. dicebat, Caput
 dolenti, & circum dolenti, seu vehementer la-
 boranti, pus, vel aqua, vel sanguis effluens per nares
 aut os, aut aures, morbum soluit: quando videlicet
 propter inflammationem, Galeno teste, vel crudo-
 rum humorum multitudinem in capite acuatorum
 fieri dolorem contingit: tunc namque inflamma-
 tione suppurata, aut humore excreto solutio fit. ter-
 tio vero prognosticorum. Capitis dolor vehemens
 inquit Hippocrates, & cõtinuus cum febre, si quod
 ex indicis extiterit exitiosus, letalis admodum est: &
 libro 3. Prædictionum dixit. Vterum gerentibus cap-
 itis dolores soporosi cum grauitate fientes mali
 sunt. Galenus autè primo de arte curatiua ad Glau-
 conem scriptum reliquit, dolorem capitis insepara-
 bile esse indicium futuræ crisis, si à principio nõ in-
 uaserit, sed ubi corpus perturbatur, ac agitur na-
 turam tentante ipsam per vomitum, aut per fluxum
 sanguinis ex naribus. Reliquum est cuiusuis doloris
 capitis curationem conscribere, vnâ tamen in o-
 mnibus communem intentionem habentes, causas
 videlicet, à quibus sunt singuli, considerare: hæ si-
 quidem tibi convenientem curationem ostendent
 non cuiusuis doloris capitis tantum, sed omnium a-
 liorum symptomatum, vt liquet lib. 1. de arte curat.
 ad Glauconem. Verum nos non immeritò initium
 faciemus ab iis, qui à nudis dantur qualitatibus o-
 riginem duxerunt, ac à procatarteticis causis. Nam
 cum recentes hi fuerint, facile curantur, cunctique
 optimi Medici ab eis initium sumpserunt, vt patet
 secundo de comp. med. secund. locos.

INSUPER visum est, quò breuiiores simus, ab
 eo capitis dolore qui ex siccitate oritur, cepisse.

Namque ex ea licet non vehementissimus, modera-
 tus tamen gignitur, non tamen intemperie media:
 quoniam citra caliditatem, aut frigiditatem hoc pa-
 cto illum efficere non valeret, vt Galeno patet pri-
 mo de causis symptom. sed media continui solutio-
 nis, hoc est, tensionis: Demum relicta humiditate, ex
 qua nec vno, nec alio modo sola existente excitari
 dolor potest, ad eos deuenimus, qui ex frigida, seu
 calida intemperie cum humorum redundantia, vel
 citra, ortum ducunt; alios, qui ex aliis iam dictis cau-
 sis excitantur, non omittentes: quamvis plurimum,
 vel frigida intemperie caput viciat, vel humida, quin-
 etiam & ambæ simul, vt 13. meth. med. apud Galen.
 legitur. Pro huius tamen ratione vniuersa victus, ac
 medicamentorum ratio ad humidum vergere oportet.
 Talis ergo naturæ aer eligatur, somno vtatur lo-
 giori, vigilias vitet, quietem eligat. Caveat ab im-
 modico exercitio, ac euacuatione immodica, ani-
 miq; affectibus immoderatis, præsertim in calore.
 Cibi eligantur humectantes, boni succi, multi nu-
 trimenti, vt recentium ouorum lutei, gallorum tes-
 tes, gallinarum, seu pullorum caro: interdum perdi-
 cum, ac phasianorum iuuenum; eorundemque ani-
 malium iusculis interim vescantur. Vinum bibant
 tenue, aquosum, optime dilutum: dulcium aquarum
 calefactarum laucris, vt quæ humectare possunt,
 vt conuenit. Capitis irrigationes faciendæ, præse-
 tim iuxta coronalem commissuram ex oleo amy-
 dalino dulci, aut de cucurbita, vel violaceo, & cha-
 mæmelino simul mixtis. Interim verò cum prædi-
 ctis oleis recentem aliquam pinguedinem misceas,
 vt anseris, gallinarum, vel vitulorum: pariter & re-
 cens butyrum, hisque caput inungendum. Humida
 quoque errhina administrari poterunt ex prædictis
 tum oleis, tum pinguedinibus pullorum, seu Galli-
 narum iusculis commixtis, ac saccharo albo.

Medica-
 mentorum
 ratio.

CAPITIS autem dolor ex calore genitus, vt
 solis ardore, flammæ vicinitate, seu odoramentis ca-
 lidis, aliisque huiusmodi, curabitur, si aer, ac domus
 in qua aeger decumbit, natura frigidi deligantur, aut
 qui nostra industria sic præparati sunt ex floribus, ac
 graminibus frigida facultate prædictis per domum
 sparsis, rosâ videlicet, liolis, nymphææ floribus, pam-
 pinis, seu capreolis vitium harundinisque foliis, &
 huius classis reliquis. Refrigerabitur item si humi a-
 qua frigida proiecta sit, ac de vasis in vasa transfunda-
 tur. De somno maxima habenda crit cura, qui sit cõ-
 sureto longior; vigilias præsertim immodicæ penitus
 vitandæ, quies inungenda, cum non modo his, ve-
 rum omnibus, quibus caput dolet, augente adhuc,
 & vigente dolore quiescere melius sit, vt Apol-
 lonij auctoritate Galen. testatur secundo de compo-
 sitione medicamentorum secundum locos. Alii ex-
 crementa, si natura non excernantur, lenibus clyste-
 ribus proritanda sunt: ex eorum namque retentione
 capitis dolor augetur. Animi perturbationes, præ-
 fertim ira, ac furor penitus vitentur. Boni succi ci-
 bis, non tamen cassacientibus, imò natura frigidis
 agrum nutrire oportet, neque eisdem multis. Sunt
 autem tales panis ex aqua frigida lotus, ptisanæ suc-
 cus. Ex oleribus, lactuca, intybum, portulaca. Ex pi-
 scibus conueniunt petrosi, & teneris carnibus præ-
 dicti. Ex carnibus, pullorum, gallinarum, ac colum-
 barum pulli cum omphacio præsertim conditi, gal-
 lorum testes, atque alæ. Ex fructibus, malum puni-
 cum, vix passæ, pyra, ac mala, quæ apia dicuntur, in-

Cura dolo-
 ris capitis
 ex calida
 intemperie.

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

Loco cita-
to.
Act. lib. 6.
cap. 46
Galen. loco
citato.

Medica-
mentorum
ratio.

Citat. loco.

terdum cruda, aliquando verò cocta condonari pos-
sunt. Abstinentum verò ab his, quæ proprietatem
quandam habent capitis dolorem inducendi, vñ à
palmarum grandibus, Galeno teste; eruo, quercinis
grandibus, lactis potu, viticis semine, ac nigris oli-
uis, vt Aët. visum est, & ante ipsum eidem Gale. se-
cundo de compositione medicamentorum secun-
dum locos. Pro potu verò, omnino aqua vtendum
est, quod si ex eius potu ventriculus subuertatur, in
ea parum cinnamomi decoquatur, aut semini co-
riandrorum præparatorum, vel misceatur cum aqua
succus malorum puniceorum acidorum, seu acidus sy-
rupus, vel oxysaccharum. Quod si nec his bene habe-
bit, & aquam bibere non possit, permittendus ei e-
rit ex aquosis vinis aquosus potus, eiusdem Galen.
præcepto. Refrigerantibus item, ac modice astrin-
gentibus medicamentis, tenuiumque partium sub-
stantia prædita vtendum erit. Quapropter in prin-
cipio nil melius erit, quàm rosaceo probè apparato
caput perfundere, ac astiuo tempore frigido existe-
te: optimūque erit si ex oleo crudo, quod ompha-
cinum appellant, confectum sit, nec id ipsum rosa-
ceum vetus existat: magis autem adhuc penetrare po-
terit, Trallia. teste, si cum aceto illinatur: pauca au-
tem eius quantitas adiecta sit. Locus autem illitio-
nis perfusionis, seu irrigationis sit iuxta frōtem, vbi
pilosa pars capitis desinit, ac iuxta vtrumque eius la-
tus, vbi pili ipsi ad aures neantur. Verum inter om-
nes capitis partes, vt sæpius diximus, ea, quæ iuxta
sinciput est, propter laxitatem coarticulationis iux-
ta coronalem futuram, & ob ossium tenuitatem, &
raritatem, facile tum caliditatem, tum frigiditatem
omniū quæ adhibentur pharmacorum intro di-
stribuit. Quare siue refrigerare oporteat ardorem,
siue calfacere frigiditatem, aptissimus erit capitis
iuxta sinciput locus. Proximum à rosaceo chamæ-
melinum locum habet in his corporibus, quibus ve-
hementem frigiditatem inducere veremur, qualia
sunt foeminarum, eunuchorum, ac puerorum, & a-
liorum quicunque molli carne præditi, albumque
habentes colorem. Mensuram autem tum rosacei,
tum chamæmelini, quod ad refrigerationē attinet,
ex prædictis corporis habitibus, & ex ardoris ma-
gnitudine inuenire oportet, considerata simul æta-
te ægri, eiusque & ambientis nos aeris temperie, ac
reliquis huiusmodi: atque ita demum, si oporteat,
rosaceo addere semperuiui succum, aut portulacæ,
aut lactucæ, & polygoni, pampinorum vitis, ac vua-
rum immaturarum, & aliquando solani paululum.
A papaueris verò, & mandragoræ succo abstinen-
dum: non enim citra damnum refrigerant, vt Gale-
no placuit. Nec minus vitanda, quæ cum refrigera-
tione magnopere astringunt: quod si libuerit ex
prædictis, aut aliis medicamenta componere, hoc
modo parari possent. Olei rosacei excipe vnc. ij. a-
que rosaceæ vnc. j. aceti vnc. s. aut prædicti succi sem-
peruiui, portulacæ, seu lactucæ vnc. j. immisceas, ac
aliorum prædictorum infundantium medicamen-
torum tantundem. Poteris insuper & addere cre-
morem feminis cydoniorum, maluarum, aut althææ,
seu psyllij drachm. iij. & loco rosacei, violaceo, de
cucurbita, ac ex nymphaea oleo vti, & cum cera, ac
paucis aceto ad vnguēti formam redigito: quod iā
dictis locis adhiberi poterit, præsertim sincipiti, aut
mori succo per linteolum expresso cum pari rosa-
ceo vitior. Sacculi itē parari poterunt ex rosis, vio-
lis, hordeo, lentibus, ac nymphaeæ floribus prius cō-

tus. At si velis aliis quoque embrochis vti, excipe
foliorum maluarum, violarum, & rosarum pug. s. flo-
rum nymphaeæ drachm. iij. pampinorum, seu capreo-
lorum vitium, portulacæ, seu semperuiui singulo-
rum manip. i. chamæmelis, meliloti, & fenigræci ana-
drachm. ij. coquantur secundum artem, & fiat em-
brocha, addendo aceti parum, præsertim, si dolor
intra cranium sit. Qua ratione permisceri eum præ-
cepimus in singulis iam dictis medicamentis, nec
minus ægri odorem suscipere poterunt ex aqua ro-
sacea, & myrtillorum, cui exigua aceti portione: pro-
derit quoque si hoc tempore per duas, vel tres ho-
ras ante cibum in manū ager assumat. vnc. j. & s. sy-
rupi de infusione rosarum, aut ex nymphaea, vel vio-
lacci cū duabus, vel tribus vnciis aquæ borraginis,
vel cichorii. Apollonij auctoritate, mori succo per
linteolum expresso, cum pari rosaceo caput assidue
irrigari poterit: aut portulacæ folia tusa per se, & cū
polentæ florē capiti imposito, aut solani, vel cu-
pressi folia similiter tusa per se, & cum polentæ flo-
res; vel vitis folia cocta trita cum mulla aqua pariter
imposito.

QVOD si non modo ex calida intemperie, sed
ex flauæ bilis redundantia dolor capitis genitus fue-
rit, non aer duntaxat, sed cuncta, quæ sæpius cōscri-
psimus, ad frigidum, ac humidū declinare opus erit,
ita vt vniuersa victus ratio non tantum frigida, sed
humidior sit, oportet, & boni succi. Cæterum cu-
randi ratio statim à bilioso humoris euacuatione au-
spicanda erit. Verum vt probè hunc euacuare pos-
sis, humidior prius victu opus est, balneisque tem-
peratis, vñctionibus, & aquæ potu liberaliore. Ita
enim, vt inquit Trallianus, diffusa bilis, & veluti
imbecillior facta, facilius à medicamento ipsam tra-
hente euacuabitur. Quare si biliosus humor copio-
sus nimis, & calidus fuerit, ita agere oportet. Qui-
bus verbis Trallianus & alteratione, & concoctio-
ne, simulatque præparatione, priusquam purgetur,
bilem indigere, potissimū vbi firmata in aliqua par-
te decumbit, lucidissime ostēdit: id quod nos fusius
in nostra methodo probauimus. Propterea nō mo-
do ex iam dictis illud probè exequi posses, verum
etiā exhibeas per aliquot dies ante purgationē
syrupide oxysaccharo vnc. vnam: & ex infusione ro-
sarum vnc. s. vel tantundem syrupi violacci, seu ex
nymphaea, vel ex succo cichorii confecti, cum bor-
raginis, seu intybi aquæ vnc. iij. Nunquid vero ante
purgationem competat venæ sectio, non admodū
liquet. At dicimus nos, quod si bilis sincera fuerit,
aut alteri humori permista, quàm sanguini, venam
secare non oportet. Verum si sanguini cōmixta fue-
rit (id quod sæpius accidit) aliis consentientibus, ve-
nam secare non esset absurdum: quod tum ratione,
tum principis Arabum auctoritate probari possit,
nisi nimium prolixus fierem: secandaque vena erit,
vel media, vel humeralis, prout maior, vel minor
fuerit eiusdem bilis redundantia, ac maior, vel mi-
nor cum sanguine commisto, non semel tantum,
sed si opus fuerit, ipsam iterare: cum non multa quā-
titas sanguinis unica vice extrahenda sit. Apparen-
te autem demum concoctione absque molestia, mi-
norique negotio à purgante medicamento trahetur,
promptiusque à natura ipsa excernetur bilis. In-
frascripto autem vitior, quod excipit tamarindorum
drac. vij. myroba. citrinarum drac. ij. florum borrag-
violarum, & hordei decorticati ana drachm. iij. fiat

Medica-
mentorum
ratio.

decoctū in quo vnc. ij. vel iij. manna electa, & vnc. s. vel drac. vij. diacatholicon dissolue, & fiat potio: aut cum prædicto decocto dissolue cassia fistula vnc. j. & s. seu sacchari violacei vnc. ij. aut syrapi ex plurib. infusionibus violarum, vel rosarum vnc. iij. rhabarbari in prædicto decocto infusi cū spica drac. j. aut scrup. iij. & cum vnc. s. diacatholicon, aut drac. ij. diaphanis solutiui, vel tātundem antidoti ē succo rosaceo, fiat potio. Temporibus autem intermediis clysteribus vti non erit absurdum, in hunc, vel similem modum paratis, Maluarum, violarum, foliorū betæ, & borragin. ana manip. j. excipe, ex quibus factō decocto permisceantur olei violacei vnc. iij. vel iij. mellis rosacei vnc. ij. cassiæ tractæ, vel pulpæ cassiæ fistula vnc. j. salis parum. Et interdum (si videbitur) addere poteris hiera picra simplicis vnc. s. At si trasior bilis fuerit, ac prædictis purgationibus non cedat, ex Galeni picra, agarico trochiscato, ac rhabarbaro formatis catapotis purgari poterit æger: fumes agarici scrup. ij. rhabarbari, cum spica, & pulueris hiera simplicis ana drac. s. cum syrupo violaceo, & aqua betonica fiant catapotia: post quæ per duas vel tres horas vnc. ij. manna, vel iij. syrapi ex pluribus infusis, rosarum vel violarum assumat cum aqua borrag. intybi, aut cichorij, in qua prius drac. j. myroba. citrinarū fuerit decocta. His quippe peractis ad topica medicamēta deueniendum erit: quæ ex iam dictis in cura doloris capitis ex ardore orti confici, ac parari possunt; vnum tantum animaduertentes, quod frigidiorebus, ac humidioribus pro cura doloris capitis ex bile orti, vti possumus, ac debemus. Insuperque & errhinis similis facultatis, humidis præsertim ex aqua hordei paratis: in qua foliorum maluarum, violarum, ac lactuæ, singulorum pug. j. decoquatur: cui succum foliorum betæ adicias, ac vitior, lib. ij. prædicti decocti assumendo, & vnc. iij. vel iij. iam dicti succi Cucurbitulas sine scarificatione, ac crurum, & brachiorum frictiones nō omnino omittens, sed intercapedine quadam, temporibus congruis, eis vtare: Similiter si quando ex prædictis humoribus reliquæ quædam relinquantur, ac iam dictis medicamentis minimè cedant, vt pote tenuibus poris, ac meatibus impactæ, & ob id etiam capitis dolor perseueret, cū rosaceo ipso, aut alijs conscriptis medicamentis refrigerantibus ea primum medicamenta miscenda sunt, quæ digerendi vim habeant, ac demum solis digerentibus, aut discutientibus vti, si oporteat. Perpetuo tamen ab his, quæ validam vim tum digerendi, tum discutendi habent, abstinendum erit: cum & immodicè quodque calida ea esse oporteret: & propterea affectio nē ipsam, cuius causa capitis dolor genitus est, irritaret magis, ac augerent, quàm curaret. Horum autem materiam, prout magis cōmoda videbitur, ex his, quæ in sequenti dicentur, eligere poteris.

EX perfrigerato autem capite si excitetur dolor aer frigidus vitandus, & omnino calidus eligendus erit. Somnus moderatus, non tamen solito longior. Motu quoque vtendum totius corporis, equitatio ne præsertim, & pedum ambulatione. Alius iis humidior sit, quàm sicca, vt singulis diebus ventris recrementa excernantur natura, aut arte, cum glande videlicet, aut clystere. Vitent tristitia, ac graues cogitationes, aliosque immōdicos animi affectus fugiant. Deuitens cunctos cibos, ac potus, qui refrigere possunt, ac eligant quæ recentia, & forbiliagal-

linarum, pullorum, perdicum, & phasianorum carnem. Necnon pro potu, vino vtantur tenuium partium, quod mediocriter extenuare, ac calfacere potest. Quæ ratione fit, vt lauacra quoque calida plurimum conferant: & vt simpliciter dixerim, pro eius curatione calefaciētibus vti oportet: verum pro intemperiei magnitudine remedium quoque variandum erit, iuxta Tralliani sententiam. Proinde neq; difficulter curatur capitis dolor ex frigidityte ortus potissimum ambientis, si recens sit, Galen. auctore 2. de composit. medic. secund. locos, vt interdum sufficiat rutaceum oleum calidum syncipiti (vt dictum est) affusum perfectè hominem liberare, vt ipse testatur, loco autem rutacei, anethino, & chamamelinino vti poteris. Si verò vehementiori calfactione opus sit, nardino, serpillino, aut amaracino, & irino. Frons quoque talibus inungatur, & narium, ac aurium meatus illinantur. Quidam etiam pedum vestigia, ac sedem ex eis illinunt, vt idem Galen. testatur præcitato loco. Confert insuper ex calfactis panis caput calfacere, aut ex saccellis ex milio, & sale confectis, & prius calfactis ac paucō vino albo, seu aceto irrigatis. Poterunt parari insuper, & alij sacculi ex rutæ folijs, hyssopi, ac serpylli singulorum pug. j. sampfuchi, betonica ana drac. ij. florum stœchadis, spica ana drac. j. rosarum rubearum manip. s. similiter & vnguentum conficiatur ex olei rutacei chamamellini, & nardini ana vnc. j. hyssopi, spica, florum stœchadis ana drach. s. mastiches thuris ana drac. j. & cera parum, & si videbitur, poteris interdum addere castorij scrup. j. Embrochæ pariter nec omittantur paratæ ex decocto florum chamameli, fœnigræci, seminis lini, fertule campanæ ana manip. s. spica, florum stœchadis ana drac. j. foliorum rutæ, hyssopi, & sampfuchi ana drac. iij. Ex quibus quoq; aut similibus per nares vaporē agri suscipiant. Lauri insuper folia tenera cum irino vnguento trita, capiti adhiberi poterunt, aut sampfuchi similiter folia cum vino trita, seu rosaceo, vel cyperū tufum adipe anserino admisto capiti illinito. Conueniunt & fomenta interim per spōgias calida imbutas, & expresas, maximè si in aqua lauri folia tenera fuerint incocta, aut sampfuchi, vel cyperi. Prodest item oleum irinum cum serpyllo, & exiguo aceto infusum, vt inquit Marcellus: magis autem si aut iridis radix, aut peucedani succus prioribus admixtus fuerit: prodest etiam & ruta cum oleo irino, & exiguo aceto cocta vt idem testatur. Hedera insuper folia mollissima quæque trita cum aceto, & rosaceo aduersum omnē dolorem capitis fronti illiniuntur. Plinio secundo auctore.

GENITVS autem ex pituitosis humoribus capitis dolor, curabitur primò aere ad calidū, & sic cum vergente: & si naturalis haberi non possit, arte paretur. Carnibus vtantur magna ex parte assis, interdum elixis, saluæ folia adhibendo, aut betonica, serpylli, sampfuchi, seu hyssopi. Pro potu tenui vino vtantur, & si illud auerferentur, aqua, in qua decoctū sit cinnamomum. Omniaque ipsos iuuant, quæ mediocriter extenuare, & calfacere possunt. Reliqua victus ratio similis seruanda erit ei, quam præcepimus in prædicto capitis colore ex frigidityte orti, illud tamen seruantes, quod ad ficius quoque inclinet præter caliditatem. Pro extenuatione verò, ac incisione prædicti redundantis succi, melli rosacei excipe vnc. j. & s. cum aqua hyssopi, betonica, seu sampfuchi

cap. i

cap. i
Lib. i. ca. i

Cura doloris capitis ex redundantē pituita orti.

Medica-
mentorum
ratio.

Purgatio.

sampfuchi vnc. iij. aut oxymellis simplicis tantundē cum vnc. s. syrupi de infus. rosarum. similiter cum aliqua prædictarum aquarum. Quibus pluries iteratis, ac propterea prædictis succis præparatis, ea, quæ purgandi pituitam vim obtinent medicamenta propinanda sunt, velut, Recip. agarici trochiscati scrup. iij. diacatholicon drac. vj. vel diaphœnicon vnc. iij. pulpæ calsiæ recentis agarici trochiscati drac. j. & s. myrobalanorum chebularum drach. ij. florum stœchadis drac. j. fiat decoctum in aqua fontana, betonica seu hyssopi, aut sampfuchi: in quo dissolvas syrupide pluribus infus. rosarum rubearū vnc. iij. diacatholicon vnc. s. aut diaphœnicon drac. ij. fiat potio. Verum quoniam hoc malo affectus non semel tantum purgatio conuenit, sed bis, aut pluries: cum vni tantum purgationi sua crassitie, ac lentitie redundans succus non recedat; ea de re iterum post vnam, vel alteram purgationem extenuandus, ac præparandus erit ex prædicto oxymelite, aut eodē scyllino, seu syrupo ex stœchade: quibus parum syrupi ex infusione rosarum (si videbitur) addere poteris, & in aquis hyssopi, serpilli, aut stœchadis parum decoquere. Et cum præparatus fuerit humor, ex cataportis expurgari poterit: quæ recipiant pilularum arabicarum, line quibus, aut coctiarum drachm. j. agarici trochiscati scrup. ij. cum oxymelite, aut syrupo ex stœchade catapotia formentur. Post quæ per aliquod spaciū vnc. iij. syrupi ex pluribus infus. rosarum rubearum, aut ij. ex tribus infus. rosarū perficarum, vel domini Augustini cum aqua borrag. vel lupulorū exhibere poteris, aut vnc. j. pulpæ calsiæ fistulæ. Conferunt etiam iis clysteres: tum vt superflua recrementa in intestinis contenta extrahamus, tum etiam propter reuulsionem eorum, quæ ad caput in iis ferri consueverunt, factio prius decocto ex maluis, borragine, sampfuchio, betonica, serpylllo, ac stœchade, fursure, & fale: in quo dissolvas olei anethini, chamæmelini, aut rutacei vnc. iij. mellis rosacei vnc. ij. benedictæ drach. iij. aut diaphœnicon tantundē, vel hieræ picræ drac. vij. & agarici drach. j. & s. vel drach. ij. misceantur singula, & fiat clyster. Ex eiusdem etiam, vel similibus glandes confici poterunt melle addito: vt si agarici drac. ij. assumas, salis gemmæ, & pulueris hieræ drac. j. cum melle quantum satis sit, & figurentur glandes, quibus clysteriorum vice vitior. Nec omittendæ erunt, reuulsionis gratia, frictiones brachiorum, ac crurum; nec non cucurbitulæ citra scarificationem in occipitio, ac dorso affixæ post purgationem: potissimum. A qua item septimo quoque, vel octauo die, si assumant drach. j. theriacæ, aut mithridati, optimum erit, similiter diambra, vel diamoschi. Nec minus hoc tempore apophlegmatismi conferunt. Tralliano teste, qui ex vna passæ drach. iij. hyssopi, & sampfuchi singulorum drachm. j. mastiches drach. ij. cum paucis melle, & cera pastilli formentur: quorum vnus notabili quodam spacio commanducetur, aut ex piperis, & sinapis singulorum drachm. j. hyssopi, staphidis agriæ, origani, & pyrethri scrup. j. vna passæ drach. iij. cum melle, & cera iidem singantur, Errhina etiam medicamenta per nares approximata, quæ nasalia appellant, præsertim mollia, & liquida valde conducunt in euacuanda à capite pituita. Componantur autem ex hyssopi, sampfuchi, & betonice decocto: de quo lib. ij. assumens, adde succi foliorū betæ, aut succi radicū eius vnc. iij. vel lib. s. vel si for-

Clysteres.

Glandes.

Cucurbitulae.

Apophlegmatismi.

Errhina.

tioribus indigeas tantundem succi trassicæ, aut cyclamini adicias. Poterit insuper & à capite pituita expurgari cum his, quæ sternutamenta prouocant: quare & interdum eis vitior, vt puluere albi hellebori, caltorij, piperis, aut nigellæ naribus indito, vel composito ex his. Ex denique naribus odoramenta calida adhibere oportet, velut infra scriptū, quod recipit sampfuchi, corticum, & foliorum citri, hyssopi, & rutæ ana scrup. ij. caltorij, florum stœchadis singulorum scrup. j. styracis calamitæ, ladani, ligni aloës ana drach. s. mastiches, corticum thuris, spicæ, & caryophyllorum, maceris ana scrup. s. sandalorū rubeorum, & corallorum rubeorum, singulorum drach. j. cum succo betonice, seu sampfuchi, & cremore tragacanthi fiat orbiculus odoriferus, mochi ac ambra grana iij. vel iij. addendo. His denique peractis, ad topica confugiendum est medicamenta, quæ disiciendi, ac attenuandi, & dissecandi vim habeant, præsertim ea, quæ in præcedenti capitis doloris curatione ex frigidityte notauimus. At si ex humore melancholico dolor capitis fiat, simili victus ratione, ac modo curationis vtendū erit, prout cap. de melancholia præcepimus. Quæ de re vt iterū hic tractemus superuacaneum puto, sed cuncta quæ dici possent, eodem loco requiras.

SI VERO non ex redundantia pituitæ, aut vtriusque bilis, sed sanguinis solius, aut quatuor humorum ex æquo auctorum dolor capitis exciteretur: quam redundantiam, siue auctiorem, multitudinem seu plenitudinem appellant simpliciter dicant: pro eius curatione aer frigidus, & siccus eligendus erit; mediocriter exercendi ægri, ac mediocri somno vtantur: studeas tamen pro virili, vt alius eis humecta sit, si non sponte, cum clysteris arte perficiatur. Fugiant immodicos animi affectus. Vitent carnes, oua forbilia, & reliqua, quæ copiose nutriunt. Vescantur hordeacea ptisana, aut frigidis oleribus, lactuca videlicet, cichorio, endiuia, portulaca, borragine, & similibus. A vino abstineant, sed aquam hordei, aut in qua decoctum sit parum cinnamomi, vel seminum coriandrorum præparatorum, bibant. Hunc autem capitis dolorem totius corporis euacuatione haud difficulter curabis, potissimum si in toto quidem corpore adsit plenitudo, nec in capite tantum. Quapropter media in cubito vena audacter statim incidenda erit; & nisi quid prohibeat, notatu digna copia sanguinis extrahenda. Quod si id vires non ferant, non vnica duntaxat vice, sed duabus aut pluribus sanguinis missio erit facienda. Verum post primam, externa in cubito vena incidatur, velut etiam si non magna fuerit plethora, ab eiusdem incisione auspicanda curatio erit. Similiter vbi caput propter eius imbecillitatem multitudinem contineat: quo casu, saltem reuulsionis gratia, vena secanda erit externa, seu humeralis; deumum si opus fuerit, frontis quoque vena incidatur. Veluti etiam clysteribus, & his quidem interdum acibus, nexibus, ac frictionibus in partibus inferioribus, plurimis expedit vt, Galeno auctore primo de arte curatiua ad Glauconem. Ipsi quoque parti affectæ hoc tempore remedia adhibere conuenit: quæ à capite repellendi vim habeant primo, deinde ea, quæ dissoluant, atque euacuant, postremo verò corroborantibus vtendum. Repellit autem (eodem Galeno auctore) oleum immaturarum, quod Græci omphacinum nominant, aut rosaceum, seu

rosaceum, seu oxorrhodinum: qua de re iis com-
modè vi poteris, ac reliquis, quæ in cura doloris
capitis ex ardore orti conscripta sunt. Deinde ex
discussoris medicamentis quippiam addendum e-
rit, paulatim detractis pharmacis, quæ repellunt,
vt chamamelinum, & anethinum: aut si in oleo
serpyllum, seu spondylium, sampuchum, aut hyf-
sopum decoxeris: quæ virium etiam aliquid capi-
tis partibus adiiciunt: & quæ debiles sunt, robo-
rant: vt proinde ipsis vsque ad integram sanitatis
restitutionem vtendum sit, eiusdem Galeni præce-
pto. Denum si oportuerit, per nares, & palatum
expurgandi sunt, ac sternutamenta excitanda, &
cucurbitulæ in occipito cum scarificatione affi-
gendæ. Irrigationibus quoque, ac aliis medica-
mentis, quæ vim discutiendi habeant paulò antè
conscripitis (vbi opus fuerit) commodè vi poteris:
nos verò breuitati indulgentes iterum ea non repe-
timus. Velut nec si ex iam dictis causis cum obtu-
ratione quoque capitis dolor fiat, quævis earum sit,
nouam præcipimus curationem, cum ex eisdem fe-
rè curari possit, causam videlicet auferendo, quæ
obturauit.

A T si ex flatuoso spiritu redundante quispiam
in dolorem capitis incidat, siue in reliquo corpo-
re simul, siue in ipso capite duntaxat, relicta victus
ratione, quæ omnino talis esse debet, vt flatum non
gignat: pro eius curatione, si in capite is non tan-
tum genitus sit, sed ex corpore efferatur, in princi-
pio repulsoria curatione vtendum est: quod vbi
moderatè factum sit, ex mitigatoriis, ac concocto-
riis quippiam admiscere ad repulsoria oportet. Dein-
de etiam discussoria addenda, ita vt paulatim re-
pulsoria pharmaca detrahamus, donec ad contra-
riam misturam perueniam medicamentum ei, quam
à principio habuit, siquidem influentem vaporem,
seu spiritum repellere necessarium sit: infartum au-
tem concoquere, attenuare, eundemque ipsum dis-
cutere; ac circa ipsam affectam partem firmitatem
inducere, ne videlicet quod insit, suscipiat: at-
tenuatum verò excernat, impactumque conco-
quat, & attenuet; prout scriptum reliquit Gale-
nus secundo de compositione medicamentorum
secundum locos. Iuuat autem eos magnopere euac-
uatio alui prius per clysterem validum: nam ex
eo, præter id, quod ea quæ circa ventrem, mes-
enterium, ac circa hepatis sima hærent, euacuantur; ad-
huc ea, quæ ad caput feruntur, reuelli contingit.
Dissoluas autem in eis præter ea, quæ iam dicta sunt,
interim benedictæ drac. iiii. aut electuarij indi, seu
diaphenicon tantundem, vel diacatholicon, aut
hieræ picæ drac. vii. in clysteriorum autem deco-
ctum, quæ flatum etiam discutiunt, adiicienda erūt:
vt semen anisi, feniculi, carei, aut cumini, aride
quoque ficus, ac fursur. Corroborandumque inter-
rim affectum membrum, vt neque ipsum vento-
sum flatum gignat, quodcumque id fuerit, siue ven-
triculus, aut aliquod intestinorum, seu iecur, aut
lien, aut quoduis aliud. Post quæ si vnà cum flatu
calor in capite prædominatur, rosaceum adhiben-
dum erit, quod videlicet repulsorium, concocto-
rium, & mitigatorium, adhæc & discussorium sit,
vt Galeno visum est eodem secundo de composi-
tione medicamentorum secundum locos: pariter &
acetum, cum & repulsoriam simul, & attenuato-
riam, imò & discussoriam habeat facultatē, eodem

Galeno auctore. Verum per se solo aceto vtendum
non erit, ob facultatis ipsius vehementiam; sed cum
eo rosacea aqua admiscenda erit, vel etiam ipsum
rosaceum, aut portulaca, polygonum, seu solanum.
Si verò cum frigore flatus sit, loco rosacei chamæ-
melino, aut anethino, cum aceto vtaris, vel cum ro-
saceo etiā, & aceto ea permisceas. At si augeat af-
fectio, Archigenis auctoritate, irrigatio facienda e-
rit ex ruta viridi cum aceto, & oleo trita, aut ex suc-
co radicum iridis cum aceto: polygonum quoque
cum ruta, oleo, & aceto dilutum adhibere conuenit;
aut serpyllum cum aceto, & oleo tritum, seu succum
e baccis lauri expressum cum aceto & ruta. Amyg-
dalæ quoque amaræ delibratæ, tritæ cum aceto &
oleo, irrigationis modo adhibita, aut cerati crassi-
tudine in linteolo fronti impotitæ, cum primū
affectio incipit augeri, magnopere cōferunt. Quod
si cupias facculis potius vi, circa initia, ex milio, ro-
sis, salicis foliis, & polygono, solano, seu portulaca,
eos parare poteris, & fronti, ac sincipiti adhibere.
Postea verò prædictis sampuchum, serpyllum, hyf-
sopum, ac rutam, lauri folia tenera, cyperumque ad-
iicere valebis. Nec non odoramentis iam dictis, seu
castorei, & musci, aut amarici vtaris; similiter his,
quæ sternutamenta proritant. Poterunt insuper a-
gri diacumini, aut dianisi drachm. j. manè assūme-
re, aut tantundem theriacæ, seu mithridati. Si autem
flatuosus spiritus, propter earundem imbecil-
litatem, in capitis quibusdam partibus generetur:
nam nec illud mirum est, neque impossibile, pro-
ut Galenus testatur eodem secundo libro de com-
positione medicamentorum secundum locos, præ-
ter ea medicamenta, quæ repellendi vim habent,
cum eis opus non sit, cunctis iam dictis, aut eis-
dem similibus medicamentis vitare, parum etiam
& in hac affectione conferunt, & si non noceant
ea quæ intus assumuntur, præsertim diacuminum, &
dianisum.

S V N T quibus caput assidue dolet, vbi vel li-
beralius vinum ingesserint, vel meracius, idque ma-
gis, si suapte natura calidum fuerit, vt testatur Gale-
nus tertio de Locis affectis, vt pote quod omnino
quidem caput vaporibus replet, aliquando verò et-
iam humoribus calidis, cum & citra vini potum e-
iusmodi ad caput promptè deferuntur. Pro eius cu-
ratione scopus primus vniuersalis, & communis o-
mnibus habendus erit, nempe euacuatio. Iubendi
igitur sunt, si crudum adhuc in eis vinum in stoma-
cho fluctuet, vt tepida aqua hausta vomant, per se
sola, aut paucò aceto, seu acetoso syrupo permista.
Quod si etiam post concoctionem caput doleant,
refrigerantibus vtendum est, ac repellentibus, vt
multitudo quidem euacuetur, caliditas verò frige-
fiat: quale est rosaceum per se, & cum aceto, aut he-
dere, seu brasica succo: quin & ipsa brasica folia
in aquam calidam macerata, capitiq; circumposita,
ac alligata, naturaliter ebrietatem arcent, vt quæ
vapores resiccant. Propterea eiusdem decoctæ v-
sus in id efficax est. Similiter ex leguminibus lens
hos adiuuat, præsertim eos, qui humidiores habent
ventriculum: rutæ quoque folia trita cum aceto,
admixta eis rosæ capiti tepidè affusa profunt, Mar-
cello auctore cap. 10. Aliis quoque boni succi cibis
vtendum (non tamen calfacientibus) vt pitifanæ
succo, ex oleribus lactuca, pane ex aqua loto: & in-
terdū ouis forbilibus. Pro potu omnino aqua vtend-

2. de compo
si. med. secū
dum loc. c. 1

dum, aut vino tenui, albo, modico, potissimum si a-
quam bibere non possint. Post omnem verò cibum
parum dandum est de malo punico, aut pomo, aut
vua passa. Breuiter, vniuersus cibus sit bonis succi,
stomacho utilis, & qui vapores arceat, Tralliano
auctore. Ceterum somni, ac quietis cura in primis
habenda erit: cum manifestum sit, Galeno teste,
quod tum hos, tum omnes, qui caput dolent, auge-
scente adhuc, & vigente dolore, quiescere melius
est: remittente verò, ac decresciente, in locis aptis
deambulare; & ante cibum quidem pluribus deam-
bulationibus vtendum. Post acceptum verò cibum,
breuibus, & lentis. Oportet aut neque multa co-
medere, neque statim deambulare, sed post duas,
aut tres, aut etiā plures horas. Si vero post hæc pro-
bè dormire non possint, ad balneum quàm celer-
rimè inducantur, calidæque aqua eis in balneo sa-
pe affundatur. At si ex vaporibus, & humoribus in
caput sublatis reliquæ quædam relinquuntur te-
nuibus poris, ac meatibus impactæ, & ob id etiam
capitis dolor perseueret, à rosaceo quidem absti-
nere expedit, & chamæmelino moderatè calido, at t
anethino primum, postea (si opus fuerit) irino vt-
tendum. In balneo verò caput calida perfundatur,
non solum ob id: vt quidpiam circa ipsum discutia-
tur, sed & somni conciliandi gratia, vt Galen. præ-
cipit secundo de Compositione medicament. se-
cundum loc. cap. 1. Quapropter etiam secundum,
aut tertium quoque ad vespèram balneum appa-
randum est, acceptis ab eo lactucis ex aceto, verum
aqua affusa multa, vt acetum planè exaquet, nisi c-
mnino aquosum sit ipsum acetum. Si quis autè vel t
ab ebrietate præseruari præsumens ea, quæ ipsam
arcent, quinque, aut septem amygdalas amaras, à
ieiuno comedat, Aëtio teste: aut vinum absinthites,
seu myrtè præassumat. Prohibent insuper & ebrie-
tatè ipsam myrti bacce præassumptæ, & brasiçæ cau-
liculi præcomesti: at quæ ebrietatè extinguunt post-
ea ingesta, sunt centaurei tenuis decoctum, cerui-
num cornu, ac verbenacæ semen cum aqua.

Cura dolo-
ris capitis
ex ictu aut
casu orti.

Vicius ra-
tio.

Si ad casu
sen ictu se-
quatur vul-
nus, aut co-
nussio, cura-
tio.

DOLOR capitis etiam ex ictu, aut casu acci-
dit, inflammatione interim subsequente. quare ei-
us curatio magno studio tractanda erit, Trallia-
no teste. Nam periculum inducit, dum humores
copiosius ad ipsum caput confluunt. Quapropter
pro eius curatione, à vino per initia, carnibus, & in
totum ab omni victu valentiori, seu pleniori, præ-
sertim si febris adest, ægros coercere expedit: pti-
sanæ verò cremorem, aluam decoctam, lactucam,
intybum, & cucurbitam pro cibo exhibere con-
uenit. Pro potu aquam per se solum decoctam,
aut cum semine coriandròrum præparatorum, vel
paucissimo cinnamomo. Acida verò, acria, & fal-
sa omnino vitanda sunt. Ad hæc quies, & corporis
tranquillitas præcipiendæ, ac cibi parcitas: fugien-
da verò sunt, sol, balneum, clamor, & contentio.
Quod si plaga, aut casus, vulneris aut contusionis
causa existant, plures scopi erunt ad remedium
inventionem, Galeno teste secundo de Composi-
tione medicamentorum secundum loc. cap. primo.
Vnus quidem in vulnere, ad quod conglutinantibus,
& inflammationem arcentibus pharmacis vt
oportet; postquam vlcus labia constrinxerimus
fibulis impositis, aut aliis, vt oportuerit. Alter verò
scopus erit in contusione, & tertius in doloribus:
qui quandoque in ipsis folis percussis partibus fiut.

Plerumque verò etiam ad vicinas partes extendun-
tur propter continuitatem substantiæ, tum cutis ip-
sius, tum eius membranæ, quæ caluariam ambit,
præsertim si visque ad eam plaga penetrat. Quod si
per communionem eiusdem membranæ caluariam
ambientis, quàm ad duram cerebri membranam
circa futuras habet, etiam intra caluariam inflam-
matio ipsa distribuatur: non absque periculo ei-
usmodi capitis dolor exsistit. Contingit autem in-
terdum in casu, præsertim ex subliqi facto, vt que-
dam circa cerebrum, aut membranas partes ab-
rumpantur: quod vbi euenit, etiam amplius capi-
tis dolor inualefcit: ipsaque affectio tota agrè cu-
rabilis redditur, & periculum ingens, ac præceps
imminet. Verum si oborta inflammatio solum cu-
tem occupet, & non vltèrius adhuc procedat, ni-
hil negotij est, sed dolor etiam, qui circa caput con-
tingit, facillè discutietur. Optimum itaque fuerit in
his, Galeno auctore, nisi ætas prohibeat, & nisi vi-
talis facultas debilis appareat, à venæ sectione cu-
rationis initium facere: ita nanque influxus reuella-
tur, vt Trallianus refert. Incidenda autem erit me-
dia, aut humeralis vena. A venæ sectione conue-
nientibus capitis irrigationibus vt oportet, oleo,
dulci ipsum perfundendo, lanis contegendo, foun-
doque omni ex parte, vt ne caput rigeat: conueniunt
quoque & fomenta per spongas aqua calida im-
butas. Quod si ætas, huc virum imbecillitas, aut e-
tiam ambo simul sanguinis detractionem fieri im-
pediant, aluum per clysterem euacuabimus reuul-
sionis simul, ac euacuationis gratia: atque inde au-
xiliis ad inflammationes commodis vtetur. Nan-
que incipientibus, & adhuc nascentibus ipsis, rosa-
ceum cum aceto; in vigore verò consistentibus
rosaceum solum adhibemus. Ipsis verò decrescen-
tibus, pharmacis laxantibus appellatis vitur: quæ
admodum in induratis inflammationibus absti-
nendum, ac pulegium rosaceo admiscemus. At nec
circa initia indefinitè acetum rosaceo admiscen-
dum erit. Nanque cutis capitis, aut quæ post eam
est membranæ caluariam ambientis inflammatio-
nes citra quidem vehementem dolorem obortæ,
per exigui planè aceti ad rosaceum admisionem
iuuari possunt: lædentur autem vbi magnæ fuerint,
dolorèque vehementem induxerint. Similiter si
crassæ cerebri membranæ nudæ rosaceum offerat-
tur, quemadmodum in his, quibus capitis oscicu-
lum aliquod excisum est, fieri consuevit, solum ip-
sum leniter tepefactum adhibemus. At si citra de-
nudationem per capitis iuxta synciput partem, sa-
na, & integra existente caluaria, rosaceum ad ce-
rebri membranam peruenire velimus, acetum ei (vt
eò perducatur) admiscemus. Quod si vigilie urgeant,
etiam chamæmelino oleo, & non rosaceo duntax-
at, subinde verò vtriusque commistis perfundere
caput debemus, plus & minus à magnitudine in-
flammationis, agri temperamento, & ætate con-
siderantes. Proderint quoque iis rosæ, & irinum o-
leum aceto decoctum. Item rosæ aride folia ma-
cerata prius passo, deinde cocta, atque trita, & ita
imposita, & fertula campana similiter facta, vel myr-
ti folia tenera ex vino trita cum myrrha, & pule-
gium ex vino tritum, & mala cydonia vino cocta
& trita, atque imposita capiti plurimum profunt,
Marcello auctore. Si verò membrana cerebri fuerit
vulnerata, egregiè ipsam conglutinat, Archigē-
nis decreto, calaminthæ succus infusus, & farina mi-
lij arida

lij arida inaspera; deinde butyrum, & rosaceum, ac adeps suillus insulsus, verus, tepefacta, ac multum insusa. Caterum in contusionibus citra desperationem, ac fissuram circa caput factis, eodem Archigene auctore, polenta imposita commoda est. Amplius verò & celsipum, atque ipse adeo sanè for-
dibus sudoris succida eodem modo: magis autem proprie simulaginem ex aqua pro cataplasmate im-
ponens, aut organum cum polenta. Hæc quam-
uis alterius negotij, atque operis sint, hic tamen ad-
scripta, nihil incommodi afferent. In mediocribus
autem capitis vulneribus, aut quibus omnino le-
gitimo Medico non opus est, in quibus nuditas per
se non adest, pilos rademus, sibilisque impositis
constringemus, ac glutinantibus experimento co-
gnitis vtremur, vt Archigeni visum est; quanquam
nec hoc ad præsens negotium attineat.

LIQVET etiam quoniam non perpetuò ca-
pire primario affectu laborante, dolor accidit, sed
interim etiam condolefcit, aliqua particula prius
affecta, velut in ventriculo, iocinore, aut stoma-
cho, aut alia quapiam. At quia sic vexatos sanare li-
cebit nihil capiti adhibentes, verum his ipsis prius
affectis partibus auxiliantes, Gal. & Aetio testibus;
propterea bona fronte huius curationem præter-
mimus. Parebit nanque cum de harum partium af-
fectionibus verba faciemus.

EVENTIT etiam capitis doloris, qui vehe-
menter febricitant: in quibus diligenter confide-
randum erit, num crisis ratione, an nò oriatur. Nam
si sanguinis fluxum, aut vomitum decretorium si-
gnificabit, remedia querenda non sunt, Galeno
teste primo de arte curatiua ad Glauconem. Quo-
niam ea (Tralliano auctore) quæ admouerentur,
præter quàm quod nihil iuuarent, etiam naturam
subinde impedirent. At quado ex magnitudine fe-
brium humores diffusi, ac veluti effervescentes ad
caput ascenderint, tunc medicamenta adhibere est
necessarium, Galeni præcepto eodem libro pri-
mo de arte curat. ad Glauconem. Vt verò promptè
illud distinguas, ac cognoscas, tria (vt eidem Gale-
no visum est) considerata erunt. Primum quidem
species ipsa febrium. Secundo loco, si sit ad salutem
morbus declinans. Tercio verò ac potissimum to-
tius morbi tempus perpendas; num videlicet in
principio sit, vel incremento, vel in summo vigo-
re. Febre nanque non magnopere calida existente,
ac circa initia, præsertim si capitis dolor irruat,
quinetiam febre valida existente, cum iudicatio-
nem non portendat, curandus is est. At si ipsa valde
vehemens fuerit, adfintque salutis signa, superue-
neritque capitis dolor, cum ipsa prope iudicationem
venerit, tunc nihil tentare oportet medicamenta
adhibendo: & si Galenus iusserit hæc perpenden-
da esse pro notitia morbi, num per excretionē cri-
sim sit habiturus: poterunt quoque ad hanc cogni-
tionem transferri: maxime verò totius morbi tem-
pus considerandum erit. In his ergo capitis dolori-
bus, qui in principio cum febribus irruunt, vena se-
canda est post primam, aut secundam remissionem,
Galeno & Aetio testibus (nisi quid impediatur) &
præsertim in corporibus bonæ habitudinis, & mul-
to sanguine refertis. Animaduertendum autem
num ob vapores à ventre sublato, aut ob alui sup-
pressionem capitis dolor contingat. Quod si serius

post septimum tandem irruat diem talis capitis do-
lor (qui crisis non significet) præuacuata aluo
per clysterem notabiliter, cucurbitæ occipitio, vel
ceruici attingenda sunt, & capiti rigationes admo-
uenda erunt; quæ vim repellendi obtineant, fri-
gidæque qualitates, ac vires, vt rosaceo quidem
in calidioribus, ac hora æstiuâ, & cum exiguo ace-
to, chamamelino verò, aut anethino frigidioribus
habitudinibus, ac hyeme, quinta acetæ parte adie-
cta. Aliæ insuper infusiones, quæ ex papauerum ca-
pitibus constant, expediunt, ex Galeni sententia,
eodem primo de arte curatiua ad Glauconem: qua-
rum materiam vbi de cura doloris capitis ex cali-
da intemperie, seu bile orti, tractauimus, inquir-
ras. Nec minus si disicientibus medicamentis in-
digeant, ea reperies eo loco, quo de cura doloris
capitis ex pituita orti verba fecimus: perseveranti
tamen vehementer dolore, hyoscyami folia viri-
dia, aut papaueris cum rosaceo, paucis aceto, ac mi-
cis panis, syncipiti, & fronti approximanda erunt.
Reliquæ verò ad capitis dolores ob febris magni-
tudinem abortos, medela ad tractationem de fe-
bribus pertinent. Restat vltimo loco amuleta, quæ
capiti coronæ modo circumposita, & alligata do-
lorem eius arcent, conscribere, Archigenis aucto-
ritate: quæ quidem nullam medicam rationem hab-
ent derelinquentes: quæ verò ab eo iuxtam medi-
cam rationem tradita sunt, referemus. Horum v-
num est, polygoni duos ramulos coronæ modo im-
posito, præsertim si ex ardore, seu ebrietate dolor
capitis contingat. Aliud, cichorium ægri capiti im-
posito, maxime si ex ardore, seu etiam ebrietate
doleat. Rosacea iterum coronæ eosdem iuuat, Ga-
leni auctoritate. Callitricho quoque coronare ca-
put conducit, quod adiantu appellatur. Philanthro-
po etiam herba appellata, coronari caput Archige-
nes nubit. Liberat item à capitis dolore verbenaca
herba, tum coronæ modo circumposita, tum illita
ex rosaceo & aceto. Testudinis quoque palustris
sanguis syncipiti instillatus capitis dolorem iuuat,
herbæque plantaginis radix in collo suspensa, capi-
tis dolorem mirifice tollit, vt cap. de Arnoglossa
testatur Apuleius Madaurensis.

Πρὸς κεφαλῆας.

De cephalæa.

CAP. XI.

Rauis quidē affectus, vehementer do-
lorificus, diuturnus, ac difficulter so-
lubilis nonnunquam euenit in capite,
à Græcis κεφαλῆα, pariter & à Latinis
nuncupatus. Qui capitis dolor ex fa-
cili occasione vehementes habet accessiones, Ga-
leno auctore tertio de Locis affectis cap. 9. & se-
cundo de composit. medicam. secundum locos cap.
2. adeo vt neque strepitus, neque vocem vehemen-
torem, neque lumen splendidum, neque vini po-
tum, neque medicamenta caput replentia tolerare
possint ægri; neque item motum: sed in quiete, & te-
nebris, ob doloris vehementiam decumbere vo-
lunt, tanquam à malleo enim se percuti arbitrantur
nonnulli: alij caput frangi, distendique sentiunt:
non paucis verò vsque ad oculorum radices dolor
progreditur. Habet autem hæc affectio aliquando
quidem cōtinuos dolores; aliquando verò exacerba-
tiones, & interualla, siue ordinata, siue inordinata.
Intermittit enim quadoque eiusmodi exacerbatio-
nes, velut in comitiali morbo apprehensis, interce-

N 2

Circumbis-
la.
Topica.

cap. 15

Amuleta.
Vide Gal.
2. de comp.
med. sec.
loc. cap. 2.Galen. loc.
citat.

Signa.

*Lib. I. cap. I.
Cur vehementius
migras te-
neat.
Quibus est
cephalal-
gia conue-
niat, & dis-
ferat.*

Causa.

*Cur adra-
tio.*

*Vene se-
ctio.*

Purgatio.

Topica.

*2. de com-
pos. med.
sec. loc. c. 2.*

ditque tempus, quo perfectè liberati videntur: sed vehementius feminas tenet, vt inquit Caelius Aurelianus, ob diligentiam capillorum. Constat igitur, quod sicuti cephalalgia, sic etiam in hac affectione consimilem aptitudinem capitis habent agri: quia videlicet facillimè ipsum afficitur, aut propter ipsius imbecillitatem, vel propter sensus exuperantiam: atque hoc est ipsis commune. Verum differunt, quod per cephalæam affectæ capitis partes multo redduntur, quam in cephalalgia debiliores: & veluti cephalalgiam patientibus quibusdam capitis inuolucra dolore afficiebantur, aliis pericranium, id est, exterior caluariæ membrana: ita quoque in cephalæa cōtingit, prout quidam quibusdam promptius has, vel illas capitis partes aptas habent, vt afficiantur. Discrimen autem num internæ videlicet capitis partes, aut externæ afficiantur, ab oculorum radicibus similiter sumitur, vt de cephalalgia diximus: considerando scilicet, vtrum veniat ad eas malum necne. Totidē insuper causæ eius esse possunt, quot de cephalalgia narravimus, externis posthabitis, ex quibus raro contingit hunc affectum generari, similique via, ac ratione inuestiganda ipsæ sunt: diligenterque animaduertendum est, atque attendendum ex qua causa originem trahat. Sic nanque affectus ipse arte facilius solui poterit. Quapropter nec victus ratio diuersa præcipienda erit ab ea, quam in prædictis capitis doloribus præcepimus, imo eadem pro causarum similitudine. Similiter & curandi ratio. Nam si humorum, aut vaporum multitudinem causam esse reperiēs, siquidem propter totius corporis repletionem facta est, vniuerso corpore euacuato, capitis dolorem sanabis. Qua de re venam secare oportet, si vires ferant: incidendaque est aut media, aut vena cubiti externa: & acrioribus vti clysteribus conuenit. Et si adhuc sanguis videatur redundare etiam ex naribus aperta vena, quantum sanguinis satis esse videatur, detrahes. Si verò velut debile existens caput ad se sublato humores, ac vapores excipiat, materiam reuellere oportet in totum corpus, atque ita particulae mederi. Fiat itaque reuulsio per clysteres, & ligaturas extremitatum, ac plures infernarum partium confrictiones. Interdum etiam (vbi nihil prohibeat) sanguinis ex cubito detractione vtendum erit, mox purgare corpus conuenit ex aliquo iam dictorum supra medicationum. Post cuius corporis totius euacuationem, seu purgationem, tuto ad ea, quæ caput euacuant, accedes apophlegmatismos videlicet, & medicamenta alia, quæ naribus induntur, de quibus supra mentio facta est. Caput autem curabis repellentibus irrigationibus primò, deinde his, quæ digerendo, seu disiciendo caput euacuant; ad motis demum his, quæ firmitatem ei addere possunt. Repellit nanque eum omphacinum, & rosaceum per se, & cum aceto illitum; & quæ his sunt similia: de quibus in præcedentibus abundè diximus. Discutit autem oleū dulcissimum calidum, & magis inueteratum, camæmelinum, seu anethinum: si verò crassior sit humorum multitudo, spondylium, aut pulegiæ comam: silumbrium, aut folia lauri, mentham, seu calamintham in oleo concoquas, capitiq; adhibeas. Sic nanque multitudinem euacuabis. eadem hæc etiam firmitatem parti addunt, iuxta Galeni sententiam. Quapropter vsque ad perfectam curationem eis vti conuenit. Omnium verò longè maxime discutit, & per-

fectè corroborat verbenaca recta, præcipuè viridis, imò & arida cum radicibus, & simul cum serpillo oleo incocta, si ex ea caput perfuderis. Quin & ipsam per se verbenacam si oleo incoxeris, caputque inde rigaueris, omni capitis dolori antiquo ex frigidityte, aut ex crassissimis humoribus orto medeberis, eodem Galeno teste secundo de compositione medicamentorum secundum locos. Maxime etiam profunt sub aquario vase nascētes aselli, millepede appellati, si oleo incoquantur. Et hæc de cura cephalææ ex plenitudine orta satis. Nam reliqua, cum pro eiusdem curatione, tum etiam si ex quauis alia causa exciteretur, in præcedentibus locupletissimè reperiēs. Quare in his non erit amplius sermo protelandus, sed ad curam hemicranie accedere tempellium erit.

Præuampvitas.

De hemicrania.

CAP. XII.

SEd & alia quædam affectio dolorosa iuxta dimidiam capitis partem, aliquando dextram, interdum sinistram contingit, quam hemicraniam appellat; distinguit autem dextram capitis partem à sinistra, futura per longitudinē ipsius protracta: sub qua intra capitis ossa linea medium cerebri diuidens protenditur: ad quam & peruenit anteriorum duorum ventriculorum septum, vt patet tertio de locis affect. & aliquibus contingit, vt extra caluariam doloris sensus percipiatur: alij in capitis intimis partibus dolorem sentiunt: aliqui verò temporum musculos vehementer dolent. Cunctis autem vt plurimum per circuitus dolor exacerbat, influxu videlicet vaporum, aut humorum, siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum causam dolori suggerente. Euenit etiam interdum, vt quidam adeo vehementer doleant, vt neque manuum contactum facile ferant: in quibus palam est, membranam caluam ambientem esse affectam, & neque cutem ipsam immunem ab affectione omnino existere: quemadmodum si in partibus, quæ intra caluam continentur, hoc est, cerebro, eiusque membranis dolor sentiat: isque vsque ad radices oculorum extendatur, liquido constabit, partes intra caluariam affectas esse, vt neque manuum contactu dolor irriteretur. Ex his constat quæ pars in hemicrania afficiatur; ac quomodo ea dignoscenda sit, in quo genere affectum contineatur, cum dolor sit: ac quot quæue sint eius causæ. Et quoniam diximus ex vaporum, seu humorum influxu per circuitum exacerbari, rationabile est, Galeni decreto secundo de compositione medicamentorum secundum locos, hunc influxum siue per venas, siue per arterias, seu per vtrasque contingere: & interdum cum corpus, aut aliqua eius pars infra caput, vitiatos vapores, aut humores sursum mittat, interim verò cum ea sola, quæ intra caluam continentur, quod in ipsis redundat excrementum, foras protendant per iam dictas venas, seu arterias, siue per vtrasque. Si quis autem cupiat dignoscere quando ex multitudine humorum, seu vaporum, & quando ex calidis, seu frigidis hemicranieus dolor exciteretur, ex superioribus capitibus notas petat. Pro quarum causarum varietate curationē quoque ipsam variari contingit. Nam vbi ipsam hemicraniam curare aggredieris, prius quali purgatione, aut venæ sectione agro opus erit, considerabis: atque

*Nostorum
pilularum
compositio.*

atque ita deinde ad capitis auxilia progrediaris, venam secans, si multitudo causa fuerit, purgationibus utens ubi ex vitiosis humoribus fiat. Atque si calidi fuerint, his quæ bilem expurgant, utaris. Si frigidi, his quæ pituitam, aut succum melancholicum. Quorum purgantium medicamentorum copiam præcedentibus capitibus comperies: quare studiosi ex inde petant. Ad capitis auxilia deinde deueniens tum per digitos suæ manus, tum per lintheum dimidiam frontis partem, & eam maxime, quæ circa vaporum musculum est, confricando exalfaciatur ager; atque id ante irritationis tempus faciendum est. Post exacerbationem verò medicamentis hemicanicis à Medicis appellatis, utendum: siquidem multa caliditas in doloribus percipitur, his quæ refrigerans quippiam habent: citra verò hanc, his quæ multum calfaciunt, utendum. Verisfice verò aliquid ex his, quæ firmatam, ac robur addunt, miscetur; quod astringentem videlicet habeat facultatem, prout Galen. eodem secundo libro de compositione medicamentorum decretum reliquit. Et quamquam ea pharmacopæia per quæ in ueterato capitis dolori medemur, hemicanicis quoque affectionibus auxiliantur; tamen Aërius quod quadam naturæ proprietate, seu potentia, euphorbium hemicanicis maxime conferat, si cum aceto teratur. Et si dextrum tempus dolet, illinito sinistram. Si verò sinistram dolet, illinito dextrum. Idem quoque asseruit, quod si intestina terræ terantur, & dolens tempus illinatur, mirifice profant. Similiter si cochlearum carne utaris: aut si cochlearum carnis cinerem excipiens, stercus bubulum, & thus, æqualibus portionibus cum aceto trita, affectam partem illinas. Stœchadem quoque herbam cum aqua, aut mulla coctam si exhibeas, in omnis capitis dolore, velut solium, & maximum remedium erit, eodemmet auctore. Galenus autem in fine secundi libri de compositione medicamentorum secundum locos, his, qui ob frigidas causas hemicanicis infestantur dolore commodissimum medicamentum esse asserit, si dimidiam frontis partem unā cum temporis musculo ex euphorbio, oleo, & cera parato unguento illinas, euphorbij sumens vnc. j. olei lib. j. cera quadrantem. Quod si validius videbitur medicamentum, poterit euphorbij vnc. s. assumi, præsertim si euphorbium validum existat, corpusque molle, ac exactiori sensu præditum. Iugat etiā hos si oleum tepidum in aure instilletur, modico euphorbio ad oleum iniecto, eodem auctore, sumito autem euphorbij scrup. j. olei dulcis vnc. ij. quibus commixtus gutta vna, vel duæ in aure instillantur. Cauēas autem hoc pharmacum in his, in quibus à calidis vaporibus, aut humoribus hemicania gignitur. Hincinum sinum tritum cum aceto scillitico misce, & fronti, & temporibus illine, hoc ad dolorem hemicanij sedandū etiam in perpetuum prodest, ut inquit Marcellus. Subito vero si hemicanij dolor fuerit, thus, & myrrham & ouum teres, simul etiam fronti induces, vel temporibus, eodem auctore. Minuta item cochleæ trita, & fronti illita, & ceruicū quoque cornu cinis cum aceto rosaceo mixtus, ac fronti impositus hemicanij dolorem emendat, Plinio secundo teste cap. 8. lib. 1. Reliquum est, ut quibus uti consuevit, tum in diuturnis capitis doloribus, tum in hemicanicis familiaria catapotia conferibam, ex quibus drac. j. vel scrup. 4. decimo vel quintodecimo quo-

que die omni tempore, præterquam in æstate æger assumere poterit, bile redundante. Excipe pulueris hieræ simplicis Galeni drachm. ij. pilularum arabicarum drac. iij. trochiscorum myrobalanorum citrinarum drac. j. s. rhabarbari cum spica scrup. iij. cum syrupo violaceo simul componantur, serueturque cōpositio; & cum opus fuerit, ex ea sumantur, ut diximus drach. j. vel scrup. iij. à cœna per quinque vel sex horas. deinde superdormiat ager. Pituita verò redundante, agarici trochiscati excipe drach. iij. pilularum arabicarum, & pulueris hieræ simplicis Galeni ana drach. j. s. florum stœchadis, & trochiscorum myrobalanorum chebulorum, singulorum drach. j. cum syrupo ex stœchade, & oxymelite simul misceantur; & cum opportunum videbitur, drac. j. vel scrup. iij. modo quo supra dictum est, assumat æger pro qualibet vice. At si ex nigra bile dolor capitis genitus fuerit, prædictarum pilularum arabicarum drac. ij. excipias, pulueris fenugreci & epithymi ana drac. ij. & s. hieræ simplicis Galeni drach. j. & s. trochiscorum myrobalanorum induratum scrup. iij. cum syrupo è fumaria, ac aqua melissophylli infusum componantur: & cum vltus virgeat, pariter, ut prædictis, vitior. Reliquum esset de aliorum sensuum affectionibus pertractare; sed quoniam extra eam partem, quam caput ex Celsi sententia nuncupauimus, quodammodo existere videntur, propterea non abire duxi prius de functionis moticis voluntariæ noxis verba facere; necnon & de his vitis, ex quibus omnes actiones animales læduntur: & deinde ad aliorum particularium sensuum læsiones pertractandas conuertar.

Περί πασσών. De conuulsione.

CAP. XIII.

VONIAM motuarum actionum prima symptomata sunt, Galeni auctoritate libro de different. symptom. immobilitas; & vitiosa mobilitas, vitiosa autem mobilitatis, alia diminuta, infirmusque motus est: de quo cum de immobilitate pertractabimus verba faciemus; alia vero prauus motus est: qui licet plures etiā habeat differentias, ut liquet apud Galenum eodem loco: duximus tamen de vna earum, hoc est, de conuulsione motu, prius differere: quem quidem Græci spasmon, Latini verò conuulsionem nuncupant, nomine ipso indicante quid sit, ac quomodo fiat. Namque passio quædam est inuoluntaria, Galeno teste, commento aphorif. 39. sexti libri, ad similem dispositionem venientibus partibus nervosis in ea, quam etiam in motibus voluntariis assumunt. Nā in eum situm nervos, musculosque conuulsio ducit, ut patet secundo de causis symptomatum, in quem, si prout natura lege se haberent, ab animali virtute ducerentur, tractis videlicet, seu remissis ad propria capita musculis. Ex quibus constat conuulsionem in conuulsis partibus factam hac sola ratione à motu naturali voluntario scilicet eorum differre, quod præter voluntatem sit, ut Galeno tertio de locis affectis visum est. Omnis nanque motus, qui à voluntate procedit, attractis musculis in eas, quibus innascuntur partes, hoc est, eas, ad quas nervi inseruntur, fieri videtur: neque potest attractio fieri, nisi ad suam originem retrahatur musculus. Itaque quemadmodum in eo, qui secundum naturam habet, voluntas in cerebro iuxta nervorum originem;

*Celsi lib. 4.
cap. 2.*

*Conuulsio
quid sit.*

cap. 2.

cap. 6.

Motus conuulsus à voluntario, in quo differat.

ordinata, motionis principium primis dat nervis, ac per ipsos musculos; ita si sine huiusmodi principio contingat musculos retrahi, tunc convulsio gignitur. Tendi igitur musculos, & ad initia propria retrahi, corporisque, cui inhæserint, partes secum trahere, est sanis, & convulsis pariter commune, iuxta Galen. sententiam libr. de tremore, rigore, palpitatione, & convulsione. cap. 8. Verum illud inuoluntarie fieri, his quidem inest, qui naturaliter vtique non habeant: ac præcedente voluntate, motus quippe naturalis erit his, qui naturaliter habent. Huius autem deprauatæ motionis tres statuntur species, seu differentia à Galeno libr. de different. symptom. & libr. de tremore, rigore, & palpit. ac commento aphorif. 57. 4. libri, & aliis plerisque in locis, tum etiam à Paulo, Aëtio, ac Celso: quarum vna τρέσος, alia ὑποπόδόνος, reliqua verò δρεμόνους dicitur. Nam cum corporis particula vna cum ceruice, ac capite in anteriora tenduntur, affectus hic ὑποπόδόνος nominatur: cum in posteriora δρεμόνους. Cum verò æqualiter in alterutram partem, & retro videlicet tenduntur, τρέσος nuncupatur. A Latinis verò quibusdam prima distentio ad anteriora. Altera distentio ad posteriora, & reliqua distentio simpliciter. A Celso autem rigor neruorum, quælibet istarum appellatur, qui modò caput scapulis, modò mentum pectori annectit, modò rectam, & immobilem ceruicem intendit, vt ipse inquit cap. 3. lib. 4. Harum autem affectionum non perpetuò eadem est sedes primò affecta. Nam interdum cerebrum ipsum noxam suscepit; interim spinalis medullæ initium; quandoque neruus aliquis, aut musculus, qui particulari motioni deputatus est. Id autem promptè dignoscitur: nam si vna cum toto corpore faciei quoque musculi conuellantur, cerebrum ipsum affectum esse indicat, Galeno teste, tertio de locis affect. At si faciei partes, seu musculi seruentur, ac illæsi permancant, spinæ initium affici sciendum est. Vbi verò pars aliqua conuulsa sit, necessum est neruum, aut musculum, qui eius motioni deputatus est, affici. Verum in iam dictis tribus differentiis, cum in toto corpore constiterint, & non in vna determinata parte, vnum tantum discrimen habendum erit; nunquid videlicet capitis, & faciei partes læsæ sint, vel illæse permanserint. Nam primo modo si euerit, cerebrum ipsum affectum erit. Si secundo modo contingat, non cerebrum, sed principium spinalis medullæ secundum totum, aut secundum partem. Pro cognitione verò particularis conuulsionis determinatæ partis cuiusnam, cum determinatus neruus, seu musculus afficiatur, summopere necessaria erit anatomies notitia, neruorum potissimum, & musculorum. Cunctæ verò conuulsionis species, seu differentia symptomata sunt in genere noxæ functionis motricis voluntariæ, eiusque deprauatæ, à causa duntaxat præternaturali ortæ. Quæ ratione conuulsio à tremore discrepat: qui non modò à causa præternaturali, verum à functione ipsa, licet irritata, ortum ducit, vt patet secundo de causis symptomatum, & libro de tremore, rigore, & palpit. Conuulsionum autem causas: non immeritò duas Hippocrates statuit aphorismo 39. sexti libri, cum dixit, Conuulsio fit vel ex repletione, vel inanitione. Nanque ex his duntaxat causis neruosa partes conuelli possunt præter voluntatem: ex repletione, inquam, madefactis ipsis, ac irrigatis; ita vt

in tumorem præter naturam attollantur: & propterea conuellantur dilatatis ipsis secundum latitudinem, earumque longitudine decurtata. Ex inanitione verò, vt ipse neruosis corporibus violentius exsiccatis; vt propterea cogantur in se ipsa duci, contrahi, atque conuelli: quemadmodum etiam in lyra chordis euenire consuevit: vt intentis ipsis vehementer ob ambientis aeris immodicam intemperiem nonnunquam rumpantur, si vel nimis aridus fuerit, vel admodum humidus. Humiditas nanque ipsas madefaciens, siccitas verò contrahens, modo quo lora quoque cum ad ignem exsiccantur, contrahi, tendique videntur: & sol tergora arefaciens contrahit. His quippe ita præcognitis haud difficile inuentu fuerit, vt Galeno tertio de locis affectis, visum est, vtrum ab ariditate, quæ est ab humidæ essentia defectu, & euacuatione, an humoris plenitudine, quæ egestati aduersatur, & ab Hippocrate repletio nominata est, affectus ipse prodierit. Nanque cum conuulsio fit vel à labore, vel vigiliis, vel fame, vel solitudine, vel arida, æstuantemque febri, qualem in phreniticis videre est, & aliis huiusmodi, causam eius esse ariditatem, inanitionemque rectè putabis. At si contigerit aliquem sanum repente conuelli, vt ait Galenus commento 26. aphorif. 2. huiusmodi conuulsionem fieri ex repletione est necessarium. Ita quoque si temulento cuipiam, ac omnino pleno homini, qui videlicet in ocio degat, id euenire conspexeris. Verum ubi propter defectum, seu euacuationem conuulsio excitatur, vel ex aliqua prædictarum causarum, vel ex aliquo præcedenti largo sudore, aut vomitu, alui deiectione, aut sanguinis profluvio, aut quapiam alia causa simili, haud difficile erit ipsam dignoscere ex relatione præsertim ægroti, seu astantium. Si verò ex plenitudine conuulsio excitetur, bifariam illud euenire poterit, iuxta Galeni sententiam libr. de tremore, rigore, conuuls. & palpit. Nanque aut ex inflammatione principij neruorum, id est, cerebri, aut initij spinalis medullæ, seu alterius partis neruosa, aut ex succorum copia circa iam dictas partes, ex qua ipsæ tendi cogantur. Id verò promptè discernas ex indicij inflammationis, si ea fuerit. Quod si præter eam, ex humorum duntaxat copia conuulsio excitata fuerit, nunquid ex multitudine simpliciter dicta, aut ex ea, quæ est vnus tantum succi redundantis, inuestigare oportet, quanquam neruosa partes ex frigidis, & glutinosis humoribus, ex quibus etiam nutriuntur, promptè repleantur, ac proinde sæpius conuulsionem patiantur, teste Galeno commento aphorif. 26. secundi libri. Illudque non alia via, quam supra docuimus, cum de dolore capitis verba fecimus. Ibi nanque reperias signa tum propriæ multitudinis tum eius, quæ non simpliciter plenitudo dicitur cum videlicet alius quispiam humor reducat cum sanguine; non sanguis solus, nec omnes ex æquo aucti fuerint. Hæc igitur sufficiant quoad cognitionem conuulsionis primario ortæ: de qua, iuxta Galeni sententiam loquutus fuit Hippocr. aphorif. 39. sexti libri, cum dixit, Conuulsio fit vel ex repletionem, vel inanitione. Verum præter hanc conuulsionem, alia quædam est conuulsio, quæ per consentum accidit, eodem Galeno teste commento aphorif. 39. primi quinti libri, & tertio de locis affectis, hanc iuniores Medici barbarè loquentes, spasmus non proportionatum ad materiam vocant; cum neque

Conuulsio-
nis tres spe-
cies seu dif-
ferentie.
de Differ.
symp. cap. 3
Lib. de tre-
more cap. 8

Paul. lib. 3.
cap. 10
Aët. lib.
6. cap. 38
Celus lib.
4. cap. 3

Quid diuer-
se partes in
eis primò af-
fici possunt.
Cap. 6. &
10
Quomodo
distinguen-
da sint.

Qui præter
naturæ affe-
ctus sint.
2. de causis
symp. cap. 2
Lib. de tre-
more, cap. 5
Dne ex
Hipp. con-
uulsionis
causa.

Diuer-
se eius-
dem.

quo cita

22. meth.
8
de loc. a
fect. cap.

22. meth.
in fine.

Prognosi-
ca lib. 4
cap. 38
Paul. lib.
cap. 19

ex plenitudine neruofarum partium, neque ob inanitionem earundem originem ducat, sed vel à qualitate quadam, alteratis per continuationem partibus; & proinde ad neruorum principium ascendente, aut à spiritali quadam substantia per iam dictas neruofas partes transmissa fluida, aut veluti arida, quæ licet mole minima, facultate tamen quam maxima sit, & ad neruorum principium delata; propter quod huiusmodi motu ipsum concutitur, vt à se expellat quicquid fuerit id, quod à parte primo affecta ad ipsius effertur. Huius verò causa non modo externa esse poterit, ex scorpionū videlicet, phalangiorum, aut alterius venenosi animalis ictu, verum etiam ex quapiam interna causa: ex qua similibus essentia generari poterit, non accedente causa extranea, velut Pelopis auctoritate, Galenus tertio de locis affectis decretum reliquit. Hæc, inquam, vbi neruosam aliquam partem occupauerit, per continuas partes (vt diximus) vsque ad neruorum principium transferri poterit: ac conuulsum motum (modo quo diximus) excitare. Hanc conuulsionem haud ægre percipies ex cognitione partis primario affectæ: cuius modum in vniuersali capite docuimus. Quod si ab externa causa ortum ducat, eam ab ægro, aut astantibus discas. Si verò earum nulla præcesserit, internam esse putabis: quemadmodum per consensum cum ore ventriculi, vbi fortius moderetur ab æruginoso humore, qui potius exacta erugo dici poterat, in quodam adolecente obseruauit Galenus; cui cum totum corpus conuulsum esset, æruginæ per vomitum vacuata febris statim, & conuulsio cessauit, prout testatur commento aphorismi primi quinti lib. 12. meth. med. & quinto de locis affect. Atqui si quis velit & hanc quoque conuulsionem per consensum genitam, ex inanitione conuulsionem nuncupare, cum humores mordaces vim habeant exsiccandi, vt Galenus inquit, commento aphorismi primi quinti libri, non reclamamus. Verum non adeo exitialis erit, quemadmodum ea conuulsio, quæ propriè ex inanitione gignitur, ob defectum scilicet humidæ essentia partium neruofarum: sed curari vtique possit, quia ex siccitate duntaxat, & non ex siccitate, quæ est ab humidæ essentia defectu, & vacatione ortum ducit, vt videre licet apud eundem Galenum, cum commento prædicti aphorismi, tum eodem 12. method. med. in fine: & hoc modo intelligendo, quælibet conuulsio tam quæ primario, quam quæ per consensum oritur, erit, ac dici poterit de repletionem, aut de inanitione. ab immodico item frigido si conuulsio fiat, velut Hippocra. aphorismi. 17. quinti libri, & Galen. duodecimo method. meden. visum est; ex plenitudine dicenda erit, quoniam neruoforum corporum substantiam cogens, ac constringens, frigidum ad distandam difficultas efficit, & propterea vt repleantur, causa est, Galen. teste commento aphorismi. 13. sexti lib. quamuis si corpus siccum fuerit, & superfluis carens; possit ex frigore conuulsio ex siccitate fieri, nam penetrans in interiores partes corporum neruoforum exugit, ac exprimit eas, & hac ratione sicciores eas reddit, ac inanit, vt Philotheo placuit commento eiusdem aphorismi 17. quinti libri. Maximum tamen ac ferè insanabile malum est conuulsio, si ex inanitione propriè fiat, vt Aëtio & Paulo visum est, curatu perdifficile, vel potius quod curari omnino non possit, si febris occasione potissimum.

contractum sit, cum prius sic affecti pereant, tempus excogitandi remedia negates: quemadmodum Galenus 12. meth. med. & in fine lib. de palpit. rigore, tremore, & conuulsione scriptum reliquit. Verum, qui à conuulsione, aut distensione neruorum tenetur ex repletionem, Hippocra. auctore 57. aphor. 4. lib. febre superueniente liberatur, eadem die, aut sequenti, aut omnino tertia: vt patet lib. de loc. in homine. Et idem auctor aph. 26. secundi libri dicebat, febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm febre conuulsionem. Et in epistola ad Demetrium dicebat. Conuulsiones omnibus morbis atræ bilis succedentes atram bilem sedant: faciles quoque eas esse ex vtero affecto, si sine febre sint, liquet in prænotionibus. Aphorismo verò sexto quinti libri de tetano sic decretum reliquit. Quicumque tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt: Si verò hos effugerint, sani fiunt. Reddit Galenus causam in commento, quoniam tetanus morbus peracutus est, vt qui compositus sit ex emprosthotono, & opisthotono. Et propterea citius in ipso fit iudicatio, non tolerante natura longiori tempore tensionis laborem: quo fit, vt in primo circuitu dierum iudicatoriorum passio iudicetur: quamuis neque pueris, neque senibus conuulsio fiat tetanica, Aëtio teste. At Aphorismi. 1. quinti libri, conuulsionem ex helleboro letalem esse dixit, & secundo eiusdem lib. conuulsionem ex vulnere letalem asseruit. Nam Galen. interprete, ex vulneribus conuulsiones, ratione sequētis ipsius inflammationis fiunt, vbi partes neruofas attigerit. Et primum quidem videntur conuelli, quæ à directo sunt partium inflammatione laborantium: deinde cum & principium attigerit, passio ad totum extenditur corpus: toto verò vniuersum corpore ab affectu immuni, si labrum aut palpebra, aut lingua contrahatur, graue symptoma existimandum est, vt Paulus asserit, quod maxima inuehat pericula: licet exigua partes affectæ videantur. Caterum quantum ad curationem spectat, scire licet conuulsionem ex inanitione, & siccitate ortam (si modo ea curari possit) humectationem poscere, Galeno teste 12. meth. med. vniuersa igitur victus ratio, quod humidum sit, oportet. Proinde aer ad humidum vergat. Somnus præcipiatur consueto longior. Quiescat æger: ab immodicis animi affectibus caueat: ac nutriatur cunctis cibis humectantibus, ac sorbitionibus pinguibus, concoctu facilibus, ac probe nutrientibus: quique facile per omnes corporis partes distribuatur. Quare contusæ pullorum, sed gallinarum, aut phasianorum carnes, & prædictorum aqua carnis quoque tribuatur: siue ex carnibus agnorum, hædorum, aut castoreorum: in quibus quandoque ponantur humectantia olera: præsertim si siccitas cum caliditate fuerit permixta. Carnibus quoque prædictis vesci poterunt cum ptisana, aut humidis oleribus decoctis. Deinceps cum cibis interim vtantur oleo amygd. dulci, ac saccharo. Pro potu (si immodica non affuerit caliditas) vino vtantur tenui, aquoso: quod si febris ac immodicus calor affuerit, pro potu eligantur aqua hordei, aut aqua, in qua glycyrrizæ parum, aut cinnamomi fuerit decoctum, vt promptius aqua penetret: seu violaceus syrupus permisceatur. Oleo insuper dulci, aut amygdalino, seu hydrelæo calido eos fouere competit, Pauli auctoritate: & si nihil prohibeat, etiam ad lauacrum tepidum eos deducere conuenit dulcis aqua: post quod aliquo

12. method. in fine.

Prope finem libri.

3. prorrh. tex. 17.

Act. lib. 6. cap. 39.

Lib. 3. c. 19. Conuulsio- nis ex inanitione curatione. Loco citat. Ratio vniuersa.

Medicamentorum ratio. Citatio loco.

iam dictorum oleorum corpus inungendum erit, tepido eo existente. Frictione lenissima, temperatoque folio vtendum. Insuper post balneum, quibus ipsum competit, ac citra balneum, quibus non competit, ægroto lac recenter multum, præbendum erit, quantitate congrua, asininum, siue caprillum, pauco addito saccharo, si febris non aderit, aut si ea admodum exigua fuerit. Conuulsiones vero quæ succorum copia, aut inflammatione fiunt, liquidò curabis, illam vacuans, huic propriis ipsius auxiliis adhibitis, auctore Galen. lib. de trem. rigore palpit. & conuuls. ac post eum Aëtio teste. Quæ de re nos eius conuulsionis, quæ ex plenitudine ortum ducit primo curationem præcipimus: deinde ad eam, quæ ex inflammatione excitatur, deueniemus: posthabita tamen ea, quæ ex plenitudine ac simpliciter dicta oritur. Nanque eius patebit curatio, cum de conuulsione orta ex inflammatione verba faciemus: cum vtriusque similibus quodammodo curatio sit, præsertim quod ad vniuersalia spectat. At si ex aliorum succorum redundantia, nervosis partibus repletis, conuulsio fiat (potissimum si à frigidis, ac glutinosis, ex quibus nervi ipsi nutriuntur) hac ratione erit curanda quæ iam dictarum specierum fuerit, cum omnes eadem ratione curentur, Celso auctore eodem cap. 3. lib. quarti. Proinde ac ad calidum, & siccum vergens eligatur. Ideoque in eo conclauit, in quo cubabit æger, eiusdem Celsi decreto, ignis continuus esse debet, maximèque tempore antelucano; quo præcipue frigus intenditur: cum ipsum frigus apprime cauendū sit. Quinimò lib. de loc. in homine, conuulsioni sic mederi oportet, inquit Hippocrates, ignis ab utraque lecti parte succedatur, & mandragoræ radix in potu præbeatur minore pondere, quam quod infaniam facit: & ad tendines posteriores faculi calidi imponantur. Somnus sit mediocri: diurnus tamen fugiendus. Quies ægro præcipienda erit; atque partes, quæ contrahuntur, valenter continendæ sunt, & inordinatis resistendum motibus, Paulo teste, oleoque perficere eas oportet rutaceo, aut veteri, aut quodam ex hoc genere. Alius sit lenis. Gaudeat insuper æger; & animi perturbationes aufugiat: primisque tribus diebus tenuissimo viatur victu. Nam dicebat Celsus, Sed diu vitandus cibus, quisquis mandendus est, & sorditionibus vtendum. Proinde aut solius aquæ mulsæ, aut pauco pusillæ cremore contentus sit, deinde ouis forbilibus cibetur, aut à gallinarum pullis mollibus ius aliquod assumendum; in quo hyssopi, aut serpilli, saluæ, sam-puchi, betonicæ, aut saturiæ parum fuerit decoctum. Assisq; interdum carnibus gallinarum, pul-lorum, phasianorum, perdicum, aliarumque auium montanarum vesci poterunt ægri: vnaque passâ, ac pincis. Potus, præter id quod exiguus esse debet, aqua mulsæ eligatur: cui etiam saluæ parum, aut cinnamomi fuerit incoctum. A vini autem potu, præsertim circa initia, abstineant. Nam vt inquit Celsus, eius vsus præcipue periculosus: ideoque in longum tempus differendus est. Licebit tamen eo vt, vbi affectus bene processerit, in parua tamen quantitate: cum & ipsum extenuando, ac cal-faciendo conferat, Galen. teste commento aphorif. 5. lib. 5. Auspicandaque statim eius curatio à venæ sectione erit, modo non penitus à sanguine secer-tus, pituitosus fuerit succus redundans, cunctis aliis consentientibus. Sanguinem autem auferre con-

uenit ex media cubiti vena, non vniuersim, sed pluri-bus (si opus fuerit) vicibus: cum taliter affectis non tantum mittere sanguinis oportet, quantum exigit morbus, sed aliquid symptomati est relinquendum, Galeno auctore primo de arte cur. ad Glauc. cuius causa sæpe sudores eueniunt, & vigilie molestant, & ægroti vires debilitantur, vt ipse inquit. Quod si sudores euenerint, sinteis oleo madentibus ab-stergere conuenit, vbi refrixerint, Paulo auctore. Partes insuper, quæ conuelluntur, valenter conti-nendæ sunt, vt diximus, atque prædictis oleis per-fricandæ: acribusque clysteribus vtendum erit. At si pituitosi succi redundantes citra sanguinis per-missionem fuerint, hi primo extenuandi, calfaciendi, ac incidendi erunt, adeo vt ad expulsionem idonei sint. Denum purgans medicamentum præbendum erit: præparabis autem aqua mulsæ cum hyssopi de-cocto, aut saluæ, melle rosaceo, aut syrupo ex stæchade, cum aquis betonicæ, aut sam-puchi. Purga-bis verò catapotis feridis, aut ex sagapeno, cum a-garici additione: excipiens pilularum prædictarum fetidarum, aut ex sagapeno drach. j. vel scrup. iij. a-garici trochiscati drach. j. vel scrup. ij. & cum aqua betonicæ, melle rosaceo, aut syrupo ex stæchade ca-tapotia fiant. Post quorum assumptionem per ali-quod spacium syrupi ex pluribus infusionibus rosa-rum rubearum, aut persicarum cum aqua betonicæ, & borraginis diluti vnc. ij. iij. vel iij. exhibere pote-ris, & si opportunū erit, iteranda purgatio erit, præ-paratione tamen præcedere. At si videbitur aliis pur-gantibus medicamentis vti, ea requiras cap. de cura doloris capitis ex pituita. Huius quoque conuulsio-nis optimum præsidium est febris superueniens, quæ per initia non fuerit, velut auctoritate Hippocratis, & Galeni aphorif. 26. 2. lib. liquet, & testatur Paulus cap. 20. 3. lib. Communis quoque non modò dis-tentionis, sed cuiuslibet alterius conuulsionis ex plenitudine ortæ sine ulceratione, iuuenibus bene carnosiss, ac æstare media curatio ab Hippoc. & Ga-len. aphorif. 25. 1. lib. præcipitur. Hæc autem est, multa frigida aque perfusio: quæ caloris reuocatio-nem faciens, cum in prædictis fortis fuerit, propter-ea ex accidenti affectum sanat: quiaquam Paulus hoc præsidium damnet, tanquam periculosissimum. Ipseque vitandum censo, nisi cuncta, quæ dixi-mus, consentiant. Succurrit tum ipsis conuulsis suc-ci ceptaurij tenuis potus, aut acanthij radices drach. j. vel ij. cum aquæ mulsæ vnc. ij. vel iij. vel myrrhæ, seu castorei drachm. j. castoreum nanque omnium securissimum, expeditissimum, ac maximè efficax est, Aëtio, & Paulo testibus, quod si robusti sint, panacis liquoris, aut ammoniaci tantundem cum aqua mulsæ bibant. Caput quoque purgandum er-rhinis, ac apophlegmatismis, cap. de memoria de-perdita, ac de dolore capitis ex pituita iam dictis: & si opus fuerit, acrioribus quoque vtendum. An-tidoti quoque anacardine theriacæ, mithridati, diamoschi, aut diambæ drachm. j. cum aqua mul-sæ præberi poterit. Ceruix insuper, ac tota spina inungenda ex oleo de castoreo, nardino, costino, de nuce muscata, aut de piperibus, aut hiperici, vel de vermibus terrestribus parato, separatim, aut permixtis, prout videbitur, castoreumque tri-tum inspergendum: & vbi perunxeris, deinde ad-mouere vescicæ bubulas, vel vtriculos oleo calido repletos, præcepto Celsi: oleoque veteri, vel adipe quam vetustissimo ceruicem, scapulas, & spinam

Curatio
conuulsio-
nis ex reple-
tione.
Cap. vlti-
mo.
Aëtio
lib. 6. ca. 38

Videtur
ratio.

Loco cita-
to.

Loco cit.

Curatio
conuulsio-
nis inflama-
tione or-

13. metho-
cap. 6.
sq.
Conuulsi-
onem co-
ntra cur-
tio

perficare oportet. Frictio namque cum omnibus in homine vertebis utilis sit, tum his præcipue, quæ in collo sunt. Propterea die, nocteque (interpositis tamen quibusdam temporibus) hoc remedium vtendum erit, eodem Celso auctore. Dum autem id intermittitur, cataplasma locis iam dictis adhibeatur.

Loco cit.

Cuius materia sit, vt Aetio visum est, fœnum Græcum, & semen lini, farina hordeacea, ac loliacea: quibus resina terebinthina addatur, galbanum, & mel, ac oleum multum, in quo decocta fuerit ruta, conyzia, artemisia, aut libanotis: infarciaturque aliquando ammoniacum, sit tamen melissimum, ac leue cataplasma: eoque incumbente prædictas vesicas oleo calido semiplenas desuper adhibeas, ne cataplasma infrigidetur; aut calfactos sacculos ex sale, seu ex milio superimponas. Neque erit inutile, præsertim si cerebrum affectum sit caput attonsum habere, idque irino oleo calido, aut iam dictorum aliquo maderacere: demum adeo ipsum valere, ne infrigidetur: sacculumque superimponere ex floribus itœchadis, hyslopi, samfuchi, ac serpilli foliis, castoreo, ac maceræ confectum. Vitandæ tamen erunt assiduæ capitis irrigationes: caput enim inde repletur, nonnunquam etiam congruum erit in calidum oleum descendere, ac balneari agrum, vel in aquam calidam, in qua fœnum Græcum decoctum sit, saluæ, seu ruta folia, & adiecta olei pars tertia, non tamen diutius in eo immorari: nam vt inquit Paulus libro sexto, cap. vigesimo, in oleum descensus maxime vires deiecit. Conferunt quoque ex aquis, sulphureis, & aluminosis balnea. Conuulsæ quoque partes pellibus luporum, aut vulpium vestiri debent. Si vero vehementius dolor increuerit, admouendæ ceruicibus cucurbitulæ sunt, sic vt cutis incidatur, Celsi præcepto. Inquit Marcellus cap. decimo octauo, opisthotonicis, & tetanicis lotium caprinum cum aqua mixtum efficaciter prodesse, si ieiunis potui de-
 Curatio conuulsio ex inflammatione orta.

tuus pariter si castorij, piperis albi, & petroselinæ æquales portiones simul tundes, & cribrabis, atque inde cochleare vnum cum vno cochleari mellis, & aquæ calidæ cyathis duobus ieiunio ad diem dabis: summum opisthotonicis esse remedium, & multis experimentis probatum ait, nec minus & arthriticis conferre. At si ex plenitudine, seu inflammatione conuulsio excitetur, vena secanda erit, liberaliterque sanguinem auferre conuenit: modo pluribus vicibus id fiat, vt diximus, & nõ vnuerfim, propter iam assignatas causas. Demum clysteribus, eisque acerbis: vtendum, modo non adsit quod impediat, vnum, aut alterum. Quod si inflammatio non cedat: vtendum erit medicamentis, quæ inflammatio ipsa exigit secundum diuersa eius tempora, indicatione, quæ à parte affecta sumitur, non neglecta, horum medicamentorum methodum à Galeno decimotertio method. scriptam reperies: aut eorum copium lib. de Simplic. medicament. faculat. requiras. Quæ vero per consensum conuulsio efficitur, curata parte primario affecta, & ipsa quoque curabitur conuulsio: velut si ex rodentibus succis, os vetriculi instantibus conuulsio fiat: his per vomitum euacuatis, conuulsio sedabitur, si opus erit, dando illi aquam repidam bibere: quemadmodum Galen. adolescentem, quendam simili conuulsione correptum duodecimo Method. meden. cap. vlt. se curasse testatur. At si ex phalangiorum, scorpionis, aut aliter venenata feræ ictu conuulsio excitetur: ad

hanc rem in primis Galen. auctoritate tertio de Locis affectis. cap. septimo, conferunt vincula superioribus partibus injecta: ab his enim præsentaneum præsidium expectatur. Et si in aliquo digitorum ictus fuerit, is contestim rescindendus erit: nam ex hoc saluus euadet, quemadmodum nonnulli rustici, quorum eodem loco Galen. meminit, ex tali rescissione euaserunt, ac à periculo liberati sunt: potissimum si ex viperis medicamentum potandum tribuatur, drachm. j. videlicet exhibens cum paucis vino albo, ac renui. At si partem abscindendam renuerit, facta ligatura, vt diximus, paulo supra affectam partem, ipsi parti affectæ medicame. ita, quæ vehementer attrahunt, adhibenda erunt: tum ex calfactoria, tum quæ atra calfactionem id efficiant, veluti cucurbitula: pariter cauterium, & medicamenta quæ cauteris similiter escharam efficiant, iuxta Galeni sententiam 13. Method. meden. cap. sexto competunt: & si inueniri poterit quispiam, qui ore suo virus extrahat, id quoque maxime confert: & ipse etiam Galen. theriacam supra affectam partem adhibere præcipit, lib. de theriaca ad Pisonem, cap. decimotexto: cum & ea extrinsecus imposita venenum trahat, aliaque innumera medicamenta pro diuerso animalis venenosi ictu à Paulo, & Aetio conscripta reperies: & proinde ea subtere libuit. Si vero ex immodico frigore conuulsio fiat, balneis, vnctionibus, frictionibus, ac reliquis calfacientibus medicamentis haud ægre curabitur.

Περὶ παραλυσῶς.

De resolutione.

CAPVT XIIIIL



VOD is affectus, qui à Græcis παράλυσις, seu παραλυσίς dicitur, à Latinis resolutio nuncupatur, neque vnus est, qui non admittat. Verum nunquid vbi motus deperditus est, aut partium aliquarum sensus perit, vel cum tum sentiendi, tum mouendi vis amissa fuerit, resolutio ea affectio appellatur, non ita liquido constat. Nam Galen. cum 3. de Locis affect. cap. 10. tum 1. de causis sympt. cap. 5. nervorum resolutionem appellat, cum & sensus, & motus fuerit. Caterum idemmet eodem tertio lib. de Locis affect. cap. 10. dicebat, per nervorum resolutionem interdum sensum duntaxat, interdum motum, nonnunquam ambo simul perire. Deinceps subdit: Itaque nervorum resolutio potissimum dicitur, vbi motus deperditus est. Vbi vero partium aliquarum sensus perit, eam partem sensus expertem esse: resolutam vero non adeo dicere consueuimus, & si nonnulli hanc affectionem sensus resolutionem vocitent. Ex quibus liquet, interdum Galeni motus deperditionem, interim sensus duntaxat, nonnunquam amborum simul amissionem, resolutionem nuncupare: quanquam potissimum resolutio apud eum dicatur, vbi motus deperditus sit. At qui eius verba bene perpenderit, cum sensisse reperiet, exquisitam, seu veram resolutionem nuncupare, cum tum sensus, tum motus vim partes amiserint: quam sententiam sectati sunt Aetius, & Paulus, necnon & Alexander Trallianus. Insuper nec negare videtur, vbi motus, aut sensus duntaxat pereant, posse non veram, nec exquisitam, sed tamē resolutionem appellari, nec minus collationem faciens inter motus, & sensus deperditionem, asseruit potissimum dici nervorum resolutionem, vbi motus deperditus fuerit. Erit igitur iuxta Galeni

Paul. lib. 5.

Aet. lib. 3.

Aet. lib. 6.

cap. 28.

Paul. lib. 3.

cap. 18.

Alex. lib.

1. cap. 16.

*Nervorum
resolutio
quid sit.*

decreta, exquisita nervorum resolutio, cum motus, tum sensus amissio: non siquidem nervorum omnium totius corporis: nam huiusmodi affectio apoplexia appellatur, ut infra dicemus: sed ubi alteri laterum, dextro, aut sinistro, aut in aliquo particulari membro id euenerit. Quoniam si alteri alterum accideret, resolutio nominabitur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus, interdum dextre, interdum sinistrae. At si in aliquo membrorum idem euenerit, ut in manu, vel crure, eiusdem membri resolutio esse dicitur: quamvis & ubi pereat motus duntaxat praecipue, aut sensus, resolutio quodammodo appellari possit eodem modo, ut diximus: id quod etiam confirmavit Caelius Aurelianus libro 2. cap. 1. cum dixit, Sed est, vel fiet paralytis, nunc sensus, nunc motus, nunc utriusque. Nec praetereundum

Locis citatis.

Cur in nervorum resolutione interdum motus, interdum sensus dumtaxat, quidamque ambo pereant.

erit quod Galenus eodem primo lib. de causis symptomatum, & 3. de locis affectis, de tertia quadam specie, seu resolutionis differentia pronunciauerit: ubi ex aliqua facta spinali medullae dispositione valida, circa primum eius processum, aut reliquis eius partibus, omnes aequaliter corporis partes suppositae resolutae fuerint, siue ob luxatam aliquam spinam vertebrae. At qui fiat, ut in nervorum resolutione interdum sensus pereat, illaeso servato motus, interdum motus, illaeso sensus, nonnunquam utriusque pereant: quoniam Galenus primo de Locis affectis, cap. 6. & primo de Causis symptomatum cap. quinto, illud enodauerit, cum eius verba obscura aliquantisper videantur, tyronibus praesertim, hic explicare libuit. Illud prius tanquam manifestum, ac luce clarius in eiusdem Galeni doctrina supponentes, quod tam motrix quam sensitiva facultas à cerebro tanquam à fonte, & parte principe ad motus, & sensus instrumenta per nervos delabitur: qui ex ipso cerebro orti eandem cum ipso substantiam habent, nisi quatenus compactiori materia sunt constituti, ne facile à quolibet paterentur. Quod sit, ut eatenus à cerebri natura recessisse videantur, quatenus ex compactiori materia constituti induruerunt: quia ratione assiduo cerebri auxilio indiguerunt. Nam si tales, quale est cerebrum prorsus remansissent, nulla eius ope indigissent. Natura enim ita comparatum est, Galeno teste septimo de Hippocrat. & Platonis decretis, cap. quinto, ut substantiarum proprietates facultatum etiam sibi convenientium proprietates secum habeant. Unde fit, ut quantum unusquisque nervus à natura cerebri recesserit, tantum etiam sit à virtute, facultateque eius remotus, & sic, omnes cerebri continuate, recentique semper, ac assidua ab eo informatione indigeant; velut, circumfusus nobis aer continuo fulgore illustratur, & non in semel accepta mutatione perseuerat: utpote qui, dum continuam accipit mutationem, illustratur, nec sublato illustrante, lux in eo permanet, sed statim fulgor cum illustrante evanescit. Non ab re igitur, si continua, ac recentiam dicta informatione, à quavis causa impedita, & facultas quoque à principe parte missa intercipiatur, ne ad animalis tum sensus, tum motus instrumenta pertranseat, pro ratione diversorum nervorum affectorum. Qua de re in his partibus, quae duplici nervorum genere participant, ut in lingua, & oculis, nihil habet ambiguitatis, quod moveantur quidem, sed non sentiant, aut illaesa sentiendi facultate, rursus non moveantur: & utriusque simul affectus generibus nervorum nec moveantur, nec

sentiant. Verum in quibus membris dari duntaxat nervi inveniuntur, si ablata cute subiectus musculus, qui nudus est, immobilis videatur, sentiat vero tangentes, exigua ei noxam accidisse putandum est. At si vehemens fuerit vitium, sensum, & motum simul laedi contingit. Sensum vero obladi, servato quidem motu in tali musculo, fieri nequaquam potest: tantam siquidem musculus ipse animalis facultatis partem suscepit, quanta ad sensus excitationem sufficiat, ad eius vero motum non sufficiat: quippe actionis sensus pati aliquid potius, quam agere deprehenditur: proinde ab exigua facultate functio eius perfici potest, ut quae non ita validis egeat viribus sentiendi facultas: & propterea nihil minus, immo etiam magis pati possunt partes, cum debiles fuerint. Efficit enim imbecillitas, ut facilius affectio à sensu dignoscatur, Galeno teste quarto de Locis affectis cap. quarto, musculorum vero motus in agendo, non in patiendo actionis efficaciam habet: quapropter plurima indiget animali facultate. Nunquam igitur accidere deprehendes, ut moveatur quidem nudus musculus sed non sentiat: cum per eundem nervum & movendi, & sentiendi facultatem fuscipiat, sed aut sentiat, & non moveatur exigua existente eius noxa, aut neque moveatur, neque sentiat: cum vehemens fuerit eiusdem nervi vitium. At si ad membrum aliquod, pro motu, nervi ad musculos inferantur: pro sensu vero perficiendo, ad cutem perueniant (non enim qui per musculos dispersi sunt nervi reliquias quasdam ad cutem impatiunt, ut quibusdam falso visum est) fieri inquam poterit, ut interdum sensus, interdum motus, nonnunquam ambo simul pereant. Nam fieri poterit, ut adiacens illi cutis sensum amittat, eo affecto nervo, qui ad cutem inseritur, ac per eam dispersus est: qui vero per musculos spargitur, noxa vacet: & proinde musculus ipse moveatur. At si is, qui per musculum spargitur nervus offendatur, qui vero per cutem disseminatur, noxa vacet, non movebitur quidem membrum ipsum, quantumvis sensum non amiserit, id vero ob hanc causam evenire solet, quod nervus alterius laesus sit, alterius vero manet illaesus: & si ab vno principio originem duxerint, fuerint tamen in via diuisi. Quod si utrique simul nervi afficiantur, & qui ad musculum devenit, & qui ad cutem peruenit, simul & sensus, & motus pereunt: cum videlicet commune principium affectum fuerit. Scies autem hoc, ubi exquisitè cognoveris communia ipsorum principia, exquisitè considerando, num cerebrum ipsum vel spina sit affecta in eius principio, aut aliqua alia vertebrae. Haec autem in nervorum dissectione percipiuntur, quare solus ille, qui in his fuerit exercitatus, exquisitè ea considerare poterit, Galeno teste primo de Locis affectis cap. sexto. Nam cum non perpetuo unus praefinitus afficiatur locus in ipsa resolutione, sed diversi affici possint, si cerebrum ipsum affectum sit, non tamen secundum totum (quia apoplexia generatur) sed secundum partem dextram, vel sinistram dignoscas: quoniam simul cum dextra, vel sinistra parte corporis, faciei quoque partes resolventur, dextrae, vel sinistrae. At si deimpta facie, una praedictarum corporis partium sensu, motuque privabitur, circa primum spinæ processum affectum consistere coniicies. Verum media pars eius affecta erit ea videlicet, quae superstat è regione resoluti lateris.

*Si initio
spinalis
colle.*

*aliqua
pars.*

*per parte
resolventur
quoniam
resolutione*

*Quo praeterea
naturā affectus
sui resolutio
nervorum.
Stupor
quid sit.
Resolutio
autem signa.*

*quem mor-
bum secler-
um resolutio
nervorum.*

Quod si omnia inferiora membra facie excepta, resoluantur eodem in loco, hoc est, in eius initio ipsa spina offensa est, tanquam omnium nervorum communis origo, qui sub facie existunt: verum non secundum partem, sed ingenti affectione laborans, tota affecta crit. At si accidat quandam duntaxat determinatam partem resolutam esse, ea inuestiganda pars erit, à qua nervos susceperit: id quod in anatomice exercitatus haud obscure inuenies: quemadmodum si & ipsamet spinalis medulla non secundum eiusdem initium, sed iuxta alias inferiores eius partes ac vertebrae laedatur, & suppositae partes oblaesae erunt: si ingens fuerit affectio, omnes si exigua, & secundum partem oblaesa sit; partes quae è directo suppositae sunt, afficiuntur. Quapropter ex anatome doctus locum primò affectu inuenire poteris, notitia praehabita, à qua spinalis medullae partes, partes resolutae nervos suscipiant: ac quemadmodum diguoscendum id sit, scriptum reliquit Galenus tum primo de Causis symptomatum, cap. 5. tum tertio de locis affectis, cap. 10. Cum igitur propter priuationem animalis facultatis qualibet resolutio generetur, quae à cerebro tanquam à primo principio mediis nervis, ac per spinalem medullam, tanquam per semitas, ad sensus, & motus instrumenta delegatur, non immerito cerebrum ipsum aut spinalem medullam, seu particulares nervos quodam à cerebro, vel spinali medulla ortos, aut denique ipsamet instrumenta in qualibet resolutione affici necesse est. At quo pacto illud distinguendum sit, num videlicet vna, vel altera pars primò afficiatur, iuxta Galeni doctrinam, paulò antè ostendimus. Est vero resolutio symptomata in genere noxae functionum animalium motricum, & sensibilibus laeditur, namque utraque facultas in ea, non tamen diminuitur, veluti in stupore: qui nihil aliud est, quam difficultas quaedam sentiendi, & mouendi, ut patet primo de Causis symptomatum, cap. 5. vel imperfecta quaedam nervorum resolutio, ut secundo de Causis symptomatum, cap. 2. liquet: quanquam enim sub eodem genere contineantur tum stupor, tum resolutio, differunt tamen magnitudine, eodem Galeno teste praecipito loco. Quapropter nervosae partes in resolutione non diffucile sentiuunt, & mouentur, veluti in stupore: sed neque mouentur, neque sentiunt: & propterea vtraque facultas in ea ablata est, facultate enim animali omnino partes priuatae sunt, cum resoluuntur. Cuius affectionis indicia scribere non opus erit: cum quibus non medicus modò, sed ferè vulgaris promptè ipsam dignoscere valebit, cum viderit partem quampiam sensu, & motu priuatam esse. Secutur autem non vnum tantum morborum genus, sed in differenter penè ex quolibet oriri potest. Interdum namque ex immodicè frigida intemperie, cum frigidorum, viscidorum, ac crassorum succorum abundantia, aut absque ea, in altera cerebri parte, spina, seu particulari nervo excitari potest. Dignosces inquam id promptè ex his, quae narrauimus, signis, cap. de dolore capitis orto ex praedictis causis: nec minus inflammatione, seu scirrhus in praedictarum partium aliqua ortis, delationem facultatis impredientibus, imò non modò si in eis, verum in vicinis partibus orti fuerint, nervos comprimentes, resolutionem excitare poterunt: quod ex propriis inflammationis, aut scirrhi signis comprehendes, qua ratione etiam & nervi ipsi comprimuntur, ac resolutio excitatur

ab aliquo corpore duro extrinsecus adueniente, aut ubi vel laqueo, vel manibus constringuntur: sunt quoque & ipsi arctiores ex luxatis, fractisve spinæ vertebrae, aut aliis ossibus. Similiter ad vulnus, seu vlcus, cum cerebri, seu spinalis medullae, tum alterius particularis nervi sequitur nervorum resolutio: quorum morborum, seu causarum notitia ex propriis eorum indicis promptè haberi poterit: vel si externa fuerit causa, ex ægri, æstantiumque relatione. Resolutio, quæ non per omnia membra, sed in partibus fit, ut Celsus asserit, cap. 27. lib. tertii, nunquam acutus, sæpe longus, ferè sanabilis morbus est. Quod verò in senibus, atque hyemis tempore frequenter hæc passio, difficile autem in calidis ætatibus, apud Cælium Aurelium liquet eodem libro secundo, cap. primo. Verum quæ à nervi diuisione oritur resolutio (Paulo teste) insanabilis est: nec minus si ex spinalis medullae transuersis incisionibus, seu luxatione valida. Amplius si resolutum membrum minuatur, aut eius color immutetur, non absque ratione diffucile curabitur, aut fortè non curabitur: non enim facultate animali duntaxat priuatum esse indicatur, verum & naturalis, ac quodammodo vitalis. Nunquid autem ea, quæ dextri lateris est resolutio deterior sit ea, quæ sinistri, aut è contra, reliquis iunioribus cessendum relinquo, nam quæ circa id dici possent, magis fortè puerilia viderentur, quam huius rei exactiorem doctrinam afferrent. Curabis autem eam, quæ à frigidis, crasis, ac viscidis succis resolutionem ortum habet, si similis præcipiatur victus ratio, velut præcedenti capite de conuulsione statuimus, ut vniuersa videlicet sit attenuatoria, ac sicior, Paulo & Aëtio testibus: modicisq; cibis eiusdemque succis, ac portionibus vtantur ægri: situm propterea quoad possint, maxime sustineant: & ut summum dicam, in vniuersum simili victus ratione vtantur. Et cum redundantem humorem euacuare oporteat, pro eius curatione (Aëtio teste) nullum aptius in his reperire datur principium, quam à venæ sectione: siquidem permiserit ætas, habitus, tempus, studium, prægressus victus, & reliqua, quæ prohibere solent venæ sectionem: quæ fiat à partibus sanioribus, & ne perfrigerentur ægri, oportet moderatam facere detractionem: per quam solum paululum immineatur materia, quemadmodum Aëtius consilii. Interpositis autem diebus quibusdam à venæ sectione, alius clysteribus subducatur, parato eorum decocto ex maluarum, althææ, mercurialis, chamæmeli, betonicae, hyssopi, & sampluchi, singulorum manipuli s. florum stæchadis, & foliorum rutæ, vtriusque drachm. tres decoquantur in aqua, quoad tertia pars absumatur. Deinde accipiat prædicti decocti lib. j. & s. salis communis parum, olei communis, anethini, vel chamæmelini vnciæ tres, mellis rosacei vnc. ij. hieræ picæ simplicis drachm. vij. aut compositæ drachm. iij. seu benedictæ laxatiuæ drachm. iij. aut confectiois de dactylis, seu antidoti indi tantundem. Interimque si videbitur, trochiscati agarici scrup. iij. aut drachmas duas commiscere poteris, & fiat clyster. Post quæ non diuersa ratione ab ea, quam in cura conuulsionis docuimus, syrupi, aut alia decocta, propinandi sunt, pro pituitosorum redundantium humorum extenuatione, ac incisione, ut expulsiōi reddantur idonei. Quibus sic paratis, purgatio exhibeatur aliqua ex his quæ iam dicto capite

Curatio.
Victus ratio.

Venæ sectio.

Clysteres.

Preparatio.

Purgatio. conscripsimus, paulatim à lenioribus ad vehementiora progrediendo. Nanque non semel tantum, sed sæpius purgandi sunt ægri, interpositis tamen semper diebus quibusdam: etenim ubi pars resoluta est (Celfo auctore) prouidet malo corporis, vel sanguinis missus, vel alius ductus. Vtilissima autem est post purgationes theriaca, & mithridatum, ut Aëtius testatur; quia de re drachma vna alterius tribuatur. Quod si cerebrum primario affectum sit, magnopere conducit post hæc apophlegmatismis sternutatoriis, ac nasalibus medicamentis caput purgare dictis uti: utpote quæ à capite pituitam ducant. Quod si ipsum affectum non sit, neque eis vtendum erit, sed talibus medicamentis, quæ cerebrum ipsum roborent. Nanque vniuersa curatio in his à capite initium sumit: hoc enim radix est, & principium totius affectionis, Aëtio auctore, inter quæ hoc vtare, Recipe diambra, antidoti pliris archoticon, & diamoschu dulcis, singulorum scrup. j. pulueris hirundinis præparati drachm. s. seminum coriandrorum præparatorum drachm. j. sacchari rosacei drachm. iij. cum saccharo dissoluto in aqua rosacea, fiant tabellæ, ex quibus æger sæpius parum in ore teneat. Auxiliatur insuper huic affectioni (ut Paulo, & Aëtio visum est) assumptio castori, aut opopanax, aut sagapeni pondere circiter drachm. j. cum aqua mulla. Insuper & antidotum ex triplici pipere, Paulo auctore. Sed & fermentorum vitis viridi decoctum à ieiunio assidue potum prodest valde partibus corporis resolutis, ut testatur Aëtius. Quod si caput primò affectum fuerit, aut spinalis medullæ initium, à iam dictis euacuationibus non erit incommodum circa occipitis cauitatem, quo loco spinalis medulla initium habet, vnctiones approximare ex oleo nardino, costino, de nuce muscata, vulpino, de hyperico, castorio, aut è terrenis vermibus parato, & demum laurino, seu de piperibus, aut de euphorbio. At si maius vnctiones componere, eisque uti, excipe ex vulpino, nardino, & de nuce muscata oleo, omnium vnc. iij. addasque succi hyperici, & saluæ, singulorum drachm. ij. castorij, sagapeni, vtriusque drachm. j. & s. florum stœchadis drachm. s. & cum pauca cera, exiguoque vino albo odorifero fiat vnguentum, vel sacculus pariter paratur. Rec. hysopi, sampluchi, hyperici, saluæ, rutæ, & foliorum lauri, singulorum drachm. ij. spicæ, matstiches, castorij, florum stœchadis singulorum scrup. ij. caryophyllorum, maceris, nucis muscatæ ana scrup. s. rosarum rubearum siccarum manip. s. omnia contundantur, & ex eis sacculi parentur. Non incommodè insuper foras fieri possunt ex saluæ, rosinarino, hyperico, herba paralyti hodie vocata, hysopo: samplucho, betonica, pulegio, & calamintha, omnibus in vino albo decoctis, additisque castorij drachm. ij. florum stœchadis, ac spicæ ana drachm. j. & s. quibus sæpius reiteratis cum spogiis, seu linteis, aliquod ex prædictis vnguentis, seu sacculis superimponi debet. Quod si neque, his morbus cedat, sinapismis, aut per ignem cauteriis, siue per aliud medicamentum candens partem inurere non dubitabis, Aëtij sententiam secturus. At si nec cerebrum, neque spinæ initium affectum fuerit, sed ex reliquis eiusdem medullæ spinalis partibus oriatur affectio, eis ritè inuestigatis, atque inuentis super easdem iam dicta medicamenta approximare poteris. Simili ratione, & si aliquis particularis nervus fuerit affectus, eius ori-

gine primo inuenta, prædicta, aut similia medicamenta adhibebis: quemadmodum Pausaniam Syrum sophistam, qui secundum duos minores sinistræ manus digitos, atque medij partem dimidiam, in primis sensum difficilem habebat, postea eum omnino amisit, malè curantibus medicis, sanauit Galenus, circa dorsi initium ea medicamenta, quæ illi digitis adaptauerant, adhibere iubens, à qua parte nervi, per quos ad manus digitos, præsertim iam dictos sensibilis transmittitur facultas, procedunt, velut tum primo de Locis affectis, cap. 6. tum 4. eiusdem, cap. 4. scriptum reliquit: nunquam tamen cerebrum despiciendum erit, & si primario non afficiatur. Prodest etiam resoluti membri, seu torpentis summam cutem exasperasse, Celfo auctore, vel vrticis casam, vel imposito sinapi, sic ut ubi ruber coeperit corpus, hæc remoueantur, scylla quoque contrita, bulbiq; contriti cum thure rectè imponuntur. Conducit quoque & cucurbitulas aliquando sine ferro admouere: quinetiam fouere aqua calida marina, vel si ea non est, tamen salsa magnopere necessarium est. At si adsint balneæ calidæ naturales, iis potissimum vtendum est: in eisque præcipue resoluta membra agitando sunt: in quarum defectu arte balneum parandum erit ex prædictarum herbarum decocto, ac reliquis calfacientibus, eoque in resolutis partibus vtendum. Nam si quid aliud, conducent resolutis membris, ut ad ea sanguis, atque calor, & spiritus trahantur: quod sit, ut & melius alimentum trahant, ac concoquant, & recrement repellant, & digerant. Post verò cucurbitulas, seu balneas, alienum non erit aliquo prædictorum vnguentorum affectum membrum linire, ac linteis seu vulpina pelle operire: aut aliud componere licebit in hunc modum, Recipe olei nardini, & costini vnciæ vnam, olei de piperibus, & de euphorbio ana drachmas tres, succi herbe, quæ paralytim vocant, saluæ & hyperici, singulorum drachmas quatuor, florum stœchadis, calaminthæ, hysopi, singulorum drachmam vnam, castorij, baccacarum lauri ana drachm. s. seminis sinapis scrup. ij. cum cera, & resina terebinthina quod satis sit, fiat vnguentum, seu ceiatum. Si verò ex ingenti frigore citra humorum redundantiæ resolutio fiat, inuenta parte primario affecta prædictis medicamentis supra eam adhibitis, curabitur, cerebro, ac ipsam et parte resoluta, omnino non neglectis, verum eis quoque auxilia (ut præcepimus) porrigas: posthabitis tamen venæ sectione, purgatione, ac reliquis connumeratis medicamentis, quæ vim vacuandi habeant, sed alterantibus tantum, ac partes roborantibus vtendum. At si ex inflammatione, vel scirrho in prædictarum aliqua partium ortis resolutio fiat, eiusdem inflammationis, seu scirrhi curatione sanabitur. Ab aliquo autè corpore duro extrinsecus adueniente, laqueo, vel manibus nervos constringentibus, si resolutio excutetur, per eorumdem ablationem promptè curabitur. Sic si ex fractis aut luxuratis spinæ vertebra, seu aliis ossibus, si curari valeat orta resolutio, ex luxationis seu fracturæ curatione sanabitur. Similiter si ad vulnus, seu vlcus tum capitis, tum spinalis medullæ, aut aliorum particularium nervorum, ipsis curatis, dummodò curari valeant, & ipsa resolutio per sanabitur: propterea ex iam dictis causis resolutionem ortam curare prætermisimus.

Que post purgatione peragenda sunt.

Vnguenta.

Sacculi.

Potus.

Sinapismi. Cauteria.

Περὶ τῆς ἐκείνου κινήσεως. De convulsione canina.

CAP. XV.

SERMONIS affinitate ducti de ea affectione tractare proposuimus, quā Græci σπασμὸν κυνίων; Latini caninam convulsionem; medicorum vulgus oris torturam appellat, quæ nihil aliud est, quam mandibularium musculorum resolutione, Aëtio teste, ex qua in obliquum distorquetur os, nasus, & oculus, & in summa dimidia faciei pars. In hac affectione inter cerebrum, non tamen secundum totum; verum secundum dimidiam eius partem afficitur, interdum nervi, qui a cerebro ad faciem deferuntur: nonnunquam verò partes ipsæ, quæ lasas actiones habent, probatio affectu laborant, Galeno auctore quarto de locis affectis, quarum partium primò affectarum discrimen per copulata symptomata faciliè deprehenditur. Nanque si cerebrum affectum sit, primò non modò omnes faciei partes affici consueverunt, ut oculus quoque lædatur, verum etiā simul cum ea tota corporis medietas è directo supposita resoluta erit, ut in præcedenti capite declarauimus. Si verò faciei tantum partes resoluantur in alterutra duntaxat parte, omnes partes quibus à tertia coniugatione nervi adueniunt, ut temporarij, masseteresque musculi, labra, & pinnae narium resoluantur, ac ipsius linguæ, atque partium oris sensus duntaxat amittitur: quapropter nervum ipsum primariò affectum esse putandum est, qui à tertia nervorum coniugatione procedit. At si fortè fortuna una quæpiam faciei particula, aut sentiendi, aut mouendi, aut utraque facultate lædatur, ea sola causam dispositionis continet, atque affecta est: velut si latus musculus affectus sit, & labrum ipsum, narium pinnae, ac ferè tota mandibula, & gena utraque resoluta videbitur. Similiter accidit si supercilium vnum duntaxat fuerit resolutum, aut palpebra: nanque affectus in ipsis tantum particulis continetur. Euenit autem cum latus musculus fuerit resolutus, qui dextram labri partem mouet, ut ipsa ad sinistram deflectatur, velut si is, qui sinistram mouet, resolutus, ipsa trahatur ad dextram, ut semper in aduersam partem deflecti contingat resolutam partem: trahitur nanque ea à musculis actionem facientibus, Galeno teste libro de causis morborum. Nec secus videbitur ubi quilibet alius faciei musculus, vel nervus quodammodo fuerit affectus. Nam semper ipsa pars in diuersum trahitur musculum, ubi resoluta fuerit, eodem Galeni auctore quarto de locis affectis, impedita nanque delegatur à cerebro, non ab re partes ipsæ eadem animali facultate priuata relaxantur. Opposita verò, utpote sanæ existentes, participesque eiusdem animalis facultatis, proprium munus perficiunt, præsertim musculi, qui cum operantur, ad suum principium seipsos contrahunt: & propterea oppositum ad se trahunt. Quare de re non mirum si in hac affectione per accidens, videatur figura vitari, ac morbus in figura oriri: quoniam pars faciei à naturali figura deflectit: non tamen propter hoc caninam convulsionem morbus in figura dici poterit: quam ad ipsam is sequatur morbus ut diximus, verum symptoma est in genere noxæ functionis animalis sensibilis, & motricis voluntariæ, si sensus, & motus deperditus fuerit, aut alterius sensibilis, seu

motricis, si sensus, aut motus deperdatur; modus autem lationis erit earum ablatio. Neque laborandum erit per multa signa pro eiusdem affectionis notatione, cum promptè à sensibus dignoscatur, visu videlicet, & tactu, cuius causæ non absimiles videntur esse, quam eæ, quas præcedenti capite de resolutione narrauimus, & propterea hic conscribere superuacaneum esset: quamvis ex convulsione quodque alterius partis faciei musculorum possit & facies ipsa lædi, ac perueri: adeò ut similiter figura vitietur, veluti ex nervorum resolutione, ut patet lib. de causis morborum: quæ quoniam curata convulsione sanabitur, propterea de ea non erit noster sermo. Indicant autem spasmi cynici euentum dolor circa faciei ossa, & stupor in cutè eiusdem, ac palpitatio multa in ea præueniens. Non despicienda erit eius curatio: nam si proteletur, fortasse ipsa speranda non est: sed timentum erit ne in resolutionem, aut morbum comitalem, vel apoplexiam mutetur. Propterea si simili victus ratione seruata, quam cap. de convulsione, & resolutione instituiimus, confestim pro ratione causæ ipsam facientis, ea rescindenda erit, utendumque & venæ sectione, si opus fuerit, aut forti aliqua purgatione: & demum erithinis, ac apoplegmatismis valentioribus, & præter iam dictos, hoc vocare, R. radices pyrethri, zinziberis, castorei singulorum scrup. ij. piperis, staphidis agriæ ana scrup. j. mastiches drac. ij. seminis sinapis drac. s. hyssopi, origani ana scrup. iij. vna passæ drac. iij. excipiantur omnia trita, & adhibita cera, ac pauco rosaceo melle, fiant pastilli mansiles. Proderit etiam eiusdem ligatura, quæ in oppositum æqualiter veluti capitulum quoddam partem resolutam deducat, Paulo teste. Quibusdam etiā & sanguinis detractio ex vasis linguæ subiectis confert, eodem auctore. Item cucurbitulæ in occipitio iuxta primam vertebra defixæ iuuant, ut ipsemet testatur. Reliquis insuper medicamentis tum cerebrum roborantibus, cum topicis supra affectam primariò partem adhibendis eis vtaris, quæ præcedenti cap. conscripsimus. Verum quia non ea maxilla, quæ peruersa esse apparet, sed opposita, resolutione infestatur, ut ex ipsa rei notitia liquet, & Paulo visum est, iccirco resolutione parti (ubi oporteat) auxilia adhibenda sunt: & non opposita, quemadmodum Aëtius præcipit. Et quoniam omnia hac affectione laborantibus commodant, quæ in resolutione fuerunt relata: ea de re huic sermoni finem imponamus, qua ratione & ab aliarum partium solutionis retractione excusatum esse velim.

Περὶ τῆς ἐκείνου κινήσεως. De incubo.

CAP. XVI.

VBI quispiam, cum somnum ingreditur, se grandi, quadam mole opprimitur, inuadique ab alio, & premi imaginatur, ἐκείνου affectus is ab omnibus ferè Græcis nūcupatur, ἀπὸ τῆς ἐκείνου λέξεως, quod inuadere & premere significat: nam hoc malo correpti ab aliquo se inuadi, & premi putant, vel quoniam homo quidam Ephialtes nominatus hunc affectum perpesus est, Paulo teste cap. 15. tertij lib. At Themison (ut ipse refert 10. suarum epistolarum volumine) πνιγὰς λέγουσιν à suffocatio nominauit. Tota autem medicorum turba Latine incubum, seu incubonē appellat, qui Aëtio teste, auctoritate Possidonij, nō est dæmō, sed inagis præludij,

Signa. Causæ.

Prognosis. Causæ.

Curatio.

Lib. 3. c. 14.

An li. 6. c.

alia huiusmodi. A sole, frigore, ventis, igne, ac fumo, diurno somno, ac statim a cibo, cauendum erit. Curandos etiam oportet iacere loco lucido, atque medio criter calido, adhibita requie animi, & corporis abstinentia, usque ad tertium diem, ex sententia Cælij Aureliani lib. 1. cap. 3. & vi summum sit, cam, simili victus ratione vntur, quam vertiginosis, ac comitialibus præcipimus. Quod si sanguis redundarit, venam in cubito secare oportet, exteriorem, vel mediam: si verò vitiosi succi magis prædominantur, purgante medicamento ægri corpus euacuandum est, prius tamen exhibitis extenuantibus quibusdam medicamentis pro eorundem humorum preparatione. Quibus paratis, si pituita fuerit is qui redundat humor, ex stomachicis pilulis, & Galeni hiera, aut ex eadem picra cum epithymo, & iena, aut ex pilulis de lapide lazuli ægrum purgabis: quod si maius aliis purgantibus medicamentis sit, cap. de epilepsia, aut de vertigine ea requiras. A purgatione ea, quæ cum ventericulo, tum caput roborant, exhibeantur: diarrhodon videlicet, aromaticum rosatum, diamofchu dulce, diambra, & alia huiusmodi. Amouenda insuper, purgato corpore vniuerso, capiti localia medicamenta sunt, irrigationes videlicet, ac inunctiones calidæ; apoplegmatisinis, ac caputurgis similiter vtendum: quorum omnium medicamentorum copiam cap. de morb. comitiali inuenies, & de apoplexia. At succurrit particularim ipsis, ex Aëtij, & Pauli sententia, niger peronie fructus, si quindecim eius granula trita cum aqua in potu exhibeantur, idque continet fiat, quoad æger sanetur.

De vertigine, & tenebricosa vertigine.

CAP. XVII.

Deo magnam inter se cognationem
habent affectus is qui à Græcis præ-
sertim Hippocr. & Galen. interdum
in 17. 706. vt patet aphor. 17. 23. & 31.
tertij lib. interdum dicitur vt liquet 4.
ratio. victus, appellatur, & qui ab eiusdem
nuncupatur, vt aphor. 17. 4. lib. & eodem 4. de ratio-
ne victus constat: quorum affectum primus à Lati-
nis vertigo, reliquis autem tenebricosa vertigo nunc-
upatur: à medicorum autem vulgo scotomia, vt
audi sint quidam iuxta eorum sententiam asserere
inter se prædicta duo non differre. Nos verò non
modò nomenclatura eos affectus, prædictorum au-
thoritate, discrepare putamus, verum etiam re ipsa,
quòd autem nomine dissideat, ex iam dictis liquet:
at quòd re ipsa, distent, ex Galeni verbis 4. de Ratio-
ne victus patere poterit, dum asseruit, quòd quando
quispiam imaginatur caput circumferri, tunc dicitur,
hoc est, vertigo dicitur, quando autem & tenebri-
cosa simul visio cum hoc fit, scotia dicitur, hoc est tene-
bricosa vertigo vocatur, ab accidentis nomen, quòd
repentinas oculis ingerat tenebras, vt ait Cælius
Aurelianus cap. 2. lib. primo. Ex quibus verbis li-
quet aliud re ipsa esse, quòd caput duntaxat cir-
cumagi videatur: aliud verò quando simul cum co-
tenebricosa fuerit visio, nanque in vertigine dic-
ta (præter tenebricosam visionem) caput vertigi-
agi videtur duntaxat: in tenebricosa verò vertigi-
ne simul cum capitis circumlatione tenebricosa
fit visio. Propterea iuxta Hippocratis & Gale-
ni sententiam asserimus, quòd vertigo sit imagina-
tio

tio quædam, quod caput circumferatur, seu vertatur, *quod dicitur* autem sit, quando quæcunque conspiciuntur, circummagi videantur, ac derepente simul pereat sensus visus, cum ipsi ægroti putent tenebras circumfundi, quemadmodum Galeno visum est, commento Aphorismi decimiseptimi, libri quarti; & si per *quod dicitur* interpretes male vertiginem intellexerit, ac interpretatus fuerit: nam in hac passione constitutos repentina visus tenebratio, atque nebula, vt ex eodem Cælio Aureliano liquet, cum capitis vertigine consequitur, vt omnia secum moueri existimant. At in generationis modo ambo conuenire videntur, cum ob inordinatam spiritus flatuosi motionem in partibus cerebri generentur, qui vel in capite localem habet generationem, vel sursum ex infernis fertur, vt 4. de Ratione victus in morbis acutis, & commento aphorismi 31. 3. lib. liquet. quod fit, vt eadem etiam pars in vtriusque afficiatur, nempe caput, vt constat de vertigine, commento aphorismi 23. 3. lib. & quarto de Ratione victus in morbis acutis, & de tenebricosa vertigine, tum eodem quarto de Ratione victus comment. 42. tum tertio de Locis affectis cap. 8. Insuper conformari poterit ex functionem læsione: in vtriusque nanque animales oblaeduntur functiones; quamuis non omnino eadem, neque eodem modo; namque in vertigine deprauata imaginatio læditur, diminuiturque visio, vel fortè etiam deprauatè interdum, vt patet Galeno quarto de Ratione victus, & commento 17. aphorismi 3. lib. quam sententiam scitari etiam videtur Aëtius, cap. proprio de vertiginosis. In tenebricosa autem vertigine cum ipsa deprauata imaginatione, non visionis imbecillitas, verum eius ablatio percipitur, nam præter id quod cuncta videntur circummagi, derepente simul perit sensus visus, vt testatur Galenus commento aphorismi 17. 4. lib. putant enim ægroti tenebras circumfundi, adeo vt interdum cadant, vt patet tertio de Locis cap. 8. Qua de re vertigo symptoma erit in genere noxæ functionum cum imaginatione deprauata; tum diuisionis diminuta, seu deprauata. At in tenebricosa vertigine non modo imaginatiua aberrat, sed visua functio abolita est, & interim motrix facultas, vt ex iam dictis liquet, & propterea affectiones prædictæ secundum magis, & minus inter se discrepare palam videntur: nec idem sunt, vt quibusdam visum est: & si in vtriusque imaginatiua facultas vitata sit, ac caput, seu cerebrum afficiatur, quamquam conati sunt quidam Galeni sectatores probare in hisce affectionibus imaginationem non lædi, cum si læderetur, aiunt, non putarent ægri se esse deceptos: nam licet videatur eis caput circumuerti, aut quæcunque conspiciunt, circummagi, sciunt tamen falsam esse visionem, & imaginationem. Atqui nihil obstat imaginationem læsam esse, ægrumque cognoscere verum, seu falsum, illud quod imaginatur; cum hæc cognitio ratiocinatricis facultatis, seu cogitatiuæ, & non amplius imaginatiuæ sit munus: quæ constare poterit, imaginatiua oblaesa existente, vt in quibusdam phreniticis apparet: & proinde quia falsum imaginatur, imaginatiua aberrat, quia verò dignoscit æger se falsa imaginari, ratio, seu cogitatio illa erit: quemadmodum de se ipso testatur Galenus phrenitide laborans quarto de Locis affectis. Rursus si ad cerebrum prædictæ affectiones attinent, quomodo visibilis dun-

taxat facultas oblaesa erit? In vtriusque igitur luce clarius patet, imaginatricem facultatem deprauatam esse: at dissident, quod in vertiginosis sensus visus non simul perit, velut in scotomaticis, nec coincidunt ægri, cum affectio mitior existat: in scotomaticis verò, quoniam caput vehementius afficitur, sensus visus repente deperditur adeo, vt interdum cadant, maxime vbi in circulum circunvertantur: si quidem ipsi ab vna ratione euenit id, quod ceteris a pluribus accidere solet, Galeno teste tertio de locis affectis: similiter si alium quendam circunverti viderint, siue rotam, aut trochum, aut ipsi quoque in aquis vortices, siue aliquid tale, idem perpetiuntur. Spiritus enim visuius ad trochum, siue aliud tale, qui circunvolutatur, allabens mouetur, & simul cum illo circumfertur, vt testatur Aëtius. quinimò & in ipsis citra circuitionem euenire videmus id, quod in aliis, cum in circo frequenter vertuntur, accidit, & proinde ex ipsa appellatione manifestus est, qualis sit scotomaticus affectus, vt patet tertio de locis affectis. Discernitur verò ab epilepsia hæc passio ex Cælij Aureliani sententia, siquidem neque sensibus priuat ægrotantes, neque spasmo, id est, diuerso raptu afficit. Nec quicquam refert, si Galenus eodem tertio de locis affectis, de scotomate duntaxat, hoc est, de tenebricosa affectione verba fecerit, vertiginis autem non meminerit, cum eadem pars in vtriusque afficiatur: quod quidem inuestigare eo libro proposuerat, & insuper quoniam de scotomate differens, qui maior affectus est, quam vertigo, sub eius tractatione & vertigo subintelligi poterat. Quod igitur iam dictæ affectiones non confundantur, nec eadem sint, ac quomodo discrepent, & vna ab alia discerni queat, ex superius dictis liquet. Sed quoniam vtraque bifariam oriri potest, tum primario affecto cerebro, tum per consensum ex ore ventriculi, Galeno auctore tertio de locis affectis, & Paulo cap. 12. lib. tertij: propterea si ex primaria cerebri affectione dependeat, vehemens capitis dolor, grauitasque præcedet, aurium sonitus: item olfactus læsio, & nonnullis etiam (vt Paulus testatur) gustus, atque alterius cuiusque sensus, qui a capite initium sumit, ex Archigenis testimonio. Si verò ori ventriculi cerebrum consensiat, stomachi morsum, quæ Græci cardiomon appellant, accersit: ac nauseam ægri præsentiant, eodem Paulo auctore, & Galeno, ex Archigenis auctoritate eodem tertio de locis affectis. At quoquomodo fiat, perpetuo ab inæqualem, turbulentum, & inordinatum motum flatuosi spiritus in cerebro iam dictæ affectiones cōsequuntur. ex quo animalis etiam spiritus in cerebro consistens eueritur, vt Aëtio visum est, vt propterea non valeat ordinatè, & vt decet, ad propria loco distribui. quod fit, vt ad morbum in via, hoc est, ad obstructionem ex prædicto flatuoso spiritu ortam, hæc symptomata insequantur, simul atque inæquale cerebri intemperiem. Verum cum non semper flatuosus is spiritus in capite localem habeat generationem ex inæquali cerebri intemperie, vt patet tertio de locis affect. sed interdum sursum ex infernis partibus furatur, Galeno teste quarto de ratione victus & commento aphorismi 31. libri tertij, ex iam dictis signis illud dignoscere poteris; ex grauitate videlicet capitis, ac eius dolore, aliorumque sensuum oblaesione, si in cerebro genitus sit. At si ex ventriculi præsertim ore, aut aliis partibus sursum feratur, eiusdem partis primò affectæ indicia præerunt. Gene-

cap. 8.

Loco citato.
Quomodo
tenebrosa
vertigo ab
epilepsia
discernatur.
Loco citato.

3 de loc. aff.
se loco citato.
Si primario
affectu
cerebro
fiant, signa.
Si per consensum
ex ore ventriculi.
3 de loc. aff.
sec. cap. 8.

Ad quem
cerebri morbum
sequatur.
Causa.

Locis citato.
in.

Flatus si
ritus gene
ratio.
Eodem loco.

Cur in in
dicationi
bus veri
gines fiant.

Prognosi
ca.

Citato lo
co.

Curatio.

Vitium ra
tio.

ratur autem flatuosus hic spiritus, non summè lan
guente natiua caliditate, prout Galenus asserit eo
dem quarto de ratione vict. cum si perfectè langue
ret, dissoluere non inciperet, & propterea cum co
natur calor ipse natiuus corporis humores tum dis
soluere, tum effundere, verum ipsos tenuare, & per
inuisibilia foramina excernere nō valeat, tunc spi
ritus flatuosus ortum habet: & in capite contentus
non ab re inæqualiter, & inordinate mouetur. qua
etiā ratione fit, vt sæpenumerò hæc symptomata in
iudicationibus fiant; conatur nanque eo tempore
natura humores euincere, dissoluere, & demum ex
cernere. hic autem flatuosus spiritus, si in cerebro
generationem habeat, ex frigido ac glutinoso hu
more vt plurimum ortum ducit, Paulo teste, & pro
pterea ex quauis leui occasione, calfacto capite, vt
puta si sub sole æstiuauerint, vertigo seu scotoma
excitatur. At si ori vetriculi, aut reliquis partibus ce
rebrum consentiat, ex vitiosis, calidis, & acerbis suc
cis in ipsis redundantibus, eiusdem qualitatis vapo
res, ad caput delati potissimum iam dictas affectio
nes efficiunt, vt Aëtio visum est. Facile etiam præ
dictis affectionibus corripiuntur, quibus consuetæ
excretiones sunt suppressæ: cruditates quoque, &
ardores alidui, & ebrietates eas efficiunt, eodem
Aëtio auctore: quæ omnia ex egrotantium, seu æ
stantium relatione percipi poterunt. Prædictæ au
tem affectiones paruificiendæ non sunt: nam ver
tigo proxima est morbo comitali, & apoplexiæ,
quemadmodum Galenus testatur commento apho
ris. 17. tertij lib. vtræque etiam affectiones medium
quodammodo obtinent, tum earum, quæ periculo
vacant, tum perniciosarum, eodem Galeno aucto
re quarto de Ratione victus in morbis acutis. non
ergo penitus periculo vacant. Prompte enim, vt
diximus de vertigine, ita & scotoma permutari pō
terit in affectus perniciosissimos, vt pote quod pro
ximi sunt eisdem, præsertim morbo comitali, & a
poplexiæ: & si ea, quæ oculis obuersantur, sangui
nolentiora se videre putent ægri, ad insaniam ma
gis apti sunt, Aëtio teste: in qua non imaginatio
duntaxat, sed & ratio læsa est, vt ipse testatur. qui
verò purpurea vident oculis obuersari, apti sunt
(eodem Aëtio auctore) ad morbum comitalem
transmutari. Vehementescit autem scotomatica
passio hyeme, vt Cælius Aurelianus inquit, vel ve
ris temporis initio, præsertim sæpe futuram denun
ciat epilepsiam. veteres denique (vt idem ait) par
uam epilepsiam vocauerunt. Quod autem ad ea
rum curationem spectat, aer eligendus erit tempe
ratus, purus, & lucidus: fugiant autem nebulosum,
& crassum, nocturnum. A ventis pariter caueant,
maximè australibus. Radios solis & lunæ vitent: ve
lut etiam aspectum rerum velociter motarum, vt
currentis fluminis, aut in circum, vt in rotæ, & tro
chi, ac profundarum rerum aspectum. Somnus sit
mediocris, non immediatè post cibum, sed saltem
per duas horas post: viteturque diurnus, ac in loco
multum calido factus: neque caput ipsum multum
calidum teneat. Ventris excrementa nitendum, vt
singulis diebus excernantur: in quo si natura auara
fuerit, clysteribus, vel glandibus ea excitanda erit.
Exercitio vtendum erit temperato; in quo quan
tum possibile erit caput quiescat: cuius vice frictio
nibus cerebro vtendum, manè præsertim, prius
quam surgant: quæ à supernis partibus cœptæ ad
infima desinant. Ab animi affectibus, seu perturba

tionibus cauendum, præsertim ira, timore, & me
stitia. Pariter & clamores, contentiones, & cantus
fugendi sunt: venus quoque omnino vitanda est.
Cibi eligendi sunt boni succi, concocti faciles, fla
tus exortes, stomacho, ac ventri commodi, sintque
modici. Propterea & satietas, non minus & fames
vitanda erit. Vinum bibendum, verum modicum
sit, album, & tenuissimum, & non valde vetus, ne
caput percutiat: qua ratione euaporantes cibi, qua
les sunt cepa, allium, porrum, atque id genus alij vi
tentur: & à cibo ea exhibeantur, quæ vim habeant a
stringendi, ne vapores sursum ad caput ferantur, &
præsertim si vitio stomachi fiant prædictæ affectio
nes. In ipsa vero accessione excitare ægros conue
nit tum odoratis medicamentis, tum frictionibus,
& id genus aliis, Paulo auctore: quo tempore, & glā
dibus, aut clysteriis vt præciperem. Possent autem
glandes confici ex hiera, agarico, sale gēma, & de
spumato melle. Clysteres verò ex furfuris, meru
rialis, maluarum, betæ, florum chamæmeli, & salis
decocto, in quo vnc. iij. olei amygd. dulcium, com
munis, aut anethini ij. mellis rosacei & drach. hieræ
picæ Galeni adicias, & vtare. Vbi verò cōquieue
rint, & vires robustæ fuerint, nihilque aduersetur,
vena secanda erit, siue principium affectionis fue
rit, siue tempus iam progressum fecerit (Aëtij præ
cepto, ac Pauli) humeralis videlicet, seu externa, aut
media, verum non acruatim sanguis euacuandus
erit, cum ex qualibet occasione ægri concidant, sed
pluribus detractionibus, ex quibusdam interuallis
vtentes, congruam explebimus mensuram. Hoc au
tem tempore caput irrigetur (ex Aëtij sententia) a
ceto, & rosaceo, admisto polygoni aut hædere fuc
co, pro causæ diuersitate. Si verò aliquid sanguinis
detractionem impediat, aliud subducenda erit, pri
mum acri clystere, postea purgante pharmaco, re
dundanti humori semper ipsum adaptando: quem
admodum idemmet Aëtius præcipit, præcedente
tamen eius concoctione, ac præparatione, bile si
quidem redundante ex oxysaccharo, & syrupo de
infusione rosarum, succo cichorii, & id genus aliis:
hocque demum purgare medicamento vtendum,
Corticum myrobalanorum cirinarum excipe dra
cij. fiat decoctum in aquis cordialibus; in quo dis
saluas manæ Calabriæ vnc. ij. & s. aut syrapi ex plu
ribus infusionib. rosarum rubearum vnc. 4. anti dori
diacatholicon drac. vij. & fiat potio: etsi malum non
cefferit, aliaque purgatione opus fuerit, catapotia
formetur rhabbarum cum pauca spica dra. j. & tro
chiscati agarici, aut pulueris hieræ simplicis scrup. ij.
cum infusione, vel succo rosarum: & post aliquod
interuallum, vel manæ Calabriæ vnc. ij. vel syrapi
ex pluribus infusionibus rosarum rubearum vnc. iij.
in aqua cichorii, vel borraginis dissolutas assumat.
At si crassus fuerit, qui redundat succus, pituita vi
delicet, aut forte nigra bilis, ab eorum coctione, &
præparatione, quæ ex his perficiatur, quæ præcepi
mus cap. de dolore capitis ex pituita, & cap. de me
lancholia, catapotia tribue ex arabicis pilulis, aut si
ne quibus, aureis, vel cochiis, agarico addito. Post
quæ, si pituita redundat, myrobalanorum chebu
larum decoctum, & syrupum ex pluribus infusioni
bus rosarum rubearum exhibe. Si nigra bilis, post
catapotia, exhibe senæ, epithymi ana drach. j. cori
cum myrobalanorum indarum drac. ij. in aqua fon
tana, vel lupulorum fiat decoctum, in quo sac
chari borraginati vnc. ij. dissolue: aut syrapi præ

purgati
que per
la sunt

per ar
marum
stomat

per con
sum fiat
ratio.

prædicti ex pluribus infusionib. rosarum rubearum drac. iij. Post quæ cucurbitulæ cum scarificatione ad occipitium affigendæ sunt: mox apophlegmatismis pituitam a capite per os detrahentibus superius iam dictis, vtendum. Naribusque infundatur aqua hordei cum corticibus, cū anagallidis succo, aut radicis betæ, vel cyclamini. Gargarismis quoque vtaris ex origani, & pulegij decocto cum aceto mulso, vt inquit Aëtius. Odor insuper suscipiatur per nares ex amaracij, sampsuchi, & hyssopi, ac storum stœchadis decocto, castoreo pauco addito, & mosco, ac aceto pauco. Ex pulegio item tuso, vel origano, aut sinapi cum aceto commisto procurare sternutamentum præcipit Theodorus Priscianus libro secundo ad Timotheum, ca. 3. præsertim scotomaticis. Deinceps æger ad balneum ducatur præsertim naturale aluminosum, etsi caput in balneo supramodum incaluerit, aut valde calidum caput habeant ægri, rosaceo caput ipsum cum aceto irrigandum erit, in syncope præsertim, & circa frontem, & tempora. Quod si adhuc affectio perseverauerit, neque prædictis cesserit, præsertim si ex vaporibus calidioribus per arterias sursum elatis prædictæ affectiones fiant, arteriæ ipse iuxta tempora sitæ supra aures incidendæ sunt, non modo Galeni 3. de locis affectis præcepto cap. 8. verum etiam Pauli, & Aëtij: quarum incisionis modum addices ex Paulo libro sexto cap. 4. Quamquam, vt Gale. asserit, non omnes huius auxilij beneficio curati fuerint: tum propterea quod per altiores arterias, quæ ad cerebrum ex ipsius basi per retiformem plexum ascendunt, vaporosus, calidusque spiritus interim elabatur, ac cerebrum implet, tum etiam quod spiritus itatiosus poterit ex inequali cerebri intemperie oriri: & proinde si prædictæ affectiones altero prædictorum modorum exciterent, nullam vtilitatem ex prædictarum arteriarum sectione ægri suscipient. Quare priusquam incendantur, summopere laborandum erit, vt exquisitè illud distinguatur. Inæqualis enim cerebri intemperies in contrarium alteranda erit, quemadmodum & consuetæ excretionis detentæ prouocandæ sunt, si earum retentio prædictarum affectionum causa sit, cruditates, ardores, ac ebrietates corrigendæ, si ex eisdem ortum duxerint. At si ex humoribus in ventriculo, præsertim eius ore contentis, vaporosus spiritus ad cerebrum delatus eas progignat, vomitu curari poterunt ex anethi, & raphani decocto, in quo acetosus syrupus, aut oxymel permisceatur: tepidumque potissimum a cibo assumatur. Quod si non suffecerit, conducet etiam eos purgare ex picra Galeni, aut stomachicis pilulis, myrobalanorum citrinorum, aut chebularum decocto, & manna Calabriae, seu syrupo ex pluribus infus. rosarum rubearum, pro ratione diuersitatis vitiosi succi redundantis. Similiter in aliis corporis partibus redundantes succi inspiciendo, ex eisdem quoque redundantes succi purgandi erunt, caput ipsum non despicendo, imo ipsum semper roborare oportet, cum dictæ affectiones ad cerebrum pertineant, licet per alterius partis consensum ipsum afficiatur, vt patet tertio de locis affect. & propterea vertigines citò emendabis, vt inquit Marcellus in suo de medic. lib. cap. 3. si betæ nigrae succo tempora perlinas: insuper efficacissimum remedium esse ab abolenda eam, si abrotanū tritum in vini potionem tepidum bibatur: vel cum oxymelle non acri accipiatur. Et hæc

simul de vertiginis, & tenebricosæ vertiginis curatione dicta sufficiant, cum non nisi ad inuicem ratione maioris, & minoris differant, vt iam diximus.

Περί επιληψίας. De Epilepsia, seu morbo Comitiali.

CAP. XVIII.



VM proxima fit (Galenus auctoritate) vertigo ei affectioni, quam Græci επιληψίαν dicunt, non ab re de ea hic tractandum duxi. Cōsueuerunt quoque eundem affectum (vt ex Tralliano verbis liquet) non modo επιληψίαν, hoc est, supra comprehensionem nuncupare, nam supernæ partes in eo comprehenduntur, sensusque detinentur, verum etiā quidam hūc eundē affectum, ἐπὶ τὸν νόον, hoc est, sacrum morbum: sacrum etenim, & honoratum est cerebrum, quod in eo afficitur: alij verò, eo quod validius, & contumax ad amouendum, sit, ἡράκλειον νόσημα, hoc est, herculeum morbum appellarunt; quemadmodum Galenus libro sexto de morbis vulgaribus testatur. Hippocrates autem puerilem morbum appellare consuevit, vt libro de aëre, regionibus, & aquis, Galeno testante, patet. Quidam etiam falsa opinione decepti sacrum morbum nominauerunt. Celsus verò cap. 23. tertij lib. maiorem morbum, seu comitalem ipsum nominat, eo quod laboranter in comitiis manifestabantur, interrumpiebanturque ea, quo die aliquis concidisset: alij etiam aliter nominauerunt, vt idē Trallianus testatur. Sed quoniam parum nostrō conueniunt instituto, propterea cuncta ea scribere oportet: satis etenim erit quoquomodo nominetur, quod eius essentia, seu substantia non te fugiat. nāque testatur Galenus tertio de locis affectis, cōuulsio est omniū corporis partiū, non perpetua, sed quæ ex temporum accidit interuallis, cum mentis, ac sensu oblacione: quā sententiam sectatus est Paulus cap. 13. libri tertij, cum dixit, quod epilepsia totius corporis conuulsio existit cum principum operationem lacione. Differt igitur ab emprosthotono, opilthorono, atque tetano, quæ differentiæ sunt veræ cōuulsionis, quoniā in iā dictis perpetua, in morbo comitiali ex temporum interuallis conuulsio accidit. Insuper quia in vera conuulsione nullum sit principibus functionibus nocumentum, in morbo autem comitiali nō modo functiones principes, verum & sensibiles operationes suscipiant detrimentum, quemadmodum scriptum reliquit Galenus eodem libro de locis affectis, & libro de differentiis symptomatum. Carterum quod cerebrum in hac affectione lædatur, liquido constat ex Galeno libro primo de causis symptomatum, & tertio de locis affectis, quo loco dicebat, Ex his igitur omnibus planè constat in cerebro hanc affectionem consistere. Insuper ex Aëtio, qui in omnibus comitialibus morbis cerebrum affectum esse inquit: & Trallianus capitis vitium esse asserit: nec minus & ex Pauli verbis hoc idem confirmatur. Quod si prædictorum auctoritates non suffecerint, ex propriis cerebri functionibus læsis, cum principibus, tum motricibus, & sensibilibus, vt patet ex iam dicta eius definitione, illud patere poterit (& si plures sint eius differentiæ, vt dicemus.) Namque in omnibus commune est, quod cerebrum afficiatur, eodem Galeno auctore tertio de locis affect. & Aëtio, qui in hoc ipsum sectatur. Verū nūquid cerebrū

Trall. lib. 1. cap. 15

6. de morbis vulgaribus commentario 6. comment. ult.

cap. 7. Morbus comitialis

quid sit.

Quibus a cōuulsione, & distinctione differat.

Que pars in eo afficiatur.

3. de loc. aff. cap. 7.

De differ. in sympt. cap. 3.

1. de causis symp. cap. 8.

3. de lo. aff. cap. 7.

Aëtius lib. 6. ca. 13.

cap. 7.

3. de loc. aff. cap. 7.

ipsum, ut similis pars, an ut instrumentalis noxam suscipiat, nondum liquet. quamvis si quis Hippocratis verba sexto de morbis vulgaribus rite contemplerit, dum dixit, Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur, & contra, morbo comitiali laborantes, efficiuntur melancholici; percipiet utique, ut instrumentalem partem hoc est, secundum ventres, & non tanquam similem affectum esse. & si nec Galenus illud indeterminatum reliquerit: nam tertio de locis affectis dicebat. Igitur ut crassius pituita succus, ita hic quoque, de melancholico verba faciens, comitalem morbum soler efficere, ubi in meatibus ventriculorum cerebri continetur, siue is medius sit, siue postremus: & secundo de causis symptomatum, sub his verbis idem confirmavit, dum dixit, Quemadmodum & apoplexia, & morbus comitialis ob pituita in ventriculis ipsius cerebri acervata multitudinem accidere videntur: & illud ratione comprobans subdebat, Proinde horum symptomatum tum generatio, tum solutio subitanea est, id quod per corporum intemperiem fieri haudquaquam potest: & eodem tertio de locis affectis hoc idem approbans, hæc verba conscripsit. Cæterum velox eius discussio; crassum humorem spiritus meatum in cerebri ventriculis obstruentem, hunc maxime affectum peperisse declarat: & paulò infra subdebat, Sed à crasso semper humore hanc affectionem induci argumento est, quod & subito fit, & soluitur confectum: nam subitaneam meatuum obstructionem à crasso, viscosoque humore fieri constat. Afficitur igitur cerebrum, non ut similis pars, sed ut instrumentaria, quoniam secundum eius ventres in morbo comitiali, ut liquidò ex iam dictis patere potest: quamvis & corpus eius parum quodammodo coafficiatur, ut quarto de locis affectis liquet. Si quis autem altius inuestigare velit num anteriores cerebri ventriculi, medius, seu postremus in comitiali morbo afficiatur, pro comperto in Galeni doctrina habebit, non anteriores, ut Medicorum vulgus refert, sed medium, aut postremum affici. Ait namque Galenus tertio de locis affectis, cap. 7. crassum pituita succum, aut melancholicum comitalem morbum efficere, ubi in ventriculorum meatibus retineantur, siue is medius sit, siue postremus. igitur aut medius, aut postremus ventriculus, & non anteriores ex eius sententia afficiuntur. Ad hæc si impediens crasso humore animale spiritum, qui in ventriculis cerebri continetur, quominus possit exire, iam dicta affectio oriatur, eodem Galeno auctore: isque animalis spiritus proprium ipsius animæ instrumentum sit, tum in sensibilibus actionibus, tum in his, quæ à consilio & voluntate prodeunt, perficiendis: qui videlicet in ipsius cerebri ventriculis medio, maximeque postremo, continetur, quis inquam inficias ibit eorum aliquem in comitiali morbo affectum esse, & non anteriores? præparant namque, ac conficiunt ipsi cerebro animale spiritum, & non confectum, ac præparatum continent, veluti postremus, & medius, duo anteriores ventriculi, ut patet octavo de usu partium: & quamvis simul veluti ductus quidam sint, ac canales ad superfluum effluxionem accommodi ad infernas perforationes in nares, alioquin animal, eodem Galeno teste præcitato libro octavo de usu partium, apoplexiis frequenter præhenderetur, nisi viam quandam horum excrementorum, quæ sæpe excipiunt, effluxui accommodata natura

præparasset: & propterea foras per narium meatum eadem excerneret, non propterea dicendum erit, quod oblatas eiusdem cerebri anterioribus ventriculis, comitialis morbus fieri possit. Cum neque apoplexia ex affectione ipsorum duntaxat generari possit, nisi & medio, ac postremo ventriculo communicaretur affectio. opus namque est in utrisque affectibus, ut tum anterior cerebri pars, quam posterior afficiatur, ut patet 4. de locis affectis cap. 2. propterea detentis præter naturam excrementis in anterioribus cerebri cavitatibus, nisi impartiantur medio, aut postremo, seu medio, & postremo ventriculis, nec epilepsia, nec apoplexia, iuxta Galeni sententiam, generari poterit. Num verò iam dictus affectus morbus sit in Galeni doctrina, vel symptoma, haud difficulter ex eiusdem verbis percipi poterit. Nam quod morbus similis non sit, patet tum secundo de Causis symptomatum, cap. ult. tum tertio de locis affectis, cap. septimo, cum asseruit, non ut partem similem, sed ut instrumentariam, cerebrum in hac affectione ladi. Propterea non mutando cerebri temperamentum causa aliqua comitalem morbum generat: sed ubi ei nocet, veluti parti instrumentaria: neque enim adeò esset subitanea eius tam generatio, quam solutio. At quod nec morbus sit in compositione, ut quidam falsò sentiunt, & si cerebrum tanquam instrumentum lædatur, ex eodem Galeno liquet præallegatis locis: dicebat namque tertio de locis affectis, cap. 7. quod velox discussio huius affectionis, crassum humorem spiritus meatum in cerebri ventriculis obstruentem hunc maxime affectum peperisse declarat, & paulò infra subdebat, quod impediens humore animale spiritum, qui in ventriculis cerebri continetur, quo minus valeat exire, eadem exoriebatur affectio, & secundo de Causis symptomatum, cap. vlti. morbum comitalem ob pituita in ventriculis cerebri acervata multitudinem accidere. Sequitur ergo, ut ex prædictis constet Galeni verbis, comitialis morbus ad ventriculorum cerebri obstructionem, quæ est morbus in via, & non est ipsa obstructio prædictarum cavitatum morbus comitialis, velut quidam, licet falsò, asserere ausi sunt, nec insuper in alio genere morborum in compositione connumerari poterit, aut in continuitatis solutione: cum nec illud imaginari queat aliquis, & Galen. ubique locorum fateatur, affectum hunc præsertim per essentiam genitum perpetuò ad obstructionem consequi. Erit igitur connumerandus in symptomatum aliquo genere: quamvis à Celso tanquam vetustissimo auctore, ut qui nullam fecerit inter symptoma, & morbum differentiam, morbus comitialis appelletur. In prædictorum enim symptomatum numero à Galeno libro de Differentiis symptomatum cap. tertio connumeratur: nam cum depravati motus symptomatum meminisset, sic ad verbum ait, Si verò non solum totum corpus conuelliatur, sed principum quoque functionum prohibitio fiat, symptomatale epilepsia nuncupatur. In genere ergo novæ functionum symptoma existit, non tamen naturalium, sed animalium: quæ cum in triplici sint differentia, in cunctis per morbum comitalem novæ existit. Namque cum de genere sit conuulsi omnis, eodem Galeno teste tertio de Locis affectis, cap. 7. erit & in eo affectu motrix facultas depravata. Insuper cum is, qui sic laborat, neque audiat

Namquid
cerebri
similis
aut ut in-
strumenta-
lis pars affi-
ciatur.
Secti. in fi-
ne.
Loco cita-
to.

cap. ult.

cap. 7.

cap. 2.
In quibus
cerebri ven-
triculis
hæc læsio
fit.

cap. 10.

cap. 6.

Quæ-
ritur

signa, quæ
eum præ-
cedunt.

Idem
adventi-
tius

Cur oris
fistula
in si signi-
ficat com-
italem

is cani-
bus mor-
bus differ-
ent-

neque vilo sensu quippiam percipiat, ut idem Galenus eodem loco testatur, erunt quoque in eo affectu sensibiles omnes functiones ablatae. Adhuc cum ratio simul cum memoria oblata sit, cohibitaque sint principes functiones omnes, ut idem Galenus libro de Differentiis symptomatum, cap. 3. & tertio de locis affectis, cap. 7. scriptum reliquit, iure fatendum erit in hoc symptomate cunctas animales functiones oblatas esse; verum motricem facultatem deprauat: principes autem, & sensibiles ablatae. Praecedat hoc vitiū (Paulo auctore) corporis, animique status minimè arbitrarius, tristitia, & eorum quae perceperunt obliuio. Turbulentae infirmorum imagines. Capitis dolor, eiusque repletio continua, iracundiam maximè, pallor faciei, & inordinatus linguae motus. Nonnulli vero ipsam quoque mordent. Quamprimum autem malum hoc inuaserit, ut idem Paulus testatur, aegri concidunt, conuellunturque, stertunt, ac interdum impotens quaedam vox eis suboritur, minimè aliquid significans. Verum peculiaris admodum eiusdem vitij nota est oris spuma, cum alia communiter aliis quoque morbis euenire possint. Non desunt etiam quibus vrina, & stercus praeter voluntatem excernatur, nonnullis & genitura. Celsus autem dixit eiusdem mali indicia esse, quod homo subito concidit, ex ore spumae mouentur: deinde interposito tempore ad se redit: & per se ipsum confurgit. At non ab re admodum peculiare indicium est huius affectionis oris spuma. Nam cum eiusdem generatio ex duarum substantiarum mixtione conficiatur, tantum ex materia, altera spiritusosa videlicet, & altera humida, Galeno teste commento aphor. 43. libri secundi, & 30. septimi lib. earum autem mixtio ambabus in multa perfractis, & multis mutuo complexu paruis ampullis ab ipsis effectis, fit, quem contractum, ac mixtionem nonnunquam violentus motus, & inaequalis, vel vtriusque, vel alterius duntaxat substantiae, nonnunquam verò fortis calor operatur: interim autem & ambae concurrunt non ab re in ipsis comitialibus morbis, non ex immodico inquam calore, sed propter motus vehementiam, ac inaequalitatem, & violentiam, quae propter conuulsionem in eis fiunt, spuma generari confuevit: quemadmodum idem Gal. com. eiusdem aphor. 43. testatur; potissimum cum in eisdem corporibus iam dictae duae substantiae reperiantur, spiritusosa scilicet, & humida. id quod nec in vertigine (cum non adeò violentus fiat motus) euenire consuevit, neque in apoplexia, cum non modo vehementis motus, imo neque vllus in ipsa appareat. Hippocrates verò libro de morbo sacro reddens causam huius dixit, Spuma verò ex ore prodit epilepticis ex pulmone: cui enim spiritus non ingreditur in ipsum, spume scit, & ebullit, velut moriens. at lib. de flatibus alia tradidit causam. Relinquitur propterea, ut ipsius comitialis morbi sit peculiaris nota oris spuma. Verum quoniam non vno tantummodo is generatio nem habet, capite videlicet primario laborante, sed duobus adhuc aliis modis oriri potest, ita ut tres sint eius differentiae: quanquam omnibus communis sit, quod cerebrum afficiatur: quarum vna est, consistente in ipso cerebro affectu primo, & per se, id quod pluribus epilepticis euenire confuevit. Altera est cum cerebrum ipsum ventriculo, & praesertim ori eius consentit. Tertia verò morbi comitialis species, seu differentia, quanquam ea raro fiat,

cum videlicet à parte aliqua inceperit affectus, qui deinde aegro etiam sentiente, ad cerebrum vsque ascendat, velut Gale. tertio de locis affectis scriptum reliquit: quem Paulus, Trallianus, & Aëtius sectati sunt. Hinc de re quibus indiciis quaelibet earum dignoscenda sit, ac ab aliis discernenda, operae pretium erit declarare. Qui primario capitis affectu comitiali morbo laborant, hoc modo argui poterunt, namque ut testatur Trallianus, capite grauantur, oculi obscurantur, & caligant, tardèque sentiant: vehemens quoque in his conuulsio apparebit, ut patet tertio de locis affectis. At quibus à stomacho vitium hoc oritur, palpitatio ipsius percipitur, & turbatio quaedam, & erosio. Item morbi accessionem tum potius aegri sentiunt, iritanturque cum tardè ipsos cibum sumere, aut nullum contingit, Tralliano & Paulo testibus: quemadmodum Galeno auctore quinto de locis affectis, cuidam grammatico iuueni eueniebat; qui quoties vel nimis vehementer doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irascere, morbo comitiali corripiebatur, ortum ducente ex ipso ore ventriculi primario affecto, utpote quod facile sentiret, & deinde per consensum cerebro oblato. At si ob aliam quampiam particulam morbo comitiali laborant, distributionem mali ex eadem parte primario affecta ad superiora, hoc est, ad cerebrum fieri manifestò percipiunt, praedicuntque id quod futurum ipsis est, cum distributio vitij ad cerebrum vergere incipit, siue qualitas quaedam sit, quae alteratis per continuationem partibus à parte affecta ad cerebrum ascendat, aut spiritalis quaedam substantia transmittatur. His etiam accedit, ut sine vehementi conuulsione concidant, sed veluti saliendo per intervalla concuti videntur: quanquam & id commune etiam sit his, qui à stomacho comitiali afficiuntur. Hanc differentiam comitalis morbi à crure initium habentis primum Galen. vidit, cum adolefcent adhuc esset, in puero, qui tertium decimum aetatis annum agebat, narrante puero ipso dispositionem ipsam à crure initium capere, mox illinc recta ascendere per femur, lumbos, ac per latera ad cervicem, donec ad caput perveniret. quod cum primum tangeret ipsum haudquaquam sibi constare dicebat. Verum quale esset id, quod ferebatur ad caput interrogatus puer, nihil habuit, quod responderet. Alius tamen adolefcentis mentis compos, qui satis poterat, & sentire quod fiebat, & alteri enarrare, dicebat veluti frigidam quandam auram esse, id quod ascendebat, ut patet tertio de locis affectis. Tale etiam quiddam contingit in his, qui à scorpio, aut aliqua alia venenum eiuculante bestia icti sunt. Ceterum cum symptoma sit comitalis morbus, ad morbumque in cavitatem, seu in via consequatur, eius causa inuestiganda erit: quae à Galen. quoniam subito fit, ac soluitur confestim haec affectio, quod nulla alia esse poterit quam crassus, lentusque humor tertio de locis affectis adstruitur. Nam subitaneam meatuum obstructionem (ut ipse refert) à crasso, viscidoque humore fieri constat. Atqui cum crassi humores in duplici prima differentia reperiantur, pituitosi videlicet, & melancholici, non ab re ab eodem decretum est, quod velut crassus pituitae succus, ita & is qui atrae bilis naturam habet, comitalem morbum solet efficere: id quod confirmavit Paulus, dum dixit, morbi comitalis modò humorem pituitosum, modò melancholicum causam esse. Tenuis namque humor, cali-

3. de loc. aff. citato loco. Quibus indiciis quaelibet earum dignoscatur, ac ab aliis discernatur.

3. de loc. aff. cap. 7.

Galen. historia 5. de loc. aff. c. 6.

Altera Galen. historia.

cap. 7.

Ad quem morbum sequatur haec affectio.

Qua sit eius causa. Loco citato.

duisque existens haud ita subito obstructionem genere valet, sed longo forsitan tempore auctus obstruere posset, non tamen morbum comitalem progignere, qui subito fit, confestimque soluitur. Igitur succi sunt, qui cerebri meatus obstruentes, impediuntque animalem spiritum, qui in eisdem cerebri ventriculis continetur, quominus possit exire, morbi comitalis auctores sunt. Verum nunquid vnus, vel alter in causa sit, ne sermo proteatur, percipere poteris ex his, quae diximus, indicis succi melancholici cap. de melancholia, & pituitae cap. de dolore capitis orti ex pituita. Haec de causis morbi comitalis primario affecto cerebro. At si per consensum fiat, sicut diuersus est generationis modus, ita diuersae eius causae esse poterunt, quae ubi ad cerebrum ascenderint, ipsum affligentes morbi comitalis auctores fiunt. Sed mox non iniuria quaeretur aliquis, nunquid conuulsio comitalis dici possit de repletionem, an de inanitione? cum ab Hippocrate decretum sit aphorif. 39. sexti libri, eam vel ab vna, vel ab altera causa gigni posse: eadem sententia quoque confirmata est Galeno tertio de locis affectis: cui responsum volo ex Galeni verbis, commento aphorif. 70. quinti libri, eam esse ex repletionem: dicebat namque conuulsionem ex euacuatione factam acutissimam esse, ac perniciosissimam, eam vero, quae ex repletionem nervosarum partium fit, qualis in morbo comitali, neque acutissimam, neque similiter periculosa esse. Conuulsionem igitur Galenus in his verbis in morbo comitali factam connumerat inter eas, quae ex repletionem nervosarum partium fiunt. Verum adhuc inficias ibit, hoc veritatem forte habere posse in morbo comitali per essentiam orto, at in eo, qui per consensum euenit, siue à ventriculi ore, siue ab aliis quibusdam partibus, haudquaquam veritatem habebit: cum nulla repletio partium nervosarum in praedictis percipitur, neque cerebri cavitates obstruantur, cum in eis humor crassus, ac viscidus non comprehendatur, veluti in morbo comitali per essentiam genito, primario ipso cerebro affecto. Atqui dicemus nos perpetuo in quouis comitali morbo conuulsionem fieri, nervorum principio seipsum quatiente, quod excutiat id quod noxium est, ut tertio de locis affectis liquet, quocumque modo ipse excitetur, verum si primario affecto cerebro exoritur conuulsio, haud absimilis est eis, quae à spinali medulla principium habent, conuulsionibus, irrigata explantatione ex eo humore, qui in cerebro comitalibus comprehenditur, vniuscuiusque nervi: quem admodum idemmet Galenus testatur eodem tertio de locis affectis, & sexto de morbis vulgaribus illud idem confirmavit, cum dixit, Causa autem morbi comitalis (intelligens de eo, qui per essentiam ortus est) crassus & frigidus est succus congregatus quidem in ventriculis cerebri, comprehendens autem & explantationes scilicet nervorum, & maxime primum principium spinalis medullae. Quae de re nemo vereri debet, conuulsionem hanc in numero earum esse, quae ex plenitudine sunt: repleti sunt namque in ea cerebri ventriculi, irrigati, seu humectati nervorum exortus, ac spinalis medullae principium: de qua etiam conuulsione eius verba intelligi debent commento aphorif. 70. quinti libri. Verum de ea conuulsione, quae in morbis comitalibus per consensum affecto cerebro contingit, non absque ratione haesitandum erit, num de repletionem

Num morbi comitalis conuulsio sit de repletionem, vel inanitionem.

3. de loc. aff. cap. 6. Responsio.

cap. 7.

3. de loc. aff. cap. 7.

6. de morbis vulgaribus comitatio 6. com. ult.

Quid sentendum sit de conuulsione morbi comitalis

ne, aut de inanitionem dici debeat: namque in his quoque veluti saliendo per intervalla concuti agri videntur. At quod nervorum principium, cerebrum videlicet, huiusmodi motu concutitur, ut à se expellat quicquid fuerit, quod à parte primo affecta ad ipsum affertur, nemo vereri debet, & Galenus tertio de Locis affectis, decretum reliquit. propter hoc ergo epileptica in his fiunt conuulsionem. Sed si veritatem fateri velimus, ea neque de repletionem, neque de inanitionem dici poterit. Et si dixeris quilibet conuulsionem, aut ex plenitudine, vel euacuationem fieri, iuxta praallegatam Hippocratis sententiam; respondebimus nos illud veritatem habere in his, quae per essentiam fiunt, conuulsionibus, & non in his, quae per consensum, ex Galeni doctrina commento aphorifini primi quinti libri. Namque in his similis aliquis motus cerebro euenit, qualis stomacho interdum à re quapiam molesto accidere solet: quippe cum à ciborum mole grauatur, aut ubi corruptis cibis morsu infestatur: tunc namque singultu affici conspiciuntur. sic etiam & cerebrum idem pati existimandum erit, cum aliquod à parte primo affecta ad ipsum affertur: quae licet mole minima, facultate tamen quammaxima est. Sed mox in dubium venit num morbus comitalis hoc modo per consensum genitus, velut & is, qui primario affecto cerebro fit, ad morbum in via, seu in cavitatem sequatur? Cui responsum volo, eum quoque ad morbum in via, seu in cavitatem insequi: nam licet humor crassus in cerebri ventriculis spiritus meatum obstruens non comprehendatur veluti in morbo comitali per essentiam genito, constringuntur tamen in hac affectione spiritus meatus, ac cerebri ventriculi, cum primum cerebrum ipsum concutitur, ut à se expellat quodcumque fuerit id, quod contristat. atqui cavitates partium non modo laeduntur, aut pereunt, eis obstructis, constipatis, coalescentibus, aut in sese residentibus: verum etiam constringuntur, iuxta Galeni decreta lib. de Causis morborum, cap. septimo. Ad morbum igitur in via semper comitalis morbus consequitur, impedito animali spiritu, qui in cerebri ventriculis continetur, quominus exire possit. Neque ab ariditate, seu vacuatione ortum ducere potest, quemadmodum Galenus scriptum reliquit eodem tertio de Locis affectis. id quod probavit ex eo, quod subito fit, & confestim soluitur: etenim brevi tempore fieri non posset, ut vel cerebrum, vel tenuior ipsius membrana ad tantam perveniret ariditatem, ut corio simile quippiam pati videretur. Accedit ad haec, quod in his, qui sic laborant, sensus, & functiones principes confestim detinentur. Occupat autem hoc vitij genus maxime pueros, eosque adhuc paruulos, deinde adolescentes, & iuvenes, minime vero senes, & decrepitos (Paulo teste) cuius sententiae subscribit Caelius Aurelianus libro primo cap. quarto, & propterea (ni fallor) Hippocrates τὰς τῶν νέων νόσους, hoc est, puerilem morbum consuevit appellare. habetur hic affectus vnus ex longis affectibus, ut fatetur Trallianus: qui excellentem diligentiam, studiumque requirit: etsi per initia neglectus fuerit, frequenter ij, qui eo detinentur, commoriuntur: id quod Paulus confirmavit, dum asseruit quod plerisque hic affectus longus esse solet, nisi crebris, & vehementissimis accessioneibus, vel acutissimis affectibus statim iungulet. Nam si non pubertate, vel menstruum initio, aut puerperio solutus fuerit, vel si post hoc tempus

6. de morbis vulgaribus comitatio 1. Text. 4. Comment. 7. in fine.

Quid sentendum sit de morbo comitali

Coratio.

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

in via

tempus remāserit, sēpē vsque ad mortis diem pro-
rogatur, nisi congruam medici curationem fuerit
affecutus. Celsus quoque testatur hunc morbum
comitialem sēpius viros, quā fēminas occupare,
ac solet quidam etiam longus esse vsque ad mortis
diem, & vitā non periculosus: interdum tamen
cū recens est, hominem consumit; & sēpē eum,
si remedia non sustulerūt, in pueris, veneris, in puel-
lis, menstruorum initium tollit. Magnā siquidem
fiunt corporis mutationes in pubertate, in fēminis
maximē, propter menstruorum eruptionem. Qua-
re si qui morbi ne hac quidem aetate finiūt, vsque
ad longum tempus perdurare consueuerunt, Gale-
no teste commento Aphorismi vigesimo octauo ter-
tij libri, quanquam & ipsemet commento Apho-
rismi septimi libri quinti scriptum reliquerit, cer-
tum esse, quod neque omnibus sanabitur morbus
comitialis ex pubere aetate, nisi & alia rectē gesse-
runt: neque quibus in hac accidit, omnino perman-
et, si bonam victus rationem adhibeant. Quapro-
pter non ab re Hippocrates aphorif. 45. secundi li-
bri dicebat, quod quicunque pueri morbo comi-
tiali laborant, mutatione maximē aetatis, temporū,
& locorum, & victuum quoque liberantur, & A-
phorismo septimo quinti libri. Quibuscunque, ait,
morbi comitiales fiunt ante pubertatem, mutatio-
nem accipiunt: quibuscunque autem vigesimo quin-
to, sēpē commoriuntur, & sexto de morbis vulga-
ribus ait, Infantium effulgescentiā cum pubertate
nonnunquam mutationes habent, &c. Et insuper
quod magna ex parte epileptici fiunt melanco-
lici, & melancholici epileptici, eodē sexto de Mor-
bis vulgaribus scriptum reliquit. Aetius verō testa-
tur, quod licet difficilem curationem habeat mor-
bus comitalis recens natis paruulis ortus, non ta-
men ea desperata est. Irruit autem in omni tempo-
re corporibus (vt refert Celsus Aurelianus) sed ma-
gis verno: quo etiam tempore periculosior est, Hip-
pocrate auctore libro de Sacro morbo. Insuper eo-
dem loco scriptum reliquit, sacrum morbum inae-
teratum esse incurabilem: cur verō huic morbo ob-
noxij aliquando liberentur, maximē accedēte hye-
me, libro de flatibus apud eundem Hippocratem
legitur. Quod autem hoc vitio affectis extenuans
victus ratio conferat, cunctis artis medicae auctori-
bus liquet, potissimum Galeno, qui libro de Atte-
nuante victus ratione cap. primo scriptum reliquit,
epilepsias paraas quidem, & etiamnum incipientes
eā penitus sanare: inueteratas verō, ac cōsummatas
iuuare nō mediocriter. Vtilis est ergo victus ratio,
quā incidat, atque extenuet: quemadmodum &
Paulo etiam visum est. Quapropter aer ad calidum,
& siccum declinans eligendus erit, praesertim si ex
pituitoso succo morbus comitalis ortum ducat.
Si verō ex melancholico succo, ad calidum incli-
nans eligatur, temperatus tamen in pascuis. Som-
nus quoque sit eis moderatus, & nocturnus: diu-
rum autem omnino vident. Exercitia, & frictions
profunt etiam capiti, post reliquas omnes corporis
partes adhibitz, Paulo teste. Alius quod lenis sit, &
non ascripta eis procurandum erit, vt ventris excre-
menta deiciantur, & non detineantur, quod si non
sponte ea deiecerint, glandibus, aut clysteribus in-
eorum excretionem natura proritanda erit. Deui-
tandus quoque erit liberalis coitus (quamquam mo-
deratus profit) Ab animi perturbationibus cauere
debent immodicis: similiter & solitudines, nego-

tia omnia, loci praecipitis conspectum, omniumque
torrentium fugere oportet, Celsus auctore: cibis
cōueniens sumi debet, mediae materiae: & propter
ea eis non conueniunt neque sorbitiones, alique
molles, & faciles cibi, neque caro, minimēque suil-
la, vt Celsus visum est: quam sententiam imitatus
Alexander dicebat, At carnes vitari debent, donec
in totum morbus fuerit discussus, & praesertim suil-
la. Similiter etiam legumina, praecipue lenticula.
Cum quo etiam conuenit Paulus, sed panis tribus
dus est optime fermentatus. Ex volatilibus verō in-
terim carnes gustare poterunt, gallinarum videli-
cet, phasianorum, auum montanarum, turdorum,
& tarturum, ac passerulorum, licet ex his minus
pingues eligi debeant, Alexandro teste, quā deco-
qui debent cum extenuantium medicamentorum
aliquo, vt hyssopo, pulegio, serpillio, samfuchio, a-
netho, & aliis huiusmodi: capparorum frequenter
eius mirifice prodest, Paulo teste. Ex oleribus, in-
tybum, caucalidem, gingidium, & decocta porra e-
dant. A cepis, dauco, smyrnio abstinendum; cū &
caput replant, comitialesque offendant, Alexan-
dro auctore. Non alienum quoque erit inter pisces
erinaeum fumere per interualla: & alios quosdam,
qui superfluitate vacent, vt merulam scorpium, aut
scaram. Fructus verō cauere admodum salubre est:
quanquam voluptatis gratia modici, & magis a ci-
bo offerendi sunt. Noces, & palmulae vitandae sunt:
ar pistacia, & uvas passas super cibum fumere pos-
sunt, praesertim quā leuem alstringendi vim habet.
Coriandrum item si comedant, prohibet humores
ascendere in caput, quod maximum adiutorium est,
Plinio secundo auctore, libro quinto cap. 7. praeser-
tim si praeparatum sit eius semen. Vinum circunci-
dendum est, praecipue vetustum, ac meracum, & co-
pioius sumptum, vt pote quod caput repleat: verum
stomachi gratia, vt coctioni auxilietur (quoniam
cruditates cauendae sunt) non ab re erit, mediocri-
ter ipsum assumere. Sit autem album, & astringens,
optime dilutum, vel aqua mulla, seu aqua in qua
cinnamomum, & coriandrorum praeparatorum se-
mina fuerint decocta, pro potu vtantur. At si infans
sit aeger, vel etiam lac assumit nihil molendum est,
neque agendum quantum ad curationem attinet,
Alexandri, & Pauli auctoritate. Nam aetate ad cali-
diorem, sicciorēque statum vergente, ac victu
moderatiore, sua sponte plerumque morbus finitur,
vt Hippocratis auctoritatibus, aphorismo 45. se-
cundi libri, & septimo quinti libri liquet. Discutitur
nanque in eis humiditas cerebri ventriculos reple-
hac ratione, ad eō vt folius victus infantium, & eo-
rum, qui lacte nutriuntur, ratio sit habenda. Quo
fit, vt iuuare nos, curamque habere oporteat, vt nu-
trix lac benignum sit, & recrementis liberum, vt
Trallianus refert, si infans lactes sit. Fiet autem hoc,
si eadem victus ratione vtatur nutritrix, quam supra
probauimus: hoc tamen seruato, quod non valde
extenuantibus vtendum sit, ne plus vasa vteri ape-
rientibus, plurimumque sanguinem menstruum
proritantibus, lac imminuatur. Propterea scenicu-
lo, anetho, & aniso, ac aliis viridibus vtantur, & nō
aridis, quā magis sint acria. Verum praeter victus
rationem nutritricis institutam, Posidonij auctori-
tate Aetius quādam adhibenda auxilia conscripsit
infantibus ipsis, inter quā puluis quidam capiti cō-
spargendus ex cypero, adianto, & iride est. Insuper
& illinitioem assiduam ex oleo anethino, iripo, ac

*Victus ra-
tio pueris
seruanda.*

*Medicamē-
torū ratio.*

amaricino cūlids laudauit: præcepitque eisdē mel despumatum ad delingendum dandum esse, & collo alligandam pæoniæ radicem recentem, quæ semper stomachum contingat: cuius medicamenti auctor fuit Galenus sexto de simpl. medicamentorū facultatibus, cap. de pæonia. Sed quoniam non his dūtaxat infantulis, & lactentibus, sed ab lactatis, præter victus rationem vtiliter vtendi venia datur medicamentis: quemadmodum non semel dūtaxat, imò sepius experientia comprobauimus: propterea & eas, quibus vti consueui recensere non grauabor. Namque & glandibus paruis ex muris stercore, agarico, sale gemmæ, & puluere hieræ simplicis, ac despumato melle vti poteris: nec minus & clysteriis ex gallinarum, seu pullorum iure, pauco sale, olei communis, seu amygdalarum dulcium vnc. ij. mellis rosacei vnc. j. trochiscati agarici scrup. ij. aut hieræ picæ simplicis drac. iij. vel ambo simul cōpositis vtaris: præsertim si bien nium transderit infans: lingen dum quoque præbeto sepius parum antidoti pliris archoricon, diambra, seu diamoschu dulcis scrup. j. & syrupi de infusione rosarum, seu mellis rosacei vnc. j. vel j. & s. simul mixtis. Interim & antidoti mithridati tantundem accipias, præsertim si triennium, aut quadriennium excesserit, cum eodē melle rosaceo, aut syrupo de infusione rosarum: necnon & puluerem capiti inspergendum describam, qui recipit hyssopi, & sampluchi sicci gra. iij. corticum thuris, mastiches ana gra. iij. spicæ, storum stœchadis, macis, singulorum gr. ij. caryophyllorum, nucis moscatæ ana gra. j. rosarum rubearum siccarum drac. iij. terantur omnia, & fiat puluis, qui capiti circa coronalem commissuram inspergatur, aut ex eo paruuli sacculi parentur, & prædictæ capitis parti applicentur: non parum etiam conducit & infrascriptus puluisculus, si eis assumendus tribuatur: quo etiam quotidie vti cōsueui. Excipit autem manna thuris, mastiches gra. iij. nucis moscatæ, spicæ, cinnamomi, singulorum gra. ij. hirundinis præparatæ scrup. s. seminis, & radicis pæoniæ gra. iij. pulueris olsis cranei viri, si masculus, femina, si foemina fuerit, gra. v. seminum coriandrorū præparatorum, & sacchari candidi ana scrup. ij. sacchari optimi lib. s. misceantur, & fiat puluis. Tempora quoque, & locus iuxta narium foramina ex antidoto mithridatico, succo rutæ, ac pauco aceto illinantur: rutæque ipsa sepius odoranda erit, ac sub cervicali substernenda. Interimque infrascripto, suffumigio vti tor. Recipe ladani drac. j. corticum thuris, mastiches, singulorum scrup. j. rosarum rubearum drac. iij. fiat puluis: quo super prunas adhibito, infans, ac domus, in qua degit, leniter suffumigetur. Inungatur præterea spinalis medullæ principium ex oleo nardino, seu de nuce moschata cum oleo rosaceo, seu amygdalarum dulcium permisto. Qui verò post puerilem ætatem in hanc affectionem prolabantur in ipsa accessione cōuulsa eorum partes dirigendæ, inungendæ, ac deligandæ sunt: atque ita continendæ, vt in rectum dirigantur: deinde distento ore, vomitus proritandus erit: quod humores ex stomacho extrahantur, pituitaque auferatur digitis, aut pennis oleo illitis, irino præsertim demissis. Insuper oportet medicamentis, quæ naribus adhibentur, sensum irritare: velut peucedano, cyrenaico succo, bitumine, aut cedrina pice, perseverante autem adhuc exacerbatione, glans immitenda erit, ex agarico, sale gemmæ, hiera, & despu-

Reliquis à
pueritia me-
dicamentorū
ratio
accesionis
tempore.

mato melle confecta. Extrêmæ partes fortiter vinciendæ sunt, ac confricandæ, confidenterque castoreum, succumve cyrenaicum cum aceto mulso ori infundere licebit, Aëtij præcepto. Acri insuper posthæc clystere vtaris, præsertim ipsis reuocatis, decocto videlicet centaurij, calaminthæ, aristolochiæ, mercurialis, florum chamæmeli, & fursuris cum sale pauco: in quo vnc. iij. vel iij. olei communis, seu anethini, mellis rosacei vnc. ij. agarici drac. j. vel drac. j. & s. hieræ picæ simplicis drac. vij. & antidoti indi, seu benedictæ laxatiuæ drac. ij. vel iij. dissoluas. Deinde recuperatis viribus, per Galeni hieram, agarico trochiscato admisto, seu alio conuenienti medicamento (vbi opus) purgetur. huiusmodi sanè est recentis, & acuti comitialis morbi curatio. quod si neque his cedat, verum adhuc permaneat, curandus iam, vt longus est. hos siquidem oportet in longo aquæ potu continere, ex Pauli & Aëtij sententia, quibus etiam (si nihil impedierit) venam secare confert, non tamen cubiti, sed crurum potius, iuxta Galeni sententiam, libro de curandi ratione per venæ sectionem, ac Celsi cap. 23. lib. tertij, paululumque sanguinis mittere oportet, eodem Celso auctore, iuxta talum, ex vtroque crure venam incidens. Tempus autem erit adhibendæ venæ sectionis accessione transacta, aliis consentientibus, vt apud Cælium Aurelium legitur, quam etiam ex brachio faciendam admittit, quemadmodum & Paulus: tu verò tutius curans, ex cruribus potius sanguinem detrahens. Intermisissis que demum aliquot diebus, purgans medicamentum exhibendum erit, redundante tamen succo prius præparato: qui si pituita fuerit, ex melle rosaceo, oxymelite simplici, aut scillino, seu syrupo de stœchade, aut hyssopi, in aqua mulsa decocto, seu aliis huiusmodi præparari poterit. Succo autem melancholico redundante, syrupus est fumaria tribuatur, vel ex lupulis, seu epithymo, aut senæ, seu epithymi in aqua mulsa decoctum, aut alius huiusmodi similis, cum quibus semper radicis pæoniæ decoctum commisceri poterit. Postea verò non semel dūtaxat, sed bis, ter, & sepius (vbi opus fuerit) purgantibus medicamentis agri purgandi sunt: cauendæque erit exquisitissima in vnica vice euacuatio. Qua de re redundante pituita pilulis cocchiis, aureis, sine quibus, aut de agarico ægrum purgabis, à quibus per duas ferè horas vnc. iij. vel ij. syrupi ex pluribus infusionibus rosarum rubearum, aut persicarum exhibeas. At si à nigra bile hæc passio excitata fuerit, à prædictis hunc humorem præparantibus, quæ eundem purgare possunt, tribuas, nempe drac. j. aut scrup. iij. ex pilulis arabicis aut de lapide lazuli, vel de lapide armeno, seu tantundem pulueris senæ, vel epithymi cum scrup. ij. aut drach. j. pulueris hieræ simplicis Galeni, catapotia conficias, à quibus per iam dictum spatium vnc. ij. vel iij. syrupi domini Augustini, aut prædicti syrupi ex pluribus infusionibus rosarum absorbere poterit æger. Vbi verò sufficienter purgati fuerint, ægros ipsos lauare non erit inutile, ac cucurbitulas post tres dies cum scarificatione (si opus fuerit) scapulis affigere, seu in occipitio: & sequenti die cataplasma capiti adhibeas, ex pane cocto cum aqua mulsa, cum amygdalis amaris contrito, aut serpillio, aut calaminthæ, aut mentha, seu ruta, idque per triduum cōtinuandum erit, ex Aëtij, & Pauli sententia. Postea radendum est caput, & liniendum peucedani succo in aceto diluto,

diluto, vel spondylium, seu serpillum in aceto co-
quatur, aut iris, & eodem modo illinatur, inde me-
dicamentis uti, quæ sternutamenta citant, hellebo-
ri videlicet, castorei, seu piperis pulvere naribus in-
iecto: aut liquidis erhinis utaris ex aqua hordei, in
qua satipsichus, aut amaracus, serpillum, calamita,
seu ruta fuerint decocta, & adiecto betæ succo,
iridis, aut cyclamini: nec minus utiles sunt & man-
siles pastilli, qui per os pituitum educant, ex hyssop-
o, pulegio, pipere, castoreo, chia, mastiche, piri-
thro, uia pasta, & cera confecti, vel alius huiusmodi
superius descriptis utare: inungaturque spinæ ini-
tium ex oleo cōstino, nardino, hyperici, de casto-
reo, aut de nucæ moschata. Quod si neque his ces-
serit malum, sinapismum capiti adhibe, eorundem
Aëtij, & Pauli decretis, aut ferro candente in occi-
pitio, & infra, quo loco summa vertebra cum capi-
tē committitur, adurans, iuxta Cornelij Celsi sen-
tentiam: inurans autem duobus locis iam dictis, ut
ipse refert: ut per ea perniciosus humor euadat,
quod si in duobus locis inustionem non perferant,
saltem in uno ferro candente aduras, quo videlicet
summa vertebra cum capite admittitur. Assumere
autem castorei cum aqua multa, summo opere à Pau-
lo laudatur: & oxymel scillinum quoti die potum.
Aëtius verò (Dioscoridis auctoritate) ruta sylue-
stris semen cum aqua potum commendat, aut spon-
dylum eodem modo, & loti arboris ramentorum
cremorem, aut foliorum quinquefolij drac. j. quo-
tidie potam. Vel si ad dies quinque aut plures duo-
rum cochleariorum mensura ramentorum ebōris,
singulis diebus, cum aqua multa assumatur. Simili-
ter si ager sciurus bibat quotidie ex coagulo lepo-
ris erui magnitudine, aqua dissoluto: & si lepori-
num non adest, hædino utatur. Assumptionem au-
tem leporini coaguli cum aceto ebibiti, tanquam
valde utilem morbo comitiali laborantibus Gale-
nus 10. de simplic. medic. facult. summo opere com-
mendauit: confert etiam mustellæ hepar sine felle
assum, si cum aqua vacuij. dabis bibere, ut ait Pli-
secundus libri tertij, cap. 10. Ex compositis antido-
tum diambræ, diamofchu dulcis, nichridatum, ac
theriacam exhibere poteris. Sunt insuper medica-
menta quedam, quæ proprietate quadam, ac tota
substantia huic malo aduersantur: quæ quoniam co-
piose à Medicis conscripta sunt, consulo præter-
misi, velut quedam quoque sunt, quæ comitalem
morbum arguunt, & eo affecto collabi faciunt sus-
cita, ut bitumen, lapis gagates, cornu caprillum, &
caprini hepatis assati odor, siue ipsum etiam hepar
comestum, iuxta Pauli & Aëtij sententiam. Reliquū
est, ut per consensum geniti morbi comitalis cu-
ram præcipiamus. Nam si ventriculo primario affe-
cto fiat, oportet agro præcipere, ut bonæ conco-
ctionis studiosus sit, eamque accuratè ei procurare,
Galeno auctore, quinto de locis affectis, quem se-
ctati sunt Aëtius, & Paulus, ita ut ex facili ager cō-
coquat. Proinde panis optimè præparatus circa
tertiam, vel quartam horam diei exhibeatur, solus
si non sitiat: si verò siti crucietur, ex vino madidum
albo, atque modicè altringente: nam huiusmodi
vinum (eodem Galeno teste) ut ventriculum robu-
stum efficit, ita haudquaquam tentat caput: id quod
facere solent ea, quæ vehementes vires obinent.
Dare quoque expedit, singulis annis bis, aut etiam
ter medicamentum amarum ex aloë: totum nanque
ventrem purgat, viresque reparat: quo curationis

modo iuuenem quandam grammaticum à prædi-
cto affectu Galenus liberauit. Propterea non ab re
& alij simili modo affecti curabuntur: præsertim si
in eis flava bili circa ventriculum decumbat. At si
pituitosum coaceruat ventriculus humorem, atque
hinc caput malè simul afficiat, & morbum comitia-
lem indicat, prospiciendum est ei (post prædicti
succu præparationem, coctionem, & purgationem,
quam non picra tantum, sed & agarico solo, aut
cum ea misto, perficias) ut os ventriculi ab extra
etiam irrigetur ex iis, quæ calfaciunt, & corroborat,
bis saltem, aut ter in mense, Alexandri præcepto,
oleo chamamelino, & absinthio: quibus adiciantur
styrax, & mastiche: quod præstantius (ut ipse re-
fert) non reperitur: cum & calfacere, & quod im-
becille est, firmare potest, ut probè cōcoquat. Illud
tamen silentio prætereire nolui, quod non modò in
his comitalibus morbis per consensum genitis, ve-
rum & in eis, qui per essentiam affecto cerebro o-
riuntur, agaricum ipsum non erit prætermittendum:
cum & Dioscoridis auctoritate, & Galen. lib. 6. de
simplic. medic. facult. & Pauli eodem capite 13. 3. libi
morbo comitali obnoxios sua facultate sancti præ-
sertim si ex crasis, & viscidis humoribus ipse gigna-
tur, quemadmodum neque nigrum veratrum præ-
tereundum erit, potissimum si nigra bilis epilepsia
causa fuerit, eiusdem Dioscoridis auctoritate: mul-
tum quoque prodest his, quibus stomachus prima-
rio affectus est, fefelli, & spondylii radix, ac semen,
seu aristolochia rotunda trita, & ex aqua pota. Mi-
rum quoque in modum opitulatur eis assidua cru-
rum scarificatio in talo, seu poplite, eiusdem Aëtii
& Paulo testibus. Alios insuper Galenus vidit con-
uulsione comitali, ob oris ventriculi vitium corre-
ptos, cum aut non probè coxissent, aut vini, & qui-
dem meracioris plurimum potassent, aut ubi vene-
ri immodicæ operam dedissent: quibus non alio
modo succurrendum erit, quam prohibita eorum
causa, eis procurare & accuratè cōcoctionem pro-
bam: nullum enim (ut inquit Alexander) est in o-
mnibus quidem affectibus præstantius auxilium,
præcipue verò comitalibus. Sin autem nec ventri-
culus, nec caput comitalis morbi originē habeant,
sed ex alia quadam particula initium sumat, siue ma-
nusea fuerit, siue pes, illi potissimum parti prospici-
endum erit, totaque curatio ei admouenda. Pro-
pterea imprimis conferunt vincula superioribus
partibus iniecta: ab iis enim præsentaneum præsi-
dium expectatur, Galeni præcepto tertio de locis
affect. id quod testatur expertum esse in viperarum,
aspidum, & scorpionum ictibus, quod magis inere-
dibile est propter imminens subitaneæ mortis peri-
culum. Insipxit quoque Medicos sanasse puerum,
cuius morbus comitalis à crure oriri consueuerat,
curato in primis vniuerso corpore, ligatoque in
medio membro, supra eam videlicet partem, quæ
primaria dispositione erat affecta, adhibitoque de-
mum medicamine extapsia, aut sinapi, parti ipsi affe-
ctæ. Post igitur totius corporis euacuationem, cum
videlicet malum remittit, ea quæ adurere, seu exul-
cerare, extenuare, ac calfacere partem possunt me-
dicamenta, parti affectæ imponenda sunt: inter quæ
lepidum à Paulo, & Alexandro commendatur: vel
medicamentum ex tapsia, seu sinapismus: quorum
meminit Galenus, eodem tertio de locis affectis.
Post omnia commemorata & theriacæ, & natura-
les balneæ locum obtinent: postremoque curandū

Agarici
laui.
Diosc. lib.
3. cap. 1.
Galen. 6.
symp. cap.
de agar.
Lib. 4. cap.
134

Galen. 5. de
loc. affect. 6.

cap. 7

Galen. lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

lib. 1.

ne caput in folatu vtratur, vt Paulo vifum eft: & de comitialis morbi curatione quouis modo orti, hæc dicta fufficiant.

Περί ἀποπληξίας.

De Apoplexia.

C A P. XIX.

EST inſuper morbus comitialis proximus quodammodo ei affectioni, quæ ἀποπληξία appellatur, vt Galenus inquit commento. aphorifi 45. 2. lib. propterea non ab re poſttractionem de morbo comitali, de ea hic tractare intendimus. Poſſet Latine affectus hic attonitus nuncupari, cum à Celſo, hi, qui hac affectione laborant, cap. 26. tertij libri, attoniti nominentur: quorum (vt ipſe refert) & corpus, & mens ſtupet. Ab Alexandro verò cap. de reſolutione, hoc modo deſcribitur, quòd ipſa quidem eſt totius corporis ſenſus, & motus abolitio. cum principis animæ functionum noxa: & Paulus cap. 18. tertij libri dicebat, apoplexiam appello, cum omnes corporis particula motum ſimul, & ſenſum amiſerint, principalibuſque animæ functionibus oblaſis. Aëtius item ſimiliter dixit, quòd eſt priuatio ſenſus, & motus totius corporis vnà cum læſione principalium actionum de repente incidens. Galenus autem tertio de locis affectis, cap. 10. ſic de ea ſcriptum reliquit. Cum igitur omnes pariter nerui, tum ſentiendi, tum mouendi vim amiſerint, apoplexia huiusmodi affectio appellatur, & lib. de Differentiis ſymp. cap. 3. apoplexiam dixit eſſe affectionem, qua ſimul & totum corpus reſoluitur, & principes functiones cohibentur, in apoplexiis nanque totum corpus de repente ſenſu, ac motu priuatur: quanquam interim ſola reſtat reſpiratio, eodemmet Galeno auctore, commento aphoriſm. 42. ſecundi libri in hac denique affectione quòd cerebrum affectum ſit, patet ab eodem Galeno tertio de locis affectis, dum dixit, Igitur apoplexia omnibus animalibus actionibus noxam inferens, cerebrum affectum eſſe manifeſte declarat, & Paulus præallegato loco ſcriptum reliquit, commune neruorum principium, hoc eſt, cerebrum in apoplexia affectum eſſe. Poterit nec minus & illud ratione inueſtigari, ac ex operationum læſione tanquam ex ſigno inueniri. Læduntur nanque in prædicta affectione, velut ex iam dictis eius deſcriptionibus liquet, non modò ſenſibiles, & motrices animæ functiones omnes, verum & principes: quarum auctor, ſons, ac principium cerebrum exiſtit. Ipſis ergo cunctis oblaſis, de neceſſitate & cerebrum oblaſum erit, non modò ſecundum vnam eius partem, anteriorem videlicet, aut poſteriorem, imò ſecundum vtranque in apoplexia, velut etiam in morbo comitali, afficitur, vt patet quarto de locis affectis, cap. 2. Verum cum ſubito eueniat, ſicut & comitalis morbus, cerebri ventriculos, eoſque principes primario affectos eſſe manifeſtū eſt, eiufdem Galeni decreto tertio de locis affectis ſymp. capite vltimo, dum dixit, Quemadmodum & apoplexia, & morbus comitalis ob priuati in ventriculis, ipſius ſcilicet cerebri, acervatæ multitudinem accidere videntur. Proinde horum ſymptomatum tum generatio, tum ſolutio ſubitaria eſt, quod per corporum intemperiem haudquam fieri poteſt. Propter repentinum ergo eius exortum, non propter intemperiem totius eſſen-

tia cerebri, ſed ob craſſum, aut frigidum, aut viſcoſum humorem, principales cerebri ventriculos impletæ fieri apoplexiam, in dictum eſt, ex eiufdem Galeni ſententia tertio de Locis affectis cap. 7. & Aëtij, cap. de apoplexia. Atqui principes cerebri ventriculi, iuxta Galeni decretum, eo dem 3. de locis affectis cap. 7. poſtremus ſunt, & medius: quamuis in ea non modò principes cerebri ventriculi afficiantur, & corpus minus veluti in epilepſia, ſed & cerebri corpus quoque vnà magis læditur, vt patet 4. de Locis affectis, cum dixit, Verum in caro, & morbo comitali ventres magis; cerebri corpus minus, in apoplexia verò corpus magis affici ſolet. Nunquid verò apoplexia in morborum numero, aut ſymptomatu cõnumeranda ſit, ex prædictis eius deſcriptionibus patere poterit. Nanque cū omnimoda ſit ſenſus, & motus priuatio, ac principum facultatū cohibitio, non morbum, ſed ſymptoma eſſe fatendum erit, ſimul cum Galeno lib. de Differentiis ſymp. cap. 3. & 2. cauſis ſymp. cap. 7. liquet inſuper hoc ſymptoma eſſe in genere noxæ functionū animalium, omnium inquam, motricū videlicet, ſenſibilium, & principium, non diminutæ, nec deprauatæ, ſed ablatæ. Qui hac affectione laborant, omni denique motu, & ſenſu careant, ac tanquam mortui viuunt, & oculis clauſis inſtar dormientium, decubunt, ac ſterunt, quæadmodum etiam profundè dormientibus accidit, licet ſecundum diuerſum modum, læditur quoque in his ſpirandi facultas, quo à caro diſcrepat apoplexia, vt patet quarto de locis affectis, quinimò cum plures eiufdem apoplexiæ differentiæ reperiuntur, vt patet apud Hippo. & Gal. aphor. 42. 2. lib. & 3. de locis affectis, ex nulla alia via eaſdem diſcernere poterimus: quam ex vehementia, ſeu paruitate noxæ ipſius reſpirationis, ſic enim & affectionis magnitudinē, atque periculū maius, vel minus cõſiderare poterimus, vt 3. de Loc. affectis ab eodem Gal. decretum eſt. Nam ſi ipſa prohibeatur, vt nulla aſpicientibus videatur fieri ſpiratio (nō quòd ſecundū rei naturam, nullo modo ſpirent laborantes, nam impoſſibile eſt, vt omni ſpiratione exactè priuatū animal in vita ſeruari poſſet, cum ſpirationē à vita, & vitā à ſpiratione ſeparari non poſſe cuiuslibet pro cõperto habeatur, adeò vt viuente non ſpirare, & ſpirante non viuere ſit impoſſibile, vt 4. 5. & 6. de locis affectis. Galenus ſcriptum reliquit) tunc igitur cum ita prohibeatur reſpiratio, vt ad ſenſum ægri non ſpirare videantur, maxima, & acutiſſima erit apoplexia, eodem Galeno teſte, commen. apho. 42. 2. lib. quamuis viuere etiā poſſint animalia quædā, & ſi nihil omnino ſpirent, vt cap. de vteri ſuſtocatione dicemus. At ſi qui apoplectici ſpirant quidem, ſed magna cum vi, fortis adeſt ipſis apoplexia, adeò vt Galeno 3. de locis affectis, aſſerat omnium apoplecticorum peſſimā putandā eſſe ſpirationem, quæ & intermititur, & magna cū violentia trahitur: quādo videlicet ad ſenſum ſpirent: nam ſi ipſis ea prohibeatur (vt diximus) omniū erit acutiſſima, ac maxima apoplexia; cum verò reſpirāt, verū eo modo, quo diximus, fortis adeſt iſtis quoque apoplexia, & inter omnes alias, præter iam dictas, peſſima. Verum minus fortis adeſt illis, qui neque intetum, neque violentū, inæqualem tamen, atque inordinatū, ac præterea intermittentem habent anhelitum: velut ſi in aliquibus aliquem ſeruat ordinē ipſa reſpiratio, quāuis quodāmodo ſpirandi facultas læſa ſit, debilior ſiquidē exiſtit hæc apoplexia: & ſi omnia fiant, quæ ſunt neceſſaria,

Quid ſit apoplexia. Alexand. lib. 1. c. 16

Lib. 6. cap. 27.

Quæ pars in ea afficitur. c. 10

Quid cerebrum in ea ut inſtrumẽtis, & nō ut ſimiliter pars afficitur.

necessaria, vt patet eodem commento Aphorism. 2. secundi libri fortè curatur. Quatuor igitur, iuxta Galeni sententiam, apoplexiæ differentiæ connumerari possunt, vt ex iam dictis eiusdè Galeni verbis liquet: quamuis Hippocrates præallegato aphorism. 42. duas tantum meminere, quæ inter se ratione maioris, vel minoris noxæ ipsius respirationis discrepant. Quapropter eodem tertio de Locis affectis dicebat Galenus, Discernitur autem affectionis magnitudo, de apoplexia verba faciens, & noxæ, quam inspirationi infert, vehementia: cum enim naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam: cum verò paulum impeditur, est paruam in cerebro noxam esse conicere oportet. Et insuper eodem tertio lib. de Locis affectis cap. 7. asserit. Porro in omnibus his affectibus, in quorum numero apoplexia quoque continetur, periculi magnitudinem, ex anhelitus magnitudine conicere oportet. Sed non ab re mox quispiam à nobis quæreret, qua ratione fiat, vt Galenus ex vehementia noxæ respirationis potius, quam ex aliarum animalium functionum læsione vehementi, magnitudinem voluerit apoplexiæ significare; cum & functiones omnes animales in ea oblatæ sint, vt dictum est. At qui respondebimus nos respirationem ipsam in numero earum actionum, quæ à consilio, & voluntate prodeunt, esse, iuxta eiusdè Galeni sententiam secundo de motu musculorum cap. 5. Quapropter musculorum munus est: eamque si libera fuerit, solum sepe cum transuersum, modo valeant vires, efficere solet, vbi vero ipsum ob infirmitatem spirandi munus pericere non valet, tunc intercostalium musculorum concurrit auxilium: & si maiori egeat animal respiratione, thoracis muscoli omnes superius, ad spirandi actionem requiruntur, vt liquet quarto de Locis affectis cap. 7. verum cum opera quæ voluntario motu fiunt, in duplici reperiantur differentia, vt patet eodem libro secundo de motu musculorum, cap. 6. nam alia penitus libera sunt, alia verò affectibus corporis seruiunt, priora itaque perpetuo absque impedimento à nobis sunt: posteriora verò non perpetuo, sed in tempore quodam, & cum mensura: opus respirationis iuxta eiusdè Galeni sententiam, non sub prima continetur differentia, sed sub secunda. Nam licet voluntatis sit opus, & sponte ab anima fiat, penitus ipsam retinere longo tempore non valemus citra mortis periculum: quemadmodum declarauit seruus barbarus, qui cum vehementi irâ concitatus mortem sibi consciscere decreuisset, prostratus humi, respirationeque cohibita, longo quidem tempore immobilis erat, postea verò paulum volutatus, hoc pacto mortuus est. Licet tamen nobis vsquequaque respirationem cohibere, quoad maximè necessitas urgeat: periculum nanque esset, ne quis moreretur, nisi respirauerit: quo fit, vt ipsam penitus retinere arduum sit: neque enim omnes ad moriendum sunt proclives, etiam si infinitis malis consistantur, iuxta eiusdè Galeni sententiam, eodem libro de motu musculorum. Et propterea idem Galenus libro de vtilitate respirationis dicebat, ex eo apparere non vulgarem esse cuius vtilitatem: quod ne momentum quidem temporis ea deperdita, sufficere possimus: ex quo manifestum est, ad nullam particularem actionem, sed ad ipsam vitam eam referre, atque necessariam esse, & propterea si ea priuemur, morimur. Ser-

uatur nanque ex ea innati caloris symmetria, potissimum cordis, animalisque spiritus nutritur, vt patet eodem libro de vtilitate resp. ac sexcentis aliis in locis apud Galenum, ex quibus luce clarius excipi poterit, inter omnes animales functiones hanc maximè esse necessariam: nanque ea abolita, non animalis partem quampiam, seu actionem priuatam esse dicemus, sed vita priuari asserimus; cum vita citra respirationem, & respiratio sine vita esse non possit: hinc patet, quod & si cunctæ animales functiones in apoplexiis oblatantur, ipsa tamen respiratio, cum adeo maximè necessaria sit pro vita, vltimo loco noxam patitur, curam habente natura ipsa de vitæ animalis conseruatione, imò & ipsius spirationis maximus vsus nervorum facultatem ac operationem excitat. Probauit & illud signo Galenus sumpto ex somno, tum tertio, tum quinto de locis affectis, nam quamuis dormientes nulla alia voluntaria fungantur actione, sed omnes ferè musculorum actiones in eis exoluantur (sola autem respiratio seruat, quæ musculorum thoracem mouentium munus est) sensusque quodammodo expertes sint: nam neque ipsa anima dormientium omnino quiescit, vt patet eodem libro 2. de motu musculorum, sed intermissione quandam habet vigor, quæ non perfecta quies dicitur: & propterea non penitus sensus expertes sunt, neque omnino à voluntario motu cessant dormientes, sic non in apoplexia duntaxat, sed in omnibus soporosis affectibus, quanquam neque sentiat corpus, neque moueatur, sola tamen respiratio seruat, alias nec ipsum animal viueret, hoc autem fit propter eiusdè respirationis vtilitatem, vt idem Galenus testatur eodem commento aphorism. 42. secundi lib. quæ quidem nervorum vim excitat ad operationem: & ob hanc causam mirandum non erit, quomodo omnibus aliis musculus motu carentibus in apoplexiis, illi qui thoracem attollunt, quamuis difficulter moueantur, tamen plerumque, imò magna ex parte, vt ipse inquit, muscoli omnes in apoplexiis operantur thoracem mouentes, & si rarò prius omnes operantur: quemadmodum & in vehementibus exercitiis, vbi anhelitus plurimus est necessarius: quanquam in apoplexiis non ob id, quod auctus fuerit vsus respirationis, quem duplicem esse diximus: sed quia vis ipsa est imbecillis, ideo omnes musculi thoracis simul coguntur operari: cum si non operarentur, cordis quoque temperamentum solueretur, & animalis ipsius necessario sequeretur interitus. Semper enim mors ad modicas sequitur cordis intemperantias, vt patet quinto de locis affectis. Cum igitur apoplecticos mori contingat ob id, quod spirare non possunt, vt tertio de locis affectis, liquet: non ab re Galenus ipse ex eiusdè anhelitus nocumeto periculi magnitudinem conicere oportere decreuit. Nam ipsa ad sensum prohibita, periculosissima ac maxima erit apoplexia. At si magna cum violentia trahatur, fortis inquam erit, & ipsa. Verum si inæqualis, & inordinata, ac intermittens spiratio fuerit, minus periculosa erit apoplexia: quemadmodum in quibus aliquem seruat ordinem, debiliior existit, & si omnes apoplexiæ fiant, propterea quod vis animalis non potest defluere ad partes infra caput existentes. Paulus quoque in hoc, velut in reliquis Galenum sectatus capite 18. tertij libri, sic scriptum reliquit, Seruatur itaque in a-

cap. 1. et sequens lib.

Quod inter omnes animales functiones respirationis sit maximè necessaria.

3. de loc. aff. cap. 7.

5. de loc. aff. cap. 1.

cap. 4.

5. de loc. aff. cap. 1.

3. de loc. aff. cap. 10.

Concluditur ex Galeni periculi magnitudo in apoplexiis, ex laesione respirationis.

Ad quem cerebri motum sequatur.

Cause.

2. de caus.
Gymp. cap. 7

cap.3

cap.3

Causarum
diuersarum
signa.

Prognostica.

cap.2

Vase se-

aliqua
dicamen
que apo
stolicos
mutant.

Cherres

Slander

ization

purga
nem, seu
ne se-
nem re-
dia.

quamuis si diutius malum proteletur, eo calente aqua temperato (Pauli decreto) vti poterit, statim quoque prædictis taliter agrotantibus sanguis ex vena detrahendus erit, prædicto tamen eorum periculo: vt ait Aëtius: quoniam sanguinis detractio, vel occidit, vel liberat, Celso auctore: adeo vt post sanguinis missionem (vt ipse refert) si non redit, & motus, & mens, nihil spei superest. Detractio autem sanguinis e dextra manu fiat, humerali, aut media incisa vena, vbi vires, ætas, & alia non dehortantur: affectus nanque magnitudo id præcipit, tanquam princeps scopus venæ sectionis, Hippo. & Galen. decreterit. Verum copia sanguinis, qui detrahatur, diuidenda erit: cum commouere oporteat tantum, non exoluere vires, & calorem extinguere, vt testatur Aëtius: & propterea in euacuatione, pulsus, faciei color, ac inspiratio inspiciantur, vt ipse refert, & si nihil mali consequatur, etiam repetenda est detractio: quoniam aliud curationis genus vix vnquam sanitatem restituit, vt placuit eidem Celso. Post tamen venæ sectionem, & vociferationes, & odoramenta excitatoria adhibeantur, ex castoreo, opopanace, aut galbano, seu sagapeno, & aperto eorum ore, aceto mulsum instillandum erit, & pinna oleo irino imbuta: immittenda sunt, & vomitus prouocandus: totumque corpus oleo calido inungendum est, irino, nardido, costino, de castoreo, aut aliis huiusmodi, vinctis, ac frictionibus vehementibus in extremis corporis partibus vtendum: & humeris plares cucurbitula affigende. Interim caput, prius abrasum, rosaceo cum aceto, in quo serpillum, aut spondylium fuerit decoctum, seu calamintha, irrigandum erit, seu chamæmelino, vel anethino, vt Paulo visum est, aut anethi, chamæmeli, sampluchi, serpilli, hyssopi, scutellæ campanæ, singulorum pugil. s. florum stœchadis, origani, spicæ drach. tres. in aqua bulliant, ac vini portione equali; quo medicamento similiter caput irrigetur. Si verò hæc nihil profecerint, clysteribus vtendum erit, ex decocto fursuris, mercurialis, minoris centaurij, rutæ, hyssopi, pulegij, saluæ, calaminthæ, singulorum manip. s. polyodij vnc. s. seminis fœniculi, anisi ana drach. ij. & parato ex eis secundum artem decocto, de eo recipe lib. & s. in qua dissoluas hiera picræ compositæ vnc. s. benedictæ drach. iij. confectionis de dactylis, siue antidoti indi drach. iij. agariçi drach. j. & s. mellis rosacei vnc. ij. salis communis, seu gemmæ parum, olei anethini, chamæmelini, seu rutacei vnc. iij. commisti omnibus fiat clyster. Nec minus & glandes commendantur, quæ ex hiera simplici, seu hiera logodio, colocynthide, agarico, & sale gemmæ, cum despumato melle formari poterunt. Interim hellebori addere poteris, aut drach. ij. ex pilulis cocchiis: ligentur autem filo, vt pro arbitrio extrahi possint, sintque notabilis longitudinis, vt pote quinque, aut sex digitorum. Verum si egrî, inepti ad venæ sectionem fuerint, aut in prædictis malum quoque persequerant, alienum non erit, medicamentum purgans eis præbere (ac non secus interim modo dictis prædictis vti) quod ex pilulis cocchiis, & agariçi, pinuita præsertim redundante, componatur: aut ex eisdem pilulis, seu arabicis sumpta drach. j. cum veratri nigri scrup. j. aut drach. s. catapota formentur, vel aliquod ex modo dictis purgantibus medicamentis præcedenti cap. de morbo comitiali, seligas, & quia permittit hæc affectio, ac cogit, vt Aëtius

tius testatur, vel temere omnia tentare, si vires permiserint, cucurbitula quoque occipitio cum scarificatione defigenda sunt, theriacaque, michridato, ac diambra post purgationem vtendum: nec minus & ea, quæ sternutamenta excitant, crebrius adhibita profunt, vt puluis castorij, hellebori, seu piperis naribus inspersus. Similiter conferunt quæ pituitam per os ducunt, apophlegmatismos nominant: parentur autem hoc modo, Recipe pyrethri, staphidis agriæ, piperis ana drach. s. thymi, origani ana drach. j. castorei scrup. j. mastiches drach. j. & s. vix passæ drach. ij. ceræ albæ parū, misceantur, & fiant manuales pastilli cum oxymelite, aut rosaceo melle: præstat etiam & rubificantibus medicamentis vti, appellatis sinapismis, ac aliis, quæcunque capiti admodum calfaciendi, ac dissoluiendi vim habeant, vbi præsertim ea, quæ diximus, medicamenta non suffecerint. Nec prætermittenda erit inunctio circa spinallibus medullæ initiū, ex oleo rutaceo, seu nardino, de castoreo, aut nuce moschata. Et hæc de apoplexiæ curatione sufficiat, modò ea curari valeat, vt diximus.

Περὶ ὀφθαλμίας.

De Lippitudine.

CAP. X.



VM inter omnia sensuum instrumenta oculus mirabili fabricæ excellentia præditus, ad cerebri naturam propius accedat, certiusque, ac subtilius, quàm reliqua proprium, ac primum sensibile habeat: siquidem in nullo alio instrumento inuenies, neque ipsam cerebri substantiam, neque tantam animalis spiritus copiam, quanta in oculo continetur, Gal. teste, 7. de Hippo. & Plat. decret. propterea post cerebri, capitique affectus, de oculorum affectionibus tractare duxi: quorum actio videre est: eorum autem propriū sensibile est colorū genus: cum illos primos, & per se, & solus ex omnibus sensibus visus percipiat, vt patet eodem 7. de Hippocratis, & Plato decreterit. Reliqua itaque eorū admiranda cōstructione, tēperamento, ac cunctarum eorundē partium vsu, velut fusē tractatis ab omnibus artis medicæ auctoribus, præsertim Galeno, libro decimo, de vsu partium, aliisque sexcentis in locis: quia ex eiusdem Gal. sententia, in quolibet instrumento vna quæpiam reperitur peculiaris pars similis, cui primò, ac per se totius instrumenti actio committitur, aliæ verò cunctæ eidem præstant vsum, ea de re in eiusdem Galeni, aliorumque illustrium Medicorum doctrina compertū est, visus actionem crystallino humori, tanquam primæ instrumenti parti, tribuendam esse. Præstant verò vsum reliqui humores gemini, vitreus videlicet, & albugineus, ac tunica cunctæ propriæ, quæ tres non à Galeno duntaxat, sed & Aëtio, aliisque medicæ artis bonis auctoribus connumerantur: quarum vna interna magis, Græcè ἀμφιβλυσ-ποίησις, Latine verricularis, seu reticularis, secūda παρὰ τὸν ὀφθαλμὸν, hoc est, vniuersalis, in cuius medio foramen exillit, quod pupillam vocant. Tertia verò κερατοειδής, id est, corniformis tunica appellatur, potissimū à Galeno eodem decimo, de vsu partium, cap. 3. & 1. de caus. sympt. cap. 2. ex his denique propriis partibus totus componitur oculus. Est insuper & alia oculi quarta tunica, seu mēbrana, quā Græci ἐπιπεφυκίτις, Latini autem agnatam vocant: propterea quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt tunicis forinsecus ex membrana os caluariæ ambiente, quæ ἀποδυνος dicitur, agnata sit, ligamentum siquidem

Loco citato.

Per totum.

Numerus partium et ponentium oculos. Aët. lib. 7. cap. 1.

existens toti oculo ad circumfita ossa, cum quibus oculum ipsum colligat, simul autem & mouentes ipsum musculos operit. Si quis autem velit prædictas tres proprias oculorum tunicas in anteriores, & posteriores partes diuidere, & hac ratione alio nomine posteriores earum partes nuncupare, ut nonnulli consueuerunt, ac sex, non tres duntaxat oculis proprias tunicas tribuere, cum ad rem tractandam nec ob sit, nec conferat, non reclamamus: etiam si ex Galeni, seu alterius medicæ artis auctoris scriptis illud elicere conetur. Nos vero tres duntaxat oculorum tunicas connumerauimus, anteriores earundem partes à posterioribus non segregantes: cum & utraque earundem tunicarum pars, siue ante crystallinum humorem, siue post constiterit, eiusdem sit substantia, ac ab eodem loco, cerebro videlicet, aut membranis eius, tenui, seu crassa progerminetur, Hippocratem sectati, qui lib. de loc. in homine dixit, Membrana autem tres sunt quæ oculos custodiunt. Quartam autem, quæ agnata dicitur iure non velut propriam annotauimus: cum neque ex cerebro, aut aliqua eius membrana, sed ex ea, quæ exterius os caluariae ambit, pericrania dicta, originem ducat. Nuncupatur autem agnata, propterea quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt tunicis, forissecus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumfita ossa, ut patet 4. de compos. medi. secundum locos, cap. 2. & decimo, de visu part. Verum cuncte nedum prænominata tunica, sed etiam dicti humores, ut perfectè visio ipsa absoluitur, à natura cõditi sunt. Quod sit, ut ex triplici vitiõrum genere (ut testatur Galen. primo, de causis sympto.) videndi actio lædi possit: quorum vnum est, cum primum sentiendi instrumentum quippiam perpeßum est, quod crystallinum humorem esse diximus. Alterum, cum ministrantium primo sentiendi instrumento partium aliqua fuerit affecta, velut sunt reliquæ omnes oculi partes annotatæ. Tercium est, cum ipsa sentiendi potentia, quæ à cerebro per neruum in oculum ipsum descendente procedit, quoquomodo fuerit impedita. Quicquid nanque ex iis (quæ iam enumerauimus) fuerit oblatum, animal vel male, vel nihil omnino videbit, hoc quidem cõmune est cuilibet sentiendi actiõni. Exordiemur autem nos ab iis oculorum malis, quæ eorundem partibus visum aliquem præbentibus euenire solent, initium fumentes ab agnatæ tunicæ affectibus, utpote quæ exterior magis sit, ac à frequentissima eiusdem affectione, quam Græci propriè ὁφθαλμία, Galeno auctore, eodem 4. de comp. medic. secund. loc. vocant: Latini lippitudinem appellant. Quæ nihil aliud est (ut idem Galenus testatur eodem loco, & lib. de differentiis morborum) quam inflammatio eiusdem agnatæ tunicæ, seu tunicæ os capitis, & caluariam ambientis, aut, ut vulgus Medicorum appellat, coniunctiua. Quod autem in hoc vitio oculus perperiat, ad sensum liquet, & propriè prædicta agnata tunica: quamuis iuxta Galeni sententiam eodem lib. de different. morborum, ex accidenti hoc vitium videatur esse oculi morbus, cum ad totum instrumentum non referatur: neque totius instrumenti primo morbus sit, sed in vna quadam ipsius particula similari consistat: qua etiam ratione sit, ut & ipsa videndi functio ex accidenti quoque ab ipsa lippitudine fuerit impedita: cum neque ipsa perfectè, inhaerenti membrana ta-

liter affecta absolui possit, & propterea, quod oculus afficiatur, ex ipsa videndi functione oblata argui poterit: quamuis ex accidenti (ut diximus) fuerit impedita. Non enim totius instrumenti morbus est, sed vnius tantum partis, quæ similis existit; & similium corporum morbi ex accidenti (ut Galen. inquit lib. de different. morborum) ad totum instrumentum referuntur, etiam si compositi sint, ut phlegmone. Nec quispiam vereri debet, cum è numero inflammationum sit lippitudo ipsa morbum esse compositum in quantitate, seu magnitudine primo, in intemperie secundo, ac soluta continuitate forte tertio: est nanque phlegmone quilibet morbus compositus, eodem Galeno teste lib. de differ. morb. Dignoscitur ex dolore, ipsiusque adnatæ tunicæ colore ad rubrum mutato, ad coque interdum in tumorem ea attollitur, ut ob id omnia, quæ circuncirca oculos sita sunt, vsque ad malas quandoque in vehementi lippitudine simul attollantur, ut patet 4. de comp. medic. secund. loc. lachrymæ quoque ex oculis ipsis resudant. Sed quoniam non vnus duntaxat differentia inflammatio in eadem tunica agnata excitari potest, ut Aetio, & Paulus testibus constat: maioris tamen, & minoris ratione differentes: quarum vna ὁφθαλμία, Græcè, Latine conturbatio, reliqua ὁφθαλμία, Latine lippitudo propriè, & tertia χημοσις, quam etiam & Latini chemosin dicant, nuncupantur: propterea dignoscas faciliè primam, quæ nihil aliud est (Paulo auctore) quam calor cum humiditate, & robore à natura alieno, quod non ab interna, sed à foris veniente causa aliqua orta sit, sole videlicet, fumo, puluere, aut oleo, si hæc adsint: qua de re promptissime etiam ipsa soluitur. Vera autè lippitudo non extrinsecus tantum, sed ex interna etiam causa excitatur, nec ita facile soluitur, velut perturbatio. Verum si adeo inflammatio magna sit, & dolor vehemens, ut utraque palpebræ ex vehementi inflammatione inuersæ sint, adeo ut vix oculi ab ipsis contegantur, & album oculi sublimis euaserit, rubrumque etiam magna ex parte nigrum occupet, non amplius lippitudo verè, sed chemosis dicitur. At lippitudinis veræ causæ in triplici differentia esse possunt. Nam vel ex plenitudine totius corporis, ob quam agnata ipsa tunica repleta distenditur, excitatur; vel ob influentium humorum acrimoniam, ac morsum vehementius eroditur; vel propter aliquam extensionem eius, ex crasis succis, spiritus flatuoso genitam, & proinde vehementes ex his causis excitantur dolores; ut patet 13. method. medend. Quare de re cum diximus lippitudinem inflammationem esse, phlegmonem intelligi volumus, eo modo dictam, quo generationem habere potest ex quavis redundante substantia. Dignoscas autem, si propter totius corporis plenitudinem sanguineus humor influxerit, ac iam dictam inflammationem concitauerit: quoniam cuncta (ut Trallianus testatur) rubra, & sanguinea sunt, nedum agnata ipsa tunica, sed & facies rubens, & humidior erit, venæ latiores, sensus grauitatis aderit, & pigritia ad consuetas actiones. Lachryma neque rodens, neque acris apparebit: adde quod temperamentum, & ægrotantis ætas, sanguinis redundantiam attestabuntur, nec minus & regio, & tempus anni, ac præcedens victus ratio. Verum si ex rodente, ac acri humore pronenerit, id tibi manifestabit, primum quod totum corpus plethoricum non apparebit, sed

In principio.

10. de visu partium. cap. 7. cap. 1. & 2. Quid triplici ei vitiõrum genere videndi actio lædatur.

Cur de lippitudine prius tractetur.

cap. 2. Lippitudo quid sit.

Quæ pars in ea afficiatur. c. 13

potius vitioso humore præditum; adhæc lachryma rodens, & acris aderit: quo fit, vt non solum oculorum anguli, sed etiam malæ vehementer ex tali influxu rodantur, & exulcerentur; ægrique videantur vri, exiliantque rosionem non tolerant. Nec minus ex his, quæ præcesserunt, id percipere poteris: nam tristitia, curæ, insolatus, ita, & acrimia eius præcesserunt, adieritque ætas, ac temperatura biliosa. Si autem ex redundante pituita inflammatio facta sit, grauitas erit vehemens, caliditas parua, & rubedo agnata tunica exigua, cum aqua & facies, ac eiusdem color communicabit. Similiter quæ præcesserunt, & concomitantur, pituita redundantiam arguent, quod si neque feruore, neque rosione, aut vehementi grauitate vrgente agnata oculi tunica extendatur, adeo, vt rumpi videatur, ac doleat, lachrymæque non appareant, aut parua; licet quandoque rubea videbitur eadem tunica, indicium erit spiritum esse, qui distendat, ac dolorem faciat. At si ab externa causa lippitudo originem ducat, ab ægri, seu astantium relatu percipere poteris. Verum cum magnam partem ad vitæ simul vsum, & dulcedinem conferant oculi nostri, Celfo auctore lib. 6. cap. 6. summa quoque cura tuendi sunt. Protinus autem, vt ipse refert, orta lippitudine, quædam nota sunt, ex quibus quid euenturum sit, colligere possumus. Nam si simul & lachryma, & tumor, & crassa pituita coeperint, si ea pituita lachrymæ mixta est, & ea lachryma calida est, pituita vero alba, & mollis, tumor non durus, longæ valetudinis metus non est. At si lachryma multa, & calida, pituita paulum, tumor modicus, idque in vno oculo est, longum id, sed sine periculo futurum est: Idque lippitudinis genus minimè cum dolore est, sed vix ante vigesimum diem tollitur: nonnunquam per duos menses durat, sed quandoque finitur. Præterea si pituita alba, & mollis esse incipit, lachrymæque miscetur, aut si simul hæc vtrunque oculum inuaserunt, potest esse breuior sed periculum vlcis est. Pituita autem sicca, & arida dolorem quidem mouet, sed maturius definit, nisi quid exulcerauit. At tumor magnus si sine dolore est, & siccus, sine vilo periculo est, si siccus quidem, sed cum dolore est, ferè exulcerat: & nonnunquam ex eo casu fit, vt palpebra cum oculo glutinetur: vtrum autem Cellum apud Hippocratem hæc eadem leguntur, libro secundo, prædictionum. Non ab re etiam Galen. libro tertio, method. medend. maximam habendam esse curam circa lippitudinis curationem præcepit, cum ex curationis errore, quosdam ægrè consuleque vidisse euenit: tempore vero, suffusione, quam ὑπόζυον vocant, vel pupillæ nimia dilatione, quam μὲν πλάσιν appellant, vel tabe, vel corrugatione, quam ποτὶδ ὥσιν nuncupant, fuisse occupatos, ex vfu potissimum stupefacietum medicamentorum. At hyme sicca, & aquilonia existente, vere autem pluuiofo, & australi, quod necesse sit præcipue mulieribus, & viris natura humidioribus, æstate lippitudines fieri, decretum reliquit Hippocrat. aphor. 11. 3. libri, & aphorif. 17. sexti libri. Lippientem (inquit) alui profluuii corripit bonum. Quidam autem volunt, quod in regionibus meridianis, multiplicetur, & remoueat veloxiter lippitudo, superueniente autem eis frigore, quod difficilis eadem ipsis fiet, præterea quod in regionibus, & temporibus frigidis lippitudo minoratur, verum ea,

quæ oritur, praua sit. Primo itaque die pro eius curatione, æger loco obscuro cubare debet, iuxta Celsi sententiam, sic vt à sermone quoque abstineat. Nam visionis instrumentum splendorem citra molestiam tolerare non potest, Galeno teste libro primo de causis sympto. & decimo de vfu partium (quo loco exemplis illud comprobauit tum militum Xenophontis, qui cum per multam niuem iter fecissent oculis læsi fuerunt: tum Dionysij Sicilia tyranni, qui super carcerem domum clarissimam, ac longè splendidissimam construxerat, in qua diutissimè infimo, ac caliginoso loco carceratos educebat, atque ita cupidè lucem intui occubantur.) Recreatur autem potissimum nigro, & cæruleo, aut viridi. Frigidus autem, aut calidus eligatur aer, non tamen immodicè, pro causæ ratione. Somno moderato vtantur ægri, & præsertim nocturno. Exercitium vitent, quietem eligant; procurantque singulis diebus alui excrementa excernere, ita vt aluus si non natura, artè saltem lenior reddatur clysteriis lenibus, seu glandibus. Animus affectus omnes proculdubio vitent immodicos, à coituque abstineant. Parco vtantur cibo, ac potu, præsertim inter initia: imò si fieri potest nullum cibum (Celfo auctore) sumere debent, ne aquam quidem: sin minus, certè quam minimum eius: nam prima omnium (vt ipse testatur) in eiusmodi casu sunt quies, & abstinentia. Qualitas autem cibi eligatur eius qui humorem generat laudabilem, eos vitando, qui vaporosi sunt, ac tardæ concoctionis, & proinde carniū potissimum, quadrupedum animalium, lactisque vsum vitandus erit: cauendumque ab acetosis, salis, ac acerbis. Pro potu, abstinentium à vino est circa initia, potissimum veteri, ac vinoso, sed aqua vtantur, in qua coriandrorum præparatorum semina, seu hordeum, aut cinnamomum fuerint decocta, aut multæ permissionis aqua mulla, præsertim cum ex crassioribus humoribus lippitudo fiat, ac tempore anni frigidus: quo casu & vino quoque vti poterunt, albo tamen, & adstringenti, tenui, & aquoso. Quo verò ad medicamentorum rationem atinet, breuissimo quodam sermone seu potius oraculo Hippocrates aphor. 31. 6. lib. ex quacunque causâ vera lippitudo oriatur, decretum reliquit, dum dixit, Dolores oculorum meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut medicamentum epotum soluit. Quamuis eorum tempora, & causas (Celfo auctore) parum explicuit, in quibus, vt ipse testatur, medicina summa est, & si in eo aphorif. nihil, vel falsum, vel quod fieri non possit, præcipiat, tertio method. medend. testatur Galenus. Verum quo pacto discernendū sit, quando, quomodoque dictorum quoque sit vtendum, in commento eiusdem aphorif. idem Galenus perbellè declarauit, iubens inquirendas esse dispositiones, in quibus meri potio, aut balneum, fomentum, venæ sectio, aut purgans medicamentum vniuersum sit. Quoniam (Aëtio teste) non eidem homini omnia auxilia hæc adhiberi iubet Hippocrates: sed alij venæ sectionem, alij purgatorium pharmacum, alij fomentum, alij balneum, alij vini potum. Et proinde cum ex plenitudine ortum duxerit, quæ distentione dolorem efficit, si nihil ex saepe relatis impedit, venæ sectio confert, eodem Galeno teste decimotertio method. quem sectati sunt Aëtius, Paulus, Alexander, ac Celsus. Venam autem secare oportet cubiti exteriorem, humeralem

Curatio.
Vltimū ratio.
1. de caus.
symp. cap. 2.
10. de vfu
partium.
cap. 3.

Medicamē
torū ratio.

cap. 2.

Lib. 7. ca. 5.
Si ex plenitudine
fiat.
Vena sectio.
Chio.
13. method.
cap. 22.
Aët. lib. 7.
cap. 8.
Paul. loc. cit.
lexand. ac
Celsus cap. 16.

appellatam, atque eam, quæ ex directo est laborantis oculi: cum oculorum persæpe dolores grauissimos è directo venarum quam humeralem nominant, sectio intra horæ vnius spatium compescuit, vt libro de curandi ratione per venæ sectionem, Galenus testatur, & propterea dolentibus oculis (vt ipse inquit) humeralis vocata vena, quæque ex ea deriuata est, in cubito incisa luculentum celeriter commodum afferunt; & vsque ad animi deliquium, vbi vehemens fueris inflammatio, sanguinem auferre idem permittit Galenus: interim verò eadem vehementiori non existente, viribusque nõ admodum robustis, nec ætate florente, iteratò sanguinem mittere, post modicam sanguinis missionem, iussit, interdum eodem die, si ita expedire videatur, interim posttridie. Atqui nos stante totius corporis plenitudine, median venam prius secare consulumus: cum vix, aut fortè nunquam cuncta ea concurrant, quæ vsque ad animi deliquium, sanguinem auferre admittant. Quæ demum peracta, ad humeralem incidendam deuenias. Neque illud pugnare prænominatis auctoribus censemus. Nam supernis duntaxat partibus sanguine repletis, aut ætate, ac viribus, & reliquis non prohibentibus, eorum dicta veritatem habere putamus. At si cuncta hæc simul non conueniant modo quo diximus, sanguinem mittere tutius esse nemo vcreri debet; & si oportuerit, non semel tantum, sed bis, aut sæpius, humeralem venalem secabis, ac cum scarificatione cucurbitulas in occipitio affiges. Conueniet insuper prædictos infernarum partiũ frictione curare: & si necessitas ali quando vrgeat, vincula artubus adhibere, & alui deiectione procurare, ex Gal. sententia eodẽ 13. meth. potissimum si biliosi, & acres humores cum sanguine redundarint: quo casu paulò post sanguinis missionẽ, purgationẽ adhibebit, Tralliano teste: mox fomenta ipsi laboranti particulæ ex aqua dulci modicè calida adhibenda sunt, vt eodem 13. meth. liquet. Admouendaque insuper sunt circa initia phar macæ repulsoria, quæ non vehementem fortita sint adstrictionem. Sed tum propria eorum substantia sint moderatiora, tum lenitiui liquoris admistione adhuc magis talia fiant, potissimũ si vehementi dolore afflicti sint ægri, aut propter inflammationis magnitudinem, aut ob influentium humorum acritudinem. Cauenda tamen sunt, quæ vehementẽ fortita sunt adstrictionem, vt diximus, cum ampliore dolorem infligant, tunicas exasperando, quam iuuent influxionum impetum repellendo: quæ verò mediocriter adstringunt, lippitudinibus iam dictis commodissima existunt, vt patet 4. de comp. medic. sec. loc. Hippoc. verò lib. de vsu humorum dicebat, vbi modica potabili in spongia vteris, optimũ oculis est. Lenitiui autem liquores, quos dixi tabulis admiscendos esse; sunt, eodem Galeno auctore prælegato loco, & 13. meth. medend. albus oui liquor, fœnigræci decoctũ, & ad hæc lac ipsum, quod iuuenclæ, simulque boni succi fœminæ existat, vberibus ipsius in cotem, in qua collyrium teritur, expressis, quò calidũ adhuc oculis infundatur. Ab eis verò anodynis, hoc est, quæ sensum auferendo dolorem sedant, summopere cauendum esse censeo: cum ipsa neque vehemẽtes reprimat fluxiones, sed excerni prohibeant: atque adeo si humores fluẽtes acres extiterint, corneam erodi contingit, si verò multi, magis irritari, ac vehementer extendi, ac

si rumperetur: ex quibus nisi medicamentum fuerit summopere stupefaciens, dolores impatibiles excitantur, Galeno teste com. aphorif. 31. sexti libri. Si verò fuerit adeò vehementer stupefaciens, vt ex oculi maximã inflammationem non sentiant, necessarium est simul quidem vim visoriam ostendi, adeò quòd cessante inflammatione, vel debilitate, vel nihil omnino videant, simul autem & quandam præduram dispositionem, & quæ difficulter sanari possit, in oculorum tunicis derelinqui: hæc de re suspecta habenda sunt talia medicamẽta, neque liberatius admouenda, etiã si ingens dolor vrgeat. Sed à vehementibus stupefacientibus abstinendum erit: quibus si fortè vrgeat maxima necessitate fueris visus, postmodum sanitaris tẽpore oculi exsalfaciendi sunt, velut & reliquæ partes omnes, si eis talia applicuisses, vt patet 12. meth. med. Frons tamen illinienda erit ex plantaginis, solani, seu semperuiui succo, oui candido, rosaceo oleo, vel aqua, bolo armen. ac pauco aceto. Poterũt insuper misceri thus, santalũ, hypocistis, balaustũ, ac hordeacea farina: interim & croci parum: mirificeque dolorẽ finit, admouẽque feruẽtes oculorum inflammationes concoquit, Tralliano teste, ex lacte muliebri, vitellis ouorum, & rosaceo, simul mixtis, superimpositũ medicamẽtum. Iterum & crocus cum mica panis, luteisque ouorum, ac rosaceo, vice autem rosacei aqua rosacea, præsertim rosarum albarũ, vtere. Quod si imponi cataplasma res aliquando sua debet, papauerũ capitibus in aqua discocctis, ac fœnigræci, vel hordei, vel lini seminis farina aquæ immista, cataplasma conficies, ex Galeni sententia eodẽ duodecimo metho. med. quo item in vehementi aurium dolore vti poteris. At si ex vehementi acris humoris confluentis rosione dolor prouenerit, inflammatioque excitetur, si quodammodo cum sanguine iidẽ permisti sint, venam prius secare humeralem oportet, reuulsionis saltem gratia: dein purgantibus medicamentis, deorsum scilicet, & reuellẽdo, & euacuãdo curare conuenit: potissimum vbi biliosa humorum prauitas in toto corpore superare videatur: tunc nanque his, quæ totũ corpus purgant, recrementisq; liberant, vitor, Tralliano teste. Nam si recrementa acra non in toto redundant corpore, sed qualitate potius, quam quantitate peccare videantur, solis balneis dulcis aquæ, & temperatis, ægrum citra dolorem liberabis, eodem Alexandro auctore: quem admodum quẽdam liberauit tali dolore affectum, ex acrium videlicet humorum influxu, non tamen totius corporis eorundem plenitudine, Galenus solo balneo vsus, vt idemmet testatur commento aphorif. 31. sexti libri. Verũ vbi in toto corpore, non qualitate duntaxat, sed quantitate etiam biliosus succus redundat, & euacuari ipsum, & ad infernas partes reuellere oportet, purgantibus videlicet medicamentis, quæ ipsum expurgare valeant, manna scilicet cum tamarindorum decocto, aut casia fistula, seu syrupo ex pluribus infusionibus rosarum, vel violarum, cum diacatholico, ac reliquis huiusmodi medicamentis: nec minus & ante, & post medicamenta prædicta alterantes syrups præbendi sunt, pro antedicti humoris acrimonia, seu mordacitate domanda; velut violaceus, rosaceus, ex papauere, seu nymphaea confectus, aut intybi succo. Demum ipsi particule candidus oui liquor infundendus erit, quo per eum acris fluxio sine offensa eluatur, iuxta Galeni sententiam

Renellitia.
cap. ult.
Topica quæ
lia in prin
cipio esse
debent.
cap. 22

Quæ cauẽ
da sunt.

4. de comp.
pos. medic.
secum. loc.
cap. 1
Lenitiui li
quores qui
sunt.
13. metho.
cap. 22

13. metho.
cap. ult.

cap. vi

1. 1. 2

cap.

13. 22
ex cras.
succo
cara.
cap. ulto

cap.
Si
de
e
13. 22

Topica
quæ
lia esse
debent.

13. metho.
cap. ulto.

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

cap. 1

13. method. tiam 13. meth. ac Pauli cap. 22. tertij libri. Atqui magna cum consideratione videntur veteres hoc casu, ad oui devenisse humorem, cum minime mordens sit, & glutinosus: & propterea lenire asperitates omnes, quascunque acris fluxio excitat, valet. Accedit ad hæc, quod cum crassus, ac lentus sit humor, constantius quam tenuis, & aquosus, in loco permaneat, & cum absque ratione sit, si modicè incaleat, dolorem maximè leniat, vt eodem 13. metho. med. cap. ult. patet. Nec minus & lactæ iuenculæ fœminæ, quæ boni sit succi, vt poteris: connumeratur etenim & ipsum inter lenitiuos liquores quarto de compositione medica. secundum loc. vt diximus. Adhæc id ipsum cum tenui oui humore, rosarumque albarum stillatitio liquore, seu aqua permistum commodum erit medicamentum, non semel tantum, aut bis in die, sed ter, quater, & sæpius applicatum, vbi vehementior dolor vrgeat, tenuibus lineis linteis in eo madefactis. Vbi autem concocta iam phlegmone ipsa fuerit, & simul corpus vacuum, tum vtique lauaciones in balneo his sunt aptissimæ: nam & dolorem statim sedant, & fluxionem quæ ad oculos fertur, sistunt: maxima quidem eius parte inter lauandum per totum corpus excreta, reliquo verò diluto ex Galeni sententia eodem 13. method. med. At si ex crassorum, frigidorumque humorum redundantia, statuosæ spiritus lippitudo oriatur, vacuato prius in his quoque toto corpore, auerforque humorum momento deorsum, ipsam curabimus, Gal. decreto, eodem 13. method. med. Euacuabitur autem corpus totum, si pituita redundarit, ea prius præparata, ac concocta, cum his quæ ipsam purgant, quæ in cap. de dolore capitis ex pituita reperies. Nec secus si succus redundans melancholicus sit, cum his quæ ipsum purgant: quemadmodum cap. de melancholia docuimus. Illud tamen non prætereundum in vtraque redundantia, quod si cum sanguine commisti fuerint prædicti frigidi, & crassi succi, ante purgationem, aut media, aut humeralis vena secanda erit; deinceps purgatio adhibenda. Si verò à sanguine absoluti sunt, purgatione duntaxat vtaris: deorsum autem humorum impetum auertes frictionibus vehementibus, vinctulis, ac cucurbitulis. Abhinc mox localibus remedijs vtendum, non tamen iis medicamentis, quæ repercutiunt, ac reprimunt, imò iis, quæ euocant, atque digerunt, vt eodem 13. meth. scriptum reliquit Galenus, & Paulus libro tertio cap. 22. Qua de re fouendi sunt oculi ex fœnigraci decocto, eo prius curiosè lauato, nequid illi, vel pulueris, vel sabuli adhærens clam lateat. Est namque medicamen hoc, Galeno teste, omnium maximè quæ oculis applicantur, sine offensa digerens, simile quidem existens quoad viscositatem attinet, albo ouorum liquori, discussoriam tamen habet facultatem, & moderatè calfactoriam: & ob id multos dolores mitigare consuevit, vt patet quarto de compos. medic. secundum locos. Est præterea fomentum oculis ipsis omnino adhibendum per spongiam semel aut bis, ter, aut quater, vel sæpius in die, prout vehementior dolor vrgeat. Fit autem interdum fomentum non per fœnigraci duntaxat, sed meliloti, & eiusdem fœnigraci decoctum. Verum meminisse oportet, quod priusquam totum corpus purgaueris, nec iam dicta, nec aliud vllum medicamentum digerens, nedum oculis, sed nec alijs quibuscumque partibus applicare debes, vbi in toto corpore redundantia subest: im-

plebunt namque potius, quam educent, iuxta Gale. cap. citato. sententiam eodem 13. metho. Qua de re expurgato toto corpore à redundantibus succis, crassis, ac frigidis, non modò fœnigraci decocto, verum etiam & alijs digerentibus, ad discutientibus, seu euocantibus medicamentis vti poteris, velut si in aqua scœniculi, eufragiæ, & albarum rosarum drachm. j. lotæ pompolygis, quam Medicorum vulgus tutiam appellat, aloësque non lotæ drac. s. dissoluas, aut si sarcocollæ in lacte asinæ, seu mulieris nutriciæ drac. j. assumas, aloës scrup. j. pōpholygis drac. s. & in vnc. iij. aquæ fœniculi & rosarum dissoluas. Similiter si aloë ipsa sola in aqua rosarum, & fœniculi dissoluta, quantitate moderata vtaris. Quod si totum corpus mediocri habitu in humorum tum qualitate, tum modo fuerit, sed caput tantum humorum redundantiam ad oculos transmittat, ipsum prius sanandum esse cōstat, eius affectu explorato, quem superfluorū generatio comitatur, vt eodem 13. met. med. liquet: quinimò diutinas oculorum fluxiones curamus, oculis ipsis dimissis, atque ad capitis curationem cōuerfi. Quod si eius vitium ex genere intemperantiarum fuerit, ex sibi contrariis curatio fiat. Plurimum namque vel frigida intemperies caput vitiat, vel humida; neque dubium est, quin ambæ etiam congregiantur, vt eodem decimotertio metho. & secundo de locis affectis, clarè patet: rariiores autem sunt, quæ propter calorem, acrem oculis fluxionem immittant. Conducit propterea iam dictis medicamentorum vsus, interdum quæ per nares, & os pituitam eliciunt, appellantur autem errhina, & apoplegmatisimi, quorum sæpius in prædictis mentionem fecimus. Vbi verò nec in toto corpore humorum copia adfit, nec à capite fluxio ad oculos fiat, verum crassus sanguis oculorum venulas intendat, eosque squallidos habeant, & propterea valde tumidas, ac plenas sanguine (vt diximus) balneum eis præcipiendum temperamentum erit, quo meatus exaltacere, & laxare valeat: ac deinde vinum meratius exhibere, quo nedum exaltacere, & meatus aperire valeat, verum sanguinem effundere, atque euacuare potens sit, & sui motus vehementia obstructions aperire, iuxta Galeni sententiam aphor. 31. sexti lib. quam confirmauit Alexander Trallianus, cum dixit, Post temperatum balneum vini potio facilè in totum corpus, partesque superiores distribuitur, vt nonnihil eorum, quæ obstructionem pepererunt, non modò calore ipsius, sed etiam motus celeritate extenuet, & expellat, simulque etiam particularum (vt diximus) imbecillitatem cōfirmet, vt ipse quoque partem aliquam illorum, quæ insident, extrudere possit. At si vini potione vt metuat æger, fomentum potius ex calida (cum sit tutissimum, & omnino aliquam asserens vtilitatem, vel tanquam causa sanitatis oculorum, vel tanquam signum ad dignotionem) adinueniendum erit: sitque id ipsum aut ex calida aqua, vel fœnigraci, fertulæ campanæ, seu chamæmeli decocto, aut demum cunctis simul commistis. Vbi namque ex eisdem fouebis oculum, nihilque influit, constat totum corpus recrementis esse vacuum, ac fomentis insistendum esse, quoniam discutiens eam, quæ in ipsis continetur, superfluitatem, oculis in totum sanitatem restituit. Sin autem humor influat, & dolor, cum primum fomentum adhibetur, suo calore paulum remissus sit, sed paulò post iterum intendat, tunc tanquam signum dignoscituum proderit, ex quo

nos dispositionem comprehendentes, quod euacuatione indigeat ager, ad totius corporis euacuationem peruenimus, aut per venæ sectionem, eo magis plethorico existente, ac sanguine redundante, aut per purgationem, si vitiosi humores infestant: neque enim difficile est admodum alterum ab altero distinguere, & propterea inter omnia connumerata fortia remedia doloris oculorum aphorif. 31. sexti libri ab Hippocrate, tutissimum est fomentum ipsum ex Galeni sententia in commento eiusdem aphorismi. Raro autem contingit spiritum duntaxat flatuosum agnatam tunicam distendentem ophthalmiam causare: verum si contingit, vaporacionibus ex milio, aut milio & fursure facellis paratis, curari poterit: aliisque digerentibus, euocantibus, ac dissicientibus medicamentis. quæ autem adstringunt, ac repellunt, vitare oportet Galeni decreto 13. method. medendi. In quibus verò chemosis fortis contingit, oui luteū cū muscæ carne terito, atque vbi ad cerati formam deducta fuerint, linteolo excepta impone, & confestim sedant, Galeno teste quarto de compositione medicamentorum secundum locis.

Si ex flatu
tuofo duntaxat
spiritu fiat,
curatio.

cap. 22.

cap. 8.

Περὶ τῆς πteryγῆς. De vngue oculi.

CAP. XXI.



INTER alias affectiones agnatæ tunicae ea à Medicis connumeratur, præsertim ab Aëtio, quam τῆς πteryγῆς Greci vocat, à Latinis, utpote à Celfo lib. 7. cap. 7. vnguis nuncupatur. Vnguis autem Medicorum, vngulam appellat, qui (eodem Celfo auctore) membranula nervosa est, oriens ab angulo oculorum, quæ nonnunquam ad pupillam quoque peruenit, eique officit, sæpius à narum, interdum etiam à temporum parte nascitur. Paulus verò libro tertio cap. 22. vnguem dixit esse membranulam quandam nervosam oculis sese obtendentem, quæ ab angulo quidem oritur, sed adusque pupillam peruenit, eamque vbi fuerit adaucta, obtegit: & libro sexto cap. 18. dicebat. pterygion nervosa membrana est, quæ ab oculi angulo maiore ut plurimum initium capiens, per minorem ad exteriora progreditur, officitque oculo, motum ipsius, & bulbi contractionem impediens, & quod progrediens totam pupillam contegat. Est itaque membrana hæc nervosa, ut ex iam dictis patet: incipit autem eius augmentum sæpè ab angulo magno appellato, iuxta nasum; rarius autem à paruo, & adhuc rarius à superna, vel inferna palpebra generatur, Aëtio teste: extenditurque vsque ad nigrum ipsius oculi, & cum maior facta fuerit, etiam pupillam contegit, & visum impedit, & propterea non ex accidenti, sed primaria ratione pupillam obscurat, visus aciem aut vitiosam reddendo, aut omnino auferendo, iuxta Galeni sententiam primo de causis symptomatum. proprius propterea, & compositus est oculi morbus pterygion, totius videlicet instrumenti primò, cum eodem tempore multæ partes ipsius in eo afficiantur, ut libro de differentiis morborum liquet. Nam licet in agnata tunica primò oriri incipiat, corneam tamen attingit; vbi plurimum increuerit, pupillam obscurat, visumque impedit. Ex cuius visus impedimento satis admodum constat oculum ipsum in hoc vitio affectum esse secundum plures partes ipsius: nam & agnata tunica primò, cornea secundò, & pupilla tertio oblaeditur. Et

I. de caus.
sym. cap. 2
cap. 13.
Quæ pars
afficiatur
oculi.

propterea ipsius oculi tanquam instrumenti primò, compositus morbus est pterygion, propter eam, quam diximus, rationem, in numero videlicet, ac in excessu (non tamen toto genere præternaturam, ut est lapis in vesica, & lumbrici) eo quod primaria ratione, & non ex accidenti pupillam obscurat, ut eodem libro de differentiis morborum liquet. & quamvis nullis opus sit signis, quibus vitium hoc deprehendatur, cum ad sensum pateat: cum Aëtio tamen dicimus, quod in hoc malo album in oculo amplius augeat, aut caro superexerescit, ex scabra quadam lippitudine, aut assiduus fluxionibus. Cuius itaque occasio magna ex parte scabra præcedens lippitudo est, aut assidua crassorum, lentorumque humorum fluxio, hunc recentem, ut Celsus ait, non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inueterauit, iamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet, faciliusque curationem recipiunt pterygia, quæ tenuia sunt, & alba, ex Pauli & Aëtii sententia: qui etiam Paulus asserit magnos, & inueteratos vngues solam manum exposituare, recentiores verò, & magnitudine mediocres, præfidiis elidi abstergentibus, qualia aspritudini idonea sunt, & albuginibus. Similem sententiam scripsit reliquit Aëtius, dum dixit, Cæterum ex pterygiis ea manu curare oportet, quæ aucta ad nigrum se extendunt; quæ vero parua, & in albo sunt, ea conandum est, ut pharmacis comprimamus. Similiter quod neque crassa pterygia curanda sunt, & euersa, & ementia, ac indurata, & quæ tempora per consensum afficiunt. Sunt enim, ut ipse asserit, maligna, & cancerata. Vniuersa victus ratio talis præcipienda erit, quæ crassos, ac lentos humores extenuet, atque incidat: particulatim autem ex præcedentibus petas, præsertim cap. de dolore capitis ex pituita, ac de lethargo. Quatenus autem ad medicamentorum rationem attinet, relictis magnis, & inueteratis vnguibus, qui solam manum expositulant, Paulo teste, ac ab eodem curationis modum discas libro sexto cap. 18. similiter & à Celfo cap. 7. lib. 7. recentiores, & magnitudine mediocres curare docebinus, qui abstergentibus medicamentis, ut idem Paulo visum est, ac iis quibus cicatrices in oculis extenuantur, curari possunt, Celfo auctore. Prius tamen vniuersum corpus à crasis, lentisque humoribus purgandum erit, & non nisi primò assumptis iis medicamentis, quæ crassos, & viscidos humores extenuandi, & incidendi vim habeant: crassi namque & lenti succi purgari non debent, nisi præparati prius fuerint. Horum autem præparatio ex iam dictis medicamentis fieri debet, & demum iidem purgandi; quorum purgantium medicamentorum materias iterum ex præcedentibus capitibus studiosi petant: neque enim decens est semper eadem repetere. Ab hinc fouendus erit vnguis, aut ex aqua temperatè calida, aut ex hordei, maluarum, althææ, & chamæmeli, seminis lini, seu fœnigræci decocto, quoad oculus calfiat. deinde quæ obsterunt medicamenta admoveantur, ac repurgant. Inter quæ tanquam modicam habens abstergendi vim, est thus ipsum in tenuissimam puluerem reductum. Item & sæpe testa vsta cum sale ammonico (ut Aëtio placuit) aut si cum pumice torrefacto, vinoque leuigato illinatur. Vehementem autem absterforiam facultatem habet æs vstum; itemque squama eius, & flos, ac calcitis quoque vsta, Galeno auctore.

Qui
natus
fuit
Loro
Signo
dem

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

cap.

autore quarto de compositione medicamentorum secundum locos, cap. quarto. Verum si talia pharmaca leuentur, exterioria quidem adhuc manent, sed tantò efficacia imbecilliora, quantò mordacitatis magis expertia sunt, ut eidem Galeno visum est. Non absque ratione itaque eisdem primò vestis, ac lotis vtire, deinceps si eis malum non cedat, non locis: & si opus fuerit, chalcantho, seu atramento sutorio vtare: nam vltum primum, & lotu in adhiberem, & si non suffecerit, vestum duntaxat. Interea verò, quæ citra mordacitatem extergunt ex sententia eiusdem Galeni eodem loco connumeratur cerui cornu vltum, & etiam caprarum: quæ de re circa initia eisdem vti possumus, ac cum thure mixtis. Nec erit absonum, cum eisdem medicamentis, præsertim generosè abstergentibus portionem quandam miscere tragaanthi, seu gummi: sunt enim mordacitatis, ac acrimonie expertia pharmaca, velut fœnigraci decoctum, tenuis ouorum liquor, & lac, ut planè constat, eodem quarto de Compositione medicamentorum secundum locos, cap. 4. Paulus verò as combustum, vel atramentum sutorium similiter combustum, cum gummi parte quadam, ac porcino, seu caprillo felle mixtum, tanquam efficax medicamentum approbat. Aëtius autem as vltum cum pueri incorrupti vrina commendat: & Trallianus lepiæ testam crematam, leuigatamque simul cum sale fossili. Et hæc commemorasse sufficiat medicamenta pro pterygij citra chirurgiam curatione: nam si ea indigeat, curationis modum scriptum reperies non modò à Paulo & Celso (ut diximus) verum etiam ab Aëtio libro septimo cap. sexagesimo.

De fugillatione.

CAP. XXII.

EX genere effusionum, quas Græci *εὐρυμωρία*, & *εὐρυμωρία* appellant, est affectus is, qui ab eisdem Græcis *ὀφθαλμική εὐρυμωρία* dicitur à Paulo *ὀφθαλμική*, Latini autem oculorū fugillationem, recentiores verò medici oculi maculam nuncupant. Nec alia ratione hoc vitium sub oculis gignitur, velut nomen ipsum indicat, quàm in reliquis nostri corporis partibus, cum videlicet tenuibus circa cutem vasis confusis, aut quomodo libet ruptis, sanguis ipse effunditur per fissuras in spacia quæ circum eadem vasa circumiacent, non vno loco acervatim, ac statim ita excretus, Galeno teste quinto de Compositione medicamentorum secundum locos, cap. primo, in grumos coiens, sed postquam per subsultationem, hoc est *διαπίδνωσις*, ut ipsi appellant, effusio ipsa facta est: contingit sane aliquando, ubi ita coierit, temporis processu liuescere, ac denigrari, parum nimirum grumulis ex disperso in multas cutis partes sanguine coactis. Quæ de re Aëtius oculi fugillationem dici asserit, cum ex ictu, seu plaga quadam, potissimum ruptis, aut confusis vasis in oculorum tunicis, sanguis sub tunicam subierit, & statim quidem cruentus color oculi fuerit, postea verò liuidus. Quod verò in hoc malo oculus afficiatur, nomē ipsum indicat, at quod particulatim agnata tunica, seu cornea dicta, indifferenter affici possit; quæ exteriores quidem oculi tunicæ sunt, modus generationis eius ostendit: sensus quoque indicat, quæ earum fuerit affecta, alijs indicijs non indigens, nam sub qua tunica

cruentus statim, postea verò liuidus color apparuerit, aut niger, eadem affecta erit. Verum si ex fugillatione videndi functio non impediatur, symptoma eam esse dicimus in genere affectus corporis, eorū scilicet quæ ad visum pertinet. At si visionem impediat per se primò, utpote magna existens, & subcornea potissimum, asserimus non symptoma esse, sed morbum in numero, seu quantitate, siue autem symptoma siue morbus fuerit malum ipsum, statim visu comprehendi poterit: nam cruentus oculi color videbitur circa initia, progressu verò liuescens, aut nigricans; putantque ægri rubra omnia quæ aspiciunt, cuius mali immediata causa est, vasorum ruptio, aut confusio. Eorum autem ruptionis causa, potissimum externa, ex ictu seu plaga est: quamquam licet rarò, & interna esse poterit, ut nimia eorundem vasorum repletio, aut ipsiusmet sanguinis in eisdem venis contenti feruor exuperans, quarum causarum discretionem haud difficulter assequi poteris, externas videlicet ex ægri, seu astantium relatione percipies, internas verò ex teipso perpendes: quibus perceptis confestim ad eius curationem, priusquam denigrescat, Galeni decreto, eodem quinto de compositione medic. secundum locos, festinare debes. Nam si in grumos sanguis coierit, ægerimè discuti potest, & temporis progressu liuescit oculus, atque denigratur. Venæ itaque sectione (si opus fuerit) aut purgatione (si ea ægri indiguerint) præmissa, confestim pro eiusdem affectus curatione ad topica medicamenta deveniendum erit: quæ non modò discutiendi vi prædia esse debent, verum parum quiddam ex astringentibus miscendum erit; quoniam vasorum tunica, ex quibus sanguis exilit, disrupta est: quare si ex sola simplici facultate discussoria pharmacum à principio adhibeatur, non solum quod effusum est, discutiet, sed & per fissuras aliquid attrahet ex sanguine in contulis venis contento. Postquam verò in suam naturam redierint venulae, ad discussoria pharmaca citra astringentium admisionem, oportune transeundum, ex Galeni sententia, eodem quinto de Compositione medicamentorum secundum locos, ca. 1. quinetiam & ex ipsis discussoriis pharmacis imbecilliora primùm adhibenda esse idem consulit Galenus, fortiora verò inueteratis, & denigratis admoenda. Instillatur itaque prædictis in oculo (Pauli decreto) sanguis palumbi, vel columbæ, vel calidum lac muliebre, cui thuris paululū sit adiectum, aut cadidum oui tepidum infunditur, ut Aëtio visum est, vel sanguis turturis, seu columbæ, Celsus verò prædictis sanguinibus tanquam optimum anteponit hirundinis sanguinem libro sexto cap. 6. circa finem: quavis reliquos quoque tanquam commodos approbet, sequentibus autem diebus oculus sæpe fouendus erit per spongiam cum absyntij, aut hyssopi decocto, iuxta eiusdem Aëtij sententiam, aut sertulæ campanæ, & fœnigraci primùm, postea etiam ipsius tantum fœnigraci decocto, iuxta Gale. decreta, eodem quinto de compos. medic. secund. loc. Post quæ brasicæ folia decocta, & contrita superimposita profunt, & caseus recens parum per salus pari modo impositus, cum & ipse mixtam quandam habeat facultatem, quare nihil absurdi erit, eo etiam in principio vti. Eiusdem quoque generis sunt rosæ, melilotum & crocus, ut eodem quinto de Compositione medicamentorum secundum locos liquet. Inueteratis autem fugillationibus, & denigratis for-

Quis afficius præter naturā sit.

Signa.

Causa.

cap. 1. Prognosis. curatio. Topica qualia esse debeant.

Loco citato.

Citato loco.

tio-

riora discutientia medicamenta admouenda erunt: inter quæ sunt raphanus, hyssopum, myrrha, aridix, origanum, myrica folia, & fructus, cardamomum, & reliqua innumera, quæ à Galeno præcitate loco connumerantur: ex quibus idonea medicamenta parari poterunt.

Περὶ ὀφθαλμῶν ἐλκῶν. De oculorum ulceribus.

CAP. XXIII.



Num quidem genus est vlcereum in oculis, vt Paulus testatur cap. 22. tertij libri, quamuis differentia specificæ diuersa sint, ac diuersimode nuncupentur, vt idemet auctor asserit, prout diuersa eiusdem oculi partes exulcerari contingit, non vno etiam modo. Nanque tunica agnata interdum, interim corniformis, aut angulorum aliquis, seu palpebra eadem affectione laborant, quemadmodum Seueri autoritate affirmat Aëtius. Quæ verò prædictarum partium exulcerata sit, haud difficile dignosci poterit: cum & præter sensu visus diiudicetur. Ipse verò affectus morbus est in genere solutionis continui, visionem incommodans, si fuerit notari dignus, non solum ob id, quod redundantem humorem coaceruat, sed etiam quia efficit, vt cristallinus humor ex breui spacio cogatur cum circumfuso splendore conuersari, Galeno auctore libro primo de Causis symptomatum, cap. secundo, præsertim si in corniformi genitum sit vlcus, & quod procedens quoque ad interiora vlcus versus pupillam, aliquid aquosi humoris foras effundit, atque hinc imminet periculum, ne sic affectus, ad extremam perueniat cecitatem. Cuius exulcerationis causa, aliquando externa, ab aliqua videlicet re ad oculum illabente esse poterit, aliquando interna, puta ex acrimie humorum erosione, à qua magna ex parte fit. At si externa fuerit causa, facile ex ægri, seu astantium loquela percipitur. Verum si ex acrimie humoribus, ac causa interna fiat vlcus, ex qualitate doloris, pruriginosa videlicet, aut punctoria, redundantis succi qualitas inuestigari poterit, ægri ætate, ac temperamento, & victu, regione, anni tempore, æris constitutione, ac reliquis non prætermittendis. Quantum verò ad prognostica attinet, satis sit nosse, quod vulnus seu vlcus corniformis tunicæ periculosius sit, quam reliquarum partium oculi: & si ea ipsius pars, quæ pupillæ obiecta est, fuerit vlcera, si vulnus ad interiora descendit, magna ex parte taliter affecti obcæcantur, Galeno teste eodem primo de Causis symptomatum, cap. secundo. Quæ verò vlcera in agnata tunica oborta sunt, non adeo periculum afferunt, velut prædicta. Cæterum siue in corniformi, seu agnata tunica, siue palpebris, aut oculorum angulis, aut quacunque alia oculi parte vlcus fieri contingat, eandem secundum genus curationem requirit, quam & alia vlcera: quamuis ob partis naturam quam lenissima adhibenda sint medicamenta, iuxta Gale. sententiam quarto de Compositione medicamentorum secundum locos cap. tertio. Nam medicamentorum sylua, quæ propriè ad oculorum vlcera pertinet, vt idem testatur Gale. item scopum habet, vt vlcus mundum seruetur, vt pote partium natura ipsum explente, & ad citatricem perducen- te, quemadmodum in aliis vlcerebus videre licet, v-

niuerso tamen corpori præ omnibus prouidentia adhibita, quo id quod redundat in habitu tollatur, Aëtio auctore, per venæ sectionem corpore existente, pleno, humeralis, seu mediæ venæ eiusdem lateris, aut per purgationem, si humorum aderit acrimonia ex quibus vlcus fuerit exortum, siue per clysterem. Quod si cunctis his opus fuerit, omnibus etiam vtendum erit, Aëtio teste. Nec minus humorum defluxus auerendus erit ad inferiores partes frictionibus, vinctis, ac cucurbitulis. Quibus autem purgantibus medicamentis vtendum sit, vbi opus fuerit, pro ratione redundantis succi, eo prius concocto, ac præparato, ex sæpius am dictis studiosi requirant, pariter & convenientem victus rationem, abstinendo potissimum à vino vsque ad declinationem, ac cauendo ea, quæ caput replent, & fluxionem irritant. Quod vero ad topica medicamenta attinet, si vlcus simul cum inflammatione infestet, curationem ex iis, quæ inflammationem lenire possunt, & concoquere moliemur, non neglectis iis, quæ ad vlcus propriè pertinet, ex Pauli, & Tralliani sententia. Quæ de re per initia collyrium album muliebri lacte dissolutum immittendum erit, instillandumque ex oui albumine: & cataplasma adhibendum, ex Aëtij sententia, ex ovo simul cum eius vitello, cum rosaceo & vino, ita vt leniter tepescat, & lana (vt ipse testatur) exceptum imponatur: poterit etiam applicari, si ex linteo linco excipiat. Sequentibus autem diebus fomentum fiat ex rosarum decocto, aut meliloti, & infundatur lac muliebri cum ovo tepidum, adhibeanturque linimenta, maxime id quod ex capitibus papaueris, meliloti, croco & pane paratur, ex quo superna duntaxat palpebra illinatur, quo aperiri possit oculus, & lachrymas influentes excernere, oculus quoque leniter deligetur, iuxta eiusdem Aëtij decreta. Sin autem vlcera for dida fuerint, multa mediocriter diluta, & scenigræci decocto vtetur, Paulo teste. At si multa fuerit sordes, ad scenigræci succum parum mellis addere conuenit. Oportet autem scenigræcum ipsum exactissime purgare, sæpe ablucere, ac eo modo madefacere pura dulci aqua, quemadmodum idem Aëtius docet libro septimo, cap. decimoquinto. Postquam autem purum factum est vlcus, à scenigræci succo abstinendum erit, & collyrio ex thure quod vim glutinandi, ac incarnandi obtinet, vtendum. Eo autem vtaris, quod ammoniacum, sarcocollam, thus, ac crocum excipit, cum scenigræci succo, & quandoque cerussam etiam lotam, ac amyllum; nam quod aliter Græci conscripserunt, acrimius quodammodo medicamentum esse videtur, præter id, quod opium etiam excipiat, veruntamen interdum, robustis præsertim corporibus, & ipso quoque vtare. Eo autem incarnato, ac explanato, aut etiam adhuc paulo profundiori existente, adhibenda sunt collyria, quæ citricè inducere possunt, præsertim id, quod Cleoni inscribitur ab Aëtio, & Paulo: eius autem compositionem inuenies apud Paulum libro septimo cap. decimosexto, & apud Aëtium libro septimo, cap. centesimo septimo. Nam vlcera oculorum eandem secundum genus curationem requirunt, quam alia vlcera, vt Galenus inquit quarto de Compositione medicamentorum secundum locos cap. 3. quanquam ob partis naturam quam lenissima adhibenda sint, vt diximus.

Περὶ ὀφθαλμῶν καὶ λευκαῶν.
De cicatricibus, & albuginibus.

CAP. XXIIII.

C Vrat is oculorum vlceribus, cicatrices in eis fiunt, quæ Paulo teste, cap. 22. tertij libri, si per summa oculorum sint, à Græcis interim ἐλας, à quibusdam verò νεφέλια, Latine cicatrices, seu nubeculae appellantur, à quibusdam verò albugines tenues. At si altiores fuerint, à Græcis λευκαῖα, à Latinis verò albugines, & ab aliquibus crassæ albugines nuncupantur. Possunt autem non ab re omnes prædictæ cicatrices albugines nuncupari, cum in oculi nigro albæ appareant. Denata enim corniformi tunica, ut inquit Aëtius, subiectus ipsi caruleus color non amplius translucet, ex quibus verbis liquet, quæ oculi pars in albuginibus afficitur, nam corniformis tunica præcipue: connumerandaque in super & ipse sunt inter morbos in numero, quod si supereminentes fuerint, maxime albescent, auctore Aëtio. At si planæ, seu æquales, minus sunt albæ, quæ verò magis causæ quodammodo concolores sunt nigro, earum causa minime inuestiganda erit, cum præcedentia vlcera insequantur. Verum ipsæ, ut testis est Cornelius Celsus libro sexto cap. 10. duobus vitis periclitantur, ne videlicet aut causæ, aut crassæ sint: qua ratione dicebat Aëtius callosas, ac diuturnas, & crassius cicatrices curare non oportere; si vero suffusus etiam, aut glaucedo affuerit (ut ipse inquit) vanum est cicatrices extergere. Si quis autem eas extere velit, quæ curari possunt, victus rationem ægro corpori accommodare debet, ex qua moderata materia, & boni succi, per vniuersum corpus diffundantur, ex eiusdem Aëtij sententia. Itaque ab omnibus acribus, salis, ac crassi succi cibis abstinere oportet, & moderate boni succi edulis uti, & probæ concoctionis maxime curam gerere: nec minus & à multo vino abstinere debet æger. Illitio autem oculis facienda erit ante cibum, non statim à lecto, neque ante cœnam, priori cibo bene concocto, & ubi ventris excrementa prius deposuerit, & capite, ac toto corpore levis sit æger. Securius autem erit, iuxta eiusdem auctoris sententiam, lenioribus extergentibus uti: nam quæ attenuari possunt cicatrices, moderate pharmacis extergentibus curari possunt. Vitanda verò sunt acria, & quæ excoriant medicamenta; nam succedentibus ex eis fluxionibus, itemque inflammationibus, & aliquando resolutis cicatricibus, vlcera magis profunda fiunt. Interea autem medicamenta, quæ citra omnem molestiam recentes cicatrices extergunt, lac equinum existit, cum modico melle assidue illitum, Aëtio teste. Similiter etiam centaurij minoris succus ex melle, ut Paulo, & Tralliano visum est, nec minus & anagallidis ceruleum florem habentis, aut chelidonij succus cum melle, seu menthæ succus, eodem Aëtio auctore. Extergunt quoque citra mordacitatem, cornu cerui vltum, velut etiam caprarum, Galeno teste quarto de compositione medicamentorum secundum locos. inueteratas autem, ac altiores albugines tum abstergentibus, tum discutientibus pharmacis curare tentandum, iuxta Pauli sententiam. Inter quæ tum Paulus ipse, tum Trallianus sæpiæ testam combustam, & cum melle in pollinem redactam, admodum probant. Aëtius butirum liquefactum solum illitum, nec non rumicis hortensis, &

plantaginis semen in testa exustum, & in cinerem redactum, exacteque tritum approbat. Similiter pullorum hirundinum capita detracta, in olla exusta, ac trita: galbanum quoque cum melle liquefactum, ac similiter tritum adhibere præcipit. Nec minus uti poteris ære vltio, aut eiusdem aeris squama, seu flore, prius tamen lotis, eisque solis in puluerem redactis, aut cum melle mixtis: poteritque inspergi infra scriptus pulvis, qui excipit cornu cerui vlti drac. j. sepia testæ combustæ drachm. s. sarcocollæ drach. j. & saristolochia rotundæ scrup. j. sacchari drac. iij. fiat pulvis. Et si fortius medicamentum reddere velis, myrrham, aut nitri spumam addas, æs vltum, eiusdemque squamam, aut florem, quæ ut magis mordacitatis fiant expertia, lauentur prius, ut diximus. Hæc pro curatione prædicti affectus commemorasse sufficiat.

Περὶ φλυκταίνων. De pustulis.

CAP. XXV.

R I V N T V R interdum in oculis, potissimum circa corniformem tunicam, quamvis in eorum albo, & in palpebris interim fieri possint, Aëtio teste, pustulæ quædam: quæ à Græcis φλυκταίνæ, à Latinis, utpote à Celfo, pustulæ, à barbaris vesicæ nuncupantur. Hæ inquam, ut Paulus asserit, ex crescentiæ quædam sunt corniformis membranæ, ortæ ex humore quodam subexcoriente ipsius compaginem: Afficitur itaque per hunc affectum oculus, præsertim secundum corniformem tunicam, ut ex eiusdem descriptione liquet, & cum illud sensu indicari queat, non opus est alia indicia asserere. Estque morbus in quantitate, seu magnitudine præsertim: quanquam & intemperie, & in soluta continuitate simul morbus dici possit, cum de numero tumorum præter naturam sit, verum cum eadem tunica corniformis ex quatuor veluti membranis delisissimis, ac fortissimis constet, possunt interim sub prima membrana prædictæ fieri pustulæ, aliquando verò sub secunda, aut tertia, quapropter quædam in superficie, quædam verò in profundo eius fiunt. Quod si in superficie, sub prima videlicet membrana fieri contingant, colorem nigriorem præ se ferunt, eodem Aëtio teste. Si autem sub secunda, aut tertia membrana consistant, albidior colore pustulæ fiunt; nam licet iam dictarum pustularum color naturalis niger sit, in profundo corniformis tunicæ cum fiunt, occultatur, eo quod tunica corniformis alba est, cornibus simillima. Inquātū igitur, ut idem Aëtius asserit, in profundo corniformis tunicæ pustula occultatur, intantum colorem assimilat, & maiorem dolorem inducit, & molestior est. Ex iis ergo interstinguendæ sunt pustulæ, quæ in superficie, ab iis, quæ in profundo fiunt. Oriuntur autem aut à sanguine ob plenitudinem, aut ab acribus succis, ut idem asserit Aëtius, quas causas inter se distinguere, aut dignoscere haud difficile erit, si & doloris qualitatem, ac magnitudinem, ipsarumque pustularum colorem, & ægri temperamentum, habitum, ætatem, ac eiusdem antea actam vitam, anni tempus, regionem, aeris constitutionem, ac reliqua optime perpendas. Verum ex quacunque causa orta fuerit pustula, si superficialis fuerit, curatu facilis erit, difficilis autem si profunda, etiam si tunica ipsa vlcerata sit. Periculum nanque est si in profundo orta sit, ne reliquum corniformis

Aet. lib. 7.
cap. 29.
Celsus lib.
6. cap. 6.
Pustule
quid sint.
Paul. lib. 3.
cap. 22.
Pars affectus.

Affectus.

Signa.

Causæ.
Causarum
signa.

Prognosis.

tenue existens rumpatur; & vuisiformis procidat, ac effluant oculi humores: præsertim si iuxta pupil- lam ruptio fiat, vt Aëtius asserit, aliudque graue cō- sequatur. Nam inducta etiam talibus vlceribus cicatrice, homo non videbit propter inductas cicat- rices. Quomodo autem superficialis orta postu- la ab vuisiformis tunica procidentia propter corni- formis rupturam, seu corrosione distinguitur, se- quēti capite explicabimus. Carterū curandæ pustulæ sunt primū, vt multiloquiū, sternutationes, iram, spi- ritus detentionem, splendorem nimium caueamus. Inhibeanturque deambulationes, & alij motus ab initio. Cibos assumant molles, ac concoctu faci- les. A vino abstineant toto curationis tempore, ex Aëtij sententia. Pro potu verò aqua vtantur hor- dei, vel coriandrorum, seu cinnamomi parum in ea decocto. Vtroque autem, cibo scilicet & potu v- tantur exiguo. Et si totius corporis plenitudo in- festarit, vena eis secanda erit, si quid eorum, quæ sæ- pius diximus, non prohibeat, non semel tantum, sed bis, & sæpius, si opus fuerit. Sequato autem humeralem, seu mediam: aut mediam primò, deinde humeralem, prout magis opportunum videbitur. Alius quoque acri clystere excitetur, quo hu- morum defluxus deorsum vertatur. Pro quo etiam satisfaciunt frictions, & infernarum partium vin- cula. Verum si humorum mordacitas, seu acrimonia pustularum causa fuerit, purgatione potius vtendum erit, eis primū domitis, ac præparatis. Atqui vitanda sunt ex Aëtij sententia ea medica- menta, quæ vehementius purgant, & maxime, quæ stomacho sunt magis infestā. Quapropter man- na, aut pulpa casia fistulæ, cum tamarindorum decocto, & antidoti diacatholicon pauco vti poteris, aut reliquis huiusmodi, deinde ad topica deuenias medicamenta, quæ licet leniter discutienda esse de- bent, eodem Aëtio teste, tamen vbi recentes pus- tulæ fuerint, & adhuc inflāmatæ, à leniter quoque astringentibus absolui non debent: vitandæ tamen sunt deligationes, tanquam eis infestissimæ. Ve- rum cataplasmata adhibere oportet, vbi inflāmatio affuerit, maxime in principio, leuia quidem, sed la- ta, vt Aëtius asserit. Ea verò sunt tenuibus, ac mol- libus linteolis illinienda, & super totum oculum imponenda, supercilio, ac mala, & tempore simul comprehenso: & finenda sunt quandiu fuerint ma- dida: postquam verò siccata fuerint, tollēda ea sunt, & alia imponenda, inter quæ commendat Aëtius ouorum albuginem, ac luteum tritum cum pauco croco, moderatoque passe, ac pane: additque ipse opij modicum, id quod ipse non auderem, in maxi- mus infestaret dolor, & in pauca quantitate: vel loco eius Recipe lycij, & croci ana scrup. j. sarcocol- læ scrup. j. & s. thuris scrup. ij. cum duobus vitellis, ac albuginibus ouorum, & aqua rosea, fiat liqui- dum collyrium, & cum mollibus linteolis (vt dixi- mus) applicetur: aut guttatim in oculum instille- tur. Procedente verò tempore ouum auferatur, poteritque addi myrrhæ parum, ac fœnigræci cre- mor. Verum vitandum est (vt diximus) ne oculus in his diutius deligetur: est enim eis hoc nocentis- simum, proficiente autem curatione adhibendum erit medicamentum, quod ex thure, myrrhæ, & cro- co paratur, Aëtio teste: fomentisque vtendum cal- facientibus: licet ab initio tepida adhiberi debeant, quæ quod reliquum est, discutere valeant. Parentur autem ex florum chamæmeli, fœnigræci, seminis li-

ni, aut melilothi decocto. At si ob multitudinem pustulæ rumpantur, aut ob acrimoniam erodatur, ac vlceretur corniformis tunica, earum curatio peten- da erit cap. de oculorum vlceribus. Nec alia ratio- ne pus, quod intra corniformem est generatum, cu- rari debet, Galeno auctore, quarto de compositio- ne medicamentorum secundum locos, quam phar- macis discussoriis, iam dictis, & propterea de eo se- paratim tractare non libuit, prius tamen vniver- sum corpus euacuato, si opus fuerit. At si eis medi- camentis malum non cesserit, chirurgia indiget, prout Galenus docuit in fine 14. method. medend.

Περὶ προπίλωσης. De Procidencia oculi.

CA P. XXVI.

CVM propter erosionem, aut ruptio- nem corniformis tunica, potissimum cum vlcera profunda euadunt, pars quedam vuisiformis, seu aciniformis tunica procidit πρόπιλωση, à Græcis πρόπιλος, à Latinis vuisiformis tuniculæ pro- cidencia dicitur, à quibusdam barbaris cornea ru- ptura appellatur. Describitur autem à Paulo quod procidencia est vuisiformis tuniculæ, quæ erosa, ru- ptæ cornea tunica accidit. Ea insuper cum non- dum creuit à Græcis μιονέφαλος nominatur, cō- quod figura muscæ capiti similis exiit, Paulo, & Aëtio testibus. Cum vero amplius creuerit, & eou- que, vt acinum vix repræsentet, σφαλόμενα à Græ- cis, à Latinis vuoatio dicitur. At vbi plurimum aucta sit, vt palpebras transiliat, μύλων, à Græcis, vt pote à Paulo, Latine malum vocatur. Verum vbi callum obducatur, præter id, quod extra palpebras transgre- diatur, ab Aëtio, & Paulo ὄλος, Latine clauus nun- cupatur: quoniam per omnia clauī capiti similis exi- lit. Affectus hic, quamuis oculi existat; non ta- men secundum omnes eius partes, sed in eorum corniformis, tum vuisiformis tunica oblata est, cor- niformis inquam erosa, vel rupta in soluta conti- nuitate morbo afficitur. Ipsius verò vuisiformis tuni- cæ morbus in situ est, totiusque oculi, in figura. Quapropter nec vna duntaxat pars in hoc affectu laborat, neque vna tantum affectu. quò fit, vt pu- pilla ipsa in iam dicto affectu diuisa omnino sit, ita vt aut non appareat, aut à situ, & figura eius sit im- mutata: quo discriminatur oculi procidencia ab e- iusdem phlyctæna, seu pustula, tum etiam, quod id quod prolapsum est, nigrum, aut cæruleum appa- ret, in circuitu vero circa fundum eius partis, quæ procidit, labia corrosæ corniformis tunica alba ap- parent, id quod in pustula videre nō licet: quoniam ea superficialis existens, similiter vndique nigra est, licet non exacta nigredine. His itaque indicis pla- nē distinguere poteris affectum hunc à phlyctæna, seu pustula, iuxta Aëtij decreta, cap. 29. & trigesimo- tertio libri septimi. Quomodo autem eius differe- rentias, quas quatuor esse diximus, inter se distin- guere liceat, ex suprā relatis liquet: licet Aëtius i- psorum etiam staphylomatum differentias plures conscribat, vt pote cum corniformis ipsa tunica fue- rit eleuata, & eminentiam acino vix similem fece- rit, aut ab humoribus intra ipsam collectis, aut ex pustula quadā satis profundē inter eius partes consi- stēte: quæ duæ differentiæ licet tunicam ipsam cor- niformem eleuent, & incuruari faciant, non ta- men ipsam rūpunt, seu exedunt. Et propterea eiusdē eleua-

elevatio sola, & non ruptura existit. quo fit, ut neque id, quod prolapsus est, ceruleum, aut nigrum appareat: quemadmodum in vero staphylomate; in quo disrupta iam est corniformis tunica, & magnus vniiformis tunica prolapsus factus est: cui etiam sententia adherere videtur Celsus libro 7. cap. septimo, dum dixit, In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis; & similis figura acino fit, unde id *σφαυλωμα*, Græci vocant. Verum cum has duas differentias non liceat (Paulo teste) vera *σφαυλωμα* appellare; & insuper earum curatio ab ea diversa existat; cum una inflammationis, reliqua pustule curationem similem requirat; propterea eas silentio prætereunt; de veri prolapsus differentis, quas quatuor esse diximus, sermonem faciemus: cuius causa erosio, aut ruptio, corniformis tunica existit, ut diximus. Ex quacunque ergo causa oculi prociencia ad *μυωφαλον* degeneraverit, si medicamenta rite adhibeantur, curari poterit: quemadmodum etiam, licet ægre, recentia *σφαυλωμα*. Verum ubi alborem, aut callum contraxerint, nullus remediis locus est, ex Pauli sententia. Ita vero prociencia, quæ curationem admittit, utpote quæ ad *μυωφαλον* degeneravit, aut ad recentia *σφαυλωμα* repellentibus, simul & adstringentibus pharmacis illi opus est, Galeni auctoritate, quarto de Compositione medicamentorum secundum locos, quem sectati sunt Paulus, & Aetius. Est verò eius sententia hæc. At verò vlcera quæ per erosionem tunica corniformis fiunt, ut etiam ex vniiformi quid pronat, manifestum est, quod tum propter seipsam, tum ob prolapsionem, repellentibus, & adstringentibus pharmacis illis opus est: conandum verò, ut ex ipsis eligamus, quæ nullam asperitudinem faciunt, ea sunt folia rosarum, flores, & succus, nardi spica, crocus, lycium, & hypocistis. At vehementiorem his adstringendi vim habent (ut testatur) acacia, & omphacium, item balaustium, cyrtini, & gallæ omphacitides. poterunt itaque folia, & flores rosarum in vino adstringenti decoqui, aut aqua pluviatili, si adit inflammatio, aut calor immodicus, & in eo decocto spongiam imbutam supra affectum oculum applicare, aut ex plantagine, rubi foliis, virga pastoris, & polygono ac rosis, ut supra, parato decocto foveas. Poterit insuper ex foliis rosarum, ac cydoniis in vino adstringenti, aut aqua pluviatili decoctis, acacia scrup. ij. croci scrupul. s. additis, cataplasma fieri, ac adhiberi, aut ex plantaginis, polygoni, & rubi foliis pariter decoctis, croci gra. iij. licij, & hyposticidis singulorum scrupul. s. nardi spica gra. iij. additis, tridem cataplasma componi: nec minus collyrium ex infra scriptis conficiatur, quo salubriter uti poterit. Recipit autem aloës lotæ, pompholygis præparate, sarcocollæ nutritæ ana scrup. s. spica nardi, croci ana gra. v. stimmeos, seu stibicos vsti, & abluti, quod medicorum vulgus anthi, aut fœnigræci, fiat collyrium, & vtare, aut omphacitides gallas tere, balaustium, & cyrtinos, ac rosarum flores, & cum succo polygoni, aut virgæ pastoris, foliorum oliuæ, aut rosarum vitior. Verum si inflammatio affuerit, mitioribus semper vtaris iam dictis medicamentis, ac simul cum ouo recenti ea infundas. Quæ verò *σφαυλωμα* prædictam curationem respuunt, chirurgia indigent, ut moderatum ægrotanti decorem conciliemus, non autem

ut visum abolitum restituamus: quæ quomodo administrari debeat, disertissime à Paulo libro sexto cap. 19. scriptum reperitur: & ab Aetio cap. 35. lib. 7. necnon à Celfo libro septimo cap. 7. quo fit, ut nos breuitati indulgentes, id prætereire ex proposito celsimus. Pariter victus rationem scribere nolumus, cum non alia indigeant, quàm ea quam aliis oculorum affectibus laborantibus, in præcedentibus instituiamus, præsertim cap. de vlcibus, & de pustulis.

Περὶ μὲν ἐκδοσῶς.

De mydriasis, seu pupillæ dilatatione.

CAP. XXVII.

Icet rhagoidis, seu vniiformis, foramen, quod pupillam appellant, quatuor modis à naturali statu immutari possit, Galeno teste libro primo de Causis symptomatum cap. secundo, nempe vel ampliatur, vel imminuitur, vel ruptum, vel in aliquam partem detortum, seu diuulsum, cum eius amplitudo, siue à natiuitate sit, siue postea accedat, semper visui incommodat; imminutio verò, quæ à natiuitate inceptit, acutissimi visus occasio est: quæ verò postea accedit, praua existit. Reliquorum verò vitiorum nullum, neque si à natiuitate, neque si post incidit, quicquam quod æstimatione dignum sit, visui officit. Propterea duabus vltimis eius mutationibus à naturali statu derelictis, de eiusdem incremento, seu ampliatione primò, deinceps de eius imminutione tractare decreui. Appellant autem *μυδρίαν* Græci, pupillæ effusionem, seu dilatationem Latini: cum pupilla ipsa colore quidem nihil euariet, multo verò latior, quàm pro naturali modo efficitur, ut aliquando ad iridis circulum accedat, Aetio teste, & Paulo. Ex eo autem, quod perpetuo hic affectus visionem lædat, siue ab utero, siue postea contingat, Galeni auctoritate, censendum est oculum ipsum oblatum esse, non tamen totum, sed secundum rhagoidis foramen, hoc est, pupillam, ea nanque à naturali statu recessit, & pro quantitate declinationis increfcit iterum ipsius visionis noxa, ut idem Galenus testatur: estq; morbus in genere conformationis, quoniam immodicè pupilla dilatata est. dicebat nanque Galenus lib. de different. morborum, quod concauitatum morbi, siue obstruantur, siue immodicè pateant, omnes ad conformationis genus reducuntur: nam in omnibus his naturalis conformatio impedita videtur, cavitatem videlicet ipsa à naturali mediocritate secundum excessum recedente. Pro cuius recessus quantitate quandoque in totum visus impeditur, interim verò vident ægri, verum obscure, & quæ videntur ab ipsis omnia minora, quàm sint, putantur esse, Paulo, & Aetio testibus; neque id mirum, nam diffunditur in eis visuius spiritus. Quapropter siue in prima protinus conformatione, siue postea amplior fuerit pupilla, iuxta Galeni sententiam, eodem i. de causis symptom. vniuersus ipsam spiritus implere non sufficit, unde ipsum diffundi, dissiparique necesse est, quo fit, ut natiua vitiosa sit, & non naturalis vitio non careat, id quod non accidit in eius imminutione, ut dicemus; bonæ itaque visioni semper incommodat pupillæ dilatatio, seu amplitudo, ceu ex iam dictis planè liquet. Eius autem causa humor excrementitius existit, ex Pauli sententia, qui aut acuatim, aut paulatim affluit, ab eoque citra sensum, ut Aetio visum est, vniiformis tunica distenditur, & pupilla amplius dilatatur. Sunt qui velint,

Quid sit pupilla dilatatio. Aetius lib. 7. cap. 52. Paulus lib. 3. cap. 22. Quæ pars afficiatur. Quis affectus præter naturam sit.

ca. 7.

Signa.

cap. 2.

Causa.

Q

*vide A. Arabes praefertim, & qui eos sectantur, communi-
ter praefertim, ex ipsius vualis tunicae defecatio-
ne interdum pupillae dilatationem excitari, exem-
plo coriorum perforatorum, cum exsiccantur; di-
latantur siquidem illorum foramina, ut ipsi asse-
runt. Quare sic quoque euenire putant pupillae, si
immodicè rhagoides tunica exsiccetur, neque nos
illud negamus, praefertim cum Galen. illud fatea-
tur lib. i. de causis symptom. dum dixit, continen-
tem causam (ut ita dicam) dilatationis pupillae esse
rhagoidis tunicae tensionem, atque ipsam propria
ipsius ratione bifariam tendi, aut exsiccata, ut simi-
larem, aut humectatam ut instrumentum; siccitatis
verò curatio difficilis est. Verum nos sectantes
Paulum, & Aëtium in hoc, & tanquam saepius con-
tingentem, ac curatu non ita difficilem, tantum
eam, quam ipsi assignant causam dilationis pupillae
admittimus modo, humorum videlicet effluxum:
qui, acuatim, aut sensim, & paulatim ad vni-
formem tunicam feruntur, à quibus ipsa amplius dila-
tatur, ut diximus: quòd si suapte natura pupillae am-
plitudo fiat, omnino incurabilis existit; si non natu-
ralis sit, egrè curabilis sit; nam cum membranosa sit
tunica vniiformis, ubi semel distenta fuerit, indura-
tur, & neque facile amplius contrahi potest, Aëtio
teste. Accidit autem hæc affectio magis pueris pro-
pter tunicarum debilitatē: insuper & his, qui ex natura
nigros habent oculos, quoniam magnas etiam pu-
pillas habent, & propterea facile in hanc affectio-
nem delabuntur. Quæ utique curari potest, pro eius
curatio, attenuante vtendum est victus ratione,
atque ventri commoda, ut testatur Aëtius. A vino
abstinendum erit, donec affectio fuerit soluta. Bal-
nei vsus sit rarior: deambulationibus lentis, ac plu-
rimis, in locis vmbrosis vtendum erit, clysteriisque,
ut alius humecta sit, & materia ad infernas partes
detrahatur. Similiterque infernarum partium fric-
tione, & (si nihil impedierit, affueritque corpori
plenitudo) venam secare oportet, in cubito hume-
ralem videlicet, vel mediam, aut purgantia medica-
menta pro ratione redundantis succi adhibenda
sunt; quanquam nec ea pluribus vicibus exhibenda
erunt, neque vehementer purgantia esse debent:
quæ si fieri nequeant, Aëtij, & Pauli decreto venas
in angulis oculorum diuidere oportet: deinde cu-
curbitulam occipitio admoovere, & marina aqua
frontem, & oculos perfundere, hyeme tepida, æsta-
te frigida, tota etiam facies in aquam mittatur, ocu-
lis per tempus quoddam apertis, ut Aëtius asserit:
quòd si marina aqua non adsit, parum salis aquæ
misceatur, aut posca aquosa assumatur. Pharmacis
autem supra affectum locum subadstringentibus vt-
tendum erit: nam si valde acria fuerint, humorum
copiam attrahunt, distendantque membranas, &
latores pupillam efficiunt: si verò vehemèter ad-
stringant, aut immodicè frigefaciant, membranas
indurant, ampliusque contrahent, ac coarctabunt
pupillam: quòd quidem incommodum est: nam
hæc res pupillam ad tabem conducit. Sunt autem
moderate adstringentia, quibus uti poteris, Aëtio te-
ste, rosa, crocus, spica nardi, cortex thuris, pompho-
lyx, spodium, & acacia, & ut summam dicam, cun-
cta ea, quæ citra aspritudinem adstringunt, atque
repellunt, exsiccantque quorum mentio ex Gal. sen-
tentia, in præcedenti capite facta est; ex quibus quo-
que licebit, prout vsus exigit, medicamenta com-
ponere, eisque salubriter uti.*

INTERIM, quoque contingit, ut
iam dictum rhagoidis foramen im-
minuatur, quam imminutionem Graeci
ci *ρσιον* appellant, ut patet decimo
de vsu partium; Latini verò tabem,
seu diminutionem pupillae vocant, medicorum vul-
gus pupillae constrictionem. Est namque affectus, is
oculi, quo pupilla fit angustior, obscurior, atque ru-
gosior, Paulo auctore, Quòd verò affectus hic ipsius
pupillae duntaxat imminuta sit, nihil cornea priua-
tim affecta, quocirca, & alteri, oculorum magna ex
parte accidit, patet eodem 10. de vsu partium, ita ut
cognitu facilis sit, neminemque Medicorum lateat,
quandoquidem (ut Galenus testatur) sanus oculus,
qui in propinquo est, affecti vitium prodit. Affici-
tur ergo oculus in hac affectione secundum eius
pupillam, poteritque affectus is ad conformationis
genus reduci, cum naturalis conformatio corrumpatur,
in specie verò in cavitare, seu via foramine ip-
so rhagoidis, hoc est, pupilla in se ipsam cōciden-
te, & propterea minori reddita, & quaquam cogni-
tu facilis sit is affectus, neminemque Medicorum la-
teat, ut diximus, Gale. auctoritate, collatione facta
eiusdem aëri, ad oculum sanum, tamen ex eo quòd
his maiora apparent, quam pro naturali modo, quæ
ab ipsis videntur propter pupillae angustiam (ut
Aëtio, & Paulo, visum est) argui poterit. Causam
verò huius dixit Paulus esse densationem, quæ sic-
citati potius tribuenda est; Aëtius verò ait plerum-
que hoc contingere ex periculosis debilitatibus,
aut ingenti capitis dolore. Differt autem iuxta eo-
rundem sententiam pupillae tabes ab oculi macie
seu atrophia: quòd in tabe pupilla duntaxat angus-
tior, ac minor efficitur, macies verò totum oculi
bulbum minorem, ac humiliorem reddit. Galenus
verò 1. de causis sympt. minorem reddi pupillam
morbi vitio ob geyminam causam fatetur, quarum
vna est, ex parte ipsius rhagoidis tunicae tantum, alte-
ra ex parte humoris tenuis albuginei dicti, qui me-
dio loco inter ipsam rhagoidem, & crystallinum
humorem effusus consistit. Atqui solius tunicae af-
fectus (ut ipse refert) extensio quædam, relaxatio-
que est: qualis utique in externis subinde partibus
accidit, cum in articulis ligamenta redundantia hu-
more sunt perfusa, & ne quis opinetur, quòd ab ea-
dem causa, eodemque affectu rhagoidis tunicae af-
ficari possint contraria vitia, pupillae videlicet cum
dilatatio, tum diminutio, eodem lib. i. de causis
symptom. dicebat ampliatis pupillae causam, ut
ita dicam, cōiunctam esse tensionem ipsius rhagoi-
dis tunicae: ipsius verò imminutionis, seu paruita-
tis, eiusdem rhagoidis tunicae esse relaxationem,
quapropter non ad eundem prædictæ tunicae affec-
tum dilatatio, & imminutio pupillae consequun-
tur. Sed prima ad tensionem, reliqua verò ad rela-
xationem. Tenditur autem, aut exsiccata, ut pars si-
milaris, aut humectata, aut instrumentalis. Qua de
re quamvis ex ipsius rhagoidis tunicae humectatio-
ne interim pupillae dilatatio fiat, non ut similis
pars, sed ut instrumentalis humectata erit, eodem
Galeno auctore, cum verò propter humorem rha-
goidis tunicae minor redditur pupilla, eadem tuni-
ca non tenditur, neque ut instrumentalis pars affe-
citur, sed ex humore relaxatur, atque humore perfi-
sa, ut similis pars humectatur. Si autem vitio al-
buginei

buginci humoris pupilla ipsa imminuta sit, hoc vitium in eius defectu consistit: cuius occasione vultuformis tunica, euacuato interno eius loco, ac interna eius portione exsiccata, in se concidens contrahitur, ac rugatur, atque idcirco pupillam imminuit. Deterius autem ex talibus affectibus cernere contingit, non utique propter pupillæ paruitatem, sed quia pupillæ paruitas vitiosos iam dictos affectus sequitur, quorum culpa necessarii peius cernit oculus sic affectus, & non propter pupillæ angustiam, eodem Galeno teste: namque si ad extensionem, relaxationemque rhagoidis tunicæ, pupillæ imminutio sequatur, redundant humore ipsa perfusa affectus hic causa erit, ut oculus deterius cernat, & non pupillæ angustia. At si contracta, ac rugata eadem tunica ex albuginei humoris defectu in se ipsam concidat, atque pupillam imminuat, non propterea quod pupilla imminuta sit, sed quoniam sicior efficitur crystallinus humor ex defectu albuginei, a quo largiter imbuebatur, & rhagoides tunica in se concidens, spatium quod inter ipsam, & crystallinum interest, angustus efficitur: itaque fit, ut idem crystallinus humor cogatur paruo interstitio cum externo splendore commercium habere, eumque sine offensa sustinere non posse, carens vno ex munimentis, humore videlicet tenui, qui cum adesset, vna ex causis erat, propter quam sine offensa crystallinus humor splendorem sustinebat; atque hæc quidem causa est, cur imminutus is, qui in pupilla est humor, tum deterius cernendi, tum foraminis rhagoidis tunicæ minoris reddendi sit occasio: quemadmodum si ipsa vultuformis tunica tendatur, ut corpus simile siccata, poterit esse causa generanda dilatationis pupillæ: eritque tunc dilatationis causa ipsius rhagoidis tunicæ tensio ex siccitate. Parciori vero reddito humore, qui sub eadem continetur, nec ipsa suapte natura siccata est, sed per accidens, minori reddito iam dicto humore, nec propterea tenditur, sed in se concidens contrahitur, ac rugatur: & idcirco pupillam imminuit, utpote non amplius protensa, ac distenta à iā dicto humore sub ea contento: quemadmodum accidit criborum tunicis: quæ si non extendantur, ipsarum foramina concident. Id ipsum etiam evenire poterit, ut testatur Galen. 10. de V. s. part. si ad pupillam ipsam parcius spiritus à principio affluat: & propterea pupilla corrugetur, velut in senioribus, ac annosissimis videre licet: quanquam & ipsis quoque rugosa interdum fiat propter senectæ imbecillitatem corniformis tunica: & propterea malè, aut prorsus non vident pupilla non immutata. Ex quibus constat spatium omne, quod est post humorem crystallinum, spiritu simul, & humore tenui assidue repleri oportere; & quod in cæteris partibus humor, in ipsa vero potissimum pupilla spiritus inest plurimus. Nunquid verò imminutionis pupillæ causa tenuis humoris defectus, seu inopia sit, aut spiritus, seu vultuformis tunicæ laxitas propter humiditatem, distinguere haud admodum difficile erit, si ea quæ in oculis apparent, ætatem, temperamentum ægri, ac antea vitam, & reliqua perpendas. Quod verò ad prognosticum attinet, dicebat Galenus primo de Causis symptomatum, cap. secundo, non semper malam esse pupillæ paruitatem: quoniam ea, quæ naturalis est, bona existit: siquidem in minori pupilla colligitur spiritus, constringitur, ac densatur: quæ omnia ad sensus bonitatem oculo conducunt.

At si morbi vitio, & non natura, pupilla minor reddita sit, mala quidem existit, ac multo deterior efficitur, quam mediocris: quoniam vitiosos sequitur affectus, ut ipse asserit, eoque maxime insanabilis est, si ex tenuis humoris defectu gignatur, minus autem innoxia est, si propter vultuformis humorem, minor reddita sit pupilla. Nam difficilius est similis corporis particulæ cuius, cum siccata est, humiditatem restituere, quam eam, cum humecta est, siccare. Ex siccitate ergo si orta fuerit pupillæ tabes, curationem porro contrariam mydriasi facere oportet, ut testatur Aetius: nam victus optimi succi, & forbilis esse debet. Vinum fulvum, atque odoratum eis adhibere oportet. Somnus præcipi, ut cibum excipiat. Balnea quoque cōueniunt ex aqua dulci, & capitis ex aqua calida perfusio. Superius partes exerceant, humeros, ac manus cum spiritu de-tensione, & caput ac facies diligenter confricandæ sunt, oculique insuper summis digitis: eademque facies aqua calida proluatur, & caput post contractionem vnguento, quod moderatè calfacere potest, illinatur, quale est irinum, & modico facto interstitio, oculi rarefaciente, ac acriore medicamento humiditatem attrahente sublinantur, cuiusmodi est, quod excipit ammoniaci scrup. ij. aloës drach. j. crocomagmatis drach. ij. croci drach. s. æruginis æris scrupul. j. in defectu crocomagmatis, croci dosis augetur, triturentur, & cum aqua pluuiæ vtear. At si ex humiditate vultuformem tunicam extendente, & relaxante tabes pupillæ fiat, curanda ea erit ex his, quæ præcedenti cap. de pupillæ ampliatione diximus, aut ex his, quæ pro cura suffusionis dicemus; quamvis rarò accidat. Et in summa ea adhibeantur medicamenta, quæ vim digerendi, ac exsiccandi contra morbum habeant.

Curatio.
Vultuformis
Medicamen-
torum ratio.

Περὶ τῆς ὀφθαλμοῦ.

De suffusione.

CAPVT XIX.

VXTA ipsam quoque pupillam affectus quidam præter naturam oriri consuevit, qui à Græcis ὀφθαλμῶν, καὶ τῆς ὀφθαλμοῦ: à Latinis suffusio dicitur, Arabes aquam, medicorum vulgus catarractam appellant. Qui affectus Aëtio teste, cap. 51. libri septimi, præterfusio, seu affusio quædam humorum est circa pupillam congelatorum, ut ubi perfecta fuerit visum impediatur: sub diuersis tamen verbis idem sentire videtur Paulus ca. 22. lib. 1. cum dixit ὀφθαλμῶν humorum esse affusionem, qui inter tunicam corniformem, & crystallocidem concre-scentes visum impediunt. Verum idemmet Paulus libro sexto cap. 21. suffusionem retulit esse lenti humoris in corniformi membrana iuxta pupillam consistentiam, quæ visum impedit, aut certè ne perspicuè oculus cernat, efficit. Quibus verbis, si quis exactè ea perpendat, videbitur Paulum diuersimodè in prædictis locis de suffusione locutum esse: nam tertio libro ὀφθαλμῶν dixit esse affusionem, vsus verbo Græco παρήυσσις: in sexto verò dixit esse consistentiam, vsus verbo σύστασις. Verum idemmet auctor his satisfacere videtur prædicto cap. 21. libri sexti, cum dicebat de iis suffusionibus, quæ nullam manus administrationem requirunt, quæque confirmatæ non erant, tertio libro se pertractasse, de iis autem, quæ confirmatæ sunt, & ex toto concreuerunt, in sexto libro verba facere. Non mirum itaque si in tertio libro suffusionem per affusionem

Vide Aul-
cen. lib. 3.
sen. 3. tract.
4. cap. 18.
Quid sit suf-
fusio.

Concilian-
tur Pauli
verba.

*Part affe-
ctus.*

*Quis affe-
ctus sit.*

*De differ-
rent. morb.
c. 13.
14. meth.
ca. 13.
Signa inci-
pientis.*

*Augefcent-
is.*

Perfecta.

*Suffufionis
differentia
plures.*

descripfit, cum ipsam in via, ac in fieri considerasset, in sexto verò per consistentiam, seu concrectionem, cum de iam confirmatis suffusionibus differere proposuisset. Cum autem suffusio ipsam visionem impediât (Aëtio & Paulo testibus) verendum non erit oculum in ea affectum esse, & propriè iuxta pupillam, ut liquet ex traditis ab eisdem descriptionibus, inter crystallinum videlicet humorem, & corniformem tunicam. Qui affectus cum per se primò functionem lædat, hoc est; ipsum videre, morbus inquam est in compositione, & propriè in numero, non in defectu, sed in excessu: connumeraturque inter eos morbos in numero, qui toto genere præter naturam sunt, velut lib. de Differentiis morb. & 14. methodi medendi liquidò constat. Cuius vitij incipientis talia sunt signa, ut Aëtio visum est, quòd ita affectis veluti culices quidam parui, ac caliginosa quædam oculis sæpe obuerfari videntur: & quidam ex ipsis piliformia vident, alij velut lanarum filamenta, aut araneorum texturas: quibusdam circa lucernas circuli apparent, augefcente deinde affectione, augefcent iam dicta symptomata. Hæc autem ubi apparuerint, aliquando (ut idem testatur Aëtius) pura pupilla apparet his, qui negligentius considerant. aliquando verò colorem maris refert. Verum ubi perfecta fuerit suffusio, æger non videbit: pupillaque colorem ad albedinem mutat: & omnino non translucet, quanquam plures sint coloris species. Nam quædam suffusiones aërem asimulant, aliquæ vitrum referunt, aliæ albicantes sunt, aliæ ad cæruleum colorem magis mutantur, aliæ verò glaucescunt. Omnes tamen suffusione laborantes (ut inquit Paulus) lucem vident, aut multam, aut paucam, eoque discrimine ab hebetudine, & glaucomate affectis separantur: cum ipsi lucem omnino nullam cernant. Quòd si totum rhagoidis foramen à crasso illi consistente corpore obtenebratum sit, utique videre hominem prohibet, Gal. teste 1. de Causis sympto. cap. 2. Si verò non totum foramen obtenebratum sit, sed aliqua pars eius pura supersit, per illam, quæ extrinsecus sunt, singula per se sola, nihilo deterius, quàm antea, videbuntur: non tamen similiter, ut antea vno tempore multa: eo quòd angustior, quàm prius, factus sit visus conus. At si in pupillæ centro exigua suffusio constiterit reliquis, quæ circa sunt, partibus puris existentibus, omnia iis, qui sic sunt affecti, veluti fenestras habere videntur: cum, quod in medio est, non cernitur, & quasi excisum videtur. Verum si diuisa, nec inter se coniuncta fuerint crassa corpora, quæ iuxta pupillam consistunt, fluitentque in tenui humore, iis qui sic se habent, tanquam culices quidam foris obuerfari videntur. Sæpenumero etiam ex crassioris quoque humoris consistentia, tanquam idolum aliquod sibi appareat, imaginantur. Eiusmodi autem idoli apparitio plerumque incidit, postquam à somno surgunt, ut idem inquit Galenus, potissimum pueris, & iis qui plusculum biberunt, aut aliàs capite sunt oppleto: quamuis prædicta quoque symptomata oriri possint ex tenuis humoris essentia permutata, & alia quædam, si à naturali colore recesserit, ut patet ibidem. Quibus autem indiciis confirmata, & quæ iam concreuit suffusio, ab ea, quæ nondum confirmata est, discriminetur, Paulus decretum reliquit, eodem vigesimo primo cap. lib. sexti ex Galeni doctrina. Pariter & ex eis, quæ confirmatæ sunt, quæ ad educatio-

nem manus administratione idonea reddantur, quæque non: quanquam nec id intactum reliquit Galenus, qui eodem libro 1. de Causis symptomatum scriptum reliquit quo pacto dignoscendi sunt suffusi, si compuncta suffusione visum recepturi sint, an non. Nam quibus altero oculo coniuuentibus, alterius pupillam dilatari contingit, iis, si compunctio administratur, recipiendi visus fiducia est; quibus non dilatatur, horum nemo vnquam reuidit: neque si minimò cum dolore, ac commodissime iis est administrata compunctio. Interim verò contingit, quòd similia iis, quæ suffusis apparent symptomata aduenient, oculis ipsis nulla propria affectione molestatis, sed per consensum affectis, ubi exhalationes quædam à ventriculo ascendunt, potissimum quando non probè concoxerunt. Et quibus adeò perfectus, sincerusque visus est, ut eum ne, vel minimum sensibile fugiat, quippe purior natura cum crystallinus humor, tum tenuis, & aquosus iis existit, respondet autem magnitudo talium symptomatum in his semper pro affectus magnitudine: quemadmodum & in aliis quoque, ut patet primo de Causis symptomatum. verum distinguenda sunt hæc symptomata, quæ à ventriculo oriuntur suffusorum similia, ab iis quæ in veris suffusionibus apparent: nam si ob humorum in ventriculo contentorum vitium oborta sint, utrique oculo similiter accidit, quæ verò per proprium oculorum affectum, alter duntaxat oculus prædictis visis occupatur: & neque simul in utroque incipiunt, neque similiter apparent, ut quarto de Locis affectis patet, deinde ex tempore quoque ipso distinguuntur. Si enim tribus, quatuorve, aut etiam pluribus mensibus (ut Galenus ait) suffusionis apparuerint symptomata, contemplantique tibi pupillam nihil tenebrosum videatur, ab ore ventriculi affectum procedere inuenies; si verò non ita multum temporis intercessit, querendum est in primis, vtrum ex quo incepit affectus, singulis diebus perpetuò humilimodi apparitio perseverauerit, nullo scilicet interueniente die, qui omni querela caruerit: an diebus quibusdam laborans exactè videatur conualuisse. Nam continuas suffusionem portendit; intermissio verò, quòd malum à ventriculo prodierit, suspicionem excitat: idque magis si ubi perfectè quis concoquens nullum sibi visum apparere fatetur: sed multò magis si cum apparuerint visa, mordicus in ore ventriculi doluit: maxime verò si post hæc vomendo eiectione mordente, mitigata fuerint symptomata. Hæc sunt quæ primo statim die, cum videris hominem interrogando discere debes: quando secundum naturam exquisitè se habuerint oculi. Vbi verò altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut non exactè pura videatur, suffusionis esse initium censendum est: & ut certius id iudicare valeas, tum ciborum, minus tamen quàm cõsueueris, assumptorum, & nihil mali succi habentium, tum etiam ex aloë medicamenti, quod quidam picram, alij hieram picram appellant, assumptionis experientia, Galeni auctoritate eodem quarto de Locis affectis, dignoscere tentabis. Cerebri quoque cognatione similia suffusis symptomata accidere solent in quibusdam phrenitidis speciebus, primariò scilicet affecto cerebro, quod ex eiusdem phrenitidis indicibus percipi poterit. Sed quoniam tam si dicta symptomata ex ventriculo, quam si ex cerebri cõsensu oriuntur, veram suffusionem non indicant: curabiturque co-

affectio partibus ipsis primario affectis diligenter curatis: idcirco eis derelictis, ad veram suffusionis prognostica, ac curationem redire tempus erit. Nam pro dignoscenda eius causa opus non est diu laborare, cum ex frigidis, & crasis, seu lentis succis omnibus consentientibus ortum ducat; de hac autem suffusione Galenus decimoquarto Methodi meden. in finetalia protulit verba, quod suffusio iam incipiens digeritur, ubi vero diu constitit, digeri nullo pacto potest. Et Celsus libro sexto cap. 6. sic dicebat. Suffusio quoque quam Græci *ὑπόπυον* nominant, interdum oculi potentia, quæ cernit, se opponit, quod si inueterauerit, manu curandum est, inter initia nonnunquam etiam certis observationibus discutitur; hoc idem confirmavit libro 7. cap. 7. Paulus *ὑπόπυον* curari posse, sed non omnia fateretur: proinde antequam consistat, suffusionis tentatis succurrendum erit. Quæ autem citra manus administrationem curari possunt, & quæ chirurgiam requirant, ab eodem Paulo libro 6. cap. 21. scriptum reperitur, similiter quæ neutro dictorum modorum curari possunt, sed omnino incurabiles fiunt. Quomodo autem id discernatur, Galenus primo de Causis symptoma. cap. 2. docuit, ut paulo ante diximus, inter eas verò quæ omnino incurabiles sunt, ab Aëtio connumerantur, quæ glaucescunt suffusiones, cum ex fiant ab humore iuxta pupillam vehementissime congelato, ac reficcatò, ut ipsa testatur. Differt verò ea suffusio à glaucedine propriè dicta, quam Græci *γλαυκωμα* appellant: nam ea (eodem Aëtio teste) mutatio propriè est, siccitasque, ac concretio crystallini humoris ad glaucum colorem; & ante Aëtium illud idem scriptum reliquit Galenus decimo de Vsu partium, cap. sexto. quæ interdum cum inceperit, curari poterit, ut idem Aëtius asserit. Suffusio itaque tentatis victus ratio attenuatoria vniuersa præcipienda erit, Pauli, & Aëtij decreto: nec minus Celsus victum optimum his esse, qui pituita extenuat, fateretur. Aer propterea ad calidum, & siccum declinet. Somnus consueto sit breuior, exercitium sit moderatum, potissimum inferiorum partium, quo si uti non poterunt, eius loco earum frictionibus vtantur. Alii excrementa quotidie natura aut arte excernant. Ab immodicis animi affectibus caueant, molestia præferunt. In eorum cibis vtantur iis, quæ extenuandi vim habent, ut hyssopo, pulegio, satyria, samfuchi, feniculo, betonica, salvia, & reliquis. A vino verò abstineant per totam curationem: cuius loco pro potu, aquam mulsam, vel ex cinnamomi decocto bibant, ab omnibusque replentibus caput abstineant; itemque à balneo, nisi quis alterius occasionis causa ad lauandum se cogatur, in quo paululum insideat, citòque exeat. A piscibus fructibusque, ac reliquis, quæ corpus humectare possunt, omnino abstinendum erit. Moxque curandi sunt qui ea suffusione tentantur, quæ nondum consistentiam adepta est, circa initia, si nihil impediatur, sanguinis ex cubito detractio, ut Aëtio, & Paulo visum est, incidaturque aut media, aut externa, seu humeralis, prout magis expedire videbitur. Deinde nedum clysteriis acrioribus, quorum formulas in prædictis requiras, verum etiam purgationibus vtare, prius tamen his, quæ extenuant, ac præparant, redundantes succos adhibitis, velut est tum oxymel symplex, tum scyllinum, syrupus ex stœchade, aut hyssopo, aut rosaceum mel cum aqua feniculi,

li, seu eufragia, hyssopi, samfuchi, siue betonica. Præparatis autem redundantibus succis, expurgari poterunt ex catapotis cochiis, arabicis aureis, sine quibus, aut lucis, addito trochiscato agarico. Assumas autem drachm. j. vel scrup. iij. ex aliquibus iam dictarum pilularum cum scrup. ij. aut drachm. j. prædicti agarici, & cum succo feniculi, aut eufragia, seu syrupo ex stœchade pilulas formato, ac vtitor: post quarum assumptionem per aliquod spacium vñ. iij. syrupi ex pluribus infus. rosarum rubearum ac duas mannæ electæ (si necessitas urgeat) ægrotò tribuas, vt pote ne corpus calefactum, & exsiccatum nimium ex pilularum assumptione relinquantur. A purgatione occipito cucurbitula affigenda sunt, cute incisa; aut sanguinem ex fronte, vel naribus mittere oportet, Cello auctore. Et ex interuallis apophlegmatismis, ac errhinis vtendum, quorum copiam in prædictis requiras, præsertim cap. de capitis dolore ex pituita orto; necnon familiaribus quibusdam catapotis vti poteris, quæ sic componantur. R. agarici trochiscati scrup. ij. pilueris hieræ simplicis Galen. drach. s. trochilorum ex myrobalanis chebulis scrup. j. cum succo, aut aqua feniculi, seu syrupo ex stœchade pilulæ formantur, ac exhibeantur. Ab hinc ad topica deueniendum est medicamenta: à mitioribusque incipiendum, cauendumque ab his, quæ impensè siccant: nam licet valenter vacuet, quod reliquum est, ita cogunt, quod ægrè, aut nunquam resolui possit: sed eis vtendum, quæ paulatim digerant, velut est mel cum oleo veteri, & feniculi succo ex Aëtij, & Pauli sententia. Similiter & Oribasij medicamentum quod ex caualidis succo, chamædryos, & coronopi, singulorum æquis portionibus conficitur. Adiuuat insuper (vt Paulus testatur) ipsius feniculi decoctum per initia superfusum. T. rallianus ex bacis lauri excorticatis, vrina pueri venerem non experti, laugatis, & paucò gummi suffusis vtilliter inungi asserit. Idem quoque ex felle perdicis cum melle, & succo feniculi illinitionem faciendam esse præcipit. Quidam fel galli similiter cum melle, & feniculi succo commedant: aut loco feniculi, succo rutæ, vel eufragia, chelidonij, seu verbenæ vtuntur. Quidam alij puluerem conficiunt ex hyrundinum capitibus adustis, cum melle, eoque solo vtuntur. Tu autem permiscere poteris aliquem ex prædictis succis; & vtère, aut ex myrrha, & feniculi, seu eufragia succo medicamentum cõponas: & si libuerit, mel quoque addas. Ipse quoque interdum ea vt aqua cõsueui, quam Neapoli pharmacopolæ parare solent. Socialemque appellant. Cuius descriptio reperitur in quodam libro, qui Rosa Anglica nuncupatur, feliciterque successit: cuius cõpositionem hic subscribere placuit. Recipit autè feniculi, rutæ, eufragia, verbenæ, tormentillæ, betonicæ, rosarum, syluestris enduiæ, callitrichi, anagallidis, pimpinellæ, chelidonij, papyri, pæoniæ, foliorum vitis, apij, agrimonij, & caprifolij, singulorum partes equales; triturentur, & pridie ponantur tritæ in vino albo: secunda in vrina pueri venerem non experti: tertia in lacte mulieris, & quarta in melle optimo: quo tempore distillantur, & quod extrahitur vsui referuetur. Hæc de cura suffusionis nondum concretæ, ac confirmatæ: nam ea quæ confirmata est (si curari poterit) manus administrationem requirit: quæ quomodo perficienda sit, Paulum consule cap. 21. libri sexti, & Celsum libro septimo, cap. 7.

Tralib. 2.
cap. 5.

De obscuritate seu offuscatione oculorum.
CAP. XXX.



Obscuritas
visus quid
sit.

Paul. lib. 3.
cap. 22.
Aetius lib.
7. c. 48.

Hebetudo
visus quid
sit.

Cap. 2.
Que oculi
pars in eis
afficiatur, si
paulatim
fiat.

Si obscuritas
visus, causa
est.

Si obscuritas
visus, causa
est.

VLLO interdum in oculis malo ap-
parente, contingit, ut cernendi sensus
deperditus sit, hunc affectum Græci
ἀμαύρωσις, Latini offuscationem, seu
obscuritatem visus appellant, recen-
tiores practicanes guttam serenam nominant. Est
autem (Paulo auctore) perfectum, ut plurimum
videndi impedimentum absque manifesto affectu
circa oculum. Aëtius verò eodem ferè modo præ-
dictum affectum descripsit, quod est perfectum, ut
plurimum videndi impedimentum citra mani-
festam circa oculum affectionem, pura videlicet ap-
parente pupilla, ut minimum, aut semel in totum
non videant. Differt autem affectio hæc ab eâ, quam
Græci *ἀμβλυωσις*, Latini verò obtusionem, seu
hebetudinem visus nuncupant: nam in hac non o-
mnino offertur visio, sed notabiliter minor redditur,
& proinde est quædam videndi obscuratio ab
aliqua causa immanifesta proveniens, ut idem testa-
tur Paulus. Differant itaque affectiones hæc secun-
dum magis, & minus: increscit namque actionis no-
xa pro quantitate declinationis, ac affectus magni-
tudine, ut primo de causis sympto. patet, similem-
que ferè curationem requirunt, & propterea vna
derelicta, de reliqua mentionem fecimus. Verum
quoniam prædicta affectio, quibusdam paulatim,
ac sensim conflat, aliis autem confertim incidit,
si paulatim fiat, læditur in ea oculus, quamvis non
manifestè, aut secundum eius visuum spiritum,
dum in crassatur, aut secundum humores, cum
crassat, aut viscosi redduntur. Interim visus spi-
ritus præter iam dictas causas imminuitur, & debi-
lis fit, corruganturque nervi visui, ac tunica, ut in
senibus accidit. At si confertim incidat hæc affe-
ctio, secundum visus ductat nervos, oculus affe-
ctus erit, Galeno teste quarto de locis affectis, &
Aëtio cap. 48. septimi libri, verum modo quovis
generetur affectio hæc, perpetuò symptoma erit in
genere noxæ functionis sensibilis, visus videli-
cet: eritque ea ablata ut plurimum, interim autem
diminuta valde, neque ex vno tantum morborum
genere pullulat, imò ex quovis gigni poterit, ex
intemperie videlicet, mala compositione, aut vi-
nitatis solutione prænominatarum oculi partium:
quorum morborum causæ non paucæ esse possunt;
cum si paulatim conflatur affectio hæc, ex in crassa-
tu visuo spiritu, tunicis densatis, ac crassifectis, seu
rugosis effectis, aut humoribus in oculo crassis, &
viscosis redditis gigni possit; pariter ex ingenti tri-
sticia, præcedenti diuturno morbo, & collapsione,
& velut corrugatione nervorum visuum; spiri-
tus etiam visui debilitate, & multa imminutione e-
tiam fit: ex quibus etiam causis oculorum hebetudo
progignitur. Repentina autem, & quæ confertim
incidit causa (ut testatur Aëtius) est nervi visui
obturatio à crassis, ac viscosis humoribus confertim
in ipsum illapsis, aut eiusdem nervi resolutione. Di-
gnosces autem dictorum humorum crassorum, &
viscosorum copiam, si ab eis nervus confertim ob-
struatur, quoniam, ut tradit Aëtius, absque alia cau-
sa necesse est capitis gravitatem consequi, maxime
in profundo, iuxta radices oculorum. At si ad eo-
rundem visuum nervorum resolutionem affe-

ctio hæc consequatur, tardè movebitur oculus, aut
omnino non movebitur. Cum verò ex violenta
plaga in caput facta, aut ex casu à cerebri connexu
ruptus fuerit nervus, primum quidem oculus pro-
minentior fit; deinde cavatur & non alitur. Præ-
cedunt autem (ut ipsemet testatur Aëtius) visus ob-
scuritatem, seu oculorum offuscationem assidua
cruditates, & meri potus, & insolatio, capitis in-
stio, acardor, aut perfrigeratio, assidua lectio post
cibum, aut similiter balnea post cibum, vomitus in-
tempestivi, immodicus ac intempestivus coitus,
spiritus detentio violenta, ut in tubicinibus con-
tingit: quæ omnia, & his similia dum modicè fiunt,
visus hebetudinem, dum verò immodicè, offusca-
tionem efficiunt. Fit itaque aliquando offuscatio
ob fortes capitis plagas, aut casus ex alto resolutio a-
liquando nervo visuo, aut rupto, aut per vehemen-
tem concussionem humorum copia illata, & vis-
uum nervum obrutante: quæ omnia, ex aegrorum,
seu astantium assertionem percipi poterunt, & vna
cum prædictis signis promptè distingui. Paulatim
verò offuscatio si fiat, non admodum difficile curari
poterit: quemadmodum nec hebetudo, nisi sen-
ioribus accidit: nam à moderatis causis, & non ab
immodicis ortum ducit. Verum si confertim ob
fortes videlicet capitis plagas fiat, aut casus ex alto,
omnium micissima erit, Aëtio teste, ea quæ fit ex
humorum copia illata propter vehementem con-
cussionem, & visuum nervum obrutante. Pro cu-
ratione autem eius, siue confertim, siue paulatim
fiat, aer moderatus eligatur: siue qui parum ad sic-
cum vergat. Somno vtantur moderato, vitentque
diurnum, curentque ut alium facile solubilem ha-
beant; idque saltem per cibos facito, qui etiam
præ omnibus bonæ concoctionis esse debent: vi-
tandique sunt omnes crassifacientes: imò exte-
nuantes potius eligantur. Vitandus est vini po-
tus, tolerandaque viriliter est aquæ potio, aut aquæ
mulsa, seu aquæ ex cinnamoni decocto. Exer-
citiis vtendum infernarum partium, & deambu-
lationibus pluribus in vmbrosis locis, ut Aëtio vi-
sum est; caveant ab assiduo coitu, capitis insola-
tione à vehementiori motu à cibo, ut neque
legant, aut scribant, balneis eis non conveni-
vitandæ sunt iræ, indignationes, curæ pertinaces,
& vehementes perturbationes, ac timores, præfer-
tim post cibum: pariterque & assidui vomitus. Ve-
rùm eos, quibus oculi confertim offuscantur cu-
rare oportet vena cubiti incisa, si plenitudine gra-
vatus sit æger: validissimum enim auxilium in ipsis
est venæ sectio, ut testatur Aëtius. Incidatur autem
humeralis, aut media, deinde interpositis aliquot
diebus (ut idem Aëtius inquit) fasciam collo cir-
cundabimus, ac constringemus, & postquam fron-
tis venæ elevata fuerint, rursus exoluemus: & hoc
iterum, atque iterum faciemus, quo per spiritus
motum humores obturati violenter concutian-
tur, postea elevatas angulares venas ab utraque na-
si parte secare oportet, eodem Aëtio, & Paulo tes-
tibus, post hæc confertim cucurbitula occipitio af-
figenda est cum scarificatione: nam contingit ple-
runque (ut Aëtius asserit) statim incumbente ad-
huc cucurbitula, hominem respicere. Paulus ve-
rò hircines temporibus admovere iussit, inferior-
esque partes perficere. Verum non oportet his
duntaxat auxiliis contentum esse, sed viribus repa-
ratis postea corpus totum purgare convenit, prius ta-
men

men redundantibus succis preparatis: explebis autē ea vtraque iis, quæ cap. de suffusione retulimus: namque cōmunis est huius affectionis curatio ei, quam in affluis diximus, Paulo auctore. Perseuerante verō adhuc affectione, etiā his quæ naribus infunduntur, medicamentis vtendum erit, ac apophlegmatifinis superius in capite de dolore capitis ex pituita conscriptis. Ceterum si neque his malum cedat, præferim si ex multis, ac crasis succis ad visorios neruos delatis originem ducatur: post omnia iam dicta auxilia, caput sinapismo integendum erit, & quæ adurunt medicamenta occipiti admouenda sunt, cauteria dicta, vt idem Aëtius præcipit. At si visus obscuritas sensum accidat, ab angularibus venis exacuatio velut dictum est: facienda erit statim ab initio, his potissimum qui non multo sanguine abundant, deinde cucurbita occipitio affigatur, postea purgatio fiat. Perseuerante adhuc malo, per modō dicta medicamenta caput purgandum erit, reliquisque paulo ante commemoratis medicamentis vtendum. Illitio autem oculorum in omni offuscatione quouis modo conflata, per simplicia primum fiat, veluti per mel, aut vetus oleum, aut aqua portione simul hac mixta, postea etiam alius compositis vtare, velut est medicamentum à Paulo simul, & Aëtio comprobatum. Id autem recipit croci drachm. j. myrrhæ tantundem piperis gra. xv. spicæ nardi scrup. j. succi fœniculi drachm. xv. ammoniaci thymiamatis drachm. j. mellis vnc. v. ad omnia leuissimè trita fœniculi succum affunde: deinde tere, ac reficca, & admisto melle, aenea pixide excipe, ac vtere. Verum ante illititionem per spongiam in aqua calida marina tinctam fomentum adhibendum erit: aliquando etiam tota facies in marinam tepidam immittenda est. Incipientem quoque offuscationem, aut suffusionem (Galen. auctore 4. de compos. medic. secund. locos, circa finem) persanat omne fel cum marrubij succo ac mel artico. Itē si myrrhæ, & piperis aequales partes assumas cum melle, aut si fœniculi succum, & fel taurinum liquidum, paribus portionibus assumas & mellis artici duplum, ac illinas, aut croci, & piperis æquas portiones felle taurino excipito, atque in collyria redigito, & illinito, quibus omnibus pro offuscationis curatione vt poteris: nec minus & his, quæ paulo ante suffusis approbauimus.

De nyctalope.

CAPVT XXXI.

RETER dicta vitia quæ oculis cōtingunt, vnum quoddam oriri consuevit, quod Græci νυκταλופία, quidā nocturnam cæcitudinem, Plinius hos lusciosos appellat. Celsus verō li. sext. cap. 6. oculorum imbecillitatem nūcupat; ex qua (vt ipse refert) agri interdiu satis, noctu nihil cernunt: vt verō Aëtio. & Paulo placuit malū, hoc est, quo per diem homo cernit, occidēte verō sole obscuri, deinde noctu penitus nihil. Cū itaque videndi functio in hac affectione læsa sit, vt ex eius descriptione liquet, cuique constat oculum affectum esse; neque enim fieri potest, vt cernendi functio oblecta sit ipso oculo, nequaquam affecto, cū affectionis noxa qualiscunque sit, cuiuslibet partis proprium est symptoma, vt patet secundo de locis affectis. Est insuper affectio læ symptoma, in genere noxæ functionis animalis sensibilis, non siquidem

ablata, nec deprauata, sed debilis. Nam vt dictum est, qui tali affectione detinentur, die quidem vident, verum occidente sole obscurius, & noctu omnino nihil. Illud autem magis fieri videtur (vt inquit Aëtius propter aliquam capitis imbecillitatem & maxime visui spiritus crassitudinem, itemque reliquorum oculi humorum, ac tunicarum. Hoc vitium (vt Celsus refert) in fœminam benè respondentibus mēstruis non cadit. Pro cuius curatione, victus ratio ex toto attenuatoria præcipienda est, vitandaque omnia crassefacientia, ab initio etiam a vino abstinentum est: & si bono habitu præditi fuerint ægri, curari debent ex venæ cubiti sectione, humeralis videlicet, & deinde ex angulis oculorum sanguis mittendus est, moxque si vitiosi redundarint humores, conuenienti pharmaco purgentur: aut per clysteres alius inaniatur. Quibus autem id perficiendum erit, sapius supra adnotauimus. Post verō vniuersalem euacuationem, vtendum est his, quæ pituitam per os ducunt, & quæ per nares purgant, & sternuationes quoque cienda sunt: quorum iterum copiam in prædictis requiras. Verum inter ea, quæ naribus infunduntur, tanquam maxime commodū ab Aëtio vnum conscribitur: id autem recipit piperis, staphidis agriæ singulorū scrup. ij. sinapis scrup. j. tundito, ac cribrato, & radicum betæ succum adicito, vt mellis liquidi consistentia fiat, & contritatis naribus infunde, ac attrahe iube, atque, vt ipse asserit, hoc ad dies quinque, aut septem facito. Poteris autem eiusdem staphidis agriæ, & piperis drachm. j. excipere, & sinapis drachm. s. foliorum sampsiuchi pug. s. in aqua decoquito, cui quartam partem succi radicum betæ adicito, & per nares attrahere iubeto. Insuper præcipit idem Aëtius, ac Paulus, vt ante cibum bibendum tribuatur hyssopi decoctum, origani, aut rutæ, & si his remediis affectus non aboletur, rursus purgatio molienda erit, quam ipsi ex scammonio, & castoreo conficiunt, addit tamē Aëtius sal, verum si hoc medicamento vti libuerit, scammonij non drachm. s. sed scrup. s. aut paulo plus assumas: nam purgatio hæc (vt idem testatur Aëtius) sæpe est vestigio ab affectione liberauit, aut multo meliorem dispositionem induxit. Et iterum post paucos dies dandum est purgatorium medicamentum pituitam, & bilem ducens, aut si paulo ante dicto medicamento vti nolueris, vt pote in debilioribus corporibus, infra scripto, vtaris ipsum iterando, interpositis quibusdam diebus, vt videbitur. Recipit autem pilularum lucis maiorum aut arabicarū scrup. iij. vel coctiarum drachm. j. cum scrup. ij. aut drach. j. agarici trochiscati, formentur cataportio ex succo fœniculi, aut syrupo ex stœchade, & exhibeantur. Oculi verō illinantur melle despumato: quo inito ad ipsum continendum oculi ipsi claudantur, aut oleo vetustissimo similiter illinantur, vel aluminis scisci partes duæ, & salis ammoniaci pars vna trita cum melle, aut muliebri lacte, sublinantur: fel quoque hirci ex melle illinitum paucis diebus vitium tollit, vt inquit Alexander. Quidā verō (Celsus auctore) contrito semine portulacæ mel adiciunt eatenus, ne id ex specillo distilet, eoquē inungunt. Verum tum Celsus ipse, tum Alexander, Paulus, & Aëtius cum Galeno 4. de compositione medicam. secund. loc. iecoris hircini faniem, quæ dum assatur effluit, colligere præcipiunt, atque hac oculos oblinire iubent: iecurque ipsum maxime hircinum assatum cum sale, sin minus, caprillum si comedendū

Causa.
Prognosticum.
Curatio.
Vitiis ratio.
Vene sectio.
Purgatio.

Topica.

Alex. lib. 2. cap. 6.

In fine.

exhibeatur, eis prodesse asserunt: similiter si dum ipsum assatur, elatum vaporē apertis oculis excipiat, vitandus tamen est perpetuo frequentior aciorum pharmacorum vsus: ipsum quoque fel capræ, perdicis, aut hirci ex interuallis cum melle illitum idem commendauit Aetius, licet etiam, vt Celsus inquit, isdem medicamentis inutiliter vt, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem extenuant. Contingit verò quandoque, quamuis raro quibusdam, vt noctu quidem melius videant, interdum autem deterius, & si noctu Luna appareat, nihil cernant, eodem Aetio teste, in quibus multum attenuari spiritum, aut tunicas rarefieri, & propterea spiritum dissipari, ac visum obscurari fatetur, noctu verò crassefieri, colligique ac sensum mouere. His autem oportet (vt ipse testatur) robur oculis adde, quamquam Herophilus vice versa eos curabat, medicamentis videlicet, quæ ad eos, qui noctu non vident, magis faciebant: nam cum simul multus, ac æthereus fuerit animalis spiritus, is res quæ distant, & videre, & exacte discernere potest, Galeno auctore primo de causis symptom. cui verò paucis fuerit, sed purus, is vt res propinqua planè discernit, ita distantes haudquaquam videt. At si crassior simul fuerit, & multus, res distantes videt quidem, sed non ad vnguem discernit, quemadmodum cui humidior simul fuerit, & exiguus, is neque exacte, neque porro videre potest. Cum itaque prædictis paucis, isque tenuis spiritus fuerit, aut idem propter rarefactas tunicas dissipatur, mirari non oportet, si noctu melius, interdum autem deterius videant: cum simul noctu colligatur eisdem, ac crassefiat animalis spiritus, & propterea sensum moueat.

Περὶ ἀγίλου. De agilope.
CAPVT XXXII.

Agilops
quid sit.



INTER maiorem oculi angulum, & nasum quidam affectus oriri consuevit, qui à Græcis ἀγίλος. dicitur. Est autem Galeno auctore 5. de compositione medicamentorum secundum locos, paruum quoddam abscessus simile tuberculum inter nasi os, & magnum iuxta oculi angulum ortum, & rumpitur sanè sæpe in angulum, quibus verbis liquet agilopa Galenum nominare tuberculum hoc tam si disruptum fuerit, quam ante eruptionem. Paulus verò (vt pote Galeno iunior) distinetius (mea quidem sententia) prædicti vitij meminit, retulit namque agilopa abscessum esse inter magnum oculi angulum, & nasum, qui si rumpatur, negligaturque in fistulam vertitur vsque ad os, priusquam verò erumpatur in vlcus, abscessus anchilops dicitur. Anchilopa itaque nuncupauit Paulus hoc vitium priusquam erumpatur in vlcus: eo autem in vlcus verso, ac rupto, agilopa. Pars quæ afficitur cum in eius descriptione, tum ad sensum patet. Affectus ipse morbus est in compositione primò, in magnitudine videlicet, & propriè in excessu: cum quo intemperies, ac soluta continuitas complicatur. Verum eo disrupto, morbus erit in soluta continuitate primò, cum de genere vlcerum sit. Progignitur autem à vitiosis succis ad prædictam partem delatis, aut à toto, vel à quibusdam partibus transmissis. Est verò affectio hæc ægrè curabilis (vt Aetius testatur) propter corporum tenuitatem, & subiecti ossis putredinem, seu corruptionem: ob situm etiam vicinitatem (vt idem inquit) ipsi quoque oculo damnum

infert, aliquando per naturale paruum iuxta angulum foramen. Ipse quoque Galenus præcitato loco, cum iam dictum malum in angulum rumpitur ægrè curabile reddi, nisi maturè occurratur, asserit: non enim potest ab acribus medicamentis curari, cum ex eis oculis afficiatur, atque ita affecta etiam partis inflammatio augeatur, nec ob id solum ægrè affectio ipsa curabilis est, sed propterea quod cum multa liquida pharmaca in experimentum assumi possunt, ea non tolerat locus ipse: necessario enim ex eis in oculum aliquid influit, neque verò adhærere eiusmodi queant citra obligationem, quæ totum oculum complectatur, quam impossibile est (eodem Galeno teste) tot diebus aliquem perferre posse, quot ad mali curationem requiruntur. Quapropter Apollonius (vt ipse refert) nulla pharmaca ad agilopas scripsit. Archigenes verò paucis enumeratis, deinceps ad curationem ipsorum per chirurgiam progreditur. Incipiente itaque inflammatione, victus ratione probe instituta pro auersione eius quod influit, eiusdem lateris in cubito vena humeralis incidenda erit, si quid non prohibeat, aliisque diuersionibus, cucurbitulis inquam, frictionibus, ac vinctulis vt edum. Ab hinc redundantes quoque vitiosi succi purgante medicamēto vacuari debent, ne posthac amplius ad affectum locum fluant, eligendaque ea sunt, quæ leniter purgandi vim habeant, pro ratione tamen redundantis vitiosi succi, quo etiam tempore repellentia medicamenta iuxta affectam partem adhiberi possunt. Verum si perueruerit affectio, tentandum est per discussoria medicamenta, quæ citra mordacitatem operantur, eam curare, Galeno, & Aetio testibus. Coafficitur namque oculus (vt diximus) ex acribus: & in ipsa affecta parte inflammatio augefcit. In huc ergo vsum probe facit medicamentum ex glaucio, & croco, vna cum perdicij herbe succo, quam parietariam vocant, compositum si imponatur, iuxta Pauli, & Alexandri sententiam, crebro autem ipsum permutare oportet, vt idem Paulus refert, etenim statim immutatum vim suam amittit, huius medicamenti vsu Trallianus testatus incipientes, & nondum in pus conuersos agilopas prohibuisse, ne in suppurationem intarentur, & proinde eos curasse. Præterea ex alia cocta in aceto, & probe trita, quam etiam commendabat Paulus, non modò incipientes agilopas, sed etiam inueteratos iam, & in pus conuersos mirabiliter se curasse testatur idem Trallianus: præcipitque vt probe leuigata imponi debeat: quod si etiam pus in hærescens deprehendatur, rumpit ipsum, & vsque ad eos penetrat, adeo validum est medicamentum, vt ipse fatetur ruta quoque satiuâ vna cum lixiuo, quod primùm distillauerit, contrita, coctaque, & imposita pulchre admōdum agilopas emendat, & ad vsque os permeat, per initia tamen hoc præsidium modicè rodit, postea verò non item: ac mirum est (vt inquit Paulus) quod ne cicatricem quidem indecoram hoc præsidium relinquit: vsu quoque probatum medicamentum quoddam Trallianus conscripsit: Recipit autem id, internam arundinis membranâ, id quod rotundum circa nodos inueniri consuevit, acceptam melli iniicito, ac particulâ affectæ imposito, mutans quotidie quater, & vbi locum probe repurgaueris, multa cum spongia ocularia abluto: hæc (inquit) prædictam arundinis membranam per se imposito, & miraberis. Antequam verò agilops in pus vertatur, & postquam ruptus fuerit abscessus,

Lib. 3. cap. 22.
Pars affecta.
Affectus.

Causa.
Prognostica.
Lib. 7. cap. 85.

Cap. 1.

Cap. 2.

Cap. 2.

Alex. lib. 1.

cap. 2.

cap. 3.

cap. 2.

Comment.

B.

Primum

indidit in

mentum

quid sit.

cap. 3.

Quid per

tutum do-

cet intel-

ligatur.

Pars af-

fecta no-

ta.

Affectus

quid sit.

cap. 13.

abcessus, cochleas, cum testis suis tritas imponi precipit Paulus, interdum aloë, vel myrrha admista, habet nanque medicamentum hoc deliciandi vim: probè quoque facit thus cum columbino stercore recenti impositum, vt Galenus Archigenis auctoritate 5. de compos. medicament. secund. locos testatur: aut erui farina cum melle. Curant quoque agilopas (si non profundum corruptum fuerit os) chamæmeli folia commansa imposita, aut maluæ folia commansa, si cum sale imponentur, prius tamen quam disrumpatur: radix item lilij recedat ad emplastri formam trita, & imposita agilopas curat, Actio auctore: rumpit enim & repurgat, prout experientia cognitum est: & vsque ad perfectam curationem cicatrice includit. Arnoglossa quoque herba cum modico sale trita, & apposita agilopas destruit, vt apud Plinium secundum lib. primo, de re med. cap. 23. legitur: item nucis combusta cinis iniectus sanat. At in quibus affectio diuturna os corrumpit, aut ad angulum in fistulam abiit, nec predicta contulerint ad chirurgiam confugiendum, quam à Paulo petas, libro sexto, cap. 22. ab Actio libro septimo, cap. 86. à Celso vero libro septimo, cap. 7.

Πνεύματις.

De aurium dolore.

CAPVT XXXIII.

AVRIUM vsum proximū à luminibus natura nobis dedit, Celso auctore libro sexto, cap. septimo, secundumque locum obtinet auditus sensorium in tenuitate, à visu, velut gustus sensorium in crassitudine secundum locum obtinet à tactu, vt patet 4. de locis affectis. propterea expediti ab oculorum affectibus, ad eos, qui in auribus euenire consueverunt, transeundum est, ab earum dolore primum exordientes: quoniam hoc potissimum symptoma artem ad curationem incitat, vt testatur Alexander: quanquam & ipsa quouis morborū genere affici possint, vt primo de causis symptomatum decretum reliquit Galenus, earum primo instrumento, aut partibus quæ illi vsum aliquem præstant, seu audiendi facultate laborantibus, ex quorum omnium culpa lædi hanc functionem contingit. Nomen autem sumpsit hæc affectio, cum ab affectu ipso, tum à parte affecta, vt patet secundo method. medendi: verum cum hic dolor in eidentibus auriculis infestare possit, nec minùs & interim affligit in profundo auditorij meatus, ad quem locum nervus auditorius peruenit, non ex longo intervallo ab ipso cerebro, quem dolorem aurium proprie nominare consueverunt, vt testis est Galenus tertio prognosticorum, cuius audiendi meatus finis vbi nervo dilatato coniungitur, propriū ac primū est audiendi instrumentum, cætera autem ipsarum partes eidem vsum præstant, vt primo de causis symptomatum liquet. Ea de re cum aurium dolorem dicimus, in quacunque earum parte, ex quavis causa ortus fuerit, intelligere volumus; quanquā potissimum de eo, qui in profundo oritur. Quod verò in eo aures afficiantur ex ipsa liquet nomenclatura. At nunquid sola circa meatum cutis, seu euidentes auriculæ affecta sint, vel ipsæ auditorius meatus in profundo, ex ipso doloris sensu, tum etiā ex eiusdem vehementia dicere licebit: vehementio nanque erit si in profundo fiat, vt eodem tertio prognosticorum patet. Quis autem affectus sit dolor, hic iterum asserere superuacaneum est, cum

id fusius disseruimus cap. de dolore capitis, in principio. Insequitur insuper non aliter, quam cæteri, dolor hic, interim ad earundem aurium inæqualem intemperiem, interdum ad earum continui solutionem, aut si utroque modo affecta sint pro diuersitate causarum, quæ earundem aurium dolores excitare solent, quas omnes Galenus tertio de compositione medicamentorum secundum locos conscripsit: docuitque simul modum dignoscendi eas: à quo cæteri auctores Græci, Paulus, Aetius, Alexander ceperunt. Quidam nanque ex frigida intemperie ortum habent à frigidis ventris in peregrinationibus susceptis, aut ex balneis frigidis, quos dignoscēs, si tum prægressa, tum præsentia percontatus fueris, antegressas quidem ex agri, aut astantium relatione, præsentia verò ex teipso, quoniam dolor altè infestabit, fixus quidem citra grauitatem, vel distentionem, vel ardorem. Verum si ex calida conceptus fuerit intemperie dolor, ex prægressa quæpiam insolatione, seu æstuatione, aut ventis calidis, seu medicatis aquis, in quibus quidam ob delicias se lauant aut ob corporis commoditatem, id perdiscēs, doloremque feruidum sine grauitate, seu tensione sentient agri. Quod si ex frigidis glutinosis, crassisque succis proritetur dolor, qui obstructione cum potius concitant, iterum artificiosa quadam coniectura deprehendes prægressa, & præsentia percontatus, cum cibi pituitosi, & mali succi, ac potus frigidiores, humidioresque præcesserint: temperamentum, ac ætas frigida, similiterque anni tempus, & regio, ac aeris constitutio: capitisque, ac aurium grauitatem agri sentiunt. Verum si distentio quidem orta fuerit, grauitatem verò in capite, vel aure nequam percipiant agri, fueritque antegressa frigiditas, spiritum flatuosum & crassum transitum non habentem, doloris causam esse manifestò constabit, qui hand aliter quam inflammatio partes distendēs dolorem excitat. At si grauitas distentioque simul, ac calor, & dolor pulsatilis, simulque etiam febriacula quædam oboritur, inflammationem efficien-
tem esse causam doloris, qui sanguinis exalfecti influxu originem habuerit, bona ratione æstimare licebit, quemadmodū Paulo & Alexandro visum est. Excitantur autem interdum ex ichoribus, seu saniosis humoribus in aurium corpore genitis confimiles dolores, quemadmodum ex mordacium humorum illapsu forinsecus factò cōtingunt, eodem Galeno teste tertio de compositione medicamentorum secundum locos. Quoniam verò maius imminet periculum in aurium affectionibus, quam in oculorum vitiiis, vt testatur Celso: nam vitia oculorum intra ipsos nocēt, aurium inflammationes, doloresque interdum etiam ad dementia, mortemque præcipitant; propterea inter initia protinus magis succurrendum est, ne maiori periculo locus sit, vt ipse inquit. Non absque itaque ratione Hippocrates tertio prognosticorum refert, quod aurium dolor cum febre continua ac vehemēti difficilis est: periculum enim delirij, mortisque imminet: nā natu minores septimo die, aut citius ab hoc morbo interimuntur; natu verò maiores multò tardius. Febris enim ac delirij minùs eos infestant; & aures eis ob id antea suppurantur, sed per has ætates recidiuæ euenientes morborum, plurimos interimunt: minores verò natu priusquam suppurentur aures, interimuntur. Alexander autem, siue meatus auris (dicebat) siue alia ipsius quæpiam interna particula

frequenter inflammatione laboret, acutissima pericula vicinia regionis, & genere substantiæ inducit: redditque ipse rationem: nam nervus qui internam auris superficiem sublinat, cum sit sensibilis, validos dolores, acutosque excitat, ut etiam cerebrum in consensum perducatur, ita ut febres, & deliria sic affectis oboriantur: interim verò moriantur, nec minus curcitiu iuvenes, quam senes ex eodem affectu intereant, asserit: quamquam & ante ipsum non Hippocrates modo, verum etiam & Galenus eodem tertio prognosticorum scriptum reliquerant. Cum itaque non ex vna duntaxat causa aurium dolor excutetur, quò sit ut neque vna sit eiusdem curadi, seu victus ratio, sed iuxta causarum diversitatem diversimodè quoque sit instituenda; prætermissa, quoniam ex his, quæ prius diximus, facile percipi poterit pro causarum varietate cuiusvis doloris auris curationem præcipiemus, quæ cum multa iam dicta sint, tantum numerum remedium esse oportet, quantus est efficientium causarum. Dolores igitur à sola frigidityte obortos calfacientia medicamenta quam celerrimè curant, Galeno auctore tertio de compositione medicamentorum secundum locos, veluti est oleum amaracinum, nardinum, rutaceum, laurinum, aut de castoreo: quòd si maxima fuerit perfrigeratio, benefacit oleum, addito pipere exquisitissimè trito, aut si multum, veteri oleo exiguum omnino euphorbij admisceas, styracem, calsiam, seu calamum odoratum: pariter quoque confert irinum oleum: & ruralibus quoque hominibus, si allium in oleo contundas, vel seruefacias, atque ita infundas, aut si magnam cepam exculpas, deinde oleo eam expleas, & in feruenti cinere moderatè calfacias: atque ita auribus infundas. At si ex calida intemperie aurium dolor originè duxerit, seu ex medicatis aquis, ovi candidum in aurem demissum, ipsum mitigabit, si tepidum paulatim cum lacte muliebri infundatur. Plurimum verò iuvantur ex succo perdicij cum modico rosaceo, aut solani, seu coriandri vel hastulæ regiæ: nec minus & amygdalino oleo, vel oleo in quo lumbrici, seu aselli, qui in aquosis & humidis degunt, fuerint incocti. Coriandri item succus cum lacte mulieris immixtus, & auriculæ infusus dolorem mirificè tollit, ut Plinio secundo visum est lib. primo de re med. cap. 10. Quòd si ex aqua medicata excitatus fuerit dolor circa auditorium meatum oleum assiduè infundere conuenit, quo ipsum eluamus, ut testatur Galenus: deinde lana molli extergere, rursusque infundere. Iuvantur quoque plurimum ex adipe anserino, atque item vulpino: similiter si ovi candidum cum muliebri lacte tepido fuerit infusum. Pro communi namque præcepto habendum erit, ut quicquid auribus adhibeatur, mediocriter calidum esse oporteat, ex communi omnium Medicorum sententia: poterit quoque per excutionem ore aqua attrahi. Si verò quis vno pede auri affectæ proximo exiliat (ut inquit Actius) inclinans quodammodo se ipsum aquam facile excernit. At si ex flatuoso spiritu, aut crasso, lentoque humore aurium dolores fiant, eis vtendum medicamentis erit, quæ obturatione liberant, absterunt, atque incidunt, citra tamen vellementem rosionem, præsertim in quibus dolor magnus, & copiar suspicio subest: cuius generis sunt album, & nigrum veratrum, amygdalæ amaræ, & ex tribus aristis lochiis, quæcumque fuerit ad manum, & iris illyrica: iniicies autem &

cinnamomum, si habueris, aut calsiam, illo non præsentem: nec minus & cucumeris sylvestris, ac bryoniæ radice, & centaurij magniteri radice, seu parui coma vtendum: & omnino omnia amara cõferunt: namque citra mordacitatē, & absq; molestia expurgant hæc meatus, disiciunt, & dissecant obturata, ut eodè tertio de compositione medicam. liquet. commendatur item à Paulo fel ouillum cum oleo communi, vel amygdalino, insuper porri & cepæ succus tepidus cum melle: aut origanum cum melle, & lacte muliebri, si insillatur. Ad vehementiores autem aurium obstructions fel caprillum cum succo porri inditum (ut ipse inquit) confert. Alexander autè fel bubulum, aut ouillum instillatum, seu capræ vrinam continuè infusam commendat, similiter si felle taurino floccum imbutum, laeuigatumque auri imponas. Priuatim autem Paulus ad dolorem ob flatuosum spiritum, refert quòd conferat strenuè cucumis ex aqua calida fota, aurique demissa. Conducit quoque vaporatio ex ruta, samplicho, castoreo, & milio. Verum si in toto corpore, aut saltem in capite prædictorum crassorum humorum adfuit redundantiæ, priusquam modò dictis medicamentis vtaris, corpus totum, aut saltem caput purgante medicamento exonerabis, præcedente tamen eorum coctione, ac præparatione: alius fluxionis causam præbeunt, & dolor amplius irritabitur. Dolor autem auris ex inflammatione oborto, statim sanguis ex cubito mittendus est, media, seu humerali vena, velut plenitudo maior, vel minor, ac vires magis, vel minus valentiores videbuntur: deinde auxilia aggredi quæ inflammationes sedare possunt, ut Alexandro, & Paulo visum est: aliisque reuulsionibus vtendum, frictionibus, vinculis, cucurbitulis, ac clysterijs, aut humorum fluxus inhibeatur. Si & biliosus sanguis redundare videatur, à venæ sectione, purgatione vtendum erit, quæ vim habeat leniter bilē educendi, hanc autem studiosi ex prius dictis requirant, demum moderata existente inflammatione rosaceum cum aceto tepesfactum adhibendum erit. Oleum quoque dulce, & calens per specillum lana inuolutum (Paulo teste) continuè adhiberi potest, aut adeps anserinus, seu vulpinus cum rosaceo: extrinsecus verò ea, quæ dolorem leniunt (ut ipse testatur) materiæque impactam concoquant, superaccommodare oportet. Si verò vehemens fuerit ex inflammatione dolor, mitigabit ipsum (Actio auctore) ovi candidum tenue cum lacte muliebri tepidum infusum. Mitigant quoque feruentes inflammationes (eodem auctore) rosaceum cum auriculæ muris, aut polygoni, vel portulacæ, seu ramentorum cucurbitæ succo, si tepidè insillatur. Item aselli subhydriis stabulantes, seu intestina terræ cum rosaceo cocta, ad oleum amygdalinum, quod insuper cum aliquo prædictorum misceri poterit. Vbi verò maximus, ac vehementissimus ex inflammatione dolor vrgeat, necesse est stupefacientibus sensum vticum videlicet propter dolorem ad mortis discrimen æger tendat; vtendum iistamen, quæ leniter sensum stupefaciunt, ut inquit Paulus: nō enim mediocriter periculum est, ne cerebrum nervo, per quem facultas audiendi erogatur vicinum, confortij lege afficiatur: neque sapius eis vti oportet, sed vbi coactus fueris semel duntaxat, aut iterum offerre conuenit, Alexandro auctore, præsertim si opio vtaris: miscetur autem opium muliebri lacti, & ovi candido: quæ ipsa & per se sæpè aurium inflammationibus

Curatio, si ex frigidityte oriatur aurium dolor. cap. 2.

Si ex caliditate, curatio.

Si ex medicatis aquis curatio. Commune præceptum pro aurium curatione. At lib. 6. cap. 75. Si ex flatuoso spiritu, aut frigido succo fiat, curatio.

nibus profuere, Galeno teste tertio de compositione medicamentorum secundum locos. Excipitur autem opij pars vna, castorei partes duae, & cum lacte mulieris, seu oui albumine, aut vino dulci tepido instillantur, Paulo auctore: quanquam Galenus velit, quod in vehementissimis doloribus parimensura castoreum admiscendum sit, in non tam vehementibus duplas; verum multo ante usum tempore preparatum id esse conuenit. Porro hoc medicamentum, quod ex castoreo, & papaueris succo conficitur, non solum aurium sedat dolorem, sed etiam oculorum, & dentium, si auribus instilletur, vt 12. methodo medendi patet. Verum eo vtendum est, cum maxime necessitas vigeat, cum non nihil (vt iuste Galenus inquit) partes laedat, ac eas imbecilliores reddat ex refrigeratione, velut reliqua anodyna; nisi post in sanitatis tempore easdem partes exalferis; liquor vero, quo haec diluuntur ex musto sapit: multo enim magis quam dulcia vina dolorem haec sedat: quomodo haec miscenda sint a Galeno eodem tertio de compositione medicamentorum secundum locos, decretum est. Similiter quo pacto eadem, aut similia medicamenta auribus vehementer dolentibus iniicienda sunt, docet. idem Aesculapius auctoritate: serosum cruorem, qui a carnibus bubulis, dum torrentur, destillat, si calidus infundatur, commendat. Extrinsecus autem omni ex parte oleo calido, aut nardino, quod adipem asferinum habeat, locus fouendus erit, aut rosaceo, seu amygdalino, & si doloris vehementia exigat, per spongia calente aqua imbutas, in qua chamæmeli flores, fenugraecum, & melilorum fuerint decocta, fomentum adhibere conuenit. Quod si imponi cataplasma aliquando suadebit, papauerum capitibus in aqua coctis, ac fornigraci, vel hordei, vel lini seminis farina aqua immixta cataplasma conficies, ex eiusdem Galeni sententia eodem 12. methodo medendi. Ex si externa videantur auris inflammatione tentari non alienum erit, farinam hordeaceam, aut triticam sapa, aut vino dulci adstrictionis experti incoctam cataplasmatibus modo inducere, Tralliani auctoritate. Vbi autem dolor inueterauerit, ac in pus inflammatio degenerare incipiat, Pauli medicamentum vitior, quod ex leni seminis succo conficitur, vna cum rosaceo, aut chamæmelino; solumque instillabis.

Περὶ τοῦ αὐρίου. De aurium sonitu.

CAPVT XXXIII.

LIVD vitij genus aurium est, vbi aures intra seipsas sonant, atque ex hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant, Celsi auctore, eodem cap. 7. lib. 6. quod vitium Graeci ἰσχυρὸν vocant, Latini (vt Celsus) aurium intra seipsas sonitum: Medicorum vulgus, aurium tum sonitum, tum tinnitum, seu sibilum appellat. Est autem sensus sonitus quidam intra seipsas aures externum sonum impediens, ne ab ipsis accipiantur, quemadmodum ex eiusdem Cornelij verbis percipi potest. In qua affectione meatum auditorium, potissimum secundum eius extremitatem, vbi dilatatum neruum attingit oblaesum esse constat: cum & ipse sensus audiendi, qui iam dicta parte perficitur, affectus sit. Affectio vero ipsa symptoma est in genere noxae functionis sensibilis deprauata: sentit enim audiendi facultas, id quod sentire non deberet, & propterea eius actio deprauata dici debet. Cuius affectionis

causa neque vna esse poterit; nam interim ex flatuoso spiritu generatur, quandoque ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem, ex ore ventriculi exhalantibus vaporibus ad aures ipsas; quemadmodum in oculis similia suffusionis symptomata, Galeno teste tertio de compositione medicamentorum secundum locos, partium etiam ex humore crasso obstructo, interdum ob ipsarum aurium imbecillitatem, quemadmodum in iis, qui ex morbo se recolligunt accidere consuevit, fit praeerea & ratione crisis (Tralliano teste) vt in quibusdam febribus euenit, quemadmodum Galeno etiam, & Paulo visum est. Propterea non conuenit citra artem, aut cognitionem, aut curationem auspicari; quamuis certa cognitio dictarum causarum in principio haberi non possit, artificialem tamen quandam coniecturam ex causis forinsecus lacerantibus (si quis ipsarum vires norit) facere licebit, vt si ex pregressa capitis plaga, aut tali morbo, vel ex cruditate, seu largo vini potu, aut violento, & multo vomitu, vel ob pharmacorum anticularium, usum aurium sonitus fiat: agri quoque temperatura, & habitus dignotio ad inueniendam causam conducunt, vniuersaque praecedens victus ratio: quinetiam si vel paulatim cogregetur, vel coacervatum irruat sonitus, id ipsum quoque ad inuentionem affectionis confert: in superq; si per intervalla repetat, vel continenter hoc symptoma perseueret, vt testatur Galenus. Si igitur sonitus nunc excitentur, nunc cessent, & spacio interposito reuertantur, intelligito ex spiritu flatuoso, cui facilis non patet exitus provenire; maxime si praecesserint cibi, qui flatus generare possint, & multae cruditates, vt Alexander testis est. Si vero ob flatum ventosum, cui transitus interclusus sit, sonitus fieri suspicatus quispiam fuerit, vt inquit Galenus, & ob hanc rem desiccantibus, & attenuatoriis, ac discussoriis pharmacis ad motus nihil profecerit, simulque apophlegmatismis usus sit, & toto capiti prospexerit, tunc sane ob auditus subtilitatem sonitum fieri coniectandum erit: praesertim si acuto audiendi sensu ager praeditus appareat: & propterea certa cognitio, post usum pharmacorum artificiali coniectura exhibitorum huius praesertim causae tempore contingit. Quod si propter humores crassos, ac viscidos sonitus accidat, inde cognosces, quod neque repente oboriatur sonitus, sed paulatim increseat. Insuper quod etiam grauitas percipiat, praecesserintque cruditates, balneorum intempestiuorum usus, & alia quae crudos humores generare solent. Verum ob locorum imbecillitatem, si ortus fuerit sonitus, ex his quae praecesserunt colligere poteris, utpote praecedentibus morbis quibusdam, a quibus conualescunt agri: is nanque accidere consuevit. Si vero in febribus sonitus fiant, aut harum crisis prompte ex eisdem causis progigni dignosces. Ex causis vero externis si excitetur, quae sane ea fuerit, ex agri, seu astantium sermone patebit. Perpetuo autem permanente sonitu, per essentiam aures affectas esse indicium erit: velut si per intervalla repetat, per sympathiam, hoc est, per consensum, vt interim quiescat, deinde excitetur, post videlicet repletionem, aut inanitionem, vel motum, aut vehementem calorem, seu frigus. Lenissimum quidem hoc vitium est, vbi ex grauedine fit, peius vbi ex morbis, capitulve longis doloribus incidit. Pessimum, vbi magnis morbis venientibus, maximeque comitiali, prouenit, vt auctor est Celsus. Hippocrates ve-

Causa.

cap. 1.

Tral. lib. 3.

cap. 6.

Gal. loc. cit.

Paul. lib. 3.

cap. 23.

Signa can-

sarum.

Ex spiritum

flatuoso.

Ex auditus

subtilitate.

Ex humoribus

crassis, & viscidis.

Ob locorum

imbecillitatem.

In crisis.

Ex externis

causis.

Prognostica.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

1. priorbet.
ex. 18

Curatio.

Si ex spū-

tu flatuoso.

Ex crasso.

Et quoque hu-

more fiat.

curatio.

Act. li. 6.

c. 78

cap. 1.

Si ob sen-

sus subtili-

tatem fiat

curatio.

Si in febr-

bus sonitus

fiat.

Ex imbe-

cillitate.

Per consen-

sus si fiat.

ro libro primo prædictionum dicebat, in febre ar-
denti sonitibus aurium accedentibus cum visus he-
betudine, & gravitate in naribus accedente, melan-
cholico modo mente moventur. Cuius quoque vitij
curadi ratio pro causarum diversitate variari debet;
propterea relicta victus ratione, quæ iterum neque
vna duntaxat esse poterit, sed pro causarum ratione
instituentia erit: poteruntque studiosi ex his, quæ di-
ximus in præcedentibus, haud difficulter ipsam per-
cipere; hic pro efficientium causarum varietate do-
cebimus curationem. Si itaque ex flatuoso crassoq;
spiritu, aut humore lento, & crasso aurium sonitus
ortus fuerit, totius corporis, aut capitis saltem, pur-
gatione præmissa, præsertim vbi lenti, & crassi re-
dundantur fucci, cataportis arabicis, aut cochis cum
agarico, aut similibus, errhinis quoq;, ac apophleg-
mativis, deficiantia, ac attenuatoria, & discussoria
pharmaca auribus ipsis admoovere oportet, vt oleū
amygdalarum amararum, aut oleum, in quo casto-
reum, cuminum, seu ruta, anethum, seu nardus fue-
rint incocta, quibus & acetum, & mel admiscere po-
teris, si vehementius attenuare, ac discutere velis,
quæ omnia affectu auri instillantur: quam etiam in-
clinare poterunt adeo, vt per arundinem, seu aliud
instrumentum vaporem intus suscipiant ex aqua, in
qua prius fuerint oleo decocta, sampluchus, ruta,
stoechas, absinthium, hyssopus, pini folia, & origa-
num. Sacculi item parari possunt ex betonica, sam-
plucho, ruta, hyssopo, chamæmeli flore, pini, lauri-
que folijs, qui calfacti auribus imponantur. Facit in-
super ad inueteratos aurium sonitus (Aëtio teste,
Apollonij auctoritate) castoreum, & spica nardi æ-
quis portionibus cum aceto, & rosaceo, si instilletur
hoc idem commendant Galenus ex mente Archi-
genis tertio de compositione medicamentorum se-
cundum locos; & ad Apollonij mentem, porri suc-
cum cum lacte muliebri, aut rosaceo infundendum
præcipit. Similiter rutam, & cuminum pari mensura
trita, & aceto diluta, admisto melle si infundas: aut
amygdalarum amararum oleum cum melle mixtū.
Cepas quoque, & allium, & adipem anserinum pari
mensura trita, & excolata si infundas, conducit. Ve-
rū si ob sensus audiendi subtilitatem sonitus fiat
prædictis pharmacis, ex stupefacientibus sensum quip-
piam admiscendum erit; velut est mandragora, aut
papaveris succus, iuxta Galeni sententiam, aut ro-
saceum cum paucis aceto, ac paucissimo opio uten-
dum; aut oleum, in quo intellina terrea cocta sunt,
infundendum erit, vt Aëtius præcipit: verū ma-
gna cum prouidentia, ea quæ sensum stupefaciunt,
adhibenda erunt, minima quantitate, & a se leuior-
ibus semper inchoando. At si in febris sonitus
fiant, minimè interturbandi sunt; vt plurimum e-
nim statim sedantur, Galeno auctore, ac Paulo. Sin
autem post morbum perscuerauerint, absinthij de-
cocto foueri aures debent, vt eodem Paulo, atque
Alexandro visum est: & acetum, rosaceumque in-
fundi, vel radicula succum cum rosaceo, aut veratrum
nigrum cum aceto iniicere: vel aloem optimam cū
vino mulso, Aëtij præcepto. At si propter imbecil-
litate accidat aurium sonitus, vt in conualescenti-
bus euenit, temperatum aliquod oleum non nimis
calidum, aut frigidum, prout necessitas urgeat,
infundendum erit, chamæmelinum videlicet, anethi-
num, vel rosaceum. Per consensum verò præsertim
à ventriculo ore orto aurium sonitu eidem parti, quæ
primò afficitur, prospiciendum erit. Ex quauis autē

causa ortus fuerit aurium sonitus, vbi inueterauerit,
confert hoc medicamentum, quod excipit seminis
porri, & caryophyllorem ana scrup. j. moschu gra-
v. cum sampluchi, & ruta decocto (interim pauco
vino dulci addito) auribus instilletur.
De difficili seu graui auditu, & surditate.

CAP. M. XXXV. CONTINGIT insuper, vt quip-
piam difficilius, seu grauius, aut om-
nino nihil audiat. Appellant autem
primum vitium Græci δὲ ἀκούειν, Latini verò (vt
Celsus) auditum grauem, interim difficilem ap-
pellant, eos verò qui hac affectione laborant sub-
surdos, aut etiam surdastros siue grauius, & diffi-
cilter audientes. Tales verò Græci ἀποκώφους, δὲ
ἀκούειν, & ἀκούειν, nuncupant, vt testis est Gale-
nus tertio de compositione medicamentorum se-
cundum locos; vt pote qui exiguas voces penitus
non audiunt, magnas autem vix percipiunt. Reli-
quum siquidem vitium à Græcis, ἀκούειν, à Lati-
nis surditas dicitur, vbi auditus in totum offensus
fuerit: adeo vt neque magnas, neque exiguas voces
ægrī percipiant; his quippe affectionibus aures ipse
perpetuò læduntur, vt ex earum oblati functione
liquet: quamquam & ipse oblati possunt per se, vt
si earum audiendi primum instrumentum, aut ali-
qua alia pars eidem vltim præstans afficiatur. Per
accidens verò si earum facultas affecta sit, neruo vi-
delicet, per quem facultatem suscipiunt, aut cere-
bro, à quo eisdem facultas transmittitur, potissi-
mum ea parte, vnde neruus oritur, perpetientibus,
poterunt nanque ex accidenti aures affectæ dici, si
earum facultas læsa sit, siue ratione nerui, siue cere-
bri: quoniam eo tempore priuantur eo, quo præ-
sente secundum naturam operantur. Hunc lesio-
nis modum meminit Galenus, cum primo, tum ter-
tio de locis affectis, quamquam hoc modo affectis
auribus nullum vitij nec sensus, nec alia ratione or-
tum in eis manifestabitur, verū illæso apparente
aurium foramine: interim quoque & reliqui sensus
qui à cerebro etiam facultatem suscipiunt, perpe-
tiuntur, & in ipso quoque cerebro aliquis læsionis
sensus innotescit: quo casu cerebrum affectum erit
aut præter audiendi facultatem nisi oblatum est, &
tunc neruum proprium affectum esse haud absurde
cōiicimus, Galeno auctore quarto de locis affectis.
Verum quomodo orta sit affectio hæc, sympto-
ma existit in genere noxæ functionum animalium
sensibilium, & propriè sensus auditus; quæ functio
non deprauata, sed diminuta in primo affectu, in
secundo verò ablata est. Insequitur autem vtraque
(vt testatur Galenus primo de differentiis sympto-
matum cap. 3.) aut morbum in intemperie, aut in
compositione, aut in soluta vnitare. Verum cum
quidam prædictorum morborum ex propriis eor-
um indicijis promptè dignoscantur, seorsumque
propriam curationem requirant; nam non audient
duntaxat læsionem, sed aliam quoque cum ea of-
fensam præstare solent, veluti est vlcus, abscessus,
quiuus præter naturam tumor, obortus in aure cal-
lus, seu tuberculum, ea de re his prætermisissis de ea
duntaxat surditate, seu subsurditate loqui institui-
mus, quæ ex redundantibus succis, calidis vel frigi-
dis (media intemperie potissimè) excitari cōsuevit.
Quamobrem

Quamobrem dictarum causarum signa trademus, quibus recte iudicari, & inter se distingui valeant. Si enim à biliosis humoribus furditas, vel furditas accedat fursum vergentibus; derepente, potissimumque in febribus infestare solent, natura, atque, ac habitus biliosi quoque erunt: similisque præcessit victus ratio; tempus anni, regio, ac aeris constitutio. Si autem à crassissimis humoribus ad aures decumbentibus oriantur, cum aurium, tum capitis gravitas aderit, ac reliqua quæ pituitosos humores indicant: ob fordes interim, quæ crebro in auribus gigni consueverant, prædictæ affectiones excitantur, quæ quoniam & dignotione, & curatione facile parent, & tolluntur, propterea neque de his etiam mentionem fecimus. Quæcunque autem ab origine, vel paulo post, sed longissimæ, & absolutæ furditates constituuntur, nullo remedio eliduntur, Paulo teste. Quæ verò non absolutæ quidem sed diuturnæ tamen, & ipsæ curationem non recipiunt, aut certe difficillimam, ut idem Paulus testatur. Furditas quoque (ut inquit Hippocrates libro primo prædictionum) in morbis acutis, & turbulentis consequens mala est. Verum quæ ob biliosum humorem ad superiora impetum facientem nascuntur furditates, vacationibus per medicamenta bilem ducentia ex facili abolentur. Quidam etiam sua sponte affectu liberantur, bile inferius descendente, quod quidem Hippocrates aphor. 28. quarti lib. confirmavit, cum dixit, Quibus biliosa deiectiones, superueniente furditate cessant: & quibus furditas superuenientibus biliosis deiectionibus cessat: & eodem libro, aphor. 60. scriptum reliquit. Quibus in febribus aures obfurduerunt, sanguis ex naribus fluens, aut alius turbata, soluit morbum. Valde quoque suspectum habere oportet grauem auditum, ut tertio de compositione medicamentorum secundum locos cap. 1. testatur Galenus: quoniam paulatim augescens temporis progressu perfectam furditatem inducit. Hæ affectiones, si ob biliosum humorem fursum virgentem ortæ sint, ex facili aboleri possunt: nam quidam sua sponte à malo liberantur, bile inferius descendente, quemadmodum Hippocrates testatur; aut sanguine ex naribus fluente. Quidam verò per medicamenta bilem ducentia eis exhibita, facilem curationem recipiunt, Alexandro, & Paulo testibus: quorum materias in præcedentibus studiosi requirant. Victu quoque convenienti contemperandi erunt, eoque biliosus humor permutandus; cuius iterum sæpius in prædictis mentionem fecimus. At ex crudis, crassisque humoribus prognatas furditates vel grauem auditum, vniuersa victus ratione attenuata prius instituta, si nihil prohibeat, venæ sectione curabis; media, aut externa incisa in cubito, venæ potissimum, si recens fuerit affectio, aut cum sanguine permixti sint redundantes crudi, crassique succi, diutina autem existente affectione, vel à sanguine, absolutis redundantibus prædictis succis, vel si quid aliud venam incidere impenderit, omnino purgatione utendum erit, humoribus prius tamen concoctis, ac præparatis: ex qua purgatione nedum totum corpus, sed caput præcipue ex iam dictis succis inaniatur: eaque non semel duntaxat, sed bis, ac sæpius (si opus fuerit) utendum, hanc autem ex prius dictis eligere poteris, præsertim cap. de dolore capitis orto ex frigidis, crassisque succis. A qua purgatione, medicamentis, quæ per os,

& nares pituitam eliciunt (Alexandro, & Paulo auctoribus) vtare: necnon & eis, quæ sternutamenta eient. Itæ & balneis sua sponte scaturientibus, & horum inopia, marinis aquis corpus abluere confert, prout idem auctores præcipiunt, omnique modo caput ipsum, præsertim vbi graue, ac repletum fuerit, exsiccare saluberrimum erit, simulque corroborare, Galeni auctoritate tertio de compositione medicamentorum secundum locos, atque eiusdem sententia in ipsam aurem immittenda sunt pharmaca, quæ crassos, & viscosos humores fundant, ac secent, attenuentque, ex quorum numero (præter ea, quæ ad sonitus tradita sunt) erit abinthium cum aqua decoctum, ac per arundinem pro fomento adhibendum, ita ut alteram arundinis partem cavitati auris adaptes, alteram verò foraminis operculi ollæ inferas; quò vapor, qui exhalat, ad auditorium meatum allabatur: vtæris autem hoc potissimum (Apollonij auctoritate) ad auditum grauitatem repentinam, & ob dolorem capitis obortam: buccis quæ lauri, aut foliis eiusdem in aqua decoctis similiter vti, aut origano: itemque hyssopo, aqua quoque marina, & aceto vti conuenit, omnis item piscis fel, perdicis, aut capræ infusum prodest, aut erinacei terrestres cum oleo: fel insuper tauri cum anguis senecta aceto exceptum, & aurium meatui inditum, grauem auditum soluit, Aëtio teste: aut ruta succus cum melle, seu castoreum cum oleo anethino, ut Paulo visum est. Fomentis quoque utendum, quæ per ipongias fiunt ex aliquo prædictorum decocto: & castorei cum bacis lauri, & aceto permixtum in aurem instilla. Nam mirifice conducit cum hoc, tum reliqua connumerata medicamenta, etsi valentissima sunt, sustinet enim (ut inquit Galenus sexto method. meden. in fine) auditorius meatus valentissima medicamenta: quamuis non solum vsque ad cerebri duram membranam pertineat, sed etiam neruum contingit, qui in ipsum à cerebro descendit, ut diximus. Plinius Secundus libro primo de re med. cap. 12. inquit, quòd succus hederæ mundissimus cum vino instillatus plurimum facit item allium, & cepulas cum adipem anseris, si colas, & infundas: una quoque formicarum (ut idem refert) contrita furditatem aurium, quam vetustissima sit, sanabunt: caprillū item fel instillatur grauius audientibus, & prodest; ac bubulum lac cum felle caprino mixtum, & infusum auriculis grauius audientibus restituit auditum, eodem auctore. Libro autem de medicamentis, quæ ad manum sunt Gale. adscripto legitur, quòd leporis fel recens cum paris mellis portione mixtum, & in cepæ corio tepefactum in aurem immisum ei, qui nihil audiat, auditum restituit.

De parotidibus.
CAPVT XXXVI.

POST aurium affectus, deinceps opportunè visum est de eò affectu agere, qui in adenibus iuxta aures adiacentibus oriri consuevit: nominat autem hunc Græci *παροΐδης*, à Latinis quoque parotis nuncupantur. Sunt autem parotides ex inflammationum genere, quæ glandulis circa aures affectis fiunt, Gale. teste, tertio de compositione medic. secundum locos. Ex quarum descriptione liquet, quæ partes in eis afficiantur, quia adenes iuxta aures, quod ab alijs alio indicio, sola inspectione patebit.

R

Cap. 1.

Topica.

Vide Galen. loco citato, & Aet. lib. 6. cap. 79.

Loco citato.

In principio libri.

Parotides quid sint. Cap. 2.

Partes affectas.

Affectus verò (cùm è genere inflammationum sit) erit morbus in quantitate, proprie in excessu primo, sicut reliquæ inflammationes, secundo verò in intemperie, & soluta continuitate: id quod dignoscere ad sensum licebit, absque alia signorum inuestigatione. Harum autem causa non vna duntaxat esse poterit: nam quandoque ex redundante sanguine, eoque non immodice crasso gignuntur:

Causa.

Earundem signa.

id quod dignoscet ex tumoribus magnis, rubrisque existentibus, ex doloribus continuis vehementibus, atque grauantibus, & temperamento, atque habitu, sanguineis existentibus, præcedenteque victus ratione multum sanguinem gignere potentem, & reliquis huiusmodi. Fiant insuper ex bilioso sanguine, ac tenuiori; quod cognoscere licebit, eo quod tumor sit rubicundior citra grauitatem, igneus, erysipelati persimilis: ægerque videbitur tanquam ardere, & tangentes manifestam caliditatem percipiunt, vt Alexander testis est. Quæ præcesserunt, ac comitantur pariter bilem redundantem arguent, vt habitus, ætas, temperamentum, ratio victus, ac reliqua. Verùm si à melancholico sanguine prouenerint, neque ruborem habebunt, neque dolorem adeo ipsæ inferunt, sed tumorem quendam scirrhum, quemadmodum si ex pituitoso sanguine fiant, laxum tumorem, qui oedema dicitur, repræsentabunt, nihil habens dolorificum, aut remittens: nec minus & quæ præcesserunt melancholicum sanguinem, aut pituitosum apta fuerunt procreare. Consueuerunt autem indifferentes cunctæ oriri, Galeno, & Paulo testibus, interim ex humoribus in capite in pactis, atque ab eo ad iam dictas partes transmissis, interdum autem citra capitis affectionem in febris, natura superfluos humores ex vasis effundens ad regionem inter cutem, & subiecta corpora deponit iudicatorie; quo tempore & glandulæ ex effusis humoribus participant, prædictoque affectu laborant. At Celsus auctore libro sexto cap. 16. parotides oriri solent modo in secunda valetudine, ibi inflammatione orta, modò post longas febres, illuc impetu morbi conuerso. Accurate igitur inspicere debet tum qualitas, tum quantitas materiæ influentis, & parotidas excitantis, vt inquit Alexander: nam quedam ipsarum ratione crisis concoctione apparente sunt, quæ neque prauæ, sed curatu faciles existunt: multosque magnis periculis liberantur; aliæ verò ex copia cruda contingunt, quæ naturam grauant, simul, & nonnihil irritant: quare etiam præcedente tempore periclitantur, & Medicis multa tentantibus, vix ad suppurationem, aut concoctionem perueniunt. Victu itaque congruo maximè, & subiecto affectui, causæque eius effectrici accommodato imprimis consilito, si sanguis redundare videatur, per venæ sectionem ipsum euacuabis: præsertim si vires permittant, antequam vllam curationem pariti adhibeas, Galeni, Pauli, ac Alexandri decreto: qui enim (vt inquit Alexander) nulla vacuatione præmissa, statim ad inducenda cataplasmata transierunt, aut aliud, quod discutere, aut extrahere parotidas potest, hi manifestò auctores extiterunt, cur ægri strangularentur. Incidenda tamen erit eiusdem lateris humeralis vena. A sanguinis autem missione ad topica deveniendum est medicamenta: quæ minimè repulsoria (veluti in reliquis inflammationibus vt conuenit) esse debent, præsertim cùm neque malignum sit, neque multum quod in-

Gale. loco cit. Pauli. 3. cap. 23.

Prognostica.

Curatio.

Vena sectione.

Topica.

fluit, neque corpus humoribus ex æquo plenum sit: tunc nanque prima pars curatione partium inflammationum à reprimendis, ac repellentibus exordienda erit. Verùm in parotidibus, siue paucum sit quod influit, siue multum, benignum, aut malignum, aut corpus ex æquo plenum, aut non plenum, Galeni decreto tertio de Compositione medicamentorum secundum locos, etiam præcedente totius corporis euacuatione nunquam eis vtendum erit: & si Celsus eodem libro sexto cap. 16. interdum ea admittat, cùm videlicet sine morbo intumuerit, tutius tamen erit, si ab eis abstinere semper, sed maturari, & quamprimum aperiri commodius est, vt ipse inquit, præsertim si ex aduersa valetudine fiant: quanquam considerandum sit (vt ipsemet testatur Galenus) num vehementi impetu fluxus illabatur, vel nò: nam primo casu nihil nos curiosius agentes, iuxta Hippocratis sententiam aphor. 20. primi libri, omnia natura permittimus. Si enim siue cucurbitam, siue aliud pharmacum humores ex alto ad cutem attrahens admovent, vehementes dolor hominem apprehendit: unde & vigilie fiunt, & febres succedunt, ac vires exoluantur, Galeno teste, præcitate loco. Mitigare igitur, & non humorum influxui opitulari tunc potius conuenit per cataplasmatum maximè lenientium vsum: veluti est, quod ex frumenti, aut hordei, aut seminis lini farina, cum aqua mulla, aut fœnigræci, seu althææ, seu chamæmeli decocto conficitur. Item quod ex lapathio, & axungia insulsa constat, vt inquit Paulus, & quæcunque alia, quæ ad hæc commodè humectam habent caliditatem: per quam mitigare dolores valent, ac influentes humores concoquere, ac suppurare possunt, in eundem vsum corporibus præsertim mollibus, eunuchorum, puerorum, mulierum, & eorum, qui teneram habent carnem, eiusdem Galeni auctoritate, butyro locum illinentes: & si vehemens fuerit dolor, butyrum, & adipem suillum simul liquefacimus, & modica cera adiecta, vt mollius cerarum fiat (vt inquit Aëtius) imponemus. At si non vehementi impetu influxus irruat, humoresque adhuc altè delitescunt, parotis in tumorem non attollatur, iuuari natura debet, vt affligens humor ex profundo ad cutem attrahatur, pharmaca attractoria, aut fomenta assidua adhibendo: atque si hæc nihil memorabile efficiant, etiam cucurbitam affigentes, vt inquit Galenus. Nam si in altum recurrat colluies, periculum haud medicare subiecturum est, vt Paulus testatur: optimum vtique hic videbitur naturam adiuuare. Quod si moderata fuerint parotides, ac mitiores, vt pote quòd neque multa copia influat, neque dolor vehemens addit, neque caliditas cum humore, sanare eas poterimus facile (vt inquit Galenus, & Paulus) foribus ex melle vrentes, & cataplasmata magis calefacientia, & discorrientia adhibentes, cùm neque ipsæ ad suppurationem festinant, neque vehementem dolorem inducunt, veluti esset ceratum ex butyro, & æsypo paratum, quod ostrea vltia, aut buccinas, aut purpuras assumeret, vt inquit Aëtius: vel ex eisdem ostreis vltis, anserinoque adipe, veteri, insulso, & butyro, & cera compositum: quod quidem efficacissimum est, vt ipse inquit: quamuis hæc eadem medicamenta ante Aëtium Galenus conscripserit tertio de compositione medicamentorum secundum locos: nunc quòd pro adipe anserino suillum apposuit veterem insulsum. Verùm si non ita mitiores fuerint parotides

cap. 4.

cap. 2.

cap. 2.

cap. 2.

cap. 2.

fulsum. Verum si non ita mitiores fuerint parotides, attractorii pharmacis (vt diximus) ac discussoriis vtendum erit, fomenta assidua adhibendo ex florum chamæmeli, sœnigræci, seminis lini, & serratulæ campanæ decocto. Quod si ex crassiori humore ac frigidiori excitentur, in aqua, & vino decoctum parari debet ex prædictis, adicique poterit hyssopus, serpillum, sampuchus, pulegium, & reliqua, quæ euidentiorem vim discutiendi habent. Post forus ex oleo amygdalino, chamæmelino, aut anethino locum illinemus: aut cataplasma ex hordeacea farina, & semine lini, in iure sœnigræci, chamæmeli, aut althææ decoctis adhibebimus. Frigidioribus autem, & crassioribus existentibus succis, oleo irino, aut liliorum alborum, sampuchino, aut rutaceo vtatur, aut cataplasmate ex crui, seminis lini, & sœnigræci farina cum sicuum siccarum, & chamæmeli iure decoctis, addita mulla, & cum his cucurbitæ quoque affigenda sunt, præsertim si nihil memorabile efficiant: bene item discutit parotidas iris illirica contusa, cocta ex passo more farinæ hordeaceæ, calida bis, tēve imposita, vt inquit Scribonius Largus. Eiusdem iris illirica puluerem cum hordei farina in mellicato decoctum commendat Theodorus Priscianus capite octauo libro primo ad Timotheum. Quod si ex his tumor nō discutiatur, sed etiam dolor perseueret, necesse est tandem, vt ad ea quæ suppurationem excitare, & materiam possunt concoquere digrediamur: velut est frumenti farina cum caricarum decocto, & oleo, item quod ex polline, & quod ex fermento constat pharmacum, Galeni auctoritate: lapathum quoque, & axungia porcina, si in hydrelæo coquantur, idem præstant, ex Alexandri sententia. Postquam verò in pus parotides transferint, materia mutata, id quod tibi innotescit ex rigore præter rationem, & febre, quæ prius non erant, ac maiori dolore præcedentibus, tempore quo pus conficiebatur, ac demum delitescit, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, aut sanè per acre medicamentum abscissum rumpere, aut tentare, vt ipsum per medicamentum attractoria, & tenuium partium vim habentia discutiamus, Galeno teste eodem tertio de compositione medicamentorum secundum locos. Verum si ipsæ parotides inueteratæ fuerint, citra omnem molestiam discutiunt, & emolles, si buccinas vltas, & ostrea, omnia adipi veteri porcino liquato admisceas, ac supra affectum locum adhibeas, Aetio teste: hoc idem efficit, si prædictorum cinerem cum melle admisceas, aut si ficus marinas aqua incoctas, vel marrubium cum sale imponas ex Pauli sententia, seu melius Archigenis: quoniam eius esse hæc medicamenta fatetur Galenus tertio de compositione medicamentorum secundum locos.

Περὶ βλαβῆς τοῦ σπληνός, καὶ τῆς παρὰ τὸν. De læsione splenis, & naturæ vitis.

CAP. XXXVII.

IN ordine instrumentorum sensus, tertium locum ad dignoscendam reueni substantiam odoratus tenet, Galeno teste, cum libro de instrumento odoratus, tum quarto de locis affectis, & propterea in quatuor aliis sensoriis, tanquam medium constituitur, ea de re absolutis aurium affectibus, & ad eos qui olfaciendi facultati, ac naribus contingunt, transeundum esse censui: prius

tamen de ea odoratus læsione, quæ non in meatibus nasi est, pertractare decreui: quæ qualiscunque fuerit, siue difficilis, diminutè videlicet, seu ablata oblecta functio, siue deprauata, noxa non eorū meatuum qui naribus conspiciuntur, erit, sed vel anteriorum cerebri ventriculorum, aut eorū meatuum, qui in os coliformes appellatur, ex Galis sententia tertio de locis affectis, in fine: quem sectati sunt Paulus, & Aetius. Nanque (vt idem Galenus testatur) odoratorum sensus in prioribus cerebri finibus perficitur, elatis ad ipsos per iam dicta coli foramina vaporibus, cum natura in fabricadis cuiusque sensus instrumentis, similitudinem sensibulum secuta sit: & propterea vaporis quodammodo simile proprium odoratus instrumentum esse oportebat, vt libro de instrumento odoratus liquet. In ipsis itaque cerebri anterioribus ventriculis, qui etiam vaporosum quendam spiritum continent, vt patet octauo de vlu partium, odoratorū sensus perficitur, non ab re iuxta Gal. sententiā. Quapropter olfaciendi facultate oblata, ad priores cerebri ventriculos referatur affectio, si simul cū ea vox nō oblata sit, sed incolumis seruabitur: verum si vox quoque mali contagium senserit, laboriosior quodammodo red data, colatoris osibus, oblectis affectio tribuenda erit, quemadmodum Paulus testatur. At si cerebri priores ventriculi affecti sint, eorum affectio, aut ex intemperie sola, aut etiam ex humorū copia oriri potest. Si vero colatorij meatus affecti sint, obstructio duntaxat eorum, & non intemperies sola in causa esse poterit, & proinde licet odoratus oblectio perpetuo symptoma sit in genere noxæ functionis sensibilis propriè olfaciendi, siue ea functio diminuta sit, ablata, seu deprauata, non ad vnū tamen genus morborum sequitur: sed si colatorij meatus affecti sint, vt pote obstructi (vt diximus) morbum in compositione, & propriè in via comitabitur, ipsis autē incolumibus existentibus, anterioribus verò cerebri finibus affectis in intemperie morbum sectabitur. Quibus autem indicibus olfaciendi læsio dignoscatur, nequaquam scribere oportet, cum ex ipsius ægri relatione promptè modus læsionis eius percipi possit. At habita notitia, quod olfaciendi facultas ex affectione anteriorum cerebri ventriculorum oblata sit, cum ipsi intemperatura quadā affecti sint, mox qualis sit ea ventriculorum cerebri, ac ipsius etiam cerebri intemperies inuestigandum erit: quæ nō alia via tibi innotescet, quàm ex his notis, quas conscripsimus, cum de dolore capitis pertractauimus: siue ea intemperies sit sola, siue cum alicuius succi redundantia, propterea non est cur iterū de eis hîc mentionē faciamus. Verum si odoratus offensio obturatos colatorios meatus sectetur, ex detētis præter consuetudinem narium excrementis, muco, ac destillatione vt plurimum prægressis, cū his quæ diximus percipi poterit: quanquam etiam ex malis quibusdam redundantibus succis prædicti meatus obstructi possunt, ventriculique oppleri, ac aliena intemperie affici: qui ex propriis eorum indicibus haud difficulter comprehenduntur, potissimum vbi deprauata functio fuerit. Non itaque despicienda læc affectio erit, præsertim vbi anteriores cerebri ventriculi, nedum intemperie affecti, sed humore opplati sint: quoniam præter id quod spiritus animalis, qui in ventriculis continetur, ac cerebrum ipsum intemperie quadam afficiatur, hæsitandum erit de futuro caro, morbo comitiali, aut apoplexia, humoribus ipsis diu deten-

Pars affectus.

Paul. lib. 3. cap. 24. Aetius li. 6. cap. 96. Odoratorum sensus quod loco fiat. Cap. 3. Cap. 6.

Quibus indicibus dignoscatur, quæ pars fuerit affectus.

Qui præter naturam affectus sit.

Quos morbos sectetur.

Causarum cognitio.

Prognostica.

Cap. 6.

Curatio.

Vicius ratio.

Medicamentorum ratio.

Cap. 4.

tis, ac adeo auctis, ut pleni ventriculi sint, non anteriores modo, sed medius saltem, aut etiam postremus cum eis quemadmodum euenire solet, si ipsis plenitudo existens tota nocte supini cubemus, Galeno teste, libro de instrumentis odoratis. Insuper si odorandi functio deprauata sit, magna ex parte periculosa existit, praesertim si in acutis morbis accidat, & odor quispian putridus, ac foetidus sentiat. Verum si ex sola cerebri intemperie olfaciendi facultas oblata sit, contrariis duntaxat remediis curabitur, calidis, si frigida fuerit intemperies: & frigidis, si calida; humidis, si sicca: & siccis, si humida fuerit: quemadmodum in cura doloris capitis ostendimus. Ex humorum autem copia, siue cerebri ventriculos opplente, siue colatoris meatus obstruente, si odorandi functio oblata sit, ea prius, aut sanguinis missione, aut purgatione vacuanda erit (ut inquit Paulus) prout ipsa humorum copia exigit: & deinde ad topica medicamenta deuenire. Sed quoniam magna ex parte, qui ventriculos opplent, ac colatoris meatus obstruunt redundant succi frigidi, ac crassi sunt, ea de re, si ita contingat, odoratum obladi, vniuersa victus ratio, quae attenuatoria sit facultatis, instituenda erit. Proinde domus in qua degunt taliter affecti, moderate calida sit oportet, pro temporis anni ratione: in siccioribus locis diuersentur: gymnasiisque pro viribus vtantur, ac moderato somno nocturno: nam diurnus, & diuturnus incommodus eis existit: dum autem dormiunt certicialia sublimia habeant, & in latus reclinentur, non tamen secundum affectam partem, praesertim si contingat vnum ex colatoriis meatibus esse obturatum, ut inquit Aëtius, Archigenis auctoritate, ex interuallis quoque acrium rerum esus adhibeatur. Hac victus ratione instituta, ac totius corporis purgatione praemissa, non semel duntaxat, sed bis, & saepius, si opus fuerit, praesertim si purgans medicamentum valentissimum non sit, commodus erit vsus eorum pharmacorum, quae pituitam per os ducunt, quorum formulas supra requiras; aut ex staphide sylvestri, mastiche, & vna passa componas: nec minus & caput ipsum per ea quae naribus infunduntur, purgari debet, prius eis vtendo, quae in praecedentibus conscripsimus: demum efficacioribus, seu est elaterium cum lacte, aut cyclamini succus. Ipsum quoque cyclaminum siccum tritum (ut inquit Aëtius) insuffla, aut nigellam tusam ac cribratam, & oleo vetustissimo addito probe tritam per nares infunde: & pharmacum per inspirationem vehementius attrahere iube: aquam autem agro in ore continendam exhibe; quo medicamento vsus fuit Galenus in quodam adolescente, qui a diuturna tum grauedine, tum destillatione odorandi sensum laesum habebat, ut patet libro de instrumento odoratis. Hic ubi per triduum hoc auxilio vsus fuisset, magnopere ab eo adiutus fuit: quarto autem die cum eodem medicamento sic vsus esset, ut spiritum violentius, quam antea attraheret, grauem in intimo capite morsum percepit; qui tamen, ut sensum leniretur, postera die penitus conualuit: vtiliter etiam nigella assumitur cum aceto, ut refert Aëtius. Sternuatorio item vtendum, primum simpliciori, deinde efficaciori, quale est veratrum album leuissimè tritum; odoramenta quoque assidue adhibeantur, veluti est narcissus, sylimbrum, aut serpillum odoratum, mentha, polium, & thymbra: quanquam om-

nium vtilissimum sit castoreum aceto dilutum: quin & potum castoreum tritum cum aqua mulsae cyathis tribus, pra multis auxiliis proderit, eodem Aëtio teste: verum efficacius redditur, aceti scillitici cyatho dimidio addito. Vtilissimum quoque ipsis existit acetum scillinum quotidie a ieiunis trium cochleariorum acceptum. Caterum si pertinacior fuerit affectio, adeo ut adhuc auxilio aliquo opus habeat, radendum est caput, & sinapisinus adhibendus vsque ad frontem: & si opus fuerit, nedum fronti, sed faciei, ac naso adhibere oportet, & postea lenare: quin & theriacae saepe assumptio magno erit praesidio, Paulo auctore.

Περὶ ὀζανῶν. De ozanis.

CAP. XXXVIII.

EX genere verò vlcere sunt ea narium vitia, quae Graeci ὀζανῶν, Latini quoque non alio modo quam ozanas appellant, ex foedo odore quem habent, sic dictae. Sunt namque ozanæ vlcera circa nares, pluresque crustas, & odorem foedum habentia, Celso auctore cap. 8. libro sexto, aut vlcera curatu difficilia, putredinosa, grauiusque olentia, ut ex Aetio, & Alexandro colligi potest. In quibus quod nares afficiantur, nullo alio indicio opus est, cum ex inspectione patere poterit, ac aegri narratione; similiter quod morbus sint in soluta continuitate: nam in vlcere genere continentur, ut diximus: id quod etiam visu facile deprehendi poterit. Earum autem causa humores acres, ac putridi sunt, ex ipsorumque influxu generantur, ut Galenus testis est 3. de compositione medicamentorum secundum locum. Nam si acres solum fuerint humores, aegre curabilia vlcera producere consueverunt, non tamen graueolentia, eodem Galeno auctore praecitato loco. Relinquitur ergo, ut ozanæ ex acrimia, & putredinosa humorum influxu procreentur: & propterea differre ab his vlcerebus, quae ex acrimia duntaxat humorum influxu fiunt, non tamen graueolentia sunt. De hoc malo scribi quidem debet (ut inquit Celsus) quod vix ei succurri possit, nihilominus tamen quaedam tentanda sunt, quam curatu sit difficile. Cibo itaque modico, qui neque acer, neque valentissimus sit, est vtendum: pariter & potu: & si suspicio adsit copiae humorum in toto corpore redundantium, ea prius aut sanguinis missione, aut purgatione auferenda erit, Paulo teste. Demum quoniam ex capite in nares acrium, ac vitiatorum humorum defluxus provenit, quantum primum caput siccetur, ac roboretur oportet, Galeno auctore eodem tertio de compositio. medic. secundum locos, eoque siccato, ac roborato ad nares purgationem progrediendum erit, scopo hoc in ozanis proposito, ut affecta pars permittit facultatis pharmaca, tum repellentia, tum discutientia resicetur: repellunt autem tum austera, tum acerbiora, quae communem adstringentium appellationem habent; discutunt verò calida, & sicca facultate praedita. Qua de re caput ad cutem tondeatur, assidueque vehementer perfricetur: demum quae siccandi, ac firmandi facultate praedita sunt, sincipiti, ac toto capiti praefuso (ut dictum est) imponantur, veluti est oleum myrrinum, rosaceum, puluis corallorum, ac santalorum, rosarum rubrarum siccarum, mastiches, & mannae thuris, acetum, & alia huiusmodi: quorum sylvam studiosi petant cap. de dolore capitis. Ex Aetio autem, & Alexan-

di sententia tale medicamentum imponi debet: excipit vero myrrha, thuris, singulorum vnc. j. cochleas integras quinque, quibus ceram, & albumina ouorum duorum addito, commiscet oq; ac medicamentum capiti cum linteis diebus 9. continuis inducitur. Postquam itaque per prædicta caput corroboraueris, ad nasi curationem accedes, præpositum iam scopum habes: in nares itaque ipsam mel cum exiguo modo resinae terebinthinae coniiciatur, ex Celsi sententia; quod specillo quoque lana inuoluta sit, attrahaturque spiritu is fuscus, donec in ore gustus ejus sentiat: sub his enim crustæ resoluuntur, quæ tamen per sternutamenta elidi debent. At puris vlcibus (eodem Cornelio auctore) vapor aquæ calidæ subiciendus est; deinde adhibendum aut lycium ex vino dilutū, aut menthæ, seu marrubij succus, seu omplacium, sic ut horum cuiuslibet mel addiciatur: inuoluendumque lana specillum est, & in eo medicamento intingendum, eoque vlcera implenda sunt; rursumque linamentum inuolutum, & oblongum eodem medicamento illinendum, dimittendumque in nares est, & ab inferiore parte leniter deligandum, idque per hyemem, & ver, bis die; per æstatem, & autumnum, ter die fieri debet. Verum Galenus (Archigenis auctoritate) calaminthæ succum naribus infundendum in ozænis præcipit: aut ipsammet aridam calamintham per fistulam insuffillandam iubet, & ad naris vlcera ex malorum puniceorum succo in aneo vase ad medietatem cocto paratum medicamentum perline, aut malum punicum dulce, integrum, in vino coctum tertio, & forinsecus imponit: poteritque ex cerula, & argenti spuma simul contritis, eisque dum teruntur vinum, & oleum myrreum addi, donec mellis crassitudinem fecerit, medicamentū parari, eoque vlcus illiniri, eiusdem Cornelij auctoritate. Interim si vetus fuerit vlcus præsertim, myrrham, plumbum vltum, ac alumen prædicto vnguento permiscere poteris, furorū atramentum vltum, vel sal ammoniacum, simulque cum his mel, & acetum, ex quibus constat cum ozænarum, tum etiam aliorum narium vlcum curatio. Vnum autem Aëtij medicamentum ex mente Orbasij prætermittere nolui, excipit autem spuma argenti, & cerula drach. vj. plumbi vlti, & loti drach. iij. myrrhæ, aloës, singulorum drach. ij. gallarum drach. j. vino, & myrteo oleo dilutis vtere ad narium vlcera; facit etiam & ad sedis vitia, vlcera scilicet, seu rimas, eodem auctore.

Περί πολυπόδος.

De polypo.

CAP. XXXIX.

VELVT ex vlcum genere ozæna, sic quoque ex genere tumorum præter naturam affectus quidam in nariibus generantur, qui à Græcis πολυπόδος, à Latinis veluti à Celso, polypus nomen à similitudine ad aliquid extra positum, velut elephantiasis, & cancer, ab elephante, & cancro, cum quibus similitudinem habent, vt testatur Galenus 2. metho. mieden. propterea ab eodem Galeno 3. de compo. med. secund. loc. asseritur polypum ratum, polypodis carni asimilis, iuxta substantiæ proprietatem: quem etiam sectati sunt Paulus, & Aëtius: nam polypus marini carni proprietate essentia,

& colore, & compage similis existit, eodem Aëtio teste. Celsus vero cap. 8. libro sexto, dicit, quod polypus est caruncula, modo alba, modo subrubra, quæ narium osi inhaeret, & modo ad labra pendens nares implet, modo retro per id foramen, quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increfcit, vt postquam conspici possit, strangulatque hominem, maxime austro, aut euro flante; fereque mollis est, raro dura, distatque polypus, iuxta eiusdem Celsi sententiam, à reliquis carunculis, quæ naribus nascuntur: quoniam illæ similes sunt muliebribus mammis, ac in imis partibus narium, quæ carnosissimæ sunt inhaerent, etsi eiusdem naturæ sint polypi, & carunculae, quas Græci γαργαρά. Pars affecta. Affectus præter naturam. appellant, Paulo auctore. Nares ergo in eiusmodi affectionibus affectæ sunt, vt ex iam dictis, ac oculorum inspectione patere potest, ac affectus, seu morbus in quantitate existit, cum è genere tumorum præter naturam sint, Galeni, Pauli, Aëtij, & Alexandri auctoritate: ex quorum essentia proprietate manifestum est (vt inquit Galenus, & Aëtius, post eum) eos ex crasis, & viscosis humoribus generari; quare non est, cur laboremus notas hic conscribere, quibus morbum hunc dignoscamus, cum ad sensum pateat, nec eas, quibus eiusdem morbi causa dignosci possit: quoniam manifestum est (inquit Galenus tertio de compositione medicamentorum secundum locos) affectionem hanc ex crasis, & viscosis humoribus generari: & proinde non ab re Celsus asseruit morbum hunc ferè quidem ferè curari, quamuis interdum medicamentis quibusdam inarescat. Verum si cancerosus ferè polypus fuerit: attingi non debet, vt idem testatur: quæuis magis spiritum impediatur, & nares dilatet, raroque talis polypus fiat, cum sapius mollis sit. Cæterum liquet, in huiusmodi affectibus consideranda cuiusque corporis naturam, sanguinem (si nihil impediatur) mittendum esse: necnon medicamentum purgans offerendum (Alexandro teste) debita prius victus ratione instituta: deinde caput radi, sicariique, ac roborari medicamentis appositis debet. Nam hæc communis cura ambobus his est, polypo videlicet, & narium vlcibus, seu ozænis, auctore Galeno tertio de compositione medicamentorum secundum locos, pituitam quoque per os educi conuenit, apophlegmatismis videlicet, in præcedentibus conscriptis, namque ex crasis, & viscosis humoribus dictum est polypum generari. Quæ etiam ratione fit, vt eis etiam topicis medicamentis, qui curari possunt polypi indigeant, quæ mistam facultatem habeant, vt videlicet partim adstringant, partim secant, & attenuent, partim etiam discutiant, & exsiccent, eodem Galeno auctore prædicto loco. Verum nequaquam ea adhibenda erunt, ni prius caput resiccet, ac corroboretur, si opus fuerit: Ante omnia venam secare, ac purgare oportet, vt diximus: quæ caput roborare, atque exsiccare præcedenti capite requiras, eisque vtare, post quæ eunuchis maxime, aut corporibus mollibus, & humidis, vt pote quæ nullius pharmaci ferre possint adhibitionem, sed ab omnibus irritantur, rosas aridas contusis, ac probè tritis, atque inditis vitæ: magnopere enim citra omnem mordacitatem iuuamentum præstant: quoniam aut nihil nocent, aut omnino citra molestiam opus suum perficiunt, vt testatur Galenus. Ipse quoque tanquam probatissimum reperisse asserit, nedum polypis, sed

etiam ozænis, quod ex malis punicis constat pharmacum; sint autem pari numero, ac magnitudine ex tribus eorum differentiis, austeris scilicet dulcibus, & acidis accepta, eaque recentia, & matura contundenda sunt, atque integra diligenter constringenda, quo succus ex eis exprimi possit, quem ubi modice decoxeris si liquidior quam oportet, videatur, stanneo vase depositum asseruare oportet. Quod verò ab eo reliquum est solidum, & crassum, rursus diligenter contundendum est, ut à contusione rursus in pila atteri, ac leuigari possit, indeque collyriorum formæ effingi, quæ congruam ad agri nam proportionem habeant. Induntur enim hæc in naris, quam polypus obsedit, meatum, quo citra mordacitatem, dolorisque consensum, qualem acria pharmaca excitare solent, per longiorem moram ipsum expurgent: quod si humectior, & mollior tibi appareat polypus, plus ex austeris malis punicis coniicies, si durior, ex acidis. Quoniam verò molestum est perpetuo collyrium sustinere, licet etiam quandoque intermittere: atque interim succum antea expressum, & in stanneo vase depositum, ac adseruatum in nares infundere: atque etiam circa illas partes, iuxta quas nasus ad palatum perforatus est, liquidum ipsum expressum succum illinire, vel cum penna, vel cum lana, specillo duos nucleos, siue cuspides habenti obuoluta, nec parum etiam confert prædictum collyrium ex malis punicis effictum, si ubi exaruerit, probe contundatur, cribreturque, ac leuigetur, indeque insuffletur, aut etiam per specillum nucleum indatur. Omnia autem hæc (ut testatur Galenus) assidue facere oportet, ut nunquam ab affecta parte pharmacum ablut, cum facile ab humiditate eluatur. Parari item potest medicamentum ex spumæ argenti drachmis iij. cerusæ drach. quatuor, malicorij drachmis duabus, & aluminis scissilis tantundem: quibus tulsis, & cribratis in mortarium coniectis, cum vino odorifero ad mellis crassitudinem redigito: postea verò myrteo oleo affuso conuassato, in pyxide plumbea seruat, utitur. Poteris insuper Pauli medicamentum vti, robustis præsertim corporibus, aut ex eo, quod excipit atramentum sutorium cum aceto; aut eo, quod recipit squamæ æris drach. viij. atramenti sutorij drachmas sex, sandarachæ drachmas tres, veratri nigri drach. ij. misceantur, & naribus insufflentur. Ad inueteratos autem polypos maximè commendauit Alexander puluerem ex quatuor metallicis compositum, chalcantio videlicet, chalcitide, ære cremato, & misy. Accipias autem hæc æquali pondere singula, & seorsum teras ex aceto, postea omnia simul misceas ex vino subigens, donec glutinosum fiat, ad mellis spissitudinem, deinde in ollam recentem cõiicias, quam operculo imposito, lutoque oblita in furnum dimittas, ut in carbones illa redigantur, dein furno exēpta cum vino teras, atque iterum misceas, & facias, redigisque in puluerem, eumque reponas, & cum necessitas postulat, utare. Prædictis etiam medicamentis uti poteris ad reliqua narium farcomata, nonnullaque alia reperies apud artis medicæ eximios auctores, quæ nos breuitati indulgentes ex industria prætermisimus.

Περὶ τῶν ἀπορροιαῶν.

De sanguinis ex naribus eruptione.

CAPVT. XL.

INTER narium affectus, quæ ex ipsis sanguinis eruptiones fiunt, à Galen. 3. de Cō-

posit. medicamento, secundum loc. connumerantur à Græcis τῶν ἀπορροιαῶν dictæ. Quapropter quod nares affectæ sint, cunctis liquet, non tamen per essentiam semper afficiuntur: similiter quod affectus ipse symptoma sit in genere excretorum immodice toto genere præter naturam. Verum id non vnum duntaxat morborum genus sectatur, velut etiam reliquæ sanguinis eruptiones, sed interim Galeno teste 5. Method. medendi. vasorum diuisionem, interdum eorum orificiorum referationem, quandoque earundem tunicarum rarefactionem sequitur, quamuis non modò vasis ipsis malè affectis, sed etiam ipsi sanguini, aut denique facultati interdum occasio tribuenda sit, ex eiusdem Galeni sententia tertio de Causis symptomatum dico autem vasa ipsa malè affecta, ut cum molliora, vel duriora, seu tenuiora fuerint, à natura, seu aliqua superueniente causâ extra vterum viciata; sanguinem verò malè affectum appello, vel cum adeo vitiosus sit, ut vasa, quibus continetur, erodat, vel cum adeo est auctus, ut à vasis contineri non possit, ut interim ea disrumpat, interdum eorum ora referat. Ex parte verò facultatis sanguinis profluuium efficitur, cum ipsamet facultas ora vasorum aperit. Non ab re itaque sanguinis ex naribus eruptio vni saltem ex prædictis causis tribuenda erit. Namque aut vasis ipsis malè affectis, venis scilicet aut arteriis, eorum ore, aut referato, aut tunica eorū diuisa, vel rarefacta, propter quod & sanguis, vel propter ἀρσίνου, quam Græci aut διαρροίαν, aut εἰς τὸν ὄρον εἰς τὸν ὄρον vasis profluat: vel sanguini ipsi, etiam malè affecto, aut ipsi facultati, quæ ora vasorum aperit, tempore quo excernit ea, quæ sibi molesta sunt. Hinc Galenus prædicto libro quinto Methodi medendi. cap. secundo, anastomosin fieri asserit, tum propter eorum imbecillitatem, tum etiam propter sanguinis copiam, qui impetu quodam ad os vasorum ruat, aut propter eiusdem sanguinis acrem quampiam, quæ illi extrinsecus incidat, qualitatem. Dixerim verò, seu diuisionem vasorum, tum ex vulneratione, tum contusione, tum ruptione fieri: aut diapedesin ex ipsa quidem tunica rarefacta, sanguine verò tenuato, oriri fatetur: quâquam etiam ex gracilium vasorum ore adaperto fieri possit. Verum si ex parte vasorum aliquo modo affectorum sanguinis ex naribus profluuium fiat, id dignoscere haud difficile erit, siue interna, siue externa fuerit causa: nam neque indicia aderunt sanguinis redundantia, neque is, qui profluat sanguis, vitiosus apparebit, nec corpus caco-chymum erit, aut crisis tempore in acutis morbis is excernitur. Sautem ex aliqua externa causa affecta fuerint vasa, ut casu ab alto, ictu, exercitio vehementi, mora in sole, ac reliquis huiusmodi, ex ægri, aut altantium assertionem id percipere poteris. Verum si ex nulla externa causa vasa affecta sint, interna perquirenda, nunquid molliora videlicet fuerint: id quod à redundante humiditate percipies: aut duriora, ab ariditate; aut tenuiora ab inedia reddita sunt vasa, seu à naturalia constructa fuerint: & proinde eorum ratione fuerint rupta, referata, seu rarefacta. Si verò nullum istorum adsit, videndum erit nunquid adeo auctus fuerit sanguis, ut vasis contineri non possit, & propterea erumpat, aut referat, id quod dignoscet ex signis, sanguinis redundantia indicantibus, aut ipsamet sanguis non valde auctus, sed vitiosus adeo sit, ut vasa, quibus continetur, erodat: id verò percipies.

cap. 4.
Pars affe-
cta.

Si ex p
facultat
hant, qd

Comme
lario 3. te
31.

tes. 34. C
35.

Paulo po
principiu.

2. p. r. r. b. e. t.
tes. 1. et 2. la.
3. tes. 49.
1. de morbis
c. 1. g. 1. b.
commenta-
rio 2. tes.
60.

1. p. r. r. b. e. t.
tes.

Leo cit.
1. prognost.
comment.

3. prognost.
comment.

tes. 33.

cupies, tum ex qualitate eius, qui profluit, sanguinis, tum ex reliquis signis cacochymum corpus indicantibus, & pro natura diuersa ipsius cacochymia poterit etiā qualitas vitiosi sanguinis indagari, num pituitosus videlicet biliosus, aut melancholicus fuerit, qua de re profluuij causa erit sanguinis. Verū si neque affectorum vaforum, aut affecti sanguinis indicia adsint, præcesseritque acutus quispiam morbus, ipsi facultati, seu naturæ, quæ ea quæ sibi molesta sunt, excernit, ora vaforum aperienti tribuenda occasio erit profluuij ex naribus sanguinis: quod vt ex prædictis elicere poteris, quandoque fit cum functionis alicuius noxa, interim verò ipsis viribus haudquaquam oblaſis, sed robustis existentibus: quamuis hoc profluuium toto genere præter naturam sit, respectu excretae substantiæ: præter naturam tamen dici non debet, si in tempore expellatur, hoc est, si id quod molestum est, expurgetur, id quod perpulehrè decretū reliquit Galenus libro 1. de differentiis symptom. Verū ex quacunque fiat causa sanguinis profluuium ex naribus, non despicendus erit: nam cum superfluit, seu longo tempore perseuerauerit, timendum erit, aut animi deliquium, aut iocinoris imbecillitatis, ac infrigidatio, & demum cachexia, & hydropisis: quamuis auctoritate Hippocratis sexto de morbis vulgaribus, qui decolores mero modo sunt, parum proſit, quibus verò colores rubicundi, non similiter, & quibus capta sunt quæ faciliè tolerant, prodest; quibus secus, non: libro autem 3. prædictionum idemet Hippocrates dicebat, Ex naribus erumpente sanguine cum exiguis sudoribus per frigescientia maligna, ac praua: item quod post sanguinis eruptionem nigrorum per aluum transitus, malum, praua etiam sunt valde rubra. Eiusdem auctoritate Aëtius libro 5. cap. 124. inquit, fluxum sanguinis è naribus in quarta die in febribus fientem, pessimum signum esse: multitudinem enim significat in toto corpore, aut in capite: addit autem Hippocrates in coacis prænotionibus, si non aliud quid boni coinciderit, verū quinta, minus periculosum esse, quamquam fortè ea sententia potius de narium stillicidio veritatem habeat, id nanque prauum esse signum, præsertim in ardentissimis febribus idem Hippocrates cū Galeno testatur, cum primo prorrheticorum, tum primo de morbis vulgaribus maxime si quarto fiat die, nam tunc absoluta morbi malitia significatur, vt apud eosdem patet primo prorrheticorum: nihil enim (inquit Galenus) eorum, quæ decretoria existunt, exiguè cecerni conuenit, quapropter vnum duorum indicabit, aut copiam, quæ tolerari à facultate nequit, vel imbecillitatem naturæ, quæ proponit superflua excernere, sed non valet. Et propterea velut perniciosissimum est in ardentibus febribus nares parum stillare, sicut eis familiarissimum existit largum sanguinis profluuiū, præsertim in iunioribus minoribus natu, infra trigessimū quintum annum ætatem agentibus: cum in hac ætate sanguis plurimus sit, facultas valentior, atque etiam calor exuperans, eisdem Hippocrate, & Galeno testibus, tum primo, tum tertio progn. Fluere quoque sanguinem ex naribus recto itinere commendauit Hippocrates; è contrario verò culpauit, cum eodem libro tertio prædictionum dixit. Sanguinis eruptiones ex contrario malæ sunt, velut in splene magno, si ex dextra nare fluat. lib. 5. aphor. 33. idem inquit Hipp. Menstruis deficientibus

sanguis ex naribus fluit, bonum. Quod autem in crifibus sanguis ex naribus profluuium quibuscūq̃ indicis præcognosci possit, & quibus (imò quod magna imperitia sit id non præcognoscere scriptum reliquit Galenus tum tertio de crifibus, tum primo de arte curatiua ad Glauco, circa finem. Si autem victus ratio vniuersa pro eius curatione (si vitio vaſorū, aut ipsius sanguinis fiat) infrigidans, & adstringens: tenuis quoque vbi ex sanguinis copia fiat bonique succi, & concoctu faciles cibi exhibeantur, potissimum vbi vitiosus fuerit sanguis, sintque contrariæ qualitatis redundantis succi in sanguine. Verū is sanguinis fluor, qui à facultate efficitur, quoad iudicatorius sit, nulla particulari indiget victus ratione, aut curatione. Vbi verò cōcitata natura medocritatem non obtinuit, sed immodicè sanguis fluxerit, ita vt vires imbecilliores reddantur, simili victus ratione vtendum erit, ac curatione, quibus in prædictis vitium: & propterea velut frigida, & adstringenti victus ratione, sic quoque frigidis, & adstringentibus medicamentis pro eius curatione vtendum erit, Hippocratis decreto, cum aphorismis 23. 5. tum 37. septimi libri. Verū nec omnino, nec sine discrimine, nec omni tempore iam dicta medicamenta circa loca, vnde sanguis profluit, sunt adhibenda, Galeno auctore, quinto metho. meden. sed postquam in alia prius loca auerteris: auertitur autem sanguis, atque ad alia membra conuertitur, tum ad contraria reuerſus, tum ad proxima deriuatus: propterea si resolutus adhuc æger non sit, vena sub eo cubito incidenda erit, qui profusioni è directo respondet (vt ipse iubet) si quid aliud non prohibeat, & vbi paulum detraxeris, mox vnam horam intermittens, rursus detrahes: post iterum, atque iterum, pro laborantis viribus. Hoc nanque auxilio reuulsorio, idemet Galenus fatetur, lib. de curand. ratione per venæ sectionem, cap. 11. validam sanguinis ex naribus eruptionem sedasse: expedit autem non multum, ac affatim sanguinem educere, sed paulatim, ac moderatè, vt diximus. Hoc etiam tempore conuenit artuum frictione, deuinctioneque vti, tum hypochondrio directè supposito cucurbitam defigere: præter hæc, priusquam ad topica remedia confugas, iterum ad contraria reuellendum, vtendumque affixa in summa ceruice cucurbita: est nanque hæc sanguinis ex naribus profusionis auersio, eodem Galeno teste: hanc verò cucurbitam cum sanguinis detractione occipitio agglutinari præcepit Paulus, cum Aëtio. Verū si quid venæ sectionem impediatur, reliquis iam dictis reuulsoriis auxiliis vtare: scapulis etiam (si videbitur) cum scarificatione cucurbitas affigēs, venæ sectione derelicta: demum ad ea, quæ refrigerat, atque adstringunt, topica medicamenta confugas. Et si purgatione quoque egeant, vt pote vitioso existente sanguine, ea quoque prius tribuenda erit, pro ratione vitiosi succi in sanguine redundantis, decocto videlicet vtens myrobalanorum citrinarum, in quo syrupus ex pluribus infusionibus ros. rub. aut manna cum rhabarbato dissoluantur, si bilis redundarit: At si pituita, agarici, & myrobalanorum chebularum decocto cum syrupo ex pluribus infusionibus ros. rub. aut persicarum vtiſtor. Atrā verò bile redundante, senæ, epithymi, & myrobalanorum indarum decoctum cum dictorum syruporum aliquo exhibeas: nec minis assumere possit saccharum rosaceum, aut syrupum myr-

3. de crifib.
cap. vlt.
1. ad Glau.
cap. vlt.
Curatio.
Vitus ratio
qualis
competat.
Medica-
mentorum
ratio.

cap. 6.

Vena. se-
ctio.

Paul. lib. 3.
cap. 24.
Aët. lib. 6.
cap. 94.

Purgatio.

Topica.

tinum, rosaceum, è papauere, seu ex nymphaea, quantitate modicata, vel è pastillis de spodio, aut de terra lemnia, aut antidoti micetæ dictæ drach. j. cum vnc. ij. aut iij. aque acetoselle, aut plantaginis. Extrinsecus verò, vniuerso videlicet fronti medicamenta imponenda sunt infrigidantia, ac adstringentia, vt diximus, cuiusmodi esset spongia ex aqua frigida, seu rosacea madida, sæpius adhibita, aut hippureos succus, quam caudam equinam vocant, seu herba ipsa trita fronti imponatur, ex Aëtij sententia: similiter quoque saluæ folia trita, aut gypsum oui candido subactum: quibus omnibus absolum non erit parum aceti addere, seu linteum in aqua frigida, aut rosacea cum pauco aceto mista, madefactum iterum, atque iterum imponas. Idemmet Aëtius cochlearum carnes cum aceto tritas, aut cochleas vstas, & tritas cum aceto imponi iussit: Apollonij auctoritate cochlearum carnes cum thure tritas naribus indito, dixit: & sanguis sistetur, iisdem etiam frontem intege: ex succo quoque polygoni, portulacæ, semperuiui, seu solani, si vnc. s. assumas, boli armeniaci, ac terræ lemnia ana drach. ij. omphacitidis gallæ drachm. j. lapidis hæmatitis drachm. j. & s. cum ouorum albumine, pauco aceto, ac aqua rosacea medicamentum parabis, quod fronti imponatur, ex aqua etiam rosacea, ac plantaginis, solani, & cichorii succo, pauco aceto addito, epithemata supra iecur adhiberi possunt, potissimum si ex dextra nare fluat sanguis: naribus præterea ipsis medicamenta sanguinem sistentia indenda sunt, veluti medicamentum Galeni quinto method. medend. scriptum, ex manna thuris, & aloë, candido quoque oui liquore confectum per contortum linamentum intus: extrinsecus verò leporis pilis additis, naribus admoetur, aut ouorum vitas vrito, ac terito, de quibus duas partes sumito, & de galla omphacitidis partem vnā, & linamento intorto aqua, aut aceto tincto excepta, indito, vt inquit Aëtius: ipsum quoque gypsum oui candido subactum, nedum fronti, sed naribus quoque imponendum asserit: vel thus confringito, & polygonij, aut porri succo diluito: in eoque linamentum obvolutum indito, Galeno auctore, tertio de compositione medicam. secund. locos. cap. 4. ex Heraclidæ auctoritate: ex cuius etiam sententia mentham tritam, aut spongiam siccam immittendam præcipit. Aëtius verò asinum stercore vstum insufflandum præcipit: aut eiusdem asinini stercore recentis succum, cum porri succo, & aceto per linamentum inditum: commodum insuper eis est per ceram, aut linteola aures obturare, & in ore aquam pluuialem frigidam continere, caputque non in sublime leuare, sed alias partes, quæ infra caput sunt sublimes facere, eiusdem Galeni decreto, præcitato loco. Paulus verò cinerem combustorum asellorum domesticorum inspirandum præcipit, vel eorum succum insufflandum: lapidis quoque molaris aceto extincti vaporem naribus suscipiendum consulit. Inquit Marcellus suo libro de med. cap. 10. quod infundere in aurem acetum acre, cuius è regione sanguinis pluit, aut in vtranque mittere, si ex vtraque nare manabit, confert: pariter iniicere intus in nare cochleæ viuæ carnem per se, aut cum thuris polline tritam, ipsæ item cochleæ tritæ cum aceto naribus inditæ, quamuis magnos fluores sanguinis compescunt, eodem auctore.

Nec id est in Galien.

De dentium dolore.

CAP. XLII.

NTER dentium affectus, is præcipuus esse videtur, qui à Grecis δὲ ὀδὴν ἄλγος, à Latinis dentium dolor dicitur, à symptomate, & parte affecta nomen sumens, vt putet secundo meth. med. Hic nanque maximis tormentis annumerari potest vt inquit Celsus lib. 6. cap. 9. verum interim non manifeste in ipsis apparet affectio, quemadmodum si ipsius dentis corpus fuerit affectum: etsi quidam id affirmare contendant: asserentes, cum dens sit os, dolore affici nequaquam posse: illud tamen cum ratione ex Galeni verbis libro sextodecimo de vitiis partium, & libro de ossibus, dum asseruit eos inter ossa duntaxat cui dentem sentiendi vim habere, tum experientia in se ipso, quinto de compositione medicamentorum secundum locos confirmatur: percepit nanque manifeste in semetipso non dolentem modò, sed etiam pulsantem dentem, quemadmodum carnosæ partes inflammatione vexatæ consueverunt. Interdum verò propter affectum neruum, qui ex tertia coniugatione distributus, omnibus dentibus ad eorum radices subternitur, dentium dolor excitatur. Non raro autem propter gingivarum inflammationem, & ipsi dentes dolere videntur: quos iterum dolores idem Galenus tanquam in se ipso expertus, fieri posse testatur, testimoniumque præbet id asserentibus eodem libro 5. de compositione medicamentorum secundum locos. Atqui dentem in proprio eius corpore affectum percipies, quoniam ipse æger dicit se sentire circa corpus dentis dolorem in profundo obortum nec vllum apparebit in ginguis inflammationis indicium. Nervo autem ipso affecto, qui ad radicem dentis substratus est, quanquam imaginationem confusam, indiscriminatam, & incertam plerisque exhibeat: nanque videtur ac si ipse dens doleat, in propria substantia affectus: id tamen percipere poteris ex vehementissimo dolore, qui in profundo valde ab ægris sentitur: nec ipsis dentes huius, aut quouis alio modo in eorum substantia, seu qualitate mutari apparent: similiter nec gingiua, & eximpropto dente, parua adhuc doloris portio remanet, leuiori tantum dolore reddito ex dentis exemptione. At si inflammatis ginguis dentium dolor excutitur, ex earum inspectione promptè id percipere poteris. Caterum quæcunque pars in dolore dentium affecta sit, perpetuò dolor ipse symptoma erit, veluti de reliquis doloribus in antedictis asseruimus: subsequiturque vel continuitatem solutam, vel inæqualem intemperiem, aut vtranque: quò fit, vt & ipse dentium dolor ex quacunque causa soluente continuum, ac inæqualem intemperiem potente inducere, progigni possit. Nos verò exordiёмur à simplicibus intemperiebus, modum conscribentes, quo singulæ dignosci valeant: nanque eis cognitis manifesta quoque composita percipi poterunt ex prædictarum intemperierum mixtura. Calida itaque existente affectione ex intonso dolore, subrufa facie, calidoque totius corporis temperamento, vigente ætate, tempore anni, regionisque & aeris statu, ac antea vita consummili percipies. Ex frigidityte verò, si dentes dolore afficiantur, ex contrariis indiciis poterit innotescere, ex figuraque tum capitis, tum reliqui corporis, & ex ea, quæ præcessit diæta, itemque exercitio, ac reliquis

liquis, quæ ad hunc ordinem referuntur, ut inquit
 Aëtius. At si ab humiditate dolore dentes afficiantur,
 ex vniuersi corporis mistura in primis, ac capitis,
 quæ ad humidiorē vergit, tibi manifestabitur, si
 delicatius vixerint, domumque habuerint in humidiori
 loco sitam, inster tempestas humida, & hora verna,
 cum afficitur, laxioresque fiunt dentes vnâ cum
 circumadherentibus corporibus, ac necessario mobiles,
 ut idem testatur Aëtius, veluti eorum corrosio, seu
 perforatio ex humorum acriū, & erodentium influxu
 efficitur, ex Galeni sententia: quanquam multis hæc
 laxitas: ac dentium mobilitas ex humiditate citra
 doloris sensum, accidat: nam humiditas per se
 dolores inferre non confuevit, imò ad eam nullus
 consequitur dolor, Galeno auctore secundo de
 compositione medicamentorum secundum locos,
 quantum ad qualitates ipsius attinet, ob multitudinem
 tamen instrumentaliū partium morbum faciens,
 dolorem interim parit. Si verò à sicca intemperie
 dolore afficiantur dentes, intolerabilis ferè eos,
 qui taliter afficiuntur, dolor concomitabitur: totius
 corporis temperamentum, & maxime caput sicca
 intemperie erit affectum, sitis aderit semper, nisi
 adsit frigiditas vnâ cum siccitate: minimum etiam
 sputi eiciunt sic affecti, præcessitque autumnalis
 tempestatis constitutio, & vita erumosa tenui
 accedente diæta: præterea regio sicca, & ambien-
 tis aeris status consimilis. Compositam autem
 intemperiem, si ea quæ diximus indicia complica-
 bis faciliè agnosces, quæcunque ea sit, propter
 quam doleant dentes: nam si verbis gratia, calida,
 & humida fuerit, totius corporis temperamentum
 sanè calidum, & humectum erit: caputque
 habebit æger, quod facile ciuimodi humiditate
 impleatur, cuius coma plurima est, & subru-
 ra, regio calida, & humida, tempus anni
 vernum, aeris quoque status calidus, & humidus
 erit, qualis est austrinus. Sic quoque, si calida,
 & sicca, aut frigida, & sicca, seu frigida &
 humida intemperies erit, ex iam dictarum
 simplicium intemperaturam indicia simul mixta
 ipsam inuestigabis. Verum si vnâ cum prædictarum
 qualitatū excessu & humorum multitudine
 affuerit, cognoscendus erit affligens humor,
 cum ex reliquis circa corpus signis, tum ex
 cōsequenti dolore, flauæ namque bile dolor
 pungitius comes exsistit: pituitam verò sequitur
 vnâ cum frigiditate distentio locorum; nigra
 verò bile affligente sensus aderit, veluti si
 corpuscula quædam in profundo confringantur.
 Vbi autem æqualiter omnes humores auge-
 scunt, multitudine horum in corpore conuer-
 sa, grauitas concomitatur. Ex sapore quoque
 speciem influentis humoris argui poterit: nam si
 amaritudinem sensu perciperint ægri, bilem; si
 fædèdinem, pituitam, si acedinem, nigram
 bilem portendit. Ceterum quoniam per omnem
 ferè animantis ætatem incrementum accipiunt
 dentes, idque non nisi ex nutrimento eis
 delato: nam impossibile est citra nutrimentum
 aliquam partem incrementum suscipere:
 quantum autem augeant, tantum in ciborum
 manu deteruntur, Galeno teste, id verò
 quod augeant, euidenter sæpè numero apparet
 in his dentibus: qui exemptis oppositi sunt,
 utpote qui semper augeantur: propterea duabus
 affectionibus in vniuersum ipsi obnoxii sunt,
 & his quidem contrariis, indigentia videlicet,
 & abundantia eius, quod defertur ad eos,
 alimenti. Verum

inopia, aridiores, & macriores, alimentumque non
 sentientes, & ob id tenuiores dentes reddit: redun-
 dantia verò consimilem in eis affectionem excitare
 potest, qualis est circa carnosas partes inflamma-
 tio, iuxta eiusdem Galeni sententiam præcitato li-
 bro quinto de compositione medicamentorum
 secundum locos. At fiat vtunque dentium dolor
 (quoniam ut diximus Celsi auctoritate) ipse quo-
 que maximis tormentis annumerari potest, & Ga-
 lenus libro 2. de compositione medicamentorum
 secundum locos, inter maximos dolores ipsum an-
 numerauit, propterea eius curatio parui facienda
 non erit. Et idem Galenus libro 5. de composi-
 tione medicamentorum secundum loc. scriptum
 reliquit, dentium tenuitatem ob alimenti inopiam
 curari non posse, cum laxari, tum & moueri ipsos
 necessarium sit: compage quoque ipsorum laxio-
 re facta, nanque non solum ipsi dentes, sed & lo-
 celli eos complectentes sunt attenuati: quam den-
 tium affectionem sedibus accidere inquit citius,
 aut serius, velut etiam magis, aut minus. At ea
 dentium affectio, quæ proportionem ad inflamma-
 tionem habet, præter id, quod magis iuuenes
 corripit, curationem quoque recipit, quæ de re
 si ex caliditate dentium dolor excitetur, victus ra-
 tione instituta, ut decet, præsertim in cibo, & po-
 tu quoniam præsana, alica, lactucis, & cucurbita,
 & quæcunque tandem his potestate sunt propin-
 qua velsi debent, eisque modicis, mollibusque
 vtendum, ne mandentis dentes irritent, id quod ser-
 uandum erit in quouis dentium dolore, ex quacun-
 que fuerit ortus causa. A vino autem abstineant,
 & aqua vtantur, in qua semina coriandrorum præpa-
 ratorum fuerint decocta, aut cinnamomi mini-
 mum: frigidis quoque medicamentis pro eius cu-
 ratione vtendum erit, eis tamen non immodicè,
 præsertim actu frigidis, nisi vehemensissimus dolor
 virgeat: nanque ex immodicè frigidis lædi dentes
 consueverunt, Hippocrat. & Galen. testibus, apho-
 rism. 18. quinti libri. Illud item seruandum erit in
 cunctis adhibendis auxiliis, quod vbi gingiue af-
 fectæ fuerint, conuenientia ad hanc rem remedia
 locis affectis nudis adhibenda sunt: quæ sanè aut om-
 nis mordacitatis expertia sunt, aut mediocriter
 acerbæ, & terrei temperamenti: quapropter acetum,
 vt acutum, & hostilem gladium deuia, inquit Aëtius:
 suo enim acore gingiuas corrodit: propterea
 maxime consolatorium eis exsistit (vbi fortè dolue-
 rint, & inflammata fuerint) lac asininum, ut ipse tes-
 tatur; pimpinella quoque herba trita, & apposta
 tumorem gingivarum emendat, ut inquit Trotula.
 Vbi verò dentes solum patiuntur, aut cum eis simul
 substratus nervus, & pelliculæ, cum ipsis curatiuis
 pharmacis, ea quæ tenuium partium in sua substan-
 tia existunt, adiicimus, quo vis ipsorum in profun-
 dum perferatur: & siquidem calidus sit morbus, ea
 quæ refrigerare possunt, & simul tenuium partium
 existunt, commiscemus: si verò frigidus, calida te-
 nuium partium adnectimus. Hac de re calida exi-
 stente affectione (ut diximus) ad collutionem oris
 præparabimus in aceto albo decoctam radicem ha-
 licacabi, semperuium minus, portulacam, perdic-
 ciū, quod parietariam vocant, & glycyrrizam: si etiā
 cum vino violas decoxeris, & ore teneas, condu-
 cit, Q. Sereni auctoritate. Quod si intolerabilis
 existat calor sensus (ex Aëtijsententia) vtendum
 est hyoficyami foliis, aut semine papaueris hortensis,

Cap. 3.
Prognosti-
ca.

Cap. 1.

Cap. 8.

Curatio do-
loris den-
tium ex ca-
litate.
Videtur ra-
tio.

Medicamē-
torū ratio.

Animad-
uersione di-
gnum.

Lib. 8. cap.
24.

cap. 58.

Serenus ex
pi. de vitio
dentium.

& semine lactuca in aceto albo decoctis. Poterit quoque in ore detinendum exhiberi oleum rosaceum, seu myrteum cum pauco aceto albo permixtum, quo item rosaceo cum modico aceto diluto, caput madefacere oportet, idemque auribus instillare, aut terrenos vermes oleo decoctos in propinquam aurem instilla, ex eiusdem Aëtij decreto: eodemque rosaceo, seu myrteo, aut nymphæa, vel papauere parato oleo, de foris partes (dolenti denti) vicinæ inungendæ sunt. Si verò ex frigidityte dentes dolore afficiantur, vniuersa victus ratione ad caliditatem vergente instituta prius, ita ut cibi sint priusana cum pulegio decocta, aut cum ruta, aut cui post cocturam additum sit piperis similiter & alica, & inter olera petroselinum, & reliqua similia: potus autem sit vinum, modicum tamen, ad oris tandè collutiones deuenies, easque præparabis ex origano, calamintha, hyssopo, dictamnno, ac satyria, in aceto, seu vino decoctis, aut tithymalli radicem, seu chamæleonis, eryngij, aut verbasci, vel veratri nigri, & capparis radicem in eodem aceto, seu vino decoquas, vnumquodque enim eorum taliter decoctum, ac ore collutum dolores dentium sedat, qui à frigidityte sunt oborti, Aëtio auctore. Verum ad eos, quorum sensus citius afficitur, hæc in posca decoquantur: pinguium quoque lignorum, veluti tedarum, ac piccarum decoctum ipsis prodesse asserit. Contunduntur autem hæc, ac cum caricis decoquantur, affuso vino, eoque dentes colluuntur. Ipsas quoque tedas in oleo decoquere licebit, idque calidum in ore continere: quin & ipsas conquassatas sola circa affectum maxime dentem, ore detinere, commodum existit. Caput autem chamæmelino, anethino, irino, seu rutaceo madefacere confert; similiter extrinsecus loca dolenti denti vicina: itemque auribus castoreum cum nardo in oleo decoctum infundatur. Suffitum quoque (præsertim si omnes ex æquo doleant) ex canis mortui dentes ita ut fumus inde progressus ore excipiat, commendat Aëtius: deinde ipsum dentem vltum, & modico aceto tritum, calidum in ore retinendum præbet. A totius etiam essentiae proprietate senecta serpentis confert in vino, aut aceto cocta, ut patet vndecimo de simplicium medicamentorum facultate, eadem quoque exusta, & trita, ac cum oleo & melli solida spissitudinem redacta, dolentique imposta denti succurrit, eodem Galeno teste (ex Archigenis auctoritate) libro quinto de compositione medicamentorum secundum locos. Ex humiditate autem affectos dentes, eosque vacillantes curare conuenit per victus rationem ad siccitatem vergentem, ac cum diuturni ore ciborum abstinentia. Cibi itaque eis tribuendi sunt sordiles, alica, panis ex iure pullorum madidus, similia, aut oriza, seu polenta cum aqua mulsa: neque male conuenit eis milium, & lenticula, volucres montanæ, & sicciores. Ex oleribus brassica, & similia in potu aqua est exhibenda, sed non multa, aut aqua mulsa: & si hanc ferre nequeunt, ad aquam modicum vini addatur. Tempore verò afflictionis fouere conuenit locum cum milio, & sale: collutiones exhibendæ adstringentes, & exsiccantes, aut salas, nisi gingivæ simul sint affectæ: quare gallas, quas omphacitides appellant, ex acri aceto decoctas, & alumen aceto permixtum exhibebimus: similiter malicorium, citynos, myrti baccas, balaustia, oliuas, & rubri folia, cupressi pilulas, ac rumicis sylvestris radicem, & quæcunque alia acerbam

in se qualitatem complectuntur, cum aceto puro, aut posca, seu vino si decoquas, conducunt, si eis colluere os præcipiamus, atque retinere adhibendum liquorem oportet supra locum dolentem diutius, Alexandri præcepto; parari tamen debet, ut sensui ægri maxime gratum, & conueniens sit, ex Aëtij sententia: nam iudicata, & perpensa medicamentorum potentia, plus, aut minus exhibere oportet, iuxta etiam exuperantis humoris multitudinem: nec minus quoque conducit, si oliuarum albarum, contusarum succum accipias, & cum eadem succo, ac melle permisceas, eoque dolentes dentes confricaueris: postea verò inspergas puluerem nardi indicæ cum pari pondere aluminis rotundissimi, & salis duplo, ex eiusdem Aëtij testimonio. Nec etiam parum confert illitio ex confectio de moris, maxime si alumen scissile habeat adiectum, & ex ea, quæ ex nucum succo apparatus, si etiam galle drachm. ij. & s. myrræ drachm. s. ij. & corticum mali punici tantundem accipias, & ex aceto vitæ, magnopere prodest, Alexandro teste; & vel alumen, & myrrham troglodyticam inspergito: nam sicca insperfusiones semper eis sunt conuenientes, ut inquit Aëtius, aut cum aceto, seu melle illinito: pentaphylli quoque radix desiccata, & in puluerem redacta, insperfaque confert, velut etiam eiusdem radix ex vino, aut aceto cocta confert, si ex ea dentes colluantur: similiter & cornu cerui in posca decoctum: innumeraque alia reperies conferentia, tum apud Galenum libro quinto, de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 9. tum apud Aëtium libro octauo, cap. vigesimo nono. Quod si ob ætatem senilem quibusdam dentes laxentur, ac mobiles fiant, auxilium capiunt, & quodammodo iuuantur ex pharmacis adstringentibus quæ gingivas confirmant, densant, & ad arctius complectendum dentes adiuvant: si verò ex percussione, aut casu dentes laxentur, maximopere his prodest alumen scissile cum myrrha troglodytica tritum, ac inspersum: atque id vbertim, & continue facere oportet, ut idem testatur Aëtius; nam ipsos confirmat: stabilit quoque mobiles dentes (Pauli auctoritate) aloë insperfa, vel rhus, vel alumen scissile, aut galla, seu rubi radix per se, aut cum vino decocta. A siccitate autem dolore affectis dentibus quibus conueniens erit succus prisanæ, mica panis madefactæ ex gallinarum iure, cucurbitæ, maluarum, oua forbilia, & quæcunque iis profunt, qui humectatione indigent. Potus sit vinum album, aquosum, aqua dilutum: medicamenta autem austera, & acerbata vitent; nam maxime contraria eis existunt: minimè itaque adstringentes, & mediocriter humectantes collutiones apparare oportet, ut aquam calidam per se, ex qua iterum per spongiam extrinsecus vapor admouendus erit: ex furturis item decocto, aut radicis dulcis, seu maluarum collutio parari poterit: similiter ex prisanæ succo, aut amylo cum sapa, aqua calida diluta: lac etiam per se maxime asininum confert, & alia quæcunque his sunt similia, auctore Aëtio. Hactenus ergo simplicium intemperierum, ex quibus dentium dolor excitatur curam ostendimus; manifesta verò & ex his fiet ea, quam compositæ requirunt, mirum & ex iam dictorum mistura signorum cognoscibiles, & ex ostensorum auxiliorum temperaturam accipientes: qui enim formam tractandi simplices morbos cognouerit, in promptu habebit, &

Si ex frigidityte fiat dolor curatio.
Victus ratio.
Medicamentorum ratio.

Lib. 8. cap. 28.

Loco citat.

Cap. proprio.

Cap. 9. Curatio doloris dentis ex humiditate orti.
Victus ratio.

Medicamentorum ratio.

habeat, & circa mixtos convenientia remedia inuenire, potissimum si excessus iuxta qualitates tantum contigerit: nam tunc scopus curationis ad alterationem solum dirigendus est, ita ut contrariis qualitatibus eam permutes. Eas vero intemperaturas, quæ vnâ cum qualitatibus excessu cum substantia etiam quadam consistunt, seu humorum multitudine, palam est primum oportere corpus euacuare, aut redundantem humorem per conuenientem purgationem detrahare: deinde eas ad temperiem reducere, nisi quid impeditur: cuius rei in omni corporis intemperie memorem esse concludit, ex Galeni, Pauli, & Aetij sententia. Quæ de re si ob humorum multitudinem, sanguinisque redundantiam dentium dolor excitatus fuerit, per venæ sectionem euacuare conueniens erit: incidere quoque oportet venam humeralem appellatam, quæ si non contingat, eam, quæ media existit, incidere conuenit, iuxta Aetij decreta: incidatur tamen ea quæ est directo laborantibus dentibus sita est: & si opus fuerit, venas sub lingua quoque secabis, aut cucurbitas scapulis affigies. At si quid prohibeat venæ incisionem facere, modico, & tenui victu superfluum detrahito humorem, ut idem præcipit Aetius. Euacuato autem vniuerso corpore, dolentibus dentibus ea adhibenda sunt, quæ reprimunt, atque repellunt, demum ea, quæ partim repellunt, partim quoque discutunt: pauca tamen sunt affectiones quæ repulsoris tantum indigeant: nam hæc duntaxat, quæ minorem habent causam, & propterea cogimur sapientius in principio etiam discutientia admiscere, aut paulo post, ut sexto de compositione medicamentorum secundum locos, testatur Galenus. Quanquam si doleant propter gingivarum inflammationem, præsentissimum remedium est, utpote citra molestiam, & absque asperitate repellens, discutiensque citra mordacitatem, cuius rei inflammationis præcipue, vsus existit, oleum inquam lentiscinum caliditate temperatum, ore retentum: esto autem id recens: nam vetus tantò re-centri deterius est; quanto calidius, Galeno auctore quinto de compositione medicamentorum secundum locos, quem sectatus est Paulus cap. 26. libro tertio, nec minus etiam si iuxta aliam partem dolor oriatur, eum sedat lentiscinum, ut idem testatur Galenus: magnopere tamen cauendum ab alterutris ipsorum intensis, tanquam inflammatis dolorosis existentibus: namque à vehementer adstringentibus partes simile quiddam contusioni perpetiuntur, earum substantia vehementer condensata, ab acerbis vero erosioni quid simile contingit. merito igitur moderatum in vtriusque facultate immoderatis perfertur, ex eiusdem Galeni sententia. Quapropter Aetius post lentiscinum oleum, asinum lac in ore retentum commendabat; similiter & sapam, aut palmularum stillamentum eodem modo calidum ore retentum. Verum ad palmularum stillamentum, quo crassities eius diluatur, aquam calidam affundendum esse iussit: valet etiam semperuiui minoris decoctum per se, aut cum rosaceo melle, sapa, vel palmularum stillamento in ore retentum. Dentibus autem ipsis in vehementissimis affectibus, aut subtrato eis neruo, quis repellere, siue discutere velit, & propterea aceto præparantur. Colluatur itaque aceto, in

quo decocta sit galla, Paulo auctore, vel halicababi radix, alterci semen, seu folia, ac solanum vel myrti folia: nec minus & eis uti poteris medicamentis supra conscriptis pro cura doloris eorum orti ex calida, tum humida intemperie, ea inuicem miscendo: poteris tamen processu temporis, quæ discutendi facultatem habent, admiscere, ut hyssopum, melilotum, scenumgræcum, althæam, pulegium, origanum, & alia eiusmodi. Ad stupefacientia autem medicamenta, nisi summa urgente necessitate, deueniendum nequaquam erit, eisque paulatim vtendum, & non nisi in humorum calidorum defluxu, qui si ex bilis redundantia fiat, ex qua interim eroduntur dentes, vniuersi corporis, tum etiam capitis prius ratio habenda erit, ipsum purgando medicamentis, quæ talem vim habeant: quorum mentio, tum cap. de dolore capitis ex bile, tum in plerisque aliis locis, à nobis facta est. Postquam purgationem per reficcationem vitii influentis humoris ex localibus auxiliis factam, cura perficienda erit: quorum iterum syluam perquiras ex his, quæ diximus pro cura doloris dentium ex caliditate, tum etiam ex caliditate, & humiditate. Carterum si dentium dolor ex frigidorum humorum confluxu ortum duxerit, post iterum eorum à toto corpore, ac à capite inanitionem (quo casu præstat valde apophlegmatissimis uti, vt 5. de compos. medic. sec. loc. cap. 9. patet) quæ similem habeant facultatem adstringendi mediocriter, ac validissime discutendi medicamenta, ac calida magis adhibenda sunt: quemadmodum est ruta, seu polium, pulegium, origanum, hyssopum, seu capparis radix si in aceto, aut vino decoquantur, ac ex eis collutio oris fiat. Conducunt quoque ea, quæ supra scripsimus, medicamenta pro curatione doloris dentium, cum ex frigida, tum ex humida intemperie. Nec minus & iam superius conscripta auxilia conferunt, quædam ad dentium foramina, seu ad eos liuidos redditos, cum etiam ex humorum vitiatorum influxu id patiuntur. Si verò nulli prædictorum malum ipsum cedat, & dolor vehementer perseveret, dens ipse tollendus erit, potissimum si liuidus, aut perforatus, ac vacillans fuerit: idque aut medicamentis, quæ ab artis medicæ auctoribus eximie commendantur, aut ferro perficies: nam si corrosus fuerit dens, & mouetur, eximatur, inquit Hippocrates libro de affectionibus, si verò non corrosus est, neque mouetur, dolorem etiam exhibet, per vitionem resicatur. Stupori autem dentium benefacit portulaca coincinmanducata, vel oleum quod immaturæ oliuæ fuderunt infusum, vel amurca vetusta in æreo vase cocta, donec mellis spissitudinem habeat si perungatur, Paulo auctore, præcitato loco.

Si ex defluxu calidorum humorum dentes doleant, curatio.

Si ex confluxu frigidorum humorum, curatio.

Ad dentium foramina, ac liuiditatem.

Circa principium. Ad dentium stuporem.

De aphthis.

CAPVT XLII.

IN oris superficie interim vlcerationes quædam igneæ quippiam caliditatis habentes exoriuntur, has Græci ἀφθας, medicorum vulgus alcolas appellat. Summa igitur oris pars cum ab eis occupetur, Galeno teste sexto de compositione medicamentorum secundum locos, & commento aphor. 24. tertij libri, haudquaquam partem ipsam affectam inuestigare difficile erit, cum ægrotantis ore adaptato promptè oculis eam cernere liceat; cap. 4.

Pars affecta. 6. de compos. medic. secundum locos. cap. 4.

*Affectus
causae, si la-
ctentibus
accidant.*

pariterque ad tactum iudicari poterit, cum calidiores, quam conueniat, tumidioreque oris summae partes sentiantur. Affectus ipse, cum exulceratio quaedam sit, liquet, neque alius indicis indiget pro eius cognitione, quam visu, & tactu, velut ipsa pars affecta. Earum autem causa neque una esse poterit: nam si lactentibus pueris excitentur, quibus ut plurimum fieri consueverunt, Galeno auctore, aut vitiosum lac nutriticis, quod non paruum in se serosam contineat partem, erit in causa, quoniam haec pars vim habet abstergendi, quam ob mollicie oris. summe partes lactentium infantium sustinere nequeunt. Quare non mirum si in corporibus mollioribus ex tali lacte per oris summa fiant exulcerationes, ex Galeni sententia in commento eiusdem aphorismi 24. tertij lib. id autem percipere poteris ipsa lactis qualitate inspecta, aut si lac vitiosum non fuerit, propterea quod ipsum non probe concoquunt infantes lactantes, ea de re contingit propter hanc causam, iam dictas exulcerationes oboriri, eodem Galeno teste, libro sexto de compositione medicamentorum secundum locos. Iis vero, qui ad perfectam aetatem perueniunt, ac non lactentibus pueris, nedum aphthae fiunt propter acridinem eorum quae bibuntur, ac comeduntur, verum etiam propter vitiosorum humorum ad eos defluxum, ut libro octauo c. 39. inquit Aetius. Ortas autem aphthas ex eorum quae comeduntur, & bibuntur acrimonia, prompte ex aegrotantis, seu astantium sermone ipsis interrogatis percipere poteris: reliquae vero ex earum colore diuerso comprehenduntur, nam rubicundiores cum fuerint, sanguinem humorem praualere ostendunt: flauiores autem amarum bilem: nec minus si tangas, immodicam percipies in eis caliditatem: quamuis valde maiorem in flauioribus, & ex bile dependentibus. At si albescerent fuerint, pituitosiores: Lucentes vero, & nigrescentes, atra bilis succum praualere ostendunt: quas geminas, si tangas, haudquaquam immodice calidas reperies. Ex corporum insuper temperatura, aetate, habitu, ac praecedente victus ratione, plenius id conicietur. Ex eis facile curantur, quae pueris lactentibus fiunt, Galeno auctore: iis quoque aetatis ratione maxime contingunt, ut inquit Hippocrates, praecitato aphorismo 24. tertij libri: quae vero accidunt iis, qui ad perfectam aetatem perueniunt, non ita facile: potissimum, ubi ob vitiosorum humorum defluxum excitentur, quamuis Celsus libro sexto cap. 11. velit longè periculosissimas aphthas esse in pueris: in viris autem, & mulieribus idem periculum non esse, cum non ita facile ab eis consumantur, quibus suis verbis cum Galeno conciliatur, qui voluit facilius curari eas in pueris, utpote quia ex moderate adstringentibus sedentur, id quod in adultis nequaquam fieri potest, aut per quam rarissime: mitiores etenim sunt in pueris lactentibus. quia ex mitiori causa fiunt, quamuis aetatis ratione ab eisdem facilius quam viri consumantur, ut inquit Celsus: at si affluente vitioso humore fiant

*cap. 4.
Causae si non
lactentibus
fiant.*

Signa.

Prognosi.

*Celsus cum
Galeno con-
ciliatur.*

*3. de morbis
vulg. com-
mentario 3.
comment. 11.*

aphthae, ut inquit Galenus, tertio de morbis vulg. id quod saepius profectionibus accidit, semper prodeunt cacoethes. Harum omnium periculosissimae existunt, quae ex atra bile originem duxerunt, propter humoris malignitatem: quae vero diuturnae sunt, & progressu temporis putredinosum quid acquirunt, ac malignae euadunt, aegre solubiles sunt, a medicisque nomae appellantur, hoc est, deposcentia

ulcera, malo nimirum semper ulterius serpente, nec medicamentis cedente: ut propterea fortioribus indigeant medicamentis, ut patet eodem lib. sexto de compositione medicamentorum secundum locos. Quae itaque lactentibus pueris accidunt, ex his quae moderate adstringunt, sedantur, vitioso tamen prius nutriticis lacte conuenientibus cibis, ac potibus con- temperato: aut si id ipsum probe non concoxerint infantes, ut probe concoquant, procurabis, simulque prospicies & ipsi nutritici bonam concoctionem. Quapropter cibis leuibus alenda erit, & his, qui facile non corrumpuntur, ut praecitato loco Celsus praecipit, potio, si febricitat puer, aqua, si sine febre est, vini diluti praebenda erit: admiscere quoque cibis conuenit lentem, cotonea mala, & ex pyris quipiam addere, sorbis, mespilis, ac cornis: quandoque etiam in cibos, qui manduntur de lactuca, seride, solano, & portulaca permiscere licet. Et si infans quid mandere queat, ea quoque tribuenda sunt, ut mandantur: praesertim si valde inflammata fuerit aphtha, est quoque infans os pharmacis illinendum, praesertim subrubas videris aphthas, in principio quidem iis, quae moderatissime adstringunt, ac irigefaciunt: deinde vero iis, quae citra mordacitatem discutunt. Si vero subflauas videris aphthas, iisdem quidem vtendum, sed magis refrigerantibus. At si pituitosiores, & subalidae fuerint, adstringentibus simul, & abstergentibus vtendum erit, velut, si nigrescentes fuerint, his quae generose discutunt, vt licebit. In principio itaque si subrubae fuerint aphthae infantibus ipsis pharmaca illinenda sunt, quae moderatissime adstringunt, & frigefaciunt, Galeno auctore, sexto de compositione medicamentorum secundum locos. deinde vero, ea quae citra mordacitatem discutunt, nam moderate aphthae maxime in tenellis corporibus moderatis pharmacis opus habent, ut ipse asserit, cuius farinae sunt, syrupus ex succo rosarum, & portulacae, ex omphacio, aut ex plantagine, vel ex moris, seu rubi moris, aut ex malis puniceis acidis: puluis quoque parari posset ex lentium farina, ex rhu, rosarum flore, ac eisdem ipsis rosas siccis. Collutiones insuper moderate adstringentes ex rubri decocto, rosarum, aut plantaginis, balauiliarum, & santalorum, admisto aliquo ex iam dictis syrupis componantur, eisdem quoque, si subflauas videris aphthas, vtitor: sed magis refrigerantia eligas, quo casu solani succo, aut eius decocto vti valde conducit. At si neque his malum cedat, adiaciendae erunt praedictis, quae citra mordacitatem discutunt, ut mel rosaceum, aut vinum praesertim dulce in quo praedictorum aliquod dissoluatur, aut decoquatur. Albescerent vero, & pituitosiores aphthas adstringentibus simul, & detergentibus similiter moderatis, curabis. Eiusmodi sunt, manna thuris, glycyrrhizae succus, nux cupressi, & mastiche: haec cum foliorum myrti, aut olea decocto miscantur, & co aphthae illinantur: quae iterum cum aliquo ex paulo ante commemoratis syrupis miscere licebit. At si liuentes, & nigrescentes fuerint aphthae, ex vna pasta ex acinata, & aniso tritis cum melle, seu melle rosaceo illinendae erunt. Confert insuper & florum chamaemeli, fertulae campanae, anethi, seu scenigraeci puluis, qui pariter cum melle, seu rosaceo melle mixtus illiniri poterit: & si mitius velis parare medicamentum, puluerem ex aliquo iam dictorum cum syrupo myrtino, aut ex moris, seu portulacae permiscebis. Ceterum, si in maioribus pueris

*Si mul-
tis puer-
culis aetate
compositis
non pueris, cur-
ribus.*

*cap. 10.
Pueri.*

*perquisi-
tio.*

*perquisi-
tio.*

*Topica
quibus ad-
hibenda.*

cap. 11.

ris, aut atate perfectis apthæ exoriantur, eiusdem quoque generis pharmacorum facultatibus, auctis tantum ipsorum viribus vtendum erit: verum non aqualiter omnibus, sed maxime eorum corporum naturas simul considerabis, non molles sint, & humide, velut eunuchis, & mulieribus, ac pueris; aut duræ, & aridæ, veluti in piscatoribus, nautis, venatoribus, atque agricolis: namque robustioribus istis corporibus fortiora adhibenda erunt pharmacâ, mollioribus debiliora, ex eiusdem Galeni sententiâ, præcitato libro sexto de compositione medicamentorum secundum locos. Quod verò ad victus rationem attinet, abstinendum erit ab acris, falsis, & acidis, tum edulius, tum potibus, ac à cunctis, quæ vitiosos fucos generare possent; quæ admodum (Apollonij auctoritate) eodem loco præcipit Galenus: victusque alendi sunt boni succi, facilisque concoctionis, cum aliquo ex prædictis oleribus, seu fructibus permisto. Et si sanguineus præualerit succus, priusquam topicis vtaris medicamentis, venâ secanda erit, si nihil impediât, inter-nas, seu humeralis: etsi opus fuerit, iteranda venâ sec-tio erit. Siquid verò venâ sectionem prohibeat, vt in pueris infra decimum quartum annum, sanguinis misio per affixas cum scarificatione cucurbitas sca-pulis fiat, aut per hirudines, eodem loco, seu in cubito admotas, veluti Neapoli consueuimus. At si hæc non succederint, ex venis sub lingua san-guis quoque prædictis mittendus erit. Quòd si totius corporis plenitudo non adsit, sed quispiam vitiosus redundarit in toto corpore succus, is pri-mo vacuandus erit, adhibito purgante medica-mento, quod talem vim habeat, bilem scilicet edu-cendi, si bilis; pituitam, si pituita, nigram bilem, si succus melancholicus redundarit. Vacuato au-tem corpore, medicamenta, quibus adstringendi facultas inest, admoenda sunt à principio: con-sequenter verò his, quæ vim discutiendi obtinent, admiscenda erunt. Primò tamen moderatis, quæ suprà reculimus, vtare. Quòd si ea non suffecerint, omphacio cum vino austero, & subastringente vt-aris, aut rhus, quod sumac appellant, oleæ, seu myrti albæ folia cum prædicto vino decoquantur, quo oris collutiones fiant: nec minus & gallarum decoctum cum vino confert, gallas insuper contu-fas, si in aqua decoquas, & cum præcolato deco-cto parem mensuram mellis permisceas, rursus-que decoquas, donec ad mellis crassioris spissitu-dinem redigatur, maximo remedio erit, vt inquit Aëtius, præsertim pueris, & inueterato iam ma-lo: prædictis verò deinceps, si malum eis non cedat, seu nungracum, melilotum, glycyrrhizæ radicem, myrrham, aut anisum permiscere poteris, aut etiam sal ipsum, si robustiora corpora fuerint, manden-das insuper sunt obliuæ muria conditæ, cum ad-stringant & discutiant, Apollonio teste, nec minus portulacæ melle tincta, si manducetur, confert. Ex erui quoque farina, & melle apthæ extergendæ sunt: & demum galla cum melle illinenda erit, vt auctoritate Archigenis, Galenus approbat, eo-dem sexto de compositione medicamentorum se-cundum loc. similiter misy, alumen, & rhoem cum melle. In perfectis etiam, & duris corporis, ex pro-pósito idem Galenus eodem loco, misyos vsu cum vino adstringente per omnia commendat: po-terit autem huius medicamentæ vis (vt ipse inquit) tum intendi, tum remitti, prout magis, vel minus

vinum fuerit adstringens : & prout crassius, aut li-
quidius efficitur pharmacum ex misyso, ac vini mi-
xtura. Porro si in putredinem aphthæ vertatur,
quam amplius aphthas appellare non conuenit, eo-
dem Galeno teste, præclare facit (vt inquit Aë-
tius) ex gallarum decocto, & melle præscripto illi-
tus: nec minus egregie facit, centaurii minoris ex-
usti cinis, illinitus cum melle: triuium verò con-
uenit cornu cerui tritum, aut atramentum sutorium
vsum, cum melle etiam tritum, seu æris ærugo, si ue-
liquama similiter cum melle: siccum item phar-
macum, quod ex rosarum floribus, rhoë, croco, &
costo constat, magnopere confert, si cum melle il-
linatur, eodem Aëtio auctore, si verò prosperant
aphthæ, quæ nomæ appellantur, summè eis facit fœ-
niculi radicis vstæ cinis (ex monumentis Archi-
genis) per se, & cum melle illita, vt inquit Aëtius.
Item amura in aëreo vase, donec in mellis crassi-
tudinem cogatur, decocta, ac illita: nec minus con-
fert gallarum, aluminis, & balauftiorum puluis, æ-
quales singulorum partes assumens, per se, aut cum
melle illitus.

CAP. XLIII.

ONTINGIT nō raro, vt capite
malē affecto, superuacaneum quod-
dam ex eo in subiecta membra con-
fluant, promptissimē quidem in os,
& nares impetum faciens, Galeno au-
tore, sexto de sanitate tuenda: & licet diuersas sus-
cipiat nomenclaturas, pro partium diuersitate, quæ
excrementa suscipiunt, vt dicemus, tamen quo no-
mine nuncupetur ea affectio, quæ communis est o-
mnibus, haud admodum liquet: nam (vt Celsus in-
quit, libro quarto cap. secundo.) Hippocrates nō pu-
gat nominare consuevit, nunc vero (vt ipse asserit,
& nos quoque obseruauimus) apud Græcos in gra-
uedine hoc nomen seruatur, velut destillationes
καταρροιαί, appellāt. Cū itaque capitis fluxio ad
subiectas partes indifferenter nullam habeat pro-
priam nomenclaturam: nec apud Græcos, nec a-
pud Latinos, seu Arabes, poterimus prout abusus
insuevit, & Græcum nomen significat κατάρροια
Græcè, Latine defluxionem appellare: Cælius Aurelia-
nus libro secundo capite septimo, inflexionem nū-
cupauit, communissimè tamen vocabulo ipso vtēs,
Nam si communiter sumatur pro omni defluxione,
quæ ex capite ad pulmonem per asperam arteriam
fluit, aut pro omni ea quæ à capite per venas ad par-
tes inferiores defluit, intelligi debet, Galeno tes-
te, commento aphorism. 12. tertij libri, propriè au-
tem κατάρροια Græci nominant, vt idem Galenus as-
serit libro tertio de causis sympt. cū quod super-
uacaneum est, à cerebro in os defluit; quem etiam
Latine propriè destillationem nuncupare debe-
mus: velut si in nares excrementorum denuat, κατάρ-
ροια Græci, grauedinem Latini appellant. At sin-
tauces, vt inquit Galenus præcitato loco, aut in la-
rynge, vt sexto de sanitate tuenda ipse asserit, ex ca-
pite excrementa decidāt, ὀφθαλμοὶ à Græcis, raucitas
Latinis nominatur affectio: nam principio vo-
cem raucam facit, procedente verò tempore paruā.
Iam verò longius etiam procedit malum totam adi-
mit, vt patet eodem sexto de sanitate tuen. quāuis
Paulus velit, cap. 28 lib. 3. Quod si excrementis hu-

cap. 9

Quod me-
dis destilla-
tio di. atur,
sen deflu-
xio.
Destillatio
is commu-
nissime sum-
pta differē-
ia plures.
de causis
ymp. ca. 4

1b. 9

150.

mor per palatum, ex capite in fauces decumbat, *κατάρρως* Græcè, Latine destillatio nominari debeat, si verò in guttur, & asperam arteriam destillet, vocatur tunc malum Græcè *σπέρχως*, vel *ἀσπλην* *σπλην*: conciliari tamen cum Galeno posset de catarrho, quòd & si per palatum in fauces excrementum aliquod defluat, adhuc in ore suscipitur; à quo

Paulus cū Galeno conciliatur.

Cap. citato.

3. prognost. comment. 16

cap. 1

De quibus differentijs tractabitur.

Quid sit omnibus commune.

Que pars afficitur.

cap. 4

cap. 9

Qui præter naturam afficitur.

cap. 4

Loco citato. Causarum cognitio.

& tum gula, tum aspera arteria excrementi decursum excipiunt, eodem Galeno auctore, sexto de sanitate tuenda. sunt enim fauces spacium illud laxius, quod inter gulam, & guttur præiacet, ut liquet commento aphor. 34. quarti libri, & tertio prognosticorum. quapropter & os cum his simul afficitur, & ore affecto, ac superuacaneum excipiente, contingit, & eas quoque coaffici, vel dicas faucibus exiguum excrementum suscipientibus fieri etiam catarrhum, quoniam vox nondum mutatur, & rauca redditur. Sic etiam de broncho discernendum erit, nam raucitas nedum gutture affecto, verumetiam & faucibus ipsis, multo tamen humore imbutis superuenit, velut ex Galeni sententia asseruimus: sunt enim ambo vocis organa, ut ipse inquit septimo de compositione medicamentorum secundum locos: præcipue tamen fieri consuevit, si in guttur, & asperam arteriam excrementitius humor destillet, ut inquit Paulus. Cæterum, si in alias partes capiti subiectas ab eo fluxio procumbat, pro partium varietate diuersas suscipit nomenclaturas, ut si in gurgulionem vna, aut si aliter in tumorem attollitur, alio nomine, si in glandulis, quæ in oris termino vtrinque iacent, antiades, si in iis, quæ proximæ eis sunt, paristhmia nuncupantur. Si in reliquis partes aliam quandam appellationem suscipiunt, de quibus omnibus modo tractare non intendimus, sed de tribus duntaxat prænominatis fluxionibus, catarrho videlicet propriè dicto, coryza, & broncho, hoc est, de destillatione propriè dicta, grauedine, & raucitate verba faciemus. Est autem tum his, tum reliquis omnibus non nominatis vitiis commune (ut inquit Paulus) descensus excrementitij humoris ex capite in subiectas partes: quem descensum, defluxionem, seu destillationem (quamuis communissimo vocabulo) nuncupare fas erit. Quod autem in hac affectione cerebrum primò oblatum sit, liquet ex Galeni verbis, tertio de causis symptomatum, cum dixit catarrhi, & coryzæ causa est cerebrum: & post pauca, iterum dicebat, ergo qualis in ventre passio ex mala concoctione fit, tale est in cerebro prædictorum vtrumque; patere insuper illud poterit & sexto de sanitate tuenda: quo loco capiti in prædictis affectionibus prospiciendum esse iussit, tanquam ipsius mali fonti. Ex ipsiusmet quoque cerebri operationibus oblati, ac ex eiusdem excrementis quantitate, & qualitate mutatis, confirmari potest. Quamquam cum eo in grauedine nares coafficiantur, in destillatione, seu catarrho, os ac interdum fauces: in raucitate larynx, seu aspera arteria, aut ipsæ quoque fauces, si immo dico humore imbutæ sint: Affectio ipsa symptoma est in genere excretorum immodicè, ut Galenus inquit, eodem tertio de causis symptomatum, quod quidem interim ad ipsius cerebri intemperiem consequitur calidam, vel frigidam, quo casu ut similis pars ipsum afficitur. Interdum verò eo impleto, & velut instrumento oblati symptoma hoc excitatur, ut Galenus testis est præcitato libro tertio de causis symptomatum. At

tibi declarabunt, quænam fue rit capitis dispositio siue calida, siue frigida, qualitas, & quantitas excrementorum, necnon causarum, quæ præcesserunt contemplatio, Galeno auctore, tertio de locis affectis. Cum itaque cuiuslibet defluxus ex capite ad iam dictas partes causa sit intemperies calida, aut frigida, cerebro tamen ut parte similari affecto, aut multitudo vaporum, seu humorum in eo contentorum, si ut instrumentalis pars, cerebrum ipsum affectum sit: quanquā eius affectio quoquomodo fiat, similis sit affectioni ventris ex mala concoctione, ut patet eodem tertio de causis symptomatum: propterea singulæ dispositiones propriis indiciis inueniendæ sunt. Nam si frigida fuerit, tum ex quantitate excrementorum, quæ maior erit, tum ex qualitate, quòd frigida, ac minime mordacia sunt, cognosces, caputque vndique & frons iis distenditur, ac meatus, quos ethmoides vocant, clauduntur ne vox deorsum per nares transiret, ut inquit Paulus frigidaque præcessit victus ratio, temperamentum potissimum cerebri, ac ætas, tempus anni, regio, ac aeris constitutio aquilonia. Hæc namque frigida cerebri intemperies cogens amplius, & comprimens quodammodo caput (velut manus spongiæ aqua imbutam) exprimit cerebrum ipsum, quo fit, ut ad loca capite inferiora eius excrementa decendant: adhuc cum quod ad ipsum cerebrum provenit pro nutrimento, sua frigiditate concoquere non possit, effectum ei velut excrementum, iterum ad infernas partes illud conuertitur, cum nequaquam continere valeat: nec minus cum ex infernis partibus in ipsum vapores ascendant, nequaquam digeri, ac discedi ab eo valent: qui iterum multiplicati, ac crassiores redditi, ut ad subiectas partes delegentur opus est, nullam siquidem in parte aliqua corporis plenitudinem digerit huius, ut inquit Galenus commento aphor. 13. tertij libri. Quare nec frigiditas confert, etenim frigida intemperies dum nihil absorbit humoris quodammodo incremento confert, eodem Galeno auctore, sexto de sanitate tuenda, & primo de morbis vulgaribus: qua ratione etiam fit, ut ex accidenti propter frigidam intemperiem cerebrum repleatur, ac ut instrumentum à plenitudine infestetur; id quod præter iam dicta, si ex frigidis succis fiat, dignosces ex capitis, tum distentione, tum grauedine, citra tamen calorem, ac mordacitatem oculorum, seu faciei rubedinem: præcesseruntque nonnulla, à quibus caput facile repleti frigidis humoribus potuit, ut nimia repletio, & præsertim frigidorum alimentorum, ac potuum, aut frequētes cruditates assumptorum ciborum, qui in ventre incocti perseuerantes nequaquam infra excernuntur: iis quoque si febris superueniat, ab ea iuuantur, Paulo auctore, præcitato loco. At si ex æstu grauedinem quippiam, destillationem, seu raucedinem concipiat, huiusmodi particulæ quæ fluxionem suscipiunt, incallescunt, acris, tenuisque humor destillat, tum per nares, tum per os, faciesque rubescit, & nasus, ut idem inquit Paulus. Hos etiam magna ex parte febris comitatur, quamuis ab ea minime iuuentur, tumescere insuper facit nasum, & interim exulceratur tum nasus ipse, tum reliquæ partes fluxionem suscipientes, cum ea acrior fuerit, Hippocrate auctore; libro de veteri medicina: & si manum fronti capiti que admoucas, immodicè calentes has partes reperies, quòd si ætas, temperamentum, habitus, anni tem-

ni tempus, regio, aerisque constitutio præcesserint, ac fuerint calidæ, certius id manifestabunt. Est autem huius defluxus causa, calida cerebri intemperies, non siquidem cogens, ac constringens, veluti frigida, sed cerebri humores extenuans, ac dissoluens; attrahendo quoque per se, & ipsa caput replet, præsertim ubi vinum ultra modum potatum fuerit, aut copia ciborum, calidorumque præsumpta, aut balnea calidiora, seu largior perfusio capitis ex aqua calida præcesserint, nam & hæc suæ præ-natura caput replent, quemadmodum austris, ac austrina pluuia, & cuncta, quorum natura calida est, & humida: omnia namque talia apta sunt caput reple, ut testatur Galenus commento aphorism. 5. tertij libri: quo casu præter iam dicta, aderit capitis quoque leuis dolor, ac grauitas cum manifesto caliditatis sensu. Aptiores autem sunt, qui temperaturam calidam capitis habent, ut ab externis causis in destillationes incidant, velut frigidam habentes temperaturam paratiores sunt, ut ab internis causis destillationibus corripiantur. Verum si raucedines, & grauedines in valde senibus fiant, concoctionem non admittunt, inquit Hippocrates, aphorism. 40. secundi libri, cum ex frigidis oriantur causis, & facultas eorum imbecilla sit, ita ut eas concoquere non valeat. Celsus vero scriptum reliquit, quod si in nares ex capite destillat humor, leue est; si in fauces, peius, si vero in pulmonem, pessimum est; quod si in asperam arteriam destillet, peius erit, quam si in fauces; non tamen ita pessimum, ut si in pulmonem, quemadmodum euilibet patere poterit. Cunctæ verò destillationes breues, & si neglectæ sint, longæ esse consueverunt, ut idem inquit Celsus, nihilque pestiferum, nisi quod pulmonem exulcerauit, eodem teste: quanquam neque omnino salubris sit, aut curatu facilis, si ex destillatione caput asperæ arteriæ, aut ipsa eadem exulceretur, potissimum si ad eius cartilagineam substantiam peruaserit, quemadmodum liquet septimo de vfu partium: considerare itaque oportet, cuiusque destillationis præcedentem causam, ac præhabitam dietam, atque ita remedia contraria afferre, ut inquit Aëtius. In vniuersum autem pauco cibo, & quiete vtendum est, vitato etiam frigore, & calore, & præsertim si repentina fiat mutatio, modo ad frigus, modo ad calorem. Hæc namque res (ut testatur Celsus cap. 2. libri primi) maxime grauedines, destillationesque concitat: protinusque abstinendum esse à sole, balneo, vino, & venere idem Celsus præcipit cap. 2. libro quarto. temperatus ergo eligatur aer, ut neque impensè calidus, aut frigidus sit: verum si causa fuerit frigida, parum ad calidum inclinet; si calida parum ad frigidum. Cauent ventos, cum austrinos, tum aquilonios, vitentque somnum longiorem, & diurnum, moderatus tamen in nocte confert; procurandumque erit, ut singulis diebus alui excrementa excernantur, si non natura, saltem arte, balanós, aut clysteres adhibendo, abstineantque ægri ab immodicis animi affectibus. Cibis vtantur concoctu facilibus, & boni succi cum frigidis aliquatenus, aut calfacientibus leniter permixtis, prout diuersa exigit dispositio. Sorbitiones tamen maxime profunt, ut inquit Paulus, aut amygdalarum succo decoctus, aut cum pini fructibus, in causa frigida. Aëtius vero cauem tenerum, ac recentem, tanquam vtilem, comestum commen-

dat; & in frigida causa cauliculos brassicæ, ipsamque brassicam, coctos, & comestos: nec minus si à ieiunio ipsimet cauliculi crudi edantur, butyrum quoque eis vtile exilit, & quibusdam robustioribus porri quoque probè cocti, potissimum in raucedine. In causa verò calida, lactuca, cauliculos parumper seruefactos comedant, etiam si in posca ipsos intingant: poterunt quoque uti pane dulciario confecto ex amygdalis ipsis, & saccharo, aut ex pini fructibus, & saccharo confectis, si ex frigida causa ortum habeat defluxus; caueant vaporosos cibos, ut cepas, allia, sinapi, ac reliquos. Prædictorum autem ciborum quantitas, præterquam quod moderata perpetuò esse debeat, minor tamen in coena, quam in prandio sit, & post cibum neque legant, neque scribant, Celsi auctore, cap. 5. libro primo: pro potu deuitent vinum; loco cuius aqua hordei in calido defluxu, aut aqua, in qua parum radicis glycyrrhizæ, seu cinnamomi fuerit decoctum, in frigido vtantur, aut radicis glycyrrhizæ decocto: vel ipsammet radicem dulcem cum cinnamomo, in frigida, seu cum hordeo, in calida fluxione decoquant. Poterunt quoque qui ex frigideitate defluxu corripiuntur, aqua multa pro potu uti, aut aquoso vino, ipsius vero potus quantitas sit exigua, nam procurata sitis multum confert, ut Theodorus Priscianus inquit libro secundo ad Timotheum cap. 7. Quod vero ad medicamentorum rationem attinet, ex Galeni sententia, sexto de sanitate tuenda, in quouis defluxu ex capite ad subiectas partes, capiti saltem prospiciendum est, ipsumque sanandum, veluti mali fontem, ac firmandum modo liceat, etenim origo, & principium catarrhi è capite nascitur, eodem Theodoro Prisciano teste. Qua de re si ab ipsa caliditate sincera, aut frigideitate fluxiones contigerint, & nulla alia facultate participauerint, sic sanè sedabuntur, ut inquit Hippocrates libro de veteri medicina, ubi ex frigido in calidum permutatæ fuerint, & ex calido in frigidum. Vbi itaque calida præpolleat intemperies, us pugnandum est præsidium, quæ dolori capitis ex tali causa contracto conueniunt, præstatque ætatis tempore eorum caput rosaceo perungi potissimum omphacino; frequentique balneo portabilis aquæ ægros fouere oportet, quo & calidos vapores, qui in capite sunt, euocemus, & totum capitis temperamentum melius reddamus, Galeno teste, eodem sexto de sanitate tuenda, ipsumque caput copiosiore aqua calida, moderatè tamen perfundendum erit, ut inquit Paulus: nec propterea Celsus pugnabimus, qui protinus à balneo abstinendum præcipiebat; namque aut sponte nascetes aquas interdicebat, vel in frigida intemperie circa initia ipsum prohibebat. At si frigida intemperies caput infestet, calefacientibus, iuxta præallegatam Hippocratis sententiam, fluxio sedabitur, in calidum intemperie permutata: caput itaque nardino, rutaceoque oleo perungi debet, Paulo teste, irinum verò non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur, vel chamemelino, seu anethino vtare. Verum si nec dum calida fuerit cerebri intemperies, sed calidi quoque in eo redundant succi, ac forte febris inuaserit, totius corporis plenitudine existente, sanguinis mittendus erit ex externa cubiti vena, quæ humoralis dicitur, siquid eam non prohibeat, eaque iteranda erit, si opus fuerit, potius quam semel multâ quantitatem sanguinis extrahere: at si quid eam

Mediam
tertiū ratio,
cap. 9. vbi
in intem-
perie
virescit
virescit

Loco ci-
tato.
Si ex cali-
da cerebri
intemperie
fiat, cura-
tio.

cap. 9

Si ex fri-
gida.

Si ex cali-
dorum suc-
corum re-
dundantia
fiat, cura-
tio.
Vena se-
ctio.
Purgatio.

prohibeat, redundantes humores alijs euacuati-
onibus purgare, ac deorsum trahere oportet, clyste-
rijs videlicet, cucurbitulis, frictionibus, ac purgan-
tibus medicamentis; prius tamen quam ea tribuan-
tur, concoqui, ac temperari calidorum humorum
acrimonia debet, ac eorum intemperantia: indi-
gent enim hoc omnes fluxiones, quæ ex humorum
acrimonia fiunt, teste Hippocrate præcitato loco.
Temperantur autem si syrupum violaceum, rosa-
ceum, ex nymphæa, papauere, aut ex cannis tribuas
cum aqua hordei, aut decocto radices glycyrrhi-
zæ, seu borraginis. Tribuas vero vnc. j. & s. vel ij.
ex prædictorum syruporum aliquo cum vnc. iij. ex
aliqua prædictarum aquarum: quibus pluries af-
sumptis purgare poteris ægrum ex cassia fistula, seu
manna vnc. ij. videlicet cassiæ fistulæ, aut ij. vel iij.
ipsius manna; & si videbitur addere poteris vnc. s.
seu drach. vij. antidoti diacatholicon, aut decoctum
trochiscati agarici drach. j. vel scrup. iij. capiti que
demum applicentur ea topica medicamenta, quæ in

Topica.

capite de dolore capitis cõmemorata sunt, balneis
item dulcis aque, ac reliquis, quæ suprà in calida in-
temperie approbauimus, vtendũ; & cum somnum
ingreditur, diacodium ore contineat, sapiusque eo
vtatur etiam si vigilet, poteritque eum in tabellis
conficere velut Neapoli vtimur, præsertim his, qui
liquidum medicamentum ipsum sumere abhorret;
somnum etenim dulcem infert, & reprimat influ-
xum, vt inquit Aëtius. Frigido autem redundante
humore, præsertim in capite, per ea quæ talem pur-
gant, medicamenta, corpus, & caput vacuabis: in
quem vsum conferunt acres clysteres, prius tamen
quam purgantia tribuas medicamenta, ex rosaceo
melle, syrupo de glycyrrhiza, aut de hyssopo, iui-
bino, aut ex succo borraginis, præparari, ac conco-
qui redundans succus debet, cum aqua betonice,
aut sampsuchi, & denum pilulis ex hiera, & agari-
co confectis euacuari, aut ex pilulis arabicis, aureis,

*Si ex frigi-
dorum hu-
morum re-
dundantia
fiat, cura-
tio.*

Purgatio.

& interdum cochiis, ac similibus, post quas (si vide-
bitur) vnc. ij. aut parum plus, vel minus rosæ mel-
lis, aut syrupi ex pluribus infusionibus rosarum ex-
hibe. Idoneum quoque erit, post vniuersalem pur-
gationem medicamen, quod pituitam per os edu-
cat, præbere, ac à capite cucurbitulis, frictionibus,
seu vinculis humores retrahere, ipsumque prædictis
calidis oleis irrigare. Item faccelli capiti ipsi admo-
uendi sunt, qui taliter componantur. Recipe hyssop-
i, sampsuchi, florum chamameli, meliloti, ana drac.
j. & s. florum stœchadis, spicæ, singulorum scrup. j.
mastiche, ligni aloës, maceris, cuiusque drach. s. ro-
sarum aridarum drach. iij. terantur singula, & in se-
ricum, seu tenuem linteum lineum immittantur,
sacculusque formetur, & coronali suturâ impona-
tur, quo etiam loco sinapisimus, aut igneum caute-
rium (vbi diuturnior fuerit affectio) vtiliter adhi-
beri poterit. In vtroque item defluxu ex calida, aut

Topica.

frigida intemperie orto, suffimenta adhibere con-
uenit, si ex calida intemperie fiat, paretur vt infra.
Recipe manna, seu corticis thuris, ladani, masti-
ches, singulorum scrup. s. santalorum rubeorum, &
luteorum, & corallorum rubeorum ana drach. j. ro-
sarum rubeorum siccarum, incompletarum drach.
iij. fiat puluis, & (vbi vsu, exigat) carbonibus igni-
tis inspergatur: frigida verò existente cerebri in-
temperie, hoc modo suffimentum paretur, mace-
ris, ligni aloës, spicæ, mastiche, corticum seu man-
næ thuris, singulorum excipe scrup. s. hyssopi, & sam-

Suffus.

psuchi sicca ana scrup. j. ladani drach. j. florum stœ-
chadis, & caryophyllorum drach. s. rosarum rubea-
rum siccarum drach. ij. vel iij. paretur puluis, & modo
iam dicto vtare. Particulatim verò (vbi ad nares flu-
xio decumbat, si calida ea fuerit) conuenit ex aqua
tepida per nares vaporem excipere; aut ex malua-
rum hordei, violarumque, & florum chamameli
decocto; frigida autem fluxione existente, ex sam-
psuchi, hyssopi, serpilli, betonice, pulegij, seu betæ
decocto excipiendus vapor erit. Ex eisdem quoque
caput purgia fiant, quæ insuper parari poterunt ex
his, quæ cap. de dolore capitis commemorauimus:
verum nequaquam fieri debent, nisi prius purgati
fuerit corpus, ac iam dictis medicamentis caput fir-
matum, aut saltem ipsi prospectum melanthij quo-
que, seu cumini vsu odorem suscipere commenda-
uit Paulus, frigida præsertim fluxione existente: nec
minus confert pulegiæ odorare: deimitantur au-
tem singula in serico, aut lineo linteo. Si verò in os
defluat calida fluxio, ex aqua hordei, violarum, aut
maluarum decocto, cum glycyrrhizæ radice oris
collutio fiat, frigida autem existente fluxione ex
hyssopi, pulegij, sampsuchi, ac aridarum ficuum de-
cocto colluatur os: priuatim etiam & ipsi raucitati
conferunt compositiones, quæ sub lingua te-
nentur *ὀντολὸς* & *ἄς* Græci appellant, quo paula-
tim eis liquecentibus, asperæ arteriæ summum, id
quod ipsum defluit, suscipiat, paulatim etiam rela-
xatis musculis ipsius gutturis. Hoc autem ex indu-
stria fieri oportet, ne tulsis exciteretur, fiet autem si
supinus cubet, iuxta Galeni sententiam, quarto &
quinto meth. meden. ac septimo de compositione
medicamentorum secundum loc. Talia sunt pilulæ
bechicæ dictæ, ac ea compositio, quam Neapoli a-
lulam vocamus conficitur autem ex amylo, traga-
cantha, amygdalis dulcibus, seu ipsarum oleo, &
saccharo: poterit quoque hæc compositio in tabel-
lis formari, nec minus & id pharmacum sub lingua
tenendum erit; quod loche de papauere nominant,
si à causa calida raucitas fiat; & si à frigida, loch,
quod sanum, aut illud, quod de pino appellant. Sæ-
pius quoque veluti lambendo, diutissime tamen
in ore tenens sensum, ac paulatim deglutiendo, as-
sumat ex syrupo de cannis, aut ex dulcibus malis
punicis, ex adianto, glycyrrhiza, seu hyssopo, aut ex
decocto, quod ex hordeo, radice dulci, vua passa, ca-
ricis, adianto, & hyssopo paratum sit, saccharum
addendo, aut mel, si frigida fuerit causa. Præstat ite-
(ex Galeni sententia, eodem septimo de compositi-
one medicamentorum secundum locos) glycyrr-
hizæ decoctum cum sapa admistum: & si magis di-
scutere, & extergere velis, caricarum decocto vtaris
per se, aut cum aqua hordei, vel cum in aqua radix
dulcis fuerit decocta. Reliqua, quæ pro curatione
raucedinis conducunt, inferius requiras, cap. de tuf-
si, priuatim autem valde confert, si ipsa glycyrrhizæ
radix, aut eiusdem succus sub lingua teneatur.

Περί φλεγμονῆς τοῦ κεφαλῆς.

De inflammatione cingulionis.

CAP. XLIII.



PNEUMATVR sapenunero quæ-
dā, quæ circa os continetur carnosa,
in summo siquidem ore dependens,
tanquam aliquod vocis plectrum ex-
istens, Paulo auctore, libro sexto
cap. 37. apparebit autem ea, si quis aperto plurimum
ore

ore toto, linguam deprimat: hanc ipsam caruncula-
 lam veteres Græci (vt inquit Galenus sexto de cō-
 positione medicamentorum secundum locos) duobus
 nominibus appellare consueuerunt. Nominant
 nanque interim γάρραρον, id est, interim verò
 κίονα, quod à Latinis gurgulio, & columna dicitur:
 à posterioribus autem medicis ferè omnibus Græcis
 (vt ipse asserit) κίονες, id est, columella, vocatur,
 quod si quidam sint, qui γάρραρον, id est, vnam ip-
 sam nuncupent, eorum meminisse non præstat:
 nam non particula ipsa, sed vna aliqua eius affectio
 γάρραρον, hoc est, vna nominatur, cum scilicet vna
 acino simile summum gurgulionis appareat, vt in-
 quit Aëtius, cap. 40. lib. 8. hanc etiam solam gurgu-
 lionis inflammationis speciem Hippocrates vnam
 appellat, vt liquet apud Galenum libro de tumor,
 præter naturam, in fine. Fit autem vna cum pitui-
 de capite ad gurgulionem descenderit, & gurgu-
 lio præceps dependet, ac fit rubicundus, eodem
 Hippocrate auctore, libro secundo de morbo tem-
 poris autem progressu nigrescit: & eodem libro
 dicebat, vnam fieri, cum summa gurgulionis pars
 aqua impletur, & rotunda fit, ac perlucida, & spira-
 tionem intercipit: quamquam raro (vt testatur Ga-
 lenus præcitato libro sexto de compositione me-
 dicamentorum secundum loc.) hæc affectio circa
 columellam contingat, sed valde sæpè inflamme-
 tur, quemadmodum etiam & raro alia quædam af-
 fectio, quam lorum vocant, circa gurgulionem et-
 iam accidit, cum videlicet nimium ignitus gurgu-
 lio ipse gracilescit, & loro similis propendet, vt in-
 quit Aëtius, vtrumque autem nomen (vt Paulus re-
 fert præcitato loco) à similitudine factum est: nam
 si longior, tenuisque fuerit, columella nuncupatur,
 si verò crassior in rotunditatem creuerit, feratur-
 que deorsum, vna dicitur. Inflammato itaque gur-
 gulione, quomodo libet aperto plurimum ore to-
 to (vt diximus) si quis linguam deprimat, eam partem
 affectam esse visu diiudicabit, nulloque alio indi-
 gebit signo. Quod verò ea affectio inflammatio
 sit, morbus siquidem in compositione primò (vt
 sæpè diximus) ex dolore, tumore, rubedine ipsius
 columellæ, cum febre, ac deglutendi difficultate di-
 iudicabitur. Prouenit autem affectus hic, cum ex ca-
 pite ad gurgulionem ipsum fluxio defertur, quem-
 admodum sexto de sanitate tuenda, & tertio de cau-
 sis symptomatum liquet: hæc inquam fluxio cum
 sanguinis, tum aliorum humorum à capite descen-
 dentium fieri poterit, verum quo pacto id discer-
 ni queat, præcedenti cap. fufius ostendimus: quare
 vt hic iterum repetamus, superuacaneum duximus.
 Inflammato gurgulione ac in tumorem aucto, vt
 tendum erit, omnibus moliminibus, præter chirur-
 giam, ipsum curare, ac extenuare, Hippocrate au-
 ctore, tertio prognosticorum. nam quoad rubidus,
 magnusque fuerit gurgulio cum periculo secatur,
 & scarificatur: & cum talem scarificationem, seu
 sectionem sanguinis fluoris, & inflammatio comita-
 bitur, eodem Hippocrate ac Galeno auctoribus
 præcitato loco. Quod si interdum chirurgia vti o-
 porteat, cum videlicet pars gurgulionis summa
 maior, ac fluida, seu orbiculata fuerit, superior, ve-
 rò tenuior, quem affectum (vt diximus) vnam ap-
 pellat, vbi alium subduxeris præstabit manus ad-
 moliri, vt ipsum testantur, ne æger stranguletur,
 potissimum vbi aliis adhibitis medicamentis ma-
 lum non cedat: nam neque in prædicta affectione

ad eius excisionem festinandum erit: quapropter
 vna vehemens inflammatio terrere quoque debet,
 Celso auctore, lib. sexto cap. 14. quò fit, vt in hac af-
 fectione abstinentia necessaria sit, vt ipse inquit.
 Conuenit verò eadem ferè victus ratio, quæ in re-
 liquis inflammationibus, potissimum autem in prin-
 cipio, conducit quies, inedia, vt sexto de compo-
 sitione medicamentorum secundum locos, Archi-
 genis auctoritate, testatur Galenus. Quod verò ad
 curandi rationem attinet, vbi vniuersum corpus
 humorum multitudine fuerit refertum, aut eorun-
 dem malitia vitiatum, priusquam ad localia reme-
 dia perueniamus, venæ sectio, aut purgatio admi-
 nistranda erit; acresque clysteres adhibendi, vt &
 vniuersum corpus euacuetur, humorumque mo-
 mentum, qui ad affectam partem feruntur, transfe-
 ratur: hoc nanque rationabile est, & multa expe-
 rientia indicatum, ac cognitum, vt testis est Gale-
 nus, eodem libro sexto de compositione medica-
 mentorum secundum loc. qua etiam ratione Cel-
 sus dicebat, quòd & sanguis rectè mittitur, & si id
 aliqua res prohibeat, alius vtiliter ducitur. Si ita-
 que corporis plenitudo adsit, vena cubiti statim se-
 canda erit (si nihil prohibeat) media, aut externa,
 prout maior, aut minor fuerit corporis plenitudo:
 cucurbitaque cum scarificatione ceruici affigende;
 & si his nec cedat affectio, venæ sub lingua secen-
 tur, eiusdem Archygenis decreto: Alius præterea
 acri clystere, aut glande subducenda erit, reuulsio-
 nis nedum euacuationis gratia: in quem etiam vsum
 frictionibus, ac vinculis extremarum partium, cu-
 curbitulisque cum iuxta scapulas, tum iuxta nates
 vtare. Vitiatis verò humoribus redundatibus, qua-
 liscunque is fuerit, purgandus erit, & si simul cum
 sanguine fluxerit: nec alienum erit ante purgatio-
 nem (reuulsionis saltem gratia) humeralem venam
 in cubito secare, paucamque sanguinis copiam ex-
 trahere, ac demum purgationem adhibere, conco-
 ctis tamen ac præparatis redundantibus succis, si
 dabitur occasio, quo etiam tempore clysteribus vti
 poteris. Sit autem purgans medicamentum non va-
 lidum, sed leniendo vacuans, veluti manna, cassia
 fistula, syrupus ex pluribus infusionibus rosarum,
 aut violarum, cum quibus interim antidotum dia-
 catholicon permisceas, præsertim si redundans suc-
 cus, aut corporis natura eius qui purgari debeat, id
 exigat. His autem peractis, aut si neutrum prædi-
 ctorum adsit, statim ad curationem per localia re-
 media peruenire debemus, quæ eius naturæ esse
 debent, vt fluxionem reprimant; quemadmodum
 in aliis omnibus morbis, cui ex humorum influxu
 contingunt. Sint igitur adstringentis facultatis, &
 siquidem moderatus sit influxus moderatè adstrin-
 gentis, quæ austeria priuatim dicuntur: vbi verò
 vehementior fuerit influxus, vehementioris adstrin-
 gentis, quæ acerbæ nominantur: ambo enim ad-
 stringunt, sed debilius austeria, vehementius au-
 tem acerbæ, vt patet quarto de simplic. med. facult.
 & sexto de compositione medicam. secundum loc. 4. de sim-
 plic. med. facultat. cap. 7. 6. de com-
 posit. medi. sec. loc. ca. 3.
 Collutiones itaque moderatè, siquidem modera-
 tus fuerit influxus, ex palmulis decoctis, quando-
 doque sola aqua, quandoque modico melle inco-
 cto, vel ex rosarum decocto, pampinorum vitis, ru-
 bi, cytinorum, filiquarum, radicum mori, & malorū
 austerorum, ac pyrorū, sorborum, interim cyperi
 parari poterunt. Fortiores verò (vbi vehementior
 fuerit influxus) sunt, myrti, & baccarū eius decoctū,

Curatio.
 Victus ra-
 tio.

cap. 3.
 Medicamē-
 torū ratio.

Loco ci-
 tato.
 Vena se-
 ctio.

Disor-
 nes.

Purgatio.

Topica
 qua compo-
 sant.

Loco ci-
tato.

cap. 6. 7.
& 8

& ex acerbis cotoneis malis, aut virgultorum tene-
rorum ilicis, arbuti, similacis, & vniuersi quercini
generis, similiterque & glandium, mespilorum, i-
tem, & cornorum decoctum: at generosissimum
est gallarum decoctum, rhois culinarij, ac coriarij,
myricæ fructus, vtriusque mali punici floris, & pu-
taminis: horum itaque vnumquodque & singula-
tim, & cum aliis decoctum in aqua gargarizandum
exhibere oportet, iuxta Galeni sententiam, sexto
de compositione medicamentorum secundum lo-
cos, & Aëtij præcitato loco: quin iuxta eorundem
decreta, aridis quoque tritis columellam contin-
gere opus est, ita vt summis, & paulatim ad su-
perforem, & extrinsecam regionem afferantur, &
per cochleare, aut specilli concavum supra linguam
immittantur: ex his ipsis moderatè quidem sunt
rosæ, & flos ipsarum, & prædictarum plantarum
germina exsiccata, ac hypocistis, & omphacium
hæc. Et si frigidior fuerit fluxio, aloë, cyperus,
& iunci rotundi odorati flos, ac rheon ponticum
confert, pariter si fortioribus indigeas, rhus obs-
norum, siue culinaris conducis, balaustium, cyti-
ni, malicorium, galla, & magis exactè cum ompha-
citis fuerit: nec minus conferunt hypocistidis, vuz
acerbæ, ac glycyrrhizæ succi, ad solem æstiuum
exsiccati, adeo vt conteri queant. Vbi verò gur-
gulio à nimium adstringentibus remediis com-
pressus fuerit, tragacantho, sarcocolla, & amylo v-
tendum erit. At vbi generatus affectus in gurgulio-
ne maiorem habuerit causam, impossibile erit ip-
sum per repulforia perfectè sanare, vt inquit Gale-
nus, & maxime vbi ægri corpus fuerit humoribus
multis refertum, aut particula affecta natura debi-
lis: ob id igitur cogimur, scire quidem in principio,
sepius verò paulo post admiscere quippiam ex di-
scussoriis, & si dolor affuerit simul vehemens, etiam
ex mitigatoriis. itaque tunc opus est vnicuique
prædictorum pharmacorum aliquid ex discusso-
riis addere: & cum hæc omnino multa sint, à mol-
lioribus auspicandum erit: ab acerbis nanque in-
flammati exacerbantur, cuius farinae sunt chama-
meli flores, foenumgræcum, fertula campana, ane-
thum, althæa, radix iridis, mel, erui farina, thus, aut
myrrha: & si mitigatoriis hoc tempore indigeas ex
contusa radice dulci, & melle, & dulci aqua pari
mensura simul coctis, medicamentum paratum cū
prædictis admisceas, aut id solum gargarizandum
præbeto. Caterum tu perspecta (vt Galenus in-
quit) inflammationis magnitudine, ac caliditate,
& considerata influxus quantitate, ampliùsque co-
piam humorum in toto corpore per coniecturam
affectus, pharmaco, in quo aut adstringentium,
aut discutientium vis excellit, vteris. Procedente au-
tem tempore, vbi iam dictis inflammatio non ces-
serit, discussoria medicamenta tuto adhiberi pos-
sunt, nisi ad duritiem vertatur ipsa gurgulionis in-
flammati: nam tunc emollientibus medicamentis
vtendum esset, quæ cuius naturæ esse debeant lib.
quinto de simpl. medicamentorum facul. requiras:
cuiusmodi sunt, & radix & folia althææ, semen li-
ni, foenumgræcum, & alia huiusmodi, e quibus gar-
garismata parari possunt: admiscere eis item pote-
ris hyssopum, aut glycyrrhizam. Verum si ad suppu-
rationem inflammatio vergat, mitioribus collutio-
nibus, & gargarismis, eisque concoquentibus vten-
dum erit: quo casu præstat decoctum ex caricis per
se solum, aut aqua mulsa permixtum, seu sapa, aut

ptisanæ succus, in quo vuz passæ sint incotæ: radi-
cis insuper dulcis decoctum, aut furfurum lotura ca-
lida, id quod in reliquis omnibus seruandum erit
medicamentis, vt temperatè calida sint. Ea verò
suppurata, post puris eruptionem extergentibus, &
desiccantibus medicamentis curari debet, aqua
hordei cum melle rosaceo mista, aut aqua mulsa, &
reliquis huiusmodi. Euenit etiam aliquando, vt ci-
tra inflammationem nimium humectus gurgulio
laxior fiat, & propterea linguæ radici, ac faucibus
propensus incumbat, quemadmodum in destilla-
tionibus continuis contingit, Aëtio auctore; quæ
affectionem Græci *ἡ ἀσπερσὺς γλῶσσης*, Latini la-
xatam columellam, barbari casum vuz appellant,
quæ affectio quoniam eandem curandi rationem
postulat, quam eius exigit inflammatio, propterea
seorsum de eâ pertractare nolumus. Pro ratione
itaque confluentis succi venæ sectio, aut purgatio
præcipiatur, quibus corpus totum, ac caput pri-
mò vacuetur. His tandem peractis, collutionibus,
gargarismis, ac reliquis medicamentis aridis supe-
rius descriptis vtaris, adstringentibus scilicet, &
exsiccantibus. Priuatim autem (vbi subalbidis, e-
xanguior gurgulio sit) ex origani triti in aqua &
aceto decocti: ac caricarum cremore misto ad gar-
garizandum vtrior: aut loco origani, hyssopo v-
tare: apium quoque, & lauri folia trita, & vino, aut
lentis decocto diluta, gargarizato, Appollonio
auctore. Arida quoque medicamēta parabis ex gal-
læ omphacitis, aluminidis scissis, ac salis ammoni-
aci partibus æqualibus, quibus tritis, ac simul mistis
expleto cochleari vnam contingito: hoc autem ve-
lut validissimo medicamento vtare, repellendi, ac
discutiendi vim habente iuxta Galeni sententiam
eodem sexto de compositione medicamentorum
secundum locos. puluis autem, quo vtimus nos, hic
est, Recipe piperis, cinnamomi singulorum scrup.
s. corticum thuris, & gallarum ana scrup. j. rosarum
rubearum siccarum drach. ij. conterantur, simul-
que, & modo quo supra vtare. His, qui casum vule
patiuntur sic subuenimus, inquit, I rotula, pulue-
rem zingiberis, pyrethri, & cinnamomi decoqui-
mus in vino, & facimus gargarizare, & puluerem
horum calidum vuluæ apponimus, tu autem vtare
hoc medicamento, vbi ex pituita fuerit laxatus gur-
gulio. Marcellus autem libro de medicamentis cap.
14. brassicæ crudæ folium leuissimè tritum com-
mendat, ex eo verò succum exprimito, quo vuz cō-
tacta potenter subleuatur. Cinis item testarum
ex ostreis, aut hirundinum exustarum cinis te-
nuissimè contritus, cum melle mistus, vuz illi-
tus prodest; similiter si rosæ sicca part. ij. & myr-
ti part. j. cum aqua mulsa decoquas, & gargari-
zandum præbeas. Denique nonnulla medicamen-
ta, præsertim composita consulto hic scribere præ-
termisimus, pro cura præsertim inflammationis co-
lummellæ, quæ cap. de angina studiosi requirant. Ve-
rùm vbi cunctis iam dictis auxiliis gurgulionis ma-
lum non cedat, tam si oblongior, tenuisque præter
naturam fuerit, quàm si in rotunditatem creuerit,
eius summo vuz acino simili existente, ne continuo
irritatu tussis, vigilæ, interim etiam strangulatus
subsequatur (vt inquit Paulus cap. 31. libro sexto.) is
excidendus erit, modo quo ipse præcipit præcitato
loco, ac Aëtius cap. 41. libro octauo. neque tamen
festinandum erit ad eius excisionem (vt diximus)
Hippocratis auctoritate, libro tertio prognostico-
rum

3. Progn.
lib. 1.
14. meth.
cap. 13.

De la-
colum.

10.

Amid. No.
quid sint.
vuz & sup.
quid.
lib. 8. ca. 48

Potes af-
fici.
lib. 8. ca. 45

Afflicti.

Causa.

rum, & Galeni 14. method. medeniis obseruatis, qua tum ipse, tum etiam cum eo Galenus, eodem loco præcipiunt.

Περὶ ἀντριάδων φλεγμονῆς.

De glandularum iuxta linguam inflammatione.

C A P . X L V .

M N I B V S hominibus carunculæ quædam exiguæ naturales ex aduerso in oris termino vtrique iacent. Galeno teste, tertio de causis symptomatum: has Græci ἀντριάς (vt Aëtius refert cap. 48. li. octauo) Latini glândulas barbaram sectantes medicinam amygdalas appellant: quamuis Galenus non partes ipsas, verum cum ipsæ de fluxu, præsertim ex capite, tumore, aut inflammatione afficiantur ἀντριάς præcitato loco nuncupauit. Paulus autem per ἀντριάς, tum lib. sexto cap. 30. tum lib. tertio cap. 26. scirrhosum tumorem paristhmiorum intelligit. Si verò in contiguas his partes fluxio decumbat, seu inflammatio excitetur παειδῖμια, tum præcitato loco, tum commento aphor. 26. tertij libri, idem Galenus appellauit dum asseruit παειδῖμια (quæ Latine tonsillas vertunt) inflammationes esse locorum ad isthmum attinentium: intelligit autem per isthmum partem illam quæ os & gulam interiacet: nominatur autem ita per metaphoram quandam ab his, qui propriè dicuntur isthmi, qui angusti quidam terræ trāsitus sunt, sitæ inter duo maria. Hæ autem inflammationes nonnunquam solius tunice sunt, ventri, gulæ faucibus, totique ori communis: nonnunquam verò (vt idem inquit Galen. præcitato loco) & subiectorum ipsi masculorum: quamuis has partes & non eorum inflammationem, tum Paulus libro tertio cap. 26. tum Aëtius libro octauo, cap. 45. παειδῖμια vocant, & Latini tonsillas vertunt, Celsum fortè putantes imitari, qui libro sexto cap. 10. postquam de dentiū dolore caput exegisset, de tonsillis, ac earum cura pertractat. At nunquid per tonsillas, id quod Græci παειδῖμια dicunt, partes quasdam intelligentes subaudire velit, aut quas ἀντριάς nuncupant, siue verasque, ex eiusdem Celsi verbis haudquaquam percipi poterit, cum dixit. Si verò tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, &c. Nos autem cum Galeno, quicquid alij sentiant, per ἀντριάς glandularum, quæ sibi ex aduerso in oris termino vtrique iacēt, præter naturam tumorem, seu inflammationē intelligi volumus, per παειδῖμια verò, cum contiguæ his partes tale quippiam perpetiantur, à partibus ipsis affectis affectiones prædictæ fortasse tamen nomenclaturam fuscipientes. Deducto itaque ore manifestè (inquit Aëtius) apparent glandularum tumores maiores, circa quidem inflammationem earum substantia concolores. Vbi verò inflammata fuerint, rubicundæ apparent, ac dolorem inferunt. Si verò partes eis proximæ inflammentur, accidit ita affectus difficultas transglutiendi, dolor, aliquando etiam & febris eodem Aëtio auctore, velut etiam glandulis ipsis inflammatis, nedum transglutionis, verum etiam & spirationis difficultas aderit: ex quibusmet indicij, & earundem partium inflammatio percipi poterit. Quæ quisnam morbus sit, non semel duntaxat in præcedentibus diximus, nec opus erit eiusdem inflammationis causas iterum repetere, cum similis esse poterunt cum his, quæ gurgulionis inflamma-

tionem efficiunt: priuatim autem (vt refert Aëtius) in modò dictis partibus inflammatio excitatur παειδῖμια præsertim infantibus adhuc lactentibus, ex haultu lactis, pueris propterea quòd multo cibo se explent, reliquis autem hominibus plerumque euenit à nimia meri potione, & à multa, ac audiore deuoratione ciborum, maxime acrium, & asperorum; frequentissimè nanque (vt idem testatur Aëtius) παειδῖμια, quæ tonsillas vocant, cum partes sint calidæ, & humidæ inflammationem incurrunt, quo etiam affectione magis arripiuntur hi, qui plurimo sanguine abundant, necnon infantes, & pueri, utpote teneram habentes misturâ, id quod Hippocrates, præsertim in pueris confirmauit, apho. 26. 3. lib. quoniam verò tam ἀντριάς quàm παειδῖμια dictæ, eandem ferè curationem exigunt, ac similem victus rationem requirunt, non ab re propterea vtrarumque inflammationum cōmunem curationem hic conscripsimus. Incipiente itaque inflammatione cibum subtrahere oportet, vt inquit Aëtius, qui verò afferuntur, modici sint, sorbiles, & ventri commodi: cibus quoque in hac valetudine (Celfo auctore) lenis esse debet, ne exasperet, verum ubi tanta sit inflammatio, vt spiritum impediât, à cibo (vt ipse inquit) abstinendum, neque absumendum quicquam præter aquam calidam est, exhibendus itaque his est aqua potus, præsertim febre simul irruente, aut aqua hordei, seu ea aqua in qua coriandrorum præparatorum semina fuerint decocta; aut etiam cinnamomi exiguum (& vt vno verbo dicam) ea victus ratio instituenda erit, quæ in reliquis inflammationibus. Quòd si levis fuerit inflammatio, circa initia gargarismi adhibendi sunt adstringentes, & repellentes, id quod præcipiebat Celsus, cum dicebat, gargarizandumque est ex reprimentibus, velut est rosatum, aut palmarum decoctum, mixta, aut lenticulæ, aut ipsius etiam fursuris ac reliquorū quæ in principio inflammati gurgulionis assumuntur: cauendum tamen, ne mel in principio ad gargarismos adiciamus, ne per acrimoniam malum irriteremus, vt Aëtius inquit, Remittente autem inflammatione, & decrecente, mel in gargarismos admiscere conuenit, eodem Aëtio, & Paulus testibus: quo etiam tempore calidiores gargarismi profunt, quanquam etiam circa initia medicamēta actu tepida exhibenda sunt, frigus enim nō tollant inflammata, sicut neque plurimum calorem, vt testatur Aëtius. Vbi verò vehemens fuerit inflammatio, adeò vt periculum suffocationis suspectum sit, priusquam adstringentia medicamenta adhibeantur, vena cubiti incidenda est, præcepto Aëtij, repetita etiam sanguinis detractione, maxime si iuuenis sit æger, & multo sanguine abundet. Vena autem incidenda erit externa, aut si multo sanguine totum corpus fuerit refertum, media primum, & deinde externa. Et si venter non probè egerat, iniiciendus est clyster, aut glande immissa irritare oportet: nec absonum erit, si cum sanguine calidi, ac vitiosi succi redundarint, præsertim si febris adsit, purgare medicamento vti, quod leniendo purget, quemadmodum præcedenti capite præcepimus. Post euacuationem reprimentibus quoque vtendum est medicamentis, superius iam dictis, deinde prisanæ succum, in quo decocta sint vuarum passæ, gargarisent, aut calidam fursurum decoctionem, aut sapam tepefactam; vel decoctum radicis dulcis, aut ficuum, & hyssopi decoctum. ex-

Prognostic.

Eodem loc.

Curatio.

Victus ratio. loco citato.

Medicamentorum ratio.

Anima- duersio circa topica adhibenda.

Vena sectionis, quibus competat.

Purgatio.

Topica.

trinfecus autem leniter fouere conuenit spongiis expressis, ac madidis in aqua, in qua flores chamæmeli, althææ, maluarum folia, fœnumgræcum, seu fertula campana fuerint decocta. Cataplasinata quoque imponenda sunt ex farina hordei, seminis lini, aut fœnigræci, aut his simul mistis: verum si ex vsu acriorum collutionum, seu gargarismorum inflammatio exaspereretur, & mordacitas inde accidat, Aetij de cetero, leniores gargarismi colluendi sunt, qualis est succus ptisanæ tepidus, aut lac etiam tepidum: permanente verò, ac immorante diutius inflammatione, atque vbi tonsillæ ipsæ subrubri coloris fuerint, neque melius à prædictorum remedium ad motionem habuerint, permutationem in pus expectare oportet: citò enim tonsillæ abscedunt, ex Aetij sententia. Dignoscet autem (vt ipse inquit) quoniam inflammationis signa augeantur, & exacerbationes ad vesperam sunt fortiores cum horrore, & inæqualitate, aliquando etiam cum febre: quare hoc tempore coadiuuare oportet, vt quàm citissimè suppuratio fiat, adhibeantur propterea gargarismi calidiores, velut aqua mulsa calida, & decoctum caricarum, ac hyssopi cum radice dulci. Extrinsecus verò cataplasma imponatur, ex eiusdem Aetij sententia, ex hordeacea farina, & fœnogræco cum decocto caricarum, & althææ, ac melle, aut vapor aquæ calidæ intrinsecus, sed aliquanto diutius ad mouendum erit, donec ea suppurentur, & per se aperiantur, vt Celso visum est. Confecto autem pure dolores minuuntur, & inflammationis tumor mollior redditus digito cedit. Qua re tunc (vt Aetius præcepit) aciores collutiones exhibendæ sunt, vt abcessus rumpantur: cuius generis sunt pulegium, hyssopum, tymum, calamintha, & thymbra in sapa, aut aqua mulsa decocta, & gargariata. Si verò pure substante non rumpuntur, hi tumores ex Celsi decreto, incidendi sunt, deinde ex mulso calido ad gargariandum per se, postea etiam admisto lenticulæ, vel rosarum decocto, atque id faciendum, donec in totum soluantur, ac penitus ad cicatricem perducantur, ex Aetij, & Pauli sententia. Modico autem tumore existente, ac exulceratione, furfurum cremori ad gargariandum paulum mellis adiciendum est, & vbi plurima vlcera sint, eod. furfurum cremore, vel lacte gargariandum est Celsi decreto. Modus autem sectionis, si non per se aperiantur, ac situationis ægri, tum ante, tum post dissectionem: ac patrato opere, quæ conducant auxilia, ab Aetio cap. 45. & 48. libri octauo: & à Paulo. cap. 30. lib. sexti describuntur. At si prædictis partibus crustosa, pestilencia, ac serpentina vlcera oboriantur, siue ex præcedente influxu, seu inflammatione, siue ex quauis alia causa fiant, nulla fluxione præcedente, seu præcedentibus aphthis, vt in pueris euenire consuevit, aut nonnullis virginibus, circa vigoris ætatem mensium purgationem appetentibus, totius corporis curatione præmissa, ac reliquis diuersionibus, & iam dictis medicamentis adhibitis pro earum curatione, priuatim (vt Paulus inquit) exhiberi debet medicamen diamoron ex aqua calida, vel aqua mulsa, quæ rosarum inspersarum florem obtineat, vel costum, vel rhus sicum, seu decoctum. Aetius autem gargarismos probat ex lenticulæ, myxarum, ac palmarum, seu furfurum decocto cum melle, & ptisanæ succo: & post principium, hydromeliti iridem, costum, ac aristolochiam infarciendum præcipit, vel succum pharmacum ex rhoe,

Si abscedit tonsillæ signa.

Serpentinum vlcerum eod. loco oritur curatio.

flore rosarum, croco, & costo adhibendum. At Paulus ex malo punico dulci cum cortice tuso succum exprimit, & eius partes sex assumit, quæ vni mellis mistæ coquantur, donec eis mellis spissitudo sit, quo medicamento perungi tonsillas præcipit. Similiter si partes duæ gallæ omphacitidis sumantur, aluminis vna & salis ammoniaci tosti tantundem, & aridum medicamentum ex eis apparatus appropinquat. Verum vbi post acria, irritantiæ medicamenta, ægri dolorem sentiant cum radicis dulcis decocto amylo, seu tragacantho lenire oportet; & vbi vlcerum depastio consiterit, lacte gargariandum erit, reliqua autem medicamenta à Paulo requiras, præcitato cap. 26. lib. 4. & ab Aetio cap. 46. lib. 8.

Περὶ τῶν ἀνγινῶν. De angina.

CAP. XLVI.

NON procul à iam dictis partibus alterum morbi genus, si quod aliud quoque vitium acutissimum existit, vt Trallianus refert libro quarto cap. primo, pestiferum, atque acutum, vt Celsus inquit lib. 4. cap. 4. quod quidem à veteribus Medicis, vt pote ab Hippocrate *ἄνωδος* appellatur, vt 3. prognost. liquet: quanquam idem affectus 4. de ratione vict. siue Hippocratis sit, siue alterius auctores, *ἄνωδος* nominetur, *ἀπὸ τῶν ἀνωδῶν ἢ στυγερῶν*, hoc est, à suffocando dicta, à Latinis angina. Posteriores autem Græci vt Alexander, & Paulus, ac quidam reliqui ante eos, quorum Galenus meminit, licet non nominatim, quarto de locis affectis, & commento. aphor. 34. quarti libri, affectum hunc quadrifariam diuiserunt, prout quatuor diuersæ partes in eo affici possunt: nam internis gutturis musculis inflammationem patientibus *ἄνωδος*, externis verò *ἄνωδος* nuncupant, pari modo interioribus faucium musculis inflammatis *ἄνωδος*, externis verò *ἄνωδος* ab eisdem appellatur, vt idem Galenus testis est præcitatis locis, Paulus cap. 27. lib. 3. & Trallianus præcitato loc. Verum quoniam, vt Galenus inquit eodem quarto, de ratione victus in morbis acutis, ad curationem nominibus opus nobis non est: nam tum primum homines res ipsas neglexerunt, cum nimio studio nomina querere inciperent. Propterea ad rem ipsam deuenientes dicimus, anginam inflammationem esse musculorum gutturis, aut faucium: per anginam intelligentes omnes iam dictas inflammationes, tam ad guttur, quàm ad fauces peruenientes, per fauces internum oris locum, vbi simul gulæ, & gutturis partes extremæ conueniunt, per guttur verò eam asperam arteriæ partem, quæ est velut caput eius, musculos autem earundem partium voco, tam internos, quàm externos, omnium prædictarum partium indicia communia sunt, Celso, & Aetio testibus transglutiendi tum cibi, tum potus difficultas, ac spiritus, vt Celsus inquit, eis includitur: Iuxta Galeni verò sententiam in cunctis spiratio quoquomodo deterior redditur, nullo existente, vel in thorace, vel in pulmone vitio, qui in hoc, velut in reliquis, Hippocratem sectatur. Verum vna pars cum afficitur, ab altera discerni poterit, velut magis, & minùs transglutiendi difficultas, siue spirationis noxa fuerit, ac reliquis indicis, nam vbi interni musculi gutturis fuerint affecti, nihil coloris, caloris, & mollis conspicium erit, nec ceruice, nec in faucibus,

ex 16. Propria...

Angina... 18...

Angina... 18...

Si ex fauce...

At ex 16. *Propria si-
na cuiusli-
bet partis
affecta. 3.*
cibus, vt 3. prognost. testatur Hippocrat. adeoque
spirationis difficultas augetur, vt non nisi recta cer-
uice trahatur aer, sensus quoque angustiae, ac dolor
plurimus in gutture erit, & febris non leuis: vox in-
super simul cum spiratione laeditur, vt patet quarto
de Locis affectis. Externis vero duntaxat ipsius
gutturis musculis inflammationem patientibus,
praedicta omnia aderunt, remissae tamen: nam ne-
que angustiae sensus, neque dolor, licet circa guttur
adsint, adeo vehementes erunt, pariter nec spirandi
difficultas. At si dolor ferè praedictis similis adsit,
calorque, rubor, ac moles fauces offendant, quae om-
nia aperiendo os, ac linguam deorsum comprimendo,
oculis cerni possunt, nec admodum diffi-
culti spirant, fauces ipsas affectas esse iudicabis:
interdum etiam lingua ipsa similiter cum faucibus
cohaesit, quae admodum ubi non solum fauces, sed
cervicem quoque rubor occupauerit, & fortè pe-
ctus comprehenderit: nec vehementer aeri dolore
affligantur, nec ferè difficulter spirant, & extrinsecus
partes circa fauces inflammatae cuiuslibet appare-
bunt, exteriores earum partes affectas esse nemo ve-
rebitur. At quaecumque praedictarum partium affecta sit,
affectus ipse morbus erit in compositione primò, &
proprie in magnitudine, cum inflammatio sit quem-
tum ex iam dictis, tum etiam ex dicendis iudicis, fa-
cile percipere valebis: namque aeger nec cibum de-
uorare, nec portionem potest, difficulter spirat, po-
tissimum ubi gutturis partes afficiuntur, interdum o-
re conuiuet, quandoque eo aperto aerem trahit, fe-
brisque saepius aderit: accidit etiam eis potum as-
sumptum quandoque ad nares reflecti: dolore quo-
que afficiuntur, & excedente interdum inflamma-
tione, & lingua, & fauces in tumorem attolluntur.
Omnium autem praedictarum inflammationum
ortus ex fluxione est, eius praecipue, quae ex capite
desertur, quae admodum Galenus testatur quarto
de ratione victus in morbis acutis: & quamvis fluxio
hac magna ex parte biliosa sit, eodem Galeno
auctore tertio prognost. ita vt praecipue erysipe-
las, aut inflammationem erysipelati similiorem
committat: tamen eodem 4. de ratione victus in
morbis acutis, vt quarto de caus. pulsuum, tum ex
calida, ac rubea ac tenuis substantiae humoris fluxio-
ne, tum etiam ex frigida, pituitosa, crassa, ac glutinosa
provenire posse fatetur: quod nequaquam negare
visus est eodem 3. prognost. & commento a-
phor. 34. lib. 4. quinimo acres ipsas, ac tenues fluxio-
nes, propterea quod per angustiores venas faci-
le penetrant: tales autem sunt (vt ipse refert) quae
guttur a ambiunt, in ipsum potissimum decumbere
ait. Contrarium autem in crasis, frigidis, ac viscosis
contingit, quod cum non ingrediantur vniuersas
venas quae admodum strictae sunt, in capicoribus
detentae, veluti ex sunt venae, quae in faucibus exi-
stunt latiores, quam ex quae gutturis, in ipsis si qui-
dem impactae in praeter naturam tumorem eas at-
tollunt: ex quibus Galeni verbis liquido constat,
nedum anginas ex calidis succis, verum etiam frigi-
dis oriri posse, ac potissimum ubi fauces inflammatae
ex frigidis succis ortum habere; ubi verò guttu-
ris partes ex calidioribus, ac tenuioribus. Verum
quo pacto fluens redundans succus percipi valeat, aliis
quoque notis ostendere conabimur: namque
gutturis musculis inflammatis si ex sanguine copio-
so confluyente inflammatio exoritur, spirandi, ac
deglutiendi difficultas maxima erit, maxima quo-

que angustia, & grauatas coniuncta erit, ac febris non
exigua, corpusque totum, ac caput plenum sangui-
ne videbitur. Temperamentum, habitus, aetas,
anni tempus, regio, ac aeris constitutio, praecedens-
que victus ratio sanguinis redundantiam attesta-
buntur. Biliosa vero in praedictis musculis deflu-
xione decumbente, quae magna ex parte est, praeter
spirationis, & deglutitionis difficultatem, quae non a-
deo vehemens, vt in praedicta aderit, velut nec an-
gustia, citra ferè grauitatem plurimum dolorem, ac
intolerabile quoddam incendium circa guttur sen-
tient aegri, morsum, ac acrimoniam, situm, ac oris a-
maritudinem; simulque acuta febris aderit magis:
nec minus temperamentum, aetas, & habitus, pra-
cedensque victus ratio, ac reliqua redundantem bi-
lem manifestabunt. At si circa fauces praedictorum
humorum fluxio fiat, ex maiori mole, calore, diuer-
soque colore, praeter iam dicta, vna ab altera sece-
ni poterit: minor enim moles, maiorque calor. ac
rubor ad flauum inclinans in biliosa fluxione ade-
runt, velut maior moles, minorque calor, ruben-
sque color ad opacum inclinans, decumbentem san-
guinem indicabunt. Quod si mista fluxio fuerit ex
vtriusque, & permixta quoque iam dicta incidia e-
runt: & prout magis, & minus alter reliquum supe-
rat, vincent quoque vnius, vel alterius indicia. At
si frigidus, crassusque sanguis, ad praedictas confluat
partes, praesertim fauces, quas potissimum (vt dixi-
mus Galeni auctoritate) infestare solet, paucus ade-
rit dolor, tumor ferè citra ruborem, aut cum exi-
guo, & obscuro laxior quodammodo apparebit, li-
cet interdum crassiori existente humore durus con-
sistet, febris nulla aderit, aut fortè exigua, & lenta.
Corpus totum, ac praesertim caput pituitoso san-
guine refertum erit, ac proinde temperamentum,
aetas, habitus, tempus anni, praecedens victus ratio,
ac reliqua, id promptius indicabunt: cum omnia
frigidi sanguinis, ac pituitosi redundantiam atte-
stentur. Verum praeter iam dictas causas Hippo-
crates secundo de morbis vulgaribus, & Galenus
quarto de locis affectis, quos sectati sunt Paulus, &
Aëtius ex luxatis ad anteriores partes cervicis ver-
tebris anginam ipsam oriri posse fatentur. Vnde
causae apparet locus, & cum extra attingitur, dolore
afficitur, vt inquit Aëtius, atque haec species (vt ipse
refert) proprie *κρυζα* à veteribus est appellata. In
qua etiam lingua ex propriis locis excedit à luxata
vertebra iuxta radicem suam impulsam, infestatque
magis difficultas circa respirationem. Vnde co-
guntur aperto ore semper hiare, atque aerem attra-
here, & circa suffocationis periculum (vt Galenus
inquit quarto de locis affectis) laborantes diffi-
culti deglutiant, atque dolore afficiuntur, idque pra-
cipue cum potus eis per nares resilit: haec verò om-
nia, tum ex Hippocr. 2. de morb. vulg. tum ex Ga-
leno quarto de locis affectis, transcripsit Aëtius, &
hanc pro quarta anginae differentia conuenerat,
cum vnam tantum posuerit, circa fauces ortam, reli-
quam in internis gutturis musculis, alteram quo-
que ubi tam externi, quam interni gutturis muscoli
affecti fuerint: de qua etiam Galenus eodem 4. de
locis affect. quorundam auctoritate commemorat:
licet commento aphor. 34. lib. 4. vnam dixerit in-
ter quatuor anginae differentias ab aliquibus posi-
tas, esse eam in qua externi gutturis muscoli affecti
sunt, & non ubi gutturis partes, tum externae, tum
internae similiter affectae sunt, velut quarto de locis

*Si ex bile
signa.*

*Si ex frigi-
diori fiat
sanguine si-
gna.*

*1. de morbis
vulg. sect.
2. post me-
dium. 4. de
loc. affe.
Cap. 3.*

*Loco cita-
to.
2. de mor-
bis vulg.
sect. 2. post
medium.
ca. 3.*

cap. 3.

cap. 3.

Loco citato. affectis asseruit. Verum dicimus nos primò Aetium non defecisse in narrandis anginae differentiis cap. 47. lib. 8. nam prima differentia, quam posuit, ubi fauces fuerint inflammatae subintelligi potest, tam intus, quam extra: & sic *μαρτυρεῖ* non dereliquit. Secundò asserimus Galenum ex aliorum auctoritate, vnam anginae differentiam posuisse, ubi externi gutturis musculi fuerint affecti, aut externae gutturis partes, ut commento aphor. 34. lib. 4. patet: nec propterea dictis suis pugnare videtur. cum quarto de locis affectis faceret quartam differentiam esse, ubi gutturis partes tum externae, tum internae affectae sunt: nam exteriorum primò meminit, quae primò in eadem differentia afficiuntur: deinde si per consensum magna, siquidem fluxione existente, interiores quoque gutturis partes afficiuntur, non propterea non eadem erit differentia cum ea, in qua minori existente fluxione, externae duntaxat gutturis partes inflammationem patiuntur. Caterum eorum, qui anginam ex colli vertebrae in anteriorem partem luxatis fieri proferunt, propterea ultimo loco mentionem fecimus, tum quoniam rarò contingit affectio haec, cum etiam quod in ea (ut primò prorrheticorum testatur Galenus) gutturis musculi inflammatur: nonnunquam etiam ij, qui gulam gutturi iungunt. Quare etiam inflammatis quoque musculis oritur angina haec, & propterea anginam omnem non immeritò diximus esse inflammationem, quae in gutture, aut faucibus fit. Haec inquam cum acutissimus affectus sit, & statim mortem inducat, Tralliano auctore, necesse est etiam protinus ad eius curationem festinare. Inter eas verò grauissima est, ac celerrimè interimit, quaecunque nec in ceruice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit: haec enim & eadem de die, & secunda, & tertia, & quarta strangulat, ut inquit Hippocrates tertio prognost. nam cum in neutro praedictorum appareat aliquid praeternaturam existimandum est intra gutturis corpora lacessere inflammationem, ex qua strangulantur, ut Galenus testatur, in praedicti textus Hippocratis expositione, de qua iterum aphor. 34. quarti libri, sic scriptum reliquit. Si febrem habenti suffocatio repente superuenerit, nullo tumore in faucibus existente, letale. At quaecunque dolorem similem praedictae anginae infert, attollitur verò, ac roborem in faucibus efficit, admodum quoque exitiosa est, sed paulò longior quam praedicta. Quibus verò fauces rubent, & ceruix, haec diuturnior est, eodem Hippocrate auctore: maxime verò ex ea seruantur, si ceruix, ac pectus ruborem traxerit, neque ad interna reuertatur erysipelas, gutture siquidem nequaquam patiente, sed aut in ceruicem, aut in haec utraque decumbente. Securiissima verò inflammatio erit, si rubor quam maxime foras vertatur, id quod aphor. 37. libri sexti comprobauit, cum dixit, ab angina habita, si tumor fiat in collo bonum; & aphor. 49. libri septimi asserens. Ab angina habita, tumor, & rubor in pectore superueniens bonum, extra enim vertitur morbus. Si autem in pulmonem conuersio fiat, dementiam parit, fiuntque ex ea magna ex parte purulenti, ut eodem tertio prognost. liquet, de qua idem Hippocrates aphorismo 10. quinti libri sic scriptum reliquit. Quicumque ab angina liberantur, iis ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt, si verò hos effugerint, suppurantur. At quae ad cutem transmutantur, aut à principio ita deferuntur flu-

xiones, quod iis, quae in profundum decubuerunt, multo salubriores existant, constat omnibus, ut quarto de ratione victus inquit Galenus, Paulus verò inquit, pueris rarò talem affectum oboriri, nisi cum ceruicis vertebrae affecta loco excidunt; id quod Hippocrates innuit aphor. 23. libri tertij. Verum illis (eodem Paulo teste) eui curationem non recipientibus, ac deploratis manum amoliri non oportet. Iuuenibus autem ferè accidit affectus hic, Aetio teste. Et propterea (Archigenis auctoritate) in principio tanquam compendiarium, & princeps auxilium omnis angina (ut ipse inquit) venae sectionem requirit. Quia de re optima victus ratione instituta, ferè velut in reliquis inflammationibus, nisi quod paricori tum cibo, tum potu in hac videntur: namque copiosiore periclitatur, ut Alexander testis est; sintque humidi, molles, ac liquidi: quò fit, ut primum omnium idem Alexander, ac Paulus multam aquosam exhibendam approbent, eaque tribus diebus utendum, à tertio die cremorè ptisanæ offerendū cōmendant cum dulci quadam potionem, ut inquit Paulus. Vice autem aquae multae hoc tempore uti poterimus aqua hordei per se, aut cum saccharo, & deinde ptisanæ cremore: moderatiore autem facta inflammatione, per liquida ouorum lutea tribuunt, non multa tamen, loco quorum (ubi vires exigant) ptisana cum iure pulli confecta vitior, aut optimo pane in tenues partes redacto, ac eodem pulli, seu gallinae iure decocto vtaris, vel eo gallinarum, seu pulorum cōtutorum iure, quod vulgus consummatum brodium appellat, & in summa, cibi ægri viribus respondant ex Pauli decreto. Protinus ergo angina infestatis (ex Alexandri, Pauli, & Aetij sententia) venae sectione adhibere necesse est, siquid eam fieri non prohibeat, verum sanguis non vniuersum, sed pluribus interpositis vicibus euacuandus erit, quare etiam tertio, & quarto (ut Alexander asserit) ipsum detrahendum oportet. Nam particulares euacuationes causam potius ex ipsis locis affectis elidunt: cum lata autem vniuersumque facta euacuatio, animi defectionem excitat, suffocationisque periculum propterea eis superuenit, dum materia tota in affectam partem collectim prorumpit, aut per facile à faucibus, aut gutture ad pulmonem deferretur, & inuitabile periculum infert. Vnam verò cubiti incidere (ut praedictis visum est) mediam, ubi corpus totum plethoricum est, aut humeralem è directo, ubi non fit, ut mihi videtur, vel primò mediā, deinde humeralem incidas; pluribus etiam vicibus, si opus fuerit, neque tamen angustiores facere venae incisionem conuenit, ut Aetius asserit, ne sanguis velut pereoletur, & crassior eius pars intus remaneat, potissimum ubi crassior sanguis huius affectionis causa existit. Confert autem in hac affectione corpus totum vacuare, ac excrementis ipsum vacare, geminam ob causam ut Galenus inquit quarto de ratione victus in morbis acutis, nempe tum ob eam, quae à vacuatione est, reuulsionem, tum quod vacuato corpore, cum à parte affecta, quod influit, expellimus, id facilius consentis, nihilque si calido aliquo vaporare volueris à corpore ipso parti calfacta mittetur. Corpus igitur totum praecitato loco Galenus vena secta vacuare iussit, & purgatione, & clysteribus. In mulieribus (ex Tralliani decreto) ubi detentis mensibus in hanc affectionem incidunt, tali, seu malleoli vena incidenda est, moderatèque sanguis (ut diximus) educendus

cendus: nanque ex hac venę sectione duplex eis cō-
 modum subsequi solet, nempe consuetarum vacua-
 tionum reditus & affectus liberatio. Idem etiam in
 viris tentandum, si ipsos sanguinem per venas, in a-
 no extantes, vacuare solitos, diceris. Quod si hac
 parum proficiant, eas quoque venas incidere con-
 uenit quę sub lingua sunt, neque multum differen-
 dum, sed eodem die id facito, ut, inquit Alexander,
 aut saltem sequenti: id quod etiam quarto de ratio-
 ne victus scriptum reperitur, ubi habet, Sanguinem
 ergo ex brachiis detrahes, mox venas, quę sub lin-
 gua sunt, secabis. Galenus verò de eis, eodem lo-
 co sic asserbat: Venę quę sub lingua sunt, eam,
 quę faucibus est, phlegmonem sine medicamentis
 vacuant; & libro de curadi ratione per venę subie-
 ctionem; talia protulit verba, Quocirca in gutture,
 & arteria graui torquentur inflammatione, in prin-
 cipio quidem, aperta in in cubito vena, post prin-
 cipium autem in ipsa lingua, magnificè prodest, inci-
 lis videlicet venis, quę in ea sunt, ambabus. Post
 venę sectionem potissimum ubi alij humores re-
 dundant, secundum erit (Celsi auctore) ducere
 aluum id quod etiam præcipit Galenus prædicto
 libro quarto de ratione victus in morbis acutis,
 cum dixit, corpus igitur totum vena secta, vacuare
 oportet, & purgatione, & clysteribus: primum nā-
 que venam secare iussit, tanquam maximè neces-
 sarium, & deinde etiam purgatione, & clysteribus vi-
 tendum, nam reucllitur per huiusmodi euacuatio-
 nem ab affectis quoque partibus. Verum ante eos
 Hippocra. libro de locis in homine, illud idem de-
 cretum reliquit, dum dixit, sit affectis (loquens de
 angina) à venis, quę in brachiis sunt sanguinem de-
 trahes, & simul aluum infernè subduces, quo id,
 quod morbum exhibet, detrahatur: ea de re et si dif-
 ficulter deglutire valeat, post venę sectionem pur-
 gas me dicamentum tribuendum erit, liniendo ta-
 men vacuas, velut est casia fistula, manna, syrupus
 ex pluribus infusionibus rosarum, vel violarum, vel
 ipsiusmet saccharum violaceum. Ex si ex crasis
 fucis fluxio facta sit, antidotum diacatholicon, aut
 agarici decoctum prædictis addas: confert nanque
 purgatio, ut Galenus inquit sexto de compositione
 medicamentorum secundum locos, gratia euacuā-
 di vniuersum corpus, & transferendi infra humo-
 rum momentum, qui ad affectas partes feruntur:
 conuenit etiam & clysteribus uti, interdum etiam
 actionibus, potissimum ubi aliquid venę sectionem,
 & purgationem prohibeat, aut eis exhibitis, adhuc
 malum non cedat: nec minùs reuulsionis gratia
 conferunt extremarum partium frictiones, aut vin-
 cula, similiter si pedes aqua calida foueantur, ut in-
 quit Paulus. Cucurbitula item scapulis hac ratio-
 ne affigenda, citra sacificationem: & ubi malum
 longius prorogetur, post prædictas euacuationes,
 cum iam materia influere desierit, cucurbitam cum
 scarificatione apponere oportet sub mento, si tu-
 mor circa fauces, & maxillas persistet. Si verò nul-
 lus extrinsecus tumor appareat, veluti in ea angina,
 quę occulta appellatur, in qua gutturis partes præ-
 fertim internę afficiuntur, circa ceruicem cucurbi-
 tula ad mouenda erit iuxta primam, aut secundam
 vertebram, vel hirudines applicandę. Quod verò
 ad localia medicamenta attinet, in vniuersum id sci-
 re oportet, quod neque reprimentia, seu adstringē-
 tia sola, neque discutientia prædictis affectibus cō-
 ferunt, licet temporum ratione habita, aliās repel-

lentia, aliās discutientia potius miscenda sunt, ceu
 in morbi initio repellentia potius, in statu potiore
 ex parte discutientia, in declinatione verò, ea quę
 valentius discutiant adhibere oportet, Alexandro
 teste: nanque nonnulli, qui admodum astringenti-
 bus duntaxat, aut discutientibus anginam curare
 tentarunt, in grauiora pericula ægros duxerunt, vel
 suffocationem acutissimam inducentes, vel inflam-
 mationem augentes. Hoc idem asserbat Gale-
 nus sexto de compositione medicamentorum se-
 cundum locos, cum de gurgulionis inflammatione
 loquebatur. Paruę etenim sunt (ut ipse inquit) &
 affectionis nomine vix dignatę à medicis, quę cō-
 festim sedantur; quò fit, ut rarò inueniantur, quę
 vno duntaxat medicamentorum genere indigeant,
 siue repulsorium, siue diffusorium fuerit: facultati
 quoque auxillorum aduertere oportet; etenim im-
 becilliora, mollioręque medicamenta imbecillio-
 ribus, & mollioribus corporibus accommodanda
 sunt, nempe pueris, mulieribus, & eunuchis, ac ho-
 rum similibus: valentiora autem durioribus, & for-
 tioribus corporibus: semper enim quod adhibetur
 remedium, contrarium quidem superanti affectui
 esse debet, familiare autem, & amicum agrotantis
 habitui, ut idem Trallianus refert. Itaque ubi ini-
 tium sit cum multa inflammatione, ea, quę leniter
 adstringunt, offerenda sunt primum, Actio teste;
 velut est rosarum, lentium, maxarum, palmarumque
 decoctum, aut flos rosarum ex hydromelite, seu
 rhus cum hydromelite decoctus: iis nanque per i-
 nitia gargarizandum erit, vel (ut inquit Paulus) gar-
 garismi hiant ex eo medicamento simplici, quod ex
 moris est, cum rhus decocto, aut potius vtaris eo
 medicamento, quod ex syluestribus moris confici-
 tur: deinde eodem medicamento composito, quod
 mora recipit, vel eo, quod ex nucibus: quod medi-
 camentum fatetur Galenus ex succo nucum viri-
 dium præparasse, nullo doctore vsus, cum ex Ale-
 xandria in patriam rediret, idque experientia com-
 probasse in quodā hortulano, ab vna, paristhmiis,
 & antiadibus ferè suffocato quo medicamento gar-
 garizare iussit hortulanum: & quoniam valde tenuis
 succus apparebat, præcoxit ipsum, & mel com-
 menfuratè admiscuit: atque ubi ad mellis compa-
 gem redactum esset, hortulano vtendum reliquit: &
 cum celerrimam videret vtilitatem ipsi inde obo-
 riri, præstabile ratus fuit in multis experiri, & ex eo
 sufficiente experimento accepto, semper ipso vsus
 fuit, & eo magis optimum iudicauit quod etiam
 coctum cum melle cum gustasset, nihil insuauē ha-
 beret: & propterea, testatur eius vim se exper-
 tum esse multum aliorum stomaticorum faculta-
 tem excedentem. Sunt autem ea, ut idemmet tex-
 tis est Galenus sexto de compositione medic. se-
 cundum locos, id quod ex moris constat, & id quod
 ex succo rubi mororum preparatur; & tertiū quod
 ex musto, & quartum quod ex puniceorum succo, &
 quintum id, quod per adstringentia mala compo-
 nitur: quę omnia propriè quidem stomatica ap-
 pellantur, quoniam ad vvas, paristhmia, ac omnes
 quę in ore fiunt repente inflammationes conue-
 niunt. Atqui ex iam dictis vtiliter gargarismi, qui-
 bus quotidie vtor, componi possunt: Mirum enim
 (inquit Galenus præcitato loco) quàm mixtura i-
 psorum vtiliores sepe fiant ipso simplici vsu, ut si
 vnc. ij. medicamenti ex moris, & tantundem me-
 dicamenti ex succo nucum excipias, & cum aqua

Galenus hanc
historiam.

Cap. I.

6 de compo-
sitione medic. sec.
inquit Galenus præcitato loco
vnc. ij. medicamenti ex moris, & tantundem me-
dicamenti ex succo nucum excipias, & cum aqua

hordei libra vna, & aquæ rosarum vnc. iij. ac aceti albi vnc. j. permisceas, quo medicamento gargari-
zare iubeas: vel aquæ hordei libr. ij. recipe, in qua
rhus drach. iij. decoquantur, ac addas myrtinæ a-
quæ lib. s. medicamenti ex moris rubi, aut ex moris
vnc. iij. medicamenti ex nucibus, aut ex malis puni-
cis vnc. iij. aceti albi vnc. ij. hoc etiam tempore in
rotulis medicamentum paratur, quod assidue te-
neatur in ore, ac sensim deglutatur. Accipit autem
diacodij. drac. ij. pulueris hirū dinis preparatę scrup.
j. seminum coriandorum preparatorum drach. j.
facchari dissoluti in aqua rosarum, quātum satis sit.
Procedente verò tempore (potissimum vbi frigida
fuerit fluxio) addere poteris scrup. j. vel ij. antidoti
diamoschu dulcis, aut pliris archotici: quo etiam
tempore sæpius, paulatim tamen, ac sensim ex syru-
po rosaceo, violaceo, iuiubino, de cannis, ac reli-
quis similibus exhibere poterimus, iubentes, vt
quā diutissimè in ore teneant, ac paulatim eum
defluere permittant. Morbo verò crescente, vi-
gente, ac consistente, iis magis vtendū medicamē-
tis, quibus discutiendi facultas inest, velut est cari-
carum, aut fursurum, seu glycyrrhizæ in aqua mulla
decoctum, aut hyssopum, thymum, calamintha, seu
pulegium, similiter in aqua mulla decocta, vel hor-
dei, Recipe manip. s. vuarū passerarum vnc. j. palmula-
rum, & caricarum, ac myxarum ana numero quin-
que, glycyrrhizæ drach. iij. hyssopi drac. iij. coquā-
tur secundum artem in lib. ij. fontanæ aquæ, donec
medietas absumatur: cui decocto percolato, adii-
ciantur mellis rosacei vnc. ij. medicamenti ex moris
vnc. j. & aceti albi parum, vel vice mellis rosacei &
aceti, oxymelitis simplicis vnc. j. & s. vel vnc. ij. com-
miscias, & fiat gargarismus: prædicto etiam deco-
cto adiacere poris thymum, pulegium, calamintha,
origanum, fœnugræcum, aut mentham odora-
tam, quam hedyosmon vocant, potissimum vbi ex
frigidis ac crasis succis orta fuerit inflammatio: ij
nanque succi acrioribus indigent medicamentis,
quæ scilicet secare, & in tenuia diuidere, & tum glu-
tinosa, tum crassa confringere possint, auctore Ga-
leno quarto de ratione victus in morbis acutis: pro-
pterea & eodem tempore, medicamentis, quæ ad
exteriorem superficiem reuellere possunt, ac attra-
ctoria facultate polleant, ab extra vtendum erit;
quæ etiam tum concoquere, tum discutere valeant:
ad mouere igitur spongas oportet, quæ in calidum
oleum demittantur, vt Celsus inquit. Nec minùs
conferent, si oleum fuerit chamæmelinum, aut a-
nethinum, seu liliaceum, aut irinum, si materia fue-
rit frigidior, aut ex casia fistula & oleo amygdali-
no, seu aliquo prædictorum cataplasma fiat, seu se-
minis althææ, maluarum, & lini cremorem assu-
mas, & cum fœnigræci, ac hordei farina, decocto q;
chamæmeli, melilori, & caricarum, cataplasma for-
metur, atque applicetur. Inūgitur quoque haud iau-
tiliter locus ex oleo chamæmelino, anethino, seu
amygdalino cum butyro, atque anseris pinguedine:
& si libeat æsypum, aut dialthæam immisceas, vel
eisdem per se vtare: optimum quoque cataplasma
erit ab Alexandro scriptum: constat nempe ex hor-
deacea farina, semine lini, palmulis ex aqua coctis,
item croco, & mica panis simul in coctis, & (si vide-
bitur) adiacere poteris ficus siccas. Placuit tandem
quæ à tota ferè substantia conferunt in fine con-
scribere, quorum vnum à Galeno, mullæ auctoritate
sexta de compositione medicamentorum secun-

Com. 30
Topica.

Que à tota
substantia co-
ferant.

dum locos, & libro decimo de simplicium medica-
mentorum facultate conscribitur: excipit autem
caninum sterchus album, quod quidem efficitur, v-
bi sola ossa cani edēda duobus continuè diebus ex-
hibeas, minimeque scetens prouenit, hoc igitur ac-
cipito, & resiccato, tritumque cribrato, & vltus tem-
pore melle diluito, atque tunc vt deuoretur illinito
quā penitissimè vt transglutire possint, aut alicui
alio medicamento admisceas, quod huic affectui
congruat, velut est medicamentum ex moris, seu de-
nucibus, seu mel rosaceum: hoc enim pharmacos,
inquit Galenus, fortius nullam nouimus neque in
angina, neque in magnis paristhmiis, aut his quibus
ex glandulis suffocationis periculū imminet. Præ-
stantissimum quoque remedium est (Paulo aucto-
re atque similiter efficac) hirundinum vstarum ci-
nis: quamuis ante eum Galenus ii. de simplicium
medicamentorum facultate ipsum cum melle com-
mendasset: pariter (vt testatur Aetius) cochlearum
in hortis repertarum citra testas, aut cancorum v-
starum cinis cum melle confert. Si quis autem pul-
lum hirundinis comederit (inquit Celsus) angina to-
to anno non periclitabitur; seruaturque eum ex
sale (cū is morbus vrget) comburi, carbō nemque
eius contritum in aquam mullam, quæ potui datū,
infricari, & prodesse, quod medicamentum, quam-
uis idoneos auctores ex populo habeat (vt ipse re-
fert) tamen cū neque habere quicquam periculi
possit inferendum suo operi credidit, et si in monu-
mentis medicorum non legerit, quamuis ego le-
gerim apud Galenum sexto de compositione me-
dicamentorum secundum locos, quo loco Archi-
genus medicamenta ad gurguliones inflammatos
meminit: quinetiam si compluribus linis, & maxi-
mè marinæ purpuræ, collo vipere iniectis, illis vi-
peram præfoces, eaque postea cuiuspiam collo ob-
uincias, mirificè profuerit tum paristhmiis, tum
omnibus iis, quæ in collo expullulant, Galeno au-
ctore sexto de simplicium medicamentorum facul-
tate. Vbi verò in abcessum angina vergat, iuuanda natu-
ra erit cum his quæ precedenti capite diximus, sic
quoque confecto pure cum his, quæ disruptionem
proritant, ac eo disrupto cum his, quæ detergendi
vim habent, quæ omnia ibi conscriptas reperias.

Πείρ. Βρυχ.

De tussis.

CAP. XLVII.

IN genere deprauatorum motuum
tussis ipsa, quem Græci βήχας appel-
lant, continetur, ex 2. de caus. sympt.
testatur Galenus. At cū deprauatus
motus in triplici sint differentia, eo-
dem auctore, in quorum numero ea reponenda sit
inuestigabis: nam alij naturæ quidem sunt opera,
sed vi coactæ à quapiam morbosa causa. Alij verò à
morbo simul & natura afficiuntur: reliqui morbo-
sos duntaxat comitantur affectus, natura ad eorum
generationem suppetias minimè ferente. Intelli-
git autem per naturam omnem facultatem, quæ a-
nimal regit, siue illa à volūtatis nostræ imperio pē-
deat, siue secus: quapropter in prædictis verbis to-
tum hoc facultatem genus, cuius beneficio seruatur
animal, ex aduerso opponit omni causæ præterna-
turali, quæ ipsum lædere, vel corrumpere possit.
Prædictæ itaque facultatis opera sunt, sternutamē-
tum, singultus, ac tussis, vt ipse inquit, solius autem
morbi palpitatio, & cōuulsio, sicut amborū, morbi
inquam

inquam ac facultatis coeuntium simul, sunt omnes motus torpidi, ac tremor. Tulsis igitur à Galeno (vt liquet) in numero eorum motuum deprauatorum connumerantur, vt ex iam dictis constat, qui opera quidem facultatis sunt coacta, violenter mouere à morbosa quapiam causa: propterea in numero symptomatum (vt dicemus) & non naturalium operationum merito esse censetur. Nam, quandiu animal naturæ legibus gubernatur, nullus motus facultatum eius symptoma existit, sed tunc duntaxat, cum ab aliqua causa præternaturali ad exercendas functiones, quauis earum fuerit irritata, quod fit, vt cum consistat in corpore aliquid à natura alienum, iniurgatq; ad ipsum deiiciendum facultas aliqua expultrix, aliquando insensibiles omnino earum motus sunt, aliquando sensibiles euadunt. Verum cum prædicti deprauati motus non vni tantum corporis nostri particulæ adscribantur, sed diuersis, prout eorum causæ in diuersis quoque partibus consistunt, propterea tulsim ipsam instrumentorum spiritus deprauatum motum esse, eumque nō insensibilem, sed sensibilem idem Galenus præcitato loco dederetum reliquit: appello autem nunc spiritus instrumenta, pulmonem, asperam arteriā, ac thoracem, vt necesse sit aliquam, vel plures dictarum partium in tulsis affectas esse: interim autem & fauces, vt quibusdam tulsibus patebit: quamquam igitur harum partium motus sit tulsis, nunquam tamen ad eum excitandum mouebitur animal, nisi à quopiam, quod præter naturam sit, spiritus partes irritare fuerit impulsus, vt verò dilucidius percipitur quænam pars determinatè in tulsis afficiatur, operæpretium erit ipsius tulsis genera, seu differentias enarrare: ex his nanque nedum quæ pars afficiatur, verum & qui præter naturam affectus tulsis sint, ac insuper modus generationis earum, patebit. Quod autem duo sint prima tulsium genera, ex Galeni sententiā liquet, libro secundo de causis symptomatum, quorū vnum vehementem spiritus ad exteriora motionē nominat, illudq; non immeritò, nanque cum non possit pulmo tam vehementi motu concitari, vt id quod molestū ei est, exploderet, naturā magna quadā solertia aliud remediū sibi adinuenit: quippè cum externus aer in asperā arteriam trahatur, quæ & cartilaginea, & dura est, nec contrahi propterea possit circa id, quod in ipsis continetur, incitatum hunc cogitauit spiritus exitum, vehementer siquidem ipsum ad exteriora mouendo: qui motus per eadem sit instrumenta, per quæ magnæ, & vehementes spiritus expulsionones fiunt, quas efflationes nominamus, ita vt tulsis hæc nihil aliud sit (eodem Galeno auctore, præcitato loco) quam vehementissima efflatio, quæ plurimus spiritus celerrimè foras erumpens impetu suo extrahit, exploditque excrementa meatus ipsius obstruentia: adeo vt si prima efflatio nō possit ea quæ molesta sunt, excutere, non grauetur, & iterum, & tertio in ipsa irruere. Efficiunt itaque hanc tulsim musculi efflationem operante, intercostales maxime, quamuis ipsa naturale quoddam symptoma sit, vt eodem secundo de causis symptomatum, & quinto de locis affectis liquet, vt autem ipsum excitaretur, opus fuit vehementi admodum thoracem ipsum omni ex parte cōprimi quo robustius, id quod in viis spiritus continetur, expellatur: motionis itaque initium ex facultate mouente thoracem in tulsientibus est, violenta verò contractio eius facit, vt spiritus feratur foras

vehementer, huius autem vehementia refert secum materiam conditam in fistulis pulmonis, quæ quidem asperæ arteriæ sunt, Galeno auctore 2. prognostic. cum itaque hoc modo id genus tulsium gignatur, haudquaquam hæsitandum erit asserere symptoma esse cum à causa præternaturali irritata natura ad hunc motum proritetur) functionum, non siquidem naturalium, expultrix videlicet, velut nausea, & vomitus, sed facultatis motricis voluntariæ: neque enim facultas expultrix, quæ ex naturalium numero vna est, hunc motum efficere potest: & proinde Galenus facultatis, quæ à voluntatis imperio pendet, symptoma esse fatetur eodem 2. libro de causis symptomatum. quo motu perpetuò natura conatur, quicquid spiritum interceperit, relicere, siue humor fuerit à capite defluens, vt in destillationibus, siue aliquid collectū in asperis arteriis, vt in peripneumonia, & pleuritide quare secatur hoc symptoma morbum in via, quia obstructionem viarū spiritus: dignoscique facile potest tulsis hæc, quoniam non exigua, sed valida erit, vehemens, ac violenta, nec supprimi, seu prohiberi potest omnino ne eueniat: vehementerque in ea thorax cōprimatur, vt multam, eandemque cōfertam efflationē excitet, etenim sine vehemēti thoracis contractione seu contractione, vehementer tulsire nemo potest: vt liquet 4. de locis affect. inter tulsendum semper aliquid expuunt, nisi valde aquosa, aut lenta sint essentia, ea quæ spiritus vias obstruunt. Cæterum veluti vomitiones nausæ præcedere solent, ita tulsim, quod Græcè *κατὰ*, dicitur: est autem id non tulsis, sed exiguus quidam ad tulsendum impetus. Præterea sicuti nonnulli nauſearunt, nec tamē vomuerūt, ita nonnullis symptoma modò dictum incidit, nec tamen tulsis propter causæ paruitatem est secuta, quippe interim ex parua faucium aspredine, interim verò ex tenui aliquo, exiguoque prorsus humore contingit. in prædicta itaque tulsis perpetuò viæ spiritus afficiuntur. At si spiritus interceptio, ab humore à capite defluente fiat, aspera ipsa arteria affecta erit: cuius autem naturæ fuerit humor, vias spiritus obstruens, ex qualitate præcedentis destillationis percipere poteris, idque studiosi petant ca. de catharro, simul atque ex substantia, & diuersa qualitate eius, quod per tulsim propellitur, inuestigandum erit. ad portionem autem eorum, quæ à capite defluunt respondent ea quæ inter bibendum, aut edendum in guttur, ac asperas arterias delabuntur, patebit autem id ex eius, qui taliter affectus est, aut instantiū relatione, præter verò hæc contingit interdum quod in asperis arteriis, ac thoracis cauitate excrementum aliquod collectum sit & proinde vehemens tulsis exciteatur; quemadmodum in pleuritide, thoracis vomica, peripneumonia, ac tabe euenit: quæ omnia interstingui possunt ex propriis indicibus prædictarum affectionum: quæ verò cum titillatione partium ab vtraque palati partē contingunt tulsis, palam ostendunt (vt inquit Aetius cap. 34. libri octauī) defluxum à capite ad asperam arteriam deferri, atque ad pulmonem, quas tulsis malignas, & contumaces appellabat Paulus capit. 28. tertij libri. Est super (eodem Galeno auctore prædicto loco) ex instrumentorum respirationi seruientium interperie ortum aliud tulsis genus, in qua nihil inter tulsendum ita affectu expuunt, neque violenta tulsis est, neque coacta, sed adeo exigua, vt

& supprimi, & ne eueniat prohiberi possit, idque vel in totum, vel magna ex parte: itemque spiritus cohibitioni non modo ea fieri prohibetur, sed etiā ea sanatur, modo admodum magna non sit, ut idem Galenus testatur: augetur nanque (ut ipse inquit) spiritus cohibitione in instrumentis spiritalibus calor, permeatque spiritus violenter à pectore pressus, ac compellitur per omnes angustos meatus: quibus vtrisque peractis æquantur omnia, atque ad temperamenti æqualitatem veniunt, potissimum si refrigeratis respirationis instrumentis orta sit. Verum quis affectus, præter naturam sit tussis hæc, ac quæ ratione fiat, quæ partes in ea afficiatur, ac à quibus causis oriri possit, patebit, eo prius dilucidato, cur videlicet per inequales intemperaturas instrumentorum spiritus, tussis excitetur: nanque ex æquali intemperie cum ea omnino sine dolore sit, haudquaquam gigni potest. Est nanque ea veluti acquisite natura quædam, ut Gale. inquit. Verum cum inæqualis oritur intemperies in quapiam parte sentiendi prædita, quanta fuerit intemperantiæ magnitudo, tanta erit molestia, quantoque eius causa, cum mordax sit, non quiescat, sed moueatur, & citius moueatur, tanto quiescente, ac ea quæ tardè mouetur, & minimè mordax est, molestior existit, ac citius sentitur, quo fit ut irritatæ partes ad expellendum id quod contristat, festinent, sese contrahentes, ac constringentes, velut in rigoribus, atque horroribus esse videre, in quibus vniuersæ partes simul ad expellendum mouentur, atque eo tempore totum corpus concussione, quassationeque vexatur, talis etiā motus & thoracis musculis per inæquales intemperies deprehenditur: eamque ob rem tussis quædam leuis ei non ab similibus affectui, quem Græci *νευρῶν* vocant, iis superuenit, concutuntur enim musculi, dum student ea quæ contristant à carne sua (ut inquit Galenus) per pulmones, & arterias expellere. In cæteris autem tussibus vehemèter eos pulmone se iniicere, est monstratum, quo multam, eandemque confertam afflictionem excitent, hæc itaque tussis, quæ ex spiritalium instrumentorum intemperie incidit, ex eodem est cum concutientibus rigoribus, horroribusque genere, eodem Galeno teste, præcitato secundo libro de causis symptomatum, differt autem, eo quod celerior eius sit sensus: nam respirationis instrumenta nunquam quiescunt. Ex his itaque constat respirationis quoque organa in hac tussi affecta esse, præsertim thoracis musculos, iuxta Galeni sententiam, eamque symptoma esse functionum non animalium, ut vehementissima tussis, sed naturalium, atque inter eas, ipsius excreticis: nanque ut expellant ea, quæ ipsis molesta sunt, concutuntur musculi, ac tussim excitant, & non vehementer pulmonibus incumbunt, quo multum simul, & celerem efflatum moueant, totusque ferè motus hic, velut de rigore testatur Galenus, ad naturalem facultatem referendus est: & si quodammodo causa præter naturam irritans concurrat ipsa cogens, ut violenter moueatur. Talis igitur quoque est eiusdem generationis modus ut diximus, ad inæqualemque intemperiem sequitur ipsorum organorum spiritus, & non ad viarum obstructionem, ut aliud tussis genus, nec aliis indiget signis pro eius cognitione, quam eis, quæ supra narrauimus: siquidem in ea nihil expuitur, nec est omnino valida, ac violenta, sed adeo praua, ac sine vi, ut eam cohiberi, & generationem eius vel plu-

rimum, vel omnino prohiberi liceat ut retulimus, Cuius quidem tussis causa, licet 2. de caus. symptom. refrigeratio instrumentorum respirationis à Galeno dicatur esse, ab eodem tamen libr. 6. de morbis vulgar. ab aliis quoque eorundem instrumentorum intemperatiis fieri posse non negatur: nanque cum non de malignis tussibus, quas Hippocrates aridas, ac parum, seu leuiter irritantes, cum eodem 6. de morb. vulg. eum aphor. 54. quarti libri appellat, sermonem faceret, eas aut ob faucium, arteriarum asperitatem, aut instrumentorum spirabilium intemperiem oriri asserit; quàm intemperiem interim frigidam esse testatur utpote in aquilonis constitutionibus, in quibus Hippocrates aphor. 5. libr. 3. tussis, ac fauces excitari assererat, non propter aliud (ut Galenus fatetur commento eiusdem aphor.) nisi propter instrumentorum respirationi obseruientium intemperiem, & propter faucium asperitatem: aer nanque admodum frigidus inspiratus, interdum faucium, asperarumque arteriarum locos exasperat, atque refrigerat, nonnunquam & toti pulmone, pectorique intemperiem affert: sæpius verò & ambo hæc contingunt: quapropter ex his arida, modicæque tussicula vexantur: quod autem ita sit, signum est (ut inquit Galenus eodem 6. de morbis vulg.) ipsos, cum spiritum attrahunt, ad tussim prouocari potissimum cum multis subito aer ipsi loquentibus, & oscitantibus, ac ore spiritum ductibus intrauerit, sed cum per nares attrahunt, ac aerem extrinsecum quispiam in ædibus ipsorum calefecerit, tunc autem omnino parum, aut nequaquam tussium. Quocirca & ob nares quidam panniculum ponentes ita inspirant, exacerbari tussim experti: cum aer externus frigidus multis subito membris prius refrigeratis, atque exasperatis, obuius fiat: nec minùs ob vehementem æstum, immodicamque ariditatem à circumfuso aëre generatur tussis hæc, eodem Galeno auctore, intemperatis siquidem instrumentis spiritus, ac iam dictis partibus exasperatis, id quod sæpenumero in febribus accidit, ut Paulus testatur: qui etiam Galenum sectatus, ex ambabus intemperantiis tussim hanc excitari posse fatetur: in hac verò tussi aerem frigidum respirare desiderant, eoque iuuantur, faciesque rubicunda apparet, ac siti molestantur ægri: Trallianus verò nedum ex iam dictis duabus, verum etiam ex reliquis intemperiebus tussim hanc excitari posse testatur, sicca videlicet, & humida. At nos Galenum, & veritatem sectati, ab humida intemperie nuda tussim oriri posse nequaquam admittimus, neque enim mordax est, adeo ut modum huc excitare possit, ac inæqualem intemperiem efficere: à sicca tamen oriri posse non negamus: quanquam citra caliditatem, aut frigiditatem omnino id fieri, ac cogitari fortè minimè possis. Non ab re igitur ex calida, frigidave intemperie, interim solis existentibus, interdum verò cum siccitate permixtis, exiguum hunc tussiculâ proritari diximus: quomodo autem hæc interstinguendæ sint, ex his quæ cap. de catarrho conscripsimus, studiosi petant, hæc iterum tussis arida, ac leuiter irritans, in qua nihil expuitur, ex puluere, fumo, alimentis, potionibusque exasperantibus interim generatur, quandoque (ut testatur Aetius) ex lumbicis stomachum infestantibus, & acri humore ipsum perturbante, similiter & in his, qui stomachi motum sentiunt, euenit: nec minùs & iocinore, ac liene, seu aliis quibusdā partibus primò affectis, arida tussis

Modus generationis eius.

cap. 4.
Quæ partes in ea afficiantur.
Quis affectus præter naturam sit.

Quem insequatur morbum.
Signa eiusdem.

ses quandoque proueniunt. Dignosces autem eas ex propriis indicis prædictarum partium primò affectarum. Galenus verò commento aphorif. 34. libri quarti, trifariam oriri posse testatur tussim aridam leuiter irritantem, nempe aut ab intemperie instrumentorum, quæ obseruiunt respirationi, aut ex faucium aspredine, vel aliquo tenui, & paucò humore destillante. At si propterea quod crassi, lètiq; succi firmiter infixi bronchiis sint, vel quod humor qui à capite ad asperas arterias defluit, non aliter atque aqua sit tenuis, arida tussis fiat, non amplius exigua, ac leuis ea erit, inò valida, ac vehementissima, quæ admodum quarto de locis affectis, secundo prognosticorum, primo de morbis vulgaribus, ac secundo de causis symptomatum, & reliquis plerisque locis decretum reliquit Galenus. Si quis autem velit omnès enumeratas iam tussis in duas redigere differetias humidas videlicet, & ficas non aberrabit Celsum imitatus, qui de tussi sic dicebat ca. 4. lib. 4. Ac modo arida est, modo pituita citat; nobis autem satis sit hæc annotasse pro diuersarum tussium dignotione, & earum generatione diuersa, ac causarum ex quibus fiunt, notitia: reliquum est de ipsarum prognostico differere, ac curatione. Sit autem primum earundem prognosticum, quod quæcunque tussis ex destillante humore à capite oriuntur, siue ex alicuius spirabilium viscerum vlcere, aut ex aliquo in iisdem orto abcessu, siue ob ea, quæ vocantur empyemata, quæ ab Hippocrate ferè appellantur libro sexto de morbis vulgar. omnes malignæ sunt, vt Galenus eodem loco testatur, maleficæ, ac cõtumaces, vt inquit Paulus; & propterea periculose, nec paruit faciliæ sunt, reliquæ verò tussis, quæ malignæ non sunt, ab his liquidem diuersæ, ac exiguae dictæ, periculum, quantum in ipsis est, nominantur, suntque curatu faciles. Quod verò tussis in aquilonia constitutione, ac hyeme generari magis aptæ sunt, decretum reliquit Hippocrates aphorif. 5. & 23. libri tertij: id quoque non prætereundum erit, quod ad validas, vehementissimasque tussis, ubi diu protelentur propter vehementem thoracis motum, sputum sanguinis superuenire consuevit. Celsus autem tussim propter faucium exulcerationem ferè molestam esse asseruit: solent tamen (vt ipse inquit) interdum per se quoq; malè habere, & vix cum vetus facta est, eliditur. Quoniam verò neq; vnum duntaxat habent tussis ipsæ generationis modum, nec causam vnā, propterea pro causarum diuersitate earum quoque curationem variari contingit: quapropter si ex peripneumonia, pleuritide, empyemate, tabe, aut simili aliquo affectu in spiritalibus instrumentis orto, veluti etiam dyspnœa, seu asthma tussis fiat, ex eorum affectuum curatione, vt in sequentibus patebit curabitur & ipsa. Si verò ex inæquale duntaxat intemperie ortum ducat, frigida existente per calefacientia emendamus, vt inquit Aetius: hæc inquam tussis (modo non valde magna fuerit) ex spiritus cohibitione, iuxta Galeni sententiam, secundo de causis sympto. curari poterit, quemadmodum superius dictum est. Caueant igitur taliter affecti frigidam inspirationem, frigidum quoque cibum, ac potum, quinimò in calidis locis versentur; calidis quoque cibis, ac potibus vtantur; eorumque pectora calidis vnguentis vngantur, vt chamæmelino, anethino, amygdalarum dulcium, butyro, ac anseris, seu gallinæ pinguedine; & (vt summatim dicam) totū studium sit, vt thoracis par-

tes à frigidis defendantur, ac calidæ seruentur. At si ex calida intemperie, arida, ac exigua tussis proritetur, quemadmodum in febribus euenire contingit, contraria tum victus ratione, tum etiam medicamentorum vt oportet, ita vt cuncta ad frigidum vergant, atque humidum, si cum siccitate ea permista sit. Quæ verò ab asperitate tussis fiunt, per lenietia, & mordacitatem arcentia sanantur, Aetio teste, qualia sunt ex arteriacis compositionibus simpliciora: nonnullorum huiusmodi medicamentorum cap. de catarrho; à nobis mentio facta est, cum raucedinis curam præcepimus. Reliquum est itaque, vt eius tussis, quæ ex destillante humore à capite originem ducit, curationem præcipiamus, qui si acris fuerit, ac tenuis, proba victus ratione instituta, modo, quo cap. de catarrho cōscripsimus (quamuis speciatim in omni tussi utilis sit, ex Celsi auctoritate, peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, & nationes) per ea medicamenta quæ vim refrigerandi, spissandi, acrimoniamque obtundendi habeant, sanabitur; aut (vt inquit Aetius) per cuiusdam pharmacii dolorem leuantis vsum & per cibos boni succi: syrupo igitur violaceo, è papauere, de cannis, aut è succo borraginis vtare: vel, Recipe syrapi violacei vnc. j. de canis vnc. s. aquæ hordei, & borraginis, vnc. iij. aut aquæ hordei vnc. iij. v. vel vj. exhibeas cum paucò saccharo. quibus syrapiis sæpius assumptis vnc. ij. vel iij. mellis roridi, siue ij. cassiæ fistule, aut iij. sacchari violacei, seu syrapi ex pluribus infusionibus violarum cum infra scripto decocto exhibeas. Excipe hordei decorticati pug. j. florū violarū, & borraginis ana drac. iij. iuiubarum numero quatuor, vuarū passarū mundatarū vnc. s. glycyrrhizæ drac. j. & s. in aqua fontana fiat decoctū secundū artē, in quo mannam, cassiam fistulā, saccharū, aut syrupum violaceū dissoluas. Conuenit quoque in hunc vsum exhibere antidotum de papauere, diatragacathæ, vel diapenidij sine speciebus. quæ sub lingua diu teneantur, quo paulatim liquecentibus, asperæ arteriæ summum, id quod in ipsum defluit, sensim suscipiat, renitaturque ipsi oborienti tussi. Conducūt insuper & bechicæ pilulæ, ac reliqua medicamenta arteriaca, quæ cap. de catarrho conscripsimus. Inter alia verò potissimum confert infra scriptū eclegma. Excipit autem sacchari violacei, ac è borragine, singulorum vnc. j. succi glycyrrhizæ drac. ij. diatragacanthæ frigida, & eclegmatis è papauere ana drac. j. & s. eius antidoti, quā electuariū regum nominat, sine tamen speciebus drac. ij. syrapi violacei, de papauere, ac de cannis singulorū vnc. j. omnibus simul permistis fiat eclegma. Nec parū etiā confert, si vnc. j. vel ij. recentis olei amygd. dulcium repidi cū paucò saccharo, mane, vel vespere, longe à cibo tribuas, eodemque oleo, ac insuper violaceo, vel ambobus simul mistis thorax totus inungi poterit. Si verò crassus, & vicius fuerit assilgens humor, qui causa tussis existat, per ea quæ extenuant, discindunt, medebimur ex Aetij sententia: qua de re similiter eodem victu vtentes, quæ cap. de catarrho ex frigida causa orto instituiamus, exhibenda ægrotantibus erant: inter simplicia glycyrrhizæ, caricarum pinguium, adianti, aut hyssopi decoctum in aqua fontana, cui parum mellis adici poterit: aut si crassior pituita fuerit, marrubij, scabiosæ, radices iridis, seu enulæ campanæ decocto, similiter adiecto paucò melle vtare. At si compositis vti libeat, syrupum ex glycyrrhizâ, ex iuiubis,

Si ex calida intemperie oriatur, curatione.

Tussis ex destillatione orta, curatione. Si acris fuerit, & tenuis destillatio.

Purgatio.

Quæ ori tendenda sint.

Si ex frigida ac crassa succi de fluentibus tussis fiat, curatione. Preparatio.

adianto, hyssopo, aut marrubio tribuas, mel etiam rosaceum, interim verò oxymel, cum simplex, tum scillinum. Quibus sapius propinatis ægrotatis corpus (si videbitur opus esse) per ea quæ crassos, ac lētos succos purgant, euacuabis; inter quæ summopere confert agaricum, ex cuius drach. j. & s. seu ij. parato decocto, ac cum vnc. ij. cassiæ fistulæ compositum exhibe, vel vnc. j. & s. prædictæ cassiæ fistulæ excipe, ac drac. j. & s. trochiscati agarici, & bolum conficito: ex eodem item agarico, & puluere hieræ simplicis Galeni pilulæ formari possunt, ac ægrotatibus exhiberi: post quæ aut mellis roridi vnc. j. & s. aut cassiæ fistulæ tantundem: post aliquod spaciū, cum infra scripto decocto præbebis. Recipe hyssopi, adianti ana drac. iij. caricarum, & iuiubarum ana numero iij. radices glycyrrhizæ drac. ij. vuarum pasfarum detractis vinaceis vnc. j. fiat decoctum. Si verò crassior, ac tenacior fuerit pituitosus succus, radices, ac helenij, singularium drach. j. & s. radices feniculi drac. j. marrubij drac. ij. prædicto decocto addere poteris: nec minus loco prædictarum pilularū, licebit pilulis ex agarico compositis Mesuæ, seu mastichinis dictis, vti post quas simili ratione præscriptam potionem tribues: nam qui ob pituitæ crassitudinem nihil educere possunt, ut inquit Aetius, ab humectantibus plus emolumenti sentiunt, maxime eo quod quodammodo, si simul extenuatoria participant facultate: prodest quoque iis ouum sorbibile assumere, paucis sulphure adiecto, Celso auctore, aut eclegma, quod officinis loch nuncupatur, ore tenendum, sensumque deuorandum erit, sanum videlicet & expertum, aut id quod è pino nominatur, vel diapenidion cum speciebus, seu diatragacantha calida, aut diahyssopum Nicolai: quæ omnia cum saccharo in aqua adianti dissoluto, ad tabellæ formam redigi poterunt, quò ægrotis gratiora fiant, & maiorem contrahant in ore moram, vel Recipe diahyssopi Nicolai, diapenidion cum speciebus, & eclegmatis è pino ana drac. ij. pulueris glycyrrhizæ, amyli, gummi tragacanthi ana drac. j. syrupi ex adianto, & vna passa, ac de hyssopo singulorum vnc. j. omnia simul mista sapius, paulatim, & sensim deuoranda præbeas. Aduersus diurnam tussim ficus aridæ coquantur cum hyssopo, & aqua, & ex ea aqua tussientibus propinatur, ex Plinio Secundo libro primo de re medica cap. 58. thorax præterea extrinsecus inigatur ex oleo amygdalarum dulcium, liliaceo, irino, seu chamæmelino, adiectis pinguedinibus anseris, seu gallinæ, ac butyro; vel in hunc modum vnguentum conficias, Excipe butyri recentis, pinguedinis anseris ana drach. ij. olei irini, & amygdalarum dulcium ana vnc. ij. farinæ fœnigræci, seminis lini, & althææ ana drac. s. radices althææ, helenij, & glycyrrhizæ, singularum drac. j. cū cera fiat vnguentum: nanque per calefacientia (ut inquit Aetius) instrumentorum respirandi frigiditatem emendamus. Illud tamen in cura tussis summopere inspicendum (ut inquit Paulus) num & aliæ particulæ condoleant, verbi gratia, an caput, vel gurgulio destillet, aut aliis morbis conflitentur: nanque vbi his quàm fieri potest, optimè erit prospectum, curationem molire. Aetius quoque remedia quædā, quæ tussis sedant præsertim à frigida causa ortas conscripsit, inter quæ simplicia præcipua est styraç, si nucis anellana magnitudine fuerit deuoratus: ficus quoque siccas pingues in vino dulci meraco madefactas vnā cum vino deuorandas exhibet ad mi-

tigandas tussis: amplius terebintinam, & mel coctū delingenda præbet, & vinum dulce dilutum insuper ad forbendum hoc nanque (ut ipse asserit) attenuat, & educit. Ad eas autem tussis noctu molestiā inferentes, tanquam valde vtile, menthæ ramulos tres tritos affuso aceti cochleari, ante somnum ad forbendum præbet: adiuuat enim concoctionem, stomacho vtile est, & crassitiem discindit, ut ipse inquit: complura etiam alia composita medicamenta, quæ tussis sedant, eodem loco conscripsit, ea videlicet 54. lib. 8. quæ studiosis facile patere poterunt: vnum tamen hic præmittere nolui, tanquam magno opere conducens, ad mitigandas tussis potissimum inueteratas, & ex frigidis, crassis, ac lentis succis ortas. Excipit autem nucum pinearum torrefactarum, amyli, radices dulcis, seminis vrtice, seminis lini cuiusque sextantem, iridis, piperis, hyssopi, ieminis nasturtij, amygd. amararum singulorum vnc. j. ut ipse inquit: verum ego vnc. s. acciperem. Excipe melle probè despumato, & præbe ex eo cochlearium mediocre, ex eiusdè auctoris sententia, suffitus quoque ad eius sententiā, admodum tussibus conducens, tanquam per experientiam ab eo inuentus ex styraçe, terebinthina, sandaracha, ac mastiche aqualibus partibus parari poterit, & vtare: castorij insuper suffimè in carbonibus excitatum, & per inspirationem attractum maxime iuuat frigidus, & humidus pulmonis, thoracis cerebriq; affectus, Alexandro teste: idem quoque testatur, spectasse virū quendam longo tempore tussi valida vexatum, nec ab ea vnquam liberari poruit, quousque calculum exquisitè figuratum, non asperum, sed valde leuedurum, & renitentē expulisset. Ad tussim verò acerrimam puerorum sic subuenimus, inquit Trorula, accipe hyssopum, serpillum, & in vino decoque, & da ad bibendum, vel grana iuniperi distemperamus cum vino, & damus ad bibendum: tu vero poteris eisdem in aqua, vel aqua multa decoctis tutius vti.

De difficultate spirandi.

CAP. XLVIII.

SÆPENVMERO respiratio læsio quædam cuenit, quæ à Græcis *δυσπνοια*, à Latinis spirandi difficultas nuncupatur, id autem (ut testatur Galenus libro primo de difficultate respirationis) nomen ipsum sufficienter demonstrat. Verum ex hac appellatione, læsionis eius differentias discere non licet, quinimo Galenum ipsum de affectione hac diuersis in locis variè loquutum esse reperio: nanque prædicto libro primo de difficultate respirat. quamlibet respirationis oblationem simplicem, aut compositam, siue exigua, siue magna fuerit, seu imbecilla, aut deprauata respiratio sit, *δυσπνοια*, hoc est, difficultatem spirandi appellauit. Idem quoque confirmauit libro quarto de locis affectis, vbi *ἀπνοια*, quasi non spiratio dixeris, dūtaxat à quauis alia respirationis oblatione sciuit: hanc nanque dicebat, aliū esse à dyspnœa spirationis affectū: id verò nō ab re, nā lib. de differentiis symptomatum, demonstrat quamlibet functionem bifariam lēdi posse: nanque aut ea non fit, aut malè fit, si non fit, est vnum genus læsionis, vocaturque ablata functio. At si malè fiat, adhuc bifariam esse poterit, quia vel ipsa facultas debilitet, vel deprauatè operatur: quo fit, ut vna debilis, reliqua verò deprauata actio dicatur, quanquā ambæ

*Ad diu-
turnā inf-
sim.*

sub vno (vt diximus) contineantur genere, eo scilicet, quod male functio fiat: & proinde Galenus cunctas respirationis laciones, propter quas imbecillior, aut deprauata ipsa redditur sub nomine dyspnœæ, seu spirandi difficultatis, in prædictis locis comprehendit voluit, tatum apnoeam, id est, nō spirationem, à qualibet respirationis offensa sciungens, quem sectatus Paulus ca. 29. libro tertio, cum de quibusdam differētiis particularibus lacionis respirationis, asthmate videlicet, & orthopnoea verba fecisset, in hac prorupit verba dicens, hoc est, spirandi difficultas communiter & his, & aliis compluribus affectibus superuenit: verum ipsemet Galenus cum libro tertio de difficultate respirationis, tum etiam sexto de morbis vulgaribus, simul cum Hippocrate, dicens, hoc est, difficilem respirationem, eam respirationis oblationem nominat, in qua densus spiritus redditur: quapropter de vna quadam specie ipsius difficultatis respirationis, in qua videlicet spiritus densatur, crebreque efficitur, licet non valde, ipsam intelligi voluit, à reliquis sciuntam, asthmate videlicet, & orthopnoea. Poterunt autem ne in his tempus teramus, Galeni verba conciliari, si quis dixerit, in vno loco communiter hoc vocabulo dyspnœæ vsum fuisse, in reliquo vero propriè, prout vna quadam species est, generis nomen assumens; quam propriè more Hippocratis dēsum spiritum nuncupare fas est, & prout si intēdit lacio, aliud atque aliud nomen habet: omne tamen malum in difficultate spirandi consistit, vt libro quarto cap. 4. Celsus testatur. sed hæc (vt ipse inquit) dū modica est, neque ex toto strangulat, dēsum appellatur. Cum vehementior est vt spirare ager sine sono, & anhelatione non possit, dēsum, cum accessit id quoque, ne nisi recta ceruice spiritus trahatur, dēsum. Idem quoque confirmavit Galenus prædictis locis, dum dixit, densum spiritum difficilem significare respirationem; & si magis increbuerit, hæc difficultas anhelitus species dēsum, si verò maxime, dēsum nuncupatur. De his itaque tribus lacionis respirationis differentiis pertractare intēdimus: quas omnes sub dyspnœæ nomine contineri promptè asserimus, sub vno tamen lacionis modo secundum magis, & minus differētes, vt pote sub densō seu crebro spiritu: namque si is exigue densus sit, nomine generis dyspnœæ appellari poterit, vt supra ad Galeni, & Cornelli mentem demonstrauimus: at si maior crebritas fuerit, dēsum, si maxima, ita vt iacentes ægri suffocentur, dēsum nuncupatur. Quapropter idem Galenus dēsum, hoc est, anhelationem densam, seu crebram quandam respirationem esse fatetur, tum septimo de compositione medicamentorum secundum locos, tum commento apho. 26. libri tertij, circa febrem, qualis currentibus accidit, aut quouis alio modo ad vehementem ductis motionem à tali euentu nomen assumens, vt liquet tertio de morbis vulgaribus. Verum in his quidem fit ob exercitum, quod multa indiget animal respiratione: vbi autem non adest exercitum, ob angustiam earum, quæ sunt in pulmone conseruerunt Medici asthmaticos, anhelosos, seu suspiriosos nominare, Aetio, & Paulo testib. Hos autem esse (Gal. auctore tertio de diffic. respirationis) qui densum spiritum habent, & simul thoracem multum distendunt, planè constat. Orthopnoea vero, quæ recta spiratio à Latinis dicitur, ab hoc sym-

ptomate iterum nomen assumens, difficultatis spirandi quadam species est, in qua iacentes suffocantur, & vix recto thorace sufficiunt, nihil dilatato dorso, vt liquet secundo prorrheticorum: nec ab re cum iacent, seu decumbunt laborantes suffocari videntur, tunc nanque totus thorax (vt idem Galenus inquit, secundo de locis aff.) supra spinam ipsam cōcidit: quo fit, vt arctior reddatur via spiritus: cum verò se erigunt extenso thorace, ac collo rectè arteriam ipsam asperam dilatari contingit, principium quidem habens à genere, & in pulmone diuisa: atque etiam quæ ex ea in pulmōnem distribuuntur propagines omnes, atque interim regionem augeri eis internam, eos verò, qui hac affectione laborant, Galenus eodem septimo de compositione medicamentorum secundum locos, orthopnoicos vocat, similiter etiam Paulus, & Aetius: propterea quod ad thoracis proportionem omnino totum corpus rectum habere coguntur ob timorem suffocationis, quin & stratum circa supernas partes, ad quas thorax ipse reclinatur, sibi ipsi erectus faciunt, ne dormientes strangulentur: minus est enim quod inspirant, quam pro vsu respirationis, quamuis thorax plurimum ipsis dilatetur, vt idem Galenus inquit, cuius causam infra assignabimus: cum verò citra sonum, & anhelationem similiter sine febre densus afficiatur spiritus, hæc inquā affectio dyspnœa propriè dicta appellari poterit, quæ nihil aliud erit, quàm crebra, seu densa quadam respiratio citra sonum, ac anhelationem, & febrem: in hoc nanque omnes prænominate species, seu differentiæ tres, communicant quod videlicet febrem careant, vt patet tertio de morbis vulgaribus, & sexto eiusdem: namque de his sermo noster erit, & non de eis, quæ cum febre sunt, ad alias videlicet affectiones, seu inflammationes spiritalium, seu reliquarum partium subsequentes, in quibus etiam non facultas ipsa respirationem efficiens, neque vsus per se afficiuntur, sed instrumenta ipsa, & inter ea aspera ipsa arteria, quæ in collo, & thorace continentur, seu eius propagines, quæ in pulmōnes distribuuntur, id quod sæpius accidit, sunt etenim strictiores, & propterea promptius obstruuntur, ac constringuntur, seu angustiores redduntur, quemadmodum liquet quarto de locis affectis, septimo de compositione medicamentorum secundum locos, & commento prædicti aphorismi 26. libri tertij. Quod verò in huiusmodi affectionibus tribus aspera arteria afficiatur, ex eo patere poterit, quod quanquam thorax maxime dilatatur, & proinde magna fiat respiratio, quantitas tamen inspirati aeris, magnitudinem distentionis haudquaquam proportionem respondet: parua siquidem est eius, qui inspiratur quantitas, vt proinde cogantur laborantes crebro, & celeriter spirare. Qua de magnæ respirationis geminas esse differentias, ex Galeni sententia liquet, quarto de locis affectis, ac primo de difficultate respirationis, quarum vna penes magnitudinem distentionis, seu dilatationis à thorace procedentis attenditur: reliqua verò penes copiam eius substantiæ quæ inspiratur, aeris videlicet. Semper itaque quantitas spiritus distentionibus thoracis similis est, cum eiusdem spiritus organa secundum naturam habent: cum verò præter naturam fuerint affecta, vt in prædictis affectionibus, ac reliquis quibusdam, possibile est aliquando plurimum distendi thoracem, sed parum externi aeris inspirari, verum non ad omnium affectionum, respi-

randi organorum proportionem, sed solum a separarum arteriarum inspirationes sunt, ut Galenus inquit, eodem libro primo de difficult. respiratio- nis: id vero sensu aliquo dignoscere non licet, sed

cap. 13.
Quam quis-
piam diffi-
culter spi-
ret, ex una
triū cau-
saru pro-
venit.
cap. 7.

Ex virium
imbecillita-
te signa.

Ex vehe-
menti cordis,
aut pulmo-
nis calore,
signa.

Ex spirita-
lium instru-
mentorum
angustia si-
gna.

Quibus si-
gnis una
differentia
ab altera
seccernatur.

Quin affe-
ctus præter
naturā sit.
4. de loc.
affe. c. 7. de
cōp. medie.
secund. loc. c.
6.

Quæ mor-
bum scilicet
signa.

sufficit ipsum solum aërem inspicere quantus in- spiratur, & quantus rursus expiratur. Sed quo- niam quempiam difficulter spirare, præsertim ubi in ea spiratione omnes thoracis musculi mouen- tur, aut virium imbecillitate, aut vehemēti in cor- de & pulmone calore, aut viarum spiritus angus- tia euenire potest, eodem Galeno teste, quarto de locis affectis, quamvis interdum duæ, aut tres, licet raro, ex iam dictis causis concurrere pos- sint. Propterea quomodo id distinguere liceat, præ- semet Galenus eodem loco scriptum reliquit: nam si ob virium imbecillitatem duntaxat id fiat, licet om- nes thoracis musculi, ac phrenes quoque moueā- tur, motum tamen sensum efficiunt, sed neque fre- quens, neque rara omnino erit eorum actio, thora- cisque dilatio haudquaquam magna erit, nulla ab ore efficitur exsufflatio, & spiritus ex solis naribus emitti solet, & si per inspirationem, ariarum pinnæ manifestè contrahi videantur, id prostrati roboris efficacæ indicium erit. Aucto verò in corde & pul- mone calore omnibus quidem thoracis musculis agit animal, sed velox, frequens, & vehemens est eorum actio: & propterea ubi ob plurimum calo- rem spiratio difficilis est, præter magnitudinem, fre- quentiam, & celeritatem huius quoque accedit, quod calidus frequensque exsufflando producit spiritus. At qui ob spiritalium instrumentorum angus- tiam difficulter spirant, totus quidem thorax ma- gna ex parte eis, & celeriter, & frequenter dilatatur, sed exsufflare omnino non consueverunt, neque calidum spiritum emittere: id enim aucti caloris proprium est. Ex his itaque indiciis difficilem spi- rationem ob spiritalium instrumentorum angustiam à reliquis distinguere poteris, de qua præsens sermo habetur: & cum tres sint eius differentiæ (ut dixi- mus) cunctæ inter symptomata dinumerantur, fun- ctionis voluntariæ, respirationis inquam: est namq; ea in omnibus oblata, non ablata, ut in apnœa, sed debiliter seu imbecille, aut interim quoque deprauatè, ut in orthopnœa, licet raro. Separatur autem una ab alia quibusdam propriis indiciis, namque in ea, quam dyspnœam nomine generis appellari di- ximus, spiritus duntaxat densus, isque modicè citra sonum, & anhelationem apparet. In asthma verò, seu anhelatione, præter spiritus densitatem maio- rem, æger sine sono, & anhelatione, ut inquit Cel- sus, spirare non potest. At in orthopnœa nedum spi- ritus crebritas maior percipitur, sed ita affecti non nisi recta ceruice spiritum trahere valēt, & cum de- cumbunt, seu iacent, suffocari, seu strangulari viden- tur. Cæterum his id commune exilit, quod asperæ arteriæ angustiam sequantur, ut quarto de locis af- fectis, & septimo de compositione medicamentor- um secundum locos patet: manifestum namque est (inquit Galenus) intrinsecus ipsis angustiam, seu coarctationē locorum factam esse præter naturam, quam etiam ægri ipsi non obscuro sensu perceptāt. Illud etiam approbavit prædicto commento apho- 26. libri tertij, quamvis etiam suppuratis, ob coar- ceruatum inter thoracem, & pulmonem humorem, seu pus, fiat locorū coarctatio, seu angustia, eodem Galeno teste in prædictis locis, & commento apho- 34. libri quartij, de qua non est ad præsens sermo. Ad

morbū ergo in via succedunt symptomata hæc, quamvis interdum viæ ipsæ obstruantur, per quas aër inspiratur, interim contringantur, ac coarctentur pro causarum diuersitate, quæ (iuxta eiusdem Galeni doctrinam, quarto de locis affectis) plures esse possunt, licet à Paulo una tantum assignetur causa, quæ quidem potissima existit. Potest namque angustia hæc citra febrem excitari, aut à tuberculo quoque iuxta asperam arteriam orto, eamque coarctante, aut à lentis, crassissive, seu multis succis in bronchiis ipsis existentibus, aut eisdem ab aliis par- tibus ad eandem delatis, ipsamque asperam arte- riam obstruentibus. Quæ omnia (ut Galenus inquit) per præterita accidentia discernere licebit: namque si quis per bonam valetudinem, cum solitas actio- nes facere potest, sic difficulter spirare inceperit, augeaturque symptomata, neque inter respirandum stertere videatur, ad hæc nihil expuit, crudi tuber- culi ortum suspicari oportet: quandoque verò iux- ta leues pulmonis arterias ipsum oriri contingit, grauitatem sentientes hi, veluti Antipatro medico contigit, demum temporis diuturnitate asperas pul- monis arterias coarctans, spirandi difficultatem ef- ficat. Si verò sterendo strepitum fecerit respiratio, lentorum, crassiorumque humorum pertinaciter impactorū multitudine, pulmonis bronchia mole- stare indicium est, cum & ipsa spirandi instrumē- ta non raro (ut inquit Galenus commento aphorism- i vltimi libri tertij) proprium sui algoris princi- pium habeant: & propterea in ipsis multæ, ac crassæ superfluitates generentur. Verum si illico ab angustie sensu quis difficulter superuenerit, fluxionem vel à cerebro, vel à vicinis sedibus in pulmonem ir- ruentem portendit, idque sæpe ex manifesta causa repente accidit, propriis desillationis signis exi- stentibus: pingui etenim (ut inquit Theodorus Priscianus libro secundo ad Thimothæum cap. duode- cimo.) & frigido phlegmate pulmonibus adhæren- te, cavernæ, vel meatus, quibus naturaliter spiritus redditur, & accipitur, concluduntur; & ex hoc im- pedimento suspirium, vel anhelitus molestissimus nascitur, ut sedendo magis, quam iacendo respiren- tur. Verum si prædictæ affectiones ex aliis quibusdam præter iam dictas causas, interdum oriuntur, vires ex angina, peripneumonia, pleuritide, empyemate, aut ex tumore aliquo abcessui simili in pulmone genito, seu aliis huiusmodi, licet de his non sit præ- sens sermo, ex propriis tamē prædictorum affectuū notis interstinguendæ sunt, potissimum autē, quod non citra febrem erunt. Nos verò de eis, quæ sine febre excitantur, nec quippiam purulentum in eis per sputum reiciant ægri, verba facientes ad pro- gnosticum, ac curationem accedemus: namque eos propriè dyspnœicos, hoc est, ægrè spirantes vocare consueverunt medici, ut testatur Galenus septimo, de Compositione medicamentorum secundum lo- cos, cap. sexto, quibus bronchia pulmonis, crassæ, & viscosæ humoribus sunt obfartæ: horum denique & nos prognostica enuntiabimus, ac curationem in- stituemus & cum Celso asserimus quam primam di- ximus esse differentiam, posse diutius trahi, duæ ve- rò insequentes, asthma, & orthopnœa videlicet a- cutæ esse consueverunt: ob vehemētissimas etenim accessiones ægros interim strangulare solent, id quod dyspnœa propriè dicta nequaquam efficere valet, cum modica in ea consistat spirandi diffi- cultas. De asthma autem Galenus commento aphor.

aphorif. 40. libri fecundi scriptum, reliquit; velut de quibufdam aliis morbis, qui ex frigidis humoribus ortum habent, fi valde fenibus excitetur, quod eos comitatur ad mortē. At Hippocrates aphorif. 46. lib. fexti dicebat, Quibus gibbi ex asthma, aut tufsi funt, antē pubertatem moriuntur.

Cælius verò Aurelianus libro tertio cap. 1. fic ait, Grauat autem, atque premit hæc paffio magis mulieribus viros, & iuuenibus senes, atque pueros, &

durioribus natura corporibus teneriora, hybernō, atque nocte magis, quā die, vel æstate. Cæterum communis prædictarum affectionum curatio est

per ea, quæ crassitudinem & viscofitatem humorum fecant, atque attenuant, verum hæc siue pharmaca fuerint, siue victus, humiditatem quandam habere oportet, Galeno auctore, eodem septimo de compositione medicamentorum secundum locos, cap.

6. Aer igitur eligatur ad calidum, & sicum parum vergens, vitandūque est frigidus, ac valde humidus. Somno vtatur moderato præcipue nocturno, caputque in lecto sublimē habeant, Celfo auctore;

vitentque diurnum. Idem Celsus, prædicto loco, iacere ægrotantes altioribus stramentis, thorace, atque capite subleuato, loco lucido, atque calido iussit. Clysteris quoque alius ducenda, præsertim vbi natura eadem humecta non sit: prodest quoque nihil magis (vt inquit Celsus) quā ambulatorio lenta penē vsque ad lassitudinem; frictio multa præcipue inferiorem partium, vel in sole, vel ad ignem, & per seipsum, & per alios vsque ad sudorem, exercitio autem vtatur ante cibum, animi perturbatio-

nes immodicæ omnes fugiendæ sunt; cibis verò lenibus (vt idem Celsus asserit) & sorbitionibus vtendum est, interdūque vino tenui austero: carnibus quoque gallinarum, pullorum, phasianorum, perdicum, starnarum, caponum, paruarumque auicularum montanarum vti poterunt, assis, aut elixis, cum pauco hyssopo, oreofelino, thymo calamintha, aut feniculo, aut reliquis huiusmodi extenuantibus. Pisces vitent, fructus, ac omnia quæ crassos, & lentos humores procreare possunt. Vini potus (Galeno teste) eis conuenit, substantia tenuis, nec exiguus eis tribuendus potus erit, imo multus, vt ipse inquit: nam humectatione multa opus habent, quo facile effertur per tussim, id quod in bronchiis continetur. Exhibenda quoque pro potu aqua mulsa erit, Celfo auctore, cum qua vel parū hyssopi, seu præsij, vel contrita capparis radix sit, aut quā suauior aqua mulsa fiat glycyrrhizæ radix decoquatur, eaque largiter vtantur. Quod si necessitas vrgeat (vt inquit Paulus) nihilque prohibeat (vt ait Celsus) ante omnia vena incidenda erit; auxilium nanque est in sanguinis detractione, & præsertim in orthopneæ sicca sine sputis, vel tussi citra puris collectionem vt Galeno visum est. quarto de Ratione victus in morbis acutis. Verum Cælius Aurelianus dicebat, At si præfocatio coegerit, & vires permiserint ægrotantis, adhibenda phlebotomia est: & Theodorus Priscianus, contingit aliquādo etiam mediis aratibus, adhuc calidis hoc vitium assererat, quos phlebotomo liberari necesse est; incidatur autem media, aut interna in cubito vena, nec multa sanguinis copia detrahatur, sed quantum vires patiuntur. At si necessitas non vrgeat venam secare, ea tribuenda medicamenta sunt, quæ vim habeant humorum crassitudinem, ac viscofitatem attenuandi, atque incidendi, & detergendi. Sed quoniam eiusmodi

di pharmaca necessario quidem tussis mouent, vt septimo de Compositione medicamentorum secundum locos, cap. 6. & quinto de simplicium medicamen. facultatib. cap. 19. liquet: quanquam, & bechica quoque ea dicantur in calidis, & tenuium partium substantiis contenta, quæ extenuandi vim habent, quo ab aliis bechicis discriminantur, quæ tussim sedant, quorū natura incrassandi exillit, & propterea in frigidis, & crassarum partium essentis insunt: cum itaque necessario tussis moueant pharmaca, quæ eiusmodi affectiones exigunt, nec facile per sputum reiciantur quod absterlum est ob crassitudinem, non immerito iuxta Galeni sententiam, humectatione multa opus habent, quo facile effertur horum excrementa, propterea, non ipsis duntaxat per se vtendū quæ incidunt, & extenuant, vt idem Galenus præcipit, quinto de simplic. medic. facult. cap. 11. sed mixtis mellicrato, prisanæ, oxymelitis, aut dulciū vinorum cuiuspiam. Ad hæc eadem pharmaca eligi debent, quæ citra vehementem calfactionem extenuent, atque incidant, Galeno, & Aetio testibus: crassi etenim, & tenaces humores a vehementi calore viscosiores redduntur, glutinosique, & vt difficulter auelli possint, & insuper quemadmodū cauendum est ab his, quæ vehementer calfaciunt (propterea quod viscosi, & crassi humores nō solū nihil ab his auxilij sentiant, sed etiam offenditur) eodem modo (vt inquit Galenus loco citato) etiam quæ valde refrigerant vitanda sunt: omnia enim crassifaciunt, & cogunt, ac coaugent humores, eosque ægrè eluibiles reddunt, nec minus ab adstringentibus pharmacis (eodemmet Galeno teste) abstinentum erit: maximè enim contraria sunt eiusmodi affectionibus: & ob id maximè eos iuuat acetum scilicet, & acetum mulsum ex eiusmodi aceto confectum, atque ipsa adeo scilla asilla cum melle, trita, & delincta, vt eidem Galeno visum est, & post eum Paulo, & Aetio. syrapi item ex hyssopo, glycyrrhizæ, è marrubio, rosaceum mel, ac ipsummet oxymel simplex conferunt, pro extenuandis, ac detergendis prædictis crassis, ac frigidis succis, ac ad euacuationem parandis. Quibus sapius assumptis, ac humoribus præparatis, ea propinanda erunt medicamenta, quæ crassos, ac lentos humores vacuare valeant, atque inter ea quæ validissima sunt, quemadmodum Archigenis auctoritate, Aetius cap. 57. lib. 8. & Paulus cap. 29. lib. 3. testantur: quæ, non semel tantum, sed frequenter adhibenda erunt, vt eisdem visum est. Exhiberem autem primò vnc. j. & s. calsig fistulæ, diaphœnicon drach. ij. agarici trochiscati, & pulueris hieræ simplicis Galeni ana drach. j. ex quibus paretur bolus: vel ex agarici trochiscati scrup. iij. & eiusdem pulueris hieræ drach. j. cum oxymelite formentur cataportia, ægròque tribuantur: post quæ per aliquod tempus vnc. ij. mellis roridi, seu vnc. j. & s. calsig fistulæ in aqua hordei dissolutas assumant; aut si maui pilulas ex Agarico à Mesue descriptas exhibe, per interualla autē (vbi vsus expostulat) pilulas præbe ex drac. j. trochiscati agarici, & scrup. ij. pulueris hieræ ex oxymelite confectas, à quarum assumptione, post tamen perfectam euacuationem, gallinæ, aut caponis cum prisanæ cremore ius tribue. Alius præterea clysteribus validioribus non rarò eluenda: interim quoque exhibenda medicamenta sunt, quæ valde ægrè spirantibus auxiliantur, quemadmodum est aristolochiæ rotundæ decoctum, aut centaurij maioris radix, & minoris

Quæ post purgatiōem medicamentis exhibenda sunt.

lucius, itē stēchadis trita decoctū, radices, seu fructuum spondylii, calamintha, hyssopi, iridis, ac melanthij: quanquā prædictorum decoctum in aqua mulla, magis quam aquam comendarem: eiusque vnc. iij. aut iij. exhiberem: in quem vsum ex caricis radice glycyrrhizæ, & fenogracio, vna passa, adianto, hac hyssopo decoctum in aqua, seu aqua mulla parare poteris, interim marrubium quoque addas: Vulpinus quoque pulmo si refecatus bibatur, asthmaticos iuuat, Galeno teste, vndecimo de simplicium medicament. facul. eundem item pulmonem quam recentissimū assum, sed sine ferro coctū edendum præbet Celsus, qui & vulpinum quoque iecur vbi sicum, & aridū factum est comendat: poterit autem prædicti iocinoris, seu pulmonis vulpini aridi drac. j. exhiberi cum aqua mulla, aut prisana, quē admodū & ipse vtor, non semel tantum, sed sæpius. Conducunt insuper ea medicamenta, quæ ore tenentur, ac sensim, & paulatim deglutuntur, vim habentia attenuandi, ac detergendi crassos, frigidos, ac lentos succos, quorum præcedenti capite de tussi meminimus: priuatim autem hoc modo parare poteris. Excipe diapenidij, & diaphysopi Nicolai, singulorum drac. ij. diareos Salamonis eiusdem Nicolai drac. j. diatragacanthi calidi drac. j. & s. syrapi ex glycyrrhizæ, & iuiubini ana vnc. ij. & s. mellis rosacei vnc. j. misceantur omnia, & vtare. licebit autē quandoque vno, vel duobus ex iā dictis antidotis, & non omnibus cū prænominatis syrups, aut aliis quibuscū ad eundē vsum facientibus vti. Confert itē potio theriacæ antidoti, ex Cælij Aureliani sententia, & aquarum naturalium vsum: insuper cōfert, ex decreto Theodori Prisciani, abrotoni pulvis cū mellicrato, seu oxymelle, & castorei pulvis, vt ipse inquit, cōmodius operatur, si similiter propinetur. Extrinsecus autē thoraci cataplasmata imponenda sunt, vt Paulo, & Aëtio vsum est, ex ficibus, & hordeacea farina, magis verò ex loliacea, habente refinam, mel, & ceram admixta: infarciri etiā potest ei iris, & manna: aut ex hordei farina cum refina, cera, iride, & manna, ac aqua mulla cataplasma fiat. Post quæ, vnguenta etiam thoraci superimponi possunt, quæ exalfaciant, vt irinum, anethinum, & rutaceū, ex Pauli sententia, in quem vsum tale vnguentum cōfici poterit. Excipe feminis lini, fenigraci, & althææ, ana drac. ij. radicis iridis drac. j. & solei irini, chamæmelini, & rutacei, ana vnc. j. butyri recentis, & adipis anseris, seu gallinæ, vtriusque drac. iij. cere quod satis sit, fiat vnguentū, prius tamē quam thorax hoc vel alio vnguento illinatur, aspero linteo fricandus erit, quo reteratis meatibus, medicamentorum vis proprius ad profunda penetrare valeat: est nanque pectus, vt eisdē Theodoro Prisciano visum est, calidis vnguentis, & vaporibus defricandū. Cæterum inueterato malo, & omni medicina frustra adhibita, ad vltionē confugiendum erit modo quod prædicto loco Aëtius præcipit. Verum si contingat ex crudo tuberculo prædictarum aliquā affectionem oriri (modo curari valeat) eadē, & similia medicamenta propinanda sunt, ex Galeni doctrina, quarto de Locis affectis, cap. 7. qui non modò Antipatri medico similem iussit victus rationem, atque medicamenta adhiberi, verum etiam ei, qui paruo grandinis grano frustum quoddam haud ab simile excrueat, medicamentum in potu dedit, quod asthmaticis auxiliatur, & si tantandem, velut etiam & Antipater medicus mortuus fuerit.

cap. de pulmone.

Topica.

Πνεύμαλος πύκνωσις.

De cruenta spitione.

CAP. XLIX.

Variis quælibet sanguinis eruptione toto genere præter naturam esse censeatur, eo excepto sanguinis fluore, qui mulieribus ab utero defluit, cum videlicet modum in quantitate non excedit, vt tertio de Causis symptomatum, cap. 2. testatur Galenus, tamen hæc sanguinis excretio, quæ à Græcis πύκνωσις, καὶ ἀπὸ πύκνωσις, à πύκνωσις, nuncupatur, à Latinis vero sanguinis expulsiō, seu reiectio, seu cruenta spitio non modò inter alias sanguinis expulsiōnes, verum etiam inter alias præter naturam affectus difficilior existit: nam peflimorum, longorumque morborum magna ex parte causa redditur, Alexandro teste, cap. 1. libro septimo. Est autem affectus hic ex ore quælibet sanguinis excretio: cæterum cum per os à nonnullis corporis partibus sanguis excerni possit, quæ omnes propriis iudiciis intertinguntur; eapropter modum quo singulæ dignoscantur, ac à reliquis discernantur, primum docere tentabimus à Galeno instructi, quarto de Locis affectis cap. 5. quem reliqui Græci quos vidi, Arabes, ac Latini sectati sunt: inquit enim ipse quod conuenit inter medicos sanguinem, aut e gula, & ventriculo, aut ex spiritalibus partibus, thorace videlicet, pulmone, seu aspera arteria, aut ex faucibus, & gurgulione, vel ex ipso proprio ore, seu ex gingiuis expelli. Illud tamen animaduertendum, vt inquit Cælius Aurelianus cap. nono, libro secundo, quod differt fluor sanguinis à spito, quod neque fluor sanguinis spitus dici potest, paruum etenim materiæ significationem spitus refert, fluor plurimæ, neque spitus sanguinis fluor, supradicta ratione: paruum etenim materiam sanguinis ex gingiuis, aut vna, aut faucibus emissam, sputum magis quam fluorem rectè nuncupamus. differt ergo fluor à sanguinis spito ratione plurimæ, aut exigue quantitatis sanguinis, ac partium diuersarum ex quibus profluit. Verum singulis iā dictis partibus proprius est reiectationis modus: namque sic ex gula, ventriculōque proueniat, vomitione expellitur, ex spiritalibus partibus, tussis, ex faucibus & gurgulione, sreatu. Si verò ex aliquo loco oris, aut gingiuarum: simplici expulsiōne expulsiō: quamuis impleat Galenus testatur sæpè penumero conspexisse sanguinem à cerebro, & gurgulionis partibus internis ad fauces assatim descendentem tussiendo educi, utpote qui subito gutturi irruens tussim mouere poterat. Quare diligenter animaduertere oportet, ne aliquando huiusmodi sanguinem ex spiritalibus instrumentis ascendisse putemus, credamusque hanc sanguinis eruptionem esse quàm periculossimam, tanquam à pulmone vehementer affecto prouenientem. Verum ex dicendis patebit, quæ via id intertingui valeat, quamuis nonnunquam etiam accadat, vt pluribus ex ordine diebus quispian sanguinem excreat, & emungat, idque citra capitis vel doloris, vel grauitatem præsentem, siue præteritam, neque aliquo præcedente icu, propter deuoratam hirudinem, in ea oris parte adhaerentem, quæ ad nares foramen tendit. Quare hanc partem, & totum per nares meatum accuratè & sæpius considerare oportet; præterita quoque semper interrogando: namque

nanque ex his rei ipsius veritate facile conicietur: eadem ratione ex ventriculo quoque epota hiru- dine cruor euomitur; verum is siue ex ventriculo, siue naribus, siue ore feratur, tenuis erit, sanieque speciem refert, eodem Galeno teste. Atqui reli- cta hirudine, ad dignoscendas partes, ex quibus ex aliis causis sanguis perfluit, accedamus, nam si è sto- macho educio fiat, præter quàm quòd vomitione excernitur, vt diximus, non magna erit sanguinis e- ruptio; graciles etenim sunt stomachi venæ, vt in- quit Aetius & cum nausea quoque sanguis effertur, ac in deglutendo mordacitas percipitur, maximè si adstringentia, aut acrida deglutiantur. Si verò ex ventriculo educatur, nausea plurimè comitantur, & vomitus; & si à cibo sumpto educio contingat, sanguis cibis permixtus, aliquando etiam pituita, & bile effertur. At si ex hepate, vel splene sanguis in ventrem deferatur, & ex eo demum vomitione ex- pellatur, in alterutro viscere aderit tumor, ac do- lor, ipsèque sanguis grumofus, ac niger erit; & magis si à splene in ventrem delatus fuerit. Ex spi- ritualibus autem partibus licet tussi eiiciatur san- guis, inuestigandum erit, num ex thorace, pulmo- ne, aut aspera arteria educio fiat: nanque si tho- rax affectus erit, neque multus, neque ruber san- guis erit, sed nigrans, ac grumofus ac minus calens, ceu è longinquo veniens. Dolores insuper circa eum intensiores sunt, cum ad ipsum multi adue- niant nervi, quibus facile dolores percipi possunt, musculis præterea, ossibusque thorax abundat, vt inquit Galenus: interim sanguis qui ex thorace ef- fertur, foetidum odorem de se præbet, & aliquan- do purè admixtus est. Si verò spumans, & subalbi- dus, floridus, feruens, confertim, multusque citra do- lorem, aut eo multo remissione existente cum tus- si sanguis reiciatur, pulmonem affectum esse no- tum est, ex eiusdem Galeni sententia, tum quarto de locis affectis, tum quinto method. med. est nan- que pulmo laxus, & ab affectione tutus à sexto, dū- taxat nervorum cerebri coniugatione duos per quā- tenues nervos per eius membranam dispersos ex- ciens, qui haudquaquam per visceris profundi- tatem extenduntur. At si paucus sit qui cum tussi sanguis effertur, ægrique doloris sensum iuxta a- liquam arteriæ partem percipiant, sitque sanguis hic quodammodo pure permixtus, aderitque etiam paucitas sputi, ac tussis non valida, aspera arteria af- fecta erit. Sanguis verò qui ex faucibus, & gurgu- lione secreatu effertur, vel ipsis primariò affectis, aut per consensum à cerebro sanguine descendente ad ipsa partes contingit. Verum si à capite descen- dat, præter id quod nedum secreatu, sed tussi inte- rim eiicitur, aderit ipsius palari titillatio, ac fre- quens excreatio, irritatur ægri ad tussim, licet non valde tussiant, præsertim vbi quippiam subito gut- turi irruat, aderitque capitis grauitas, aut dolor, au- rium sonitus, faciei rubor, venæ frõtes emicant, ver- tiginisque accedunt, præcessitque nimirum capitis ictus, frigiditas, aut calor, seu ebrietas, interim cõ- sueta per nares sanguinis excretio cohibita. At si absque his cum secreatu sanguis educatur, faucel- que seu gurgulionem sanguinolenta inspexeris, at- que veluti exulcerata, eas partes per se affectas esse non dubitabis; veluti si simplici expuitione san- guis expellatur, ex ore, seu gingiuis profluit, vt dixi- mus; nec minus sensus diiudicabit. Interim verò accidit vt à capite per gulam, seu stomachum san-

guis in ventrem defluat, vomitque reiciatur, ve- rum præter id quod cuncta iam dicta capitis sym- ptomata præcedunt, sanguis hic levis, æqualis, at- que immixtus erit, nec adeò crassus, & colore ni- gro, & cum excreatione statim se in linguam infert rotundus, facileque reicitur per sputum, ita igitur locos affectos in sanguinis reiectione internosce- re licebit. Affectus verò ipse, quod symptoma sit, à quacunque parte, & quouis modo excernatur, in genere excretorum præter naturam tota substan- tia, seu toto genere à naturali habitu recedens, Ga- leno liquet libro de differentiis symptomatum, quā- uis interdum cum functionum noxa, interim verò citra noxam functionum expellitur, quemadmo- dum si ab aliqua parte in ventriculum fuerit deri- uatus, isque demum vomitione reiectus fuerit: di- stinguere verò id ex eo, quod expurgatur, nunquid tanquam molestum excernatur, seu in tempore, vel non, quemadmodum supra declarauimus cap. de profluvio sanguinis narium. Euenit autem, vt rous modorum reiciatur, aut referato aliquo vasis o- sculo, aut rupto, aut eroso vase, eodem Galeno te- ste, tum libro de differentiis symptomatum, tum quarto de locis affectis, quamuis quinto meth. me- den. per diapedesin quoque sanguinem è vasis pro- fluere posse testatur. At quia id fieri haudquaquam potest, nisi ob exiguarum venarum refectionem, seu rarefactionem tunicarum, vel propter eiusdem sanguinis tenuitatem, feri speciem referentis, pro- pretea (vt idè Galenus asserit, tertio de causis sym- ptomatum) vel ad vasorum refectionem, quam Græci *ἀνασφύων* nuncupant, hic modus proflu- uij sanguinis reduci debet, vel in genere cruentæ excretionis connumerari non debet, quippe cum feri speciem referat sanguis, qui profluit, qualis per iocinoris, renūque imbecillitatem subinde eue- nire solet; quò fit, vt nec quartum genus à iam dictis tribus, sanguis qui per diapedesin transcolatus, seu sudoris modo transmissus à vasis profluit, dici de- beat: profluit itaque ex vasis sanguis, aut eorum o- sculo aperto, aut ipsis ruptis, aut erosis; atque aper- tio osculorum instrumentalis morbus in via est ni- mis patefacta; ruptio verò, & erosio in soluta con- tinuitate continentur. Verum si ex vasorum ruptu- ra fiat ex multi sanguinis fluxione, ac confertim fa- cta deprehendes, id quod vel ex externis, vel inter- nis causis provenire potest, externis siquidem, vt cum aliquis ex alto, vel in ludo, vel certamine ce- ciderit, aut cum alter super alterum cadit, vel ex ina- nimatis corporibus aliquid graue, vt lapis, vel li- gnum hominem offenderit; item si ita cum exclama- tione præcessit; cytharædis quoque, ac tragædis certantibus acuta, vehementique voce vasa interdū disrumpuntur, vbi violenter clamare conantur, nō præmissa pulmonis lenitione per præcedentes ex- clamationes, vt Galenus inquit eodem quarto de locis affectis: interim nulla ex prænarratis manife- sta extrinsecus adueniente causa, vas aliquod, tum in cæteris corporis particulis, tum in pulmone dis- rumpi potest, ob sanguinis abundantiam vel per se, vel vnā cum crudo, & frigido, & statuofo spiritu ve- nas extendente, cum videlicet vas ipsum extensio- ni resistit, aut ob frigus à vicinis partibus contra- ctum, aut ob innatam intemperiem, quemadmodū & ipsa aqua frigida Hippocratis auctoritate venas frangit, 24. aphorism. libri quinti, & tertio de morbis vulgaribus, commentario tertio, tex. 14. Verum nō

Quis præter naturam af- fectus sit, cruenta spui- tio. cap. vlt.

Lib. de dif- ferent. sym. cap. vlt. 4. de loc. af- fect. cap. 5. 3. meth. c. 2. De diapedesin nota.

cap. 2.

Quot mod- is è vasis sanguis per- fluat.

Si ex vaso- rum ruptu- ra fiat, si- gna.

Causa.

cap. 8.

per se ruptiones facit, sed quia venarum tunicas frigiditate sua duras, & extrahi cōtumaces reddit, & ut rumpantur paratiores efficit. Erit igitur ruptionis causa, aut externa, ut quibus vehemens motus, aut humorū abundātia, seu sanguinis copia, ut diximus, utriusque verò commune existit sanguinis effusio repente, & coaceruatim facta. Si vero exeso vase aliquo cruentū sputum eiiciatur, non confertim, sed paulatim per modica intervalla sanguis reiecitur, præcedereque solent sanguinis expuitionē exigua sputa, ut inquit Galenus, atque acres in pulmonem à capite fluxiones, si ab eo sanguis profluat, temporis verò diuturnitate, multi sanguinis intertusculum eruptio sit, ut quinto meth. & quarto de locis affectis liquet, & potissimum si nulla præcesserit expuitionis externa causa, quocirca diligenter cōsiderare oportet, nū quippiam spumofum simul educatur: id enim efficacissimū erit indicium, quod propriū pulmonis parenchyma fuerit exulceratum, haud secus si bronchi pars quædam, aut arteriæ, aut venæ tunica eiiciatur, eadem ipsius pulmonis partes exesæ erūt quemadmodū aphorism. 13. libri quinti, & prædicto quarto libro de locis affectis scriptū reliquit Galenus: præcessit quoque acrium, prauorumque ciborum vsus, vel inedia, Paulo auctore. At si nullū ex prædictis, præterquam plenitudo, interdum cruentum sputum præcesserit, ut inquit idem Paulus cap. 31. libri tertij, verum victus humidior, calidiorque, balnei immoderati vsus, calidi nimis loci inhabitatio antecesserint, fueritque anni tēpus eiusmodi, ut Galenus asserit, & ut summatim dicā, si tales calide dispositiones præcesserint, ex refectione osculorum vasorum, & nō ex ruptione, aut exesione proficisci cruentam expuitionem iudicabis. At ex qua prædictarum causarū sanguinis reiectione fiat, qualiscūque fuerit vasorū affectus, partim ex seipso, partim etiam ex ægri, seu altantium relatione haud difficulter percipere poterit Medicus, qui summa cura prædicti affectus curationem aggrediatur propter imminens (ut inquit Paulus) ex immodica euacuatione periculum; siquidem copiosè euacuatus sanguis quemadmodum in his qui iugulantur, mortem infert præsentaneam, si affectus remanet, in tabem transire minatur. Quod autem cruenta expuitio periculosa sit, decretum reliquit Hippocrates aporism. 25. libro 3. cum dixit, Sanguinem quidem supra ferri qualiscūque sit, malum; intelligens per supra ferri (ut Galenus exponit) eum sanguinem qui per os excernitur. Aphor. verò 37. lib. 7. sic scriptum reliquit, quicumque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: hoc est, ut inquit Galenus, curari possunt: subdit autem Hippocrates, si verò cum febre, malum. At si cum tussi ex pulmone enittatur sanguis, & si quamaxima absque febre fuerit, periculum imminet ne curari possit; & si durarit, omnino postea febres succedent, Galeno teste in commento eiusdem aphorism. Verum si mulier sanguinem euomuerit, menstruis erumpentibus (ut idem Hippocrates inquit aphorism. 32. lib. 5.) solutio fiet. A sanguinis verò sputo, puris sputum malum esse, aphorism. 15. 7. libri dicebat: nanque purulentum sputum (ut in commento ait Galenus) non omne sputum sanguinis sequitur, sed quod malignū existit, tale autem est omnino ex pulmone, ex quo proveniente sanguinis reiectione, ea quæ intra tres dies non curatur, phlegmone deinde adueniente, omnino incurabilis aff-

fectio erit, potissimum si ex erosione ortum ducat, eodem Galeno teste 5. meth. med. Nanque sanguinis euacuatio (Paulo teste) quæ sit exes vasorum tunicis, nunquam commodè cadit, facitque valentem, etiam si ex pulmone non fiat; etenim grauissimè nocet, ut inquit Celsus: quare difficilis est iudicanda curatio eorum, quibus à pulmone sanguis profluat, ex Sorani sententia, & non impossibilis omnino: velut rursus cuilibet patere poterit, sanguinem ex ore, & gingiuis profluentem cæteris minimū periculosum esse, quemadmodum si ex faucibus, interioribusque partibus processerit, & metus maior est, & cura maior adhibenda, eodem Celso auctore, lib. 4. cap. 4. At si ex thorace sanguis profluat, quod minoris sit periculi, quàm si ex pulmone, Galenus quinto meth. med. & 4. de loc. affectis, scriptum reliquit, quo fit (ut patet Celso) quod modò minùs, modo plus periculi habet sanguinis expuitio, etenim ex capite veniens fluor, generaliter est curatione facillimus; ex stomacho, vel ventre, aut faucibus curabiles fluores approbamus: vlceratione facti difficiles curatione ab iis, qui è ruptione fuerint effecti iudicantur: omnium verò difficilis, atque grauior curatione ex pulmone fluens sanguis accipitur, ob iuge spirationis officium, ut liquet apud Cælium Aurelianus lib. 2. cap. 12. Quoniam verò non vnam requirunt cruenta spuitiones victus rationem, ac curationem, sed quodammodo diuersam, propterea cruenti sputi ex disrptione, aut vasorum apertione orti ex quauis parte prius victus rationem instituemus: nanque aut similem aut paucissimis discrepantem vasorum disrptione, ac refectione rationem victus, simulatque curatione expostulat, diuersam verò ab his requirit erosio, de qua ultimo loco pertractabimus. Sit autem eis cruentis expuitionibus, quæ ex iam dictis duobus vasorum affectibus oriuntur, communis, ac proba victus ratio hæc. Aër continens eligatur ad frigidum, & siccum parum vergens, à calido verò, ac humido abstineant: qua ratione austrinos flatus vitent. Somno vtantur moderato, præsertim nocturno, fugiantque diurnum: caputque cubantis sublimè sit, præsertim si ex spiritalibus perfluat sanguis, nec conclaue calidum, & inclusum existat, aut mobile. Alui excrementa quotidie natura, aut arte clysteribus præsertim lenibus excernantur. Conuenit eisdem magnopere quies, securitas, ac silentium, Celso auctore: vitent itaque motum, ac exercitium, præsertim vbi ex spiritalibus partibus sanguis profluxerit; item & magnam, ac frequentem respirationem, imò sensim respirent, semperque silentium agant, ac reliquam omnem quietem eligant, ut Galeno visum est quinto meth. medendi. Animi quoque affectus immodicos, iram præsertim, omnino fugiant, pariterque & venerem. Quod verò ad cibum portionemque attinet, eligendi sunt qui emplasticam vim habeant, & refrigerent, ut eodem loco testatur Galenus; atque si valentior sit æger, omne ferè nutrimentum circuncidendum erit; sin aliter sortitionis quod satis est, exhibendum, potissimum vbi pulmonis vas fuerit disrptum. Quo fit ut Tullianus iusserit omnem cibum, qui prædictis exhibetur, debere vim mediocrem obturanei, ac leuiter adstringēdi habere, & neque quippiam calidum offerre, sed omnia potius sint temperata, & ad frigidius declinantia, etiam actum licet non vehementer, ut inquit Aetius, neque nimium

Si ex vasorum exesione fiat, si gna, & causa

4. de loc. aff. cap. 8
5 meth. c. 6
4. de loc. aff. cap. 5

4. de loc. aff. cap. 5
Si ex refectione fiat, signa, & causa

Prognostica.

Medicamentum non ratio. nu liq bis nis tin. cap. 4. del me. terr. ben. ra fi ficit dica. con. cant. circ. mea. qu. sim.

animaduertendum, nunquid causa ruptionem efficiens defierit, vel adhuc maneat: nancque si defierit, primum sistere sanguinem expedit, post vero (vt inquit Galenus eodem quinto metho. meden.) ruptum vas, aut resectum sanare, eo conglutinato, vel obstruato. Si autem permaneat adhuc efficiens causa, vt potest abundantia, ea quidem primo vacuanda erit; etenim manente ea, vas etiam plus rumpitur, vt resectur; ab hinc sanguis suppressendus, moxque vlcus ipsum vas, vel eius apertio curanda. Desinente itaque effetrice causa, primum sistere sanguinem expedit, Galeni decreto; post vlcus sanare: obturato quidem quod pertruptum est, auerso autem, atque aliorum translatio, quod per id ferebatur; quado si id, eo quo inter initia, impetu confluat, osculūque vas pri modo pateat, citius planē moriatur animas, quod profluuiū laborat, quam sanguis cesset effluere: sistitur porro qui ē vasis profluit sanguis, aut propterea quod amplius non cōfluit, aut quod oclusa diuisio sit, seu cōnueinat id quod resectum est, vel propter vtrūque, vt inquit Galenus eodem libro 5. meth. med. id quod ipse dicit esse tutissimum. Hæ quidem sunt communis curandi indicationes cuiusvis cruētæ expuitionis, ex diuisione, seu apertione vasorum cuiuslibet partis: est insuper & aliud commune omnium internarum partium affectarū, vt idem Galenus quarto meth. meden. asserit, vt ea elegantur, quæ animalis naturæ maximē sint familiaria, siue ea cibus sit, siue medicamenta; fugiantur, respiciunturque huic contraria. Verū quia quæ à partibus indicatio sumitur, ea communibus, quæ iam dictæ sunt curandi indicationibus, veluti auctarium in singulis affectibus accedit, iuxta quam rationem cōtingit & quodammodo curationem variare, ac interim cum prædictis contraria medicamenta miscere, vt patet, ea de re priuatum ex iam dictis causis cuiuslibet sanguinis reiectionis à quavis parte prouenientis, curationē instituere decreuimus: nam si ex ginguis exit, portulacam manducasse satis est, Celso auctore. Si ex ore, continuasse eo merum vinum, si id parum proficit, acetum; si inter hæc quoque grauius erumpit (quia consumere hominem potest) commodissimū est (vt ipse inquit) impetū eius ad mora occipitio cucurbitula (sic vt cutis quoque incidatur) auertere. Si id mulieri cui mensura non feruntur euent, eandem cucurbitulā, incisus inguinibus eius admouere: cōducit autem eisdem oris collucio ex plantaginis, polygoni, ac portulacæ decocto in aqua pluuiā, paucō addito aceto, vel vino rubeo adstringenti, aut succi eiusdē portulacæ, polygoni, aut arnoglosi assumptis vac. iij. cum rosacæ, seu myrtinæ aque libra vna, permisce, & vtare; adas (si lubet) acetū parum. Quod si adhibitis his adhuc grauius erumpat sanguis, quod si auertatur, sanguinem mittere, expedit, loco cucurbitulæ humeralem, aut mediam incidens: aut si mulier sit, quæ laborat, cui mensura non feruntur, in talo venam secare expedit, pari ratione, vt sanguis auertatur. Si verō ex locis circa fauces, aut gurgalionem sanguis feratur, aut per palatum, & gargarizare oportet adstringentibus, frontique & capiti admouenda sunt quæ ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur, Paulo testē: quare sufficiunt adstringentia per collutiones, aut & gargasmata adhibita frigida; nam à calidis, & rarefacientibus collutionibus plus sanguinis erumpit, vt inquit Aëtius, vel ea, quæ

pli. fac. cap.
4. & lib. 9.
cap. 8. &
10.
Quid pri-
mo: an
maduere-
dum sit pro
curatione
cap. 3.

Quid 2. a-
nimadu-
erendum. c. 7

Curatio
cruenti spu-
ti, si ex gin-
ginis prone-
niet.

Sanguinis
missio.

Si ex fau-
cibus pro-
neniat, cu-
ratio.
Lib. 8. c. 59

Loco ci-
rato.
Si ex capi-
te prome-
at, curatio.

Si ob defil-
lationē spi-
ritus cuncta
fiat, cura-
tio.
Paul. lib. 3.
cap. 31.
Aet. lib. 8.
cap. 60.

cap. 13.
Aet. lib. 8.
cap. 60.

Vomitus
sanguinis
curatio.

modo scripsimus, vel ex his, quæ dicimus, componan-
tur; aut ea quæ capite de angina scripsimus, & de
gurgulionis inflammatione huc transferas. Verum si à
capite sanguis feratur, multusque sit, qui defertur,
evacuatione opus erit, ex eiusdem Aetij sententia:
quare citius (vt ipse ait) per nares, aut per venæ ali-
cuius incisionem euacuare oportet, inferens ex eius
verbis, aut ad propinqua deriuandum, aut ad lon-
ginquas partes diuertendum esse, ne per negligenti-
am consuetudo fiat sanguini in hos locos delabedi.
Sin verò plurimus fuerit fluoris lapsus, acacia ex a-
ceto frontis, atque temporum partes illiniendæ sunt,
& perseverante fluore, cucurbita quoque apponē-
da (subiecta flamma plurima) occipitio, ex Cælij
Aureliani sententia. At si ob destillationem, sangui-
nem reiecerint, ad quamcunque partem feratur, aut
quocunque modo excernatur, his venam incidere
protinus in principio debes, vt Paulo, & Aetio vi-
sum est: secato autem humeralem, aut mediam, nisi
vehementer actis humor destillauerit: nanque hu-
ius curatio patebit, cum de erosionem tractabimus:
ac pro viriū modo sanguis detrahatur. Acres quoq;
clysteres adhibeantur, frictionibus multis, manibus,
brachijs, ac cruribus vtantur; ac vinculis extremæ
partes colligentur, postea raso capiti pharmacum
ex stercore syluestrium columbarum impone, quæ-
admodum Romæ in splendida muliere peregit Ga-
lenus vt patet quinto metho. meden. quem demum
sectati Aetius, & Paulus, & ipsi quoque id scriptum
reliquerunt: vel aliud simile, calidum medicamen-
tum capiti imponas; vel candenti ferro inultio in
capite fiat, ex Tralliani decreto: & velut idem Ga-
lenus interpositis tribus horis, in balneum demum
mulierem duxit, ac lauit, deinde caput idoneo pilo
contexit, nutritque eam sola sorbitione, fructus-
que quosdam austeros dedit; deinde cum dormi-
tura esset, recētem theriacam circiter quatuor men-
ses ante confectam tribuit, ad fabæque magnitudi-
nem vesperi rursus eam dedit, quamvis pridie hoc
longè amplius accepisset, & tertio die mane mel
coctum copiose exhibuit, ac reliqua probè mini-
strauit, vt præcitato loco pat. t; pariter & tu simili-
ter affectos curabis. Quod si malum in vetustatem
incidit, cucurbitula quoque occipitio defigenda e-
rit, iuxta Pauli sententiam. At si neque his malum
cedat, reliqua, quæ ab eodem Galeno citato loco,
ac Aetio, & Paulo conscribuntur, commodissime
adhibeantur, quoad curatio perficiatur. His verò
qui sanguinem euomunt (ex Archigenis sententia)
vena quoque statim incidenda est, in cubito supe-
rior, humeralis appellata, etiā si ex hepate in ipsum
ventrem deferatur. Si verò à splene sanguis feratur
ad ventrem ipsum, incidenda vena erit, quæ inter
paruum & annularem digitum in sinistra manu est,
sic nanque probè, ac propriè auxiliaberis. Cæterū
tum cibos, tum potus quodammodo magis adstrin-
gentes, pariter & medicamenta, his qui ex ventre
sanguinem reieciunt, non tamè vehemēter adstrin-
gentes, neque vehemēter actu frigidos præbe. Qua
de re vbi exiguum vas est, quod perruptum est, vel
modicè reclusum, sic vt non multus sit, qui ex eo
profluit sanguis, Galeni auctoritate, eodem 5. metho.
med. ex vino nigro austero, vtilia medicamēta
sunt (præcedente tamen venæ sectione non semel
duntaxat, sed bis, aut ter si opus fuerit) aloë, manna
thuris, pini cortex, lemnium sigillū, ac lapis hæma-
tites: quod si nec genus id vini præsto sit, coquen-

da in aqua sunt (vt ipse inquit) pluuiæ, addo ego, aut
in aqua chalybs ignitus fuerit extinctus, rubri ger-
mina, aut canirubi, myrti, lētici, seu hederæ fructus
quoque, siue cortex, siue germē, maximè coto neo-
rū, itēmq; myrtorū, & mēpillorū, ibi decoquantur,
& (vt summam dicam) omnium quibus adstrictoria
vis inest, idonea præsidia sunt. Sin autem perruptum
vas magnū est, aut vehemēter reclusum hiat, vt pro-
pterea multus profluat sanguis, vtique adstringen-
tibus magis medicamētis est opus, veluti balautio,
hypocistide, rhoë, omphacio, acacia, gallis immaturis,
& malicorio. Ex Aetij verò sententia eis, qui ob
apertionē oris venarū, aut rupturam sanguinē reieci-
unt, ac non tussunt, optimè conducunt acetum,
& portulaca comestæ: efficacior quoque exilit eis
de portulacæ siccis bibitus, aut plātaginis, vel san-
guinariæ; poterit verò cuiusque succi vnc. iij. v. vel
vj. exhiberi. Decoctum insuper radices symphiti, at-
que ipsam quoque siccam tritam, potuque insper-
sam cōmendat Aetius; itē centaury radices drac. ij.
aut lapidis hæmatitis drac. j. aut radices equiseti tā-
tumdem summopere approbat. Cētaury radicē cū
aqua febricitantibus, cū vino febre carentibus exhibet,
lapidē hæmatitē cum succo mali punici; & (vt
summam dicā) curare eos oportet adstringētibus,
& refrigerantibus, pout decretū reliquit Hippoc-
apho. 37. lib. 7. At sanguine in vtriculo grumi in-
star concreto, insit Paulus coagulū potandū esse,
maximè leporinū, aut thymū, vel thymbrā cū ace-
to, vel etiam vacuari debet ex lacte scissili, aut ex a-
loë, vt ipse inquit; in quē vsum si poscā tepidā sor-
beant, nō parum cōfert. Possunt quoque extrinse-
cus profluenti particula, vtriculo videlicet, ioci-
nori, aut spleni admoueri tū adstringentia, tum ci-
tra adstrictionē frigida: verum nec omnino, nec si-
ne discrimine, nec omni tēpore loca, quæ circa par-
ticulam, vnde sanguis profluit sunt posita, refrige-
randa sunt, ex Galeni sententia, eodem quinto metho.
med. imò posteaquam in alia prius loca auer-
teris, non semel tantum, sed secundo, & tertio: si o-
pus fuerit, nec ad vnā duntaxat partē sed ad plures,
nec vno auersionis modo, sed cōpluribus vltis fue-
ris: sanguinis videlicet missione artuū frictione, de-
uinctionēque: tunc nanque circa afflictam partem
tum adstringentia, tum frigida admoueri possunt,
alias manifestè læsos ægrotantes videbis, cum san-
guinē ipsum intro cōpellant, ac venas, quæ in alto
sunt, implere videantur, nec minis quo medicamē-
torum vis ad interna magis penetrare valeat, acetū
cum eis permisceri debet. Quare ventriculi partes
ab extra illiniat ex rosaceo, & melino, aut myrteo
cum aceti modico, aut vino austero: immutetur au-
tem crebrius, ne si exalhiat, rursus ab eis sanguinis
commotio, ac irritaceo quæpiā oriatur: poterit in-
super epithemata in hunc modū parari. Excipe suc-
ci plātaginis, & portulacæ, seu sanguinariæ, aut om-
phacij ana libram j aquæ plantaginis, & rosarū vnc.
viij. aceti vnc. ij. omnibus simul mixtis, fiant epithe-
mata; quæ non minis conferūt, si supra iocinoris
prolienias partes admoveantur, vbi ex his sanguinis pro-
fluuiū ortū ducat. Ex iocinore insuper si fiat, nedū
prædictis, sed solani quoque, aut lactucæ succo vt
poteris, nā in his frigidus est vtendū, vt inquit Hip-
pocrates apho. 23. lib. 5. vnde fluit sanguis, aut fluxu-
rus est, nō ad ipsas, sed circa ea, vnde influit. Si verò
ex refrigeratis spiritus instrumentis sanguinem re-
iecerint, his è velligio venam secare conuenit, ac bis
eodem

eo dem die, & deinde rursus poſtridie bis, Galeni decreto 5. metho. meden. ſi tamen ætas, aut vires non prohibeant, paulatim tamen euacuatio faciendæ erit, vt ad contrarium diuerſio fiat: cuius enim gratia venæ ſectio adhibetur, vt inquit Aëtius: nec minus tempore intermedio, artuum, ac extremitatum partium frictione, & ligatione vtare iuxta eorūdem ſententiam; toti autem pectori ceratum, quod ex taſſia conficitur, poſt alteram ſanguinis detractiōnem, ſecundo die imponendum, mox veſperi, ne ſupra modum calſciat, id auferendum præcipiebat idem Galenus, ac rursus tertio die, ad tres horas imponendum. Cum verò ſpirituū delegatæ partes in naturali temperamento eſſent, & totum corpus vacuatum, diſpermaton ad veſperam exhibebat, non ſemel dūtaxat, eo quod ſomnū conciliabat, ſenſum doloris leuabat, & ſiccandi vim habebat, poſtremo Tabias ægrum dimittebat: loco autem cerati ex taſſia, ac medicamenti, quod diſpermaton appellatur, aliis vtare ſimilem vim habentibus calſciendi, & exſiccandi, ac ſomnum conciliandi, non tamen ſupra modum, quo naturale temperamentum ſpiritus inſtrumenta ſibi ipsis vendicent: mittas quoque & tu ægrum Tabias, in loca videlicet iuxta poſita, ſi Neapoli, vel aliis in locis non valde remotis fuerit æger. At qui ſpiritus vaſis diſruptis, aut eorum oris patefactis, ex quauis alia cauſa ſanguinem reiciunt, incidere iis ſtatim venam cōuenit, cubiti internam, vt Galenus præcipit eodem lib. 5. meth. med. & poſt eum Paulus, & Aëtius: à qua bis, terque poſtea ſanguis eſt detrahendus, paulatim tamen, gratia diuerſi: non enim euacuatione indigent tales, nimirū ab affectione ipſa euacuati, vt inquit Aëtius. Quod ſi cubiti venæ in conſpectum non venerint, etiam ex venis in talo ſanguinem mittere expedit, imò multo magis proficere teſtatur Alexander: nam ad longinquiores partes diuerſio fit. Cuius etiam cauſa ætus omnes fricandi vinciēdiſque ſunt, poſtea verò quàm hæc facta fuerint, primum poſca, tum diluta, tum tepida potui eſt offerenda, quo ſi quis in viſcere trombus, id eſt, cruor concretus latet, reſolutus expiatur, atque hoc nihil verat, bis, terve, ternis horis facere, vt idem Galenus aſſerit: poteris autem ei uſum poſcæ vnc. iij. vel iij. aut ſaltem ij. qualibet vice exhibere. Ab iis verò aliquod eorum quæ tum emplaticam vim habeant, tum adſtringant, medicamentum exhibendum; idque aut ex poſcā diluta primum, aut ex malorum, myrtorumve, vel alicuius cuiusmodi mox dictorum adſtringentium decocto: inter omnia verò pulvis radicis ſymphiti, althææ, vel equiſeti, aut earum decoctum conſert; ſimiliter terra lemmia, bolus armenia, lapis hæmatites cum alicuius (ex prædictis adſtringentibus) decocto magnopere conducunt, Tralliano auctore: nec minus & cunctis prædictis adſtringentibus medicamentis commode vt poteris: illud tamen perpetuò ſeruari debet ex Galeni decreto tum 4. metho. meden. tum 7. de compoſitione medicamentorum ſecūd. locos, quod congruenti meſura prædictis medicamentis, in his qui ex pulmone, aut thorace, aut aſpera arteria ſanguinem reiectant, miſceatur tum calida, tum remiſſum partium exiſtentia; quamvis vaſorum rupturæ, ac reſerationi ſint inſeſſiſſima, gratia ſcilicet diſtributionis ipſorum medicamentorum: etenim adſtringētia, & viſcoſa, ac tenacia ſibi ipsis vias præcludunt, quare opus habent facultate ipsis viam ſtruentē, ac præparantē. Quapropter omnibus me-

dicamentis, quæ thoracis, & pulmonum vlceribus ſunt deſtinata, mel admixcendum erit: eſt nanque ipſum veluti inſtrumentum quoddam digeſtionis eorum in corpus, ac celeris tranſitus, veluti vehiculum, vt patet eodem 4. libr. method. medend. in huncmet uſum poſt venæ ſectionem, & poſcæ aſſumptionem, puluerem ex rhabarbaro ſine ſpica drach. j. vel ſcrup. iij. aſſumentes, mumia gran. v. (ſi ea haberi poterit) vel vj. rubeæque tinctorem gran. iij. vel iij. cum adſtringenti vino rubeo, aut plantaginis aqua, exiguo aceto iniecto exhibemus: ex hoc nanque medicamento nedum concretus ſanguis reſoluitur, ſed foras propellitur, atque expurgatur, ruptumque vaſ, ſeu reſeratum ſanatur. Ex compoſitis medicamentis vtmur trochiſcis eſt ſpodio, aut terra lemmia, ſeu eſt ſuccino: ſimiliter & ſyrupis, myrtino, eſt portulaca, roſaceo, ſaccharoque roſaceo, roſaceoque melle, eſt quibus in commodiorem uſum compoſitum quoddam medicamentum parari poterit, vt Recipe ſyrupi myrtini, & eſt portulaca, ſingulorum vnc. ij. ſacchari, mellisque roſacei ana vnc. j. tragacanthi, amyli vtriuſque drac. j. & ſ. pulueris radicis ſymphiti, terræ lemmiæ, boli armenię & lapidis hæmatitis ana ſcrup. ij. fiat in modum eclegmatis, iubeatque ſæpius id in ore contineri, paulatimque eger ſupinus cubans permittat in aſperam arteriam deſluere, quomodo (vt inquit Galenus) nedum viſ, ſed medicamenti ſubſtantia ſenſim, & paulatim per ipſam aſperam arteriam inſluit, vt 4. & quinto metho. meden. liquet: prædicto quoque medicamento addere poteris (ſi videbitur) drac. j. vel ſcrup. ij. alicuius ex prædictis trochiſcis, vel ſi malit æger in forma ſolida potius medicamentum ore continere, hoc modo paretur, Excipe diacodij drac. ij. boli armenię, corallorū rubeorū, lapidis hæmatitis ana ſcrup. j. pulueris radicis ſymphiti, & terræ lemmiæ, vtriuſque ſcrup. s. tragacanthi, amyli, & gummi arabici ana drac. s. ſyrupi myrtini, aut de portulaca, & ſacchari roſacei ana drac. iij. cū ſaccharo diſſoluto in aqua roſacea, aut myrtilloſū, quantum ſatis ſit, fiat medicamentū in tabellis. Rurſus licet in prædictis inſeſſiſſimum ſit illud genus pharmacorum, quod in tantum refrigerat, vt affectio ſtupeſcat, Galeno auctore 7. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos, tamen etiam hæc quandoque admixcentur medicamentis ad hæmopticos conuenienter paratis, vt quæ altiore ſomnum, ac ſoporem inducant, & commodiſſima ſunt his, qui à tuſſi lancinantur, ſiſtentia nimirum ſanguinem, qui ad effectum vaſ deſertur, atque hoc per ſuam frigiditatem, in quem uſum ſcrup. ij. vel drac. j. philonii perſici, aut romani cū aſtringenti vino, aut plantaginis aqua exhibere ægris conſueuimus, nō ſemel duntaxat, ſed bis, & ter, vbi opus fuerit, virgente videlicet ſanguinis profluuiō, nec prædictis medicamentis cedente: viresque nō imbecilliores fuerint. Forinſecus autem pectori irrigatio adhibenda erit ex vino adſtringēte, cum oleo roſaceo, aut myrteo, ex Aëtij ſententia, aut ſupra id, quod dolet imponenda extrinſecus ſpongia eſt, ex tepente poſcā, vt inquit Paulus, & à ſeptimo die irrigatio fiat cum roſaceo, vel myrteo, vel lentifcinio: cui interim vinum auſterum ſit additum, interim acetum potiſſimum vbi multa ſanguinis fiat eruptio, & in aſtate, robuſto, & carnoſo exiſtente ægro, nec tuſſis adſit, præſertim valida; aut huiusmodi cataplaſma admoveatur, quod ex palmis, acacia, alumine, mali-

corio, symphyto, hordei, & lentium farina apparatus, ut Aëtio visum est, vel iuxta Pauli auctoritatem, ex farina pollinae, & manna thuris cum aceto accommodentur; vel alumen, acaciam, vel malicorium, vel gallam cum aceto, vel palmulas cum polentis, & malis cidoniis in vino austero decoctis adhibeto: aut foliorum plantaginis, portulacae, & sanguinariae manip. j. contundito, additoque mannae, thuris, aluminis, malicorij ac radices symphiti, singulorum drac. j. hordeaceaeque farinae drac. ij. palmularum, & cydoniorum in vino austero decoctorum ana drac. iij. fiat cataplasma cum posca, aut vino austero; aliquando autem acaciam, aloem, aut omphacium cum his permiscere conuenit. At Galenus eodem lib. 5. metho. med. ex melino, rosaceo & pectus maderieri (si aestas sit) vndique, sin hyems, nardino vnguento praecipit: datque veniam, ut aliis quoque emplasticis medicamentis uti possit, si placet: asseritque nonnullos hac affectione laborantes curasse, ad quos statim ut malum senserunt, accessit, quo cruentum adhuc vulnus fuerit, priusquam phlegmonem exciter, nam si ea semel inuaserit, exigua spes est, ut ipse inquit, eius postea glutinandi, in longius tamen trahere potest tempus, potissimum pulmonis vasis disruptis. Quod si resectionem sanguinis vase exeso, ex quibuscunque tandem partibus fieri contingat, per renutritionem erosorum curabitur, Galeno teste 7. de compositione medicamentorum secundum locos: renutrientur autem corrofa (ut ipse inquit) per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignentia (sarcotica à Graecis appellata) ea de re (ut testatur Alexander) non amplius medicamentis, aut cibis admodum adstringentibus, aut acidis, sed potius iis, qui temperare, mutare, & alterare humoris, qui erosionem excitant, acrimoniam possunt, uti oportet, nisi profusior haemorrhagia fuerit: nam tunc iis, quae vehementissimè adstringunt, utendum medicamentis est, quoad vehemens eius impetus frangatur, ut testatur Galenus v. metho. med. Quapropter pituita aegros alere conuenit, aut alica seu reliquis cibis, quibus nihil adsit, aut falsum, aut acidum, imò nulla alia tenuis qualitas, sed e contrario, quae magis implentem, obturantemque ipsam reddere queant, ex mente Alexandri; velut est amyllum frumentaceum. Ex oleribus competunt intybum, cichorium, buglossum, lactuca: procedente verò tempore, ubi vires infirmas habeant, citra salem offerre expedit carnes gallinarum, pullo- rum, caponum, perdicum, phasianorum, starnarum, turdorum, ac reliquarum montanarum auium, interim hedorum, seu castratorum, ut ita dixerim, aut suum pedes cum pituita decoctos assumant; & (ut summam dicam) cibis utantur boni succi, ut diximus qui etiam humoris influentis acrimoniam obtundere, & crassiores reddere possint, potissimum ubi ex acri distillatione, pulmone, seu thoraci erosio fiat; ab acidis, falsis, potissimum veteri caseo abstinentes, licet molli, atque recenti caseo, praesertim caprillo, aut bubulo (ut Alexander inquit) com- modè uti possint, tanquam utili existente. Pro potu aqua utantur decocta cum semine coriandrorum praeparatorum, paucò cinnamomo, aut glycyrrhizae radice; vino quoque (ubi affluerit fuerint) eo uti aquoso, aut parum rubeo, subadstringenti conuenit. Destillante autem acri humore, praesertim ad pulmonem, aut pectus, toti corpori, consulendum erit, quo sistatur erosio, Galeni auctoritate, eodè 5. me-

tho. med. & quamuis Paulus, & Alexander praeci- piat cauere debere sanguinis missionem, praesertim ubi admodum acris fuerit distillatio, nam magna ex parte corpus eorum, qui ex erosione sanguinem reddunt, gracile, atque periculum est, tamen Gale- ni auctoritate freti praecitato lib. 5. meth. med. ubi validi fuerint, multi que sanguinis, iis statim à prin- cipio sanguis detrahendus erit, id quod nec Alexan- der nec Paulus negarunt. At si parum habere sangui- nis videbuntur, id ad quendam succum probiorem, proba victus ratione reduci debent, deinde sangui- nem detrahare poteris: & si res sua fuerit, denudò sangui- nem mittere expedit, potissimum quibus veluti limus quidam vitiosus, & crassus totus fuerit sangui- nis: hoc itaque seruandum in venae sectione erit; verisq; tamen id commune existat, ne multa copia sangui- nis semel extrahatur, potissimum iis qui parum ha- bere sanguinis videbuntur, cumque vitiosum. Sangui- ne verò detracto tum reficiendi agri sunt, tum purgandi, ac rursus post purgationem reficiendi, & potissimum ubi ceu falsilaginem sputum suum sen- tire se aiunt, quamuis longo tempore omnino opus sit, ut Galenus inquit, quo succi huiusmodi corriga- tur vitium. At ubi congestus fuerit vitiosus eius- modi, etsi etiamnum sanguinem non reiciant, ut ab eo praeseruentur, quae acres humores purgare pos- sunt, medicamenta propinanda sunt: prius tamen i- psis alteratis, ac temperatis quodammodo, ex sy- rupi, videlicet violacei, rosacei, ex nymphæa, seu pa- pauere, myrtini, aut de cannis exhibitione cum hor- dei, buglossi, seu borraginis aqua; quorum medica- mentorum copiam, tum capite de distillatione, tum cap. de tussi, conscripsimus. Illud autem perpetuò in eorum exhibitione seruabis, ut quae magis familia- ria, ac lenia sunt eligas, vitæque acriora, calidiora, ac sicciora; quae insuper non semel tantum præbeas, quinimo bis, & saepius, ubi oporteat: nam longo tē- pore (ut diximus) ex Galeni auctoritate, omnino opus est, ut succi corrigatur vitium, potissimum si ex eo in pulmone erosio facta fuerit. Quapropter Galenus eos, qui planè deplorati non sunt, om- nes seruati fatetur per haec tria, per sanguinis vido- licet missionem, purgationem, ea quae caput robo- rant: non enim in huiusmodi affectibus à paruis au- xiliis incipiendum est, veluti Erasistrato visum fuit: nam in morbis, in quibus periculum non imminet, à paruis incipiendum auxiliis est, quod si nihil pro- fecerint, aggredienda maiora sunt: at ubi periculum maximum impendet, à maximis quoque auxiliis exordium est; nam ad ultimos morbos vitima prorsus remedia maximè valere Hippocrates de- cretum reliquit: ea de re non immeritò statim circa initia venae sectione (si nihil prohibeat) ac purga- tione utendum: nec minùs & capiti confestim prospici- endum, ne ex eo in pulmone, aut pectus aliquid defluat, in quem usum cōducit si drac. j. infra scripti pulueris sumatur. Excipit autè feminis hyoscyami, & papaueris albi, singulorum scrup. s. feminum coriandrorum praeparatorum drac. j. corticum thuris- gra. ij. mastiches gra. iij. pulueris hirudinis prepara- ta drac. s. sacchari vnc. iij. tempus autem sumendi est post duas, vel tres horas à cena ante somnum, vel pi- lulas duas deuorè ex pilulis de cynoglossa. Nicolai loco medicaminis, quod diaspermaton appellatur. Ex cerati quoque usu, quod fit ex thapsia, capiti pro- uidebitur, ut testatur Galenus in acri distillatione, ne, vice cuius eo loco quo sagittalis futura coronali

Cap. 8.
Cruentum spu-
ti ex vaso-
rum exeso-
ne, curatio.

Cap. 4.

Cap. 6.
Vitiis ra-
tio.

Medicamē-
torū ratio.
Vena se-
ctio.

e. 13. & 14.

committitur, aut sinapismo, aut ignito cauterio v-
tare, vel si tutius eo vti volueris, quamvis minus
quodammodo conferat, inter primam & secundam
cervicis vertebra locum inuras. Atque hæc qui-
dem Galeno auctore, eodem quinto methodi me-
dendi cap. 14. in principio peragenda sunt: aduer-
sus quem acerrimè Alexander insurgit: asserens ca-
piti adhibenda non esse acriora medicamenta, quæ
ex thapsia, aut columbarum stercore, aut sinapi pa-
rantur, cum magis intemperatum caput reddant,
& quæ ab eo in thoracem, aut pulmonem cōfluunt,
acriora efficiunt: quæ ratione humectantibus po-
tius, refrigerantibusque caput ipsum statim inter-
nitia vti debere præcipit, ac cauenda esse acria, sic-
cantia, & calfacientia, vt quæ intemperiem capitis
adaugeant, & erosionem magis intendant, quàm cu-
rent: fieri enim nequit (vt idem Trallianus asserit)
vt tussis desinat, aut affectus particule non exedatur,
nisi acris, tenuisque ex capite influxus cessauerit, id
quod probè fiet, si quæ refrigerare, & humectare
possunt, capiti admouerimus, propterea rosaceum &
per se, & cum frigida aqua modica admouendum
præcipit: ad balneumque agros ducendos esse; &
cum hoc fiat, rosaceum, vel oxyrhodinum frigidum
superinfundendum. At pace Tralliani dixerim, Ga-
lenum mox circa initia in acri defillatione, acria
quoque medicamēta capiti adhibere, nō quo ipsius
intemperiem, quæ calida quoque est, curaret, verum
vt excrementum, seu superflua humiditas, licet acris,
quæ à capite defluit, partim exsiccaretur, partim e-
tiam ex intro foras traheretur, atque per cutim va-
cuaretur: de eo nanque in principio valde sollici-
tum esse oportet, vt idemmet testis est Galen. præ-
citato libro quinto methodi medendi, vt neque tuf-
siant agri, neque ex capite aliquid in pulmonē de-
fluat: nam si fluat, & tussiant, necesse est & affectus
partes magis extendatur, atque ita temporis spacio
omnino insanabiles fieri, præsertim si pulmo affe-
ctus fuerit. Maius itaque commodum comparatur
egro ex defillationis inhibitione, tum propter eius
exsiccationem, tum etiam reuulsionem, quàm in-
commodum ex eo quod calidam intemperiem præ-
dicta medicamenta adaugeant, quæ postea alteran-
tibus, contemperantibusque, ac leniētibus quibus-
dam medicamentis adhibitis curari poterit: cum
prius quæ redundant superflua in quavis parte va-
cuanda sint, & deinde partis intemperies corrigen-
da, vt apud omnes conuenit medicos, & non econ-
tra, præsertim vbi ea ad partes confluant, in quibus
nisi defluxus inhibeatur, omnino insanabiles affe-
ctus pariunt, veluti in hac, de qua loquimur fluxio-
ne, contingeret. Vbi verò hæc non impederent pe-
ricula, in calida fluxione post redundatium humo-
rum vacationem, ea quæ infrigidant, pro eius alte-
ratione, capiti admouere hæsitaret nemo, & non ca-
lida, cum si caput ex calida intemperie male habet,
talìa medicamenta noceant: vt igitur eius tempera-
mentum melius reddamus, præstat ipsum rosaceo
perungere, atque æstatis tempore præstantius erit,
eo quod ex crudo oleo, quod omphacinum vocant,
componitur, vti: quemadmodum idemmet Galen.
præcipit sexto de Sanitate tuenda, cap. 9. dampnans
medicamentum, quod ex thapsia, & sinapi compo-
nitur, cum ex calida capitis intemperie fluxio fiat,
eosque balneari iubet, frequenti balneo potabilis
aquæ, quo & calidos vapores, qui in capite sunt, euo-
cemus, & totum capitis temperamentum melius red-

damus: nec minus balneum ipsum prædictis libro
quinto methodi med. commendauit, prædicti quo-
que sunt (eodem Galeno teste) qui maxime lac re-
quirunt, neglectoque eo omnium maxime sunt in-
sanabiles, præcipue vbi ex capite aliquid in pulmo-
nem defluit, de quo Alexander, Galenum in hoc se-
ctatus talia protulit verba, Omnes autem lacte v-
tantur, molli recentique caseo, præsertim caprillo,
aut bubulo: neque enim medicamentum, aut cibus,
aut aliud quippiam adeo accommodum ipsis est, aut
utile, atque lac, & qui per initia solo ipso cōstanter
longiori tēpore vsi sunt, omnes in totum cōstane-
runt: assument autem ipsum à balneo aque dulcis ad
vnguem tēperatè calidæ, vtpote iucundissima cum
sit, non modò acres contemperat humores, vt di-
ximus, verum etiam naturam ad explicandam se,
atque ad dulcedinem, quàm præstat, quoque versus
extendendam prouocat, contraria videlicet ratione
iis, quæ sunt iniucunda; ab iis enim recedit, fugitque
ad profundum: inducta itaque capra, in ipsam: in
qua æger iacet, domum expedit, vt quam minimo
tempore extractum ab vberibus lac in aëre ambiē-
te mōretur; propterea quod (vt inquit Galenus se-
ptimo methodi medendi cap. sexto,) celerrimè mu-
tari sit aptum, ita vt calens adhuc ex mammillis in
agri ventriculum quàm ocysimè transferatur: erit
insuper mellis tepidi paucillum miscendum, ex cuius
dem Galeni decreto, potissimum si cui cogi in ven-
triculo solet, erit quoque & ipsum mel, velut instru-
mentum quoddam digestionis ipsius lactis ac cele-
ris transitus velut vehiculum, cum eo, quod nec vl-
ceri nocebit, ex eiusdem Galeni sententia quarto
Methodi medendi, vt paulò ante dictum est. Sit autem
lactis quantitas ab vnc. iij. vsque ad vj. pro diuersa
corporum natura, ætate, & cōsuetudine, ac reliquis:
mellis autem, vel rosacei mellis, quo ipse potius v-
tor, quarta pars, aut medietas vnciæ vnus. Si verò
profusior ex erosione hæmorrhagia accidat, iis,
quæ vehementissimè adstringunt (vt diximus) vten-
dum medicamentis est, quorum copiam etiam
paulò ante conscripsimus, quoad vehemens eius
impetus frangatur. reliquo verò tempore iis quæ
celerrimè erosionem lenire possunt, modicè sic-
cantibus, & ad cicatricem ducentibus vti licet, ex
Tralliani sententia, inter quæ principatum obti-
net lapis hæmatites cum succo polygoni, aut etiam
ex aqua sola tepida, paucò vino, aut lacte exhibea-
tur. Tribuas verò eiusdem lapidis hæmatitis in te-
nuissimum pollinem detriti scrupul. j. aut ij. pau-
lò amplius, minusve, non semel duntaxat, sed sæ-
pius. In eundem vsum conferunt bolus armenia,
aut terra lemnia, si simili modo præbeantur. Sunt
quoque & alia medicamenta simplicia, & compo-
sita, quibus ij curiosè vti debent, quæ siccam, &
acrem qualitatem sustinent, vbi malum prædictis
non cedat, & phlegmone superuenerit: quæ tam-
en non adeò opitulari possint, vt prædicta, ero-
sionem tamen adhuc latius serpere non permit-
tunt, quæ porrò exhibenda etiam ægris sunt, vt lon-
giori tempore viuere possint: nanque ij saltem ex
huiusmodi medicamentis id lucri faciunt, ne (vt di-
ximus) exulceratio vltra progrediat, ac maior
fiat, sed siccata, ac veluti callo durata, longiori vita
frui hominem permittat, quanquam omninò insa-
nabilis sit, vt ex eiusdem Galeni sententia liquet,
præcitato libro quinto meth. meden. cap. 14. & nos
dicemus sequenti capite de tabe.

cap. 14

Eoco citat

Libro 5. me
tho. c. 12. &
7. Meth. c.
6. & alibi.
Cap. vlti.

Περὶ πλευρίτιδος. De laterali dolore seu morbo.

CAPVT L.

INter eos affectus præter naturam, quibus à laxa particula nomen est inditum, vt patet. 2. methodi meden. cap. 2. connumeratur is, qui à Græcis πλευρίτις, à Latinis verò lateralis morbus nuncupatur, quamuis, si verbum verbo reddatur, non minus lateralis, quàm costalis dolor, seu morbus appellari deberet: nam quod à Græcis πλευρά dicitur, Latine nedum latus, verum etiam costas significat. Qua ratione πλευρίτις quoque non magis affectum lateralem, quàm costalem significare poterit, verum quoniam improprie costalis diceretur, cum costæ ipsæ haudquaquam in hoc vitio afficiantur, ea de re potius à Latinis lateralis, quàm costalis morbus, seu dolor appellatur, et si costæ ipsæ tam verè scilicet, quàm nothæ eas partes, quas Latini medici latera appellant, occupent. Quod verò has partes Latini latera nuncupent, testis est Celsus cap. 6. libri 4. cum dixit, stomachus lateribus cingitur, intelligens per stomachum gulam ipsam, id quod etiam significauit cap. 5. eiusdem 4. cum dixit, Fauibus subest stomachus: & cap. 11. eiusdem dicebat, Stomachus interior ad ventriculum fertur. Latera itaque eas duntaxat partes (Celsi auctore) appellare debemus, quæ costis ipsis circumscribuntur, & non eas quas Græci λάρνας, καὶ νεφύρας καὶ λαπαράς, velut quidam intelligi voluit, harum namque partium Latini nullum habent peculiare nomen, præterquàm si illa dicant, vulgò fianchi. Verum quoniam, nō de quolibet laterum dolore hic pertractare intendimus, sed de eo duntaxat, qui acutus morbus est, ac proprie πλευρίτις à Græcis nominatur, vt inquit Celsus: propterea licebit, hunc non dolorem, sed morbum lateralem appellare, quo ab aliis laterum doloribus seccatur. Sunt namque laterum complures partes, præter costas, & cutim: nempe thoracis, & intercostales musculi, cum interni, tum externi: nam duo sunt huiusmodi musculorum genera, vt Galenus inquit quinto de locis affectis, & præter has, ea existit membrana, quæ costas cingit, à Græcis ὑμὲν ὑπεζωδός, καὶ περιζωικός, à Latinis subcingens, seu circumcingens membrana dicta. Quare cum morbum lateralem dicimus, non omnes aut plures laterum partes affectas esse intelligi volumus, sed prædicta subcingentem costas membranam: quamuis vbi ipsa primario affectu infestatur, aliquando inter costalium musculorum, internorum præsertim partes ei consentiunt, quæ admodum & ipsis primò affectis contingit interdum membranam ipsam similiter eis cōsentire. Verum exquisita pleuritis, de qua modo sermonem facimus, erit, vbi cingens costas membrana primario affectu laborat, eodem Galeno auctore, præcitato 5. de Locis affectis. Hæc (inquam) cum laterum pars vna sit, non immerito à parte nomē sumpsit; quæ nihil aliud est, quàm inflammatio eiusdem subcingentis costas membrana, vt libro de constit. artis medicæ. cap. 15. 2. & 5. de locis affect. 4. de causis pulsuum, cap. 8. secundo de crisib. cap. 10. & sexcentis aliis in locis testatur Galenus, quem etiam secuti sunt Paulus. Alexāder, ac Aëtius in propriis cap. Cum autem inflammationem dicimus, nō siccam, sed humidam intelligi volumus, nec vt ortam à sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem obtinente, aut bile dūtaxat, sed ex quouis affluente sanguine, siue optimus fuerit, si-

ue biliosus, siue pituitosus, siue mela ncholicus: namque inflammatio vnaqueque ex alicuius humoris sit super abundantiā, Galeno teste commento aphor. 33. 6. lib. Appellat itaque Galenus interdum inflammationem, ex quouis redundante fiat humore, siue sanguis fuerit, siue alius quispiam, quemadmodum eodem commento, 2. & 5. de locis affect. lib. de constit. artis medicæ. cap. 15. ac secundo de differen. febr. c. 9. & ferè innumeris aliis in locis patet. Hoc itaque modo cum eodem Galeno, cum morbum lateralem, inflammationem subcingentis membranae dicimus esse, inflammationem ipsam significari volumus: ex quibus etiam liquet, quod pars illa lateris, quæ patitur in exquisito morbo laterali, est membrana modò dicta, quæ costis subicitur, quemadmodum secundo lib. de crisibus, cap. 10. quinto de locis affect. cap. 3. libro de constit. artis medicæ. cap. 15. & plerisque aliis in locis scriptum reliquit Galenus: id quod etiam ex nonnullis indicis patebit: nam cum eadem membrana vnum sit ex spirandi instrumentis, necessariò ea oblata, animal difficilem habebit respirationem. Item ex proprio symptomate ipsorum etiam instrumentorum spiritus, tursi videlicet, quæ confestim ea affecta excitatur, tãquam naturale quoddam accidēs, nedum ipsius verum etiam, & reliquarum partiū respirationi feruētium. Insuper ex dolore cum posito eam affectam esse, manifestabitur: sed potissimum ex doloris specie; quoniam pungens erit: namque hic dolor circa membranas potissimum consistit, sentientes siquidem, vt patet secundo de locis affectis, cap. 5. Quapropter subcingens membrana, quoniam neruosa est, & partis affecta substantia firmatur ad costas; quoniam in hac situs est perpesus locus, vt inquit Galen. lib. de constit. artis medicæ. propterea dolorem inuehit necessariò punctorium, cum inflàmata ea sit, longèque extenditur, & latissimè quoque diffunditur dolor ipsæ: quia quæ patitur pars, membrana est, ac ad plurimum spaciū extensa. Quoniam verò nonnulla alia subcingentis membrana affecta indicia sunt, quæ simul & affectum indicant: ea de re ipsius affectus dignotionem aggrediētes, singulas communes notas examinabimus, ac ipsius affectus quoque proprias, qui cum phlegmone sit, vt diximus, morbusque in magnitudine, intemperie, ac soluta continuitate, ea ratione ex necessitate symptomata habebit, tumorem præter naturam, ruborem, ac dolorem: quorum duo, tumor videlicet, & rubor nunc sub sermonem non cadunt: relinquitur ergo dolor solus, qui ad costas firmatur, pungensque sit, vt diximus. Verum dolet homo, quoniam affectus pl. legmone est: atque species doloris punctoria exilit, propter assignatas causas: pulsatorius autem dolor in laterali morbo euenire non potest, vt Galenus inquit eodem secundo de Locis affectis, cap. 3. namque is dolor per affectus inflammatorios sit, in corporibus sensibilibus, propriè & primario affectu existente in ipsis arteriis, aut saltem per consensum affectis, eo quod vicinorū contactu premanantur. Verum subcingentem costas tunicam haudquaquam attingūt arteriæ, & si sensu prædita sit; neque ea inflàmata per contactu eadem premi possunt, sed vbi costis vicina sit, necessario ea ab ipsis comprimitur: arteriæ verò quæ per intercostalia vocata spacia, & per crassas, laxasque laterum partes extenduntur, ac in profundo marginis delitescunt, premi ab inflàmata membrana haudquaquam possunt. Consequitur item inflàmationem

Cap. 3.
Quid per
morbum late-
ralem intel-
ligendū sit.
Lateralis
morbi quid
sit.
Citato c. 3.

2. de loc. af-
fect. cap. 9.
5. de loc. af-
fect. cap. 3.
Pau. lib. 3.
cap. 33.
Alex. li. 8.
cap. 1.
Aet. lib. 8.
cap. 68.

tionem hanc non modò difficultas respirationis in genere, sed in specie, frequens erit, & exigua, Galeno teste, tum quinto de locis affectis, cap. 3. tum libro de constitut. artis medicæ, cap. 15. nam licet inflammationis ratione magna esse deberet, urgente viis prohibet tamen dolor, quominus respirationis instrumenta plurimum attollantur: quo fit, ut respirationis actiones deficiant usu nondum completo; unde ad secundam respirationem pergere citò coguntur itaque spiritus fiat paruus, ac creber necesse est: non autem multò tardus: etenim dolor non ita grauiter vexat thoracem, ut ex Galeno liquet libro 1. de diff. resp. cap. 9. ob motus velocitatem, sicut ob dilatationis magnitudinem. Velocitas enim (quæ circa ipsam actionem fit dolorosa, tamen quia breui tempore omnem motum efficit) minùs thoracem offendit: nanque festinat ad quietem, eamque quam celerrimè assequi cupit, tanquam quæ sola dolorem ex inflammatione lenire possit. At dilatationis magnitudo penitus molesta est, tum propter violentiam motus, tum quod còprimat, & distendit inflammata, & omnibus modis thoracè dolore affligit: ob id igitur plus de magnitudine, quàm de velocitate respiratio adimit. Verum pro ipsa (ob urgentem utilitatem) crebritas generatur: erit igitur in morbo laterali spiratio frequens, parua, non admodum tarda, sed quodammodo celer propter iam dictas causas. Comitatur item lateralem morbum necessario febris, tum ob affectum, tum ob situm offensa particulæ: quippe quæ vicina sit cordi, quorù si absit alterum (ut Galenus asserit lib. de constit. artis medicæ, cap. 15.) non ex necessitate consequetur febris: neque enim si phlegmone digitus doleat omnino febricitant: quoniam à corde longè abest, nec cum subcingentem membranam scirrhus, vel œdema occupauerit. Omni itaque parti, quæ inflammata sit, hæc necessario duo accidunt, calor immodicus, & tensio, eodem Galeno teste, lib. 4. de causis pulsuum, cap. 7. Morbus nanque existit in quantitate primo, & secundo in intemperie ipsa inflammationis, quæ (ubi pars nobilis sit, seu cordi vicina, vel insigni prædita inflammatione) vniuerso corpori impartit ambo: calorem scilicet immodicum, ac tensionem atque immodicum calorem (ex sententia eiusdem Galeni) qui vniuersum corpus occupat, febris est. Non ab re igitur propter assignatas causas, lateralem morbum necessario febris consequitur: itaque pleuriticis ipsis (eodem Galeno auctore) necessario accidit respirandi difficultas, & lateralis dolor, atque hic cum febre & tussi, neque possibile est pleuriticum esse, cui non omnia hæc adsint, ut libro secundo de difficult. resp. cap. octauo liquet. Atqui cum febris adsit, usum pulsus alterabit dilucidè, & partis inflammata tensio peruadet etiam arterias, quo fit, ut pleuriticis pulsus habeant celere urgente usu: & quia neruosa est pars ipsa affecta, insigniter erit, sedum ratione inflammationis, sed ipsius etiam partis affectu: namque neruose partes præter ceteras in inflammationibus tenduntur, ut quæ sint sua sponte etiam tensæ, & quia fortiores sunt, vnà secum partes vicinas intendunt, atque ipsas arterias quo fit, ut propter tensionem duriores fiant, propter duritiæ vero minor erit, quàm febris conueniat pulsus: quare & creber fiat pars est, quod magnos pulsus calor postulet, refragetur autem durities, quantum enim ab usu ab sit magnitudo pulsus, refert crebritas id quod vias deficit. Hæc igitur rectè om-

nes quos ex inflammatione febris corripuit, pulsuum durum: item & ob intemperie arteriarum, inæqualem in vno occursum, quæ si ambo coniuncta sint, existet dubio procul species illa pulsus, quæ veluti ferrat tactum, ut alia pars arteriæ attolli videatur, alia non: eam enim imaginem concepit, qui tangit, ubi inæqualiter instrumentum durum occurrat, quæ inæqualitatis pulsus species, morbi lateralis proprium signum est, Galeno auctore libro de pulsibus ad tyrones, cap. vndecimo, & quarto de causis pulsuum, cap. octauo. Quamuis omni inflammationi communis fuerit, huic autem non ratione inflammationis modo, sed pro loci affecti natura peculiaris magis existit, siquidem partes neruosiore duriores edunt pulsus, magisque ferrantes, & minores, ut patet præcatis locis, atque hæc quoque pulsuum differentia ex necessitate subcingentis membrana phlegmonem consequuntur. Ceterum quamuis tussis ab affectu ipso separari non possit, & creatio tamen post tussim inseparabilis quidem minimè est, sed magna ex parte fit. Verum si excreet, colorabitur sputum necessario, licet non semper eodem colore inficietur, sed pro diuersa natura excrementi in inflammata parte contenti, diuersus excretioni aderit color, ut dicemus in causarum dignotione. Nam cum in inflammata parte multa simul, ac tenuis fuerit humiditas, & ipsa pars rara plurimum ex ea foras effluit, cum verò contra fluxus, paucus, crassusque, & spissum corpus fuerit, minimè ad tussim irritat, & nihil spūit, veluti & cum prouenit copiosissimus, tussium plurimum, nec pauca expuunt, ut patet eodem libro de constit. art. med. Quod verò dolor quandoque ad hypochondria, interim vero ad clauiculam perueniat, causa est, tum læsa natura particulæ, tum inflammatio, quæ dolorem efficit extensuum. Si nanque supernæ partes subcingentis membrana phlegmone confluentur, ad clauiculam perueniet dolor, ut ipsa trahi deorsum videatur, si infernæ, dolor in hypochondrium erumpit. Verum hæc inter assidentia morbi lateralis signa connumerantur; fieri (inquam) poterit admodum parua inflammatio ad medium costarum, ut neutram ad partem efferatur: quandoque verò magna, in qua ad utrâque perueniet, necessario tamen vnum quodpiam ex prædictis consequetur. Ad idem quoque genus assidentium attinet, quod eger facilius in latus patiens, quàm in alterum decumbat: nam euenit interdum, quod minus dolore afficiatur, si in non affectum latus decumbat, interim verò in vtrunque similiter dolor excitatur, licet vnum ipsorum necessario pleuriticis comiteretur, ut eodem libro de constit. art. med. Galenus fatetur. Nanque cum duplex sit subcingens membrana, si pars eius exterior circa ossa valētius phlegmone infestetur, facilius in oppositum declinantur ægri: opprimuntur enim si super affecta cubet parte. Quod si pars altera, quæ intus est (id quod magna ex parte accidere consuevit) in oppositum magis decumbentes dolebunt: suspensa enim ipsius est pars phlegmone vitata, sin in latus perpesum, minùs. Non enim ad ossa comprimitur, nec pendet, sed ab horum vtroque libera euasit, ac super inoffensa parte altera firmata est. At affectis ambabus succingentis costas membranae partibus, super latere vtroque similiter decumbunt. Non ab re igitur inter assidentia signa hæc à Galeno connumerantur, quorum natura est, non esse à morbo inseparabilia, sed

Li. de diff. art. medicæ, cap. 15. Cur dolor ad clauiculam perueniat, & interdum ad hypochondria.

Cur facilius in altero latere decumbat.

Supra & infra.

Ab aliis.

aliquando simul inuadunt, aliquando superueniunt, nonnunquam autem neque omnino veniunt, ut patet commento aphorif. 12. libri primi, & libro de constit. artis med. quoniam ex his sunt, quæ sæpe

Lib. de constit. artis med. cap. 15. 3. de morbis vul. commen. 3. comm. 34. Ex quibus magnitudo, seu paruitas morbi lateralis arguitur.

morbis accidunt, ut idem Galenus inquit tertio de morbis vulgaribus. Ex eisdem verò his omnibus magnitudo, seu paruitas prædicti morbi lateralis desumitur, magnitudo videlicet, seu paruitas in specie sua potissimum: nam velut si ingens fuerit dolor, isque punctorius valde, maxima anhelitus difficultas, valida febris, ac ingens quoque tussis, ascenderitque simul dolor ad iugulum, ac ad hypochondrium pertineat, decumbantque laborantes super utroque latere difficulter, nihilque cum tussi expuant, maximam fore inflammationem indicat, sic si exigua prædicta fuerint, dolor videlicet, febris, anhelitus difficultas, ac tussis, cum qua aliquid expuat coloratum, ac promptè statim, ad neutramque partem dolor efferatur, ac non aegrè sub utroque latere decumbant, exiguam fore pleuritidem manifestabunt: nam species quidem morbi ex propriis accidentibus dignoscitur, magnitudo verò ex eorundem quantitate, Galeno teste tertio de crisisibus. Sunt præterea alij laterum cum febre dolores, per quos inspirationem exiguam reddi necesse est, sed nullum redditur sputum, ut in ea re nihil à pleuritide sine sputo differre videantur. Verum hi faciliè (ut inquit Galenus libro quinto de locis affectis) ab illis discerni possunt: namque in his nulla omnino tussis est, aut fortè exigua valde, illi verò, qui sine sputo morbo laterari laborant, sicca tussis valde molestatur; præter hæc neque tensionem, neque duritiem ullam refert pulsus; item non aequè acuta febre laborant, neque adeò difficulter spirant, pressoque nonnullis eorum extrinsecus inflammato loco dolere sese fatentur, atque hi per sputum non purgantur; quia ab initio nihil eius succi, qui inflammationem excitauit, ad thoracis spacium peruenire solet: verum concocta inflammatione (ut idem Galenus testatur) nisi prius prius discutiatur, ad cutem usque attollitur, atque inciditur. Interim quoque laborantes pulsatorium sentiunt dolorem, ut patet secundo de loc. affect. vocantque iuniores Medici pleuritidem hanc non veram, cum in externis intercostalibus musculis, & non in subcingenti membrana, ac musculis internis illi continuis inflammatio fiat; quemadmodum etià Aëtij auctoritate, cap. ultimo lib. 8. ex cruditatibus plurimis, cibisque crassis, ac pituitosis, velut sunt bulbi, ac fungi, & cõsimiles crudi humores, viscosique, & tenaces in corpore generantur, qui aliquando repenti se in vacuum thoracis locum ingerunt, aut in ipsum etiam pulmonem: qui sua multitudine subcingentem costas intrinsecus membranam distendentes, inferunt dolores, quin etià viam spiritus intercipientes vehementem spirandi difficultatem inducunt, ut imaginatio genitæ inflammationis inexpertis exhibeatur, quem etiam dolorem lateralem consueverunt recentiores Medici, non veram pleuritidem nuncupare; & velut prius dicta nota pleuritidis dicitur ratione partis affectæ, hæc quoque ratione causæ non vera nuncupari posset, quæ quomodo dignoscenda erit, ac ab exquisita pleuritide interstinguenda, idem Aëtius præcitato loco fusissimè scriptum reliquit: namque exquisita pleuritidis causa (Galeno auctore, libro de constit. artis med. secundo de crisisibus, ac secundo de locis affectis, secundo de differ. febr. ac plerisque

aliis in locis) affluens sanguis est, aut optimus, medicocrinusque crassitudinem habens, aut biliosus, aut pituitosus, aut melancholicus, quamuis sæpenumero magis biliosus sit: percipies autem horum quolibet potissimum si expuant, ex diuerso spuitionis colores; namque coloratur sputum pro humoris ratione, qui in parte inflammata continetur. Quapropter rubrum quidem fit; ubi sanguis in subcingentem membranam fluxerit, flauum, aut pallidum, si biliosus fuerit sanguis, spumans, & candidum, si pituitosus; nigrum, aut liuidum, si melancholicus. Ex corporis item temperatura, ætate, ac habitu, consuetudine, ac præcedente victus ratione, necnò anni tempore, regione, aerisque constitutione, diuersis, haud aegrè qualis fuerit redundans sanguis, qui morbum lateralem excitauerit, simul cum prædictis sputis percipere valebis. Ceterum fieri quoque potest, ut ob hepatis inflammationem in notharum costarum loco quispiam doleat, intus videlicet internis vinctis, quibus nonnullorum iecur costas alligatur, ut Galenus asserit secundo de locis affectis. c. 9. atque sic dolor ad subcingentem costas membranam perueniat, ita ut pleuriticus esse videatur. Verum nonnullis notis discernitur, eodem Galeno, ac Paulo testibus: Nam neque in iocinoris inflammatione punctorius aderit dolor, neque pulsus adeò durus, qui & serræ modo tactum fecet, velut in morbo laterali, & si affectus qui propriè iecorarius nominatur, cum iocinoris inflammatione aderit, erunt alui sedimenta similia aquæ, in qua nuper macerata caro fuerit abluta, id quo haudquaquam in pleuritide euenit, ab exigua quoque tussi irritantur qui hepatis inflammatione laborant, eoque perpetuo sicca erit. At thorace affecto tussis increfcit, & eo tempore omnino apparent ea, quæ tussiendo expuntur, Galeno teste, secundo de loc. affect. necnon lingon, facies, & vniuersi corporis color alteratur, iecore affecto, ac pallidi fiunt, decorumque amittunt, Paulo, & Tralliano testibus; aderitque dolor ad nothas costas in dextro laborantis latere, grauatiùs magis, ut iterim egri iugulum ad infernas partes detrahi sentiant. Hisce notis iocinoris inflammationem à laterali morbo interstinguere valebis, quemadmodum Galenus ad Glaucōne philosopho ductus ad Siculum Medicum iocinoris inflammatione laborantem cognouit, quem prius tãquam pleuriticum curauerat Medici, velut quinto de loc. affect. scriptum reliquit. Reliquum est, ut ad prognostica deueniamus, quorum primum Hippocrates aphorif. 8. quinti lib. scriptum reliquit, dum dixit, Quicunque morbo laterali laborantes, in quatuordecim diebus non repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur: prætinuit ergo tempus purgationis morbi lateralis in hoc aphor. Hippocrates, in quo si non fiat, in suppurationem ait verti: & aphor. 12. libri primi dicebat, Si circa initia statim in morbo laterali sputum appareat, morbum breuiat: si verò postea appareat, producit: intelliges per principium non stantaneum, & citra latitudinem, nec prout est vnum de quatuor morbi temporibus, sed prout extenditur vique ad tertium diem: triplici namque modo iam dicto principium ipsum intelligi potest, ex Galeni sententia, tum comment. prædicti aphorif. 12. libri primi, tum primo de crisisibus. Quapropter crudissimum esse lateralem morbum, in quo nihil omnino exprimitur, Galenus asserit, quem incoctam pleuritidem nominat, ita ut vel celeriter hominè rapiat, vel longum

cap. 4. Aliorū lateraliū dolorū signa. Cap. 3.

Loco citat.

cap. 3.

Exquisitè pleuritidis causa.

Li. de constit. artis med. cap. 15.

us, me- 2. aphor. go temporis spacio finiatur, vt quinto de locis affec-
 bus, aut 12. liquet. Secundum ordinem obtinet ille morbus la-
 nune, in 2. de loc. teris, in quo sanies tenuis expuitur. Tertiū, in quo
 quod- 4. de cap. 3. crasior, & quartum, in quo perfectam habet conco-
 tionem. Quod si apparuerit circa tertium, vel quar-
 tionis 9. tum diem, non contingit morbum transcendere
 s ratio- 9. septimum: in aliis verò sanguinis singulis necesse
 propter 9. est, vt pro concoctionis modo mensura tempo-
 gentem 9. ris consequatur: quamuis magna ex parte (vt dixi-
 bilio- 9. mus) lateralis morbus terminus suae iudicationis
 uituto- 9. habeat quartumdecimum, & si non hunc, saltem o-
 Ex cor- 12. maino vigesimum, vt eodem commento aphorism.
 nueru- 12. lib. 1. patet: idque verificauit etiam in Anaxione,
 ani tē- 12. de quo Hippocr. 3. de morb. vulg. scriptum reliquit;
 is, haud 12. quamuis ad trigessimum quartum diem extēsus fue-
 orbum 12. rit morbus, quoniam ab initio non expuebat, sed
 sputis 12. & octauo die adhuc tusses siccae subsequēbantur; vt
 telt, vt 12. Hippocr. inquit eodem loco. Caterum si in pleuri-
 costerū 12. tude pulsus fuerit magnoperē durus, paruus etiam
 us vin- 12. atque creberrimus, indicium erit lethale, ita vt pleu-
 tur, vt 12. riticus cum tali pulsu nemo fuerit seruatus, ex Ga-
 que sic 12. leni decreto 4. de praesag. ex puls. Maximum quo-
 perue- 12. que signum prognosticum ipsius pleuritidis praebet
 nūl- 12. pulsus serenitas: nā si ea remissa sit mollem, & probē
 ulo re- 12. maturandam inflammationem indicat; si vero ma-
 ne pun- 12. gna, difficilem, & admodum crudam, quā si cum im-
 is, qui 12. becilli facultate coniuncta fuerit, periculum, si cum
 latera- 12. firma, aut tarde concoquetur, aut ad suppurationē
 matus, 12. defleat, aut tabidus eam excipiet marcor, ex Gal.
 alui se- 12. decreto lib. de puls. ad Tyrones, & quarto de causis
 a caro 12. puls. Scretario verò sine dolore, citō, promptēque
 tude e- 12. facta mitissimum quidem est pleur. signum; potis-
 ceparis 12. simū vbi permixta appareat cum secretionē ad-
 a erit. 12. modum flaua bilis, Hippocr. auctore, secundo pro-
 ore o- 12. gnost. At si quod expuitur, concoctum fuerit, ad-
 r, Ga- 12. huc magis mitissima erit, Galeno teste, libro de cō-
 m, fa- 12. stitut. art. med. nihil verò expuere exitiale est, par-
 e affe- 12. tim quod fluxum declaret à phlegmone deuinctum
 alo, & 12. partim quod totus (propterea quoniam intus ma-
 as co- 12. neat) corrumpetur. Ex diuerso item excretionis
 gis, vt 12. colore, prout diuersam indicat inflammationis cau-
 ihi sen- 12. sam, possumus indicia prognostica assumere: nā per-
 i late- 12. niciosissimus est melancholicus humor prepollens,
 odum 12. id quod indicabit sputum nigrum, aut linidum: tum
 Sicu- 12. quod & praedictus ipse sit morbus pessimus, & ma-
 oran- 12. xime erodat, concoquaturque agrē, nec facile ex-
 in cu- 12. purgetur, vt Galenus inquit, eodem lib. de constit.
 prum 12. art. med. tum quod plurimā sit caliditatis index; à
 enia- 12. qua astatu, genitus est. At exquisitissimus omnium est
 quin 12. sanguis per cruentum sputum, ac rubrum indicatus:
 mor- 12. vtpote qui dulcissimus existat, & concoctu facillim-
 nrafi- 12. mus. Reliqui verò duo humores inter hos medij
 lis in 12. sunt, quod ad simplicitatem, malignitatemque at-
 i sup- 12. tinent, Morbo verò laterali, si pulmonis inflamma-
 dice- 12. tio superueniat, malum est, ex dictis Hippocr. aphor.
 atum 12. lib. 7. causam reddit Galenus in commento; quo
 reat, 12. etiam loco asserit, quod non admodum consequi
 meū, 12. solet morbus lateralis ad inflammationem pulmo-
 tuor 12. nis. Caterum ex quacunque causa morbus lateralis
 e ad 12. ortus fuerit, pro eius curatione talis instituitur vi-
 prin- 12. ctus ratio. Aer eligatur temperatus, parum tamen
 nia, 12. ad calidum inclinans: nam frigidum nerosi parti-
 tum 12. bus, eiusque affectus est inimicum, Hippocr. auctore,
 esse 12. aphor. 18. lib. 5. dolorem quoque insuppurabilem
 imi- 12. facit. Somno vtantur longiori, quam vigilia, à motu
 den- 12. omnino abstineant, inungendaque quies erit. Alius
 lon- 12. quoque assidue subducatur, lenioribus praesertim

clysteribus, cauendum tamen ab acrioribus. Immo-
 dicas animi perturbationes vitent, irā potissimum,
 metum, ac mœstitiā. Cibus sit quammaximē te-
 nuis, & lenis, praecipueque sorbitio, vt placuit Celso,
 eodem cap. 6. lib. 4. Sorbitio autem ex pituita po-
 tissimum, nihil verò detur (vt ipse inquit) quod aut
 refrigeret corpus, aut fauces asperet: qua ratione a-
 cacia, acida salia, & adstringentia vitanda sunt. Ve-
 rum Alexand. pituita cremorem largiter decoctum
 donec id quod statuosum est, deposuerit, pro cibo
 commendat: quod si humor agrē ducatur, amygdala
 purgata, leuigataque pituita incoquenda commi-
 sceto, vt ipse inquit, quo humor magis educationi pa-
 retur. Cremor item amygdalarum per se exhiberi
 poterit, eiusdem praepro, paulum ei mellis adiciens,
 praecipue si ex pituitoso sanguine pleuritis ortū du-
 cat; commodius tamen erit, eiusdem Tralliani sen-
 tentia, manē pituita cremorem, vespere amygdala-
 rum succum offerre. Nostis verò temporibus ex-
 purgatis, ac confusis amygdalis, cum eis & aqua pa-
 nem decoctum pro cibo exhibemus, aut cum eis-
 dem amygdalis pituitam paramus: & si vires imbe-
 cilliores fuerint, in gallinarum iusculo panis micas
 decoctas pro cibo exhibemus, potissimum vbi a-
 lios cibos ager fastidiat; ex amygdalis quoque &
 saccharo panes quidam dulciarij efficiuntur, quos
 praedictis pro cibo offerimus. Olera vitanda sunt,
 nisi lingua scabra siticulosaque, & febris ingens ap-
 pareant: tunc enim absurdum non erit (vt idem A-
 lexander inquit) aut malua, aut intybi decoctum ex-
 hibere, similiter cunctis pleuriticis dulcia mala de-
 cocta potissimum dari possunt, ea praesertim quae a-
 pia nominamus. Potus sit aqua hordei, vel radicem
 glycyrrizae, seu paucum cinnamomum in ea deco-
 quas: ipsa quoque aqua tepida per se exhiberi pote-
 rit, Alexandro auctore; interim & aqua mulsa, po-
 tissimum vbi ex pituitoso sanguine ortū ducat pleu-
 ritis. Vbi verò paulum morbus se remisit, alimenta
 pleniora, & vini quoque aliquid dari potest, ex Celsi
 sententia: sic etiam vbi vires admodum imbecillae
 videantur instituta autem modo dicta victus ratio-
 ne pleuriticis, differendum primò erit, nunquid pro
 eiusdem morbi lateralis curatione, perpetuò vten-
 dum sit insigni, seu notatu digna vacuatione, quae
 aut per ventrem, aut per venae sectionem fiat? haec
 namque in morbis acutis insignes erunt vacuationes,
 Galeno teste, primo de curatione vict. cui respon-
 sum volo, quod non perpetuò praedictis vacuationi-
 bus vtendum erit pro cuiusvis pleuriticis curatione:
 nam cum laborantis phlegmone partis momentum
 omne consistat, vt Galenus inquit libro de consti-
 tutione artis med. & 13. method. meden. in redu-
 dantis in ipsa sanguinis euacuatione: vacuatio autē
 in his affectibus excogitata est duplex, aut translato
 ad alias partes, qui in agra continebatur, sanguine,
 aut foris à corpore expulso: at qui extra corpus edu-
 citur, aut sensibili effluxu, aut ratione tantum con-
 templabili perficitur. Si igitur fieri poterit, vt qui
 continetur in subingentis membrana phlegmone
 sanguis per halitum digestus, extra corpus educatur
 & proinde pleuritis curetur, frustra quispiam tenta-
 bit validiora auxilia afferre, vnequam sectionē,
 aut purgationem: cum absque iis curari ea possit.
 Probē autem id perficies, vbi exigua pleuritis fue-
 rit, ac mitissima, & in toto corpore humorum non
 aderit redundantia, id quod magnus Hippocrates
 nos docuit libro secundo de ratione victus in mor-
 bus.

Lib. 6. ca. 2.

Loco citat.

commen. 1.
 lib. de consti-
 tutione artis med. c.
 17. & 13.
 metho. c. 9.

sex. 1.

bis acut. cum dixit, lateris dolorem, siue is per exordia fuerit, siue postea obortus sit, tentare calidis fomentis dissolvere, non ab re existit; nempe fomenta calida (vt Galen. in commento inquit) cutim ipsam ad respirationem rariorem efficiunt, inflammationisque sanguinem tum tenuare, tum per halitum digerere consueuerunt; quæ si facta fuerint, non solum sanguinis aliquid euacuabitur, verum quoque & affecta, quæ minus distenduntur partes mitius exinde & manifestius dolentia autem proueniet semper, ubi non addit in toto corpore humorum redundantia, ac morbus lateralis mitis sit: qua curationis ratione ipsemet Galenus testatur quendam agrotum citra venæ sectionem curasse, alius congruentibus remediis vtens, qui morbo laterali, eoque miti laborabat, vt patet sexto de morbis vulgar. similis sententia est Celsus, qui superuacuum esse auxilium sanguinis missionem testatur, si leuior fuerit pleuritis, quemadmodum ferum, ubi vetustior casus sit: Alexander quoque hanc sententiam scriptam reliquit cum dixit, Ne igitur temere sanguinem dimittas, neque purges, vt vulgo faciunt, nisi exquisitè didiceris humorem qui inflammationem peperit copiosum esse, & in toto corpore superare. Relinquo Paulum qui (ubi vires non patiantur) neutrum facere oportere iussit tanquam cuiuslibet Medico notum & Actium, qui de notha pleuritide verba faciens, sic asserbat, Quod si mediocris infestet dolor, & non pungitius, neque addit tussis, neque febris acuta, non est opus magna remedia adhibere. Verum citra controuersiam in vera pleuritide, viribus valentibus, cum Hippocrate, Galeno, ac Tralliano firmiter concludimus (modò mitior sit pleuritis, citra humorum in toto corpore redundantiam) nec venæ sectione, nec purgatione vtendum esse, verum eam curari debere calidis fomentis, ac reliquis medicamentis, quæ digerendi per halitum, cutimque rarefaciendi vim habeant: quomodo autem ea pa-

Nunquid Sed mox queret quisiri debeant, infra patebit. *indifferen-* *ter in omni* *morbo laterali, nulla* *precedente* *insigni vacu-* *atione,* *possumus* *calidis fo-* *mentis uti.* *22.30*

nam nunquid non habita adhuc notitia distincta, quod in toto corpore humorum redundantia non addit, possumus indifferenter calidis fomentis rectè uti, nulla præcedente sanguinis missione, aut purgatione? Cui responsum sit, quod & calidis fomentis uti poteris; nam & ea maximè tibi copiam manifestabunt, vt inquit Alexander, vt pote si fomentis dolor non mitigetur, vt idem Hippocrates simul cum Galen. eodem secundo de ratione victus in morbis acutis tex. 2. scriptum reliquerunt: & proinde periculum faciendum esse iubent calfactionibus, fomentisque calidis; deinde si iis minimè fuerit solutus morbus, quinimò dolorem augeri contingat (propterea quod pars quæ calore afficitur, plus trahit, quàm euaporet) abstinere ab eis oportet: nam quæ calfaciunt suapte natura, hæc vt quod vicinis continetur partibus, digerunt, sic & quod redundat, ex propinquis trahunt. Quare non diutius calfaciendum erit, ubi fomenta dolorem non soluerint; quoniam in toto corpore humorum redundantia adesse indicant: & propterea corpus totum insigni aliqua euacuatione præuacuas, vt Galenus inquit, quemadmodum si fomentum, & sacculorum usu (vt ait Alexander) dolor moderatio euadit, vt etiam æger manifestò recreationem sentiat, copiam non esse intelligito, ac cum fiducia fomentis utitor, & auxilia parti inducito, discuries enim id quod offendit, quodque inflammationem

excitat. Quapropter securissimum erit in omni pleuritide fomentum adhibere, tanquam omnino aliquam afferens vtilitatem, vel vt causa sanitatis, & auxilium corpore non existente pleno, vel tanquam signum ad dignotionem, nec minùs & eo tempore aliquod afferens mediocre leuamè, ex quo nos dispositionem comprehendentes, ad totius corporis vacationem peruenimus, quemadmodum pro curatione doloris oculorum commento aphorism. 31. sexti libri, Galenus decretum reliquit. Cum itaque anceps fueris, ac nondum exactè noueris, num lateralis morbus exiguus, seu mitis fuerit, necne, ac non omnino perperis corpus totum plenum esse, aut in eo humorum redundantiam non adesse, tutò calidis fomentis primò utare: nam vel ipsum sanabis, aut ex eisdem nedum dolor mitigabitur, sed augeri eum videbis, & tunc redundantiam humorum in toto corpore indicantibus corpus totum insigni aliqua vacatione præuacuas, vt diximus ex Galeni sententia. Hac quoque curandi via usus fuit Hippocrates in Anaxione pleuritico, cui adhibitis fomentis primò, cum dolor nihil remittebatur, & febris intenderetur, ac grauius in septimo se haberet, octaua die venam secuit, vt patet eodem tertio de morbis vulgarib. Lateris igitur dolorem, siue is per exordia fuerit, siue postea obortus sit, tentare calidis fomentis dissolvere, non ab re existit, inquit Hippocrates in qua Hippocratis sententia nonnulli alucinantur, opinantes eum talia adhibere medicamenta, non vt eisdem pleuritici curetur, si totum corpus humorum redundantia vacabit, sed vt dignoscatur duntaxat, ac manifesta affectio sit: verum qui talia effutunt, non animaduertunt ignorantiam notam Hippocrati tribuere, qui non nouisset exactè morbum lateralem, priusquam fomenta calida adhibuisset, id quod de tanto viro haudquaquam asserendum erit: simulatque patefaciunt eorum inscientiam in curandis inflammationibus; in quibus momentum omne (vt dictum est ex Galeni mente) consistit in vacatione sanguinis, qui in ipsa inflammata parte continetur: atqui vnum, ac præcipuum vacuantium auxiliorum genus, per iam dicta fomenta calida perficitur, quæ extra corpus educunt sanguinem tenuantia, ac per halitum digerentia: tentat itaque Hippocrates prædictis calidis fomentis dolorem dissolvere primò, vt qui non ignorauerit hac via inflammationes curari posse, ac debere. id quod Galenus confirmauit, libro de inequali intemperie, dū dixit, verum digestio optanda maximè curatio est: de inflammatione loquens. Verum ubi ex humorum in toto corpore redundantia hic curationis modus impeditus fuerit, vt pote si ex iis dolorem augeri cōtingat, immutandus tunc erit curationis modus, ex eiusdem Hippocratis, ac Galeni sententia, id auferens primò quod talem curationem interpellat, aliquo insigni auxilio, venæ inquam sectione, aut purgatione, vel vtrisque: deinde iterum ad calida fomenta rediens, siquid inflammationis relictum sit, eisdem curabis: nam vehementes dolores à corporis vacatione leniendos esse, præcipit Paulus prædictis fomentis, ac sacculis calidis, cum videlicet exactè noueris in toto corpore humorum adesse redundantiam. At si id non exquisitè cognoueris, statim à principio eis utare, ex Hipp. Galeni, ac Alexandri monumentis, simul atque & rationibus prius dictis instructus. Ceterum, ubi in toto corpore aderit humorum redundantia, vt insigni aliqua ipsorum

cap. 1

Ex qua ve
na sanguis
miserendus
sit.

Lib. de cu-
ran. rat. per
venæ sect.
per totum,
præcipue c.
19

Primum
propositum.

Secundum
suppositum.

de rat.
cl. text.
C II.
de rat.
u. vict.
73-74.
C 76.

*Tertium
suppositum.*

valentes vires, quæ modo vacuationis eius respondeant, ad hæc nanque respicientes sanguinem detrahimus, aliàs semel, aliàs bis, vel ter, vel sæpius, ut ipse inquit eodem nono method. meden. cap. 11. Accedit ad hæc, quod licet derivatio semper ad vicina loca fiat reuulsio tamen ad contraria efficitur, non vno duntaxat modo, sed humoribus sursum fluentibus, deorsum reuulsio molienda erit; deorsum verò, si sursum: sin ad dextram inclinēt, ad sinistram, ad sinistram verò abeuntibus, in aduersam partem; intro autem vergentibus, foras: ac rursus foras ruentibus, intro: sic quæ retrorsum fluxiones sunt, reuocabis antrorsum: quæ verò antrorsum, contra retrorsum, quemadmodum cap. de reuuls. Galenus scriptum reliquit, quinto method. meden. cap. 3. & aphorism. 68. libri quinti, fit itaque ad contraria auersio, vel secundum longitudinem, vel secundum latitudinem, aut secundum profundum, in quæ duæ continentur differentiæ, tum ea, quæ est ante, & retro, tum ea, quæ est intus extra: & propterea libro quinto method. meden. cap. 3. eius meminit quæ intus extra, & è contra habetur, & commento præcitati aphorismi eius duntaxat, quæ est ante, & retro, & è contra: cum in vniuersum, secundum tres dimensiones ad contraria auersio fieri possit. Ea verò quæ fit secundum profundum, sub diuersa ratione bifariam considerari valeat: & ne quis temerè pro sanguinis auersione indiscriminatim diuersione, aut derivatione vtatur, idē Galenus (Hippocratis auctoritate, nam & hæc quoque Hippocr. inuenta sunt) tum libro de curan. ratione per venæ sectionem, cap. 19. tum quarto method. meden. cap. 9. & secundo de arte curat. ad Glauconem, cap. 2. docuit nos eisdem vtiliter vti: nam incipientibus fluxionibus, ac toto tempore etiamnum fluxio valenter irruit, ad contraria reuellere studendum erit: in inueteratis autem, ac vbi fluxio ferè iam resistit, expedit magis per vicina deriuare. Neque illud satis admodum esse putes pro reuulsione, aut derivatione perficienda, nisi & hoc potissimum animaduertas, quod eisdem geminam ob causam vti poteris, aut pro auersione duntaxat, ac inhibitionem impetus fluentium humorum, ipsum ad diuersam partem reuocando, vel per propinqua deriuando, quo casu id, quod influit, aut fluxurum est, tantum reuulsione, aut derivatione prohibemus, nominabimurque eas diuersiones simpliciter, si ad longinqua, atque cōtraria, & simpliciter derivationes, si ad proxima sanguis, seu fluxionis impetus per eas conuertatur; de qua simpliciter diuersione, ac derivatione meminit Galenus præcitato libro nono method. meden. cap. 11. quo loco cum tractasset de venæ sectione tanquam vna vacuantium præsidiorum, confestim de ea mentionem fecit, qua vtimur pro reuulsione duntaxat, aut derivatione fluentiū humorum; de eisdem quoque quinto method. med. cap. 3. verba fecit, cum dixit, eas esse omnis immodicæ euacuationis communia remedia, ac propterea ab Hippocrate inuenta: & libro de curandi rat. per venæ sectionem, cap. 15. in immodicis sanguinis eruptionibus, reuulsionis causa venam secare iussit: nā citissimè ex ea conspicuam videbis vtilitatem, si in directum adhibeatur; & tertio prorrheticorum, dicebat, Nempe & nos sæpius auxilium experti sumus venæ inquam sectionem, perspicuè per eam immoderatam sanguinis lationem sistentes: neque enim per eam (ut ipse inquit) vacuationis, sed reuulsionis

*Quantum
suppositum.*

*Quantum
suppositum.*

Coment. 53

gratia sectionem facimus. Quapropter & recto tramite eam fieri præcipit, quod ab Hippocrate *κατ' ἄνω*, dictum est id in super exequendum iussit in inflammationibus ipsis, præsertim circa initio, vbi totum corpus plenum sanguine appareat, secundo de arte curat. ad Glauconem, cap. 2. dum asseruit, Semper enim fluxionis motum ad contrarium trahere expedit. & 13. method. med. cap. 6. indicationem curationis phlegmonarum, quæ adhuc in generatione sunt, priorem vacuatione esse inhibitionem confluens ad affectum locum sanguinis asserbat: nam quæ phlegmonæ adhuc in generatione sunt, earum causas prius abscindere oportet, ut eodem loco patet; & paulò post dicebat præceptum in contrarium auersionis esse in omnibus talibus commune, potissimum si totum corpus male sit affectum: nanque in his ad partes, quæ maximè longinquæ sunt, semper auersionem facies, siquidem longissimè à tentata fluxione parte auellere, nequaquam ad eam trahere conuenit, hoc idem confirmat lib. art. med. cap. 95. inquit, Si igitur vniuersum corpus plus æquo plenum fuerit, per patientem locum minimè vacuandum, neque elaborandum, ut quod influxit, retrocedat, cum corpus plenum non admittat, sed prius totum corpus euacuare oportet, aut omnino ad contraria loca retrahere, quod patienti particulari influit, quo perfectò opere à parte prius repellendum mox dispergendum. Poteris insuper & secundo reuulsione, seu derivatione vti non simpliciter, & exquisitè, pro scopo habens auersionem duntaxat fluentium humorum, aut eorum, qui fluxuri sunt, seu immodicæ euacuationis curationem, sed eum qui in partem affectam continetur, qui insimul cū diuersione, aut derivatione euacuatur. Sed quoniam in huiusmodi diuersione, seu derivatione duo perficiuntur, euacuatio videlicet humoris in parte affecta contenti (& cum is non per eandem partem euacuetur, verum per remotas, aut propinquas prædictæ partis affectæ) insimul cum iam dicta euacuatione, reuulsio quoque seu deriuatio fit; vnde cum mixtum quoddam opus sit, ex vacuatione, & auersione, interim Galenus reuulsiones cum euacuatione, aut vacuationes cum reuulsione nominat & iam ex mente Hippocr. & ut patet commento aphorism. 69. libri quinti, cum ait, Non solum studet Hippocrates vbi opus sit, euacuare, sed etiam reuulsoriè euacuare, seu cum reuulsione; sic quoque libro de curandi ratio. per venæ sectionem, cap. 19. asserbat, incipientes phlegmonas reuulsoriè euacuare oportere: & paulò infra inquit, Quippe reuulsiones cum euacuatione adhiberi magis debent in fluxionibus incipientibus, & libro secundo de ratione victus in morb. acut. Cum igitur (dicebat) superiorum condolentia signum fecerit, venâ in cubito secare eam oportet, quæ sanguinem ab affecta parte, & magis, & velocius tum reuellere, tum vacuare possit. 13. quoque method. med. cap. 11. de curatione inflammati iocinoris verba faciens, hæc protulit verba. Ergo pariter tum reuellendus, tum educendus, qui ad iecur fluit sanguis est, interna in dextro cubito secta vena: interim verò euacuationes eas duntaxat appellat, aut reuulsiones, aut derivationes; iuxta etiam Hippocr. sententiam, quauis improprie sic dicantur, quemadmodum liquet secundo de arte curatiua ad Glauconem, cap. 2. cum dixit. At ex positi indicatio neque ipsa negligenda est: nam per quæ euacuare oporteat, atque quomodo, ipsa

*1. met. c. 2.
1. met. c. 2.*

*Secundum
suppositum.*

Coment. 53

do, ipsa præcipue demonstrat: fluentium igitur humorum retractio (sic enim Hippocrates nominat) eorum autem qui iam membrum obsederunt, deriuatio medela est: & demum subdit; vtrumque autem euacuationis genus per communes venas fieri præcipit: nam proximarum (vt ipsemet Galenus inquit, libro de Constitut. artis medicæ cap. 17.) communiumque affectæ particulæ venarum euacuatio optima est, atque facillima. Neque id mirum videri debet: nam cum mixtum quoddam opus ex huiusmodi reuulsionibus, ac deriuationibus fiat, quod quidem proprio nomine carere videatur: idcirco alias alia Galenus cū Hippocrate vtitur appellatio- ne quemadmodum cum morbos fientes curamus, quæ curatio mista est ex præseruatione, & curatione, proprio carentes nomine, interim præseruationem, nonnunquam verò curationem, quandoque verò curationem cum præseruatione nuncupamus, vt commentò aphorismi 22. libri secundi liquet, & 11. & 13. methodi medendi. Cum igitur non perpatientem particulam ipsam, humorem qui in ea continetur euacuent prædictæ reuulsionibus, ac deriuationibus, sed per alias partes ipsi coniunctas, ac per proximas, seu communes venas, possent haud obsecrè ab euacuationibus appellari, Græcè verò non *ἀναστροφῆς*, sed *ἀποστροφῆς* dici, quo etiam vocabulo vtitur Galenus libro de arte medendi. cap. 95. de cura inflammationis loquens, vniuerso præsertim corpore plus æquo pleno existente: quamuis repellentia quoque medicamenta ex numero eorum sint, quæ per patientem locū minime euacuant, sed per translationem ad alias partes, nam quamuis momentum omne laborantis phlegmone partis (vt prius diximus ex Galeni sententia decimotertio methodi medendi cap. 9.) in redundantis in ipsa sanguinis vacuatione consistat, vacuatio tamen hæc duplex excogitata est, vt ipse eodem loco inquit, aut translato ad alias partes, qui in ægra continebatur; sanguine, aut foras, à corpore expulso; gemina autem est dictarum vacuationum vtræque: quod fit, vt quadruplex in vniuersum oriatur vacuantium auxiliorum genus; nam translationis ad alias partes sanguinis alterum genus est, vt ipsa pars, quæ phlegmone laborat, sanguinem abigit, id quod ex adstringentium, ac infrigidantium medicamentorum appositione perficitur. Alterum genus est, cum hæc quæ integræ sunt, ad se trahunt, ipsis tamen prius exinanitis, aut quomodo libet aliter eisdem ad se trahentibus. Eius tamen quæ extra corpus educit, alterum sensibili effluxu, alterum verò ratione tantum contemplabili perficitur. Hisce itaque duobus modis tam reuulsione, quam deriuatione iuxta Hippocratis, & Galeni sententiam, commodè vti poteris. Verum id neutiquam prætereundum est, ex eorundem decretò, quod velut natura sanguinis eruptione crism efficiens reftitudinem quandam seruat, talisque eruptio summum commodum laborantibus affert, quibus verò contra euenit, nihil iuuat, aut etiam interdum nocet, quod vires scilicet citra morbi leuamen deiciat, atque exoluat. Non enim (vt Galenus inquit libro de Curandi ratione per venæ sectionem, cap. decimo quinto) in liene turgente, ex dextra nare erumpens sanguis, nec in iecore ex sinistra, vllam vni est ex his, quæ requiruntur in perfectæ, & indeficiente iudicatione, vt patet commentò aphor. 20. libri primi. Sic in quâ nos in diuersionibus ac deri-

uationibus seruare debemus, velut Hippocrates diligenter obseruatus, memoriæ prodidit, scilicet *κατ' ἴκην*, hoc est, in reftum, seu secundum reftitudinem ipsas efficientes: nam reuulsio quibus in directum adhibetur, euidentem vtilitatem celeriter ostendit, quibus contrà, haud etiam à membris igitur, quæ è directo sunt affectis partibus, propterea quod viciniore venæ sunt, atque magis è directo, ac plus inter sese communicat, vena secanda erit, id enim per *κατ' ἴκην*, secundo de arte curat. ad Glauconem, cap. 2. Galenus intelligi voluit, redditque rationem 14. de Vsu partiū, cap. 7. ex Hippocratis sententia: quoniam partes, quæ secundum reftitudinem sunt sitæ, necessario plus inter sese communicant, ac fruuntur. Quapropter proximarum, communiumque affectæ particulæ venarum euacuationem optimam esse, atque facillimam idem Galenus asserbat, libro de Constitut. artis medicæ. cap. 17. vt paulò antè diximus & lib. de palpit. trem. rig. & conuuls. cap. 5. scriptum ab eo est, semper à communibus venis sectionem faciendam esse, cum si alias secueris, neque sanabis affectum, perpetuò verò quod est sanum, lædes: id autem potissimum seruandum erit in reuulsionibus quæ pro compescendis immodicis sanguinis eruptionibus adhibentur, quemadmodum lib. de curandi ratione per venæ sectionem. cap. 15. liquet: nec minus & in diuersionibus, seu deriuationibus cum euacuatione, cum diuersione, aut deriuatione, vt patet eodem libro de curandi ratio. per venæ sectionem. cap. 15. 16. & 19. 13. meth. cap. 11. & secundo de Arte curatiua ad Glauconem cap. 2. quo loco tam de diuersione, quam de deriuatione cum euacuatione loquitur; ait enim, Vtrumque autem euacuationis genus per communes venas fieri præcipit Hippocrates, veluti in locis muliebribus in cōcrarium trahes, si eas, quæ in cubito sunt, secueris venas, aut mammillis cucurbitas apposueris, vel manus concalefeceris, & fricueris, atque alligaueris. Deriuabis autem, si eas, quæ in genibus, aut talis, venas diuideris, & cucurbitas coxis applicueris, & crura calefeceris, ac perfricueris, atque alligaueris: & si quidem in parte dextra locorum passio fuerit, à dextra manu, aut crure detraxeris sanguinem: si verò in sinistra, à mēbris, quæ illi è directo sunt, hoc ipsum nanque est, quod ab Hippocrate *κατ' ἴκην* dicitur, perpetuò in omnibus, quæ phlegmone afficiuntur partibus obseruandum, tam pro euacuatione reuulsoria, quam cum deriuatione, prout idem Galenus præcitato libro 13. methodi med. cap. 11. decretum reliquit. In his denique diuersionibus, ac deriuationibus, nedū *κατ' ἴκην*, id est, reftitudinem seruandam esse censemus, verum & maiorem reftitudinem, hoc est, venarum maiorem communionem ac propinquitatem propter iam dictas causas. In reliquis verò reuulsionibus, quæ pro inhibitione duntaxat fluentium humorum adhibentur, sat erit reftitudinem seruare, adeò, vt obliquitas vitetur, appello autem obliquitatem, eam quæ secundum duas differentias aut plures iam dictas affectæ parti opponeretur: vt si iocinore inflammato, ex sinistro crure sanguinem detraxeris: liene verò, ex dextro: aut si dexter oculus inflammatus esset, ex sinistra manu, aut crure: & si sinister, in dextra manu, aut crure. Nam cum venarum distributio obliquè non fiat, sed rectè magna ex parte, aut agrè confluentis ad affectum locum sanguinis fieret inhibitio, aut fortè nequaquā fieret. Quapropter cum opus fuerit huiusmodi

reuulsiōe vti pro inhibitione duntaxat confluentis succi, ea seruanda rectitudo erit, quæ è regione seu diametro parti affecta sit, non secundum duas, aut plures reuulsiōis differentias, sed secundum vnam tantum, vt puta ex sursum deorsum, vel ecotrā, aut à dextris ad sinistra, contraq; ex sinistris ad dextra: sic quoque in reliquis seruandū erit reuulsiōis differentiis, quæ scilicet sunt foris intro, ac retrorsum ad antrorsum: & econtrā: non enim per has reuulsiōes, sanguinem in inflammata parte contentum euacuare intendimus, nec immodicum sanguinis profluiuium cohibere, sed tantum fluxionis impetum coercere, ac ad contrarias, longissimasq; partes auertere, id quod in inflammationibus, quæ in generatione adhuc sunt, ex Galeni decreto decimo tertio methodi medendi, cap. 6. prius exequendum erit, præsertim vbi ex toto corpore, aut aliis quibusdam partibus superfluum alicui particulæ transmittatur, vt in ea phlegmone excutitur, quo fit, vt per quamlibet vnam reuulsiōis speciem, ex iam dictis seruata etiam rectitudine fieri possit; aliàs superflue à Galeno proprio cap. de reuulsiōe, libro quinto methodi medendi, cap. 3. & commento aphorismi 68. libri quinti, conscriptæ fuissent. Idem quoque eodem decimotertio methodi medendi, cap. 5. corpore existente pleno, in cura phlegmones, quæ ad vlcera consequitur, manu laborante, ex cruribus sanguinem mittere præcipit, & altero crurum malè habente, ex reliquo sanguinem mittere: quo loco tum de ea, quæ secundum longitudinem, tum etiā de ea, quæ secundum latitudinem fit, diuisione (vt liquet) mentionem fecit. Nec quicquam valet, si dixeris, in membris extremis id duntaxat veritatem habere, vt quidam sentiunt; nam hoc idem Galeno pugnat, qui secundo de Arte curatiua ad Glauconem, cap. 2. decretum reliquit, Patientibus membris extremis, de phlegmone loquens, à coniunctis euacuationem faciendam esse, siue retrahere velis, siue deriuare, quemadmodum paulo supra de inflammatione iocinore, & liene similiter concluderat. Hoc insuper confirmauit Hippocrates libro secundo de natura homi. ac libro de ossium natur. cum dixit, Operam dare oportet, vt quàm longissimè à locis, vbi dolores fieri solent, sanguisq; colligi, sanguinem mittamus, idque pro reuulsiōe duntaxat perficienda, vt ex eius verbis liquet. Nec obstat, si dixeris Hippocratis dicta veritatem habere in ea præseruatione, cum scilicet periculum imminet ne in futurum inflammatio procreetur, & non in ea, quæ iam orta est, ac in generatione existit: nam par ratione qua per reuulsiōem prohibetur phlegmones generatio in his corporibus, in quibus nondū oriri cœperit inflammatio, ea præseruandū à futura inflammatione: similiter, & in his in quibus in generatione adhuc est, necdū absolutionem nacta sit, per reuulsiōem duntaxat, ne augeatur, prohibetur: idque medicinæ artis parti similiter, quæ futurū morbum præcauet, subiicitur, velut in prædictis atque similiter prophylactice dicitur: quamuis ea purè, syncereque prophylactice dicatur, cum nōdum sensibiliter morbus ex causa gignatur, sed futurus est: in hac verò cum sensibiliter generetur, licet nondum absolutionem nactus sit, prophylactice dici poterit, quamuis non purè, ac syncere: Nam quod generatum ex ea est, id medicinæ artis parti quæ morbos curat, subiicitur, quod verò in generatione adhuc est, parti, quæ futurum morbum præcauet, vt li-

quet apud Galenum eodem vnde cimo & 13. methodi medendi. Vnica igitur indicatio in vniuersis est: asimilis quoque est scopus, nempe inhibitiō sanguinis, ne ad locum qui affici consuevit, aut afficitur, confluat; prophylactice quoque vtrique est, & propterea rectitudine seruata quoad possit, vt diximus, quarumvis vna ex modo dictis reuulsiōis differentiis, pro ea perficienda vti poteris, æstimata tamen tum phlegmones magnitudine, tum corporis totius statu, positioneque partis affectæ, cum qua societas quoque comprehenditur, quàm cum aliis partibus habet, vt patet lib. de Constitut. artis medicæ, cap. 16. Ex his itaque constat quid intelligendum sit pro eo quod ab Hippocrate xar' ἔσθ', dicitur hoc est, secundum rectitudinem: nanque partium è directo positione, propter quam & necessario plus communicant inter se per eorum vasa, ac propinquiores sunt inflammationibus partibus, quàm hæ quæ non è directo sunt positæ, & non intelligendum esse rectitudinem fibrarum quæ in venis sunt, prout quibusdam visum fuit, id quod nec ab Hippocrate, nec ad Galeni sententiam veritatem habere potest, cum eam indicationem, quæ à partium positione sumitur, earumque figuratione, laborantes partes, non quæ similes sunt, sed quæ instrumentales indicent, vt decimotertio methodi medendi, cap. 7. ac nonnullis aliis in locis testatur Galenus: & propterea de instrumentalium partium positione verificatur rectitudo: & non fibrarum, quæ in venis existunt: nam auersionis in contrarium, quæ ab Hippocrate antispassis dicitur, non à substantia, sed à curandi membri positi inuentio præstatur, vt idem Galenus inquit 14. methodi medendi, cap. 8. Ad hæc cum prædicti auctores nouerint fibras in venis contineri, cum non earum rectitudinem seruandam esse in venæ sectione pro diuisione, aut deriuatione statuerint, potissimum Gal. libro de curandi ratione per venæ sectionem, c. 15. & secundo de arte curandi ad Glauconem, cap. 2. ac reliquis in locis, in quibus hoc Hippocratis verbum declarat, de insuturientia proculdubio notari possent. Amplius cum multis medicis liqueat, sanguinis vacuationem scētā venæ, eiusque attractionem consecutione ad vacuum fieri nullum propterea præstabit vnam rectæ venarum fibræ pro eius vacuatione, potissimum cum confluerint, qui venas incidunt, iuxta incisionem, partem ipsam, in qua vena secanda est, dolorosis vinculis aligare, multisq; frictionibus, interim etiam balneis aquæ calidæ, quo maior fiat attractiō ad scētā venam vti, vt propterea minime opus sit venarum fibræ, etiam rectis, in hunc vsum, quinimò nec etiam transuersis, quanquam vsum præstent venarum fibræ pro sanguinis per vniuersum corpus distributione, quò promptius singulæ partes nutriri valeant: sunt etenim communia totius corporis instrumenta, vt liquet 16. de Vsu partiū. His deniq; iactis fundamentis firmis pro venæ sectione adhibenda, ad prædā nostram opinionem, ac veritatem, quam de venæ sectione in pleuritide efficienda sentimus, accedere tempestiuum est. Pro qua audacter, ac citra controuersia cum Hippocrate libro secundo de ratione victus, simul atque Galeno tum eodem loco, tum quarto eiusdem, & libro de Curandi ratione per venæ sectionem, cap. 16. in pleuritide venæ cutibiti internam secandam esse censemus recto à latere dolente tramite. Quod & si ab Hippocrate aperte præcitato libro secundo de ratione victus, non dicitur

2. de natura homi.
tex. 9.
De ossium natur. paulo ante medendum.

dicatur subintelligendum erit nedū ad Galeni, sed omnium medicorum sententiam, idque manifestū scriptum reperitur lib. 4. de Ratione victus, modō Hippocratis fuerit. Expedi enim iam dictā venam secare, quoniam, vt inquit Galenus, partem eā quā phlegmone obsidetur, tum eceleriter, tum quā ceteras partes magis in acutis præsertim morbis vacuare contendimus. At sectio prædictæ venæ (vt idemmet testis est) sanguinem ab affecta parte, & magis, & velociter, tum reuellere, tum vacuare potest. Vt igitur optima sit, atque facillima inflammata partis euacuatio, à proximis, atque communibus venis ea perficienda erit, atque prædicta interna cubiti vena è directo laborantis lateris, & maiorem communitem, atque propinquitatem cum affecta parte habet, quā reliquæ, per quas posset sanguis ab affecta parte tum reuelli, tum vacuari. Non ab re igitur si cum reuulsione sanguinem qui in inflammata parte continetur, vacuare contendimus, eam incidas venam oportet: eritque sanguinis vacuandi terminus coloris mutatio, vt ex eodē Hippoc. scriptum est, afferente. Neque vt copiose sanguis detrahatur est cunctandum, sed eoulsque auferendus, donec rubidior multo, vel pro puro, rubidiorque liuidus fluxerit: redditorque Gale. rationem dictorum Hippoc. tum eodem 2. de rat. vict. tum lib. de cur. rat. per venæ sect. cap. 6. nā alius est qui in phlegmone continetur sanguis, quā qui secundum naturam, vt potest plus excafactus. Quapropter si antea crudior erat, rubrior modō, & flauior efficitur: sin eiusmodi prius fuerat, liuidior erit, aut ad atredinem vergit pro maiori, minorive affatione, seu aduisione. Coloris igitur mutatio, sanguinis ex particula inflammata translationem sufficienter demonstrat: & propterea hic erit modus vacationis, atque mensura, quæ affectui peculiaris existit, siquidem signum constituit Hippocr. assumpti in sectam venam ex phlegmone sanguinis mutationem in eo apparere; quem sectatus Galenus, pari ratione pro reuulsione simul cum vacatione perficienda in pleuritide lib. de cur. rat. per venæ sectionē, cap. 16. dicebat. Quin & pleuritis, quæ è directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio, clarissimam sæpe utilitatem attulit, quæ verò ex brachio opposito, aut omnino obscura, aut certe post temporis intervallum. Nemo itaque vereatur vbi simul vnica venæ sectione, tum reuellere, tum vacuare velit, ac possit in morbo laterali venam cubiti internam secare, quæ è directo laborantis lateris sita est: ea verò non apparente, eiusdem cubiti mediam: quod si nec ea appuerit, humeralis incidatur, prout Galeno visum est, eodem secundo libro de ratione victus in morbis acutis, eritque huius venæ sectionis vacuandi sanguinis terminus, eiusdem (vt diximus) coloris mutatio. Ceterum quoniam non omni ex parte cuncta vena in pleuritide, vt Galenus inquit, eodem lib. de cur. rat. per venæ sectionē, cap. 14. imò verum est, vbi antequam existat, cessare cōueniat, idque duplici nomine, vt ipse asserit, ob infirmas vires, quæ tantam copiam vacuare prohibent, aut ob phlegmones prauitatem: namque interterdum nihil ab ea mittitur, sed inibi sanguis fortissio duntaxat, & non reuulsio, & euacuatio simul fiet: propterea non ab re in dubium venit, num perpetuo seruandum erit in cura pleuritis, quod ea

incidatur interna cubiti vena, quæ è directo laborantis lateris sita est: vel liceat interdum à reliquis partibus sanguinem mittere, etiam pro reuulsione duntaxat, perficienda: Pro quo animaduertendum, quod præter iam dictas duas præcipuas causas de pleuritide traditas, nonnulla alia sunt, quæ multam simul copiam sanguinis euacuari prohibent, etiam si affectus id indicabit, velut scriptum reperitur apud Galenum tum lib. de cur. rat. per venæ sectionem, cap. 14. tum quarto de ratione victus in morbis acutis. primo de arte curand. ad Glauconem & reliquis plerisque locis. Ea sunt, laborantis temperies cum calida scilicet, & humida fuerit: nam suapte natura corpora hæc promptè diffilantur, qua etiam ratione, & pueris ipsis cum videlicet pubertatem attigerint, quod ad ætates attinet, minus detrahimus, quā plenitudo, seu affectus commonet: dixi autem non inconsulto, cum pubertatem attigerint, ne quis opinetur admisisse Galenum veris pueris venæ sectionē vsque ad 14. annum, interdicit enim eis vbique locorum eam: & proinde cum dicit libro de cur. rat. per venæ sectionem cap. 13. Quod minus detrahimus, quod ad ætates quidem attinet in pueris, de eis intelligendum erit qui pubertatem attigerint, sic nanque & eodem libro parum ante præscripta verba eos nominauerat: etiam post decimum quartum annum. Quod verò ad corporis habitus, in candidis, & quibus mollis, teneraque est caro, minus etiam detrahimus. Similiter in regionibus, anni temporibus, ac ætatis constitutionibus immodicè calidis, aut frigidis largam vacationem fugimus, licet cuncta hæc sub virium imbecillitate ferè contineantur. Cum itaque tot sint, quæ exquisitam venæ sectionem fieri impediant; audacter asserimus eandem internam cubiti venam è directo laborantis lateris incidi debere, eaque non bis duntaxat, sed ter, & sæpius, vbi opus fuerit, etiam reuulsione tantum gratia, cum aliquod ex prædictis vsque ad coloris mutationem fieri prohibeat: quamuis ex ea (vt Galenus inquit) parti quæ phlegmone obsessa est, minus futurum sit auxilium: modò fluxio non valenter irruat, velut consuevit in primis morbidiebus, aut corpus totum non sit ex æquo plenum. Verum vbi ea vehementer irruat, aut in corpore toto humorum adsit redundantia, cum debilitate virium, nullo pacto pro reuulsione duntaxat eiusdem lateris venam primò in cubito secandam esse putamus, sed ad partes, quæ maximè longinquæ sunt, diuertere prius oportet, atque magis in aduersum trahere, seruata tamen perpetuò Hippocratis rectitudine, quæ in reuulsione duntaxat efficienda seruari potest, ac debet; vt potest quæ non secundo duas, vel plures, sed vnā tantum reuulsione, seu oppositionis, differentiam fiat. Nam quamuis ex ea minus sequatur auxilium laboranti particula, multo tamen securius existit, cum non ad ipsam per hanc venæ sectionem fluxio, magis proritetur, ac trahatur, quemadmodum si ex eodem latere venæ sectio fieret; imò ipsa per eā inhibetur, cum ad partes, quæ maximè longinquæ sunt, attractio fiat. Ad nanque perpetuò seruari oportere in cunctis venæ sectionibus, quæ tantum pro reuulsione adhibentur, ac fluxionum inhibitione, ex paulo supra conscriptis auctoritatibus Hippocr. ac Galeni constat: & Aëtius lib. 5. cap. 100. Illud confirmauit, cum de doloris curatione verba fecit, inquit, Si quid igitur multitudo fuerit quæ disten-

Cōmen. 19.
I. ad Glau.
cap. 14.

2. de rat.
vict.
cōmē. 10.

Quid non
perpetuo è
directo la-
borantis ve-
næ sectio-
ne faciēda.

dit, viribus fortibus existentibus, vena secetur, & ex magna vena, inflammare aut dolenti parti propinqua, sanguis auferatur. Si vero debiles fuerint vires, reuulsio fiat, & deriuatio sursum, aut deorsum, aut vtrinque, aut per frictiones. Nec vtiq; Galen. illud negauit in morbo laterali, cum lib. de cur. rat. per venæ sect. cap. 16. dixit, Quin & pleuriticis, quæ è directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio, clarissimam sape vtilitatem attulit, quæ verò ex brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certe post temporis intervallum. Nunquid aliud voluit per hæc verba significare? nisi quod clarissimam vtilitatem affert venæ sectio è directo laborantis lateris adhibita? nāque per eam celeriter clarissima vtilitas ægrotanti affertur. Sed quoniam nouerat iam id obseruari perpetuò haudquaquam posse, propter eas quas prius tradiderat causas, quas etiam modò narrauimus, sape id dixit obseruari debere, & non semper, vsus verbo *πολλὰ δὲ*, & non *ἀεὶ*; subditque demum cum id obseruari non potuerit perpetuò, quod licet non tantam afferat vtilitatem, nec ita celerem, nec ex brachio opposito fieri debet, cum dixit. Quæ verò ex brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certe post temporis intervallum: frustra namque apposuisset verba hæc, nisi quandoque ea vti deberemus; præsertim cum prius secta vena ex eodem latere, sape, & non semper clarissimam vtilitatem attulisse dixisset. Accedit ad hæc, quod & conferre confitetur venæ sectionem ex opposito brachio, quamuis obscura sit conferentia, aut post temporis intervallum; idque non præter rationem. Nam cum per hanc venæ sectionem reuulsio tantum fiat confluentis succi, qui in ea continetur, nec propterea dolor confestim sedetur: ea de re rectè Galenus inquit, per hanc venæ incisionem obscuram fieri, aut post temporis intervallum ægrotantibus vtilitatem; relatione ad eam, quæ è directo laborantis lateris efficitur, pro reuulsione simul, ac euacuatione. Hoc idem confirmauit Aëtius, qui lib. tertio, cap. 12. ex Galeni sententia pro reuulsione, simul ac euacuatione perficienda, venam è directo laborantis lateris secandam præcipit: lib. verò 8. cap. 68. (ex Archigenis monumētis) venam incidere oportet, inquit, ut dictum est, in brachio, non eo quod recta ab inflammato latere procedit, sed opposito. Sanguinis autem multitudo non vsque ad animi deliquium extrahatur, sed modicum extrahere oportet, & post sufficientem temporis interapedinem, rursus repetita incisione modicū auferre. Quo loco venæ sectionem adhibendam esse pro reuulsione duntaxat perficienda, putandum est, cum non liceat tantum virum sibi met pugnancia conscripsisse, ut quidam volunt: quamuis in vtriusque locis secundum mentem aliorum loquutus fuerit, Galeni scilicet in vno, Archigenis in alio. Ex opposito itaque brachio venam interdum secandam esse reuulsione tantum gratia in morbo laterali, cum in generatione adhuc sit, fluxio valèter irruat, aut corpus totum humoribus plenum fuerit, ex Galeni, ac Aëtij sententia liquet; cum videlicet laborantes vnicam venæ sectionem, quæ vsque ad coloris sanguinis mutationem fieret, pro reuulsione simul, ac euacuatione, propter aliquam ex prædictis causis, ferre non valeant: namque in his inflammationibus, quæ in generatione adhuc sunt, prior vacuatione inhibito facienda est confluentis ad affectum locum sanguinis. Quapro-

pter longissimè à tentata fluxione partē auellere, & nequaquam ad eam trahere conuenientid autem potissimum seruari debet, ubi à toto, vel reliquis eiusdem partibus, superflua affecta parti transmittuntur. Semper etenim fluxionis motum ad contrarium trahere expedit: dicebat idem Galenus 2. de arte curat. ad Glaucō. Si verò fluxionis causa ex ipsa parte quam phlegmone vexat, oriatur, utpote quæ calidior sit facta, aut dolore vrgetur, quippe satis constat eiusdem Galeni præcepto 13. metho. menden. affectum illum principio tibi esse sanandum, & mox quicquid iam phlegmones factū est: nam semper quæ phlegmonæ adhuc in generatione sunt, earum causa prius abscindere oportet, ut eodem libro patet. Quapropter toto (ut inquit) celo, (ut mea fert opinio) errarunt, qui iuxta Galeni doctrinam voluerunt perpetuò pro cura pleuritis eiusdem lateris venam incidendam esse, freti ex paulò ante dicta auctoritate ipsius, in qua (ut cuiuslibet patere poterit) à Galeno perpetuò id seruandum esse non præcipitur: quamuis sapius dixerit, vtilitatem clarissimam eam afferre imò, propterea quod sapius dixit, id semper obseruari noluit, ac si dixisset, quandoque ex ea vtilitatem non prouenire, imò potius laboranti incommodum, veluti si fieret, redundantia in toto corpore existente, circa morbi initia, fluxionēque valida irruente, & vires, aut quodpiam aliud ex prædictis vsque ad coloris mutationem eam fieri prohiberent: quo casu, satius, imò tutius erit, iuxta eiusdem Galeni decreta ex opposito brachio sanguinem mittere reuulsione tantum gratia, quamuis ex ea inflammata parti minus futurum sit auxilium, quæ ad contrarium iuxta latitudinem fieret, ut si iuxta tali venas, è directo tamen laborantis lateris venam incidas, per quam reuulsio duntaxat fiat, secundum longitudinis oppositionem, potissimum, quibus hæmorrhoides, aut mensēs detenti fuerint, à qua confestim eadem die, si vires permiserint, aut in sequenti eam incidas venam in cubito, quæ è directo est laborantis lateris, etiam si per eam reuulsio tantum fiat: nam quanto maiorem in numerum particulares auxeris detractiones, tantò reuulsionem efficacior em effeceris, ut Galenus inquit eodem libro de cur. rat. per venæ sectionem. Et propterea facta prima venæ sectione ex opposito cubito, aut eiusdem lateris erure, statim ad secandam (ut diximus) eiusdem affecti lateris in cubito venam deuenias, eamque non semel incidas, imò bis ter, ac sæpius, ubi opus fuerit, repetas, si quid non prohibeat; quoad sanguis qui in obfusa phlegmone parte continebatur, per eam vacuetur; id quod dignosces præcipue, ex eiusdem sanguinis coloris mutatione, ac doloris sedatione. At mox deerit, quæ nostram hanc opinionem impugnabit, asserens, quod si sectio venæ è directo laborantis lateris pro reuulsione duntaxat interdum adhibeatur, & ea ab affecta parte reuellit, ut palam constat, cum ipsa à morbis non prohibeatur, etiam existere in toto corpore plenitudine, ac valenter fluentibus succis ad affectam partem, præcedente tamen oppositi cubiti, aut eiusdem lateris circa talum sanguinis missione, eam pari ratione etiā à principio nulla facta in reliquis partibus remotionibus venæ sectione, pro eadem duntaxat reuulsione perficienda ipsa non incidenda erit: Cui responsum volo, quod licet per sectionem venæ in cubito è directo laborantis lateris interdum reuulsio tantum perficiatur, ut prius diximus

Loco citato.

non hinc
et alibi
et alibi
et alibi

cum est, tamen si tempore quo fluxio valenter ir-
 ruit seu corpus multis humoribus refertum sit, vt
 saepe contingit, pro reuulsione duntaxat ea incida-
 tur, maius affert agrotati incommodum, quam cō-
 modum: nam inanitis per venæ sectionē venis bra-
 chij eiusdem lateris, cum viciniore sint affectū par-
 ti, quam reliquæ, quæ in opposito brachio, aut eius-
 dem lateris crure existunt, irritatur quidem per eam
 ad affectam partem humorum defluxus consecutione
 ad vacuum ipsi attrahētib. Nec quicquam
 valet, si dixeris eas potius a parte phlegmone obse-
 sa trahere, quam reliquis partibus: nam præter reli-
 quæ, quæ dici possent, illud tantum satis esse puto,
 quod apud Galenum legitur 3. de natur. facul. quod
 in successione ad id quod vacuatur, quod leuissi-
 mum, tenuissimumque, prius ei quod vacuatur suc-
 cedit, quam id quod grauius est, & crassius. Atqui
 crassior est qui in parte phlegmone obseffa sanguis
 continetur, inibique fortiter constrictus, nec leui-
 ter in eiusdem spaciis inanibus impactus, ac ex valis
 ad eadem effusus, & proinde agrius, quam a ceteris
 corporis partibus ab inanitis venis trahitur: quod si
 velis saltem a naturali facultate vasorum eum fan-
 guinem trahi, quid stultius, cum id quod familiare
 est, & non alienum (velut sanguis, qui in inflamma-
 ta parte consistit) ab attractrice facultate propius
 trahatur? Potius itaque attrahit venæ sectio hæc ad
 inflammata partem quam reuellit, si in princi-
 pio nulla facta à iam dictis remotioribus partibus
 venæ sectione adhibeatur: & propterea magnopere
 vitanda erit, nisi pro reuulsione simul, ac euacuatio-
 ne adhibeatur, aut pro reuulsione duntaxat vbi cor-
 pus totum plenum non fuerit, seu post primos mor-
 bi dies, cum fluxio non vehementer irruat, quem-
 admodum ex his, quæ supra diximus, liquet: tūc et-
 nim nec fluxio irritabitur, & promptius sanguis in
 affecta phlegmone parte cōtentus, per eadem vasa,
 per quæ erat effusus, remeabit, si eum quoque eua-
 cuare tentabis cum reuulsione per iteratam venæ
 sectionem, modo nullum eorum quæ diximus, eum
 euacuari prohibeat. Verum vbi corpus totum vi-
 tiolis quoque scatet succis, ac recrementis ple-
 num appareat, & circa imas potissimum thoracis
 partes dolor excruciet, nec dolor per venæ sectio-
 nem adhuc conquiescit, à venæ sectione, alius ne-
 dum clysteris, verum etiam purgantibus medica-
 mentis subducenda erit, ex Tralliani sententia
 cap. 1. lib. 6. modo vires valeant: nam si imbecillio-
 res fuerint nedū leuibus clysteris, verum etiam a-
 crius vtendum, Paulo auctore. Et si paulo ante
 cum Galeno medicamenta purgantia nulla præ-
 cedente venæ sectione quodammodo propter tra-
 ditas causas, vitauimus: nam tutius esse fatemur sem-
 per in morbo laterali, qui euacuatione totius cor-
 poris indiget, venæ sectione primo vti, non nega-
 uimus tamen post venæ sectionem, interdum pur-
 gans medicamentum posse conferre, cum scilicet
 adsint ea, quæ modo diximus. Verum ea eligenda
 impendant prænarata à Galeno pericula non
 uunt, de quibus Aëtius lib. 8. cap. 68. sic scriptum re-
 liquit, Alius autem assidue subducatur, in maximis
 præsertim doloribus, sed tamen cauendum ne for-
 miora solutiva exhibeantur. Hæc inquam purgantia
 medicamenta tempore, quo Galenus vixit, vbi e-
 rant, quæ cane peius & angue fugienda sunt pro cu-
 ra morbi lateralis, propter causas superius assigna-

tas. Verum eis potissimum vtendum erit, quæ le-
 niendo purgant, aut per tussim repurgationi opi-
 tulantur, aut saltem non aduersentur. Ea sunt hoc
 nostro æuo, calsia fistula, manna, saccharum viola-
 ceum, aut syrupus ex pluribus infusionibus violarū.
 Diaprunum non laxatiuum Nicolai: quibus etiam
 interdum pro ratione redundantis succi admiscere
 poteris, aut diacatholicon, aut rhabarbarum, vel a-
 garicum: quantitas autem istorum lenientium iam
 dictorum ratione, exigua sit, oportet. Nec Galenus
 illud negasse videtur, quamuis ante venæ sectionem
 cum prædicta non concurrant, purgans medica-
 mentum vitauerit; simul etenim cum Hippocrate 4.
 de ratione victus in morb. acut. venam primò secan-
 dam esse, & deinde purgans medicamentum exhi-
 bendum in internis inflammationibus, & nō ē con-
 trario decretum reliquit, idque secure, & mediocri-
 ter porrigendum inquit Hippoc. vbi vtroque indi-
 geant auxilio. Redundante itaq; bile, ex calsia fistu-
 la vnc. ij. & s. & diapruni lenitiui vnc. s. & bolus con-
 fici poterit: post cuius assumptionem vnc. ij. vel vnc.
 ij. & s. manna dissoluta in infra scripto decocto tri-
 buere poteris, quod recipit hordei mudi drac. ij. flo-
 rum borraginis, & violarum, singulorum drac. ij. ra-
 dicis glycyrrhizæ drac. j. vuarum passiarū mundatarū
 drac. iij. adiantū drac. j. & s. iuuubarū, num. 4. bulliat
 secundū artem in aqua fontana: deinde vnc. iij. vel
 iij. eiusdem decocti assume, in quibus iam dictam
 mannam dissolvas. Si autem æger (vt pleriq; solent)
 calsiā fistulā assumere abhorreat, cum eadē man-
 na diapruni lenitiui vnc. s. ac rhabarbari optimi vigo-
 rati infusi in parte prædicti decocti, ac per lineum
 linteiū transfusi drac. j. misceantur. At si pituitosus
 fuerit redundans, in vice diapruni lenitiui cum calsia fi-
 stula vnc. s. diacatholicon, & agar. trochil. drac. j. ad-
 das, sicq; bolū conficias: aut si portionem potius al-
 lumere eligat, prædicto decocto ficus aridas ac pal-
 mulas ij. vel iij. & hyssopi drach. ij. adicias: in cuius
 decocti quantitate, quæ satis sit, agarici trochil. dra-
 j. vel scrup. iij. leuiter decoquantur, in quo iure vnc.
 j. & s. calsia fistula, aut ij. mellis roridi dissoluantur,
 cum vnc. s. diacath. Pari ratione si atra bilis redunda-
 bit, decocto addendū erit fenæ, & epithymi, vtriuf-
 que drac. ij. in quo demū dissolvas drac. j. & s. aut ij.
 calsia fistula: cū vnc. s. aut drac. vij. diacath. aut loco
 calsia fistula, manna vtare, potissimum si ea abhor-
 reat laborantes. Nec minus loco manna, præsertim
 pauperibus; aut in locis vbi ea desit, saccharo vio-
 laceo, aut syrupo ex pluribus infus. viol. vti poteris:
 quemadmodum in robustioribus etiam corporib.
 vice diapruni lenitiui etiam laxatiua vtare, & vice dia-
 cath. cōfectione de dact. potissimum pituita redun-
 dante, id tamen perpetuo seruandum erit, vt ex eis,
 quæ fortiter purgant, etiam robustis corporibus
 multa quantitas non tribuatur, semperque mixta
 sint cum multo maiori copia prædictorum lenien-
 tium medicamentorum, ita vt eorum quantitas
 drac. ij. non excedat. Interim autem Medici exhibe-
 re non negligant ea medicamenta, quæ ad facilem
 excreationem, ac thoracis expurgationem condu-
 cunt, diuersa tamen, prout diuersitas humoris gi-
 gnentis inflammationem requirit: nam si sanguis,
 aut bilis fuerit, violaceum syrupum, aut e cannis, seu
 vua passia, vel ex adianto tribuas, interdum vero iu-
 binum simplicem: compositum verò, aut eum
 qui ex glycyrrhiza, seu hyssopo conficitur, seu e-
 tia ē marrubio exhibere poteris, si morbus latera-

lis ex crassioribus succis fuerit ortus. Quod si æger maluerit aquis permixtos potius absorbere eos, aquam borraginis, aut hordei, seu adiatum permisceas, vel aquam in qua glycyrrhiza radix fuerit decocta. Nonnulla item echinata hypoglottidæque in hunc usum parari possunt, quæ studiosi iuvenes requirant, cap. tum de catarrh. tum de tussi. Sed quoniam Hippocrates præcipiebat à principio lateris dolores tentare calidis fotibus dissolvere, tempestivum videtur, ad eos describendos devenire: eos nanque conscribere distulimus usque in hunc locum, ne interceptus fuisset sermo de venæ sectione ac purgatione adhibenda. Erit itaque (eodem Hippoc. teste secundo de ratione victus in morbis acutis) inter omnia fomenta calida probatissimum nam à frigidis nemo veretur abstinendum esse id quod ex aqua calida in vtre, vel vesica, aut alio vasculo posita, sit: quamvis vtilis etiam sit, ut ipsæ inquit, & spongia mollis, magnæque atque ex aqua calida expressæ applicatio: verum fomentum linteum vestiendum erit, propter eas quas ipse præcitato loco reddit causas: hi siquidem humidi potius inflammationibus quæ à bilioso succo factæ sunt, opitulantur, ex Gal. sententia eodem 2. lib. de rat. vict. in morb. acut. velut ficiis, quæ à tenui, aquosoque sanguine exorta sunt, cum perpetuo contraria contrariorum sint remedia. Loco autem prædicti fotus in eundem usum parari possent, si prius in qua radicē, & folia althææ, flores chamæmeli, fenugræcum, scutellam campanam, ac semen lini decoquas, ac demum aliquo prædictorum modorum fotus applices: ex eisdem quoque facelli parari possent, qui etiam calidi, veluti fotus, extrinsecus adhibeantur. Si vero ab aquoso, tenuique sanguine exorta fuerit inflammatio, tertio forum genere ab Hippo. conscripto vtare. Est autem fomentum ipsum siccum ex sale, milioque, frictis, torrefactis, atque in sacculis conclusis paratum: beneuolum siquidem, leue, atque iucundum est milium, ut ipse inquit Hippocrates. Poteris inulper & in hunc eundem usum, ex chamæmeli floribus, fursure, ac milio facellos componere: vel ex millo, sale, semine lini, ac fenugræco, modo fici semper applicetur. At si suspicio, fuerit, crassos, viscososque humores, in ea quæ phlegmone obsideri parte collectos esse, secundo ab Hippo fotus genere conscripto, vtare. Constat autem ex hordeo, ac eruo, prius tamen eis concisis, comminutisque, & demum ex aceto, & aqua decoctis: ita diluto aceto ex aqua, ut paulo acidius sit, quam ut quis bibere possit. Hec itaque semina madefacta persusaque, & feruefacta in sacculos coniecta lateri dolenti apponantur: in hunc etiam usum confert fursur appositum: eodem Hippoc. teste, & in hunc quoque usum facellis vtare ex hordeo cocto, ac fursure, addito hyssopo, ac pulegio, similiter madefactis ex diluto aceto: nempe hoc pacto tum bladior, tum efficacior erit fotus, Trallianus vero (ubi melancholicus abundat humor) fomentum potius ex fursuribus in iure chamæmeli decoctis commendat, tanquam excellentissimum, & prope ad omnem dolorem conueniens: perpetuo tamen consulo, ut ab eo incipias fotu, qui periculo omni vacat: Is autem est, qui minime mordet, humidusque existit: sic nanque & Hippocrates coepit. Nempe (ut inquit Galenus) tamen si nihil aduersus malum fecerit, non tamè magnum, & insigne affert detrimentum, veluti hi qui ex aceto, vel orobo, aut sale sunt: qui nisi propriam, conue-

nientemque consequatur affectionem, non solum non salutare erunt, verum quoque & malum augerunt. Propterea ab eis te inchoare non oportet, nisi exactam habueris notitiam eius, qui in inflammata parte euincit, humoris. Hanc verò dignotionem, cum scientificam habere nequeas, sed coniecturalem: propterea (ut diximus) tutius erit, ab his inchoare fomentis, quæ quàm cætera magis auxilio esse tibi videbuntur. Quod si nihil præsidij tuleris, ad alia etiam te transferre conueniet: quin etiam post fotus vtiliter admoueri possunt vnguenta eiusdem rationis calfacientia, ut R. olei amygdal. dulc. vnc. j. butyri recentis vnc. si vel loco olei amygdal. dulc. chamæmelino, aut anetlino vtare; & in vicem butyri, anseris seu gallinæ pinguedo accipiat; potissimum ubi ex frigidiori succo inflammatio orta fuerit: in quem etiam usum, hordei, fenugræci, & seminis lini finiam addere poteris, vel ælypum, & dialthæam compositam Nicolai, aut eiusdem simplicem: aut ex foliis, & radicibus maluarum, & althææ confusis, atque in aqua decoctis, adiectisque olei anethini, vel chamæmelini, & amygdal. dulc. vtriusque vnc. j. seminis lini, fenugræci, ac hordei farina, fiat cataplasma. Ad curandum summopere est, si cataplasma imponatur, vt calidum permaneat: permanebit autem, si oleo calido vesicam semplenam frequenter cataplasmati admoveas, ex Aetij præcepto. Post septimum autem diem (ut idem inquit Aëtius) si eodem modo dolor persistat, cucurbita lateri affigenda est, & cutis scarificanda: manifestissima enim in pleuriticis (ut ipse refert) vtilitas ex cucurbitulæ appositione apparet. Celsus vero (ubi lenior, siue vetustior fuerit lateris dolor) ad cucurbitulas confugiendum esse (ante summa cute incisa) præcipit. Verum ne in errorem incidas in cucurbitularum adhibitione, seruanda erit Alexandri sententia; qui dixit, commodius & tutius esse hac vti curatione in quibus parua copia est vacuum. Nam per eam quod in affecta parte continetur, ex alto extrahitur, atque hoc factum mirari liceat, quomodo inde etiam dolor, qualiscumque fuerit, licet vehementissimus conquieuerit, vt neque fomento, neque alio præsidio indigerit. At si inflammatio membranæ costas subcingentis ex iam dictis discuti non valeat, sed in suppurationem permutetur, hanc permutationem coadiuuare oportet: cum quibus verò fiat, sequenti capite de suppuratione patebit: quicunque enim dolor (inquit Hippocrates secundo prognost.) in his affligit sedibus, hoc est, thorace, & pulmone non desinens, neque secessionis purgatione, ventris subductione, neque venæ sectione, ac medicamento, & victus ratione, in suppurationem verti sciendum est.

De pneumonia.

CAP. LII.

Hic quoque affectus, quem *πνευμονία*, seu *πνευμονία*, vel (ut Celsus visum est cap. 7. libr. 4.) *πνευμονία* Græci vocat, Latini verò & *πνευμονία* quoque, interim verò pulmoniam appellant, inter eos morbos connumeratur à Gal. 2. meth. med. c. 2. quibus à læsa particula nomen fuit inditum. Est namque (ut Celsus inquit) vehemens, & acutus pulmonis morbus. Paulus verò cap. 30. libr. 3. peripneumoniam, pulmonis inflammationem esse testatur. At Aëtius cap. 66. lib. 8, eandem dixit pulmonis esse inflammationem cum febre acuta. Cuius

Fotus.

2. de rat. vict.
lib. 2. tem. 1.
sec. 3.

Eodem lib.
sec. 4.

Si inflama-
tionis causa
sit biliosus
sanguis.
commen. 2.

Si aquosus
sanguis.

Eodem lib.
sec. 6.
Si crassior
& viscosior
fuerit san-
guis.

Lib. cita-
ta.
sec. 5.

Lib. citato.
commen. 2.

verò licet sub diuersis verbis in eandemmet videntur ferè coincidere sententiam, quòd scilicet peripneumonia pulmonis inflammatio sit: quam etiam sententiam scriptam reliquit Galenus 2. & 4. de locis affect. lib. de puls. ad tyrones, cap. 11. & 4. de causis puls. cap. 12. Nec alio modo per inflammationem hic intelligendum erit, quàm præcedenti cap. de pleuritide intelleximus: poterit nanque inflammatio hæc (vt in sequentibus differemus) nedum ex sanguine optimo, ac laudabili, mediocrémque crassitudinem habente initium sumere, verum etiam & ex eodem pituitoso, aut bilioso, aut melancholico existente, vt patet apud eundem Gal. præcitato lib. 2. de locis affect. cap. 9. & commento apho. 33. lib. 6. cum dicebat, pulmonem aptum naturæ esse, cum rare, ac laxè substantiæ particeps sit, ad omnes humores suscipiendos. Sed mox aduersus ea quæ diximus, non ab re instabit quispiam asserens Galenum 4. de caus. puls. cum de peripneumonicorum pulsibus pertractat, fatetur pulmonem, cum latus sit, & mollis, subtilisque inanibus vndique infinitis canis, à pituitosiore, atque crassiori sanguine inflamari, cum subtilis, biliosusque fluat ferè, nec cum viscere vlla ratione coherescere potest: Cui responsum sit, Galenum præcitato loco, tum etià 2. de locis affect. propter visceris laxitatem, ac mollietatem, & raritatem asseruisse pulmonem promptius ex pituitoso sanguine inflamari, ac etiam magis, quemadmodum & subcingentem membranam ex bilioso magis, non tamen negasse vtrasque partes ab vtriusque etiam inflamari posse, cum 4. de causis puls. sic dicebat: Si quidem biliosioris minus est cogere, siccare, tendere, indurare: quæ quando minus sæpe pulmonem infestat, sanè erit rata quoque pulsus durities: & 2. de locis affect. dicebat: Quin etiam laterali morbo sepe numero magis biliosum, in peripneumonia verò magis pituitosum sequi cõsuevit. Non itaque negauit Galenus omnino pulmonem inflamari posse ex biliosiori sanguine: sed id raro continere: sæpius verò, ac magis à pituitosiore sanguine inflammationem in ipso oriri propter iam dictas causas, vbique confirmauit. Afficitur autem in hoc affectu pulmo ex quouis humore originem ducat, vt ex eius descriptione liquet, insuper ex spirandi difficultate, quæ necessario comitatur, eo quod affecta particula spiritus est instrumentum, sic etiam ex tussi, quæ necessario eis accidit. Quare ex spirandi difficultate, ac tussi ipsum affectum esse conicere poterimus: sed quoniam maxima pars signorum huius affectionis, communis est tum parti ipsi affectæ, tum etiam affectui: propterea ne eadem bis repetamus, cuncta narrabimus, quæ affectum ipsum ac partem affectam indicant, pro cõperto habentes, quòd cum vitium hoc sit inflammatio, morbus vtrique erit in quantitate primò, & secundo in intemper. indurandi autem inflammatum pulmonem immodica spirandi difficultas, atque angustia, adeò vt suffocari laborantes videantur, ac recti federe conentur: nam hoc pacto facilius sentiunt torum thoracem dilatari: quippe qui decumbentibus in sese concidit, eo quod pectoris partes ad spinam declinant, quæ erecta thorax etiam simul ferunt, non amplius se ipsum grauant, vt patet 2. & 4. de locis affect. quin etiam calidam sentiunt eandem respirationem, maximè si erysipelatis particeps fuerit inflammatio. Quocirca (vbi plurimum efflant) iuari videntur, ac multum aërem frigidum attrahere concupiscunt. Insuper gra-

uitatis cuiusdam thoraci incumbentis sensum sæpe numero percipiunt, ac dolorem ex imo ad ipsum peruenire, & ad spinam: ibi enim & membrana ipsam ambientes suspenduntur. Vehementi autem dolore pulmo nunquam cruciatur, verum propter iam dictas membranas, & grauitatis sensum, & aliquando extensionem quandam, vel ad pectus, vel ad spinam percipere potest, vt iam diximus ex Galeni sententia quarto de locis affectis, cap. 8. præterea acuta quoque febris incidit pulmone inflammato: at si intolerabile fuerit incendium, vt Gal. inquit eodem 4. de locis affectis, cap. 8. angustia vero grauitatisque sensus minor, erysipelas ipsum vexare censendum est. Quibus sic definitis, si erysipelas phlegmonodes, aut phlegmone erysipelatos des sit, haud difficulter deprehendetur. Si verò inter tussendum sputum expuant, id veluti in pleuritide, modo hoc, alias, alio colore infectum videbitur, pro ratione diuersi humoris inflammationem excitantis. Proprium item in peripneumonicis signum est, Gal. teste 1. de locis affectis, cap. 3. quòd maxilla rubrè appareant, pulsus verò magnus, languidus, mollisque atque inæqualis, & vndosus est, interim quoque dirotus: & cum acutè omnes febricitet peripneumonicus, nonnihilque comatis habeant, vtrum horum excellat, maximè ratione crebritatis pulsus inueniatur: nam vbi ardentior febris fuerit, pulsus abundè creber erit. Si verò comatosior sit, minus creber, vt patet lib. de pulsibus ad tyrones. cap. 11. & quarto de causis pulsuum, cap. 12. quo loco studiosi requirant causas, propter quas prædictæ pulsuum differentie in peripneumonicis fiant. Nonnulla quoque alia symptomata peripneumoniam comitantur, vt anxietas, impotentia, iactatio, lingua flaua, licet temporis progressu nigrescat, Hippocrate lib. 3. de morbis, & lib. de diebus iudicat. auctore; interdum etiam delirium, oculi intumescunt, vt inquit Paulus, nasus in summa fit sinus, & venæ temporum eleuantur, vt Aëtio visum est, ac prostratus est appetitus. Simili autem via ex quo humore ortum duxerit, indagabis, quam de pleuritide docuimus: nã licet sæpe numero ex pituitosiori sanguine gignatur, ex aliis quoque humoribus fieri poterit, vt prius dictum est: idque potissimum percipies, si cum expuant quicquam, ex eiusdem sputi colore diuerso: namque si rubrum fuerit, sanguineum; si flauum, aut rufum, seu pallidum, biliosum sanguinem; si spumosum, & candidum, pituitosum; si verò nigrum, aut liuidum apparuerit, melancholicum sanguinem inflammationis causam esse significabit, quemadmodum secundo de locis affectis, cap. 2. & secundo prognosticorum commen. 47. à Galeno scriptum reperitur. At si nihil expuant, ex aliis id coniectari licebit, ex maiori scilicet, vel minori calore, seu incendio, quod in thorace percipitur; ex maiori, minorive angustia, respirationis difficultate, ac grauitatis sensu, temperamento, ætate, habitūque diuerso, regione, aëris constitutione, anniq; tempore, ac præcedente victus ratione. Verum ex quouis redundante fiat succo pulmonis inflammatio, ea affectus origo est. Id verò genus morbi (vt inquit Celsus) plus periculi, quàm doloris habet. Iudicatur (Hippocrat. auctore secundo, & tertio libro de morbis, ac lib. affect.) breuissimus quidem in diebus septem, aut quatuordecim: longissimus verò in duobus de viginti; pauci autem hunc morbum effugiunt: verum postquam vigintiimum diem transgressus fuerit, nō amplius mori-

3. de morb.
versus me-
dium.
De diebus
iudicat. in
fine.
Pau. lib. 3.
cap. 30.
Causa.
Aet. lib. 8.
cap. 66.
Signa cau-
satum.

Lib. 8. ca. 7.
Prognost.
2. de mor-
bis. in me-
dio.
3. de morbis.
loco citato.
De affect.
in prim.

tur: sed pus spuit, pectus dolet, & tussis: nam ex hoc morbo fiunt etiam pectore suppurati, si non in iudicatoriis diebus pulmo fuerit purgatus. At si screatio flaua non multo permixta sanguine inter initia excernatur, salutaris admodum pulmonis inflammatio est, si septimo die pigriusve minus secunda est, eodem Hippocrate auctore secundo prognosticorum. Quæ verò peripneumonia cum virtutis imbecillitate sit, perniciofa est, Galeno teste tertio prorrheticorum, cōment. 4. & decimo methodi mendendi, cap. 5. namque vna salus tum pleuricis (vt ipse refert) tum peripneumoniacis, adde etiam & synanchicis: ipsum virium robur. Harum etenim partium inflammationes, veluti etiam ventriculi, & iocinoritis, non modo iis qui tam imbecillis sunt viribus, sed etiam iis qui valentiores ipsis sunt, mortifera esse solent; si verò quid per tussim effertur in peripneumonia, spumofum, ac biliosum est, & aliquando cruentum, & floridum vehementer, vt Aetio placuit, quod etiam pessima significationis existit: & si mortale quidem malum fuerit, vigilæ amplius aderunt, aut somni breues, stupor ac delirium inducentes, & imaginatione mentem vicissim perturbante non sentiunt valde præsentia mala; extremitates frigida, vngues liidi incruantur; quarta, aut ad summum septima die hi moriuntur. Verum si ad salutem permutetur morbus (vt idem fatetur Aetius) sanguinis eruptio ex naribus abundanter sequitur, aut alui exturbatio, multis exeuntibus biliosis, & spumosis humoribus: aliquando autem inflammatione in pus commutata, per ventrē, aut vrinam, pus excernitur, statimque ab omni molestia liberatur: at si in pulmonem irruerit acruatim, aut suffocat, aut cum grauibz accessionibus in tabem permutatur. A pulmonis autem inflammatione phrenitis, malū est, vt inquit Hippocrates aphorif. duodecimo libri septimi, & in coacis prænotionibus legitur, quod peripneumonia ex pleuritide transmutata securiores sunt his quæ ab initio fiunt, licet si superuenerint, sint mala, vt patet vndecimo aphorismo eiusdem libri septimi. Quātū verò ad victus rationem attinet, pro eius curatione, eadem ferē, quæ pleuriticis instituta sunt, vtantur, nisi quod magis extenuatoria opus habent: Dicebat etenim Aetius, cibus sit extenuatorius: verum quod ad ipsum attinet cibum (vt testatur Celsus) neque salis opus erit, neque acribus, neque amaris, neque aluum adstringentibus, sed paulo leuioribus. Quare primis diebus danda erit sorbitio ptisana, aut etiam ipsa ptisana cum melle rectē quoque fumeretur, & recens butyrum (vt Paulus inquit) vel ipsum etiam cum ptisana, cum aqua iterum recens adeps coqui potest, ex Celsi auctoritate; ea verò sit gallinarum, aut anserum. Nam primis diebus sorbitiones dulciore esse oportet, iuxta Hippocratis sententiam libro tertio de Morbis, sic enim (vt ipse inquit) id quod cōfedit, ac compactum est, potissimum eluearis, ac commoueris: quarta autem die, & quinta, & sexta non amplius dulces, sed pingues: nam ad spumum sursum excreandum conducunt. Poteris insuper in ptisana decoquere (iuxta Aetij sententiam) parum hyssopi, aut origani, potissimum vbi à frigidioribus succis inflammatio fuerit orta: & post quartum, quintum, aut sextum diem, cum pinguis admittat Hippocr. prædictam ptisanam cum pullorū, aut gallinarum iure pingui pararem: vel macerato in iam dicto iure pane, in quo parum etiam, aut hyf-

fopi, aut origani fuisset decoctum vtare; tribuendæque sunt sorbilia oua, vt refert Celsus; panis ex aqua mulsa, & nuclei pinei ex melle, aut (si libeat) etiam ex saccharo. Potus autem quod ad quantitatem attinet, sit exiguus; humiditas enim noxia pulmoni existit, vt Aetius inquit: quare primis diebus vinum dare conuenit dulce, album, aquosum, paulatim frequentius bibendum, vt Hippocrati visum est, libro secundo de Morbis, eoque præsertim vtendum, vbi inflammatio ex frigidiori sanguine ortum habeat, ac laborantes admodū elegantes, delitiosique fuerint: reliquis verò pro potu aqua hordei (præcipue non decorticati) tribuenda erit, vel aqua, in qua glycyrrhizæ radix fuerit decocta, aut vna passa vinaceis detractis, vel aqua mulsa, in qua etiam parū hyssopi decoctū sit: propinari item poterit pro potu sicum cū pauco hyssopo decoctū, ex Pauli sententia. At virtutis tuendæ gratia (vt ipse inquit) crebrius potui affumetur aqua mulsa per se, aut cum nucleis pineis. Reliqua quæ ad victus rationem attinent, præcedenti capite studiosi requirant. Oportet autem (si satis valida vires sunt) sanguinem mittere, ex Celsi sententia: quam etiam confirmauit Aetius, cum dixit, Itaque (si nihil obliterit) statim vena secanda erit in cubito, ex quacunque causa, ac quouis modo genita sit peripneumonia: quamuis Paulus velit in iis, qui ex aliis morbis in hunc decidunt, sanguinis detractionem vitandam esse, maxime si diu hoc in statu fuerint: vel si per initia sanguinem miserint. Sin autem peripneumonia statim ab initio inuaserit (vt ipse facit) sanguinem mittere, si vires id permittant, ex usu est. Quibus verbis pugnare videtur Paulus Aetij, ac Celsi sententiæ: quamuis nedom non pugnant verba eius prædictorum sententiæ, sed ipsam confirmant: non enim propterea quod morbus diuturnus fuerit, vel quod per initia sanguis missus fuerit, his qui ex aliis morbis in hunc decidunt, propriè sanguinem mittere prohibet Paulus, sed quod vires consonum sit hoc auxilium eisdem prohibere, vt pote imbecilliores existentes: quo casu nec Celsus, nec Aetius venæ sectionem admitterent: namque Celsus dicebat, si satis valida vires sunt: & Aetius, si nihil obliterit. Secare itaque venā oportet statim circa initia, in quavis peripneumonia, si valida vires fuerint, ac nihil aliud obliterit: & in cubito internam, ac ex utroque brachio sanguis extrahendus, si sustinerint vires, primum quidem modicus, & non usque ad animi defectionē; vt videlicet adseruetur ad repetendam detractionem, ex Aetij sententia. At si quid venæ sectionem prohibuerit, cucurbitulas thoraci admoouere oportet, ac lateribus defigere, quibus tantum elicietur sanguinis, quantū vires ferunt, vt Paulus refert; vel acri clystere aluum subluere oportet. At si neque iis morbus cedat, præsertim in primis quatuor, aut quinque diebus, purgare medicamento aluum subducere licebit, & hoc paulo amplius, quod & febres obtusiores sint, & dolores leuiiores, quemadmodum Hippocr. scriptum reliquit libro tertio de Morbis. Eligantur autem ea, quæ leuiter purgant: cuius generis sunt nostris temporibus, manna, cassia fistula, ac antidotus diacatholicon, seu diaprunum non laxatiuum, quorum decorem quantitatem assumens cum aliquo ex decoctis, præcedenti cap. de pleuritide descriptis dissoluit, ac potui donato, oportet autem infernam aluum (vt præcitato loco inquit Hippocrat.) neque valde

suppressam esse, vt febres non sint acutæ, neque valde egerere, quo salua sursum educi possit, & æger viuis valeat. Cõfert itaque peripneumonici purgatio, iuxta Hippocratis sententiam, præsertim si prædicto modo ea vtare, ac modo dictis medicamentis purgantibus: nec parum conferunt diutissimæ frictions, si bis quotidie fiant in scapulis: proximè ab his in brachijs, & pedibus, & cruribus, leuiter contra pulmonem, vt testatur Celsus. Interim verò, vt præptè ac celerrimè pulmo expurgetur, curandum erit: in quem vsum conferunt syrupi ex adianto, glycyrrhiza, vna passila, aut, si crebro assuman- tur, pariter nonnulla eclignata, aut hipoglottides, seu becchiæ pilulæ tribui possunt, quæ omnia cap- de catarrho, ac de tussi requiras: & post vniuersales euacuationes, poriones quasdam dare conuenit; inter quas à Cello, & Paulo hyssopi decoctum, cui ficus arida sit incocta, præstat; aut aqua mulla, in qua vel hyssopum, vel ruta decocta sit, aut iris sicca trita instar duum cochlearium aquæ mullæ inspergenda, vel ipsamet mulla, in qua iris sit cocta, præbeat. Quibus etiam pro ratione redundantis succi ad- ducere poteris hordium, vnam passam, adiantum, gly- cyrrhizæ radicem, iuiubas, marrubium, aut origanum, seu helenij radicem: valentioribus namque hic mor- bus medicamentis indiget, maioriq; extenuandi fa- cultate præditis, quam pleuritis. Ceterum ab extra profunt aduersus dolores imposita calida fomenta, quæ digerendi vim habeant, ac discutiendi, quorum mentio præcedenti cap. facta est: post quæ thora- cis partes illinantur ex oleo amygdalarum dulcium & amararum, aut anethino, seu chamæmelino, irino aut rutaceo; addasque si libeat prædictis oleis gal- linarum, seu anserum pinguedinem, ac butyrum in- fultum, vel cœsypum liquidam. Quod si maius, cera- tum conficias ex butyri recentis, adipis anseris, vtri- usque drachm. j. olei rutacei, ac vtriუსque amygdalæ ana vnc. s. pulueris iridis, & hyssopi sicci, singulorum scrup. ij. cœsypi liquidæ drach. ij. ceræ, quod satis sit, fiat ceratum. Cataplasma item paratur hoc modo, Recipe radicem, & foliorum althææ, & maluarum ana manup. s. contunduntur, & adde cremoris se- minis lini, althææ, & fenigræci ana drachm. ij. iri- dis, & hyssopi, quæ tenuissimè sint trita, singulorum drachm. j. butyri, & cœsypi liquidæ ana drachm. j. & s. olei chamæmelini, & rutacei ana vnc. j. cum aqua mulla, aut cum resina terebinthina cataplasma con- ficiatur; quo tum pectus, tum latera contegantur: optimum etiam erit eidem cataplasmati inspergere seminis lini, ac fenigræci tenuissimum pollinem. Aetius verò, ac Paulus valde commendant medi- camentum compositum ex cera, resina terebinthi- na, medulla ceruina, butyro, cœsypo liquida, iride sicca tenuissimè trita, & etiam nardino ynguento, vt inquit Paulus: sint autem horum partes æquales, vt ait Aetius.

De empyemate, seu suppuratione.

CAPVT LII.

MOrbus qui à Græcis *ἐμπύημα*, à Lati- nis suppuratio, seu purulencia dicitur, & propterea qui hoc morbo laborant *ἐμπύηματι* Græcè, Latine ve- ro suppurati, & purulenti appellantur non vno duntaxat modo in Hippoc. & Galeni do- ctrina intelligi consuevit. Namque interdum omnè transmutationem quæ fit ad pus, in quancunque par- te fiat, per suppurationem intelligit, vt patet apho-

rismo 8. 5, & 45. septimi libri, & libro prognosticor. præsertim primo, & secundo; interim vero solos eos, qui in thorace, ac pulmone vniuersum pus conten- tum habent, prius tamen prædictis partibus inflam- matione affectis, purulentos nominant: vt dicatur suppuratio hoc modo transmutatio, seu alteratio prædictarum inflammationum ad pus, vt liquet, tū commento citati aphorismi octauo, quinti libri, tū etiam secundo prognosticorum. Tertio modo per suppurationem propriè, ac præcipuè intelligunt, nō siquidem conuersionem inflammationis lateris, seu pulmonis ad pus, sed collectionem, seu effusionem puris in spacio thoracis, atque pulmonis intermedio post prædictæ suppurationis disruptionem. Sic quo- que præcipuè suppuratos nuncupant eos, quibus inter thoracem, atque pulmonem acervatum pus est, vt commento aphorismi 45. 6. & 27. & 8. & 15. quin- ti libri patet, ac etiam secundo prognosticorum. Cum itaque hæc tribus modis suppuratio, seu pu- rulentia in Hippocratis & Galeni doctrina intelli- gi possit, de ea quæ primo modo sumitur, nequa- quam pertractare proposuimus, cum de thoracis, ac pulmonis affectibus, & non de his qui indifferenter in singulis corporis partibus provenire possunt, hæc verba facimus. Et cum magna ex parte, ac præcipuè suppuratos nominent Hippocrates & Galenus eos, qui pus habent in spacio inter thoracem, atque pul- monem, vt præcatis locis liquet, propterea de hac suppuratione potissimum pertractare intendimus: quamvis affinitate sermonis nonnulla quoque di- cemur de conuersione, seu transmutatione inflam- mationis lateris, seu pulmonis in pus, quod quidem adhuc in parte inflammatione affecta vniuersum con- tinetur; & si hic affectus non præcipuè suppuratio, aut purulentia dici possit, vt dictum est. Afficitur verò perpetuò in verè purulentis thorax, præsertim secū- dum eius cavitatem, hoc est, intermediam regio- nem quæ inter thoracem atque pulmonem est: qua- propter angustiam sentiunt laborantes loci illius pure repleta intermedia ea regione: acciditque eis anhelitus difficultas ac tussis, & in imo thoracis grauitas quædam sentitur. Verum si nondum pus in idem spacium effusum sit, sed vniuersum consti- terit in parte prius inflammatione affecta, pulmo- nem, aut subcingentem membranam affectam esse dignoscet ex præcedente peripneumonia aut pleu- ritide, quæ haudquaquam adhibitis subsidijs discul- se fuerunt. Præter hæc, si in pulmone pus contineat- tur, & in vtraque parte potius, quàm in altera, dex- tra scilicet, & sinistra pus colligitur, in vtriusque inci- dens veluti quoddam onus per sentiscit æger, & æ- qua calidiores ambæ partes sentiuntur, neque æ- grius, aut promptius in vno latere, quàm in alio cubabit. Si verò suppuratio in altero latere tantum- modo fuerit, in altera quoque parte thoracis, dextra scilicet, aut sinistra potius quàm in vtraque pus col- lectum erit, neque in dextra parte existens, in sini- stram, neque è contrario in sinistra, transire in dextram potest. Ceterum pars affecta cognoscitur, quia calidior est, quàm reliqua, & in eadem quoque duntaxat dolorem, seu grauitatem sentiet æger: & eo in incolumelatus cubante, veluti onus desuper aliquod illi pendere videtur, vt apud Hippocr. at- que Galen. legitur secundo prognost. Suppuratio itaque præcipuè dicta, quæ nihil aliud est, quàm collectio puris inter thoracem & pulmonem, vt prius diximus, morbus est in numero toto genere

2. prognost.
cõment. 6o.

De qua sup-
puratione
tractabi-
tur.
2. prognost.
Loco citat.

Pars affe-
cta.

sex. & 59.
mens. 59.

Suppuratio proprie dicta quid sit. Quis affectus praeferatur naturae est.

præter naturam, ac in excessu, ut lib. de differ. morb. cap. 8. patet. At ea suppuratio, quæ transmutatio est seu conuersio inflammationis lateris, aut pulmonis ad pus, cum eodem tempore fiat abscessus dictarum partium, morbus posset dici in magnitudine, velut quoduis aliud genus abscessum, ex Galeni sententia 14. meth. meden. cap. 12. Vtraque tamen morborum

Signa inflammationis cum in abscessum vertitur.

Tex. & comment. 58. Alex. lib. 7. cap. 2. Paul. lib. 3. cap. 32. Signa disruptionis abscessus. Loco citat. Suppuratio nunc proprie dicta signa.

4. de locis aff. cap. 7. Quales sint suppuratorum pulsus.

morborum genera in numero scilicet, & magnitudine, sub vno prædicamentorum genere continentur, utpote sub quantitate, velut patet eodem libro de different. morb. c. 8. Verum ut clarius fiat prædictarum suppuratio dignotio, eas separatim distinguere volumus, ac pro earum distincta notitia, primo indicia trademus ipsius suppuratiois, quam abscessum nuncupauimus, secundo disruptionis ipsius abscessus, & tertio effusionis, seu collectionis puris inter thoracem, atque pulmonem, quæ proprie, ac præcipue suppuratio dicitur. Dignoscet autem inflammationis transmutationem ad pus, cum adhibitis opportunis subsidiis, ac proba instituta victus ratione in præcedenti inflammatione dolor non desinat. adhuc rigor laborantemprehendit propter puris acrimoniam, ac mordacitatem, quod quidem adiuncta corpora erodit, talemque rigorem febris comitabitur vehementior admodum, quam ea, quæ præcesserat, euenietque ægrotis ponderis cuiusdam (in loco quo dolore afficiebantur) sensus. Ex pondere itaque, rigore, ac febre multo vehementius affligente, quam anterior, suppuratiois initium percipitur, ut liquet apud Hippocr. & Galen. 2. prognost. & apud Alexandrum cap. de purulentis: nam dum pus conficitur, dolores, ac febres accidunt magis, quam iam confecto ex eiusdem Hippocrate sententia aphorism. 47. libri 2. aderitque grauitas pectoris, tussis valida, & sicca cum dolore, aliquando etiam cum humiditate, ob quam releuari quoque videntur, ut inquit Paulus. Verum licet confecto pure, & dolor, & febris mitiores fiant, tamen instante tempore disruptionis ipsius, vehementius cum horrore quodam iterum febricitabunt, ac in sermone proprietate conturbantur, offendunturque spiritu, adeo ut difficilius, quam antea spirent, ex eiusdem Pauli testimonio. Rupto autem abscessu, ac effuso pure inter thoracem ac pulmonem, vehementes febres quiescunt, & magna ex parte dolor quoque, licet indefinenter febricitent habituali quadam febre: grauitatis autem sensus remanet intus in profundo thoracis: simulque transfluere aliquid apparet iuxta multiplices reclinacionis permutaciones, & maxime cum ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sanè multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibiliter in reclinacionibus ipsorum auditur, prout legitur apud Galenum libro quarto, de locis affectis, cap. 8. & apud Aëtium libro 8. cap. 65. totusque thorax eisdem attollitur, etsi neque calidus sit ipsorum spiritus, neque etiam exfufflando emittatur, nisi adurens fortasse febris accesserit, ut idem testatur Galenus, potissimum ubi magna puris quantitas collecta sit. Educitur quoque eisdem pus nunc purum, nunc foeculentum, ut inquit Paulus: ex pulsu item poteris diuersa suppuratiois tempora interstinguere: nam initio suppuratiois statim suppurati pulsus habebunt, qualem habere solent in vigore inflammationis: nam hoc tempore initium est suppuratiois: erit itaque pulsus durior, quam antea, & vibratus magis, sed minor, quam dudum, non tamen languidior,

quin etiam crebrior, ac celer: nonnunquam etiam inæqualis, & inordinatus; verum omnibus erit hecticus; quoniam perpetuo est illa in motu arteriarum agitatio, donec fiat eruptio: licet cum pus propè maturum sit, æqualior sit pulsus, cum vero eruptio fiat, languidior, latior, tardior, & rarior pulsus redditur, ut libro de pulsib. ab Iyrones, cap. 11. & quarto de causis pulsuum, scriptum est. Hippocrates verò eodem 2. lib. Prognostic. omnes purulentos dignosci his indicibus fatetur, nam principio febris non dimittit, sed interdum tenuior, nocta verò vehementior est. Copia sudoris elicitur, ac tulsendi cupiditas adeest: quamuis nec quicquam commedatione dignum expuant. Oculi cavi redduntur, genæ rubent, vngues curuantur: digiti verò potissimum summi calefcunt, atque in pedibus tumores consistunt, procedente videlicet tempore, neque cibum appetunt, ac pustula circa corpus erumpunt quorum omnium Galenus eodem loco causam reddit. At quoniam suppuratio non ex vna duntaxat causa oriri potest, eas propterea inuestigare conabimur: interim nanque ex inflammatione in pus versa, & demum disrupta siue subingentis, aut alterius thoracis membranae, siue pulmonis fieri poterit: velut ex iam dictis liquet, ac etiam Paulus & Aëtius testantur. Quandoque verò propter sanguinis eruptionem, vlcere ad cicatricem non perducto oriri poterit, ut idem Paulus inquit. Ex angina quoque, cum ab ea ægri liberantur, & ad pulmonem vertitur, si non in septem diebus pereant, sed eos effugerint, suppuratio fit, quemadmodum aphorismo decimo libri quinti, ab Hippocrate & Galeno scriptum est. Quocumque verò prædictarum causarum suppuratio excitaueit, haud ægre dignosci poterit, ex propriis eorundem affectuum signis, ut si pleuritis, aut peripneumonia, aut sanguinis eruptio, seu angina præcesserit. Ex confluxu etiam è capite ad thoracem manente (ut Paulus asserit) ortum ducit quandoque suppuratio, seu (ut inquit Aëtius) ex seroso, aut pituitoso humore, ex reliquo corpore in vacuum thoracis delapso, isthucque putrefacto: id quod confirmari videtur ab Hippocrate, simul atque Galeno aphor. 38. septimi libri, cum dixit Hippocrates, Destillationes in ventrem superiorem suppurantur intra viginti dies: & libro primo de morbis ab eodem Hippocrate. dum asseruit suppuratos interim fieri, cum pituita de capite copiosa, & acernatim in superiorem ventrem fluxerit, putrescit, & in pus vertitur. Nec minus & huius causa notitiam habebis, si præcedentem destillationem considerabis, ac eiusdem signa pernotabis. Verum qui fiat, ut ex destillatione, seu ex delapso pituitosi præsertim, & serosi humoris ex reliquo corpore in vacuum thoracis suppuratio gignatur, non ab re dubitabit quispiam, cum suppuratio (ut superius definitum est) aut mutatio sit inflammationis ad pus, aut effusio quædam, seu collectio puris inter thoracem, & pulmonem: quod verò pus generationem habeat, aut ubi contusa caro fuerit, aut ex humore, qui phlegmonem producit, apud Galenum legitur quinto de simplic. medic. facult. cap. 5. insuper (ut idemmet Galenus testatur primo de different. febr.) pus generationem habet per inflammationes, & phymatosos tumores omnes, superante quidem natura, quemadmodum in humoribus intra vasa putrescentibus, id quod subidet in vrina, proportionem puri correspondet. Quæ de re quocumque modo suppuratio sumpta, cum semper pus

per pus contineat, siue collectum in parte prius inflammata, siue effusum inter pulmonem, & thoracem: oriri nequaquam poterit propter confluentiam humorum à capite, aut ex reliquo corpore ad thoracis partes manentem, vt Paulus, & Aëtius asserunt, seu ex destillatione; vt inquit Hippocrates, & Galenus præcitato aphorismo 38. septimi libri, cum necesse sit ipsum fieri, aut ex carne confusa (id quod in suppuratione iam dicta minimè contingit) vel ex præcedenti phlegmone non discussa, seu tuberculo; ad pus transmutatis: non igitur generari poterit ex destillatione, seu delapsu humorum ex reliquo corpore in vacuum thoracis suppuratio. Verum si quis Hippocratis, ac reliquorum iam dictorum verba sanè intelligere velit, ipsos promptè à calumnia liberabit: nam destillationes in ventrem superiorem intra viginti dies suppurari, hoc est, concoqui, superari, & euacuari, sic similes puri reddi, & non verè in pus verti docuit Hippocrates, id quod Galenus disertissimè declarauit, commento aphorismi 30. eiusdem septimi libri, cum dicebat, loquens de his, quibus fiunt à capite ad pulmonem fluxiones manifestæ. Verum hi neque spumosa per sedem excernunt, neque cum tussi expuunt, & tamen sæpius manifestè quæ sunt in viscere, hoc est, pulmone aspera arteriæ sunt eo oppletæ, quod defluxit à capite, quod iam concoctum est puri simile, sed spumofum minimè: concoctæ itaque destillationes in superiori ventri, hoc est, thorace, puri similes fiunt, vt inquit Galenus, & non verè suppurantur. Quare ex eis similitudinariæ quædam, & non veræ suppurationes interdum gignuntur, ex Galeni sententia: cum verum pus ex eisdem progigni nequeat. Quomodo etiam interpretari possunt & Pauli verba, vel intelligas ex confluxu à capite manante ad thoracis partes, phlegmonem prius generari posse, & ex ea suppurationem per eiusdè phlegmones transmutationem ad pus. Erit itaque non immediata, sed mediata causa suppurationis destillatio, si hoc modo interpretentur Pauli verba. Quod verò Aëtius suppuratos non verè fieri ex seroso, aut pituitoso humore in vacuum thoracis delapso, isthucque putrefacto intellexerit, sed æquiuocè, ac similiterdinariè ex eiusdem verbis liquet, cum dixit, Nouimus autem quosdam citra febrem suppuratos, ex iam dicta causa, &c. Paulus enim supra reulerat suppuratos indefinenter febricitare febre hectica. Quæ de re sibi ipsi pugnaret, si post pauca verba eosdem citra febrem nouissè asseruisset, nisi per eos citra febrem suppuratos non verè suppuratos intellexisset; vel dicas fieri suppuratos, si pituita ex capite destillet ad pulmonem, ex qua temporis progressu exasperatur pulmo, & intus ulceratur à pituita inhaerente, ac putrescente, vt visum fuit Hippocrati libro de morbo primo, & si tabidi potius, quàm suppurati hi nuncupari possint. Verum de causis suppurationis satis sit hæc dixisse: sed ad eiusdè prognostica deueniamus, asserentes quod suppurationum hi potissimam super sunt (vt inquit Hippocrates secundo prognostic.) quos febris eodem dimiserit die post eruptionem, ac cibum citius appetunt, & siti liberati sunt, & venter exigua, ac consistentia deiecit, & pus album, leue, concolorque est, ac vacans pituita, & absque labore, ac valida tussi expurgatur. Itaque optimè quidem sic, ac celerrimè iudicantur, sin minus, quibus ad hæc proximè accedunt: moriuntur verò ij, quos febris non deserit,

aut cum videatur deferere, denuò recalescens innotescit: & sitiunt, nec cibum appetunt, alius humida est, pus viride, liuidumque spumant, vel pituitosum, spumofumque: pereunt ergo, si hæc omnia adsint. Ad horum quibus alia adueniunt, alia nō, ij partim intereunt, partim in multo tempore incolumes euadunt: verum ex indicis omnibus, quæ in iis existunt, de cæteris quoque vniuersis coniectandum. De iis verò suppuratis, ac purulentis, qui ex pulmonia fiunt, eodem secundo prognosticorum, Hippocrates sic scriptum reliquit. Quod si maiores natu fuerint, potius intereunt per alias verò suppurationes, minores natu potius moriuntur. Etenim (vt inquit Galenus in commento) in purulentis ex pulmonia, quia propter excretionem sanari debent, viribus propterea egent validioribus, & ob id potius minores natu, quàm maiores seruantur. In cæteris verò suppurationibus, minores natu antea moriuntur propter vehementiores dolores, ac febres, quæ magis dū suppurationes fiunt, illis accidunt: quod fit, vt propter magnitudinem febrium, ac doloris, morte præoccupentur. De iis verò qui ex morbo laterali suppurantur, talem protulit sententiam aphorismi 35. libri 3. quod si in quadraginta diebus purgantur à die, à qua fit eruptio, liberantur, si verò non, ad tabem trahunt. Conuersa autè inflammatione lateris, aut pulmonis in suppurationem, rumpitur nonnunquam sursum versus, quando etiam periculosior est, Aëtio & Paulo testibus: aliquando verò deorsum. Verum si sursum erumpitur, si non quàm citissimè pus per sputum reiciatur, tabidi fiunt, vt inquit Aëtius: & (vt Paulus asserit) illud idem confirmans nisi eiusdem summa adhibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio tabem accersit, pulmone exulcerationem contrahente. Quæ verò suppurationes inferius tendunt, ac rumpuntur, non adeò periculosiores existunt, cum in aluum, & intestina, aut in vesicam transfundantur per vasa quædam transmissione adea membra facta; quem puris expurgationis modum, pulmonis, aut thoracis vomica disrupta, disertissimè Galenus sexto de locis affectis, cap. 3. & commento aphorismi 30. libri septimi, docuit, in his itaque locis illum studiosi requirant: ij verò suppurati, quibus propter magnam puris copiam inter thoracem & pulmonem collectam totus thorax in respiratione attollitur, celerrimè suffocantur, ex Galeni testimonio quarto de locis affectis, cap. 7. tum ob affectum ipsum, vt ipse refert, tum quod vires omnibus suppuratis defessæ, siquidem propter pugnam ex necessitate imbecilliores redduntur. Verum quinto de locis affectis, cap. 3. de suppuratis aduersus Erasistratum sic dicebat, quod velut nō paucos perire, ita & alios complures seruari videat: quorum si quis per singulos dies reiecti puris quantitatem collegerit, interdum sex, aut octo heminas, interim quindecim atque interdum plures totam summam æquare inueniet. Quis autem sit suppuratorum per expuitiones purgationis modus, habetur à Galeno eodem quinto de locis affectis. namque expirationis tempore vniuerso thorace vehementer constricto per validam tussim (sine qua fieri nequit) pus, quod inter ipsum & pulmonem continetur comprimendo cogit, atque ad pulmonem ipsum impellit concedente pulmonis membrana eiusdem puris, ac similiter cuiusuis alterius excrementi penetrationem: etenim thorax vehementer admodum hoc tempore pulmonem omni ex parte comprimit; & deimùm, cum & maio-

res sint in earum extremitate aspera arteria partes, quam vena; & arteria leues, ac multo ampliora habeant ora, nec ita cūcidant, neque omnifariam concludantur, propterea quod cartilaginea sint in asperas ipsius pulmonis arterias recipitur, & non in leues, ac venas, ac deinceps expuitur. Qui autem suppuratio laborant aërem inhabitent siccum, in calido, & frigido temperatum, vel paulo ad calidum vergentem, ac in quiete diligenter custodiendi sunt a motu, seu exercitio cauentes: somno quoque temperato vtantur, & si rupturæ tempus instauerit, super sanum latus decumbant, Paulo auctore: singulis diebus alui excrementa excernant, si non sponte, saltem clysteribus, præsertim lenibus: namque exonerata natura ab eiusmodi excrementis, promptius suppurationi vacabit, ipsam maturando, aut rumpendo, aut expurgando. Immodica animi affectiones vitandæ erunt, præsertim metus, & mœstitia: nutriendi vero sunt ex ptisanæ succo, & aqua multa, vt inquit Aëtius: nam multa quouis tempore exhibita, nihil agrum offendit, Iuliano teste: quamuis nec ipsa vniuersum, sed paulatim exhiberi debeat: nam omnis potus modicus esse debet, in iis qui alicubi abscessum habent, vt Galenus testatur septimo de compositione medicament. secundum loc. cap. 6. Verum (vbi infirmæ vires fuerint) maior cura ipsarum habenda est: & propterea cibis boni succi, & cōcoctū facilibus vti debet, ptisanæ cremorem parantes, aut ipsammet totam ptisanam decoquentes in gallinarum, seu pullorum gallinaceorum, phasianorum, aut perdicum, seu columbarum iure: quorum etiam carnes edant, veluti etiam & turdos, aliasque aves montanas, ac gallorum testes. Et quia iura (vt inquit Alexander) vlcera magis deterunt, ventremque humidiores efficiunt, propterea modo dictarum carniū iure vtantur, thymo, hyssopo, oreofelino, aut foeniculo adiecto; bralsica, aut asparago, vel malua, vbi biliosum corpus fuerit, aut salsum quid expuant, & febris valida. Interim vero vti poterunt pistaciis, amygdalis, vna passa, ac nucleis pineis, verum non copiosius ex eis assumant, & si abstergere possint: nam agere cōcoquantur, & propter oleosam ipsorum partem alios cibos in ventriculo interim corrumpunt, vt apud eundem Alexandrum legitur. Potus vero (vt diximus) sit aqua multa, aut aqua hordei, vel vinum tenuis substantiæ, vt Galenus præcipit, eodem libro septimo de composit. medic. secund. loc. cap. 6. sit autem vinum (vbi eo agri indigeant) paucum, ad dulcedinem declinās, vt inquit Aëtius: poterit quoque & aqua probe cocta offerri, iuxta eiusdem sententiam: ab aceto autem, & omni alio vinofo genere, & ab aqua quoque frigida abstineant, vt ipse præcipit. Cum autem suppuratio fieri incipit, puris coactio, seu concoctio iuuanda erit, vt Paulus refert: namque vnum ex naturalibus operibus, quod quidem concoctio quædam exsistit, est ea quæ in pus fit conuersio, vt apud Gale. legitur quinto de simpl. med. facult. & primo de differen. febr. Quæ de re quod ad mouendum pus adhibetur medicamentum, tale esse debet, qualis est in naturis temperatis calor natiuus, modicè siquid humectans, & excoalsciens, vt neque excellat, neque inferius sit temperatura corporis ipsum immutantis, sed quoad fieri possit simillimum quemadmodum eodẽ quinto libro de simp. med. facult. cap. 5. liquet. itidẽ quod emplasticum sit oportet, quo tenaciter corporis poris, siue meatib. illitū inhereat,

Curatio.

50. 1001

Puritas ratio.

Medica-
mentorū
ratio.
5. de simpl.
fac. cap. 5.
1. de diff.
febr. cap. 6.
Que medi-
camēta pu-
ris genera-
tioni opor-
tentur.

vt ibidem patet. Primum itaque cum suppuratio sit formētis per spōgias natura adiutanda erit, vt Paulus asserit: nec illud citra rationem fieri iussit: nam inter omnia, quæ ad puris generationem conferunt, aptissima est perfusio aquæ temperatè calidæ, aut cui additum sit oleum, quod hydrelæon Græci vocant; & ex iis, quæ irrigantur, oleum temperatum, iuxta eiusdem Galeni decreta, præcitato libro quinto de simpl. med. facultat. cap. 8. Farina quoque triticea pura, aut panis purus modicè coctus cum hydrelæo confert: insuper & adeps suillus, vitulinus, gallinaceus, seu anserum, cum melis, seu althææ radice permixtus: vel cataplasma fiat, præsertim tardatibus suppurationibus ex caricis decoctis, hordeacea farina, althææ radice, colubino stercore, & mordica resina terebinthina, ex Pauli, & Aëtij sententiis. Ceratum quoque conficere poteris ex butyro, ruta, iride, bacis, lauri, vt Aëtius inquit, cui radicem maluæ, aut althææ, adipem ex prædictis, farinam hordeaceam, aut triticeam, oleum commune, amygdalarum dulcium, aut chamæmelinum, simulatque ceram addere poteris. Quo item tempore ius ex confusis carnibus gallinarum, aut gallinaceorum pullorum, perdicum, phasianorum, aut flarnarum paratum, etiam cum ptisana permixtum assumere agri poterunt, præsertim vbi imbecilliores vires fuerint, cum non parum eis conducatur pro puris generatione. Pure autem genito, quæ abscellum rumpunt adhibenda erunt, velut ex multa sorbitio interposito tempore, & ptisanæ cremoris cum melle: & si valentiores agri fuerint (vt Paulus refert) decoctum hyssopi, & thymi cum melle: item falsorum esum, commendat, & catapotia ex hiera diacolocynthide, a quibus abstinere consulo, nisi valde robusta sint corpora, quibus hæc tribuantur: potius verò, syrupum ex hyssopo, aut è marrubio crebrius ad huc vsum præberem. Conducit quoque non parum ad abscellus rupturam, super sanum latus decubitus: legitur etiā apud Hippocratem libro de locis in homine, quod purulentis, cum excreationem facere oportet, pluribus cibis, & salis, ac pinguib. vtendum est, & vino austero, & cum sic habet tulsis inducenda. Ab extra verò vile est (vt Aëtius inquit) cataplasma ex solo stercore caprino, præsertim vbi ruptura tardauerit. Verum rupto abscellu adiuvare oportet puris excreationem, quocunque reperere cognoscatur, ex decreto eiusdem Aëtij. Nam si ad alium proreperet, magis emollientia offerenda sunt: si ad vesicam serpat, ea quæ vrinam magis cient adhibenda: si verò per tulsim puris repurgatum fiat, nihil cōuenientius, aut familiarius exhiberi poterit, quàm ptisana optimo melle permixta: item dari poterit (vt Paulo visum est) hyssopi, iridis, aut dulcis radice decoctum in multa diluta; cui quoque sententiæ ad stipulatur Aëtius: item & radice dulcis succus commendatus confert. Et si pus, quod expuitur, foedi odoris, ac sordidum fuerit, foenigraci cremorem cum palmulis pinguib. decoctum dare confert, horum inopia, siccus quoque siccas modicas incoquere. Præstat etiam si mellis paulum admisceas, vbi cremorem exhibiturus es, vt Alexander scriptum reliquit: per aliquod tamē tempus ante cibum potius ipsum dato. Benefaciunt quoque (eodem auctore) hyssopum, thymum, aut iris contusa, seu pulegium, scorsum assumpta, aut cum melle mixta: nam generose (vt ipse inquit) repurgant. Idem quoque medicamentum commendat, quod recipit nucem pineam, quæ

cap. 11
Dubio

Responsio.

cap. 12.

quæ copiosam resinam peculiarem sibi circundatã habeat, cum marubio recetĩ decoctã, deinde mellis medicũ decocto misceto & rursus hoc vsq; ad mellem crassitiem incoquito, & vitur, in quẽ etiam vsum cõducunt, mel rosacẽ, syrupus ex adianto ẽ glycyrrhiza, de hyssopo & marrubio. Vtilis quoque ad puris repurgationem existit alliorum præcipue coctorum comestio, robustis præsertim, vt Aëtius fatetur. Interea ex hyssopi puluere, vel abrotoni mixtis seminibus in decoctione pinguium caricarũ medicamentum paratur. Similiter etiam terebinthina munda in mensura vnius cochlearis, ieiunis quàm maxime, & viribus reparatis datur, ex Theodori Prisciani sententia libro secund ad Timoth. part. 2. cap. 10. Cæterum vndeunque puris excretio contingat, eodem Aëtio teste, ea quæ vrinam cient, cibis commodẽ admiscetur: quãuis hoc pugnare videtur Galeni verbis libro quinto de simpl. med. facult. cum asseruit medicamenta vrinam cientia acriora esse, & valde exalfacientia, quæ omnia aduersa sunt puris ex thorace expuitioni. Quippe cum natura eorum sit, tum exalfactoria exsiccatóriaque tum etiam secretoria, & coactoria. Quod verò coactum est acque exsiccatum, haud etiam facile expuitur: proinde huiusmodi medicamenta, quæ expuitioni ex thorace puris opitulatur, incidendi, atque extenuandi, & detergendi vim habeant oportet, sed non tamen insigniter calidam, ne videlicet validẽ desiccet, veluti ea, quæ vrinam valenter ciunt. Atqui nodus hic bifariam solui poterit, primò quòd Galenus acriora medicamenta dixit plurimam mouere vrinam (cũ nonnulla alia eam ciere possint, quæ acriora non sunt) quæ insuper puris ex thorace expuitioni aduersa esse fatetur: cum simul cum caliditate valenter desiccet: & propterea ab eo peculiariter hæc dicuntur vretica, siue vrinam mouentia, nõ quia hæc solum vrinam moueant (quoniam & alia quoque medicamenta, quæ non adeo calida sunt, neque desiccant, vrinam prouocant) sed quia iam dicta medicamenta solas vrinam mouent, propterea peculiariter vretica nuncupantur, à quibus abstinendum esse pro puris ex thorace expurgatione, eodem loco præcipit, & non ab his, quæ non adeo calida, & sicca, seu acria sunt, & ab Aëtio commendantur. At si quis velit, cuncta quæ vrinam ciunt ab eodem Aëtio commendari, dicimus nos, quòd eisdem etiam vti possumus, modo quo præcipit Aëtius, ea scilicet cibis admiscetes, quæ suapte natura humidiora sunt, vtpote ptisanæ, aut cuiuspiam iuri ex prænominatis; id quod neque Galenus ipse negauit, cum præcitato libro quinto de simplic. med. facult. dixerit eadem medicamenta vretica, acria, plurimum mouentia vrinam commoditatis gratia, pro expurgando ex thorace pure, cum sorbituunculis, portionibusque humectantibus exhiberi posse: obtunditur etenim prædictorum medicamentorum caliditas, ac siccitas immodica ex admistione sorbitum, ac aliorum ciborum, seu portionum humectantium. Quòd si diuturnior affectus fuerit, imbecillæ vires, ac febrilis calor moderatio euaserit, neque thorax multum puris contineat, lac (vt inquit Alexander) dari debet, asinum præcipue, vbi sordidum ac fœdi odoris pus expurgatione indigens existat; hoc enim omnibus aliis antecellit, vt ipse inquit: post ipsum equinum propinandum erit, quod asinino ad omnia sit persimile. At si hõrum animantium ægri lac nolint as-

umere, dabitur ipsis secundo loco bubulum, aut caprillum: nam & si non adeo purgantẽ vim obtineat horum lac, nutriendo tamen amplius quiddam aliis præstare potest: & si timor absit, ne ægri ventriculũ lactis corrumpat potio, satius erit ipsum incoquere: nam decoctio bonam serosi partem auferet, vt etiam ipsum efficax euadet ad ventrem retinendum. Commodius quoque adhuc, & vtile efficies, si calculos fluuiales candentes, excussosque iniicias, aut ferramẽta eodem modo ignita. Vnus denique lactis vlcus purgare, carne obduce, & totum corpus, plusquam vniuersa nutrire poterit, vt idem Alexander inquit: verum de hoc in sequenti capite fusiùs pertractabimus.

Περὶ τῆς φθίσσεως.

CAPVT LIII.

De tabe.



TABES diutius, sæpe & periculolius tabes eos male habeat, quos inuasit, vt legitur apud Celsum cap. 22. lib. 3. tamen plures sunt eius species, vt ipse inquit; quarũ vna est, quæ corpus non alitur, & naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis verò in eorum loco subeuntibus summa macies oritur, & nisi occurratur, tollit: hanc tabis speciem *ἀρεσφίαν*, Græci vocant. Altera species est, quàm Græci *καχεξίαν* appellant, vbi malus corporis habitus est, ideoque omnia alimenta corrumpuntur. Tertia est, longẽque periculosissima species, quàm Græci (vt ipse inquit) *φθίσην* nominauerunt, quemadmodum Hippocrates nonnullis in locis, præsertim aphorismo 16. septimi libri, nominauit: licet hanc etiam Græci potissimum Athenienses (vt Galenus in commento refert) *φθίσην* appellent. De hac itaq; tertia specie, quàm Græci *φθίσην*, aut *φθίσην*, nuncupare consueuerunt, Latini tabẽ, reliquis duabus posshabitis, pertractare intendimus quãuis & hæc quoque *φθίσην*, seu tabes, non vno modo in Galeni doctrina intelligatur: nam tabidos interim nominat eos omnes, quomodocunque extrema macie confectos quocunq; extenuentur modo. Interdũ verò illos solum, quibus pulmo est exulceratus: quandoq; autem eos, qui natura proni, seu apti sunt ad hunc morbum, veluti videre licet commento aphorismi 10. & 13. tertij lib. & 8. 4. ac primo de morbis vulgaribus, & sexcentis aliis in locis. Nos verò per tabidos audiri volumus non eos, qui extreme emaciati sunt quomodocunque, nec eos qui parati sunt ad hunc morbum, vtpote angusto, & restricto thorace existentes, vt à tergo in morem alarũ promineant opera scoptula, quos propriè Græci *πτερυγῶδες*, quasi alatos vocant, & quibus à capite ad pulmonem fluxio defertur: nanque hi quoque faciliẽ tabescunt, cum caput faciliẽ impleatur, spiritusque organis multas destillationes demittat: Galeno teste, eodem primo libro de morbis vulgaribus. Verum eos duntaxat, quibus pulmo exulceratus est: veluti per tabem intelligi volumus vlcerosam dispositionem in pulmone existentem, quàm idem Galenus describens commẽto præcitati aphorismi 16. septimi lib. totius corporis extenuationem esse dixit, cum febre tenui, seu exigua, consequentem ad insanabilia pulmonis vlcera. Voluit quoque Hippocrates libro secundo de morbis, ac libro de internis affectionibus, tres item esse tabis species, quarum prima à pituita fit è capite ad pulmonem confluente; secunda à labore; tertia à spinali, seu

Tabis species tres.

Tabes, quæ phthisis appellatur vbi etiam modis dictatur.

1. de morbis vulgaribus. commentario 1. comment. 10.

Comment. 1. comment. 13.

De qua tabe hic tractatur. Quid sit. 2. de morbis, paulo post mediũ. De inter-nis affectibus. circa prim.

Quod hæc
est tabes
bisaria di-
catur.

De definitis
medicis, in
medio.

est adu-
m

est adu-
m

est adu-
m

est adu-
m

est adu-
m

est adu-
m

dorsali medulla, quæ maxime corripit recentes spō-
los, & veneri deditos. Nos verò (vt diximus) reli-
quis omnibus posthabitis tabis speciebus, seu diffe-
rentiis, de ea verba faciemus, quæ totius corporis ex-
tenuatio est, cum febre lenta, conſequens ad infana-
bilia pulmonis vlcera, Galenum ſc̄ctat; aut ſiquis
vellet breuiorem afferre definitionem, eam nomi-
nabit, tabem, de qua ſermo habendus erit, quæ vl-
ceroſa pulmonis diſpoſitio eſt, quemadmodum Ga-
lenus eam nuncupauit aphoriſm. 11. libri quinti, &
decimo libri tertij, & poſt eum Aëtius cap. 67. lib.
8. & Paulus cap. 32. libri tertij, quamuis auctor libri
de definitionibus medicis, per tabem propriè dictā
nedum pulmonis vlcerationem, verum etiam tho-
racis, vel faucium ſubintelligi voluit, quam & tuſi-
cula, & debiles comitantur febres, atque in eis cor-
pus conſicitur. Exquiſita itaque tabes (ex Hippo-
cratis & Galeni monumentis) erit corporis conſum-
ptio, ſeu colliquatio cum febre lenta, ex pulmonis
vlcere: quamuis improprie, ac non exquiſite tabes
nuncupari poſſit ea quoque totius corporis demo-
litione, ſeu extenuatio, quæ thoracis, aut faucium, ſeu
aſperæ arteriæ vlcera comitatur, præſertim vbi non
exactum adeo ſermonem occaſio requiratur licet re-
uera, qui hoc modo laborant tabidi non ſint, ean-
dem tamen curationem exigunt: tabeſcit ſiquidem.
& in his tēporis progreſſu corpus totū veluti in pro-
prie dictis tabidis, præſertim ſi in thorace, aut aſpe-
ra arteria exulceratio fiat: propterea quod cor ipſum
ſimiliter eiſdem ſiccari oporteat: abſque enim prin-
cipis membri paſſione heri non poteſt, vt animal
in toto afficiatur, vt libro de maraſmo, decretum
reliquit Galenus, quamuis non æqualiter ſingulæ
corporis partes tabeſcant. Verū cor, & iecur, mi-
nus quam partes aliæ attenuantur in tabidis: cor ſi-
quidem, quoniam facultate trahēdi vehementi pol-
let, quapropter ſanguinem valentiſſimè attrahit: &
nō priuſquam vltima ſit membrīs omnibus inopia,
ipſum alimento caret: iecur verò, quod ſanguis to-
tus inde initium habuerit, vt apud Galenum legitur
præcitato libro de maraſmo, cap. 5. Id verò quod in
ſingulis partibus, & præcipue in corde (vt diximus)
per tabem primò demolitur, humor eſt in eiſdem
inſitus, ac per loca media partium ſimilarium diſper-
ſus, ex quo membra primū aluntur, verū quo-
uſque in corpore cordis aliquid ipſius ſeruatur, li-
cet propius veram tabem accedant, tabidi re vera
appellandi non ſunt. Cum verò ad carnoſum genus
conſumptio pertranſit, aut ad fibroſam, ſeu mem-
branofam ſubſtantiam, omnimoda facta conſum-
ptione ob ebullitionē iam dicti humoris inſiti, ex-
quiſitus tunc marcor exiſtit, vt legitur apud Galenū
ſeptimo & decimo method. medendi, ac primo de
different. febr. cap. 9. Nos verò qui adeo exacto ſer-
mone de extenuatione loqui non intendimus, & ſi
de ea loquamur, quæ vlcera pulmonis, aſperæ arte-
riæ, aut thoracis conſequitur, quoniam exſiccato hu-
more duntaxat, diſperſo per loca media partium ſi-
milarium, cordis præcipue, ac totius corporis, eiſ-
dem corporis exſiccatio quædam, ac extenuatio ſit,
adhuc tabem eam eſſe dicimus: nam licet perpetuò
exulceratio præcedat, non tamen ex ea conſeſtim
carnoſarum partium, aut fibroſarum, ſeu membra-
noſarum conſumptio ſequitur, ſed prius nuper di-
ctus humor conſumitur. Ex tuſſi autem, ac anhe-
litus difficultate aliquam prædictarum partium af-
fectam eſſe conſicere poteris: quæ autem earum ſit,

ex aliis quibuſdam ſignis comprehendas: nam pul-
mo ſi fuerit, plurimum erit quod per ſputum rei-
citur, dolor non aderit, ſiquidem pulmonis vlce-
ra dolor non comitatur, Galeno teſte, quarto de
locis affectis, cap. 8. Et ſi in eius parenchymate ex-
ulceratio ſit, ex eiſdem pulmonis eſſentię proprie-
tate percipies, cum ipſius pulmonis caruncula per
tuſſim reiiciatur: haud ſecus ſi bronchij pars qua-
dam tuſſiendo reiiciatur, ſecundum aſperam arte-
riam pulmonem exulceratū eſſe exiſtimamus: quin
potius totum bronchion reiici neceſſe eſt. Similiter
ſi arteriæ quapiam, aut vena in eo exulcerata fuerit,
ipſarum quoque portionem aliquam, præſertim vbi
fructum valis haud paruum fuerit, tuſſiendo expui
oportet. Orto verò in aſperâ arteria vlcere, præter
hoc quod ſputum purulentum apparet, dolorē quo-
que in loco affecto laborans ſentire conſuevit: ipſum
verò per ea, quæ ſcreantur, quia exigua ſunt, ab vl-
cere quod in pulmone natum eſt, diſcerni poteſt:
quippe ab vlceribus pulmonis plurimum reiicitur.
Ita quoque videmus interdum per exulcerationem
excreari ex gutture corpusculum aliquod à ſigula
(Græci *πυλωρίδα* vocant) cum pars ipſa efficitur:
id verò non ſolum hoc indicio deprehenditur, ve-
rum etiam ex eo, quod in vlcerato loco doloris ſen-
ſu laborans infeſtatur, veluti de aſperâ arteria iam
dictum eſt. At ſi nullus in prædictis partibus dolor
ſentiat, nec aliquod iam dictorum ſignorum ad-
ſit, verū cum purulento ſputo in thoracis parte a-
liqua manifeſte ſenſus doloris adſit, thoracem af-
fectum eſſe cenſeto. Affectus hic cum exulceratio
ſit, morbus planè erit in ſoluta continuitate. Digno-
ſcitur autem ex frequēti tuſſi, per quam pus excrea-
tur, interdum eruentum aliquid, vt inquit Celfus,
quod ſi in ignem impoſitum ſit, mali odoris erit.
Comitatur autem neceſſario affectum hunc totius
corporis extenuatio, ac carniū conſumptio, & fe-
bris quædam lenta, ſeu exigua, vt patet commento
aphoriſmi 16. ſeptimi libri, potiſſimum vbi pulmo
exulceratus fuerit. Vt verò Celſo viſum eſt, febrili-
cula leuiſ ſit, quæ etiam cum quieuit, tamen & re-
petit: verum proprium exulcerationis indicium eſt
(vt ipſe Galenus inquit, primo, & ſexto de locis af-
fectis) vocatum ramentum, ſeu cruſtula quædam ei-
us particulæ, à qua excernitur, Græcè *εφελεία* di-
ctâ; ſpirituum instrumentorum, ſi tuſſiendo excre-
natur: proprietas verò eſſentiæ eiſdem affectu par-
tis proprium indicium eſt. Diſcernunt præterea plu-
rimi purulentum liquorem, vt ex Celſo Aureliano
liquet, libro ſecundo, cap. decimo quarto, phlegma-
ta carbonibus imponentes quò exuſta probentur.
nam terti odoris eſſe neceſſe eſt, omne quod natura
fuerit mutatum, velut ex deſluxione carnis veniens:
item in aquam mittunt ægrotantium putamina, oco-
nimnatur, alia facile ſoluuntur, vitriata verò, atque mu-
tata perfeuerant, quadam tenuitate coacta, & ſubli-
dunt, ſiquidem ſint grauia, & cōtra naturam ex de-
fluxione carnis venientia: verū cum cōfirmata ta-
bes fuerit, præter carniū conſumptionem genē li-
ueſcunt, vngues curuantur, exalbidi, vel pallidi ap-
parent: & malo iam vincente, capilli de capite de-
fluunt: aluiq; profluuiū ſuperuenit Hippocrate au-
ctore: præcordia ſuſum cōuelluntur, litis ipſos ma-
gis cōſicit, cibiq; ſatiſdium vrget: & id quod ſuſum
vergit, ac per ſputū reiicitur, vehementer foedi odo-
ris eſt, vt inquit Paulus. At tabi dorum pulſus langui-
dus eſt, ac paruus propter ſacultatis imbecillitatem non

non nimium celer, vt plerique febricitantes habent, quod non detineantur vrente febre: Habent tabidi pulsum hecticum, hoc est, vndequeque similem, quoniam & febre habent hecticam: hic enim à febre, quæ vniuersum corporis habitum occupauit, appellatur pulsus, vt libro quarto de causis pulsum, cap. vndecimo, scriptum reliquit Galenus. Oritur tere à capite tabes, inde in pulmonem destillat, huicque exulceratio accedit, ex Celsi decreto: etenim quæ capitis destillationes tussim primo concitant hominibus, & rauedinem, neque tandem consistunt, tabem generant, Galeno teste, primo de Morbis vulgaribus, cuius duæ sunt maximæ differentiæ, vt ipse refert; vna ex illis, quos caput demittit, fluxibus constat; altera, quæ ab ipsius pulmonis malis profiscitur, omninoque postquam expuitur sanguis, potissimum vase rupto: sæpenu- merò etià fluxione impleto viscere hoc, alia de cau- sa ex partibus aliis, nõ ex capite. Aerius verò pulmo- nis exulceratione ad sanguinis sputiones præcitato loco cõsequi fatetur: cū videlicet sanguinis eruptio- ne suppressa, vlcus non fuerit conglutinatum, ne- que cicatrix in ducta: consequitur etiam in suppu- ratas, & peripneumonias, item aliquando in affe- ctionibus pleuriticis. Quo autem modo interstinguē- dæ sunt prædictæ tabis causæ, faciliè patere poterit, si quis eas, quæ præcesserunt destillationes, sanguinis reiectiones, suppurationes, peripneumonias, ac pleuritides, ex his, quæ in propriis earum affectionum capitibus retulimus, considerauerit: reliquum est, vt prognostica aggrediamur. Sit autem primum, quod licet vlcera creberrimè in pulmone fieri possint, curationem tamen (vt quibusdam visum fuit) ne- quaquàm admittunt: aut (vt aliqui putant) difficulter admodum sanantur, quemadmodum liquet, tum quarto de locis affectis, cap. 5. tum quinto methodi medendi, ca. 8. & vndecimo. Ipse verò Galenus dif- ficillima sanatu esse pulmonis vlcera fatetur, vt quæ nec ita tussim expurgari possint: & si tussim exci- tes, laceraueris: itaque quasi per mutuas operas ma- lum is in orbem redit: tum etiam quod ea, quæ ido- nea vlcerebus medicamenta sunt, contingere vlcus, sicuti in ventriculo, non possunt: vt quod per me- dium interuallum, ferè vim suam amittunt. Et præ- terea, quod præter id, quod tussiendo lacerantur, respirando etiam mouentur: & proinde cõcludebat eodẽ quinto methodi medendi, ca. 11. quod cū in pulmone ruptū vas est, scire aperte licet (nisi protin- us antequam phlegmone excitetur, glutinatū sit) id postea insanabile fore. Quod si aliquādo curetur, relinquitur tamè in ipso res quæ dā callosa, fistulo- sã, quæ tractu tẽporis à leui occasione expelli so- let, vt quarto de locis affectis, ca. 5. liquet: quamuis si exantemata quæ dā in pulmone sint orta propter vl- cerum siccitatem, sanari possint, præsertim vbi aspera, & scabiosa fuerint, vt idem Galenus testa- tur libro quinto methodi medendi, ca. 12. & 14. quæ- ritiosius erosione vlcus in pulmone habent, cū longo tempore omnino opus sit ex succi corrigatur vitiū. At quæ in thorace vlcera sunt, nõ omnino veluti iã dicta, curationi resistunt, etiam si diuturna fuerint, vt eodẽ quarto de locis affectis, cap. 5. liquet: ete- nim quæ ex pectore educuntur, triplex cõpendium præstis, quæ ex pulmone vacuantur, habent: nam & vasa ipsa multo sunt minor, & fanies in spaciū interius effluit, & in summa magis carnosum est pe-

ctus quàm pulmo, vt patet eodẽ quinto methodi medendi, cap. 8. Ceterum vlcera, quæ in asperæ ar- teriæ interiore sunt tunica, & potissimum, quæ sum- mæ eius parti, quæ *ἀσπρὴ γὰ* vocant, sunt vicina, aut etià in ipsa, hæc & curationem recipiunt, & nos non paucos (vt Galenus præcitato loco inquit) eorum, qui ita sunt afflicti, sanauimus, quorundā autem eor- um historia ibidem cõscripsit, potissimum vbi in- terna eiusdẽ asperæ arteriæ tunica exulcerata fuerit: namque ea sanatu est facillima, ac omnis, qui in ea or- tus fuerit affectus, faciliè sedatur, nisi fortè aliquādo à putredine aliqua magna ipsius portio quæ dā cor- rosa cartilaginem nudam penitus destituerit. Ve- rum si ipsius cartilagines exulceratæ sint, aut insa- nabiles, aut sanatu difficillimæ erunt: nāque car- tilaginum affectus (vt Galenus testis est, libro se- ptimo de vsu partium cap. 7.) omnino insanabiles sunt, aut sanatu quàm difficillimi. Quæ de re prius- quam malum ad cartilaginem peruaserit, asperæ ar- teriæ exulceratio protinus etiam vt sanetur, labo- randum erit. In tabem verò incidunt maximè iuue- nes, Hippocrate auctore, aphorismo 29. tertij libri, in eam tamè potissimum (vt Galenus in eõ comment. inquit) quæ ad sputum sanguinis consequitur: Illū verò non ob ætatis imbecillitatem, sed ob inconti- nentiam, seu intemperatum victum. Hoc idem con- firmavit Hippocrates aphorismo nono quinti libri, eum dixit, tabes sunt præcipuè ætatibus à decimo- octauo vsque ad trigessimūquintū annum, & Cel- sus morbum hunc ætate firmissima maximè oriri cẽ- suit, id est, ab anno duodecimo ad annum quintum & trigessimū. At qui tabe molestantur, si sputum quod extulsiunt, grauè oleat iniectū carbonibus, & capilli à capite destillant, lethale; quibuscunque et- iam tabe laborantibus, capilli à capite destillant, iis alui profluuiū superueniente moriuntur. Tabes itē laborati profluuiū alui superueniens, lethale, vt a- phorismo 11. 12. & 14. quinti libri, patet. Verum idē Hippocrates de tabidis sic scriptum reliquit, apho- rismo duodecimo sexto septimi libri, à puris sputo phthisis, & fluxus: cū verò sputū retinetur, moriū- tur: modum siquidem ostendens in hisce verbis, vt Galenus in commen. refert, illorum qui ex tabe mo- riuntur; eousque enim extenuati viuunt, donec per ea quæ expuunt, possunt pulmonē expurgare: cū vero intus manent, obseruantur quidem viæ spiri- tus, patientes verò strangulantur. Quod autem au- tumus tabidis malus sit, aphorismo decimo tertij libri, patet: similiter quod nec per superiora, sed per inferiora medicandi sunt, propter instrumentorum, quæ respirationi obseruiunt, imbecillitatem, liquet aphorismo octauo quarti libri. Ceterum idem Hip- pocrates libro secundo prædictorum, hæc de tabi- dis scripta reliquit. oportet enim eum, qui probe liberari volet, faciliè sputum per tussim reicere; & id esse album, & æquale, & eiusdem coloris, ac ab inflammatione alienum: quod verò à capite destit, ad nares cõuertit, febre autem non inuadere, vt ne à cœnis prohibeatur, neque sitiat: vter autem egerat quotidies; & id quod egerit sit durum, copia pro- ratione ciborum ingestorum. Hominem verò quàm minimè tenuem esse oportet, pectus autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum, & os ipsius paruum sit, & robustè carnosum. quicunque enim hæc omnia habuerit, maximè superstes erit; qui ve- rò nihil horum habet, interitui proximus est. Huic malo inter initia protinus occurrere necesse est, ex

5. method.
cap. 12.

Non multo
post præci-
pium.

Celsi decreto : neque enim (vt ipse inquit) facile is morbus cum inueterauit euincitur. Atqui nos cum de sputo sanguinis verba facimus, cruentorum adhuc vñlerum, tum pulmonis, tum aliorum instrumentorum respirationi deseruietium, curandi modum instituimus. Reliquum erit, vt reliquorum vñlerum in eisdem partibus ortorum curationem cōscribamus, & si ea, quæ in pulmone hæserunt, vel difficiliora ad curandum sint, vel eorum curatio perfici omnino nequeat, propter iam dictas causas; ne tamen tanquam deplorati destituantur, quomodo hi tractandi erunt, ac reliqui, qui in aliis partibus iam dictis ab vñlere oblati sunt curandi, docebimus: id tamen prius commonefacientes, quod & si nonnullæ traditæ sint pulmonis, thoracis, seu asperæ arteriæ vñlerum causæ, de ipsis haudquaquam sermo faciendus erit, cum in præcedentibus singularum causarum curationem perscripserimus. Quare si qua earum adhuc permanserit, ex iam dictis curationem petas: modo autem de tabe duntaxat, quatenus vñlerea pulmonis, thoracis, seu asperæ arteriæ consequitur, deq; ipsis vñleribus agemus. Initio itaque aer eligendus ad sicci parum vergens; in calore verò, & frigore temperatus, quemadmodum Galeni tempore in Tabiis habebatur; locus siquidem inter Surrentum, & Neapolim, mediocris altitudinis, velut ipse quinto methodi medendi, cap. 12. describit, & nos propriis oculis non semel duntaxat vidimus. Sol item & frigus propterea vitandi sunt: verum (vbi vires patiantur) opus est longa navigatione, cæli mutatione, sic vt densius, quam id est, ex quo discedit æger, petatur, ideoque aptissimè Alexandriam ex Italia itur, vt ait Celsus, potissimum vbi à destillatione tabidi fiant, somno indulgendum; nocturno tamen ac moderato vtantur. Exercitia immodica vitent, aut modica exercitatione, seu ambulatione potius, præsertim vbi remiserit febris, vtantur; vel lenibus frictionibus ante cibum. Aluus lenis, licet conferat, non tamen immodicè cienda erit. Abstineant ab ira, tristitia, aliisque immodicis animi affectibus, tum à negociis, omnibusque rebus, quæ sollicitare animum possunt, necnon à venere: crudelitatemque omnino vitent. Cibi eorum sint sorbitiones ex ptisana, alica, amylo, vel oryza, lacte adiecto, vt inquit idem Celsus: vel parètur huiusmodi sorbitiones cum lacte amygdalarum, gallinarum, seu pullorum iure, caponum, perdicum, seu phasianorum: aut simul cum pedibus vitulorum, hædorum, aut castratorum decoquantur: Exhibeantur item prædictæ carnes contusæ, aut earum succus, quem consummatum ius appellant: adiecta ptisana, aut eius cremore exiguò. Aetius verò amygdalas amaras cum ptisana decoquere bonum esse dixit. Conferunt item cancri fluuiatiles, erudi, triti, cum lacte potati, aut cocti in cibo sumpti, assidue iure eorum insuper absorpto, vt idem inquit Aetius: hædi quoque lactantis, capreolorum, seu vitulorum carnes interdum gustare poterunt: turdorum quoque, ac aliarum paruorum auium. Verum licet, qui ita se habent, non paucò indigeant nutrimento: quoniam etiam ad concoquendum; vt nequeant; propterea, q̃ mediocre est, concoquere: ea de re paulatim hos, & sapius cibare oportet, ita vt semel, aut bis eos cibasse satis non sit; qua de re per eos cibare conuenit, quemadmodum in refectoria vocata victus ratione, quoad gracillima torpora sint, ob-

Curatio.

Vñlerum ratio.

seruari iussit Galenus septimo methodi medendi, ca. 6. Sitque alimentum in vniuersum quod sine negotio & trahatur, ac promptius alendis partibus assimiletur: nam non aliud est, quod nutrimentum desiderat, & aliud quod ipsum conficit; sed quod nutriendum est, ipsum sibi & nutrimentum attrahit, & mutat, & concoquit, & adiungit, & assimilat, vt eodem septimo methodi medendi, ca. 6. liquet. Cuius rei gratia non ab re nihil lacte præstantius esse videtur, quemadmodum Galenus libro de marasmo, cap. vlt. de cibis boni, & mali succi, ca. 3. & quinto, & septimo methodi med. & sexcētis aliis in locis scriptum reliquit, & ante ipsum Hippocrates, aphorismo 64. quinti lib. & post eum vno ore medici omnes: eo quod omnium ferè, quæ mandimus, lac optimum, optimi est succi, ac multi alimenti, vt tertio de aliment. facult. cap. 15. patet ac medicorum omnium auctoritate, lib. de cibis boni, & mali succi, cap. 3. confirmauit Galenus, promptèque concoquitur, ac distribuitur. Erit autem optimum, vbi nullam externam qualitatem, odore, gustuue præ se ferat, sed esto quàm dulcissimū, & sibi ipsi continuū; & prout lacti cōuenit, splēdens: super omnia quoad eius fieri potest, similes habeto partes. Quo verò tale fiat lac, ea seruanda sunt, quæ Galenus docuit septimo methodi med. cap. 6. idem quoque optimum lac, nedum vt alimentum, verum etiam vt medicamentum summo opere conducit: nanque thoracis ac pulmonis partibus lac omne est vtile: necnon & iis, qui quauis ex causa tabe laborant, aut vñlus habent in pulmone, vt tertio de aliment. facult. cap. 15. & 16. apud Galenum legitur: detergit etenim, ac vñlerea repurgat serosa eius substantia, & consolidat caseosa, febrileque aduersatur. Quapropter nonnulli (vt idem auctor testatur lib. de bonis & mali succi ca. 3.) pulmonis vñleribus affectos potione tantum lactis curari putat: antea scilicet, quàm ea ipsa vñlerea amplientur, callosaque fiant: sed præ ceteris lac muliebre, tanquā naturæ eiusdem, nobisque cognatum, ac accommodatum ab aliis medicis, præcipueq; ab Herodoto, Eurypbone & Prodicò celebratur. Vbera quidē more infantium, illorū iudicio ab ita affectis fugēda sunt: quæadmodum eodē lib. de cibis boni, & mali succi, cap. 3. septimo methodi med. cap. 6. & lib. de marasmo, cap. vlt. scriptū reliquit Galenus, verum cum hoc plurimis non placeat, melius est calens adhuc ex māmillis id in ægri ventriculum, quàm ocysimè transferri, propterea quod celerimè mutari sit aptū: & proinde astante animali statim multum ipsum bibat, oportet. Quod si muliebre lac sibi exhiberi recusent, asininum ipsis dare conueniet; id enim reliquis omnibus vtilius est, quippe cum tenuissimum sit, ac serosum valde, & maximè coaguletur, & quoquoersus ocysimè in corpus digeritur: quod etiam si non adsit (licet omnium cōuenientissimum phthysicis sit) bubulum, aut caprillum exhibendum erit, Aetio auctore: nam caprinū inter cætera lactis genera moderatè se habet; cum non admodum pingue, crassumve sit, ob idque medium quoque esse censetur, quod in corporibus nostris præstat. igitur lac ipsum per se est his dādum, tum etiā mellis tepidi paucillulū immiscendū, si cui cogi in vñtriculo solet, aut saccari, seu rosacei mellis, prout ego vtor, potissimū vbi caprinū sit lac: nā id sine melle sumptū periculosum est, vt cōstat præcitato li. de cibis boni, & mali succi, ca. 3. Quantitas verò eius quod assumitur, moderata sit.

Dabim.

Responso prima. Impugnatio.

Responso ue.

ita vt non excedat, potissimum circa initia vnc. iij. vel iij. procedente vero tempore (si opus fuerit) quantitate adaugeas, inspecta tamen natura, etate, ac agrotantis consuetudine, si lacte delectatur. Post cuius assumptionem, & quiescant acri, nec dormiant, aut alium cibum, potissimum vinum, sumant, ne ipsum in ventriculo corrumpatur, aut ad caput vaporet: cauendus tamen lactis usus erit, vbi valida tabidi febre corripitur; cum eis duntaxat dare conueniat, qui non valde multum febricitant, ex Hippocrati sententia apho. 64. quinti libri, quo casu pituita, eiusque cremore vtare, modo prius dicto paratis, Inter fructus conducunt vix passae, ficus, nuxes pineae, & amygdala, ac palmulae. Eorum vero potus sit aqua coelestis, vt inquit Paulus, aut mulla inde confecta: ipsam quoque aquam mullam per se, & cum amylo, aut melle, & radice dulci in ea decoctis commedat Aetius. Vici cuius aqua hordei ex hordeo non decorticato, ac tosto, sola, aut glycyrrhizae radice etiam decocta vti poterunt: poteritque in ea canculos quoque fluuiales decoquere, aut saltem eos cum pituitana decoctos, aut lacte (vt diximus) tribuas. Vino quoque interdum pro potu vtantur leni & austero, vt Celso visum est, mediocri tamen valde mensura, vt ait Aetius, vbi praefertim vires indicabunt, & febris remissa fuerit. At cum mel calidis marasminis, ac heceticae febris aduersissimum sit, vt libro de marasmo, cap. 9. & decimo methodi medendi. cap. 11. liquet, quippe cum protinus vertatur in bilem, & siciores, acriorisque caloris febres reddat, non ab re habebit quispiam in Aetium, & Paulum, propter quid tabidis aquam mullam bibendam admittant? Atqui dices non absolutum mel, id quod auersatur Galenus, eisdem admittere, sed aquam mullam, in qua mellis caliditas permixtioneaque obtunditur; praefertim vbi dilutior fiat. Verum nisi Galenus, eodem decimo methodi medendi, necdum mel, sed etiam aquam mullam in heceticis febribus vitasset, ex iam dictis forte liberari a calumnia possent Aetius, & Paulus; sed cum ab ea etiam quoad fieri possit, abstinentum esse iusserit, nullius momenti nuper data responsio esse videtur, sed aliter, & rectius dicendum erit. Quod heceticae febris, seu marasmo exurenti duntaxat aduersissima est aqua mulla potissimum quae non admodum diluta est propter traditam a Galeno causam; quo casu neque eam praedicti auctores tribuerent; verum tabidis ipsam commedant, vt pote quibus precipuus morbus, vlcus est, licet & febris hecetica, & marcor ipsum sequantur. Mel autem non modo quia detergeri vim habet vlcetri non nocebit, verum digestionis aliorum medicamentorum in corpus instrumentum erit, ac celesis transitus veluti vehiculum: qua de re omnibus medicamentis, quae thoracis, & pulmonis vlcibus sunt destinata, ipsum admiscendum esse praecipit Galenus quarto methodi medendi, cap. 7. Maius itaque ex usu aquae mullae commo dum consequitur ipsis tabidis ex absterfione (cum princeps eorum morbus vlcus sit) quam incommodum propterea quod marcori, & heceticae febris, qui secundarii eorum affectus sunt, vt pote vlcus ipsum consequentes, aduersetur, praefertim vbi dilutior fuerit, vt diximus. Et quoniam Paulus tanquam optimum auxilium boli armeniae potionem commendauit, propterea ipsa cum eadem aqua mulla exhibita conducet, aut inpersum in pituitana, seu eius cremore, quantitate scrup. j. aut drach. s. pro qualibet vice. Aetius vero eiusdem boli ar-

meniae darch. j. ex vino tenui albo, tanquam efficax medicamentum commendat: nec minus confert saccharum rosaceum saepius exhibitum per se, aut cum pituitana cremore: interdum etiam & herbam sanguinali ex aceto, vel plantaginem esse, vtile est, vt apud Celsum legitur: item plantaginis succus per se, vel marrubium ex melle coctum, ita vt illius cyathus sorbeat, huius cochleare plenum paulatim delingatur: vel inter se mixta, & cocta resina terebinthina pars dimidia, butyri, & mellis pars altera, ab eodem auctore commendatur. Et vt summum dicam, medicari pulmonis vlcibus oportet (vt Aetius refert) eo apparatu, quo facile sursum efferantur humores, cura simul adhibita, ne alij congregentur: excogitata autem a medicis proinde sunt, vbi expurgandum ex pectore, & pulmone pus est, fortissima, vt inquit Galenus quinto methodi medendi, cap. 11. (quaeque maxime dissecant) pharmaca: in quibus vsum summopere conducit, praeter iam dicta aqua mulla per se, & cum amylo, aut melle, & radice dulci in ea decoctis, vel hyssopo, seu marrubio, aut tostum hordeum non decorticarum, si in ea coquantur, syrupus & glycyrrhiza, ex adianto, de hyssopo, aut marrubio, quibus mellis rosacei paucissimum miscere poteris, interim & myrtinum syrupum: & (si febris obstitit) aquam hordei praedictis syrupis permisceas. Poterit insuper & tale parari medicamentum instar ecligmati, de quo paulatim delingatur, modo quo docuimus capite de spuitione sanguinis cum tulsi, id autem excipit ecligmati & pulmone vulpis, & e pino, amborum drachm. j. syrupi myrtini, de hyssopo, mellis rosacei, ac syrupi & glycyrrhizae ana. vnc. j. s. boli armeniae, terrae lemniae, & lapidis haematitis ana scrupul. j. radices symphyti drach. ij. diatragacanthae drach. iij. misceantur, & formetur ecligma: & vbi medicamentum & pulmone vulpis haberi non poterit, tantundem eiusdem pulmonis vulpis arte preparati adicias, aut ex adianto, glycyrrhiza, & eodem pulmone vulpis, semine feniculi, amylo, ac tragacanthae puluis paretur, de quo quotidie drach. j. cum saccharo rosaceo, aut syrupo ex adianto, seu marrubio, pituitana, vel aqua mulla tribuatur. Quod si vnc. ij. carniū gallinarum, vel caponum assumas, anili, & tragacanthae, singulorum scrupul. j. diapenidon, vel cofectionis regum sine speciebus drach. ij. margaritarum drachm. j. seminum melonum drachm. iij. & cum saccharo diluto in aqua rosatum morulos formare iusseris, non parum adiumenti afferes, praefertim si cum pituitana, aut aqua mulla quotidie mane, vnum, vel duos ipsorum dabis. Pro vlcere autem exsiccatione, quae quidem eorum communis finis est, valida non existere febre, proderit tabidis per intervalla exhibita Mithridatis antidotus, aut Theriaca, Aetij, & Pauli decreto: necnon Ambrosia, & Athanasia, quibus omnibus pro forti pulmonis exsiccatione, usus fuit Galenus, vt patet quarto de Locis affectis, cap. 8. quae via tabidi id saltem lucrificiunt, vt vlcus nec vltra progrediarur, nec maius fiat, sed siccatum, ac cum callo duratum longiori vita frui eos sinat, si omnia praesidia fuerint rite administrata, vt capite de cruenta spuitione, dictum est. Extrinsecus vero per initia, vbi conqueuerit malum, cataplasmata applicentur, ex althaeae foliis, semine lini, ac tenuissima polline, quae cum decoctione femine graeci, & althaeae, vel maluae, oleo, ac melle admisceantur, ex Pauli, & Aetij sententia. Deinde post temporis intercapedi-

Curatio tabidorum cum exsiccantibus.

Topica.

nem (vt ipsemet inquit) ad cerata transeundum, ex butyro, oleo laurino, ac cera apparatus: at tempore repurgationis epithemate vtendum est, vt ait Aetius, ex terebinthina, & oleo cyprino, butyro, & medulla ceruina, adipe taurino, iridisque farina, & cespō, æqualibus omnibus partibus commistis, loco autem ciprini olei, irinum, laurinum, aut ruta-ceum assumas. Tempore autem pro cicatrix obducitur, oleum myrtinum, aut rosaceum extrinsecus thoraci inungendum, interim adiectis alimine, acacia, malicorio, hypocistide, galla, & rhoë obsoniorum: addendo etiam (vbi opus fuerit) ammoniacum, viscum, quercinum, piscem, ac ceram, apique semen, ex eiusdem Aetij sententia. Quod si tussis molesta grauius affligat, thymus tritus; & hyssopum cum succo radices dulcis, ac melle cocto excepta, formataque sub lingua tenenda dentur, vt iidē auctores sentiunt. Verum tum medicamentum hoc, tum & quod vis aliud humidum, quod ad eiusmodi curanda vlcera faceret, ægro supino cubanti exhiberi debent, iubentes id in ore continere, paulatimque permittere in asperam arteriam defluere ex Galeni decreto (vt diximus) quarto & quinto method. medend. Qua ratione nedum pulmonis vlcera, sed & thoracis, aspera arteria, ac gutturis curari debet: influit enim sic sensum, & paulatim de medicamento aliquid sensibiliter, & manifeste in ipsam asperam arteriam, & per eam ad pulmonem, ac pectus. **Cauterium.** Cauterium verò nec ex his, quæ actu, neque ex his, quæ potentia inurendi vim habent, tabidorum capiti vllum adhiberi debet, pro tabis curatione, nisi malum à fluxu acrium humorum ex capite factum sit, ac fiat, aut nondum tabidi sint, sed morbo tabifico opportuni, vt pote quibus caput facile impletur, ac ipsum spiritus organis multas destillationes dimittat: hi nanque ex cauterio capiti adhibito, praesertim qua parte sagittalis futura coronali committitur, aut accipitio inter primam, & secundam vertebra, quo loco totius fiet, non exiguum commodum suscipiunt: quemadmodum Galenus docuit quinto method. medend. in eisdem obseruari: licet nec de his, quæ igne sunt cauteriis, nec de determinata capitis parte loquatur. Reliquis verò maximum affert incommodum, cum altera causa sit extenuationis eorum, nec quicquam eis auxiliatur, ex quacunque alia causa tabidi facti fuerint: & proinde cum neque vnus reperiatur auctor artis medicæ, qui ipsum commendaret, abstinendum propterea ab eo erit.

Περὶ παλμῆς καρδίας. De palpitatione cordis.

CAP. LIIII.

VENIUNT quoque non rarò & ipsi cordi (quod veluti innati caloris fons est) siue ipso primariè affecto, siue ceteris quibusdam partibus contentiente, affectus præter naturam quidam non pauci inter quos is existit qui à Græcis παλμὸς καρδίας, Latine cordis palpitatio dicitur, à symptomate, & parte affecta simul nomen assumens. Quamuis interim quidam non cordis palpitatiōem, sed tremorem appellent; licet perperam, vt dicemus. Quidam alij recentiores medici cardiacam, sed temerè nuncupant: cum tam καρδία quam καρδιά, quam etiam καρδία, non ipsius visceris, quod in thorace continetur, cordis (inquam) affectiones sint, sed ipsius oris ventriculi, quod mos erat

Græcis, veluti & iam dictum viscus καρδία, hoc est, cor appellare, vt secundo de Hippo. & Platonis decretis, apho. 17. & 65. quarti libri, cap. 8. notauit Galenus ac nonnullis aliis in locis. Verum de his paulo post, cum de ventriculi vitii loquemur, verba faciemus. Nunc autem satis sit monstrasse, haud rectè recentiores medicos cordis palpitatiōem cardiacam nominare: cum cordis palpitatio ipsius principis visceris, quod in media thoracis sede collocatum est, affectio sit; cardiacam verò non huius visceris affectus est, sed oris ventriculi, vt in sequentibus patebit. Vt verò pateat quid sit cordis palpitatio, ac quomodo cordis tremor appellari haudquaquam possit, differendum primo erit quid sit palpitatio, & secundo quibus discriminetur à tremore. Quod palpitatio dilatatio quædam præter naturam in particula sit, significauit Gale. 2. de causis symp. cap. 2. quod verò eadem partium eleuatio quædam præter naturam sit, atque depressio idem Galenus docuit lib. de palp. trem. rig. & conuuls. cap. 5. quo fit, vt omnibus corporibus, quæ dilatari possunt, affectio hæc incidat: sunt porò ea omnia quæ naturaliter sunt molia, ita vt tum dilationem sui tollerare, tum rursus in se fidere possint: & propterea in cute sæpe incidit: nonnunquam in subiectis musculis, non in postremis autem ventriculo, vesica, vtero, intestinis iocinore, liene, septo transuerso, corde, ac arteriis: & proinde affectio hæc neque voluntaria virtutis propria est, nec instrumentorum ad hanc spectantium, sed indifferenter cunctarum partium quæ distendi, dilatarique possunt: qua etiam ratione fit, vt neque os, neque membrana, cartilago vnam palpitent, neque nervus, quod cano vacent, & propterea dilatari non possunt, vt eodem lib. 2. de caus. symp. & lib. de palp. trem. rig. & c. Gale. decretum reliquit. Verum cum partes ipsas, quæ palpitant, ex seipsis non dilatari liqueat, quia neque vis aliqua naturalis eis inest, quæ id efficiat: nam semper iis inesset, & cum sanæ essent præcipue, modo autem cum neque semper, neque bene habentibus inest; constat talem dilatatiōem, seu distinctiōem, eleuationem, ac depressiōem, in palpitatiōe præter naturam esse, vtrum, necnon laborum follum ritu: impletæ nanque partes dilatantur, & cum dilatantur sese implent, veluti arteria. Est itaque motus hic palpitatiōis non sponte factus elatis palpitantium, atque delatis partibus: verum quæ in palpitantibus membris eleuationes corporum cernuntur, & depressus, ab implentibus quasi extensiones sunt, & elationes: è contrario inanitorum sunt depressiones. Quapropter delationes tales, cum præter naturam sint, opus est (vt Galenus inquit præcitato libro secundo de causis symp.) ab aliqua quæ in ipsas insuat substantia fiant, & hanc vnam è duabus esse credibile est, vel succum quempiam, vel aëriam aliquam naturam. At quo minus succus sit, repugnat palpitatiōis tum motus, tum solutionis celeritas, vt quæ & illico fiat, & statim desinat. Succus autem nullus, ita celeriter insuit, aut refuit: itaque necesse est, causam vnde palpitatio exoritur, aëream esse substantiam: verum si hæc tum exigua, tum subtilium esset partium, facile per corpus transflueret. Non alienum igitur à ratione est, substantiam quandam crassarum partium halituosamque esse tum quantitate, relatione ad locum in quo consistit, semper satis magnum: dilatat ergo, vt verissime est, attollitque, ac inflat partem, quoad trusa, &

compulsa ad sui generis perspiret substantiam : & si corpus cavitatem habuerit, hanc implet, & quæ cōpleta est, extollit, ac distendit, si autem non, inter corpora duo congesta, sibi ventrem acquisititum molitur, & vnum ab altero distans reddit. Quapropter rationabiliter iis, quibus perfrigerata est aliqua particula, palpitaciones accidunt, vt apud eundem Galenum legitur eodem libro secundo de causis symptomatum, quippe quod ab ea sub naturali ipsius statu attenuatum, omninoque per naturalem animalis calorem concoctum effluit, id nunc vbi eadem propter frigus reddita est imbecilla, & halitusuosus, & crassarum partium efficitur : ita vt neque facile sicut prius perspirat : interim angustia quoque viarum accedente : quoniam autem nebulosus spiritus, & ater, flatuosusue, vt diximus est palpitacionis causa, ideo totus motus præter naturam est, a causa præternaturali duntaxat ortus, vt eodem libro secundo de causis symptomatum liquet. Et propter iam dictas causas generationis eius, frigidiores ætates, natura corporis frigidior, regio frigidia, tempus anni frigidum, otiosa vita, facies, & temulentia, cibi frigidi, atque flatuosi : & ad summum quotquot corpora in frigidant palpitaciones facile generant. Horum autem contraria illas illinc extinguunt : quæ enim calfaciunt, spiritus tenuat, corpora transpirabilia, laxaque efficiunt : densantem contrario frigida, cogunt, & corporum meatus arctiores reddunt, spiritus crassiores, glutinosos, atque attros faciunt, vt facile propria crassitie, & ambientium corporum angustia transitu carentes detineantur. Palpitacionum itaque ortus ex frigore est : & proinde veteres medici palpitacionibus, quæ calfacere, & tenuare possint, repperunt, quemadmodum ab eodem Galeno scriptum est libro de palpitatio. tremor. & conuuls. Is verò affectus, qui à Grecis τρέμος à Latinis tremor dicitur, inuoluntarius sursum, & deorsum motus est, motuum partium ab inuicem, vt patet apud Galenum præcitato loco : quo fit, vt à palpitacione discrepet, quoniam non idem est sursum ferri, & eleuari, neque deorsum ferri, & deprimi. Nam quæ sursum feruntur, & deorsum, cum alio priorem locum mutant, vt in tremore videre licet : eleuata autem, & depressa seruantia antiquam sedem, (vt in palpitacionibus inspicitur) ambientis nunc aliquid assumunt, nunc deperdunt : moueri itaque non sponte, sed inuoluntariè, & præter naturam vtriusque commune est. Verum palpitacionibus proprium est maiorem, & minorem locum non relicto primo occupare ; tremoribus autem adeo loca commutare, ne in eadem sede maneat : qui licet præter naturam motus sit, non tamen totus ex causa præternaturali sit, sicut in palpitacione, & conuulsione, sed mixtus quodammodo est ex causa, quæ præter naturam sit, & animali virtute : etenim tremor, qui non decreuerit mouere membra nemo, ex Galeni decreto libro de palpitatio. trem. rigo. &c. est itaque tremoris motus cōpositus, qualis est arteriarum pulsus, & præsertim fornicatissimus pulsus non absimilis. Non tanquam in hoc pulsu arterie motus in minima spacijs intercedere agitur, sic in tremore animalis particula, quæcunque imbecilla virtute mouetur : vicissitudo autem motus non ab vna perficitur natura, sicut in arteriis, sed ex pugna virtutis, & ponderis corporis, & si omnino huius symptomatis generatio cum conatu sit mouendi, est tamen cum virtutis infirmitate. Quare inuicem vincente, victaque potentia, mutuoque

semper cōtrariis succedentibus motibus tremor efficitur : licebitque liquido cerni eorum pugnam, nec virtute membrum decidere sinente, veluti in paralyti, nec pondere permittente virtutem id sublatum seruare, ita vt cum valens erat, sed incunte motione vna, alteram huic aduersam, quasi adiunctam dici etiam reperiatur, vt quæ sursum versus latitio sit, quæ ad inferius excipiat, ab ea subinde præpedita, imperfecta semper vtrique remanente : quo sæpius affecto, & sursum versus delationem, ea quæ sit deorsum insequente, & huic quæ sursum versus fiat, iterum adiuncta, vt diximus, partibus locum continuè mutantibus, motus duplex sit, & cōpositus, quæ affectio tremor nuncupatur, motu deorsum grauitate facto, & viribus sursum versus itidem mouentibus. Et quibus clara luce patet, quam dissimilis sit affectio hæc à palpitacione, ac quo pacto prædictis symptomatis ab inuicem differant : neque insuper idem, qui afficitur locus in tremoribus, ac palpitacionibus existit : nam tremor inualida virtutis actio est : & propterea mouentis virtutis affectus, & non instrumentorum, vt patet eodem libro de palpitacione tremore rigo, &c. & tertio de morbis vulgaribus, impediri nanque solent operationes non ab instrumentis solis, sed à viribus. In ipsa vero palpitacione facultas haudquaquam laeditur, sed instrumenta, seu partes ipsæ, quæcunque præter naturam dilatare possunt, vt prius dictum est : & propterea partibus alioquin penitus imotis accidit. Tremor verò semper inualidi, atque impotentis est symptoma, cum imbecillitas sit virtutis motiua corporis, neque vna causa species, quæ tremores efficiat, reperitur, veluti palpitacionum ; quarum ortus ex frigore semper est, ac nebuloso, crasso, vaporeoque spiritu, vt paulo ante demonstrauimus. Neque remediorum vnum genus tremoribus, vt palpitacionibus existit, quemadmodum eodem lib. de palp. trem. & rig. scriptum reliquit Gal. quo ite loco, ac lib. 2. de cau. symp. & 3. de morb. val. diuersas tremoris causas conscripseris dicere poteris. Differt itaque palpitacio à tremore ex Galen. sententia ; tum quia non idem affectus præter naturam est vterque, neque accidentia eadem ; nec qui afficitur locus idem existit ; neque causa etiam, si quæ diximus diligenter attendas. Errarunt propterea toto (vt iniquiunt) cælo, qui cordis palpitacionem cum tremore confuderunt, eum neque in vno palpitacio cum tremore conueniat, vt ex superius relatis liquet. Accedit ad hæc, quod & si quemadmodum conuenire possent, adhuc falso affectio hæc perpetuò consequatur facultas motricis voluntariæ imbecillitatem : nec tremor fieri potest nullum aggrediendi motum voluntariū : agit etenim in tremoribus voluntas semper, ad eisque inseparabilis est, quodammodo à Galeno scriptum est, cum libro 2. de causis sym. tum libro de palp. trem. rigo. & conuuls. in corde verò talis facultas haudquaquam reperitur : neque enim nerui ad ipsum pertingunt, vt delatores prædictæ facultatis, sed quodammodo sensus duntaxat (vt pote vt dignoscet ea, quæ sibi laborem afferrent) quemadmodum natura etiam distribuit hepatis, lienis, ac renibus : nam eadem omnino insertionis horum neruorum est ratio, quæ admodum 5. 6. & 14. de vfu partium liquet, ne scilicet sensu omni carerent, neque plura penitus essent. Quapropter neque ad ipsum propriè, veluti ad sensus instrumenta nerui perueniunt, nec etiā velut ad motus voluntarij instru-

Cuius facultatis sit affectus tremor.

commen. 1.

commen. 2.

cap. 5.

cap. 2.

3. de morb.

commen. 1.

cōm. 2. &

4.

Quibus differt palpitacio à tremore, & c.

diut.

Error eorum qui non nouerunt prædicta.

2. de cau.

symp. cap. 2.

cap. 3. & 5.

5. de vfu.

part. ca. 13.

5. de vfu.

part. cap. 9.

et 10.

6. de vfu.

part. cap. 18.

14. de vfu.

part. cap. 13.

cap. 8.

menta: nam quamvis cor caro sit dura, & ægrè patibilis, ex fibris multiplicibus conflata; & propterea quodammodo musculi videri possit per simile, discrepat tamen ab ipsis perspicue, non vna duntaxat ratione, vt ab eodem Galeno scriptum est præcitato libro sexto de vsu partium, & exinde etiam factum est, vt quod actionis animalis instrumentum non esset, nullam actionem animale habens, sed naturalem, vt paucissimis etiam ei opus fuerit nervis: tremere itaque cor propter iam dictas causas haudquaquam potest; licet sæpenumero palpitare compertum sit. Verum affectionem hanc neutiquam tremorem appellare poteris, sed palpitacionem, quæ nihil aliud est, quam ipsius cordis eleuatio quædam præter naturam, atque depressio, vel ipsiusmet cordis dilatacio quædam præter naturam: neque enim ex se ipso cor in palpitacionibus dilatur velut in pulsu, licet motio, quæ ex palpitacione fit, ex corde etiã fiat, non tamen secundum naturam: & propter motus cordis, qui in pulsibus fit, est operatio, qui verò in palpitacionibus est affectio, vt à Galeno decretum est libro sexto, de Hippocrat. & Platon. decretis: verum affectio appellatur in secundo significato, secundum quod affectione intelligebat motum contra naturam, oppositum ei, qui secundum naturam erat, atque operatio dicebatur. Est namque symptoma in genere deprauati motus toto genere præter naturam, ita vt totus motus præter naturam sit, paucus simul, tardusque, & rarus, Galeno teste 2. de causis sympto. cap. 2. Dignoscitur autem facile cordis palpitatio ex ægri relatione: namque cor ipsum præter pulsum palpitare sentiunt, tanquã diuersam existentem motionem à pulsu, quem proprium cordis motum appellamus: insuper & Medici ipsi manu adhibita cum supra thoracem, loco quo cor ipsum situm est, tum tangendo arterias ipsas, sentient liquido in vtrique locis hunc palpitacionis motum longè diuersum, ab eo qui secundum naturam est, ac pulsus appellatur: eritque spiratio eorum exigua, & rara; nec minùs & vniuersas ferè ipsius pulsus inæqualitatis differentias, ex eo quod cor ipsum affectum sit, percipient: atque id cõmune signum, tum partis affecta, hoc est, ipsius cordis, tũ affectus erit. At quoniam palpitacionem ortus ex frigore est, vt diximus: non ab re intemperie frigidam ipsius cordis palpitacionem sectare, fatendum erit: & quoniam si cavitatem habet pars quæ palpitacione afficitur, extollitur ea, ac distenditur à causa faciente eam; si autem non, inter duo corpora congesta ventrem acquisitionem sibi molitur, vnumque ab altero distantem reddit, vt patet libro

Quid sit cor
du palpitatio.
Quo differat
cor
palpitatio
à pulsu.

est autem
an affectio
an operatio
an affectio
an operatio
cap. 8

Quis affectus
præter
naturam sit
Palpitatio.

Signa.

Quem cor
du morbum
seleatur.

cap. 5
Causa.
Lib. de pal.
cap. 5.
2. de cau.
symp. cap. 2.

cap. 5. Causa. Lib. de pal. cap. 5. 2. de cau. symp. cap. 2. numque ab altero distantem reddit, vt patet libro de palpi. trem. rigo. & conuulsio. propterea ad vnitatis quodammodo solutionem etiam consequi palpitacionem asserere non erit absolum. Cuius affectionis causa in vniuersum vnicam esse asserit à Galeno tum præcitato loco, tum etiam secundo de causis sympto. Ea autem est crassus, nebulosus, aer, flatuosusve spiritus, vel quomodocunque aliter ipsum appelles: & idcirco (vt ipse asserit) frigidiore corporis nature, atates, regiones, anni tempora, ociosa vita, facietas, & temulencia, cibi frigidi, ac flatuosi, & quotquot corpora in frigidant, à palpitacionibus facile præhenduntur, & horum contraria illas illico extinguunt. Verum hæc affectio (vt idem Galenus inquit libro 5. de locis affectis, ca. 2.) aut per se euenit ipsi cordi, aut cum suspitione quadam, quod in humore cor ipsum moueatur: neque

enim mirum videri debet tantam humoris multitudinem cumulari aliquando in ambiente cor tunica, vt exapd 106 dicta, vt ipsum, ne attollatur, impediti possit. Ex aliquo ite tumore præter naturam in eadem ambiente cor tunica duro siquid, aut humore in se continente, qualem pustulæ, quas Græci hydridas vocant, emittere solent, oriri poterit cordis palpitatio, quæ admodum experientia comprobauit in gallo, ac simia, quæ emaciari in dies videtur, Galenus. Pluribus etiam integra valetudine degentibus, tum adolescentibus, tum adultis subito, sine alio manifesto symptomate, palpitatio visceris huius euenire visa est: cunctis tamen siue per se, corde ipso affecto; siue per consensum à frigidis causis prouenire putandum est; cum ex frigore palpitacionum sit ortus, vt diximus eiusdem Galeni sententia; calfacientibusque, ac tenuantibus remediis curentur, prout veteres Medici innuerunt; ac attenuante victu, vt dicemus. Quo fit, vt nedum Arabes, verum & iuniores Medici quidam etiam qui Galeni doctrinam profitentur, longè ab eius sententia aberrant, dum asserunt, ex calida cordis intemperie eius palpitacionem oriri posse; quod omnino eiusdem Galeni doctrinæ purgare videtur, quemadmodum clara luce patet in præcitatis locis, libro videlicet secundo de causis sympto. & libro de palpitatio. trem. rigo. &c. Nec minùs temerè audent frigidis medicamentis cordis palpitacione curare, cum perpetuò calidis (vt dicemus) curanda sit. Quod si pro eorum opinione confirmationem putent esse Galeni verba in commento aphor. 65. quarti libri, quo loco aliter videtur ex maximo incendio vitalis facultatis, quæ in corde consistit, palpitacionem oriri posse, non minùs quam in prædictis cæcutiunt. Nã ibi Galenus ponderas verbum *καρδιωγμων*, ab Hipp. in aphor. positum, dicebat ipsum bifariam intelligi posse, vno modo, vt idem significet, quod *καρδιαλγία*, secundo modo, vt nonnullis visum est, motum quendam cordis palpitacioni similem per *καρδιωγμων* intelligentes, hoc est crebrum, & velocem cordis motum, & præcipue similem palpitacioni. Hic namque affectus extremum malum portendit vim scilicet vitalem, vt Galenus inquit, maximo incendio laborare significans: oriri itaque potest, vt ex Galeni verbis liquet, affectus *καρδιωγμων* dictus, ex immodico cordis incendio, in quo crebro, & velociter ipsum cor moueri necesse est, attamen nequaquam motus hic palpitatio rectè nuncupabitur, licet ei similis existat, etenim à facultate ipsa motio huiusmodi fiet, licet fuerit immodica, ac irritata facultas ipsa, & non omnina à causa præternaturali; crasso videlicet, ac nebuloso spiritu, vt palpitatio. Verum forte dicent saltem ex Pauli sententia, illud verum esse, quod scilicet ex calida cordis intemperie palpitatio excitari possit: nam ca. trigesimo quarto, libri tertij dicebat, itidem valentes cordis palpitaciones sæpe ex sanguinis in eo concepti copia, aut feruore contrahuntur. Atqui dicimus nos de forti cordis palpitacione Paulum verba facere, per quam non aliud intelligere voluisse putandum est, quam crebrum & velocem cordis motum; similem palpitacioni existentem, quemadmodum per *καρδιωγμων* Galen. intellexit, & non de vera palpitacione; quæ est partium præter naturam quædam dilatio: nam hæc cum non nisi à flatuoso spiritu oriri possit, vt Galenus inquit, à cordis feruore haudquaquam gigni potest, vt luce clarius patet ex his, quæ diximus.

duximus. Quantum verò ad eius prognosticum atti-
 net, non negligenda circa initia eius curatio erit:
 nam si augeatur, aut diutius perdurauerit, ad synco-
 pem permittabitur, & demum ad mortem, eamque
 repentnam, ob consequentem virtutis videlicet vi-
 talis imbecillitatem; veluti ille cuius meminit Ga-
 lenus aphor. 41. secundi libri, cui dum exolueretur,
 cor fortiter palpitabat, de repente mortuus est, non
 aliter quam illi, qui acutissimis cordis affectibus,
 quos syncopas vocant, arrepti subito intereunt.
 Quinto autem libro de locis affectis, cap. 2. asseruit
 Galenus cordis palpitacionem, licet tum adolefcen-
 tibus, tum adultis euenire ea possit, magna tamen
 ex parte iis accidit, qui ætatem agunt quinquaginta
 quidem annis inferiorem, sed quæ quadraginta
 annos excedat. Ceterum quamvis nonnulli ab hoc
 symptomate planè liberati sint per venæ sectionem,
 viciūque extenuantem, ac medicamenta similia,
 vt ipse inquit, nihilominus omnes ante senectutem
 morte præuenti sunt. Verum alij quidem per acu-
 tas febres, alij verò cum sani degerent, affatim syn-
 cope intercepti interierunt, quamvis vnus, vel duo
 citra syncopem alia quadam mortis specie perierint.
 Ceterum pro palpitacionis curatione, aer eligatur
 ad caliditatem, & siccitatem declinans, sitque gra-
 uis odoris expers; quinimò vt suauiter oleat, arte
 paretur: sunt namque odorata omnia cordi familia-
 ria, somnus sit moderatus: vitentque vigilias, im-
 modicas præsertim: motu etiam, & exercitio tem-
 perato vtantur: alius seruetur lenis: & si id natura
 non fiat, arte suppleatur, clysteribus scilicet, aut ba-
 lanis. Immodicos etiam animi affectus vitare de-
 bêt, præcipue mœstitiā & metum, atque etiam le-
 gitimā immodicā. Et quia vniuersa victus ratio
 (Galenus teste 5. de locis affectis) attenuatoria esse
 debet. Propterea tales eligantur cibi immodicæ hu-
 miditatis, ac status expertes, sintque boni nutriti-
 ti, ac facili concoctionis: quapropter carnes pul-
 lorum gallinaceorum gallinarum, itarnarum, pha-
 sanorum, perdicum, merularum, turdorum, ac a-
 liarum paruorum auium montanarum eligantur:
 necnon interdum hædorum, vitulorum, leporum,
 ac capreolorum: eis autem vtantur asis, interim eli-
 xis, hyssopo, feniculo, aut serpyllo, satureia, vel
 mellissophyllo, sampsucho, seu pulegio, interim e-
 tiam boragine, seu pimpinella: nec minus in prædi-
 ctarum carniū iure piper, cinnamomum, macer,
 aut cariophylli in puluerem prius redacti iniician-
 tur. Potus sit vinum dulce, substantia tenui, colore
 flauum, seu fuluum, vetus potius quam nouellum,
 vel mediæ ætatis, dilutū aqua, in qua borago, mel-
 lissophyllū, vel pimpinella fuerit decocta. Et quo-
 niam omnes palpitacione affectos sanguinis detra-
 ctio inuat, vt testis est Galenus eodem libro quin-
 to de locis affectis, propterea statim circa initia (si
 virtus, aut ætas, seu aliud quippiam non prohibeat)
 venæ secāda erit, interna dextri cubiti, si totius cor-
 poris plenitudo adsit, aut sinistri, ea non existente.
 Est namque morbus hic magnus, saltem ratione par-
 tis affectæ: quapropter & si intemperatum ad frigi-
 dum in hoc affectu sit cor, quia tamen princeps vi-
 scus est, aut saltem reuulsione gratia venæ sectio
 confert, prohibens ne ad ipsum excrementa con-
 fluant, tum quod imbecillum sit, tum etiam ne pro-
 pter hūc præter naturam palpitacionis motum ex-
 crementa quoque trahat. Qua ratione Galenus nō
 curare eos venæ sectionem dixit, sed iuuare, eos ve-

rò liberatos esse, qui post sanguinis missionem te-
 nuante victu medicamentisque similibus vsi sunt:
 hæc (inquam sunt) quæ palpitacionem curat, victus
 scilicet extenuans, ac extenuantia medicamenta,
 quamvis ipsa venæ sectio iuuat. Nec mirum id est,
 nam ea reuellit: victus autem, & medicamenta cum
 extenuent, dissipent, atque discutiant, palpitacionis
 causam, quæ spiritus flatuosus, & crassus est, omnino
 adimunt, intemperantiāque ipsius cordis frigidam
 corrigunt, simulatque ipsum corroborant. Qua de
 re neque multa sanguinis copia per venæ sectionem
 vacuanda est; sed potius (si opus fuerit) iteranda ea
 erit: nam quantò maiorem in numerum particula-
 tes auxeris detractiones, tantò reuulsione effica-
 ciorē effeceris, vt à Galeno decretum est, libro de
 cur. rat. cap. 12. per venæ sectionem, & nos in præce-
 dentibus annotauimus. A venæ sectione, quæ exte-
 nuant medicamenta, ac calfaciunt, tribuenda sunt:
 in quem vsū conducunt, diambra, diamoschus,
 cum dulcis, tum amarus; confectio de cinnamomo,
 de xyloaloe, diacalamenthum, dianisum, aromati-
 cum rosaceum, theriaca, aut mithridatum, qualibet
 vice drac. j. exhibens cum vnc. ij. prædicti vini, aut
 vnc. iij. aquæ mellissophylli, boraginis, aut florum
 citrangulorum. Poterunt insuper prædicta in mor-
 sulis formari, excipiens diambra, vel diamoschu drac.
 j. similiter confectio de xyloaloe, aut de cinna-
 momo: adiciās autem seminum melonum vnc. s. &
 cum saccharo diluto in aqua rosacea, aut mellisso-
 phylli, morsuli formentur: sit autem quilibet pon-
 deris vnc. quorum vnum pro qualibet vice dato, ex
 syrupo item de pomis, corticibus citri, ac rosaceo
 simul mixtis, aliquo ex prædictis antidotis addito,
 liquidum medicamentum fieri poterit, ex quo pau-
 latim sæpius assumat æger. Ex Plinio Secundo libro
 2. de re medica habetur cap. 14. quod si costū ad cor-
 dis pulsū, panacē, & foenumgræcum æquis pōde-
 ribus in puluerem rediges, & cum melle attico re-
 pones commixtum, & (cum opus fuerit) cochlear
 plenum ieiunus cum aqua calida bibas, per triduum
 confert: aristolochiam item rotundam in puluerem
 rediges, vt idem inquit, & ex eo denarios tres ex vi-
 no per triduum bibes: Item thaponticum ex vino
 veteri tritum, ieiuno potui dabis. Exteriorius insuper
 epithemata imponantur, quæ in hunc modum fiant,
 Recipe aquæ mellissophylli, florum citrangulorum
 ana lib. s. aquæ rosacæ, & boraginis, cuiuslibet vnc.
 iij. maceris, caryophyllorum, cinnamomi ana drac.
 j. ligni aloës, corticum citri, semini ozimi ana drac.
 ij. ambræ, moschu, ana gra. 5. croci grana iij. vini o-
 doriferi vnc. iij. commixtis omnibus fiant cordi e-
 pithemata. Ex oleo quoque costino, ac nardino, a-
 mygdalino, & rosaceo, puluere ligni aloës, cinna-
 momi ac maceris, exiguoque croco, & galla mo-
 schata, ceræ quod satis sit, ac paucio vino albo odo-
 rifero, fiat vnguentum, quo vtare. Sacculorum etiā
 vsus non minus conducit, qui sic parentur, Recipe
 florum boraginis, rosismarini, citrangulorum, sam-
 psuchi, mellissophylli, & serpylli ana drach. ij. ligni
 aloës, corticum citri, maceris ana drach. j. cinnamo-
 mi, caryophyllorum, ac seminis ozimi, ana scrup. ij.
 rosarum rubearum drac. iij. croci scrup. s. ovis de
 corde cerui num. j. contusis omnibus fiat sacculus
 ex serico, cordique imponatur. At si cum frigida
 cordis intemperie, frigidorum quoque adsit humo-
 rum redundantia, priusquam prædicta medicamen-
 ta adhibeantur, à venæ sectione, ea quæ iam dictos mor-

Topica.

Si pituita-
sus redun-
dantia lu-

Ratio, ac pur
gatio.

ratio, ac purgatio.
 succos concoquendi, præparandique vim habent, tribuenda sunt: & dein quæ purgant, quibus fuerit redundans succus, siue pituitosus, siue melancholicus: pituitoso autem existente mel rosaceum, oxymel simplex, compositum, aut scillinũ cum syrupo è corticibus citri, aut de hyssopo, & aqua, in qua betonicæ, sampſuchi, pulegij, origani, aut mellissophylli folia fuerint decocta, tribue: quibus sapius assumptis, ac parato proinde, & concocto redundante pituitoso succo, pergetur, vt infra. Recipe agarici trochiscati drac. iij. vel scrup. iij. corticum myrobalarum chebularum diac. ij. florum boraginis, & lupulorum, singulorum drac. iij. fiat decoctũ in aqua fontana, secundum artem, in quo drac. vj. diacatholicon, aut iij. confectiois de dactylis cum vnc. iij. vel iij. syrapi ex pluribus infus. ros. rub. aut vnc. ij. syrapi ex tribus infus. ros. pers. potius dato: vel catapota formato ex drac. j. pulueris hieræ simplicis, & altera drac. seu scrup. iij. trochiscati agarici, cum oxymelie & præbeantur. Post quæ per aliquod tempus duas scilicet, vel tres oras vnc. iij. vel iij. syrapi ex pluribus infusionibus ros. rub. aut D. Augustini tribue. A purgatione verò (prout vsus requirit) supradictis medicamentis variè. Si verò melancholicus redundarit succus, vt sæpius contingit, similiter præparandus, ac concoquendus primò erit, ex syrupo de pomis, è corticibus citri, de succo boraginis, seu fumariz, lupulorum, aut de epithymo cum mellissophylli, boraginis, aut lupulorũ aqua: quò deinde cocto, ac præparato, purgans medicamentum exhibendum erit, vt Recipe senæ, epithymi ana drac. ij. corticum myrobalarorum indarum drach. iij. florum boraginis, fumariz, lupulorum, singulorũ drac. j. fiat decoctũ in aqua fontana, in quo dissolue diasenæ drach. iij. aut diacatholicon drach. vij. & aëri mellis vnc. ij. & s. aut syrapi D. Augustini vnc. iij. seu syrapi ex pluribus infus. ros. rub. tantundem. At si magis expediat catapota exhibere ea ex drach. j. pilularum de lapide lazuli, aut de lapide armenio, & scrupul. ij. agarici trochiscati, aut drac. j. pulueris hieræ simplicis formato. Post quorum assumptionem modo, quò supra diximus vnc. ij. sacchari boraginati, aut tantundem mannæ electæ cum aqua boraginis, aut lupulorum præbeto: & deinde (prout vrgeat vsus) prædictis alterantibus medicamentis vtare. Id tamen prætereundum non erit, quod dũ purgante medicamento redundante succum vacuas, perpetuò ea, quæ cor ipsum roborant, permiscenda erunt. Quomodo autem dignoscas pituitosum, aut melancholicum redundante succum, cùm sæpius in præcedentibus dictum sit, frustra putauimus hoc loco iterũ repetere: nam præter symptomata diuersa, diuersa quoque victus ratio præcessit, temperamentum, habitus, ætas, tempus anni, regio, aëris constitutio, ac reliqua.

Si melan-
cholicus re-
dundarit
humor, pra-
paratio, &
purgatio.

Excusatio.

Πεὶ συζκοπῆς.

De syncope.

CAP. LV.



Acutissimis cordis affectus, quæ Græci *ευνομη* vocant, ut patet commo-
to aphorismi. 41. secundi libri. Latini
verò (cum proprio careant nomine)
syncope[m] etiam appellant: quam-
vis magna ex parte cum ea affectione, quæ *λερωθυ-
μία* dicitur, Latine animi defectus, communice[m]t,
tamen non omnino idem significare videtur, sed ab

ea discrepat, quinimo & res diuersæ est: Nam λεπτο-
θυμία nomen compositum à verbo Græco λεπτο-
θυμία, quod Latine sonat, lingo, seu deficio, & θυμία, La-
tinè animus, deliquium, seu defectionem animi si-
gnificat: quâ ratione quidam putarunt aliud esse
λεπτοθυμίαν, à λεπτοφυσία, cum λεπτοθυμία, animi
defectum, λεπτοφυσία autem nō animi, sed animæ
defectionem significet: compositum etenim nomē
est à verbo λεπτο, & φυσίη, quæ non animus, sed ani-
ma Latine dicitur. Verum quamvis nomen si-
gnificata inspicienti dissentire videantur, reperitur
tamen apud Hippocratem, interdum vno, quandoque
que altero vsum fuisse, volens in re idem intelligere,
vt patet aphor. 23. primi, & octauo, septimi li-
bri. Nec minus & in Galeni doctrina confundi, pro-
fessio habetur, tum præcatis locis, tum etiam
primo de Arte curatiua ad Glauc. cap. 14. & 12. me-
thodi medendi nam in primo præcitato loco, ver-
bo λεπτοθυμία vitur, libro autem duodecimo me-
thodi meden. λεπτοφυσία idem per vtranque intel-
ligens quapropter auctaster dicitur re ipsa prædi-
cta nomina haudquaquam dissimile, sed confundi
inuiuem ex Hippoc. & Galeni sententia: nam eadē
est pars quæ afficitur in vtriusque, idem symptoma, ac
ad eadem dispositiones, seu causas consequuntur:
quamvis etiam sunt, qui velint neque ipsam λεπτο-
θυμίαν ab eo affectu, quem Græci ἐκλυσιν nuncu-
pant, Latini exolutionem, dissentire, auctoritate
quadam freri ipsius Galeni præcitato libro primo
de arte curat. ad Glaucon. cap. 14. & si eo loco alio-
rum medicorum auctoritate loquatur. Nam quod
inter se discrepat, ab Hippocrate decretum est eo-
dem aphor. 8. 7. libri cum dixit, ὑπνῶντας εἶναι ῥη-
σις: ἐκλύσεις ἑμέτες καὶ λεπτοφυσίη γίνεται. Similiter à
Paulo cap. 34. libro 3. qui inter syncopes indicia
cum exolutionem, tum animi defectum connume-
rauit. Verum quicquid sit de eclysi, hoc est, exolu-
tione, satis sit nunc demonstrasse λεπτοθυμίαν, à λε-
πτοφυσία re ipsa non differre, ita vt quicquid de vno
dicitur, de reliquo quoque dictum putetur. Nam
nihil aliud per ea significare volumus, quàm animi
defectum, per animum intelligentes, animā ipsam
animosam, quæ ex Galeni decreto sedem in corde
habet: cum itaque deficit animositas, tenor, ac prò-
prietudo hæc animæ, quæ quacunque causa ortum ha-
beat, λεπτοθυμία, aut λεπτοφυσία appellatur. At
quod à Græcis συζυγία nominatur à verbo συζυ-
γίω, Latine serio, verbo, seu concido derivatum
est, ita vt etiam animi concisionem Latine signifi-
care possit: licet affectus quodammodo similis sit
animi deliquio, ab eo tamen discrepat. Nam (vt Ga-
lenus inquit) defectus animi præcedere consuevit
syncopem ipsam, vt patet eodem primo de arte cu-
rat. ad Glauc. cap. 14. & idemmet prædicto libro
duodecimo meth. meden. cap. 5. inter lipopsychia
& syncopen differentiam tradit, cum maiorem cau-
sam syncopæ requirat, quàm lipopsychia, & si eadē
possit vtriusque esse, tamen prout maior, aut minor
existit, vnam, vel alteram affectionem efficit. Hoc
idem cōfirmavit Aëtius lib. 5. cap. 96. quamvis cap-
it. eiusdem libri, sub nomine λεπτοθυμίας commu-
niter sumpta: quod comprehendit possit & syncopē,
postest, tamen, quod inter se differant
ostendit: nam animi deliquium (vt ipse inquit) de-
repente incidit, sensu, & motu hominem priuans,
& omnino non sudant: syncopæ verò & vigilantes
& dormientes inuadit. & omnino cum sudoribus
qui

qui *συνκοπή* appellari solent. Ex his itaque constat, quia ratione syncopae ab animi defectu dissentit; namque non idem significat, nec idem est defectus animi, & concisio; maiorem etenim læsionem, ac virium calamitatem portendit concisio, quam defectus, licet ex eadem causa fieri possint, & non alia ratione curentur: quapropter de syncopae verba facientes, patebit quoque & defectus animi curatio.

Est denique syncopæ, Galeno teste duodecimo methodi medendi princeps virium lapsus: quem secutus Paulus cap. 34. lib. 3. eam dixit esse confertum, seu simul totum virium collapsum. Dixit autem non ab re confertum, & Galenus præcipitem: nam si sensum paulatimque fieret virium collapsus, non utique syncopæ diceretur: verum cum essentia virium, quibus regitur corpus, tum in spiritu, in solidorum corporum temperamento consistat; & propterea hæc integra seruari debent, ut qualitate, tum quantitate, quoad fieri licet, naturaliter se habeat, ut liquet eodem duodecimo methodi medendi consensum erit, ut cum vires labuntur, aut spiritus, vel solida corpora non naturaliter se habeant, qualitate, vel quantitate ipsorum immutata, potissimum ipsa corpora solida, in quibus utique vel maxime consistere virium substantia videtur: nam ad robur virtutis conservandum, & ad syncopalem accessionem, quominus de repente incidi cauendam, singulare præsidium est temperamenti custodia: ante omnia quidem trium principiorum, mox vero reliquarum partium, quæcunque in consortium affectus principia secum ex facili trahunt, cuiusmodi est ventriculi os, propter exquisitum eius sensum. Si itaque in syncopæ vires collabuntur, spiritus, aut solida corpora offendi opus erit cum in his vires consistent, ut diximus. Verum cum vires, quæ animal gubernant, tres diuersi inter se generis sint, ut legitur apud Galenum quinto de locis affectis, cap. 1. nono methodi medendi, cap. 10. & sexto de Hippoc. & Plat. decretis, & sexcentis aliis in locis, cum syncopæ dixerimus præcipitem esse virium lapsum, quarum virium intelligendum sit, non ab re queret quispiam, nunquid videlicet naturalium, aut animalium, aut vitalium? Et quoniam sensu, & motu priuatur homo cum syncopæ afficitur, non absque ratione animalis vires offensas esse diceret quispiam: verum quamuis animales functiones sint sensus, & motus, offendantur quæ ipsæ in syncopæ; non propterea facultatem animalem duntaxat, ac primo oblaxam in ea esse fatendum erit, quinimò omnes esse asserimus, sed primo vitalem: & si non perpetuò in syncopes generatione facultas ipsa, aut cor ipsum primo lædantur; dicimus tamen syncopen haudquaquam gigni posse, nisi facultas ipsa vitalis, seu cor ipsum afficiatur, quo offenso, & reliquas vires, seu principes partes in quibus consistunt, necessariò offendi oportet. Simul etenim cum ipso omnes viriantur partes, nedum principes ipsæ, ut inquit Galenus quinto de locis affectis, cap. 1. cum & ipsa peculiari cordis temperie actiones suas perficiant, hac denique pereunte actiones quoque ipsarum perire necesse est, simulque quæ cerebri, & iecoris. Horum verò temperie deperdita, non oportet cordis simul actionem perire: seruatur etenim caloris symmetria in singulis partibus ab ipso corde, tanquam innati caloris fonte, ac principio, mediis arteriis, quamuis per venas etiam, & alia vniuersa consuat ad corde calor, longe tamen minor quam per arterias, ut Galenus

asserit libro de usu pulsu. cumque illi à nullo calor consuat, sed aliis ab illo, consentaneum erit, ut cum à naturali statu recesserit, ac non amplius in peculiari, ac propria temperie persistat, quod reliquæ omnes detrimentum patiantur, ac actiones earum pereant, priuata siquidem eo qui prius consuebat calore, quo seruata in proprio temperamento actiones perficiebant. Propterea igitur syncopæ præceptum est omnium virium lapsus: nam in ea cor ipsum afficitur, ad cuius oblaxationem, nedum cerebri, & iecoris, tanquam principum partium functiones, atque vires offenduntur, sed reliquarum omnium. Nec propterea negamus interdum syncopen oriri posse corde ipso non primario affecto, sed reliquis quibusdam partibus consentiente; quinimò (veluti cæteræ corporis partes) cor ipsum primario affectu laborare potest, interim vero cæteris partibus consentiens, quemadmodum in stomachica syncopæ, de qua Galenus mentionem fecit, tum quinto de locis affectis, cap. 6. tum 12. methodi medendi cap. 2. & 3. liquido videre licet: Asserimus tamen, quod nisi cor afficiatur, quomodo docque affectum sit, progigni syncopæ haudquaquam possit: quamuis cerebrum, iecur ventriculus, aut quæuis alia corporis pars etiam vehementer, vel diutius affecta sit: cum ex nullo prædictarum partium affectu possint de repente, affatim, seu simul totæ vires collabi; quemadmodum neque animal omnino perire potest, nisi cor afficiatur, cum semper mors ad immodicas sequatur cordis intemperantias, Galeno teste eodem quinto de locis affectis, cap. primo. Ex quo virium præcipiti lapsu patebit liquidò cor ipsum in syncopæ affectum esse, neque ipsum strenue munus suum obire potest, cum oblaxum sit: quapropter, & pulsum paruitas, ac imbecillitas, frigidaque extrema consequuntur. Affectus ipse symptoma est in genere noxæ functionum omnium, primò tamen vitalium: læduntur autem vires non modo diminutæ, ut in *συνκοπή*, sed magis, & quasi ablata interdum, saltem quoad sensum. Eius verò signa sunt (ut inquit Paulus) resolutio, ac animi defectus, pulsum paruitas extrema frigida, & in sudorem proruptentia: apparet autem sudor, præsertim circa caput, vultum, ac cervicem, ex Hippocratis ac Galeni auctoritate, libro primo Prognosticorum, qui sudores syncopici appellari solent; quæ omnia innati calidi suffocationem, aut extinctionem portendunt: utroque enim modo pro ratione diuersarum causarum in syncopæ innatū calidum offendi solet. Propter quid autem in syncopæ sudores, & hi quidem frigidi appareant, in lipothymia autem non, adhuc non liquet. Dicimus autem nos propterea id enuncire: quia cum in syncopæ vires magnopere oblaxæ sint, confugiatque calor innatus ad cor, tanquam ad propriam arcem, derelinquensque partes externas: id quod in eis, præsertim in partibus solidis, continetur, humidum retineri neutiquam valet, quinimò tanquam destitutum ab innato calido, facultatēque retentrice haudquaquam eum continere potente, ad externas cutis partes cōfluit, ac sudor propterea gignitur, non siquid ex excrementitia duntaxat humiditate, sed propria etiam solidarum partium. Frigidi verò sunt tales sudores, quoniam ea, quæ solida corpora regit natura, quæ secundū Hippocratem est calor naturalis, vel omnino extinguitur, vel proxima est extinctioni; quæ de re infrigidatis partibus solidis propter iam dictā causam, quic-

Quæ pars in syncopæ afficitur. Quis affectus præter naturā sit. Lib. 3. c. 34.

Tex. & comment. 26.

Propter quid in syncopæ vires magnopere oblaxæ sint, confugiatque calor innatus ad cor, tanquam ad propriam arcem, derelinquensque partes externas: id quod in eis, præsertim in partibus solidis, continetur, humidum retineri neutiquam valet, quinimò tanquam destitutum ab innato calido, facultatēque retentrice haudquaquam eum continere potente, ad externas cutis partes cōfluit, ac sudor propterea gignitur, non siquid ex excrementitia duntaxat humiditate, sed propria etiam solidarum partium.

Lib. 3. c. 34.

quid ex eis profuit, quod frigidum sit oportet. Et propterea qui profliunt sudores in syncope necessario frigidi sunt; quoniam (ut dictum est) in syncope innatum calidum aut extinguuntur, aut extinctioni proximum est: & non ab re synoptici nuncupantur; quia cum syncope proueniunt, non autem cum lipothymia: quoniam in ea non adeo vires labuntur, nec ad hoc deuenit calidum innatum (licet afficiatur) ut fere extingatur, aut extinctioni proximum sit, neque solidæ partes in lipothymia, velut in syncope à natura quæ eas regit, ita destituuntur; cum minor sit cordis affectio in lipothymia, quam in syncope: & propterea neque sudores, neque frigidi in lipothymia apparet, imò qui ita affecti sunt, omnino non sudant, ut inquit Aëtius. Ceterum quoniam cor in syncope interdum proprio affectu, interum vero per consensum laborare solet, dignoscitur quando ipsum cæteris partibus consentit ex propriis indicibus earum partium primo affectarum, ac symptomatis quibusdam, quæ quidem syncope antecedunt quemadmodum si affecto ore ventriculi syncope consequatur, quæ stomachica dicitur, vomitus, nausea, aut dolor eiusdem partis, seu morbus quidam præcessit: sic quoque affectis primo reliquis partibus, corde vero consentiente, dicendum erit. Verum si nullum præcesserit signum alicuius partis affectæ, & syncope oriatur, nullusque alius affectus ipsam antecesserit, præterquam si immodica fuerit aliqua animi exandescencia, seu affectio, cor primario affectum esse iudicabis. Utinque autem fiat syncope, aut fortem duntaxat consequitur cordis intemperiem, vel cum vitioso, seu venenoso humore, nonnunquam vero erysipelas, aut inflammationem, aut alium quempiam præter naturam tumorem ipsius fectatur. Verum si ob inflammationem, vel erysipelas excitetur syncope, antequam augentur huiusmodi affectus, animal corrumpitur: non sic autem si ob simplicem cordis intemperiem syncope excitetur, siue æqualis, siue inæqualis ea fuerit, ut patet libro quinto de locis affectis, cap. secundo. Ex hoc itaque distinguere poteris, cum syncope genita sit per proprias simularium partium intemperies: nam ea subitam mortem non inducit, quemadmodum ea, quæ ad instrumentales partes pertinet, quæ subito enecare potest, prius tamen præcedentibus quandoque signis quibusdam: quorum vnum scriptum est ab Hippocrate præcitato aphorismo 41.2. libri, cum dixit, Qui sæpe, & multum exoliuntur sine causa manifesta: id repente moriuntur. Syncope vero causæ quamvis nonnullæ esse possint, cunctæ tamen, aut cordis spiritus, vel solidum eius corpus offendunt: utraque vero substantia bifariam lædi potest, quantitate scilicet, vel qualitate mutata (nam nedum eorum substantia certa esse quantitate desiderat: verum etiam & qualitate.)

lib. 8. c. 101.
Quibus discernatur indicibus, si per essentiam, aut per consensum in syncope cor afficiatur.

Ad quos cordis affectus consensum quatuor syncope.

Syncope causa.

Quæ in vniuersum sunt syncope pos causa.

Ex quibus causis spiritus alterantur.

lerum, vel animalium, aut si halitum ex stagnis, vel paludibus, vel fluminibus recipiat: item ex venenatis facultatibus, aut animalium quæ virus reiectant, venenis. Nec mirum si spiritus ex ambientis malitia, ac vitiosis succis alterentur: namque ex tenuiori, ac puriori sanguine, simulque ex aere, qui optima temperie sit, atque ab omni inquinamento purissimus, per inspirationem attracto nutriuntur.

At ipsius spiritus corruptio, tum ex ingenti dolore, ac crebris motibus, cuius generis & vigilia sunt, tum ex immodica eius tenuitate, & continente eum corporis raritudine prouenire potest, tum vero ante hæc omnia ex ipso respirato prohibito, & nutriti defectu. Item ex animi affectibus, veluti est timor subitus, & vehemens, & quæ contraria huic timori est, voluptas maxima, hoc est, gaudij excessus: tristitia etiam, anxietas, ira, & cura eo genere sunt noxiæ, quo frequentes vigilia, spiritusque corrumpendo vires resoluunt. Ex his itaque causis alias spiritus alterantur, ut diximus, alias corrumpuntur: aliquid quando ex parte degeruntur; non raro autem hæc utraque perpetiuntur. Virium vero lapsus, qui ad solidorum corporum digestam substantiam succedit, causam habere poterit, longissimos præcedentes morbos, extenuato ægro ex atrophiam, id est, nutriti defectu; præterea ex febris acutis, quæ corpus liquant, excitari contingit. Eorum vero corporum temperies mutata prouenire potest, vel ex immodico calore, vel frigore, vel humiditate, vel siccitate, aut horum aliquibus copulatis: succedunt autem & syncope immodicæ ventris inanitione, vel principiorum intemperiei, aut in his qui aliena loquuntur, etiam propter motum; & (ut summam iterum dicam) quæcunque spiritus, aut corpora solida mutant, aut corrumpere possunt, syncope generare valent. Quarum causarum cognitio magna ex parte ex altantium sermone patebit, quasdam vero ex te ipso cognoscere poteris. Nos vero earum, quæ non ita facile patere possunt, signa conscribemus, utpote si ex magna crudorum humorum copia, ex cruditatibus, vel alia quapiam occasione congesta syncope excitetur, una cum oris ventris (quod stomachum vocant) offensione: his namque, & præcordia inflata, & totum corpus ampliori mole, quam pro naturæ modo, cernitur: tum color alius ad albidius, quam pro naturali habitu, & aqua intercute laborantium magis simile est mutatus: nonnullis etiam ad nigrius, aut luidius, quos medici plumbei palloris appellant. Omnibus vero pulsus minores sunt, quam pro caloris ratione, si febricitauerint; præterea obscuri, omninoque inæquales, sæpe ea inæqualitate, quam sistematicem Græci vocant: semper vero ea, quæ in vno est ictu, ut legitur apud Galenum duodecimo metho. medendi, cap. 3. & Aëtium cap. nonagesimo sexto, libro quinto, ac Paulum, cap. trigesimo sexto, libro secundo. Eos vero, quibus ex flatu bile, quæ os ventriculi infestet syncope incidit, cum ex reliquis, tum etiam ex assidua oris ventriculi mordicatione, anxietate, vellicatione, ac dolore cognoscas. At si quis adeo prætenues succos, ac spiritus habeat, ut ocyssimè exhalent; adeoque imbecillam habeat per vniuersam corporis molem recenter concitatam: ut propterea in syncope incidat, in eiusmodi affectibus, mortifera alia species in facie celeriter apparet: natus videlicet acutus, oculi caui, adstricta tempora, & reliqua quæ deinceps ab Hippo

Ex quibus causis spiritus corrumpuntur.

Ex quibus causis digeratur solidorum corporum substantia. Ex quibus alterentur.

Si syncope causæ fuerit cruditas humorum maxime copiosa signa.

Signa syncope oria ex flatu bile os ventriculi infestante. Si ex succorum tenuitate, & corporis raritate fiat signa.

Tex. 6. et 7.
1. prognosi.
tex. et com-
ment. 8.
Prognosi-
stika.

ab Hippocrate, primo Prognosticorum sunt con-
scripta: quamvis alius non multum exereuerit, ne-
que vigilauerint, aut tristes fuerint, aut fame affecti
agri ipsi; ex his nanque minus malum est, quam si
absque his emaciati fuerint, eodem Hippocrate au-
ctore: & Galenus cum primo prognosticorum, tum
12. meth. meden. cap. 6. que sectati sunt Aëtius cap.
98. libro quinto, & Paulus cap. 37. libro secundo.
Verum si syncope valida fuerit, medicinae locus non
est, ut idem inquit Paulus cap. 34. libro tertio. At si
vires adhuc tantillum constant, aliquando ad sani-
tatem recursus est, ut ipse refert. Ceterum ubi cor
proprio affectu laborauerit in syncope, valido exi-
stente animae robore; ex quibusvis animi affectibus
ipsa excitetur, nunquam aeger succumbet, Galeno
teste quinto de locis affectis cap. 1. Si vero propter
eius intemperiem syncope eueniat, perniciosior e-
rit, quam ex cerebri intemperie; quemadmodum
hæc periculosior est, quam si iecur primo affectum
fuerit, ut testatur Paulus cap. 38. lib. 2. & Aëtius cap.
99. lib. 5. quamvis non ita subito syncopæ necare
possint, quæ ex cordis intemperie oriuntur, quam
illa, quæ instrumentales eius morbos sectantur, ut
patet eodem libro quinto de locis affectis, cap. 2.
Pestifera autem est syncope illa, quæ extenuato spi-
ritu ac sanguine originem trahit, potissimum ubi
imbecillitas adsit retentricis facultatis totius cor-
poris, ac expultrix immoderatus concitata fuerit.
Prorsus autem exitiosa syncope erit, si corpore cru-
dis succis referto generetur, aut ex redundante fla-
ua bile os ventriculi infestante: siue ex extenuatis
succis, ubi iecur, vel ventriculum phlegmone obse-
derit, quemadmodum scriptum reliquit Galenus
eodem 12. methodi medendi, cap. 6. Verum si citra
phlegmonem stomachicæ syncopæ fiant ventriculi
ore affecto primo, ac conueniente corde, curatio-
nem magna ex parte admittentiam minus pericu-
losæ sunt, quam si excitatæ fuerint ex aliquo trium
principiorum, quemadmodum colligi potest ex
Galeni verbis, præcitato libro 12. methodi meden-
di, cap. 3. Quoniam verò quæ habentur indicatio-
nes ex symptomatibus, & morbis, non simpliciter,
sed secundum causam, à qua singulæ fiunt, conside-
rare oportet, ut liquet primo de arte curat. ad Glau-
conem, cap. 14. propterea non vnus modus curatio-
nis, cuiusvis syncopes erit, sed singulæ earum pro-
priam curam desiderant pro diuersitate causarum;
ex quibus excitantur: in vno tamen omnes commu-
nicant; quod si deprehensus syncope cubans est o-
mnis sollicitudo medentis ad symptoma vertitur; si
nedum ea premitur, vtriusque curam habebit, & ut
sympoma non incidat: & ut morbus paulatim di-
scutiat, ut patet apud Galenum eodē libro duo-
decimo methodi medendi, cap. 6. Nec minus & in
alio quoque conueniunt, quod siue per essentiam
fuerit orta syncope, siue per consensum affecto cor-
de, semper ipsi prospiciendum erit, cum & principa-
lissimum viscus sit, saltem quoad vitam: & propter
ea robur eius perpetuo seruandum erit, nec syncopæ
aliqua gigni potest (ut prius diximus) nisi & i-
psum cor afficiatur. Si itaque ex ambientis malitia
syncope fiat, prospiciendum erit, ut is ad optimam
temperiem mutetur, atque arte odoratus fiat. Si ve-
rò ex venenatis facultatibus, aut ex animalium quæ
virus reieciunt, venenis excitata fuerint syncope, eis
vtendum erit, quæ ἀλεξοφάρμακα, Græci nuncupant,
vtriusque propriis: ex ingenti dolore, curanda causa

doloris erit: ex crebris, & inordinatis motibus;
quies iniungenda: ex respiratione prohibita, respi-
ratio procuranda, sublata causa quæ ipsam prohibe-
bat: ex animi affectibus, statim ab eo affectu reuo-
candi: postmodum verò conueniens passioni cura
est offerenda. Si verò ex aliqua trium principio-
rum intemperie fuerit excitata; per contrariam in-
temperiem; moderatè tamen vindicatam, syncopæ
curabitur. Sic si ob inflammationis magnitudinem,
aut vehementis febris malignitatem, syncopæ gene-
rentur, propriis curationibus, inflammationis sci-
licet, aut febris, curandæ sunt, tempore quo syncopæ
deprehenso cubantes non sint. Verum quoniam læ-
pius accidit, ut ex immodica quapiam euacuatione
nec animi defectus, sed syncopæ eueniat, & similiter
ferè succurrendum erit cuilibet repente syncopæ
ingruenti, velut huic: propterea curationis eius, cum
iam euaserit, mentionem primò faciemus, relicta e-
ius curatione, si ea agri non laborent: quoniam pro
diuersitate affectuum, ad quos sequitur immodica
euacuatio, curari eo tempore debet, quemadmodum
& reliquæ omnes ex quibusvis causis fuerint ortæ.
Occurrendum est igitur, cum repente eius accessio
ingruat, frigida faciem aspergendo, & nares appre-
hendendo: conuenit etiam & os ventriculi perfri-
care, ac iubere, ut euomant, stomachum irritando,
digiti, vel pennæ immisione. Conducit itè manus,
vel pedes alligare: verum oportet nexus fieri plures,
ac fortiores circa manus, quando per inferiores par-
tes fiunt euacuationes, quemadmodum quādo per
hæmorrhoidas sanguis profluit, aut ventris proflu-
ua adsunt, vel per vterum exeunt in mulieribus mē-
ses. Contrā autem fit in fluxibus sanguinis factis per
nares, atque vomitibus, in quibus crura sunt vehe-
mentius alliganda: in vniuersum autem (ut Gale-
nus inquit primo de arte curat. ad Glauconem) aut
ad cōmunia membris patientibus in aduersum tra-
here oportet, aut ad ea in quibus est euacuationis o-
rigo. Atque ideò quæ ex vteris fiunt immodicæ e-
uacuationes, cucurbitulæ māmellis appositæ statim
sedant; quæ verò ex naribus, hepatis, ac spleni secun-
dum naturam patientis. At si ex vtriusque naribus mul-
tus sanguis effluat, vtriusque visceri sunt adiciendæ:
talibus etiam auxiliatur vinum aquosum, vetus, fri-
gida dilutum, & præferim quando ad ventriculum
fluunt humores, nisi aliquid vini exhibitione pro-
hibeat eorum, quæ à Galeno primo de arte curatiua
ad Glauconem, conscribuntur. Ex variis quoque o-
doramētis eos reuocare conuenit: nam humida, &
potus, necnon odora: a, præferim ad recuperandas
vires citissimè optima sunt, Hippocrate auctore,
libro de aliment. & aphorismo vndecimo secundi
libri, simul cum Galeno. In vini autem exhibitio-
ne non frigidum, vel calidum exhibendū sit, ægro-
tantis natura, consuetudo, ætas, & ambientis aeris
temperatura consideranda sunt: atque hæc respi-
ciens distinguere oportet, num calidum, vel frigi-
dum exhibendum sit: ipsis verò locis, ex quibus pro-
fluuium prouenit, imponere oportet ea, quæ cor-
roborandi vim habeant. Verum si ob sudoris mul-
titudinem animi defectus, vel syncopæ excitetur, eis
quæ adstringunt, ac cutem refrigerant, vtendum e-
rit. Vinum præterea frigidum dilutum, velut dictum
est, etiam his commodum existit: nihil autem om-
nino calidum offerre conuenit, neque crura, nec
manus ligare oportet, neque cogere ad vomitū, aut
villo modo mouere. Aërem quoque domus alterare

Ingruenti
syncopes
curatio.

Loco ci-
tato.

Lib. de ali-
ment. in fin.

In quibus
conueniant
omnes syn-
copes pro
earum cu-
ratione.

opus est, eis quæ frigida, atque adstringenti qualitate, participant; vt myrtorū foliis, rosas, ac pāpinis vitis, pauimentum consternentes, frigidōsque ventorum flatus ventilabris etiam inducetes. Verūm nihil horum, vbi ad ventrem fluxiones fiant, confert: nam quo magis cutem densaueris, tanto ipse magis augentur: eis verō balnea aptissimæ sunt, confert etiā immodico sudore sudatibus partibus illinire myrtinum, rosaceum, aut cotoneorum oleum: quæ omnia à Galeno primo de art. curat. ad Glauconē, & ab Aëtio cap. 102. libri quinti, scripta reperies. Quomodo autem vindicandi sint agri à quauis particulari ingruenti syncope, seu animi defectu, apud eosdem auctores præcitatīs locis studioſi requirant, quauis ab vtriusque de animi defectu verba fiant: idē tamen de syncope intelligendum erit, si ab eisdem causis excitetur: neque enim alio discrepant, quā maioris minorisve ratione, vt diximus. Nos verō eius synopes curam aggrediemur, quæ ob magnam crudorum succorum copiā vnā cum oris ventris offensione excitatur, & primò eorum curam præcipiemus, qui nondū ea præmuntur, vtriusque curam habentes, vt & ipsa non incidat, & vt morbus paulatim discutiatur, quamuis celerius hunc discutere-mus, si nullus symptomatis subesset metus. Nāque, qui multitudine crudi succi grauat, hūc (si modo iustā semel vacuationē ferre possit, nec metus aliquis synopes impenderet) semel arbitror, vacuatū à morbo explicaremus, vt duodecimo meth. med. cap. 6. Galenus inquit. Quapropter licet vacuationem desiderent, nulli tamen sanguis mitti sine maximo dispendio solet: quo fit, vt nec sanguinis missionem, nec purgationē subſtineant, vt pote quod sine his synope subito adoritur. Degāt itaque tales in domo puræ lucis, nec madente: aer eligatur calidus media temperie: quapropter reclinandi in domo sunt; æstate quidē, quæ frigeat, hyeme, quæ caleat; cū aduersissimus eis sit aer ambiēs, quoties vel nimīū calidus est, vel nimīū frigidus. Ex calido etenim crudi humores diffunduntur, & per totū corpus diſſiliūt, vt liquati propterea metuendū sit, ne ad pulmones, & cor ferantur, aliquādo etiā, ne ad cerebrum subeant: cū longē præſtet, vt circa iecur, & primas venas subsistant. Qua ratione iterū aduersissima his balnea sunt. Ab aere verō, & in domibus immodicē frigidis, succi, qui crudi sunt & inepti ad concoquendū, manent, & obturationes hepatis augent, si paræ fuerint, si verō non fuerint, generant propter crassitiē detenti, & impacti. Somno vtantur, atque vigiliis moderatis: nanque vberior somnus, neque his est salutaris, cū nec crudos succos digeri sinat, & viscera grauiora reddat, sed si quis alius affectus est (vt Galenus testatur) qui somnū & vigilias modicas desideret, hic profecto in his est, quippe somnus cōcoquit, vigilie digerunt. Pari ratione motus vitādus erit, quies verō præcipiēda: seruandūque inuiolabiliter est, ne vel cibum, vel sorbitionē, vel aquā exhibeas, vel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulla tribus primis diebus duntaxat vtantur, in qua hyssopum coctum fuerit: & si nullum occurrat incommodum, eadem aqua mulla duntaxat, in qua incoctum hyssopum sit, vsque ad septimum vtare; siquidem longissimam (vt Galenus asserit) qui ita sunt affecti, cibi abstinentiam ferunt, corpore scilicet ex crudis ipsis, quos continet succis, cōcoquendis, alito: quare nec eadē aqua mulla copiose semel exhibenda erit. Si tamē vehemēter

nō febricitet, his & aquosum vinū idoneū ab initio statim est; & in eo diluto panem quoque exhibere conuenit, modo in aliquo viscere phlegmone non adsit. Et si non solum crudi succi sint, sed etiam eo corruptionis peruenierint, vt cōcoqui ad perfectionem non queant, si fortē horum desperata salus nō sit, agro mullam fastidiente, vel aluo fluente, ad ptisanā cremorem est transeundum: & si cubi crudos affatim succos esse animaduertis, oxymel pro mulla exhibere assidue debebis. Quod si huius assiduus vsus tædio esse cœperit, transire insimul ad mullam, & ptisanam conueniet: dein rursus ad oxymel reuertī: & si æstas sit, atque æger frigide potioni affuetus, frigidum huic oxymel dabis, sin hyems sit, omnibus calidum: tum his, qui calidæ, tum his qui frigidæ insueuerunt, offeres; æquē, vt si immodicus æstatis tempore æstus sit, etiam qui calidæ affucti sunt, frigidum, si nullum sit his viscus adinuriā oportunum. At quoniam hi cū vacuari postulent, vacuantia præſidia non ferunt: ea de re nulla alia idonea vacuatio inuenta est, à Galeno præſertim, eodem duodecimo method. meden. ab Aëtio confirmata cap. 96. libri quinti, & Paulo capite trigefimosexto libri secundi, præter eam, quæ est frictione paratur. Incipere verō in principio statim morbi oportet frictiones, linteis non admodū mollibus, sed aspredinis mediocri quid habētibus, ac primū à cruribus superne deorsum, dehinc tota brachia ab humeris vsque superne deorsum simili modo sunt fricanda: postulat enim ægrotus simul per eas frictiones, & caleſcere, & aliquid degeri: licet cōducant etiā vberiores frictiones ad somnū alliciendum. At vbi artus omnes abundē calere videantur, & metus est, ne quis ex multitudine frictionis contusa iam carne, lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxante vtendum est, quale est, quod dulcissimū est: & si hyems fuerit, nihilo deterius erit ad digerentiū aliquid oleum transire, quale est chamemelinū, aut anethinum, quo oleo vngere artus, & fricare quā plurimū debebis, postea oleum detergere, atque ad spinam dorsi transire, hancque totam fricare primū sicca frictione, postea oleo. Ab hac rursus ad crurā te conferes, ab his ad brachia, exinde denuo ad spinam, ita totum agens diē. Considerare item oportet in his, quæ ad aluum spectāt; & si sua sponte commodē nō deiciat: pulsus verō robore mediocri sit, ac magnitudine, & æqualis, præterea minimē inter-cifus, audacter per inferius aliquid infundes. Cata-plasmatīs autem, & perfusionibus minimē vtendū est, prius quā superuacua magna ex parte partim vacuata sint, partim cōcocta: nanque hi, qui assidue prædictis medicamentis præcordia vexāt, potius in eiusmodi affectibus phlegmones excitant: licebit verō eis vtī tempore quo diximus. non tamen duntaxat relaxantibus, sed eos plurimum fouere oportet oleo, in quo absinthium ebullierit: vel emplastrum adhiberi ipsi ventriculo, quod fit ex pal-mulis, vino, farina hordei, croco, aloē, & mastiche, ac madefacere etiam mastichino, seu nardino; postea verō hyssopum in mellicrato decoctū, aut diatriopipereon, aut diaspoliticō medicamē exhibere non incōuenit: & ad eundē modum medicamēta quæcunque offerenda sunt extenuantia, calſcientiaque saltem ea, quæ sumere febricitans homo poterit, si febricitauerit. Qua ratione, & propter eā etiam, quam supra assignauimus, nimium calida medicamenta vitanda sunt: & si qui laborant, senes

Medicamētorū ratio. 12. meth. c. 3.

Vitæ ratio.

12. meth. c. 3.

Leoto citato.

sint, post quanque cibationem aquosum vinum præbendum erit, magisque etiã si interposita quietis spaciã mediocritas sint. Qui sane ex eiusmodi succis laborat, hos quotidie accessiones exercent, præcipueque ad vesperam, & noctu, non mane, nec vsque ad meridiem: Si verò ad hos (cũ syncope eos iam premit) sis accitus, si ea que retulimus loca phlegmone vacent, panem exhibebis non multum, vino fuluo madefactum, quod celerem in corpus digestionem adiuuet, statimque ad frictions venies; quas etiam pro tradito iam modo administrabis: ac siquidem ætas sit, aut regio naturaliter calens, & æstiuans, vel status cœli vehementer calidus, cum frigida vinum dabis, si nihil eiusmodi sit, iam calida; quæ tamen secundo, & tertio dabitur potio, omnino calidam exhibendam curabis, quippe ad vniuersam eam curationem (cuius gratia frictions adhibite sunt) calor præstat, vt pote crudorum succorum concoctionem adiuuans, Galeno & Aëtio testibus, in præcitis locis. Nec parũ conducit si prædictis diamoschu dulcis, aut confectionis diambra parum cum paucò vino exhibeas: odoramentis quoque animinum reuocare conuenit; parẽtur autem hoc modo, Recipe aquæ rosarum, florum citrangulorum, & mellisloph. ana. vnc. ij. corticum citri, ligni aloës, singulorũ drac. j. moschu, & ambar vtriusq; gra. iij. acetĩ vnc. j. Interim autem neque cor ipsum negligẽdum erit, ne ei succurratur ab extra adhibitis medicamentis, epithematibus scilicet, vel sacculis, vt infra. Recipe aquæ mellisloph. florum citrangulorum, & rorismarini ana lib. s. aquæ rosacæ vnc. iij. ligni aloës, corticũ citri, singulorũ drac. ij. cinnamomi, caryophyllorum, vtriusque drach. s. croci gra. v. osis de corde cerui num. ij. moschu & ambar, singulorum gra. iij. vini fului odoriferi veteris vnc. iij. misceantur, & supra cor epithemata fiant. Item ex floribus mellisloph. rorismarini, & citrangulorũ, sampfuchi, & serpylli cum cinnamomo, croco, caryophyllis, corticibus citri, rosis siccis, ac ligno aloës simul mixtis, & contusis, additis gra. iij. moschu, & toridem ambar, cum serico sacculi fiant. Qui verò ex vitiosis calidis succis redundantibus, seu flaua bile, quæ os ventriculi infestet, syncope vexantur, tempore, quo ea non præsumuntur, contraria quã prædicti curatione curandi sunt. Nam in aëre ad frigidum vergente degerere debent; somno longiori vt, ac cibis, & potibus frigidioribus, vt ptisanæ cremore, aut pane nõ multo, sed modico, hũcque ex vino aquoso frigida diluto, tribuas: confestimque tentandum erit, vt bilis ipsa expurgeretur, quæ sua acrimonia, ac mordicatione os ventriculi infestat, per vomitum si fieri poterit, quẽ digitis aut pennas demittendo irritare oportet, aut aquæ calidæ, seu hydrelæ potui, vel tãtillum acetĩ aquæ calidæ imponas, aut crypi acetofi simplicis. Quod si neque sic euomere possunt, alius ciẽda erit, ex tamarindorum decocto, ac manna; quandoque etiam rhabarbari parũ adiciendo: illud tamen animaduertas, quod neque hi immo dicẽ semel vacuãdi sunt, cum exquisitas euacuationes nõ ferant. Ad hũc etiam vsũ clysteriis, eisq; lenibus vt conuenit; postea verò cum maior pars redundantis succi fuerit expurgata, omnibus modis membra ipsa, ventriculum præsertim corroborare oportet, oxyfaccarum, syrupũque granatorum acidorũ, aut ex acetositare citri, & pomis, aut de corticibus citri cum iam dictis permistum, ante, & post purgationem indefinenter tribuas. A purgatione

verò absinthij decoctum præbere conuenit. At si in syncope prædicti inciderint, his exhibendus est frigidus potus: sit tamen tunc vinũ, quod & calidum natura sit, vt deductionẽ in corpus promoueat: id verò seruandũ erit omnibus, quos syncope malẽ habet: distribui nanque per corpus nutrimentũ, quod sumptum est, non in ventre manere volumus: propterea ex vinis ea deligenda sunt, quæ & flauo sint colore: & substantia tenui, & ætate vetera, ac boni odoris; licet talia (vt Galenus refert) & boni odoris cõtinuò sint: igitur cõmodissima his vinã erũt, quæ cum naturaliter austera sint, sensilem iam adstringendi vim propter vetustatem non exhibent, calorem tamen admodũ habent. Quandoquidem hæc omnia quæ requirimus in iis, quorum stomachus amara bile vexatur, efficiunt: cum & iucundẽ fuman- tur, & tum cõcoctionem, tum digestionem in corpus promoueat, & succi vitium mitiget, & corporis habitum exalfaciant, & stomachũ ipsum firmet: in prædicti verò vini penuria; aut vbi caput fuerit imbecillum, vel oblesum, vina diligenda sunt aquosa, & antiqua: talia naque, tametĩ non valenter exalfaciant, tamen faciliẽ in omne corpus deducũtur, capũque minimẽ tentant, velut fulua: omnia autẽ austera vina, tum noua, itẽmque crassa fugere oportet, vt idẽ Galenus præcipit eodem duodecimo meth. meden. cap. 4. Nec etiam inconuenit, si eisde diamarg. frigidi exiguum quippiã cum paucò vino, vel syrupo de pomis, seu oxyfaccaro tribuas: odoramentũque naribus adhibeas; quod recipit aquæ rosacæ, myrtillorum, ac nymphæ ana vnc. iij. santalorum, ac corallorum rubeorum, cuiuslibet drac. j. & s. corticum citri serup. j. ambar, seu moschu gra. ij. acetĩ albi vnc. j. omnibus simul mixtis fiat odoramentum. Cordi itẽ epithemata imponere cõuenit, quæ sic parentur, Recipe aquæ boraginis, acetosellæ rosacæ, & mellisloph. ana vnc. iij. santalorũ omnium, & corallorum rubeorum, singulorum drac. ij. corticum citri, ligni aloës, cuiuslibet drac. s. croci gra. iij. moschu gra. ij. osis de corde cerui num. j. vini fului odoriferi vnc. ij. misceantur, & fiant epithemata. Sacculos item componas ex floribus boraginis, violarũ, nymphæ, mellisloph. ac rosis, quibus parum croci, ligni aloës, ac corticum citri, & ambar quoque gra. ij. addas; necnon santalorum, & corallorum rubeorũ ana drac. iij. & cum serico fiant sacculi. Qui verò ob prætenues succos syncope opprimuntur, sic vt ocysimẽ exhalent, accedente quoque corporis raritudine; diuersã ratione curandi sunt, quàm illi, qui ob crudorum humorum copiam syncope laborant, cum eos paulatim, & assidue vacuare iussimus, propterea quod simul multam euacuationem ferre non poterat: hos verò paulatim, & assidue nutrire oportet, ex omnium medicorum sententia: quamuis si à principio viribus adhuc valentibus curandos susceperimus; nec paulatim eos cibabimus: possunt nanque hi, vel quod liberius semel datum est, nutrimentum superare: nutrire itaque hos oportet, sicut etiam corporis summa desare, nõ secus quàm priorum rarefacere; cum etenim maxime hi affectus disideant, etiam præsidiorũ speciem diuersissimam requirunt; frigidum ergo his aërem, adstringentemque comprobauimus, rosis, aut myrti foliis, seu vitium pampinis in domo substratis: vngendi quoque sunt adstringentibus vnguẽtis, omphacino videlicet, aut rosaceo, melino, aut myrtino: & si exurantur, miscere oportet aliquid ex refri-

copis im-
mentis con-
ratio.

12. method.
cap. 4.

Ematio
prædicta
syncope
ingratis.

Synopes
ex flaua bi-
le curatio.
Vitiũ ra-
tio.

Medicamẽ-
torũ ratio.

Synopes
ex tenibus
humoribus
curatio.

gerantibus, veluti portulacæ, solani, aut vix acerbæ succi; præcordis verò, & stomacho cataplasma admovebitur ex palmulis, rosis, ænanthe, acacia, hypocistide, & alumine; capiti autè, atque fronti omphacinû, vel rosaceum imponatur per se, aut cum gummi. Cibi his dandi sunt, qui non admodum promptè diffuât, quemadmodum Galenus, Paulus, & Aëtius sentiunt, ut panis, & sorbitio ex alica, fructus aut steri, qui non faciliè corrumpantur, tum ipsi per se, tum verò & cum pane; velut sunt cydonia, mala punica acida, & austeræ, amarenæ, pyra quædam, & hi, quos vulgus azarolas vocat. Dabis etiam aliquando & oîa, præcipueque & horum vitellos: album namque corû agere concoquitur, ut patet 12. meth. med. cap. 6. præterea gallinaceorum qui lacte sint aliti testes, itemque suillû cerebrum, probè tamen assum tribuendum, ut ipse inquit, vel in albo iure legitimè elixum; porro, & anetho iniectis. Vinum autem his aquosum necessarium inter initia est, sumptum post cibum. Denique omni ratione agendum, ut & fucorum materiam crassiorē reddas, & cutim densas, & exhalationem inhibeas: quòd si ex sententia omnia nobis responderint, etiam carni his aliquid nutritimè post alia dabimus potissimum post quartum diem, Galeni decreto, eodem 12. method. mendi. Ex his itaque constat qualiter syncope succurrendum erit: pauca etenim sunt, vel fortè neque vna, quæ ex his quæ hic conscripsimus, curari non valeat, modo curari possit.

Loco citato.

De lactis defectu.

CAP. LVI.



VAMVIS affectio hæc infantibus magis, quam mulieribus grauis sit, ex Aëtij testimonio, cap. 33. libro 16. & propterea conuenientius fuisset alio loco de ea pertractare; tamè quia hic de affectibus in spiritus instrumentis ortis sermo nobis institutus est, in quibus certè thorax, & cor existit; ob id quoque & mammillarum affectu non ab re quoque meminimus; ut quæ incumbant thoraci, & cor contendant, Galeno teste septimo de usu partium, postquam de reliquis instrumentorum spiritibus, ac cordis affectionibus verba fecimus. Merito autem pectori homini mamma inhaerent: nam aptissimus omnium hic ipsis locus est, tum propter alios vsus, quos Galenus eodem septimo de usu partium, connumerat, tum etiam quod in eo loco in mulieribus copiosissimum benigni alimenti superfluum colligi potest, lac videlicet, cuius causa extiterunt: nam hanc primam, ac maximam animalibus (ut ipse inquit) præbent vtilitatem: quod quidem cum vtilis alimenti superfluum sit, cibis exactè confectus, in eo potissimum loco constituere eas conueniebat, ubi facillimè simul, & citissimè elaborati lactis copia perfectè consistere poterat. Nam cum tenera adhuc sunt, atque imbecilla recens nata animalia, edulia solida nondum possunt conficere: & ob eam certè causam natura, perinde ac si vtero adhuc gererentur, alimentum ex matre ipsis comparat pro conceptus nutritione, ut 14. de usu partium, cap. 8. decretum reliquit Galenus. Hoc siquidem alimentum nihil aliud est, quam quædam veluti superfluitas nutrimenti partis ipsam generantis, similis quidem naturæ ipsius existens. Qua de re cum quidam in mammis adenes existant, vim habentes, id quod ad eos influat alimentum alterandi, ac

Cap. 22. in fine.
Cur hamini mammae pectori inhaerant.
Eodem 12. Quid sit lac.

sibiipsis assimilandi, quoniâ exangues, & albi hi sunt proprium efficiunt humorem talem qualis est lac, & plus talis efficiunt, quando plus alimenti deferuntur ad ipsos, ex Galeni sententia commento aphor. 39. quinti libri. Cum itaque humor hic, qui veluti superfluitas alimenti est ipsarum mammillarum generantium ipsum, quo conceptus ex eo nutriatur, ut retulimus, vel admodum exiguus existat, vel omnino deficiat, lactis defectum appellamus. Quòd verò in hac affectione mamillæ afficiantur, ex his quæ diximus, liquet, cum principem ipsæ usum, qui gratia generationis lactis existit, ut paulo ante dictum est, non præstent, potissimum tempore, quo præstare debet, de quo modò loquimur. Est autem id à partu, quando iam fœtus natus fuerit, totòque lactationis tempore: etenim mirabili quadam arte natura fecit, ut māmæ maximum habeant cum matricibus consensum. Nanque cum partes utraque ad vnum opus obeundum comparasset, ipsas per vasa coniunxit, modo quo Galenus declarauit libro septimo, & 14. de usu partium, ac libro de ven. dissect. partium quidem ex partibus, quæ sunt supra phrenas ad inferna deducendo, partium ex inferioribus sursum. Necesse nanque erat has particulas per vasa coniungi, ut quando in matricibus fœtus augetur, ac conformaretur, illi soli venæ cōmunes ex utriusque alimentum affundant: quando verò natus fuerit, māmīs sursum alimentum totum affluat. Quò fit, ut lac menstruo germanum esse inquit Hippocrates, & quòd eodè tempore menstrua belle procedere nequeant, & fœmina lactare, ut Galenus asserit. Ad hæc libro quinto de simpli. med. facul. cap. 21. dicebat, Proinde quibus menses mediocriter feruntur, iis lac in māmillis nō colligitur; quibus verò hoc largè suppetit, iis planè menses supprimuntur. Hoc itaque tempore, ac reliquo toto quo mulier lactauerit, si lac deficiat, mamillas affectas esse non ab re fatemur, siue per essentiam, siue per consensum affectæ sint. Earum verò affectus symptoma est in genere retentorum immodicè: nā (ut inquit Galenus) commento prædicti aphorismi 39. quinti libri, hoc commune est omnibus animalis partibus, quæ apte sunt humores aliquos viles generare, aut partibus aliis, aut ad generis propagationem, aut ad conceptus nutritionem, esse humore illum quandam veluti superflui a tem alimenti partis ipsam generantis. Nam quantum alimenti ab ipsa parte alterati fuerit nutritio corpori exquisitè assimilatum, illi apponitur parti, ac nutritur eam: superfluum verò derelictum similis quidem naturæ partis humor existit; verum eiusdem partis veluti excrementum est: cum autem hoc excrementum deficiat, non ab re dicimus affectionem hæc contineri in genere excrementorum retentorum immodicè. At quoniam lactis materia sanguis est in venis contentus, quantitate, ac qualitate contemperatus, tum ab aliis partibus transmissus, tum etiam à mammis ipsis attractus, ut quinto de simpli. med. facul. est videre; propterea non ab re ipsum sanguinem contemplari, eodem loco præcipit Galenus, quo promptè inueniatur causa paucitatis, aut omnino defectus lactis. Nanque inuenies quòd aut paucior est quam conueniat, aut deterior, ut ipse inquit: paucior autem esse poterit, vel quod in toto corpore exiguus affuerit sanguis; vel quod licet exiguus in toto nō fuerit, paucior à māmillis attrahitur: id autem intertingere poteris ex totius corporis temperamento, ac habitu sicciore existente: ex immodicis item sanguinis,

Quid intellegendum sit per lactis defectum.

Quæ p. afficiat.

Lib. 7. de usu part. cap. 22. 14. de usu part. cap. 5. De venarum dissect. cap. 5. & 8.

Quis affectus præter naturam sit defectus lactis.

Quia via investiganda sit causa defectus lactis. cap. 11. Eodem lib. 5. cap. 20.

*Signa si ex
sanguinis
defectu
proveniant.*

languinis, aut aliorum humorum euacuationibus precedentibus, vehementibus exercitiis, laboribus, vigiliis, fame, morore, vel solitudine, aut arida, æstuantēque febris, vel id genus aliis: quæcunque plusquam expediat, corpus deficcauerint, ac callescerint: hæc enim sunt, quæ inter alia lac lādunt, ipsūque provenire prohibent, ut legitur apud Galenum eodem libro quinto de simplic. medic. facult. cap. 20. nedum sanguinem ipsū minorem reddunt, sed partim etiam qualitatē ipsius vitiant: quamvis & immodicē refrigeratiā huiusmodi quoque naturæ sint: Si verò hæc non adsint, inspexeris autem aridas, macilentas, ac graciles mammillas ipsas, ob propriam earum imbecillitatem, ac aridam intemperiem provenire lactis defectum conicere poteris, utpote quæ non valeant tantā quantā indigent pro lactis generatione, sanguinis copiā attrahere. At si propterea quod sanguis deterior, seu vitiosus fuerit, lac ipsum deficiat, utpote biliosus, aut pituitosus, vel melancholicus existens, id tum ex lactis colore, tum substantiā, & sapore potissimum interstingere poteris, præsertim si non omnino defecerit, non tamen posthabita cognitione temperamenti, habitusque totius corporis, & ætatis. Namque si biliosus fuerit; præter eius tenuitatem, ac flauitiam, amari quodammodo saporis lac erit, aderitque temperamentum biliosum, habitus gracilis, ac ætas florens: Si verò pituitosus sanguis fuerit, crassior substantiā, albi, aut pallidi coloris, acidi saporis, odorisque lac existit; lactantisque temperies, habitus, ac ætas pituitosi quoque erunt, quemadmodum si vehementioris fuerit spissitudinis, ac paucitatis, obscuriorisque, ac quodammodo nigri coloris lac ipsum, & reliqua quæ diximus melancholica, fuerint, melancholicum quoque sanguinem adesse significabunt. Hæc tamen de fectione quamvis infantibus magis, quam mulieribus grauis sit, ut diximus, non propterea despicienda erit, cum absque aliquo eiusdem mulieris præter naturam affectu etiam gigni non possit. Quapropter ubi imminuitur lac, aut omnino extinguitur, vel corrumpitur, aut spissatur, vel attenuatur; præstat quidem alterius nutricis lac præbere, quemadmodum Aëtius præcipit lib. quarto, cap. sexto. Sin autem id non permittat res aliqua instas, victu curanda est, ut ne in morbum incidat infans, ut ipse inquit, ac ipsa sibi quoque meliorem vindicet sanitatem. Itaque si lactis defectus ex sanguinis paucitate proveniat, vniuersam victus rationem mulier exposcit humectantem, & exalfaciētem, Galeno teste, quinto de simplicium medicament. facultatib. cap. 20. Similia item & medicamenta, siquidem quæ non deficcant, & modicē exalfaciunt, lacti generando vtilia sunt: ac meritō dicta sunt lactis procreatricem habere facultatem; quamvis ea numero sint perquam exigua, ut idem Galenus inquit. Nam lactis, velut etiam seminis effectrices facultates partim in medicamentis duraxat, partim in alimentis consistūt: in medicamentis, cum succos pituitosos exalfaciētes in sanguinem vertimus: in alimentis autē, secundū totius substantiæ similitudinē; ubi videlicet boni sint succi, & humida; ac tepide de calida, seu est ipsum lac medium habens temperamentum, quod ad calorem attinet, pituita, & sanguinis licet non æquē ab utroque adsit, sed longius abest à pituita, propius autem accedit ad sanguinē, ut eodem quinto de simplicium medicament. facult. cap.

20. liquet; id quod etiam patebit, si eiusdē triplicem diuersam substantiam, ex qua componitur, considerabis, primam quidem crassam, ex qua caseus conficitur; alteram pinguem, ex qua butyrum; & tertiā aqueam, quam serum nuncupamus: nam ex hisce, pinguis maximē temperata est; crassa verò paulum ab ea declinat, aquea autem frigida; & humida est; ut idem Galenus testatur, quarto de simplic. medicament. facultatib. cap. 16. Quapropter alimentum augere, & melioris succi cibos dare oportet; panem videlicet optimum, gallinarum, pullorum gallinætorum, ac columbarum iuuenum, perdicum, & phasianorum carnem, hædorum, vitulorum, & castoratorum, insuper & oua recentia, præsertim forbiilia. Ex fructibus uvas passas, amygdalāsque dulces. Pro potu vinum, aut aquosum, aut flauum, tenue, moderatē aqua dilutum, vel vinum dulce potui tribuatur, ac sorbitionibus utantur, ut Paulus iubet, libro 1. cap. 4. Caueant exercitium immoderatum: verum supernarū partium exercitiis uti possunt, vberumque frictione moderata, ac fomentis per spongiā, Aëtio teste. Vitent animi affectus immodicos, mæsticiam præsertim. Medicamenta verò & si lacti generando proficere aliquid possint, non tamen frēquēter ipsis uti, præcitato loco præcipit Paulus; eorum tamen quibus uti poterunt, in fine mentio fiet. Si verò quia deterior sanguis sit, propterea lac deficiat, siquidem biliosus fuerit sanguis, primum purgationem desiderat; mox victum, quem modo dicebamus, ut eodem libro quinto de simplicium medicament. facultatib. cap. 20. docet Galenus. Eligatur autem purgans medicamentum; quod leuiter bilem expurgat, ac non exsiccat; veluti est manna, castia fistula, syrupus ex pluribus infusionibus violarū, aut rosarum, tum rubearum, tum persicarum; prius tamen syrupum exhibens ex succo intybi, aut boraginis, vel ex infusionibus rosarum, ut facilius bilis expurgetur. Pari quoque ratione nigra bilis, si ea causa vitiosi sanguinis fuerit, ac defectus lactis, expurganda erit medicamento, quod talem vim habeat, nec tamen exsiccat, veluti est diacatholicon, seu syrupus domini Augustini, si cum manna; aut castia fistula ea permisceas. Verum si pituitosus fuerit sanguis, medicamenta requirit, Galeno teste, exalfaciētia aut primo aut secundo ordine, non tamē deficcantia: nam hæc pituitosos humores exalfaciētia, in sanguinem vertunt; & non ipsius sanguinis humorem depascunt, ac ipsum crassiores, simulque pauciores efficiūt, ut ea quæ deficcant. Verum inter ea potiora sunt, quæ non tantum sunt medicamenta, sed & nutritiua, ut ipse inquit, velut eruca, foeniculum, anethum; cum etiamnum virentes, & humida fuerint: nam sicca plusquam oportet exalfaciunt, & deficcant. In hunc etiam usum conferūt, sinyrnium, apium, syon, & polium; eaque virentia, priusquam siccantur, ex eiusdem Galeni sententia. Similiter etiam confert foeniculi radix, & semen, ptisanæ incocta, ex Pauli testimonio; item cythi folia ex vino nigro, aut ptisanā, melanthium dulce, & anethum pastinacæ radix, atque semen, quæ calida prius irrorata admouenda sunt, ut ipse Paulus refert. Confert quoque lini semen cum melle delingere, ut inquit Aëtius, aut sesamum crudum cum vino dulci: item naturaliter facit lapis galactites dictus pro amuleto alligatus, & aqua dissolutus, ac potatus, ut ipsemet fatetur Aëtius lib. 16. cap. 33. intestina quoque terre, si quinque, aut septē teras, aut plures;

Victus ratio.

Citato lib. 4. cap. 6.

Si ex deteriori sanguine proveniat lactis defectus, curatio.

Qualia medicamenta purgationem habent generandi lac. Loco citato.

Loco citato. Præcitato loco.

Præcitato loco. Lib. 4. c. 6.

ac cum duobus, vel tribus recētibus gallinarum o-
uis decoquas, paucō fœniculo, aut aneto addito, at-
que ex his ferculum parabis, non parū ad multitudi-
nem, ac bonitatem lactis comparādum cōferet. Si-
militer etiam si ea prius vino albo abluta in puluere
redigātur: & cum vino dulci drach. j. vel ij. prædicti
pulueris exhibeas. Ex Hippoc. lib. primo de morbis
muliebribus, habetur, quod si lac fuerit extinctum,
porrum tritum, & aqua dilutum bibendum dandū
erit; calida mulier lauetur, & brasicam edat, sed &
cythi folia simul coquat, & succum sorbeat, bibat et-
iam fœniculi succum, seu semen, & de radicibus
fœniculi, & hordeum molitum, ac butyrum simul
coquito, frigefacito, ac bibenda præbeto: bonum
est & hippomaratum, & hippofelinum, & cythi:
hæc omnia (vt ipse inquit) simul multum lac faciūt,
& augment: viticis itē fructus in vino bibendū dato;
& beta succus potatus, multum lac facit; & nastur-
tium in vino potū commodum est, eodem auctore:
Prope finē. hæc eadē ferē cōfirmavit libro de natura muliebri.

De lactis redundantia. CAP. LVII.

CVM lac velut superfluitas quædam
alimēti vberum sit, vt paulo ante as-
seruimus, non ab re contingit inter-
dum, quando plus alimenti ad ea de-
fertur, adeo hoc ipsum redundare, vt
ex eius ampliori plenitudine mulier grauetur, ac
doleat, ita, vt copiam eius ferre nequeat, præsertim
cum ē mammis non effluat, & propterea intus de-
tinetur. Contingit autem hoc sæpius puerperis, non
rarō autem & reliquis lactantibus. Talis autē mam-
millarum affectus facile percipi poterit, tum visu,
& tactu, tum etiam ipsius mulieris sermone. Qua-
litas verō affectus causa morbi est, in quantitate vi-
delicet, & propriē in excessu, qui ex ipsa provenit
lactis copia, si in mammis detineatur; etenim lactis
copia velut quælibet alia plenitudo, causa morbi e-
rit, cuius iterum causa est boni sanguinis multitu-
do, quemadmodum ē diuerso eiusdem lactis defe-
ctus ex pariori, aut vitioso sanguine originem ducit,
vt præcedenti cap. diximus. Potissimum verō
plurimum colligitur lac, oppletis sanguine commu-
nibus venis, quæ à mammis pertingunt ad vteros.
Euenit autem, & id mulieribus vtero gerentibus,
ob conceptus imbecillitatem interdum: interim ve-
rō cum neque grauida est, neque perperit, sed ei mē-
strua defecerunt, Hippocrate auctore, aphorismo
39. & 52. quinti libri, de quibus modo noster sermo
nō erit, cum de his dūtaxat verba faciemus, quibus
à partu, aut reliquo lactationis tēpore, adeo creue-
rit in mamillis lac, vt propterea mulieres grauen-
tur, ac doleant; ita, vt metus sit, ne vbera inflam-
matione corripiantur. Si verō lac multum ē mam-
mis effluat, non amplius causa morbi, sed sympto-
ma erit, sub genere excretorum immodicē conten-
tum; nec formidandum erit ex eo quempiam præ-
ter naturam affectum in mammis ipsis futurum esse
aut fieri: & propterea nec de hac etiam lactis abun-
dantia hic loqui intendimus. Verū huic affectui,
de quo morbo verba facimus, statim succurrendum
erit, alioquin metuendum est, ne mamillarum
inflammationē pariat, vel instar casei lac cogatur, seu
in grumos vertatur: & si vitiatum quoque lac fue-
rit, mammarū vasa exulcerat, scabiem, panos, & pa-
pularū eruptiones quoque producit, vt inquit Aë-
tius.

Quapropter vbi imminuere ipsum voles, cibos
minus alentes & paucissimos dato, vt ipsemet re-
fert Aëtius. Exiguum quoque potum tribuas, aquā
videlicet, & non vinum; cauendum nanque ab eo
erit. Frictiones, vincula, ac infernarum partium e-
xercitia præcipienda sunt. Cæterum (vt Soranus
inquit) vbi mammae assidue doleant, neque à mu-
lieribus neque ab infantibus exugī oportere (nam
suctione plus materiae attrahi asserit) id quod con-
firmavit Paulus cap. 35. libri tertij. Nos verō ex Aë-
tij sententia cap. 34. libri 16. ab adultis, ac peritis mu-
lieribus, quod puerperarum mammae leniter exu-
gantur, non negamus, præsertim vbi non immodi-
cē doleant, seu inflammatae sint: effertur nanque so-
ras leni hac exuctione, quod in mamillis lac con-
tinetur, neque plus materiae ad eas trahitur. Et pro-
pterea inflammationem per eam fieri prohibetur,
potiusque proritur: in vniuersum autem prohi-
benda sunt ea, quæ multū, ac optimum sanguinem
procreare possunt: & proinde nil præstantius, quā
circa initia, si quid non impediit, poplitis, seu tali
venam secare, copiosumque sanguinem ex ea va-
cuare permittas, vbi vires ferant, eaque iteranda, si
opus fuerit. Et si altera mamillarum magis obla-
ta sit, ē directo vena secanda erit; potissimum au-
tem id seruandum erit puerperis, vbi menses deti-
neantur, totisque viribus præter venæ sectionē eos
prouocare conandum: nam quibus menses medio-
criter feruntur, vt prius diximus ex Galeni sententia,
iis lac in mamillis multum præsertim non colli-
gitur. At si non propterea quod menses præter na-
turam detenti sint, sed quia in toto corpore sangui-
nis redundantia adsit, lactis quoque copia immo-
dica oriatur, media, quæ in cubito est vena, aut in-
terna primò secanda erit; & prout vires ferunt, san-
guis extrahendus: deinde tali quoque vena incida-
tur, & eis quæ modicē repellunt vtare; potissimum
vbi lactis redundantia non fuerit à partu. Quapro-
pter spongia pura, molli posca ē gelida imbuta, ex-
pressaque super mammas fasciis accommodanda
erit, vel palmula cum pane, ac posca trita, deinde
vincire eas, ac moderatē constringere oportet, iux-
ta Aëtij, & Pauli sententiam; vel ouo toto cum ro-
saceo vtendum erit, aut linteum aceto imbutum
imponito, & assidue humectato; vel lentes aqua ma-
rina coquito; & cum decocto quidem mammas a-
bluito; ipsas autem lentes contusas imponito; aut
myrti etiam decocto ipsas perfundito. Quod si lac
omnino restinguere malueris, alumen, & psyllium
cum aceto, & coriandri succo, ac rosaceo adhibe-
to, ex Aëtij testimonio. Poterit quoque portulacæ
succus cum fabacea, ac lentium farina addici, vel ex
cremore fœnigræci, seminis lini, & althææ cum suc-
co coriandri, aut portulacæ, farina hordei, ac len-
tium, adiectis oleo rosaceo, aceto, ac cera medica-
mentum paretur, quo mammae illiniantur. Cumi-
num quoque cum aceto illinitum lac imminuit, eo-
dem Aëtio teste: similiter eius decoctū cum modi-
co croco oblitum, aut fœnigræci succus cū apio
viridi, mentha, aut ruta, farina lentium, rosaceo, ac
posca imponatur. Quod si neque his lac imminua-
tur, vel restinguatur, aut si à partu lac omnino restin-
guere malueris (id quod assidue huius cinitatis mu-
lieres, nobiles præsertim, ac diuites experit, cum la-
ctare nolint, ac nequeant) non amplius eis, quæ re-
pellunt, ac reprimūt, sed quæ ipsum exciccat, ac di-
gerūt medicamentis, tanquā tutioribus existētibus
vtendum

Curatio.
lib. 16. c. 6.
lib. 4. ca. 6.
vitiu ra-
tio.

Vena se-
ctio.

Lib. 5. de
simpl. med.
facul. ca. 21.

Localium
medicamen-
torum ra-
tio.

Act. lib. 16.
cap. 35.
Paul. lib. 3.
cap. 35.

Citato lib.
16. cap. 35.

Lib. 4. ca. 6.

utendum erit; adhibitis tamen prius per vincula, curbitulas, frictiones seu venæ tali sectionem, diuersionibus, prout postulat vſus. Huius autem generis medicamenta, quibus vti conſueui, hic conſcribam; quibus veluti miraculo quodam cunctas, quæ ad manus meas perueniunt, puerperas adeo feliciter curavi, vt lac omnino è mammis extinxifſem, illud cogi, & caſcari non permittens, ac à futura inflammatione penitus mammas liberaui. Excipio autem ſceniculi, apij, oreoſelini, maluarum, & althææ cum radicibus, cuiſlibet p. j. foliorum lauri, & florum chamameli, ſingulorum m. s. quibus in aqua arte decoctis, ac in largiori vaſe proiectis, tectis deſuper panno lineo mammillis, eas fouere præcipio; dein eodem decocto mammas abluere, ac poſt abluitionem roſaceo omphacino illinire, quo tẽpore, vt leniter quoque exugantur permitto, vt reliquum quod in mammis cõtinetur lac fuſum, ac liquatum promptius foras effluat, nec materia aliqua ad eas trahatur. Reſinæ terebinthinæ deinceps quantitatem, quæ ſatis ſit, aſſumens, vino albo, & odorifero, ac aqua roſacea ſapius abluere iubeo, cui duo, aut tria oua tota, ac croci ſcrupul. j. adicere permitto, & in emplaſtri formam, ſeu cerati, cera addita redigi; quod ſuper lineo linteo, eoque craſſo extenſum, perforato tamen in duabus partibus, ex quibus mammillarum papillæ extra prominerent poſſint, imponi, ac ſcicis circumligari, moderatèque conſtringi præcipio. Singula autem dicta iterari facio bis ſaltem in die, manẽ videlicet, & veſperi, ante cibum; ita vt prius mamma foueantur, abluantur deinceps, & illinantur, exuganturque leniter, & demum emplaſtrum prædictum imponatur, & ſcicis moderatè conſtringantur, ac ligentur.

De lacte in caſei ſpeciem, ſeu grumos conuerſo.

C A P. L V I I I.

Accidit etiam plerumque à partu præſertim, Paulo teſte, vt lac in mammillis caſei modo coaguletur, ſeu in grumos cõcreſcat; neque enim idem eſt, vt nonnulli ſentiunt, lac in caſei ſpeciem coagulari, & idem in grumos coire; neque omnino in cauſis generationis iidemmet affectus cõueniunt, vt dicemus. Ambo autem morbi in numero, ſeu magnitudine dici poſſunt, cum in quantitate comprehendantur, atque in exceſſu eiſdem: vtrumque quoque vitium cum facile tactu, ac ægrotantis ſermonibus comprehendendi poſſit, haud aliis pro eius dignotione indiget notis: Ex lactis item copia, vel eiſdem craſſitie, tanquam ex materia originem ducunt affectus ambo. Vtrum autem eorum cauſa ſit, promptè dignoſcere valebis ex indi-
Lib. 3. ca. 35
Affectus.
Cauſe.
Si in grumos concreſcat, cauſa efficiens.
Si inſtar caſei coaguletur, cauſa eſt ſuſcitans.
ciis abundantia lactis, ſi ea cauſa extiterit; aut ex eiſdem lactis craſſitie, modo ex ea excitentur. Itaque ſiue craſſum fuerit lac, ſiue multum indifferenter in caſei formam redigi poteſt, aut in grumos conuerſi, tum ex immodica mammillarum caliditate, tum ex inmoderata earundem frigidityte velut efficienſi cauſa, prima ſiquidem exhecando, ac ſecernendo id quod tenue, ac ſeroſum in ipſo cõſiſtit: reliqua verò adſtringendo, ac cogendo vniuerſam eius ſubſtantiam; in grumos tamen cõcreſcere ipſum nequaquã à caliditate valet, ſed à frigidityte cõtaxat, quemadmodò extrauaſatus ſanguis, veluti nec inſtar caſei coagulari, niſi à caliditate poterit, vt Gal. auctoritate non probabimus; & ſi plerique e-

tiam, qui Gal. doctrinã profitentur aliter ſentiant: cuius nanque cõſtat, lac non alio modo, quàm ſanguinem in grumos cõuerſi: at is non niſi vbi extrauaſatus, frigefactus fuerit, in grumos vertitur: & propterea æger frigore exoluitur, ac penè exanimatur; pulſusque imminuitur, ac frequens apparet, & denique malè ſe habet, ex eiſdem Gal. teſtimonio 6. de loc. affect. cap. 3. & lib. de cibis boni & mali ſucci, cap. 3. ac cõm. apho. 20. 6. lib. Quod verò lac coagulari nequeat, niſi à valido calore, apud eundem liquet 5. de ſimpl. med. ſacul. cap. 12. indiget nãque vt coaguletur, quod ſeroſum eius ac tenue ſeroſum fuſum ſegregetur, quod verò craſſum in eo eſt, in ſeſe cõeat: id autem (vt ipſe inquit) abſque valido calore peragi nequit: cuius quoque naturæ eſſe debent ea, quæ vrinam ciunt: nempe excaſatoria, exſiccatoriæque; tum etiam ſecretoria, ac coactoria. Illud idem confirmarunt Paulus, & Aëtius, diuerſam inſtituentes curatiõnem, ac alia medicamenta, pro lactis caſeatione, & pro eiſdem in grumos conuerſione: à frigore itaque lac grumefcit, & à calore caſei modo cogitur, vt patet ex dictis. Quomodo autem interſtinguere valeas concretum, ac grumefcens lac à frigida intemperie, aut ipſummet caſei modo coactum ab intemperie calida, non opus eſt, vt hic conſcribam, cum quiuis promptè ex earundem temperierum propriis ſignis conicere poterit. Id verò haudquaquam prætereundum eſt, quod niſi quàmprimùm grumefcens, ſeu caſeatum lac curetur, aut inflammationem pariet, aut mammarum exulcerationem, præſertim ſi vitiatum lac fuerit. Qua de re vbi ipſum ab immodico calore caſeatum ſit, victus ratione ad frigidum inclinante inſtituta, eiſdem ferè medicamentis, præſertim circa initia vtendum erit; quæ in præcedenti cap. cõſcripſimus, Pauli, & Aëtij auctoritate. Priuatim autem deinceps (eodẽ Aëtio teſte) cõferunt furfures in aceto cocti cum ruta decocto ſuprà mammas impoſiti: idem facit mentha polentæ admixta, & iuglans cum ruta, ac melle, vt ipſe inquit. Cuminum item priuatim, vel cum polenta, & crocus cū lacte ac muria fomentum, & apium viride impoſitum (quod etiam grumos lactis diſſoluit) magnopere conducunt, vt apud eundem Aëtium legitur, cap. 35. lib. 16. Folia item ſolani, ſeu halicacabi cum braſſicæ foliis, ſi cõtundantur, pauca myrrha, ac croco adiectis, & exiguo aceto non minùs conducunt: ſimiliter ſi ex ſcæ-nigræci, ſeminis lini, & althææ decocto cū oleo violaceo, & exiguo aceto epithemata fiant: Proderit quoque ſi mentham contundas, & cum hordei, ac ſcæ-nigræci, althææ, & ſeminis lini farina, oleo roſaceo, ac paucò aceto permifceas, & ſuperimponas. At vbi in grumos cõuerſum lac fuerit, victus ratio ne vtendū extenuat eſt, ac ad calidum inclinante: ſi-
Paulus li. 3. cap. 35.
Aëtius lib. 16. cap. 34. & 35.
Prognofica.
Curatio caſei lactis.
Lib. 16. cap. 35.
*Lactis in grumos cõuerſi, cura-
tio.*
milibus quoque medicamentis, in quæ vſum lentes aqua marina, aut muria decoctæ, ſi eiſdẽ vtaris, quæ admodum præcedenti cap. dictum eſt; aut etiã cumini decocto cum modico croco, haud exiguum afferet vtilitatem. Paulus verò cap. 35. lib. 3. panẽ ex hydre-
Lib. 3. cap. 35.
Lib. 3. cap. 35.
Lib. 3. cap. 35.
leo, aut mulſo, aut cum perdicio herba viridi vti conſuluit: Similiter ſuperfuſione calētis olei dulcis, aut fori calidæ aquæ, vel decocto ſcæ-nigræci, althææ, ſeu apij mammillas fouere iuſſit: In talem itẽ vſum, chamæmelinum, ſcænumgræci, althæam, ac anethum eligas. Delinire verò mammillas conuenit (vt ipſe inquit) polline farinaceo cū ſemine lini, aut ſcæ-nigræci cum hydromelite, aut etiam ſefamo, quod

cum melle, aut butyro sit leuigatum. Poteris insuper tritici farinam cum fursure eisdem permiscere: oleis quoque amygdal. dulcium, chamæmelino, aut anethino mammillæ inungendæ sunt. Coagulum quoque leporinum, præsertim si cum pauco aceto, butyro, aut aliquo prædictorum oleorum illinatur, in grumos conuersum lac summopere dissoluit: nã & in ventre concretum lac curat, Galeno auctore lib. de med. paratu facilibus, in fine: potum cum vino coagulum, & cum aceto simili modo epotum, nedum lac, sed & sanguinem in ventre concretum dissoluit, vt patet decimo de simplic. medic. facult. Betæ item folia si tandiu oleo fuerint incocta, quoad intabuerint, cum pane, & fabarum farina, paucisque oleo sesamino, ac cera permista, & imposita conferunt.

Cap. de coagulo.

De mammarum inflammatione.

CAP. LIX.

Sicut ceteræ corporis partes, ita quoque vbera interdum inflammari solent, illud tamē præter reliquas peculiariter habent, quod nedū ex confluente ad ea sanguine, verum etiam ob lactis copiam, aut eiusdem casei instar coagulatione inflammatione affici cōsueverunt. Quibus inflammationis non admodum laborare oportet in tradendis signis, pro eiusdem affectus, ac partis affectu cognitione; nã facile ad sensum patebunt. Verum cum eiusdem inflammationis gemina causa esse poterit, sanguis inquam, aut coagulatum lac, prima causa, quouis tempore ipsam excitare valet, & propriis indicis promptè dignosci; reliqua verò nō nisi puerperis, aut vtero gerentibus, seu quibus menses detenti fuerint, præter naturam: vno etenim iam tritū dictorum modorum mulieres lac in mammillis habent, ac abundantius habent; interflungues autem id, tum ex præcedenti lactis abundantia, tum etiam ex eiusdem coagulatione. Ex quacūque verò causa mammillarum inflammatio fuerit excitata, non spernenda erit eius curatio: nam cum laxior, ac adenosæ earum substantia sit, nec multum obtineant innatū calidum, metus erit, ne in scirrhum tumorem, & demum in cancerosum vergat, aut ea suppurrata, ac ad abscessum progrediente, excedens vlcus consequatur. In curandi autem ratione, prius recta victus ratione instituta, obseruandū primò erit, vt si ex confluente sanguine, aut etiam ex lactis coagulatione, mensibus præter naturam detentis inflammatione fuerit excitata, sanguis mittatur, ex eiusdē lateris vena talis; potissimum si detenti menses fuerint, aut ex interna, vel media similiter eiusdē cubiti vena; & (si opus fuerit) nō semel dūtaxat, sed bis, & tertiū vena secanda erit. Insuper à venæ sectione, purgante medicamento vtare, eo tantū quod leniēdo purgat, velut manna, calisia fistula, saccharum violaceum; & interdum prædictis antidotum diacatholicon addere poteris. Post hæc ad ea, quæ reprimūt, seu repellunt medicamenta, nō tamen valida confugiendum. Tutius autem eis vtī poteris, si quæ digerēdi vim habent medicamenta, cum eis permisceas, in quæ vsum maxime cōuenit, si madefacti lintei ex aceto vini albi cum gelida aqua manimis imponantur, ac pluries iterentur: Aut paretur decoctum ex floribus chamæmeli, cui æqualis portio olei rosacei, & pauca quātitas aceti albi admisceatur, & similiter vtare. Vel ex æpe fucci solani, & olei rosacei

Partis affecta & affectus cognitio.

Causa.

Prognostica.

Curatio.

Venæ sectio.

Purgatio.

Topica qualia esse debeant.

singulorum vnc. ij. aqua, in qua scenigræci, florum chamæmeli, & seminis lini, ana drac. ij. fuerint decocta, vnc. iij. aceti, vnc. j. s. misceatur, & mammillis (modo iam dicto) imponere. Vbi verò inspereris prædicta medicamēta parū admodum conferre, potissimum transacto inflammationis initio, ad ea quæ magis digerunt, ac discutunt, progrediendum erit: quapropter hoc medicamento vtitor. Recipe florum chamæmeli, meliloti, scenigræci, althææ, seminis lini, & anethi, singulorum manip. j. ebulliant in iuste quantitatē aqua, deinde adde olei rosacei, & chamæmelini, aut anethini, vtriusque vncias ij. aceti albi vnc. j. & madefactis in eo spongiis, aut linteis linteis, mammis sapius imponantur. Ex farina item fabarum, scenigræci, & seminis lini, ac hordei, & pane contrito, in aqua decoctis cum oleo sesamino, & anethino, additis duobus vitellis ouorum, & croci, ac myrrhæ ana scrupul. j. emplastrum formari poterit, ac mammis superimponi. Vel ex radicibus, ac foliis althææ decoctis, seminis lini, ac scenigræci farina, cum oxymelite medicamentum paretur, ac vtitor. Sesamum quoque tritum, butyro admixto, moderatè tepefactum quotidie bis impositum commendauit Aëtius. Similiter si medullæ panis aqua madefacta, ac tritæ partes duas assumptis, & perdicij herbe trusæ partem vnam, ac cerati liquidi partem vnam, & dimidiam, simulque permisceas, & bis in die imponas, auctoritate eiusdem cōducet. Si verò discuti inflammatio haudquaquā valeat, prædictis medicamentis, ac reliquis similiter discutientibus sapius adhibitis: pro eiusdem suppuratione auxiliari conuenit, calida, ac humida temperatè medicamenta adhibens, quæ emplasticam quoque vim habeant; hæc nanque maturationi, ac suppurationi opitulantur, Galeno teste quinto de simplic. medic. facult. cap. 8. quo loco vberem eorum materiam reperies. Inflammatione autem in pus transmutata, ad eius disruptionem deueniendum erit, ferro, aut medicamentis acrioribus. Verum si ad duritiem inflammatio vergat, ea, quæ molliendi vim habent, adhibere conuenit, in quem vsum laudauit Aëtius cap. 38. libro 16. semen lini, aut scenigræci, aceto multo coctum, & impositum; aut sesamum illorum modicè tostum cum melle tritum, & calidum appositum: vel sterces caninum album terebinthina exceptum superimpositum. Cæterum si ex coagulato lacte inflammatio fuerit excitata, eiusdem circa initia vtendum medicamentis erit, quæ paulò ante, coagulato lacti conferre diximus. Verum si neque eis inflammatio cedat, ad ea, quæ modo commemorauimus, medicamenta progrediendum erit.

Lib. 16. cap. 37

Περί καρδιακῆς, ἢ καρδίας, καὶ καρδίας πάσης.

Id est, de cardiaco morbo, & cardialgia seu cordis dolore.

CAP. LX.

VMiam tempestiuitatem sit de ventriculi affectibus pertractare, non ab re fuerit ipsum primò in duas, easque maximas, ac præcipuas partes secare, quemadmodum mos est apud omnes medicos præsertim Galenum libro 5. & 6. de locis affectis, quarum vna, quæ superior est, gulæ quæ continua ex multis nervis sensificis est contexta: altera verò quæ huic continuatur, ad intestinorum vsque exortum extēditur. Vtraque autem earum in animalibus

5. de loc. aff. cap. 6. 6. de loc. aff. cap. 1.

animalibus proprio fungitur munere, ac pro vilitatis differētia, cum earum qualibet læditur, diuersa eis euenire consueverunt symptomata, quāquam interdum similibus quibusdam afficiantur affectibus. Cæterum proprium munus primæ partis (quæ os, seu ventriculi ostium nūcupant) est ciborum appetentia, quemadmodum reliquæ (quam eiusdem ventriculi spacium, seu cavitatem appellare solent) eorundem ciborum concoctio. Prioris itaque partem nos primò præter naturam affectus cōscribemus, deinceps autē & alterius, hoc est cavitatis eius, quæ primam partem Græci diuersimodè appellare solent, nam interdum *καρδιαν*, hoc est cor, propter symptomatum vehementiam, quæ inducere videtur familia eis, quæ proueniunt ex eo viscere, quod sua natura pulsatur, ac in thorace continetur, dum afficitur, & propriè cor appellatur, nominant, veteres præsertim, vt liquet quinto de locis affectis. 1. de causis symptomatum. 2. de Hippoc. & Plato. decretis, & commen. aphor. 17. & 65. quarti libri. Interim verò non *καρδιαν* sed *συναρξος* consuetio nomine, non vetustis dūtaxat Philosophis, seu medicis etiam nominatur, eodemmet Galeno teste præcitato primo libro de causis symptomatum. & 8. de compositione medicamentorum secundum locos. Quāquam *συναρξος* propriè eam partem quæ inter fauces, & os ventriculi media est, quam etiam veteres Græci vsq; ad Aristotelis seculum *συναρξος* nūcupabant, post eum appellare consueverunt, Latine autem gula dicitur, vt patet eodem 5. de locis affectis, nonnunquam tamen os ventris ita vocant, vt 13. method. medend. legitur, non solum medici, vt idem Galen. inquit 3. de loc. affect. verum etiam & homines vniuersi vulgò sic nominant, vt eodem 1. de causis sympt. liquet. Celsus verò per stomachum quandoque intellexit gulam, interim quoque ventriculi inferiorē partem sic nominat, vt videre licet apud eundem libro 4. cap. 1. verum quicquid sit de huius particule nomenclatura, quam nos ventriculi os, seu ostium appellauimus, nonnullis præter naturā affectibus conflitari ea solet, vt patet citato lib. 5. de loc. affe. innumeratq; & varia symptomata hominibus, vbi offensionem acceperit, inferre consuevit ex Tralliani sentētia ca. 5. libri septimi. At cum in ipso quidem oriatur affectus consentientibus ei quibusdam aliis partibus, præsertim principibus, corde videlicet, aut cerebro, corde siquidem propter exactam, quam habet sentiendi vim, eius cum corde vicinitatem, cerebro verò propter magnos, quos suscipit molles nervos per sextam coniugationem ab eodem cerebro ortam, ob quam etiam causam os ventriculi sensu acutissimo præditū est, ac deficientis alimēti præter cæteras quasque partes exactissimā sentiendi facultatem habet, ita vt nullum membrorum, aut ita exactum habeat sensum, aut ita vtrunque principium vnā secum afficiat, sicut os ventriculi, vt patet 1. de cau. sympt. quidam verò ipsi peculiare sunt, ac ad propriam eius rationem pertinent, vt eodem libro 1. de cau. sympt. & 5. de locis affect. scriptum est. Nos primis derelictis, ex quibus os ventriculi cum affectum sit aliarum particularum actionibus nocere consuevit (vt diximus) eos aggreddiemur eiusdem oris ventriculi præter naturam affectus, qui eidem proprii sunt, & peculiare, ab eoque nostram exordiemur orationem, quæ valde molestus esse videtur, adeo, vt cum augetur etiam propter eius (vt diximus) exactissimum quem habet

sensum, cor ad consensum trahatur, ac eidem noxam transmittere videatur, etsi tunc stomachicæ syncope fieri debeant, & non is affectus, de quo modo mentionem facimus, qui ab altera eius appellatione nomē sortitus est, vt liquet primo de causis symptomatum. cuius affectus adhuc apud Græcos treis diuersas reperio denominationes: nam interdum *καρδιαν*, interdum *καρδιωγμὸς*, quandoque *καρδιαν* dicitur: pro quo animaduertere dignum est, quod hæc tria nedum nomine discrepant (vt cuique patet) verum etiam & re ipsa, vt ostēdemus, (quamuis quidam aliter sentiant.) Nam *καρδιαν* nomen assumens) vt Galenus inquit 2. method. medend. à parte & affecta, & affectu ipso ex *καρδιαν* inquam tanquam parte, & *αλγία* tanquam affectu, cordis dolorem significat: verumtamen ne quis decipiatur, cordis cum dicimus, non illius cordis quod in thorace continetur subintelligi volumus, sed oris ventriculi, quemadmodum passim liquet ex Galeni doctrina, & potissimum in præcitatis locis, namque huius cordis, hoc est, oris ventriculi affectio est *καρδιαν*, vt ab eodem Galeno decretum est 2. de Hippoc. & Plato. decretis, & non alterius neque alterum omnem oris ventriculi dolorem *καρδιαν*, seu cordis dolorem appellamus (vt quibusdam falsò visum est) sed illum tantum (vt ipse inquit) qui fit, cum acrimonia humorū proritat, ac ipsum mordet, & proinde 5. de vsu partium *καρδιαν* esse dicebat, mordacitatem oris ventriculi. Accidit verò (vt eodem 2. de Hippocr. & Plato. decretis patet) affectio hæc nedum aegritudine vexatis, verum etiam iis, qui diutius paulò ieiunium tollerant, præsertim cum vehemēti exercitatione fatigati cibum nullum assumpserint, quemadmodum etiam & morsus hic in mœroribus sentitur, efficit nanque mœror veluti vehemētor exercitatio vt flaua bilis in ventriculum conflatur, à qua postea irritati, & morsus homines cordis dolore laborant. *καρδιωγμὸς* verò ex *καρδιαν*, & *ωγμὸς* compositum à Galeno com. aphor. 17. quarti libri, sic describitur: *καρδιωγμὸς* est morsus cordis, hoc est oris ventriculi, quare si hoc modo *καρδιωγμὸς* intelligatur, cum *καρδιαν* concidet: verum commento aphor. 65. eiusdem quarti libri quorundam auctoritate per *καρδιωγμὸν* non cordis, hoc est oris ventriculi dolorem intelligi asserit, sed motum quandam ipsius visceris, cordis inquam, palpitationi similem. Qua de re sic ipsum interpretando satis admodum à *καρδιαν* dissideret, cum non amplius oris ventriculi, sed ipsius cordis propriè affectus esset, etenim crebrum esse, & velocem cordis motum, & præcipuè palpitationi similem *καρδιωγμὸν* asserit. At *καρδιαν* Græcè, affectus seu morbus cardiacus Latine dictus ex Alexand. sententia ca. 11. lib. 7. & Celsi ca. 19. lib. 3. stomachi quoque vitium est, vt idem Trallianus fatetur quod quidem accidit, vbi humores parui erodentes, virilenti in ore ventriculi collecti fuerint, aut eò confluerint. Is autem affectus nihil aliud est (vt Celsus inquit) quàm nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languente immò dico sudore digeritur: lib. verò de definitionibus medicis scribitur, quod cardiacæ dispositio est innati caloris labefactio, & languor fit plerumque conflitante ore ventriculi, & stomacho cum sudorem immò dico vi. Verum quod os ventris primum fit quod in ipsis cardiacis afficiatur, per consensum tamen vehementer oblādens cor ipsum: propter vicinitatem

Concluditur
eorum
differentia.
cap. 7

Adversus
eos qui di-
ctos affe-
ctus non
dissidere
putant.
Contra eos,
qui cordis
esse affectus
putant.
Quod os ven-
triculi affi-
ciatur, si-
gna.
cap. 8

Quis affe-
ctus preter
naturam
sint.

ab Aetio scriptum est libro nono, ca. primo, non tamen adeo ut syncope oriatur. Ex his itaque constat hos tres affectus quamvis in parte affecta, ac causa quodammodo inter se communicent, tamen inter se ipsos nedum nomine, sed re ipsa quoque dissidere. Nam *καρδίαλγία* perpetuo affectus est oris ventriculi, cuiusque infestum est symptoma, & ad sensum tactus refertur, à succis mordentibus proveniens, ut patet primo de causis symptomatum, *καρδίαλγία* vero interim non oris ventriculi, sed eius visceris, quod in thorace continetur, affectum quandam apud quosdam (ut diximus) significat, qua iterum ratione à cardiaco morbo distat: qui etiam ipse perpetuo est oris ventriculi affectus, veluti paulò ante demonstravimus ex Aetij, Celsi, & Tralliani sententia. Verum enimvero morbus ipse cardiacus à *καρδίαλγία* maximopere dissidere videtur, nam cum acuta, & aestuosa febris evenit (ut Aetius testatur) ac nedum à mordentibus, & erodentibus succis ortum ducit, sed eis venenosis, seu virulentis existentibus, ut Tralliano visum est. Acciditque in eo nimia (ut dicemus) corporis imbecillitas, quod immodico sudore digeritur, qui sudor supra consuetudinem ex toto thorace, facie, ceruice, atque capite etiam prorumpit, glutinosus: extremis tantummodo partibus ficioribus, atque frigentibus (Aetio, & Celsi testibus) adeo ut propè in lyncopen incidant taliter affecti. At *καρδίαλγία* ex acrimonia duntaxat humorum proripiente, ac mordente os ventriculi, cum videlicet summe biliosi fuerint, & non ex eorum quoque venenositate, seu virulentia efficiatur, sentiunt quoque hunc ventriculi morsum (quæ *καρδίαλγία* appellamus) non tantum ægritudine vexari, verum etiam ijs, qui diutius paulo ieiunium tolerarint, præsertim si aliqua vehementi exercitatione fuerint fatigati, pariter etiâ & mœrore cōfecti (ut Galeno visum est) neque adeo immodico sudore digeruntur, aut imbecilliores sunt toto corpore cardialgici, velut cardiaci, fit etiam *καρδίαλγία* citra febrem, eamque acutum interdum, id quod nequaquam fieri potest in cardiaco morbo, ut diximus. Quatum igitur delirant, ac à Galeni doctrina, & à veritate recesserint qui *καρδίαλγία* cum cardiaco affectu confundi putarunt, ex iam dictis luce clarius liquet, sed toto (ut inquirunt) cœlo à veritate lapsi sunt, qui eandem affectiones non ori ventriculi, sed cordi tribuerunt, cum perpetuo in utriusque affectibus ventriculi ostium afficiatur (ut ostensum est ex Galeni, Aetij, & Tralliani sententia) similiter quoque dicendum & de *καρδίαλγία* iuxta Galeni decreta præcatis aphor. 17. & 65. quarti libri, quamvis interdum quidam velint (ut diximus) per *καρδίαλγία* cordis affectionem intelligere, de qua non est modo sermo faciendus. Quod verò os ventriculi in eis efficiatur, patere poterit ex nonnullis indicibus. Nam in *καρδίαλγία* angor quidam, ac dolor cum quodam morfu, ac rosione sentitur in inferioribus thoracis partibus propriè sub pectoris cartilagine (ut Gale. inquit eodem 2. lib. de Hippo. & Plat. decretis) quare ex dolore cum posito, os ventriculi affectum esse coniiciendum. Nec minùs, quinimò magis circa eundem locum dolor cum morfu & erosione sentitur in cardiaco morbo cum vehementius ventriculi afficiatur ostium, adeo ut accedat desperatio quædam, angor animi, & corporis iactatio (ut Aetius refert. Quod verò utriusque affectus symptomata sint maioris, minorisque duntaxat ratione

dissidentia in genere noxæ functionū animalium sentiri, ac propriè sensus tactus cuius patere poterit. Nā in dolorū genere continentur, cum utriusque affectus dolores sint cū erosione, & morfu, licet in cardiaco morbo maior sit offensio, nā lāguor, labefactatio, ac exolutio innati caloris, ac totius corporis sequitur, adeo ut quidā (Tralliano auctore) qui valde sensibile os ventriculi habet, statim intereant, cū immodicam humorum erosione sustinere nequeant: præter autem angorem, erosione, ac morsum, qui in *καρδίαλγία* sentiuntur in ore ventriculi, consuevit quibusdam bilis exactæ vomitus euenire, interim vero descendit idem humor, & ex alio summe biliosa egeruntur, ut testis est Galenus eodem 2. lib. de Hippo. & Plat. decretis. Quod autem febris non necessariò accidat in *καρδίαλγία* ostendit eiusdem Galeni verba eodem loco dum dixit, neque ægritudine vexatis tantum verum etiā ijs, qui diutius paulo ieiunium tolerarint, accidit, ut morfus hos ventriculi sentiat. At in cardiaco morbo præter id quod ipse cum acuta febre & maxime aestuosa euenit (ut Aetio, & Theodoro Prisciano visum est) pulsus aderit densus, & obscurus ijs qui eo morbo affliguntur, extremarum partium frigiditas, sudores circa faciem, & ad pectus usque glutinosi; inueniēque odorem corporis eorum terrestrem nares percellentem, & pulsus circa ipsum cor vehementiores, ac magnos. Accedunt ad hæc desperatio, angor animi, & corporis iactatio. Licebit autem protinus scire morbum cardiacum esse, (ut Celsus inquit) ubi venarū exigui, imbecillique pulsus sunt. Sudor autem supra consuetudinem, & modo, & tempore ex toto thorace, & ceruicibus, atque etiam capite prorumpit, pedibus tantummodo, & cruribus ficioribus atque frigentibus, ex his denique indicibus dignoscet cum *καρδίαλγία*, tum cardiacum morbum. Quæ vitia ambo consequuntur, nedum calidam oris ventriculi intemperiem, verum etiam & eiusdem erosione, ac morsum, quæ erosio solutio continui est, ut patet quarto de simplic. medica. faculta. Horum autem affectuum causa humor est acris & mordens quomodocumque in ore ventriculi contineatur, seu ad ipsum confluat, quamvis præter acrimoniam, & morsum, virulentus, seu venenosus, ac male qualitatis particeps sit oportet in cardiaco morbo (ut Tralliano visum est) & proinde non mirum si ex libricis etiam sursum ad os ventriculi ascendentes, ac eidem rosione, ac morsum inferentibus (ut idē Alexander inquit) possit interdum cardiacus oriri morbus. Verum ubi humores parui rodentes hunc excitent morbum, ex propriis indicibus redundantie talis succi, ætate, temperamento, anni tempore, victus ratione præcedente, ac reliquis promptè dignoscet, si verò ex lumbricis ad os ventriculi ascendentes exoriat cardiacus morbus, ex propriis lumbricorum indicibus illud percipies, simul cum victus ratione præcedente, ac aliis modo dictis, nec aliter percipies ubi ex inflammatione oritur, quàm ex propriis signis inflammationis, similiter si *καρδίαλγία* ex præcedenti ieiunio, cum vehementi aliqua exercitatione, aut ex mœrore immodico fuerit orta, non magno negotio ex ægri, aut astantium sermonibus id percipies. De *καρδίαλγία* autem; quantum ad prognosticum spectat scriptum reliquit Hippocrates aphor. 65. quarti libri. Quod si febricitantibus accidat malum est. Propterea quod ventriculi mordeturos, atque ob id malus est casus, ut inquit

Eorundem
signa.
Lib. 7. a. 11

cap. 8

Causa

cap. 1

Prognostic.

Inquit Galenus in comment. modo cordis morbum significet, quia etiam ratione & καρδιαλγία in febribus iudicanda est mala. Si verò sine febre, aut aliis minime ægritudine vexatis incidat, non adeò mala erit, neque periculosa. Ac cardiacus morbus cum in acuta febre & maxime æstuosa fiat, perpetuò periculum minatur, confirmat id eius causa, cum à rodentibus, ac venenosis succis fiat, seu ab alicuius visceris inflammatione, adeò ut quidam os ventriculi valde sensibile habentes, cum immodicam humorum erosionem sustinere nequeant, statim ex eo intereant (ut Alexander inquit.) Nec minus periculosus erit cardiacus morbus à lumbricis ascendentibus ad ipsum os ventriculi ortus, nam hæc bestia (ut ipse refert Alexander) adeò repentinam mortem, syncope non minus quàm perniciosi humores inferunt, ut nonnulli statim cum à lumbricis roduntur, intereant. Hæc autem passio (ut Theodorus Priscianus ait libro secundo ad Thimotheum capite 12.) frequentius iuuenibus, quàm cæteris ætatibus euenire consuevit, in augmento ægritudinis, hoc est circa diem sextum, & quàm maxime eo tempore, quo æstas calidior incanduerit. Quantum verò ad curationem spectat, cum prædicti affectus ratione maioris, minorisque (ut diximus) differant, propterea nos communem eorum tum victus, tum medicamentorum rationem instituemus, qua de re aer frigidus eligi debet, ita ut solem domus, in qua decumbit æger, non admittat, sitque minime alta, sed depressior, nec valde lucida, fenestris, tamen patetibus sit, ut perflatus quoque aliquis accedat, ut Aetio, ac Celso visum est, leuique veste, ac molli, & vlu priora detrita contegantur ægri, potissimum in cardiacæ morbo pauimentumque irroretur, ac foliis cõsternatur myrti, in quercus maxime verò vitis, atque ipsi etiam rosis. Somnus eis competit moderatus, vigilæ tamen immodicæ vitandæ sunt, quies præcipienda est, ita ut omnis ferè motus quamuis exiguus interdicatur. Alius ut sit lenis inagnopere conserit, quare si non natura, arte saltem cum glandibus, aut clysteribus lenibus sic seruanda erit. Immodici animi affectus vitandi sunt præsertim mœror, quoniam hic ex se ipso cardiacam excitat, ut potius ex Galeni mente diximus. Cibus autem esse debet ex infirmissima materia, & stomacho aptus (ut Celso visum est.) Ut verò Alexander inquit, præter quam quod refrigeret, etiam particulam resolutam possit cõfirmare, nõ multus quidem, sed sæpe tamè nocte, ac die dandus est, ut nutriat neque oneret. Qua de re panis ex aqua frigida, aut ex vino albo, & tenui, frigidiorque, ac diluto tribuendus est, ex Aetij testimonio, interim verò paulatim ipsis offerri debent quæ ægrè concoquantur, & noxiorum humorum rofioni, ac acrimoniæ resistunt, veluti sunt vetriculi anserum, pedes suilli, & ex volucribus macræ & non foetidae, in pitisanæ decoctione eliquatæ aut etiam per se, quæ etiam frigida exhibentur, si caloris sensus circa stomachum sit, & æger inflammatione non vexetur, aliis calida exhibenda sunt) ut idem Aetius inquit. Atqui probè refrigerant, corroborantque tum mali punici grana comesta, tum succus eorum, ad hæc mala non admodum dulcia, sed mediocriter adstringentia, pira persica, & vuæ, quæ austerum frigidumque succum obtinent. Conueniunt insuper lactuca cum aceto, pulli gallinacei, perdices, phasiani, turdi, merulæ, ac reliquæ aues montanæ cum omphacio, ver mali medici, seu li-

moncelij acido conditi. Hippoc. verò libro 2. de morbis vulgaribus mulieri cui os ventriculi dolebat, & nihil remittebat dolor, polentæ pollinem in mali punici succo inspersum semel in die in cibo tribuens ipsam curauit, & non renouebat, ut ipse inquit. Potus sit aqua hordei, aut seminum coriandrorum præparatorum decoctum, seu aqua, in qua exigua cinnamomi quantitas fuerit decocta, & nisi necesse sit, ad vinum festinare non oportet, ut inquit Celsus. Si autem verendum sit ne deficiat æger, vinum tenue, album, dilutum tribuendum est, frigidum ubi æger inflammatione non vexetur, & immodici caloris sensus circa stomachum sit, aliis verò calidus potus tribuendus erit. Quod si stomachus resolutus parum continet, & ante cibum, & post eum, sponte vomere oportet, rursusque post vomitum cibum sumat, Celso auctore. Si vero (ut inquit Aetius) stercora intestino recto subsideant, neque aliàs etiam excrementorum multitudo in intestinis, ægri autem cibum non sentiant, & tabescant, pitisanæ succum, aut alicæ, per clysterem infundere oportet tepidum, conuulsato cum eo ouo crudo. Ultra hoc enim quod ea quæ stomachum infernè molestia afficiunt, euocat, & educit, etiam alimentum optime corpori sufficit, ex languore ob non acceptum cibum viscere affecto, siquidem id quoque (ut Celsus inquit) vires tuetur, hoc item potu vrantur, qui reliquos cibos continere non valent. Excipiantur micæ panis mediocriter torrefactæ, macerentur in vino austero, tenui, & albo, & demum fortiter exprimantur, & ex eodem vino singulis tribus, vel quatuor horis exhibeantur vnc. iij. vel iijj. donec pulsus robustior fiat, sitque vinum frigidum, ubi immodicus fuerit circa stomachum calor sensus, & inflammatio non adfit. Aliis verò tribuatur dilutum & calidum, sedque potissimum cardiacis, confestim vero circa initia proritandus vomitus erit, leuioribus quibusdam ut egelida aqua cum paucis aceto, acetoso syrupo, aut oxysaccharo, præsertim iis, qui natura ad vomitum proni sunt. Quod si mordaces succi in ventriculi ore contenti vomitu excerni nequeant, per inferiorem aluum protinus purgandi sunt eo medicamento, quod cum hoc quod vim habeat prædictos expurgandi succos, etiam ventriculum ipsum roboret, nec admodum calidum sit. Qua de re tamarindorum excipiens vnc. j. factoque ex eis decocto in fontana aqua, in ipso dissoluens mellis aerij vnc. iij. rhab. infus. in vnc. ij. succi rosarum drachij. vel scrup. iij. spica grana iij. vel iijj. pro potu tribuas, vel loco mellis aerij tantundem syrup. ex pluribus infus. rosarubearum, vel vnc. iijj. permisceas, post hæc ea quæ os ventriculi roborare valent intus, & extra adhibenda sunt, intus siquidem syri. ex oxysaccharo, ex infusione, vel succo rosarum, aut ex malis punicis, seu depomis, vel de acido mali medici: extra verò auxiliantur (ut inquit Aetius) folia rubi cum pane, aut myrti folia, ipsæque myrti bacca, aut pampini vitis, aut plantago cum pane, aut mala cotonea, & palmæ stomacho, ac sinistra mammæ impositæ, ut ipse inquit. At imbecillioribus sufficiat polentam cum palmis imponere: aut palmas in vino madefactas excipe, & adiectis aloë, & mastiche simul teres, deinde affusa cera & oleo rosaceo, seu melino simul misce, & vtere eodem modo. Quod si ex palmiscenathe, acacia, rosis, alumine, hypocistide, & rhoëcataplasma conficias, atque imponas, ut sinistra

Curatio.

Victus ratio.

Alex. lib. 7
cap. 12.

Purgatio.

Topici.

mammam, & ventrem ipsum complectatur. sudores reprimat (vt idem inquit Aetius) stomachumque & cor ipsum firmitatis auctorem placat, & cohibet. Exsudantibus verò partibus, sudorem prohibere oportet, id autem præstat oleum acerbum, vel rosaceum (vt inquit Celsus) vel melinum, aut myrteum, quorum aliquo corpus leuiter perungendum est, vel myrtus trita sicca inspergatur (ex Aetij decreto) vel cenanthe, aut hordeum in primis quidem collo, & thoraci, & locis sub alis, ac inguinibus ea sunt adhibenda. Eodem modo auxiliatur malicorium cum manna inspersum, aut galla per se. Illinuntur etiam ad coercendos sudores (vt idem auctor inquit) oleum myrteum, cenanthinum, rosaceum, melinum, & lentissimum: circumlita etiam sudores cohibent manna, & amyllum candido oui excepta. Extremæ verò corporis partes refrigeratæ concalescendæ sunt cum multa frictione ipsarum partium, linteisque calidis adhibitis, aut aliis calefactibus. Quod si ex visceribus quoddam inflammatum sit, & propterea cardialgia, aut cardiacus morbus fiat, eadem inflammatio curanda erit. Si ex ascendentibus lumbricis, ea medicamenta tribuenda erunt, quæ ipsos tum interficere, tum etiam e corpore expellere valeant, expelles autem, si prius enecaueris, necabis

cap. 19 autem amaris medicamentis, vt Galenus inquit 14. method. medend. & nos infra docebimus. Si verò cardialgia iis, qui diutius paulò ieiunium tollarunt, accidat, iis consulendum est, vt non tardè, sed citius cibum capiant, vitentque ieiunium. Similiter si ex mœrore flaua bilis in ventriculum confluat, aut ex vehementiori exercitatione, vitandi & mœror, & vehementior exercitatio erunt. Cunctis verò varia odoramenta offerri debent, præsertim rosæ, & vinum (vt Celsus visum est) aut aquæ rosacæ, & myrtillorum excipe vnc. iij. vini odoriferi vnc. ij. fantalorum drac. ij. & fiat odoramentum.

Odoramentum.

Πνεξι νυνιάς τος ἀπεξέτος.

Id est, De canina appetentia.

CAP. LXI.



VERMADMODVM stirpibus, vt pote terræ affixis terram, sic quoque hominibus, cæterisque animantibus natura pro nutrimenti veluti penu, ventrem fabricauit, vt liquet apud Hippoc. libro de humoribus, & apud Galenum lib. 1. de causis sympt. Tribuit autem animalibus ipsis & penuriæ sensum, quo scilicet ad cibū potionemque proritata tempore expleantur, vocaturque huiusmodi implendi desiderium appetentia, quæ ex penuriæ quidem sensu fit, cum secundum naturam existit, quando scilicet venæ ex ipso ventriculo veluti emulgentes, sugentesque aliquid trahunt, non ferens autem eum suctum ventriculis, sed veluti diuulsus offensæ eius medelam cibum comparat. Verum suctus quidem ipsius sensus, fames est: actiue suctiōnem naturalis omnium partium appetentia præcedit, tamen ea naturale quidem opus est, non animale, vt quæ modo dicta est. Talem autem appetentiam vacuatio præcedit. Quæ de re necessum est ex Galeni decreto præcitato loco, ad hoc, vt secundum naturam excitetur hæc animalis appetentia, quatuor ordine quodam symptomata sece deinceps sequentia præcedat. Primum namque omnium totius corporis inanitio est, seu vacuatio secundum

Quatuor accidentia ordine quodam sece deinceps sequentia, quæ ventriculi appetentiam præcedunt, secundum naturam appetit.

naturalis euacuatarū partiū appetentia, tertium ventriculi suctus, quartum ipsius suctus sensus. Quintum verò iam dicta ventriculi animalis appetentia. Verum cum præter naturam sit appetentia hæc animalis, vitiosaque redditur, propterea quod in quantitate modum excedit, à quibusdam (vt Galenus testatur tum præcitato primo de causis symptomatum, tum commento aphorif. 21. secundi libri.) *νυνιάς τος ἀπεξέτος* Græcè, dicitur Latine canina appetentia, non ab re sic nuncupata, quoniam in hac affectione ægri vomunt pituitam, & cibum cum assument, retinere nequeunt, ac post vomitum statim alium appetunt, quemadmodum canes (vt Alexandro visum est cap. 5. libri septimi.) In his enim qui canina vocata appetentia vexantur (vt inquit Galenus 6. de locis, cap. 2.) videmus quod affatim impleti paulò post aut euomunt, aut fluore deiciunt. Nam non potens ipse ventriculus deuoratorum pondus sustinere, multa impetuosè ingerere, atque ea celeriter excernere cogitur. Id quod etiam & animalibus quibusdam integra valetudine degentibus accidere solet (vt ipse inquit) in quibusdam scilicet auiculis, quas selucidas in Asia vocant, quippe quæ iugiter locustas edunt, easque celeriter excernunt. Estque (vt eodem Galeno placuit præcitato commento aphorif. 21. libri secundi.) vehemens & infedabilis ciborum appetentia: quam non necesse est, vt quatuor iam dicta symptomata naturalia ordine præcedant, vt dicemus: sed affectio quædam præter naturam est ipsius oris ventriculi, vt liquet tum 1. de causis symptoma. ca. 7. tum etiam 5. de locis affectis, ca. 6. Nam eius proprium munus est ipsa animalis appetentia, cuius gratia ad ipsum par neruorum, haud mediocre à cerebro, ex sexta scilicet eius coniugatione defertur, & disseminatur, & ob eam causam pars hæc ventriculi sensu acutissimo prædita est, vt liquet tum quarto, tum nono de vfu partium, & licet hoc neruorum par in alias etiam ventriculi partes vsque ad fundum ipsius protendatur, tamen quia maxima sui parte os ventriculi contextit, minor verò in alias partes vsque ad fundum disseminatur, propterea non toti ventriculo sensus alimenti deficientis, ad quem sequitur animalis appetentia, (quamuis prædictis neruis participet) donata est facultas hæc, sed ipsi ori dūtaxat, vt pote quod exactioris, ac acutioris sensus existit, cum maiorem prædictorum neruorum participet portionem. Pari ratione nec læsio prædictæ appetentiæ animalis quomodocunque fuerit, toti ventriculo tribuenda erit, sed potissimum eius primæ parti, quæ est circa os, nam quamuis similibus dispositionibus, quales sunt illæ, quæ in ore ventriculi fiunt, interdum afficiatur ventriculi spaciū, atque similia quoque ei adueniant symptomata, quoniam longè maiorem inferūt violentiam ea, quæ in ipsius ore contingunt (vt Galenus testatur quinto de locis affectis, ca. sexto.) Idcirco medici ea quæ in parte ventriculi inferiori eueniunt, perinde, ac si omnino non fiant, & despiciere, & contemnere solent. Non ab re itaque in ipsa canina appetentia instrumentum appetentiæ læsum esse, hoc est os ventriculi cum Galeno quinto de locis affectis, cap. sexto decernimus; & quamuis exigua quædam non magnopere modum excedens reliquis ventriculi partibus affectis gigni possit, eam tamen perinde, ac si omnino non fieret, despiciamus, ac contemnimus. Neque alio indicio indigemus pro notitia iam dictæ partis affectæ,

Loco citat.

Canina appetentia nuncupatur.

Quid sit.

Quæ pars in ea afficitur.

4. de vfu par. cap. 7. 9. de vfu par. cap. 11.

Quid affe-
ctus preter
naturā sit.

Signa.

Causa.

Causarum
cognitio.

Ale. lib. 7.
cap. 5.

affectedæ, oris inquam ventriculi, cum ex eius propria facultatis oblatione iam pateat. Ipsa verò affectio symptoma est in genere noxæ functionum animalium, atque ipsius sensus tactus, nanque offensus ventriculus ipse, & veluti diuulsus ab aliqua causa præternaturali, non ferens talem diuulsionem, quæ per immodicam suctionem fit, ad iam dictam excitatur vitiosam appetentiam in quantitate modum excedentem, & propterea vitiosa dicitur, & ipsa functio deprauata est, non diminuta, nec ablata. In hac affectione ægri plures cibos appetunt, & cum appetitum cohibere nequeant (vt inquit Aetius ca. 21. lib. 9.) in ingerendis nimis cibis modum excedunt, deinde multitudine eorum aggrauati, & absumptos citra nouementum ferre non potentes ad vomitum diuertunt, deinde rursus cibo se explentes iterum ad vomitum reuertuntur, quemadmodum canes. Hæc autem immodicum implendi desiderium naturalis affectus similitudine ex morfu oris ventriculi consimili existente suctu naturaliter effecto, perpetuò generationem habet, & propterea ex tactorio genere symptoma est, veluti quodlibet aliud, quod circa os ventris contingit, vel liquet primo, de causis symptomatum, cap. 7. Verum hic morfus non ex vnicâ duntaxat causa proritaturnam quandoque propter solam intemperam oris ventriculi frigidioris existentem fit, interim verò propter humores acidos vitiosos, ac frigidos, quos exorbuir os ventriculi, vt patet apud Galenum commento præcitati aphor. 21. secundi libri. At si ex frigida intemperie fiat, ægestiones multæ ex ipsorum ventribus procedent, crudis existentibus nimirum cibis, aut semicoctis. Si verò adfuerint acidi quoque succi, aderunt simul cum his acidi quoque ructus, nec mirum si frigida intemperies, frigidique vitiosi succi in ore ventriculi redundantes propter frigus, alimenti, & non potus desiderium excitent. Nam frigiditas tunica ipsius ventriculi cum vacuat, tum etiam cogendo, ac confringendo ad maiorem appetentiam irritat, vt Galenus inquit primo de causis sympto. cap. 7. Qua ratione fit, vt non parum ad esuriem frigiditas eorum quæ in ventre habentur, conferat, etsi libro primo de causis sympto. ca. 7. frigida duntaxat intemperiei non meminerit, velut commento aphor. 21. 2. libri. voluit tamen eam contineri sub frigidis succis, nanque ipsi non alio modo, quam propter frigus caninam excitant appetentiam, vt ipse inquit, poterit insuper & morfus hic similis suctui ex immodica totius corporis digestionem, ac vacuatione cum inops reddatur, alimenti originem trahere, ita vt altera sit ex Galeni sententia causa caninæ appetentiæ, verum hæc immodica vacuatio duplicem habere poterit causam, quia aut ex caloris robore, vel ex retentricis facultatis imbecillitate fieri potest, vt ipse inquit eodem libro primo de causis sympto. cap. 7. Interstinguas autem si à caloris robore fiat euacuatio, & per consequens caninæ appetentia, quoniam (vt inquit Alexander) neque siti carent ægri, neque acidum humorem vomunt, veluti supradicti, nam immoderata caliditas tale quid accidere non permittit, vt quæ omnia facile in vaporem dissoluat, & latenti perspiratu extenuet, atque digerat, vnde etiam pus his magis adstricta est, quam citata, imò ventris ægestiones longè pauciores procedunt, quam pro eorum quæ ingerantur, modo, ac proportionem, & stercorea quæ egerintur ægri, existunt sicciora (au-

ctore Aetio ca. 22. præcitati libri) verum iis qui ob retentricis in viuifico corpore facultatis infirmitatem laborant (vt idem inquit Alexander) cibi minime cocti, & subinde alterationem non experti excernuntur: quare etiam tales continuis illorum corruptionibus laborant. Breuibis autem verbis sic has duas causas interstinguere docebat Galenus primo de causis symptomatum, ca. septimo, quoniā in hac plurima sumptorum incidit deiectio, alia verò ceu conflata ex totius habitus vacuatione alimentum in corpus deduci: quapropter longè pauciores aderunt ventris ægestiones: Hippocrat. verò, & Galenus in præcitato aphorismo 21. secundi libri hanc causam, scilicet totius corporis vacuationem, non tetigerunt. Nam de ea duntaxat mentionem fecerunt, quæ vini potione curatur, à qua insuper causa potissimum affectus hic constituitur, vt Paulo visum est cap. 51. libro secundo, ex hoc autem affectu aliquando & ad vomendi consuetudinem delabuntur, (vt inquit Aetius) sæpe etiam & aliis affectionibus obnoxij fiunt, celiacis videlicet, & dysentericis, atque aquæ intercutem. Propterea quod priusquam priores cibi sint concocti alios ingerant. Quidam etiam volunt quod vbi diu perdurauerit canina appetentia, quandoque permutatur in *βολιμια*, interim in soporem, & interdum ad mortem. Ea verò canina appetentia, quæ ex immodica dissipatione ortum ducit, si priusquam ad summum peruenerit, eam cognoueris (vt Galenus testatur sexto, de locis affectis ca. 2.) non difficile curabitur. Nam vbi quis duplum consuetorum alimentorum assumpserit, neque corpus ali videatur, idque citra alui fluorem, hunc affectum non solum priuati, verum & medici paruipendunt. Cum verò tripulum ingerit idoneis auxiliis liberari potest, priusquam scilicet ad quadruplum, vel ad quintuplum perueniat. Qua de re non omnino paruifacienda erit affectio hæc, sed mox pro eius curatione si ex frigida intemperie, aut frigidis succis excitetur, aer eligatur ad calidum, & siccum inclinans. Vitæ autem sunt vigilie immodicæ, ac somnus omni conatu, allicientus erit. Exercitium moderatum confert, prius tamen alui excrementa natura, vel arte ducantur. Inter animi affectus vitandi potissimum sunt timor, & mæstitia. Quod verò ad cibum, & potum attinet, inquit Galenus præcitato 21. secundi libri, quod qui famem caninam patiuntur, iis vini potus, non cibi multitudo remedium est, & subdit, equidem multos ipse sanauit, qui indefinenter famefcebant, vinum ipsis abundanter exhibens, ex eorum genere quæ multum calefaciunt, quæ colorem flauum habent, vel rubrum absque adstrictione; siquidem oportet cum ad prandium accedunt, primum illis afferre pinguiusculia, atque (vt ita dixerim) oleagina, & quæcunque alia ex multo parantur oleo. Postea vero vnum aliquod ex vinis quæ diximus etiam si nondum sitiant, ad potandum dare oportet, statim enim sedatur ipsis fames, & talem longo tempore victum exhibendo, cessat omnino hæc Gale. Alexand. verò ferè eadem afferens dixit vtendum esse calidioribus, præsertim vino mero, cibis pinguibus, & omnibus oleosis, ac carnibus suillis, hæc enim comesta (vt ipse inquit) prius exfaturant ipsos, & immodicam eorum appetentiam obrundunt, vt in posterum copiosiorum cibum nolint assumere. Potum etiam (vt inquit Aetius) præbeamus ante cibum, multum, ac acriter bibendum calidum sanè, aut certe tepidiorum.

Aet. lib. 9.
cap. 21.
Prognostics

Curatio.

Viculus rati-
tio.

rem. Item forbitiones appetitum destruentes exhibendæ erunt, veluti sunt pulces cum melle multo, & oleo plurimo, aut adipe asferino, gallinaceo, aut suillo. cerebella item, & pinguiore volucrum partes, ac piscium, eodem modo, & ex oleribus, malua, conueniunt & omnino quæ appetitum auerunt, ac satietatem inducunt, & magno cumulo accepta modicè alunt. Admiscere etiam conuenit panibus (dum fermentantur) acriora, & vrinam cientia: similiter & vino quod in potu sumunt, vt idem inquit Aetius, veluti est cuminum, anisum, petroselinum, & quæ eius generis existunt. Ad vinum etiam, & piper, & mel, & spica nardi ultra ea, quæ dicta sunt, adiciantur. Abstinere verò oportet ab omnibus acidis, ac adstringentibus cibis, & potibus, maximè verò à functibus. Eorum autem bellaria sint pistachia, amygdalæ, nuce pineæ, colymbades etiam oliuæ ex melle exhibendæ sunt, etsi neque his cedat affectio, ea quæ dissecare, ac repurgare, calefacereque possunt in cibis quoque; annectemus, veluti sunt allia, porrum, thymus, satureia, origanum, pulegium, & quæ his familia existunt, pariter & oxymel simplex, aut scillinum, aut ipsimum rosaceum mel cum aliquo ex iam dictis decocto præbeamus, & ubi cognouerimus quod humores pituitosi, & acidi in ipso ventris ore fuerint impacti, ac veluti aqua in spongiam imbibiti, eos quoque purgabimus ex hiera. Nanque hæc non tantum calefacere potest, vt inquit Aetius, sed dissecare, ac repurgare, extrahere ex profundo oris ventris imbibitum humorem, & per alium infernè euacuare: quin & robur ventri addit, vt ne faciliè nocium humorem suscipiat. Poteris autem drach. ij. exhibere etiam vino cum aqua calida, diluto, vel drachm. j. & s. eiusdem excipiens & scrupul. ij. trochiscati agarici. Ad dens, catapotia formato, ac præbeto nedum semel, sed bis, & ter, ubi opus ferit. Si verò ex immodica totius corporis dissipatione canina appetentia excitetur, abstinendum erit à continenti calido, ac vini potu, & ab omnibus, quæ tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt, Aetio teste. Qua de re aer frigidus eligatur, quies iniungatur, somnūque mediocri, omninoque immodicæ vigiliæ vitentur. Et si ex immodico calore dissipatio fiat, clysteris vten- dum est lenibus, caueantque ægri ab immodicis animi affectibus, præsertim ira. Cibi eis exhibendi sunt stabiles, & ægrè corruptibiles. Vinum (vt diximus) omnino ipsis dandum non est, sed aquæ potu vtantur, vel seminum coriandrorum preparatorum decocto. Cutem ipsorum cōdensare, ac spissiore reddere oportet cum oleo quopiam adstringendi, vt pote omphacino, myrtheo, aut rosaceo, interim eis admixto alumine scisso in aceto acerrimo prius trito. Conferunt item & lauacra frigida, si nihil id fieri prohibeat. A balneis verò calidis abstineant, illinire quoque conuenit eorum cutem ex infra- scripto, Quod R. succi plantaginis, & semperuiui ana vnc. s. santalorum rubeorum, sanguinis draconis, & boli armeniaci, sing. drac. iij. olei myrtini, citoniorū, & rosacei omphacini ana vnc. j. farinæ hordei drac. iij. ouorum albuminis vnc. s. aceti parum, & ceræ quantum sufficiens sit, fiat vnguentum.

Περί τῆς πικρίας. Id est de cirra, siue pica.

CAP. LXII.

Accidit nonnunquam nedum mulieribus vtero gerētibus, verum etiam & viris deprauata quædam appetentia, non quidem

in quantitate modum excedens, sed in qualitate: prauas etenim qualitates appetunt (Galeno auctore libro primo de Causis sympto. ca. 7. & Aetio. lib. 9. cap. 23.) quæ affectio à Græcis *πικρία* & *μαλακία* dicitur, à Latinis pica, quæ secundum quosdam à pica auicula nomen accepit, secundum alios ab hedera similitudine, quæ *πικρία* Græcis vocatur, nam sicuti illa variis plantis (prout occurrunt) se implicare solet, ita mulieres ex pica laborantes varia edulia appetunt, atque ea contraria, quæ tum voluptatem, tum insauitatem gustanti exhibent (eodem Aetio teste ca. 10. lib. 16.) Est autem affectio hæc (vt idem auctor asserit) stomachi languor cum nausea, & auersione ciborum, bilis, ac pituitæ vomitum inducens, vel vt testatur cap. 23. libro 9. Concupiscentia quedam est vitiosarum qualitatem ciborum. Nam acida, & acerba interdum, nonnunquam acria quoque, interim verò vel cimoliam terram, vel testas, vel extinctos carbones, aut alios huiusmodi cibos absurdos appetunt, vt Gale. inquit eodem primo de causis symptoma. ca. 7. Quod verò in hac affectione ventriculi ostium cōstictetur ab eodem Galeno liquet præcitato loco, & 5. de locis affectis cap. 6. patet, insuper & eius propria functionis offensa, quæ appetentia est. Quod autem symptoma sit, ac noxa eiusdem appetentia, quæ deprauata est, in qualitate tamen & non in quantitate, velut canina appetentia excidens, liquet ex eodem Galeno, præcitato lib. 1. de causis sym. ca. 7. Aberrat enim facultas hæc appetendi, cum nō cibos, quinimo prauas appetat qualitates, vt pote (vt diximus) acida, acerba, acria, cimoliam terram; vel testas, seu extinctos carbones, aut alios huiusmodi absurdos cibos. Apparent etiam taliter affectis assidua expuitiones, oris ventris morfus, ac anxietates. Insequitur autem prauam eiusdem oris ventriculi intemperiem, cum eius tunicæ prauo aliquo excremento fuerint imbutæ, quo fit, vt mulierculis vitioso humore repletis euenire soleat affectio hæc, maximè cum vterum fuerunt. Pro varietate autem vitiosi humoris prædicta varia, ac peregrina edulia appetunt, & propterea alio signo non indigent pro eorum dignotione, quanquam etiam & per vomitum iidem manifestati cōsueuerint. Assolet affectio hæc (Aetio auctore) vtero gerentibus fieri ferè circa quadragesimum diem à concertu, & sæpe vsque ad quartum mensem durat. At Galenus complures, ait, vtero gerentes huiusmodi vitio laborant vsque ad secundum, ac tertium mensem, in quarto verò quiescunt, partim quod vomitione vitari humore expurgantur, partim quod concoquuntur, vt pote exiguum cibi tum sumente muliere ob fastidium, partim etiam quod multitudo vacuatione sit diminuta, quippe primis duobus mēibus fecutus paucum ad se sanguinem attrahit, eò quod parum adhuc auctus sit. Vbi verò iam creuit, tunc plurimo indiget alimento, atque tunc non id, quod optimum est è venis allicit, verum, etiam quia maiorem alimenti copiam requirit, aliquid vitiosum simul attrahit, & ita fit, vt vniuersum corpus plenum esse desinat, & minori humorum vitio crucietur. Idem quoque affectus nonnunquam & viris ipsis accidit, cum humor quispian vitiat, ad os ventris fuerit delapsus, vt diximus, qui neque despicendus est. Pro curatione autem affectionis huius victus ratio prius instituenda erit diuersa pro varietate vitiosi, & prauis redundantis humoris. Verum cunctis commune est, vt cibis vtantur moderatis, qui neque faci

Pica vnde dicta sit.

Quid ea sit.

Quæ pars in ea afficiatur.

Quis affectus præter naturam sit pica. Pica signa causa.

Prognostica.

Curatio. Vnde etiam.

facile corrumpantur. Quapropter panis succo coto-
neorum, aut malorum puniceorum maceratur con-
fert, similiter cichorium. Ex auius deligenda sunt,
quæ neque pingues, neque virosæ sint. Conueniunt
item pedes, ac rostra, & ventriculi porcorum, & eri-
nacei marini recentes. Sint tamen omnia (vt dixi-
mus) quâtitate moderata, & si cibos auferantur, ob-
soniorum varietate, ac iucunditate illectentur. Ab-
stineant tamen à dulcibus obsoniis, verum iis, qui
terram appetunt nihil ita prodest veluti amyllum re-
cens. Cunctis verò confert ante cibum oliuas albas,
muria conditas cum pane molli exhibere, aut quin-
que, vel septem amygdalas amaras. Post cibum au-
tem vix passæ, mala punica, ac pyra exhibeantur.
Sit etiam potus moderatus, ne alimenta ventriculo
innascent, ac vinum fulvum, odoratum, antiquum, &
subadstringens bibant. Quod si vinum auferantur,
aquam ex cinnamomi decocto potabunt. Si verò
stomachus ab acris, acidis, aut aceto si syrupi, & si
crassius fuerit quod euomunt, & ob viscositatem
difficiliter excernatur, raphani etiam decoctum cū
aceto multo exhibebimus. Nam omni studio co-
mandum est, vt infestus humor citra molestiam per
vomitum educatur, præsertim ipsis vtero gerenti-
bus, quibus in hoc casu purgans medicamentum ex-
hibendum non est, vtpote cum affectus hic in pri-
mis mensibus oritur. In quibus omnino vitauit
Hippocrates aphor. primo quarti libri, purgantia
medicamenta exhibere, ea præsertim, quæ huic affec-
tioni commoda essent. Verum vitis ipsis si acci-
dat hæc affectio, & per vomitum sedari nequeat, pur-
gans medicamentum exhibebis, prius tamen qui-
busdam syrupis adhibitis pro ratione redundantia
prauis succis, veluti est syrupus ex oxyfaccaro aceto-
sus, oxymel simplex, atque ipsum scillinum, si opus
fuerit. Sit autem purgans medicamentum ex picra
Galeni compositum, atque ipso rhabbarbaro, seu a-
garico prout redudans prauus succus requirit. Eua-
cuatio autem plurimo vitioso humore exhibendus
est eis, (vt inquit Aëtius præcitato cap. 23. libro no-
no.) mali punici dulcis succus, mentha sicca insper-
sa item portulacæ cremor, & ipsa quoque in cibo sum-
pta confert, polygoni decoctum potum, similiter et-
iam anethi, & rhapontici, ac spicæ nardi cremor,
item intybi succus, vel ipsa herba cruda, aut cocta
alsidue comesta: forinsecus autem adhibita langui-
do stomacho conferunt (vt idem Aëtius asserit, cap.
decimo, libro 16.) cenanthe, balauftium, rosæ, cymini
myrtus, silyrii coma, sceniculi semen cum vino ca-
taplasmatas modo adhibita, addita etiam galla, aut
cumino, aut absinthio, palmularum item carnes vi-
no coctas, aut maceratas, tritas pro emplastro im-
ponere prodest, aut mala cotonea cum posca trita, ro-
faceo, vel nardino cerato excepta, addito croco, aut
lanam succidam, vel lintheolum vino, & oleo, aut a-
ceto & oleo, vel rosaceo & aceto, aut nardino & vi-
no inbuito, & stomacho adhibeto, morsus enim (vt
ipse inquit) stomachi puncturas mitigant.

Item, βέλμους. Id est de bulmo, seu ingenti esuritione.

CAPVT LXIII.



V M ventriculi ostium indigentia, simul
ac refrigeratione, & imbecillitate virium
laborauerit, symptoma quoddam in eo ex-

citatur, quod à Græcis βέλμους, à Latinis autem in-
gens fames, seu vehemens esuritio dicitur, Galeno
auctore, libro primo de causis symptomata. cap. 7. βέλ-
mους enim dictio græca aliis adiecta vocibus vim habet
augendi significationes earum. Quæ affectio ab eo-
dem Galeno commento aphor. 21. libri 2. sic descri-
bitur, quod est labefactatio facultatis à frigore ex-
terno, quæ à fame quidem inchoat, sed non habet
eam amplius adiuncta. Quod verò in hac affectio-
ne os ventriculi affectum sit, liquet eodem libro pri-
mo de causis sympt. cap. 7. Nam ipse Galenus eam
connumerat inter affectiones, quæ ori ventriculi cō-
tingunt, cum dixit, quod βέλμους est symptoma ex
indigentia simul imbecillitateque, & refrigeratio-
ne huius loci, hoc est oris ventris ortum. Patet insu-
per quod hæc affectio symptom. sit in genere noxiæ
functionum propria ipsius appetentiæ deprauata.
Verum quamuis in hoc cōmunicet cum canina ap-
petentia, differt tamen ab ea, quoniam licet à fame
quidem & ea ingenti βέλμους inchoet, velut & appe-
tentia canina, propter virtutis tamen concidentia,
quoniam in animi deliquium statim incidit qui βέλ-
μους laborant, immo ipse βέλμους (vt idem Galenus
inquit lib. 1. de arte curat. ad Glaucōnem) nihil aliud
est, quàm animi defectus, propterea eam famem nō
habet amplius adiunctam βέλμους, veluti canina ap-
petentia. Præterea (vt ipsemet Galenus inquit eodē
comment. aphor. 21. 2. libri. c. 14.) vniuersalior est
canina appetentia, ipse verò βέλμους affectus magis
specialis, atque particularis præter quod in causa e-
tiam differant, vt dicemus. Nam à frigore externo
perpetuò ferè βέλμους exoritur, ipsa autem canina
appetentia ex reliquis nonnullis aliis causis (vt di-
ximus.) Dignoscitur autem affectio hæc, quoniam
in principio fames multa adest, quæ tamen non vi-
quequaque perdurat. Nam postea repente animo
linquuntur cum extremarum partium refrigeratio-
ne, & spiritus defectione, vt Aëtius inquit cap. 6. li-
bro nono. Cum itaque tria necessario cōcurrant in
huius sympt. generatione, indigentia scilicet imbe-
cillitas, & refrigeratio ipsius oris ventriculi, nō ab re
videndum est, quomodo hæc tria ordine se conse-
quantur. Atqui dicendum ex Galeni, atque Aëtij
sententia frigiditatem oris ventriculi primo neces-
sariam esse, qua demum fames excitetur, eaque va-
lida, ingens, ac vehemens propter duas causas cap.
de canina appetentia traditas, quæ non nisi à valida
ipsius oris ventriculi refrigeratione ortum habet.
Verum cum ipsa quoque immodicè creuerit, ne-
cessario imbecillitas ipsius facultatis, ac ex conse-
quenti virium sequitur labefactatio geminam ob
causam, tum quia omnis immodica intemperies vi-
res exoluit, vt liquet commento aphor. 20. 2. lib.
& tertio de causis symptomata. cap. 1. & propterea li-
cet frigiditas oris ventriculi appetentiam augeat, in-
tantum tamen eam augeri contingit, vt appetitus
deficiat, quemadmodum ipsis senibus accidit, licet
nedum os ventriculi, sed totum corpus frigidū ha-
beant, eodem Galeno teste præcitato aphor. Tum
etiam quoniam aucta eiusdem oris ventriculi refri-
geratione immodicè, propter eius exactum sensum,
ac ratione vicinæ, eā ipsi cordi impartitur, ipsumque
valde refrigerans, nō ab re causa existit, vt animi de-
liquiū acci-
dat, imò propterea Gal. hanc affectionem
dixit nihil aliud esse, quàm animi defectū, vt ipse Aët-
ius præcitato loco de βέλμους sic scriptū reliquit, βέλ-
μους ex stomachi frigiditate oboritur, indigentiaque;

*βέλμους
quid.*

*Quæ pars
in ea affe-
ctio.*

*Quis affe-
ctus præter
naturā sit.*

*Quibus dif-
ferat à ca-
nina appen-
tentia,
βέλμους.*

*Eiusdem
affectus si-
gna.*

*Modus ge-
nerationis
eius.*

Causa.

ac virium imbecillitate, & ab externo frigore fere in totum initium capit. Oritur nanque hæc ingens fames simul cum virium imbecillitate ex refrigeratione oris ventriculi, quæ semper ferè ab externo frigore ortum ducit. & propterea peregrinationes (vt inquit Aëtius) & itinera longa, maximè per niuè facta per affectionem hanc inducent, proinde quidem in locis desertis, aut in balneo in hoc malum collapsi ex instanti perierunt auxilij facultate destituti. Quapropter auxilia cōfestim pro eius curatione adhibebis. Nanque assidui etiam βέλμοι & exoluunt, & in animi deliquia incidunt, quibus ægrè auxilium reperitur ex eiusdem Aëtij auctoritate. Et quoniam affectio hæc frigiditas est iuncta siccitati (vt Galenus inquit quinto de simplicium medicament. facult.) propterea eius sanatio per contraria perficitur, vt ipse asserit, calidis siquidem, & humidis tum cibis, tum medicamentis. Idcirco si in viis quidam ex ingenti fame animo linquantur, eos reuocabimus (vt octauo de compositione medicamentorum secundum locos, idem Gal. Archigenis auctoritate scriptum reliquit) odoramentis aceti, aut pullegij, aut quæ fortè obtingit, terra aceto macerata, aut malis, seu pyris, aut aliis similibus fructibus, qui ad manus sunt. Insuper panem odorandum dabimus, præsertim si recens fuerit, & ingerere ipsum quoque cogemus, necnō caueum boni odoris, præterea & suillam carnem assatam, ac coctam, & in vniuersum omne, quod valde nutrit, & potissimum ea, quæ odorem nidorosum, ac probe conditum habent. Per huiusmodi enim odores (vt idem Galenus asserit præcitato loco) vt plurimum tales reuocantur. Hoc etiam tempore & extremæ ipsorum partes constringendæ sunt, manuum, ac pedum summitates calidæ aquæ feruentiori imponendæ sunt, ipsique excitandi, tum maxillarum punctura, tum capillorum, ac aurium distentione. Ipsi verò ab exolutione, & animi deliquio reuocatis, panem in vino dilutum, aut etiam aliud quidpiam ex iis, quæ acuatim reficere vires possunt, exhibebis, veluti sunt oua forbilia. Compēdiōsissimum enim auxiliū (vt inquit Aëtius) ex cibo sperare possunt, quæ etiam si oblatum acceptare non possunt, ori indere oportet violenter, cogereque vt ipsum transglutiant, euestigio enim, & à fame & ab animi deliquio liberantur, & celeriter excitantur. Vitabimus autem omnino in his, qui hac affectione sunt apprehensi, longiorem cibi dilatationem, ac inediam, & ne alternis tantum diebus cibum offeramus. Verum solerti ratiocinatione facta singulis horis simplicissimum, modicumq; cibum dabimus. At si in febribus contingat hanc affectionem oriri, nā sic quoque excitari potest, vt Aëtio visum est præcitato loco, & Paulo cap. quinquagesimo libri secundi: licet tamen ea rarò accadat, inspiciendum est quo accessions tempore contingat, nam si in remissione, seu declinatione febrilium exacerbationum irruat intrepide eis cibi sunt offerendi, quos diximus. Si verò in principio eueniat, aut in vigore apparuerit, per prædicta odoramenta conabimur eos primò reuocare, potissimum pane calido vaporem adhuc mittente, vel polenta, aqua, seu posca madefacta. Frictio quoque tunc temporis extremarum partium adhibeatur, & cataplasma ex palmis, aut malis cotoneis in vino diluto decoctis ventriculo applicetur, atque hæc vsque ad remissionem facere oportet, vt opportunè cibum offeramus. Quod

Prognostica.

Curatio.

5. de simpl. facult. c. 4.

cap. 4.

Curatio si in febribus accidat.

si ex his nihilo melius habeant, audendum est per ciborum ingestionem auxilium offerre vnam, atque alteram in vino madefactam buccellam panis tribuentes, vt exinde refocillati vsque ad remissionis tempus perueniant, in quo tum corporis curatio, tum sufficiens cibus ordinetur. Nam neq; Galenus ipse veritus est in principio, incremento, ac summo vigore exacerbationum febrilium, potissimum calidis, & siccis corporibus, quibus etiam stomachus fuerit imbecillus cibum offerre, non vni duntaxat, aut alteri, sed pluribus, vbi vsus postulare, præsertim panem ex vino dilutum, vt liquidò constet apud eundem lib. 10. method. med. Nouit etiam Alexan. (vt ipse inquit cap. 6. lib. 7.) mulierem quādam, quæ adeo ingenti fame laborabat, vt nunquam saturari se diceret, verum & rosionem in stomacho sentiebat, & capite dolebat, cui exhibita hiera pro purgante medicamento vermem euacuatione proiecit longitudine (vt ipse refert) duodecim cubitorum, atq; tunc immoderata, & furiosa appetentia cōquieuit. Propter quod innotuit eam bestiam fuisse causam, quæ ad cibum sumendum ægram compelleret, atq; omnia consumeret, & non affectio βέλμοι dicta. Si verò à frigidis in ore ventriculi, & siccis redundantibus succis hæc affectio excitetur, iidem prius concoquendi, præparandi, ac expurgandi sunt. Nanque iam dictis commodè vtare accessions tempore vt ab animi deliquio reuocentur.

Περὶ ἀνορεξίας, καὶ ἀστίας, καὶ ἀποστίνος. Hoc est: De cibi fastidio, seu inappetentia.

CAP. LXIII.

CONTINGIT non rarò (vt Galenus inquit, primo de causis symptomatum) vt succionis sensus in ore ventriculi pereat, vel succio non fiat, aut corpus ipsum non inaniatur, & propterea affectio quædam excitetur, quæ à Græcis cōmuniter ἀνορεξία dicitur, à Galeno interdum ἀστία, vt patet commento aphor. 17. quarti libri: ab Hippocrate autem cūm præcitato aphorismo, tum etiam aphorismo tertio sexti libri, ἀποστίν in nuncupatur, & Aphor. 61. quinti lib. ἀσ, cibi fastidium ab Hippocrate & Galeno appellatur, à Latinis modò cibi fastidium, interim inappetentia dicitur, quamquam inter ἀστίαν, & ἀποστίν, hæc differentia tradatur à Galeno primo de morbis vulgar. quod illi appetentia carentes cibum non sumunt, reliqui oblatos fastidiunt, quæ quidem affectio contraria existit caninæ appetentiæ. Nanque in illa immodicè appetunt, in hac nullo modo, ac nihil appetunt ægrotantes. In qua affectione, quod os ventriculi læsum sit, patet à Galeno præcitato primo de causis symptomatum, & comment. aphor. 3. sexti libri. Insuper & ab eius propriæ functionis oblatione. Nanque ipsa appetentia nedum oblata est, sed omnino abolita, vt eodem primo de caus. sympt. liquet, & propterea symptoma est in genere noxæ functionis animalis, & propriè ipsius appetentiæ ablatæ, necessariò consequens aut ad deperditionem sensus succionis venarum, quem famem naturalem ipsius vetriculi appellauit Galenus eodem primo de causis symptomatum, aut quod exuctio non fiat, aut quod corpus non euacuetur, vt diximus, quinimò (vt idem Galenus testatur eodem loco) ex eisdem etiam affectionibus non quidem pereuntibus, sed propius ab abolitionem accedentibus, imbecilla, seu exigua oritur appetentia,

10. method. cap. 3. 4. 5. & 6. Alexan. dicitur historia de muliere quadam.

cap. 7.

Commentario 1. comment. 28.

1. de caus. sympt. cap. 7. In cibi fastidio, seu in appetentiâ, quæ pars efficitur. Loco citato.

Quis præter naturam efficitur sit.

Citato loco causa.

appetentia, & propterea quæ de inappetentia curatione dicemus, deferuire etiam poterunt pro ipsius exigua, seu imbecillæ correctione. Dictarum verò affectionum, seu inappetentia (vt Alexander inquit cap. 7. lib. 7.) aut in imperies quædam, aut humores in stomacho contenti causæ sunt, similiter (vt Paulus asserit cap. 37. tertij lib.) duæ fastidij causæ esse poterunt, aut vitiosa stomachi imperies, aut humorum redundantia. Nanque si humorum adfit redundantia vitique inanitio non fiet, potissimum si nedum in ore ventriculi, sed in vniuerso corpore fuerit. Si verò vitiosa quapiam imperies stomachus laborauerit, siue cum humore, siue absq; eo, vnum duorum necessario consequitur, quoniam aut non sentiet suctionem ventriculus, aut eadem non fiet. Et enim si talis fuerit imperies, vt omnino sensus ipsius oris ventriculi destruat, vitique suctionem non sentit, idque fieri potest, aut eo primario affecto, aut per consensum cerebri, seu sextæ coniugationis neruorum, similiter & suction non fiet, aut cum non adfit dissipatio, seu inanitio, aut quod reliquæ corporis partes propter earum imbecillitatem non sugant, etiam si inanitio fiat. Qua de re dicebat Galenus præcitato primo libro de causis symptomatum, quod velut ad excitandam famem frigus in ventriculo non parum confert. Nam & vacua reddit corpora (vt cap. de canina appetentia diximus) ac ipsorum tunicam cogens, constringensque famem sufficit, ita inter potissimas, continentisque causas quibus fames impeditur, calor numeratur. Quippe qui solida corpora laxando dissoluit, atq; ad attractionis functionem reddit imbecilliora, humida verò fundendo ac liquando supramodum extendit. Quamuis interdum frigida quoque oris ventriculi imperies immodica ipsam excitare possit, vt liquet commento aphorismi 20. secundij libri. Hæc namque vires corporis emortuas reddit, & deficit, unde etiam cibi fastidij causa efficitur, Alexandro auctore, præcitato loco. Testantur autem calidam ventriculi imperiem (Paulo teste) sitis, oleosique ructus, si cibis præter voluntatem sit assumptus, item si frigidiora potius, & elaboratu perniciosa hac detenti queant concoquere. Frigidam verò imperiem contraria indicant, neque enim in hac ægri sitiunt, neq; frigida sustinent, & acida nonnunquam eructant. Si verò vnà cum calida imperie biliorum adfit redundantia humorum, rosionem, ac morsum ventriculi sentiunt laborantes, nauseaque magis & siti cōficiuntur, & si humores computruerint, hi etiam interdum febricitabunt, vt Paulus asserit. Pariter si cum frigida imperie crassi, viscosique succi redundarint, ij nec rosionem ventriculi, nec sitim experiuntur omnino. Communiter autem omnibus superuenit nausea, etsi in ventriculi sinus humores se receperint, etiam ex his ipsis vomitus erumpit. Si verò infarcti tunicis adhærescunt, etiam eo quod ingesserant sursum educto, nausea solum, non vomitu premuntur ægrotantes, præterquam cum cibos assumpserint. Immodica autem corporis plenitudo præsertim humorum erudorum inactionem prohibens, si inappetentia causa fuerit, quemadmodum visis, & quibusdam lactentibus aliis animalibus euenit, quæ per multum tempus à cibo abstinent, maxime hyberno tempore, haud difficulter dignosci poterit. Similiter etiam si propter quampiam aliam causam, vt pote cutis densitatem, aut otiosam vitam impedita fuerit inanitio, &

per consequens excitata inappetentia. At si calidi fuerint vitiosi succi totum corpus occupantes, præter alia signa, rigor aderit, & febris cum cibi fastidio, seu inappetentia. Quæ haud negligenda erit, cum opus sit ad vitam necessariam ipsa appetentia, Galeno teste, aphor. 3. 6. libri. Quamuis si iuxta principium morborum accesserit, aut iuxta vigorem vires adhuc sustinere possunt, nihil molestiarum infert, Aëtio auctore, cap. 20. lib. 9. Modico enim alimento ægri opus habent, vt ipse inquit. Si verò in declinatione totius morbi appetitus perditio accedat, aut in diuturna imbecillitate, aut viribus debilitatis aut ex immodica euacuatione, periculo non vacat, ex eiusdem auctoris sententia. Augeretur etiam affectio hæc & ab ætate. Incommodè enim hoc malo pueri afficiuntur, vt pote qui voraces natura sunt, & alsii duo fomite opus habent. Quare magnus præter naturam excessus significatur, si pueri appetitus perditione fuerint affecti. calida itaque imperies os ventriculi infestans, ac cibi fastidium excitans, refrigerante victu curari debet (Paulo & Alex. testib.) Quapropter frigidus aer eligendus erit, moderatus somnus, atque vigilia, & quies magis præcipiendæ sunt. Alui excrementa singulis diebus educenda saltem arte clysteriis lenibus, si natura defecerit. Iram vitent, anxietates, ac reliquas animi perturbationes immodicas. Cibi quoque refrigerantes exhibeantur, præcipue qui ex aceto parantur. Qua de re panis posca imbutus esui, ipsaque posca potui detur (vt inquit Paulus) conueniunt quoque lactuca, & cichorium ex aceto, vel posca, & quæcunque alia è contrario imperiei calide superanti resistunt. Similiter & aqua per se frigida, si moderatè bibatur, confert. Nam immoderatus in frigidantium vsus non modò non iuuat, sed etiam sæpe insanabilem morbum efficit, vt Paulus refert. Præterea cibi apparentur plures, & varij, ac optimo apparatu, & vltra dulcedine etiam allicientes, & appetitum irritantes, ac multi alimentij, & omnia, quæ exhibentur (vt Aëtius inquit) eiusmodi esse cōuenit, vt faciliè deuorari possint. Quæ enim multa commenducatione indigent, iniucunditatem quandam afferunt, & appetentiam euertunt. Quapropter oua forbilis interdum, & galorum testes, & ex volucris non graueolentes, & montanæ exhibeantur, quod sufficiens alimentum corpori offeratur. Necnon pedes suilli in decoctione plurimum eliquati, idque commune sit sibi fastidio ex quacunque causa orto. Conandum est etiam vt per odora menta appetitum reuocemus ex posca aut vino diluto, aut malorum cotoneorum, seu odoratorum pyrorum decocto, vel aquæ rosatæ excipe vnc. iij. aceti, vini albi vnc. j. santalorum omnium drach. ij. misceantur & fiat odoramentum. Extrinsecus verò eis, quæ fouere stomachum & corroborare queant, ac calidam imperiem alterare, vt edum, veluti est oleum rosaceum, omphacinum, ac cytoniorum, vel victis oleis additis succi lactucæ, cichorij, portulacæ, vel solani vnc. j. santalorum, & corallorum rubeorum scrup. j. cum pauco aceto, ac exigua cera fiat vnguentum, quo vtare. Vel cytonium accipias & in posca decoquito, cōtundito, ac stomacho imposito. Quo etiam tempore moderata corporis frictione, atque etiam pedum, ac manuum palpatione, ac cōrectatione accuratorie vt conuenit, eodem Aëtio teste. Saccellos item parare poteris ex rosis, violis, coral-
lis, ac fantalis, qui parum posca inspersi stomacho applicentur. Si verò nedum ex calida intempe-

Prognosis
Curatio
ex calida
oritur im-

*Si simul cum
calida in-
temperie
siosi succi
redunda-
rint, cura-
tio.*

rie; sed etiam ex mordacium biliosorum humorum redundantia cibi fastidium proritetur, priusquam alia adhibeatur curatio, prædictos humores, aut vomitu, aut per aluum reiiciendos curabimus. Per vomitum quidem ubi facilius æger vomat, quibus etiã facilius reddi potest, copiosa aqua tepida exhibita sola, aut paucio aceto, seu syrupo aceto, seu syrupo acetoso addito. Satiùs etiam fuerit (vt Paulus & Alexander testantur) si priusquam tepidam exhibueris, humectatã ægro exhibeas alimenta, veluti ptisanã cremorem, vel ouorum lutea, deinde exiguo tempore interposito, vomitum prouocaueris. Namque his sine noxa erit & vtilissimus, vt Alexander inquit. At si difficilius æger vomuerit, melius erit materiam ad ventrem prouocare copiosiore temperatoque alimento prius humectatam. Ita namque ea purgantibus medicamentis promptè obedire poterit, vt refert idem Alexander. qua etiam ratione aquam hordei paucio saccharo addito exhibere poteris, aut syrupum violaceum, vel ex infusione rosarum, seu de succo cichorij cum eadem aqua hordei, aut cichorij, vel lactuca, vt humores alterentur, ac cõtemperantur, quibus aliquot vicibus assumptis, purgans medicamentum propinabis: esto autem id quod stomachum non offendant, aut calidam intemperiem augeat. In quẽ vsum vnc. iij. mellis aerij, aut vnc. iij. syrup. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum cum tamarindorũ decocto exhibebis, vel loco prædictorum casia fistula vtare, & interim si videbitur drachm. j. rhab. vigorati in aqua hordei, aut cichorij macerati, & per colum transfusi prædictis adiacere poteris. Deinde ad ea, quẽ stomachum ipsum intus, & extra alterant, ac roborant, modò à nobis conscripta redeas, quo etiam tempore miua cytoniorum simplicia, ac syrupo ex citri acido vti poteris per se, aut cum aqua hordei, vel cichorij. Item cytonium ipsum saccharo conditum confert, vel eorundem cytoniorum succus cum aceto & melle permixtus modo quo Gal. docet, sexto de sanitate tuenda tribuatur. Qui autem ob frigiditatem cibos fastidiunt, contrariis etiã medendi sunt tum cibis, tum medicamentis, ac reliquis, quã in vltis ratione continentur. Inter cibos verò magnopere commendauit Alexander ius columbẽ, & uas passas, etenim ipsẽ stomacho sunt gratẽ, contemperantque maligna, & cruda concoquunt, & præter id quod non subito corrumpuntur, nutriunt. Pro potu quoque vinum vetus, & conditum cõfert. Item decoctum rutæ, anisi, & petroselinĩ. Insuper allia his & alimenti, & medicamenti nomine conueniunt, Paulo & Alexandro testibus. Decoctum etiam cinnamomi, aut piperis ex aqua calida communi conducit, vel etiam ipsum medicamentum, quod inscribitur diatiron piperis præbebis, aut diacalamintus dictum. Iis enim si quotidie vtatur is, quem frigidus venter infestat, nihil incommodi sentiet, Galeno auctore, sexto de sanitate tuenda, cap. 10. veluti quibus venter, aut frigidus est, aut etiam temperatus. Ceterum, si ad frigus propensior (vt ipse refert) iis aptum medicamentum est, quod diaspoliticon vocant. Ex horum quoque numero est theriaca, quã cum stomacho sit idonea, maligna quoque contemperat. Vnde etiam iis (vt Alexander inquit) quos humida recrementa maligna, & praua infestant, rectè hoc antidotum exhibetur, vt vna quoque vice datũ appetitum abolitum frequenter reuocauerit. Conducit præterea non parum succi absynthij potio, seu

*In fine.
Si ex frigida in-
temperie inap-
petentia fiat,
curatio.*

syrup. ex eo confectus. Ceterum quibus stomachus nimium refrigeratus est (vt idem facit Alexander) etiam medicamenta ex pipere, & gingibere confecta porrigere necesse est, quorum numero etiam id habetur, quod ex malis cotoneis paratur adiectum habens piper, myrrham, aut ligusticum, aut costum, aut pulegium vel satius iuxta Galeni sententiam (eodem sexto de sanitate tuenda) sic componas, Accipies (vt ipse inquit) succi malorum cotoneorum, quẽ dulciora, maiorãque sunt, ac minus acerba, Strutia in Asia vocata, sextarios Romanos duos, quibus mellis optimi tantundem miscebis, aceti sextarium vnũ & semissem, & cum super prunas modicẽ coxeris, & spumam detraxeris, immittes vnc. iij. gingiberis, piperis albi vnc. ij. deinde rursus in simili igne recoques, donec mellis crassitudo existat, qua vtique crassitudine stomachica medicamenta preparari solent, idque maximè dádum est ieiunis medicis mystri modo, quanquam nec si à cibo sit sumptum, quicquam ledit. Commode quoque dabitur etiam si prius pransus quispiam ante cenam id fumperit, maximè tamẽ tempestiue id duabus horis, aut tribus ante cibum obtuleris. Verum si medio temperamento ventres habeant, ita vt nec biliosum excrementum, nec pituitosum congerant, iis piperis, & gingiberis dimidiũ eius, qui prædictus est modus, sat erit. Vt sit piperis vnc. j. gingiberis vnc. ij. quemadmodum si immoderata frigiditas temperiem vitiat, iis quatuor gingiberis, piperis tres, aut duas & semis vncias iniicias. Hoc nanque medicamentum tum ad appetentiam excitandam iis, quibus ea languet, tum ad concoctionem iis, qui parum feliciter cibos concoquunt, vtile est, & in summa ventri robur conciliat. In quauis tamen intemperie dicta, poteris medietatẽ piperis, ac gingiberis assumere, aliàs erit medicamentum admodum acre, vt ipse expertus fui. Quandoque præterea ex citrio quod cõficiunt medicamentum, non parum prodest cum melle præsertim. Extrinsecus verò vtendum eis quã fouere stomachum, & corroborare queunt, veluti oleũ est mastichinũ, de absynthio, nardium. Poteris item hunc in modum inunctionẽ parare, Recipe melle secæ, ligni aloẽs, singul. scrup. j. mastiches drach. iij. aloẽs drach. ij. succi absynthij drach. iij. olei nardini & mastichini ana vnc. s. cerã quod satis sit, fiat vnguentũ. Vel sacculos componas excipiens menthe vtriusque, ac absynthij cuiuslibet p. vnũ, corticem citri, ligni aloẽs, mastiches, cinnamomi ana drachm. ij. maceris galangã ana drachm. j. rosarum siccarum p. ij. omnibus ritè contusis, saccelli figurentur ad formam cuti, qui per se, vel in vinograto, seu guarreto macerati prius, applicentur, ac pluries iterentur. Emplastrum quoque conficere poteris ex palmulis, aloẽ, mastiche, vino, & hordei farina, ac croco, adiectis oleo nardino, ac absynthij succo, necnon cerã & terebinthinã parum. Sin autem nedum ex frigida intemperie, sed ex viscosis humoribus cibi fastidium ortum fuerit, ipsos extenuando, incidendo, ac abstergendo medeaberis, ea adhibendo, quã ex oxymelite, seu muria componuntur, vt sunt cappares ex oxymelite parati, oliuã, quã ex muria, aut oxymelite condiuntur, ac sinapi cum oxymelite, & aceto comestũ, et si largius detergere volueris, etiã oxymelite Iuliano dicto vtire, Paulo & Alexand. auctoribus, in quem etiã vsum si hæc non suffecerint, ea compositio, quam picram vocant, accommandanda est. Nam acrimonia ac ca-

In fine.

lore eorum, quæ in se habet, crassos, ac lentos succos
 cap. 10. dissecat, ac detergit, Galeno auctore, eodem sexto
 de sanitate tuenda. Verum aliquid uti hoc medica-
 mento non licet (ut ipse inquit) sed singulis septem,
 vel decem diebus eâ exhibere poteris ponderedrac.
 j.s. aut drac. ij. exhibitis etiam prius, quæ iam dictos
 humores præparare valent, ut mel rosaceum, aut i-
 psam oxymel, etiam scillinum si opus fuerit, aut id
 medicamentum, quod ex malis cotoneis paratur,
 quod mox ex Galeni mente conscripsimus, dabis.
 Verum eiusdem nedum drachm. j. sed ij. vel iij. exhi-
 bere poteris, & quandoque plus, & demum ea con-
 donanda sunt, quorum supra meminimus, potissi-
 mum diatrion pipercon, diacalamintes, aut theria-
 cæ drachm. j. eorum pro qualibet vice tribuens cum
 paucis vino odorifero, aut aqua mulsâ. Hisque con-
 ducit (si non difficulter vomat) vomitus, qui cum a-
 qua tepida, & oxymelite proritetur. Insuper & aliis
 medicamentis conscriptis extrinsecus utare, ac exer-
 citiis, & frictionibus valentissimis, quin etiam & di-
 gitorum in os immisione stomachus turbatur sepe
 ad excipiendo cibos est conuersus ex Pauli, & Aëtij
 auctoritate. Quare hoc ipsum tum ante curationem
 tum post eam est faciendum. Euomuntur enim ali-
 quando biliosa, aut pituitosa quædam, quæ perdit
 appetitus in quibusdam sunt causa, atque ita ab hac
 accessione eos liberabis. Si verò ex virum imbecil-
 litate appetitus perditio contingat, considerare o-
 portet qualis intemperies vires exoluat & per con-
 traria eâ ipsam corrigere. At si propterea quod su-
 ctio non sentitur, cibi fastidiū accidat, cerebro, aut
 nervis ab eodem ipsi stomacho distributis, pros-
 piciendum erit, & cognita eiusdem causa, eam prius
 auferre necesse est. Si autem propterea quod totum
 corpus plenum existat, eiusdem corporis inanitione
 ne non perfecta inappetentia fiat, idem vacuandum
 est, diuersimodè tamen pro varietate redundantis
 succi, quo casu etiam valentiores exercitationes cō-
 ferunt, iis etiam quæ cutem rarefaciunt, utpote bal-
 neis, ac frictionibus uti oportet, ubi ex cutis den-
 sitate eadem inanitio non fiat. Cæterum, si ob alicuius
 visceris inflammationem, aut obturationem ap-
 petentia deperdatur, illius etiam habere curam con-
 uenit, ut inquit Aëtius. At si ex vlcere in stomacho,
 aut ventriculo existente ortum ducat inappetentia,
 ab omnibus acerbis & cibis, & potionibus abstinere
 oportet, ac uti medicamentis, quæ leniunt, puta
 sorbitionibus ex oleo, tum iis quæ ex amylo, lemnia
 terra, & lacte, vel quæ melle paucissimo conficiun-
 tur, ut quæ purgent citra rōtionem ex Pauli decreto
 Extra verò ex palmulis, & cydoniorum carne & po-
 lenta epithema facies, & ceratum ex melino vel ro-
 faceo cum ammoniaco, & thure.

Necesse dicitur, ut quod præc. id est, De immoderata siti.
 CAPVT LXV.

SIMPOTIONS appetentia toti-
 dem quoque sunt symptomata, quot
 accidunt circa cibi appetentiam, at-
 que iis etiam similia Galeno auctore
 primo de causis symptomatum. cap.
 7. Namque interim abolitum omnino est desiderium
 potus, quandoque verò diminutum, quæ quidem ex
 eiusdem causis ortum habent, excessu, defectuque
 diutaxat differētib, de quibus symptomatibus mo-
 do tractare non intendimus, verum de ea potione
 appetentia mentionem faciemus, quæ vitiosa est, &

ad portionem se habet cum ea, quæ circa alimentum
 est praua, aliquando quidem immodicum postulans
 potum, interim verò alieni per eam desiderantur,
 perinde ac cibi. Hoc symptoma siue ingentem, siue
 immoderatam, siue vehementem sitim appellabis,
 perpetuo in eo venter, & præsertim eius os affectum
 erit, ut liquet ex Gale. cum primo de causis sympto-
 matum, tum sexto de locis affectis. Quamquam non
 semper primario ipsum afficiatur, sed quandoque
 per consensum, vel iocinore, & maxime si ma eius
 parte, vel pulmone, vel mesenterij venis, seu ieiuno
 inflammatis ex sententia eiusdem Galen. præcitato
 libro sexto de locis affectis, & Alex. cap. 8. lib. 7. Di-
 gnoscas autem cum per consensum ab aliqua præ-
 dictarum partium inflammatione os ventriculi fuerit
 affectum ex propriis signis inflammationem earun-
 dem partium. At si primario oblatum sit, nullum
 tale apparebit indicium inflammationis prædicta-
 rum partium. Quod verò os ventriculi in hac affe-
 ctione oblatum sit, ex eius etiam proprii muneris
 offensione (quod quidem appetentia cum cibi, tum
 potus est) cuiuslibet patere poterit. At quod ingens
 sitis sympt. sit in genere noxæ functionum, atque i-
 psius appetentiæ deprauata, luce clarius est. Nec pro
 eius symptomatis notitia alia conscribenda sunt in-
 dicia, cum res ipsa ex laborantium relatione pate-
 fiat. Quamquam non semper vnum sectetur oris ven-
 triculi morbum. Namque aut ventriculus calida, aut
 frigida, aut utraque intemperie affectus est, & maxi-
 me os ipsius, ut idem Galenus inquit præcitato sex-
 to de locis affectis. Et propterea tum ipse lib. pri-
 mo de causis symptomatum, & primo de simpl. me-
 dicam. facult. cap. 30. tum etiam Aëtius libro quinto
 cap. 119. & libro 9. cap. 4. ac Paulus libro secundo, c.
 52. & Alexander eodem cap. 8. libro 7. sitim oriri tes-
 tati sunt aut ob penuriam humiditatis, aut ob abun-
 dantiam caliditatis. Verum nedum ex nudis hisce
 intemperiebus, sed cum vitiosis quibusdam con-
 iunctis humoribus, qui falsi, aut biliosi sint, ven-
 trem mordentibus excitari poterit quandoque, te-
 stante Galeno, primo de causis symptomatum. Nec
 mirum si ab eis potio magis, quam cibus appetitur.
 Nam præter quam quod ab iis calefiat, sicceturque
 ventriculus (ut ipse refert) quæ utique causæ sunt,
 etiam liquari, fundique tum in eo, tum venis succis
 contingit. Fundendorum autem succorum sympto-
 ma, ea quibus continentur, implet: quemadmo-
 dum contra frigiditas vacuat. Desiderantur etiam
 prædictis succis in ventris tunicis redundantibus
 alieni potus quandoque, perinde utique ac cibi,
 pro dominantis vitiosi succi ratione. Atque hoc
 quidem in longo tempore iis, qui vitiosa victus ra-
 tione sunt vsi, superuenit. Aliquando autem & im-
 modica sitis ex naturali humido ipsius oris ventri-
 culi in eo veluti feruente oritur, ut patet eodē pri-
 mo de causis symptomatum, id quod etiam fieri ne-
 quit, nisi ab excedente eiusdem oris ventriculi ca-
 liditate. Et propterea non ab re decretum est à iam
 dictis auctoribus præcatis locis, necnon & à Ga-
 leno iterum aphorismo 19. quarti libri, ingentem si-
 tim aut ob humoris inopiam, aut ob caloris copiam,
 aut propter utrunque excitari. Nec admodum dif-
 ficile erit dictas causas intersingere. Nam si ob hu-
 moris inopiam excitetur, tum ex infirmi loquela,
 tum ex iis quæ præcesserunt facile percipies, utpote
 si ex defectu potus sitis aduenerit, aut ab ea affe-
 ctione, quam diabete nuncupant, seu ex aliqua

Quæ pars
 afficiatur
 in immoderata
 sitis.
 1. de caus.
 sympt. cap.
 7.
 6. de loc.
 aff. cap. 2.
 6. de loc.
 affe.
 Loco cita-
 to.

Quæ affe-
 ctus præter
 naturā sit.
 ingentis sitis
 causa.

6. de loc.
 affe. cap. 2.
 1. de caus.
 sympt. cap. 7.

Loco cita-
 to.

Citato cap.

copiosa euacuatione præcedente orta fuerit. Poterunt & eiusdem esse causa ij, qui pertinaciter sibi sustinere sitim imperauerint, aut in nauigio ex aqua dulcis defectu marinam biberint. Verum si ob caloris copiam ea fieri citra acrium humorum redundantiam, præter immodicam sitim excedentem, in ventriculo sentiant laborantes caliditatem. Id autem contingit interdum ex alicuius medicamenti assumptione, quod calidum, acre, ac mordax fuerit. At si ex caliditate, & siccitate simul copulatis quidam siti premantur in febribus ardentibus, & adurentibus omnibus, ac æstare, & graui æstu laborabunt. Etenim in his præsertim febricitibus caliditas multa est, & siccitas succedit, multa humiditate per violentiam febris consumpta (Aëtio teste eodem cap. 119. libri quinti.) Si autem simul cum caliditate viscosi adsint succi redundantes falsi, aut biliosi, haud difficulter ex iis, quæ præcedenti cap. diximus, intertingere poteris, præsertim ex oris sapore diuerso, falso, aut amaro. Quanquam si falsi humoris copia in ventre fuerit cõgesta (quemadmodum accidit in aqua intercutem affusionibus) aut pituita falsa ventri illita inhaerit (vt Galenus fatetur primo de simplicium medicamentorum facultatibus cap. 30.) ex caliditate simul cum humiditate coniuncta sitis orta erit. Si autem biliosi redundarint succi, à calida & sicca ventriculi dispositione sitis proueniet, cum talis fuerit naturæ is succus. Fiunt quoque nonnulli sitibundi ex immodico vini meracioris potu, præsertim veteris, ac ciborum calidiorum usu, & qui quandoque viperas deuorant, aut qui vinum, in quo talis serpens fuerit mersa, biberunt non ob aliam causam, quam earum aliquam, quas supra diximus. Verum ne quis decipiatur, animaduertendum nos ingentis sitis, quæ in ægris excitatur corporibus, & non exiguae, modicæ, seu superficialis, quæ in sanis quandoque corporibus oriri consuevit, verba fecisse. Nanque licet ea ob siccitatem etiam, aut caliditatem fiat, tamen neque à toto corpore, neque ex magno ventriculi partium affectu excitatur, Galeno auctore sexto de morbis vulgaribus. Sed (vt ipse inquit Erasistrati auctoritate) arefcentibus, aut incalentibus locis illis, per quos ab ore ad ventriculum humor delabitur, fieri consuevit. Et propterea si arefcentibus locis illis fiat, somnus remedio est, corporis penitioribus, atque iam dictis locis madefactis, vt pote per somnum sanguine ad interiora de lapso (vt ipse inquit Galen.) vel quia idem somnus humores concoquit, vt testatur Aëtius. Verum si ob caliditatem iam dictarum partium superficialis sitis aderit, atque à somno expurgata, vigilantibus facile sedabitur. Calescunt enim dum in stomacho cibi concoquuntur, calido quodam halitu ad eas partes delato, quæ caliditas cum in vigiliis circa superficiem expanditur, à tali siti facile liberantur, euanescente siquidem calefactarum partium caliditate. Verum si ob comestorum, epotorumque calorem ventriculo exalfacto, à somno siticulosi fiant, absque externo subsidio per vigilias sitis non sedabitur, & propterea Hippocrates eodem sexto de morbis vulgaribus, dicebat, siti superficiali somnus medela est. Siti vero ex somno, vigilia quibusdam, & aphorismo 27. quinti libri, qui noctu bibere appetunt (inquit) iis admodum sitientibus si superdormierint bonum. Neque enim omnibus à somno excitatis ab eodem affectu sitis oboritur. Verum ingentis sitis, de qua modo sermo habetur, non paruifacienda cu-

ratio est, cum si nimium intalescat, ex ea ægri perire poterunt, quemadmodum Galenus nonnullos vidit immodice sitientes perire ex diuersis causis, ac modis quoque diuersis, vt patet apud eundem præcitato libro primo de causis symptomatum. At pro eius curatione non semper refrigerantibus, humectantibusque vtendum erit, sed ubi causam accuratè distinxeris, atque internoueris, ita tandem congrua adhibenda curatio est, Alexandro teste præcitato c. 8. lib. 7. & proinde iis, qui ex siccitate sitiunt, humectantia conueniunt, ita vt aer humidior consuetò eligatur, temperatus tamen in calore, & frigore. Somnus solito longior conuenit, nanque hoc duntaxat curari hæc sitis consuevit. Quæ etiam præcipienda erit. Nam & ipsa ex accidenti humectat, saltè seruas humiditatem, eam scilicet, quæ ex cibo prouenit, non exsiccat, vt patet apud Galenum commeto aphorismi 13. quarti lib. cibi quoque, & potus humidiores sint. Et si ex immodica euacuatione fuerit siccitas orta, erunt cibi eligendi nedum humidiores, sed qui multum, ac promptè nutrant optimique alimentum, & qui facilius concoquantur, veluti contusa, seu iura ex carnibus gallinarum, aut pullorum, pitana, seu eius cremore adiecto. Potus sit aqua, aut vinum album, tenue, subastringens multa aqua permistum. Si verò ex defectu potus fuerit excitata, abundanter iis tribuendus erit, viribus consentientibus. At si ex diabetica dispositione, ea curanda erit. Verum ubi ex caloris copia orta sit sitis, si ob caliditatem eduliorum, aut ob multum vini meracioris potum excitata fuerit, medela est, frigide potus, Galeno teste sexto de morbis vulgaribus, & Aëtio præcitato cap. 119. libri quinti. Similiter & ex eiusdem Aetij auctoritate, ubi longo iam tempore stomachus æstuat, radices dulces succus potatus auxiliatur, atque ipsa etiam radix ex aqua item pampinorum vitis, cremor, & portulacæ succus, vt apud eundem patet cap. quarto libri noni. eodem pacto cucumeris satiuæ semen comanducatum, vel decortatum, & tritum, & ex aqua potatum. Nec minus prodest tum lactucæ, tum portulacæ semen manducatum, & ex aqua potatum. Vniuersa autem victus ratio in his ad frigidum vergat. Vbi verò cum caliditate coëat humiditas, & propterea sitis fiat, optima eius medela acetum est, vt Galenus inquit, primo de simplicium medicamentorum facultatibus, cap. 30. Poterit insuper & eisdem exhiberi mali medici, seu limoncelij succus cum aqua frigida, item malorum cytoniorum, vel pampinorum vitis, vel mali punici succus sorbitioni per se, aut cum aqua datus confert. At ubi ex calore simul, ac siccitate sitis fuerit orta, optima medela est (Galeno teste ibi idem) acetum vt quod strenue refrigeret, & quouis expedite permeet, & aqua, quæ supra quam quod refrigeret, omnium sit vel humidissima. Nihil enim est aqua humidius (vt ipse inquit.) Componi autem inter se debent, vt facile potari possint, dico acetum & aqua. Id quod ex fumentis gustu, & non nostro iudicium facere oportet, rati tunc fore conuenientissimum, & proinde etiam utile, cum eidem fuerit iucundum. Ab extra verò conducit sanguinariæ, intybi, sonchi, pampinorum vitis, seu portulacæ succus cum aqua rosacea, ac pauco aceto permixtus, si frigidus stomacho adhibeatur. Vniuersa verò victus ratio frigida, & humida præcipiatur. Verum si in febricitantibus sitis accidat, lenimenta quædam sitis excogitanda sunt, ex Aëtij

Cap. dis-
to.
Curatio.

Loco citato.

Commen. 4
commen. 23

Citato lib.
5. cap. 119.

Loco citato.

Prognostica.

Sitis curatio in febricitantibus.

Lib. 5. cap.
119.

ex Aëtij sententia, quandoquidem & mensuram, & tempora potus decernere oportet. Nam si sine detrimento bibere possent agri quando velent, hanc sane sitis medelam statim amplecterentur, sed quoniam intempestivè sumptus potus non solum sitim non extinguit, sed etiam contra auget, propterea non ab re, eadem (vt diximus) lenimenta sitis excogitanda sunt, quibus oportet vt in principiis, ac exacerbationum augmentis, quo tempore potus prohiberi debet. In vigoribus autem primum per gargarismos, & collutiones oris squallorem corporis mitigare oportet. Deinde declinatione incipiente potum dare. In remissione verò etiam nolentes aliquando cogendi sunt, vt potum assumant. Mitigare itaque oportet hanc sitim per irrigationem capitis ex oleo frigidissimo, vel rosaceo, Paulo & Aëtio testibus, optimè etiam facit (vt inquit Paulus) nigræ lactuæ semen comanducatum. Ad hæc cucumeris semen in ore retentum, vel portulacæ viridis feminis, similiter & peponis, succique radicis dulcis, & tragacanthi singulas partes æquales assumere, & cum saccharo ad fabæ magnitudinem reducto, ac vtire. Aut seminis cucumeris satui excipe drach. iij. tragacanthi drac. ij. tragacanthum cōtundito, & cribrato, semen vero conterito, & cum crudorum ouorum recentium albumine, ac saccharo catapotia formato, & ex his vnuni sub lingua tenedum exhibeatur, vt paulatim dissolutum deglutatur. Adieci autem saccharum his medicamentis quo iucundiora fiant, quod in aqua rosacea dissoluatur. Conducit etiā melonis indi semē, aut eiusdē parua frustulam, eius substantia, quæ est inter externum corticem, & internam medullā, si in ore detineantur. Ex succo etiam malorū puniceorum, vel pampinorum vitis, aut cytoniorum cum aqua permixtis, in accessionū vigore, gargarismi, & oris collutiones faciendæ sunt. Pariter & ex vino albo aquoso multa aqua permixto. At in declinatione exacerbationum vbi incœperit, ac in earum remissione potum dare conuenit aquæ frigidæ vbi omnia consentiant, seu pauco aceto adiecto, vt diximus, ex Gale. sententia, vel vñc. iij. syrupi acetosi simplicis; aut ex oxyfaccharo assumas, ac frigidæ permisceas, vel vt tutius exquiras non aquæ frigidæ, sed aquæ hordei miscebis. Verū vbi vitiosus quispiam humor in ventriculo contineatur, biliosus si fuerit, ac prædicta refrigerantia, & humectantia nō suffecerint, ita vt ex eisdem alteretur, ac contemperetur, per vomitum vacuari procurandum est, cum his, quæ præcedenti cap. diximus, modo laborans non difficulter vomat. Nam si difficulter vomuerit, per inferiora purgandus erit lenientibus duntaxat medicamentis, vt puta cassia fistula, melle aëreo, saccharo, violaceo, aut syrupo ex pluribus infusionibus violarum, vel rosarum cum tamarindorum decocto. Deinceps, quæ diximus medicamenta intus, & extra sitim arcentia, propinentur. Pariter si pituitosus, ac falsus fuerit is qui redundat succus, quæ abstergant, ac repugant eundem humorem, offerre conuenit, veluti est psilana ac eius cremor, radicis glycyrrhizæ decoctum ex aqua, ac ipsimum rosaceum mel, seu diluta aqua multa, & vbi hæc detergere non valuerint, quæ purgant adhibeto, cassiam videlicet fistulam cum trochiscaro agarico, aut diacat. & deinde ad ea, quæ sitim arcent, præsertim ex calida, & humida affectione ortam, præbenda te conuertas. Huiusmodi sitim à falsa pi-

uita ortam nouit Alexander per falsos cibos (vt ipse inquit) finitam fuisse. Quæ verò sitis ex inflammatione oritur, cuiusvis prædictarum partium curata inflammatione sedabitur.

Περὶ λυγμῶν. Id est, De singulis.

CAP. LXVI.



Ritur interim veluti conuulsiva oris ventriculi affectio, siue stomachi conuulsio quedam, quæ à Græcis λυγμός, quandoque autē ab Hippocrate λυγξ dicitur, à Latinis autem singultus nuncupatur, qui motus quidam est vehemens, ac violentus stomachi, quo rem infestatem expellere conatur, vt ex Galeni sententia liquet, cum tertio de causis symptomatum, cap. 2. tum commento aphorismi 39. sexti libri. Hic quidem motus (licet eiusdem generis sit cum vomitibus) fortior tamen illis, ac vehementior est, cum per eum stomachus appetat, ac conetur eorum aliquid expellere, quæ in ipso continentur. Non siquidem in eius latiori spatio, sed in ipso ventris corpore, atque ea, quæ sunt in ipsius ore penitiora, at quod ea quæ veluti absorpserit stomachus, seu ventriculi os, quæ quidem per singultum excernere tentat ventriculus ipse, vehementiori motu indigeant, vt expellantur, quàm ea, quæ in capacitate ventris continentur, & per vomitum expelluntur, omnibus ferè clarè patet, medicis itaque in vomitibus erit stomachi motus, siquidem per vomitum ea duntaxat appetit expellere, quæ in ventriculi spacio latiori continentur, fortior autem, & vehementior in singultu, cum ea, quæ sunt in ipsius ore penitiora, atque in ipso ventris corpore infarcta, expellere tentat ventriculus, vt liquidò constat apud Galenum præcitato libro tertio de causis symptomatum. cap. 2. & commento aphorismi 39. sexti libri. Valeant ergo Arabes, & eorum doctrinam sectantes, qui contrarium sentiunt. In hac affectione quod os ventriculi affectum sit præcipue, patet apud Galenum tum præcitatis locis, tū etiam tertio, & quinto de locis affectis, cum pars hæc, vt sepius diximus, exactioris sit sensus, quandoque ex eiusdem Galeni sententia commento aphorismi tertij libri septimi, nedum os ventriculi, verum etiam totus ventriculus ipse. Nonnunquam etiam & pars ea, quæ propriè stomachus appellatur, gulam nominant, affici potest, licet non adeo exactioris sit sensus. Affectio hæc cum contineatur sub communi genere motuum illegitimorum, seu deprauatorum, vt liquet ex Galeni libro secundo de causis symptomatum, cap. 1. & maximè eorum qui à facultate hunt, à causa tamè præternaturali irritata. Propterea nulli in dubium venit, quod symptoma sit, in genere noxæ functionum naturalium ipsius stomachi deprauatarum. Nanque non vnus duntaxat facultatis opus, seu deprauatus motus est, sed duarum ex eiusdem Galeni decreto præcitato libro tertio, de causis symptomatum, cap. 2. nempe expultricis, & retentricis. Miscentur etenim tum morbi, tum symptomata interdum tam expultricis, quàm retentricis facultatis, vt ipse refert. Verū primum quidem expultricis motus est non legitimus, secundo loco retentricis, ac complectentis facultatis eiusdem ventriculi, vt ipse Galen. inquit. Quæ ratione nemo inficias ibit nos ipsum dixisse illegitimum esse motum expultricis ventriculi facultatis, cum eiusdem primò noxa sit, secundario verò ipsius reten-

Singultus quid sit.

Quibus singultus à vomitu differat.

Vide A. nic. lib. 3. sen. 13. trac. 5. c. 19. 3. de locis aff. cap. 7. 5. de locis aff. cap. 6. Quæ pars in singultu afficitur. Quis affectus præternaturalis sit singultus.

trictis. Primum namque per hunc praetum cupit ventriculus, media expultrice facultate, id quod contrahit atque reicere, Secundario vero cum praetum venter sim gurgit, retrahit quoque facultas oblaeditur, cum praetum eum non naturaliter cibos complectatur: propter eundem illegitimum seu conuulsivum ventriculi motum, (siquidem conuulsio in totum non est, sed veluti conuulsio quaedam et ambarum virtutum commune symptoma) ut eidem Galeno placuit, idque non ab re, namque conuulsio solis accedit musculari, ventriculus autem, nec stomachus muscularis est. Sed in hac affectione simili tum affectus, tum motu moquentur, eis quibus instrumenta respirationis feruientia per tussim ex interperie ortam, omnibus nimirum ventriculi paribus, quod contrahit expellentibus.

Bisfariã pos
se singultus
generari.

Quod vero ob geminam causam excitari possit ab Hippocrate decretum est aphorismo 39. sexti libri. Inanitionem, inquam, vel repletionem, veluti & ipsa conuulsio proprie dicta. Illud idem confirmat ipsius Galenus commento aphorismi 13. eiusdem sexti libri. Quamquam magna ex parte a plenitudine, raro autem ex inanitione fiat singultus, vt ipse inquit. Hos fecisti sunt Paulus, libro secundo, cap. 56. Alexander cap. 15. libri septimi, & Aëtius libro nono cap. 5. Verum circa hanc Hippocratis sententiam hæsitare videtur Galenus libro octauo, de compositione medicamento. secundum locos cap. 3. asserens quod ipse in conuulsione tertiam aliquam causam supra euacuationem, & repletionem nondum reperit, singultum autem sine his fieri vidit, vt pote ex acris humoribus, aut serosis, & medicatis stomachum mordentibus, quos ubi vomitu reiecerint, statim singultu liberantur. Quinetiam ex deutorum pharmaco ex tribus piperis generibus constare, vel ipsomet pipere tenuiter cribrato, si statim vinum postea biberint, & præterit calida aque temperatura, omnino singultiunt, calore quidem potus piper ad interiora deuchente, sua vero acrimonia ipsius ventriculum molestante vt ipse Gal. refert præcitato commento aphorif. 39. sexti libri, ex quorum numero ipse erat, vt patet tum præcitato libro octauo de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 3. tum tertio de locis affectis, cap. 7. Amplius & a cibo in mordacem qualitate corrupto, quinetiam ex rigore, seu frigidityte oris ventris singultus excitatur, vt ipse refert, quamquam etiam afferat dignum consideratione esse, num ob nimiam euacuationem fiat singultus, veluti & conuulsio. Id tamen admittendum erit, ex Hippocratis auctoritate, quamuis raro accidat. Ex quibus liquet non solum ex repletione, & inanitione singultum fieri posse, verum etiam ex nonnullis aliis causis morbum ipsi ventriculo inferentibus, ob immodicam videlicet caliditatem, vel frigiditytatem. Quod vero vehemens caliditas, atque frigiditas morbum inferat, ad media continui solutione, dolorem proripent, liquet ex Galeni 4. de simplicium medica. facultat. cap. 1. quamuis vna erodendo, & reliqua vero diluendo id efficiat. Quod etiam præter inanitionem, & repletionem iam dictæ causæ singultum excitare valeant, confirmatum est à Paulo Aëtio, & Alex. præcitatistis locis, verum ne calumniam Hippoc. aliqua tribuatur, ac de insufficientia damnetur, nec Gale. & reliqui iam dicti auctores vt superflui condemnentur, dicere possumus primò Hippoc. præcipuas vniuersales, ac maximas tantum causas recensuisse ipsius singultus, quæ sunt inanitio, & repletio, reli-

quas verò particulares tanquam manifestas omni-
sc, quas demum Galenus, & reliqui particulatim e-
narrantur. Vel rectius dicamus, quòd quamvis plu-
res esse possint particulares singultus causa præter
repletionem & inanitionem, cunctæ tamen ad eas
reduci possunt. Nanque cum omnes morbus ratio-
ne, ipsum efficitur, aut calidiores causa
erunt, ac humores calidi, acris, & mordaces, & sic
quisnam vereatur quòd vim habentes excitandi,
dicere poterimus, ex inanitione singultum fieri ex
talibus causis? Quemadmodum ipsemet Galenus de-
cretum reliquit aphorismo primo quinti libri, vt
non calidiores, sed infrigidantes ventriculum ip-
sum immodicè, propterea singultum excitantur,
quò casu quis etiam verebitur quòd singultus hic
educetur ad eum, qui ex plenitudine oritur? Nam
cum rigor, & frigiditas omnia nervosa corpora ef-
ficient ad distillandum difficultia, sunt causa vt hæc re-
pleantur, atque ideo singultus inde existant, vt testis
est Galenus commentò aphor. 13. sexti libri. Non
itaque deficit Hippocrates in narrandis causis sin-
gultus, nam considerata rei natura, duæ duntaxat vi-
niuersales (quas ipse refert) erunt, Nec de superfluo
Galen. & reliqui còdemnari possunt, vt qui specia-
tium magis, ac manifestas causas præter inanitionem,
& repletionem conscripserint, licet ad eandem re-
duci possint cunctæ, quæ dictæ sunt, vt reliquæ, quæ
ab aliis narratur: quemadmodum si in febris sin-
gultus fiat, stomacho præsertim, aut aliquo alio vi-
scere inflammato. Tot itaque singultus causa esse
possunt particulares, licet vniuersales tantum duæ
sint. Quæ omnes particulatim faciliè dignosci que-
runt. Nam si ab inanitione excitetur, ex præcedentibus
causis inanitionis, vt immodico sanguinis fluore,
aut alui profluvio, seu reliquis huiusmodi dig-
nosce valebis. Si ex repletionem, ad eundem & plenitu-
dinis signa, sic si ex acris humoribus, & medicata
qualitate præditis, eorum signa aderunt, & vbi vo-
mitu eos reiecerint, statim a singultu liberantur,
veluti etiam si ex cibo corrupto in mordacem qua-
litatem aliqui singulantur: hi quoque à vomitu ita-
tim liberantur. Similiter ex rigore oris ventris, aut
ob eiusdem partis frigiditatē, vel ex deoratur phar-
maco ex tribus piperis generibus singultu contingat,
ex relatione ægri faciliè percipi poterit. Quamvis
pueris maxime ob corruptionem alimenti in
ventre, aut ob eiusdem partis frigiditatem singultus
accidat, Galeno teste, octauo de composit. medic.
secundum locos, cap. 3. Frustra itaque contendere
tempus erit in narrandis aliis signis causarum sin-
gultus, cum promptè quælibet earum percipi pote-
rit, tum ex ægroti sermone, tum etiam ex iis, quæ
suprà diximus. Verum singultus ex inanitione fi-
at, siue ex immodico sanguinis fluore, aut ex ni-
mia purgatione, semper malum erit, Hippocrate
auctore, aphorismo tertio & quarto quinti libri.
Nec minus & malum erit vbi à vomitu singultus
excitetur. Indicat enim vel cerebrum nervorum prin-
cipium, vel ventriculum pati non mediocrem in-
flammationem, ex sententia Hippocratis & Gale-
ni aphor. 3. septimi libri. Similiter & malum erit si
ab ileo singultus fiat, vt liquet apud eundem Hip-
pocr. aphor. 10. præcitati libri septimi. At si singul-
tus in altiore sopore, aut animi deliquio, aut tetanis
obortus fuerit, mortem non longe abesse prælagit,
vt inquit Aëtius: & singultu tamè corruptum ster-
nutatione superueniens liberat, inquit Hippocrates,

Prognosti-
ca.

Curatio, si
fiat ex iura
nitione.

Resolutio.

aphorismo 13. libri sexti, quando scilicet ex plenitudine fiat, ut Galenus exponit. Vbi autem ex evacuatione ortus fuerit singultus, curabitur per alimentum conuenientis assumptionem, & per ea quæ defectum explent, eodem Aëtio teste. & si perseuerauerit adhuc immodicus sanguinis fluor, aut alui profluuium eisdem prospiciendum erit, iis maxime cōducit oleum amygdalarum dulcium potū per se, aut cū aqua tepida, pariter & ptisanæ cremor per se, vel cum confusa pullorum carne. Si verò ex frigiditate, calfacientibus curari debet (Galenus & Aëtio testibus) tum cibis, tum medicamentis. Quapropter in potu ruta cum vino exhibenda est, aut apium, cūminum, calamintha, asarum, pulegium, dictamū, aut nardus celtica, quodlibet eorum per se, aut simul mixta in aqua mulsā decocta, vel etiā fefeli, & daucus, seu castorium ex Galeni Aëtij, & Pauli sententia, vel syrup. de mentha, seu ē corticib. as citri paratū exhibe. Interim quoque drach. j. diacalaminthes, aromatici rosati, aut diarhodon, seu diacinnamomi cum exiguo vino, aut aqua mulsā præbebis. Foveri etiam extrinsecus debet stomachus oleo, in quo ruta, cūminum, & absinthium sint decocta, ut idem Aëtius inquit. Insuper oleo masticino, nardino, costino ab extra uti poteris, similiter & saccelli parentur ex utraque mentha, absinthio, calamintha, ac pulegio ana p. j. macere, caryophyllis, cinnamomo ana drach. ij. corticibus citri, ligno aloës, & chia mastiche ana drach. j. confusis omnibus sacculi formentur, ac calidi per se, seu parum inspersi vino albo odorifero applicentur. Quod si simul cum frigiditate, frigidorum, viscosorumque humorum copia adsit, extenuantibus, & incidentibus utendum est, Alexandro auctore, inter quæ summopere acetum scillinum approbat, ac ipsum oxymel scillinū. Paulus verò, ac Aëtius eis, qui integræ sunt ætatis drach. j. castorij exposita potui tribuunt, quineriam & ipsum forinsecus (ut aiunt) impositum cum oleo ficyonio, aut antiquo commodum existit. Denique (ut Paulus refert) spiritus retentio potens est remedium. Ab extra verò vltus (ut inquit Trallianus) fuit castorio, styrace, & mastiche, oleo ipsa incoquens, agitabaturque inter coquendum oleum ruta, & ex eo stomachum vehementer fovebat, & ubi hæc non suffecerint, per vomitum modo dicti succi vacuandi sunt, præsertim si facile vomant, qui etiam iuuari poterit, ex potu aquæ tepidæ cum oxymelite, etiam scillino si opus fuerit. Et si agrè euomant, per inferna ex hiera, & agarico (nisi quid prohibeat) vel tutius per clysteres purgabis, qui ex eodem agarico, & hiera, rosacoeque melle diacatho, aut medicamento ex dactylis parari poterunt, oleo, & sal adiectis cum mercurialis, caricarum, florum clamemeli, foliorum betæ, ac maluarum decocto. Curat item sternutatio singultum à plenitudine ortum, Hippocrate, & Galeno testibus præcitato aphorismo 13. sexti libri. Nam violento opus est motu, ut veluti concussa ipsi efficiunt humiditates dissilientur, atque euacuentur, hoc autem facit sternutatio (ut Galenus inquit) pariter & vomitus sufficiens erit ipsius medela, ut liquet eodem octauo de compositione medicament. secundum loc. cap. 3. Qua ratione etiam ex Aëtij decreto, cōfert extremarum partium adstrictio, cōpressio spiritus, vociferatio concinna cum plurimo clamore, deambulatio longa, & concitata, gestatio, atque adhuc magis equitatio, & cucurbitulæ cum plurima flamma pectori, sto-

macho, & dorso affixæ. Vbi verò ob caliditatem, Curatio fin
mordacemque acrimoniam singultus fiat, primum gultus à cal
vomitum reperiemus sufficientem medelam, Galenus
& Aëtio testibus. Quod si excrementa rodentia, & liditate et
corrupta fuerint, iis utendum esse constat (ut inquit Trallianus) quæ contemperant, & simul id quod rodit, abstergere possunt. Quapropter temperata aqua, & pane ea imbuto, ac copiosa pituita utendum, item pisciculo aliquo, qui aceti paulū habeat, & pullis columbarum. Obtunditur etiam dictorum excrementorum mordacitas, si intybi succus fuerit potatus, item cucumeris semen decorticatum, tritūque bibitum, & lactuca semen, eodem modo: adhuc portulacæ succus potatus, ipsaque portulacæ in cibo sumpta, & myxarum decoctum in potu acceptum, maximeque omnium tamen præstat (ut inquit Aëtius) lac recens multum, potatum, id verò sit asininum, aut caprillum: adhuc exhiberi poterit vtiliter syr. violaceus, ex nymphæa, de papauere, ac de infus. rosarum, seu de succo cichorij. Conducunt etiam pariter & hæc, si ex cibis in mordacem qualitatem corruptis aliquis singuliat, prius tamen præcedente vomitu, ut diximus. Sic etiam si singultus fiat ex serosis quibuscunque, & medicatis humoribus, stomachum mordentibus. Verum ubi mordacitas ex iis non alteretur, abstergetur, ac discutatur iis quæ sensus stupefactionem inducunt, uti opus erit ex eiusdem Galeni, & Aëtij decreto. In quem vsū drach. j. medicamenti Philonij Perfici, aut Romani exhiberi poterit. Quanquam ipsi pharmacum quoddam mixtam quandam facultatem habens alterandi, discutiendi, attenuandi, ac resiccandi, & sensum obtundendi conscribant, quo etiam, si videbitur, uti poteris. Nam Galenus præcitato libro 8. de comp. medic. secundum locos, nedum idem medicamentum Asclepiadis auctoritate conscripsit, sed particularim quodlibet medicamentum simplex, quod in ipso ingreditur, exposuit, ac eius vires examinavit. Ab extra verò oleum rosaceum, citoniorum, de papauere, ac ex nymphæa applicari poterunt quodlibet eorum per se, aut cum aliquo aliorum permixtum, adiiciens solani, aut portulacæ, lactucæ, seu intybi succum, nec non aceti parum. Verum si ob ipsius ventriculi, aut alterius visceris inflammationem singultus fiat, ex eiusdem inflammationis curatione sedabitur. Id verò ex iis quæ paulo post dicemus, patebit. Similiter si fiat ex spiritu flatuoso, eis quæ ipsum discutunt intus, ac extra adhibitis soluitur. Consulto etiam prætermisimus particularem victus rationem singultus, prout diuersa exigebat eius causa, ne nimium prolixi essemus, tum quoniam studiosi ex iis, quæ diximus in aliis stomachi affectionibus pro causarum diuersitate petere poterunt.

Πολλὸν ἰσχυρὸν, ἀναισθητικόν, ναυστικόν, ἢ ναυστικὸν καὶ ἐμετικόν. Id est, de supinitate, stomachi sub-

uersione, nausea, & vomitu.

CAP. LXVII.



VAMVIS venter cum pro natura lege se habeat, trahat quidem ad se supernè per stomachum, deorsum verò excernat, tamen cum ab aliquo, quod morfu, ponderève contristet, vexatur, eicere id statim cupit, & quocunque vergit, id quod offendit, eo abutitur ad expulsionem, & interdum si toti ipsi ventriculo talis affectus con-

Cap. 3.

cap. 3.

tingat, utroque etiam eius ore vitur ad expellendum, Galeno teste tertio de causis symptomatum. cap. 2. Non ab re itaque in hoc expulsionis conatu, in eo plures excitari possunt deprauati motus, ac symptomata expultricis eiusdem ventriculi facultatis. Verum nos posthabitis his, quæ proueniunt, cum venter eicere cupit per infernum os in pyloro existens, quoniam de his infra pertractabimus, de eis mentionem faciemus deprauatis motibus expultricis facultatis ventriculi, qui (præter iam dictos) ipsi accidunt, cum cupiat id, quod contristat, excernere per supernum os in gula existens. Ij autem plures sunt, prout diuersimode offensus ventriculus ipse à diuersis fuerit. Nam quidam est, qui à nonnullis Grecis *ὑπὸ τῆς σφύξης* Latinè verò supinitas stomachi appellatur, qui affectus contingit quâdoque iuxta intemperiem quamecunque ipsius stomachi, citra tamen vitiatos humores. Fit etiam per humiditatem multam quidem, non tamen malignæ qualitatis, vt liquet ex Galeno 8. de compo. medic. secundum locos. Iriguus enim stomachus (vt ipse inquit) per largam humectationem similiter vt ligamenta neruorum, lassatur. Quidam verò à Grecis *ἀναγώνη*, à Latinis subuersio dicitur. Quanquam hæc vox indifferenter duo significare poterit ex eiusdem Galeni auctoritate. Nam quandoque appetitus perditionem sic appellare possumus: interim verò nauseosas affectiones ab accepto cibo fientes: contingit etenim quâdoque hoc vnum solum symptomata accepto cibo, vt si paulo fortiori motu moueantur, statim vomant. Appellant aliqui etiam taleis stomachicos. Verum hæc affectio quandoque ad solam oris ventris debilitatem sequitur, quod cibos amplecti, eisque obuolui non potest, velut tota ventris amplitudo solet. Quandoque verò & cum vitiatæ alicuius, modicæ tamen humiditatis, complexu. Nam multa quemadmodum & valde vitiatæ citra cibum nauseam efficit (vt posterius dicemus) quam nauseam Græci cum *ναυτίαν*, tum *ναυρίαν* appellare solent. Quandoque ipsa ventriculi vis ad alium deprauatum excitatur motum, vt quæ ipsum contristant, detrudat, qui licet non idem sit cum singultu, eiusdem tamen generis est, vt eidem Gale. liquet comment. aphor. 39. 6. lib. maioris, ac minoris ratione differentes. Nam vehementior ille, mediocrius autem hic stomachi motus existit (vt præcedenti capite dictum est). Appellatur verò à Grecis *ὑπὸ τῆς σφύξης* à Latinis vomitus. Verum quanquam quatuor hi affectus nominati paulò inter se dissideant, tamen nos quoniam primus, qui stomachi supinitas appellatur, facillimè curabilis est, quia aut adstringentibus solis, aut quæ siccare humiditatem possunt, ac constringere laxatum corpus, curabitur, aut alterantibus, vel eisdem simul mixtis, de quibus in cura nausea, & vomitus mentio fiet, amplius verba de eo non faciemus, velut neque de ea, quam Græci *ἀναγώνη*, Latini subuersionem nuncupant. Nam si ea *ἀνὸς τῆς σφύξης* hoc est appetitus perditionem significabit, iam eius curam cōscripsimus. Si verò per eam intelligatur id symptoma, quod accedit sumpto cibo, vt si paulò fortiori motu moueantur, statim vomant, ex iis etiam, quæ nauseam, & vomitus curabuntur, curari poterit, potissimum cum parum à nausea discrepet, quando à modicè vitiatæ humiditate exoritur. Verum si ob oris ventriculi solum fiat imbecillitatem curabitur vt supinitas. Reliquum est vt consuetum morem seruando, de nausea, & vomitu

à nobis sermo fiat. Ij nanque maximam inter se cōgnationem habent, ac vnus reliquū præcedit. Nam nausea vomitionem præcedit, licet non perpetuò ad nauseam vomitus consequatur, cum nonnulli nausearunt, nec tamen vomuerunt, vt Galenus inquit 2. de caus. sympto. Similiter Paulus cap. 155. lib. 2. dicebat, nonnulli verò turbantur, sed nihil euomunt, humore ipsis tunicis imbibito. Quæ nausea deprauatus est quidam expultricis facultatis ventriculi motus, quo venter ipse ea quæ eius corpus contristant, quàm citissimè per stomachum vacuare appetit, vel breuius, irritus quidam est conatus ad vomendum, vt quidam volunt, seu inanem quædam vomendi irritatio, hæc interdum ad vomitum impellit (vt diximus.) Interim verò & citra vomitionem fit, vt ex Galeni mente declaratum est. At vomitus prauus quoque est eiusdem expultricis facultatis ventriculi motus, quo ea quæ in eius capacitate, seu latiori spacio existunt, ac ipsum contristant, & in se fluitant, reiciat quamcitissimè per stomachum, vt ex eiusdem Gale. verbis colligi potest præcitato lib. 2. de caus. sympt. Ex quibus facillè quispiam colligere poterit tum conuenientiam, tum etiam & differentiam inter nauseam & vomitum. Quod vero in ambabus hisce affectionibus os ventris potissimum afficiatur, liquet apud Galen. cum 2. de caus. sympt. tum etiam 5. de loc. affe. Dixi autem non ab re potissimum, quoniam & totius ventriculi affectiones esse possunt, quemadmodum & reliquæ iam dictæ, vt apud eundem Gal. liquet præcitato lib. 5. de loc. affe. & cum nemo sit qui vereatur ventriculū in hisce affectionibus oblati, easque esse proprias eiusdem affectiones, citra quæ symptomata nihil è ventre per os efferri potest, ex sententia eiusdem Galeni comment. aphor. 43. 2. lib. propterea in hoc sermo protelandus, & tempus contendum non est, etsi ventriculus per se quandoque per consensum, maxime in vomitu afficiatur, vt ex causarū enarratione patebit. Verum qui affectus præter naturam sint, non admodum liquet, cum Gale. quandoque naturalis expultricis facultatis symptomata appeller. Interim verò eiusmodi motus licet prauus sint, naturæ opera nuncupet, vt eodem 2. lib. de caus. sympt. scriptum est. At si quis eiusdem verba probè intellexerit, pro comperto habebit, vtrumque verum existere. Nam cum nullum animal nauseare, aut vomere ab aliquo doceatur, imò à seipso, ac à propria eius naturâ, (seu vt ita dixerim) à principio intrinseco, & per consequens naturaliter hos exerceat motus, cui in dubium venerit motus hos naturæ esse opera? At quoniam nunquam natura ipsa taleis exorditur motus, nisi grauata, aut stimulatæ à quapiam præter naturâ causâ, quæ naturam sic violentè moueri cogit, propterea inter symptomata, quæ præter naturam sunt, annumerantur, ex illo si quidem sympto. genere sunt, in quibus causâ aliqua quæ præter naturam est, ad taleis actiones naturam stimulat. Hinc fit, vt symptomata potius, quàm naturæ opera appellari mereantur, cum nunquam ex se ipsa natura taleis exordiretur motus, nisi à causâ aliqua præternaturali fuisset stimulatæ. Et propterea non motus secundum naturam, seu actiones, sed affectiones potius appellari merentur, quia quodammodo ab alio, & non omnino à se natura in hoc opere motū habet, irritata scilicet, ac coacta à præternaturali (vt diximus) causâ. Contrahit etiam seipsum ventriculus circum ea, quæ ab ipso excernuntur ad

Nausea & vomitus cōuenientia & differentia 2. de caus. sympt. cap. 4. Nausea quid sit.

Vomitum quid sit.

Quæ pars in eis afficiatur.

2. de caus. sympt. cap. 3. 5. de loc. affe. cap. 6.

Leco citat.

Qui affectus præter naturam sint.

tur ad eum modum id quod in se continet, extrudens, quo manus nostræ aliquid exprimunt, ut Galenus inquit. Facultas autem, quæ motum ei præstat, vna è quatuor naturalibus est, expultrix scilicet appellata, cuius propriæ facultatis symptomata sunt nausea, & vomitus, ex Galeni decreto eodem 2. libro de causis sympto. Eiusdem nanque prauus motus sunt, ut diximus. Verum licet vomitus toto genere præter naturam sit, tamen si tempestiue fiat, hoc est cum id quod contrahitur, expellitur, ad animalis cõmodum per eum, non erit symptoma in genere læsionis actionum, sed alteri generi sympt. subiicitur, quod scilicet est affectum præter naturam, ex Galeni decreto lib. de differ. sympto. in fine. Sic quoque de nausea sentiendum erit, si ad eam talis consequatur vomitus. Semper etenim præter naturam quempiam affectum consequuntur. Dignoscitur autem nausea quando ipsa in illa inani vomendi irritatione lancinat tantum ventriculum ipsum & nullum humorem educit, Aëtio teste. Distinguitur etiam à subuersione, quoniam ea non nisi cibo assumpto, hæc autem sine cibo assumpto fit, ex Pauli sententia eodem cap. 54. lib. 2. Quamuis Gal. aliam præter hanc asserat diuersitatis causam, quoniam ea aut propter solam ventris debilitatem, aut cum vitiata alicuius, modice tamen, humiditatis complexu fit, hæc verò ex multa, & etiam valde vitiata, citra quoque cibum afficitur. Vomitus autem signa frustra quispiam conscribere tentauerit. Verum à nausea ipse differt, quia per vomitum perpetuo aliquid extra excernitur, per nauseam autem nequaquam, quamuis ad eam (ut diximus) vomitiones interim consequantur, interim verò non. Hæc symptomata non nullos sectantur ventriculi morbos, qui diuersimode à diuersis quoque causis oriri possunt, ea propter ut manifestior fiat eorum morborum cum dignotio, tum curatio; ad dignoscendas eorum causas me conuertam, quoniam, & in his quoque non exiguum inueniemus inter dicta symptomata differentiam. Sunt verò in vniuersum duæ præcipue prædictorum symptomatum causæ, nempe copia, vel humorum vitium, seu prauitas. Copia siquidem ventriculum grauando, prauitas autem, seu vitium morsum inferendo affligens, ut patet apud Galenum cum 2. & 3. de sympto. caus. tum 8. de compos. medic. secundum locos, & apud Alexan. cap. 13. lib. 7. Atqui copia humorum ex pondere, ac tensione, quæ in ventriculo sentiuntur, percipi poterit, ita ut cum eos ferre non potest ventriculus, ad nauseam seu vomitum excitetur. Verum si ciborum fuerit hæc copia facile ex ægri, vel adstantium sermone percipi poterit, quemadmodum si sine cibis tensio, seu pondus sentiat, humorum esse copiam coniectandum erit. At si non multi, sed prauis humores fuerint, qui ventriculum obfederunt, si biliofi fuerint, oris amaritudo, sitis, atque ardor simul cum morfu in ore ventriculi & inappentia aderit, & absumpti cibi in amarum, seu nidorosam qualitatem vertuntur; quemadmodum si frigidi fuerint neque siticulosus erit æger, neque ardorem in ore ventris sentiet, sed e contra frigus, & quandoque immodicè appetet, percipietque in ore acidam qualitatem, aciescentque in ventre cibi assumpti, & si dulcis fuerit pituita, eandem sentiet in ore qualitatem, verum si falsa sit, sitis quoque in his augebitur, minueturque appetentia, ac fortasse abolebitur, præter id quod similem quoque sentiet in ore

qualitatem. Quod si vomitus ad has causas consequatur, facilius per vomitionem redundans succus dignosci poterit, tum visu à medico, tum gustu à laborante. Verum ubi saniosi, serosive, ac tenues fuerint redundantes humores, non solum ante cibos, sed & post acceptum cibum vomitum inducunt, perpetuo nimirum motu versati ex Aëtij sententia cap. 10. lib. 9. Ex vitiosis autem cibis deuoratis, aut ubi in ventriculo fuerint corrupti, si vomitus fiat, facile quoque ex laborantis, aut adstantium relatione simul cum vomitionum qualitate percipitur. Atqui neque hoc satis erit pro causarum dignotione, sed diligenter considerare oportet, num in ventrem duntaxat tales redudent succi, an ex aliqua quadam parte, seu ex vniuerso corpore humores in ventrem confluant. Ad hæc nū in lato ventriculi spacio contineantur, eoque fluent, innatentque, an in eius corpore infarcti, aut infixi fuerint? seu eius tunicis adhærescant, qui generantur in ventriculo humores, aut ab aliis partibus transfinitantur? Hæc nanque cognitu perquam necessaria sunt, viròque indigent exercitata considerationis. Nam si vniuersum corpus fuerit affectum, plethoricum quidem ex plethoræ signis id iudicabis. Si ex vitiosis humoribus repletum, id ipsum ex colore, & eruptionibus papularum circa cutem cognoscitur, atque ex ipsa adeo vrina (ut inquit Aëtius.) Quod si non ab vniuerso corpore, sed ab aliqua eius parte ut capite, splene seu hepate humor ad ventriculū fuerit transfusus, æger ipse primum affecti membri læsionem sentiet. Aut enim caloris sensus iuxta affectū membrum ipsi contingit, aut frigoris, aut grauitatis, aut etiam tactui nostro durum succumbit. Nec nausea intensa & crebrior, si ipsa excitetur, aut vomitus, si is quoque fiat, crebrior, & intentus erit, sed leuior & insigni aliquo spacio interposito vrgebit, totiusque præter hæc corporis habitus perpetuo considerandus erit. Ab iis illud existimandum erit, quam victus ratione sit vsus, verum ne frequenti cruditate, aut satietati incidit, idque in otiosa vita, ac præcipue præter consuetudinem, an contra. Illud deinde perpendendum an aliud membrum corporis certo temporum circuitu vexari solitum nunc non vexetur, vel aliqua consueta excretio iis retenta sit. Verum si nihil horum addit, & crebre, intensèque, nulloque insigni spacio interposito vrgebunt prædictæ affectiones, certum est ventrem ipsum per se, ac primario affectum esse, redundantesque humores in eo esse genitos. Num verò in latiori eius spacio contineantur, ac fluent redundantes succi, vel in eius corpore adhærescant, seu infixi sint, hoc modo interstingues. Etenim si vomitus statim post nauseam obortam, etiam citra violentiam comitetur, humorem noxium in lato ventriculi spacio esse non dubie censendum. Sin autem nausea quidem excitata fuerit, verum nihil notatu dignum per vomitiones efferatur, humores noxios, si bilioli sint, vel serosi, in ore ventriculi absorptos esse, vel si viscosi sunt, ipsi ori ventriculi infixos esse, intelligito ex Tralliani decreto. Nam cum humor quispiam in ipsis ventriculi tunicis contineatur, nausea quidem vexabit, sed inanis, & sine vomitu, & quæ irritat duntaxat, nullum humorem euacuans, Galeno auctore 1. de locis affectis, cap. 4. Quamuis humores crassi, ac viscosi, qui superficiem ventris infarcti adherent, ante cibum etiam magis nauseas, atque inaneis vomitiones moueant, & propterea nil mirum si ex ta-

2. de cau. sym. cap. 3.
3. de cau. sym. cap. 2.
8. de compos. medic. secundum locos. cap. 3.

Nausea, & vomitus causæ.

Nausea signa. Aet. lib. 9. cap. 10.

Læsciat.

libus oriatur succis nausea, quod vomitus eam non sequatur, potissimum si expultricis facultatis quoque adsit imbecillitas, veluti etiam non raro evenit, quod ea robusta existente, humoribusque tenuibus in ventriculi tuniculis existentibus, exigua quædam eorum portio ex nausea violenta in ventriculi capacitatem effundatur, ac proinde excitato vomitu per os eiciatur, & hæc esse in causa mihi videtur, quod interim vomitus nauseam comitetur, quandoque verò citra vomitum nausea fiat. Quamquam succis etiam in ventriculi spacio consistentibus, nausea illa exigua quæ vomitum præcedit, excutitur similis ei affectui, quem Græci *ἔμετος* vocant, qui tussim præcedere solet ex Galeno auctore eodem 2. lib. de causis symptom. id quod etiam Aëtius confirmavit, licet à quibusdam prauè eius verba fuerint intellecta. At si quispiam scire cupiat cur absorpti, seu infarcti in tunicis ventriculi humores ipsius corpus molestantes, præsertim qui morsum inferant calidi, vel frigidi existentes singultum potius quàm nauseam efficiant? Respondebimus nos eos cum non adeò morsum inferant, nauseam excitare, cum verò mordacitatem validam efficiunt, singultum promouere, & propterea non semper humores etiam mordaces in ventriculi corpore impecti singultum efficiunt. Neque etiam nauseam, sed quandoque vnum, interim alterum symptoma excitant propter iam dictam causam. Verum à vomitu singultus, & oculorum rubor malum esse inquit Hippocrates aphor. 3. 7. libri, quemadmodum etiam à tuberculi introrsum ruptione vomitiones si fiant, malæ sunt, eodem auctore aphor. 8. eiusdem libri, & iterum ab ileo malus est vomitus, ut idem inquit, quoniam is non semper adest, sed quando exitiales ilei sunt (Galeno auctore com. aphor. 10. lib. 7. Nausea verò quandoque (ut quidam volunt) signum crislum existit, interim verò signum malum, ut in febribus pestilentibus: quando in conualescentibus multiplicatur, indicat reciduum. At vomitio vtilissima est, si pituita ac bile permixta quammaximè fuerit, si non multa nec crassa sit. Sin cerior enim deterior est, siue fuerit porracea, aut liuida, aut nigra, quicunque ex his fuerit color, malum esse censendum est, auctore Hippocrate 2. prognost. Exitiale quoque admodum est, si idem homo omnes vomit colores. Et si vomitio liuida graue oleat ocysimam indicat mortem, & (ut summam dicam) omnis subputris, ac subfoetidus odor in omni vomitione malus est, Hippocrate auctore præcitato loco. Quod autem interdum vomitus valetudinis causa rectè fiat, experimentis credens Celsus approbavit. Commonet tamen, ne quis qui valere, & senescere volet hoc quotidianum habeat, ut liquet lib. 1. cap. 3. Pro dictarum autem affectionum curatione illud primum animaduertendum est, quod vbi ex immodica humiditate citra vitiatos humores fiant, quæ velut mador quispiam circa affectam partem existens sola quantitate, & copia affligat, & veluti irriguum os ventris reddat, aut totum ventrem ob eandem multam humiditatem exolutum, ac laxum habeant laborantes, vtilissimus adstringentium eduliorum, potuum, ac pharmacorum vsus existit, languido nimirum, exolutoque tunc reddito ventriculo ipso admodum laxatorum articulorum, ut liquet apud Galenum 8. de compositione medicamentorum secundum locos. Quemadmodum vbi vitiatum fuerint redundantes circa ventrem,

& stomachum humores, in maximum perueniunt detrimentum agri, ex adstringentium eduliorum, potuum, ac pharmacorum vsu, ex sententia eiusdem Galeni præcitato loco, & Pauli cap. 54. lib. 2. Verum si iam dicti succi præter id quod viscosi non sint, frigiditatem permixtam habeat, calfacientia prædictis adstringentibus misceri debent ex eorundem auctorum decreto: humida nanque intemperies siue sola consistat, siue cum calore, frigoreve coniuncta sit, omnium facillimè curatur, ut patet 7. method. medendi, cap. 9. Ad hæc sciendum quod veluti graueolentia omnia stomachum subuertere solent, sic odorata corroborare. Quapropter cum ea multiplicitè auxilièntur stomacho, ob vitiatos serofos humores subuerso, nedum in medicamentis ipsis, verumetiam in cibis permiscenda erunt. Et quoniam diximus per consensum quandoque à toto, vel à quapiam corporis parte affectiones has gigni posse, quæ quidem curari handquaquam possunt, nisi prius totum corpus, aut primario affecta pars curetur, ita tamen, ut neque eodem tempore ventrem ipsum negligamus Galeno eodem auctore præcitato loco. Propterea de iis à nobis sermo non fiet, sed eius duntaxat nausæ, & vomitus curationem aggrediemur, qui causam habent nedum in ventriculo contentam, sed in ipso etiam genitam, quo fit ut propterea etiam de nausea, & vomitu ex bile ortis verba non faciamus, cum neque ipsa in ventriculo oriri possit, nisi ab aliis partibus, iocinore præsertim, aut eiusdem bilis vesica ad ipsum transmittatur. Ac itaque eligatur, ad calidum vergens, item somnus, quies, ac etiam moderata inedia competunt Alexandro & Paulo testibus. Hoc enim victu (ut inquit Alexander) pituita non solum alteratur, extenuaturque, sed etiam in sanguinem benignum, probèque conuertitur, ut eiusmodi quoque humor per inopiam alimenti nutrire possit, præsertim vbi dulcis fuerit. Quamquam in vomitionibus frequenter, & paulatim cibus offerendus est (ut inquit Paulus) præsertim vbi biliosi fuerint. Decubitus autem sursum vergens in omnibus quomodo cunque nauseantibus, & vomentibus adornetur in conuenienti, & affectioni contraria domo, Aëtio auctore præcitato loco. Vbi autem vires in ediam etiam moderatam non ferant, contusa carnes, ac iura pullorum, seu gallinarum tribui poterunt pro cibis, modò eorum quantitas modica fuerit, cum quibusdam odoratis parata, ut cinnamomo, caryophyllis, seu aniso, coroneis etiam, aut mali punici granis simul incoctis, aut exiguo omphacio, & aqua rosacea adiectis. Quòd si contusas carnes, seu iura assumere noluerint, poterunt ipsas quoque carnes gallinarum, pullorum gallinaceorum, columbarum iuuenum, phasianorum, perdicum, turturum, turdorum, merularum, leporum, ac capreolorum iuuenum, commodè pro cibis capere, & interim easdem assas adiectis prædictis odoratis, interdum etiam elixas, & præter iam dicta odorata decoqui cum eis possunt hyssopum, pulegium, serpillum, sampuchus, fœniculum, oreoselinum, thymus, & reliqua huius classis, potissimum vbi crassa, & tenax pituita in causa fuerit, & tunicis adhærescens, atque impecta. Pro potu vinum exhibeatur rufum, subadstringens, & vetustius, ut inquit Aëtius, vel aqua mulsa. Vinum nanque adeò calefacit ventriculum, ut in qualitate eius calorem non intendat, licet eiusdem substantiam augeat, & mel despumatum ipsum per se optimè nutrimentum

De odoratis notat

7. meth. 11. Vt illius ratio.

2. de caus. sym. cap. 4. Dubium.

Ratio.

Prognostica.

Aphor. 10. lib. 7.

Tex. 38. & sequentibus.

Curatio.

cap. 2.

trimentum frigido ventriculo est, ut liquet 6. meth. med. cap. 7. A cibis autem semper cotonea mala, mēspila, corna, forba eos fructus quos azarolas vocant, aut alia pyra adstringentia, seu mala punica gustare poterunt. Exiguam autem quantitatem de eis capiant, ut cibum duntaxat continere vascant. At quod natura, vel arte alui excrementa subducere quotidie conferat, ac vitare immodicos animi affectus, cuilibet patere poterit. Caterum ubi tenuous, ac serosi fuerint vitati humores, qui stomacho impatti nauseam efficiunt, confestim vomitu eiiciendi sunt, qui digitis, aut pennis immisis proritari debet, vel liberaliori tepida potu, seu tenuissimo pituitosa succo exhibito, ut Alex. & Aetio visum est, vel etiam mulsā ex Galeni & Pauli sententia. Verum eo casu tam pituitosa cremoris, quam aqua mulsā sumendum plus est ex eiusdem Galeni decreto 7. meth. med. quam vel nutrimenti, vel etiam deiectionis causa sumeretur. Idoneum quoque est (eodem auctore ibidem) si mulsā, in qua incoctum absynthium sit, bibatur. Nam id quoque (ut ipse inquit) tenuous succos, quicunque videlicet in ipsius ventriculi ore continentur, comode deorsum impellit. At si difficulter vomant, nedum prædicta mulsā, in qua incoctum absynthium sit, uti poterunt, verum & aliis quoque purgantibus medicamentis, quibus prædicti redundantes serosi succi deorsum impellantur. Sunt autem ad eiusmodi affectus, ubi scilicet vitiosi succi in ventriculi tunicis fuerint recepti, idonea pharmaca, ex genere eorum quæ modice purgent, sicut eorum vis super ventriculi, & intestinorum loca non ascendat, aut si quid ultra vasa quoque in mesenterio contingat, speciatim verò quæ ex aloë composita sunt, aptissima, & si illa præsto non sint, aloë ipsa per se, ut liquet eodem septimo meth. med. cap. 11. Nam ubi humiditas vitata tunicas ventris, perrigat picra ex aloë utilis est expurgas humiditatem, eodem Galeno auctore octavo de compositione medica. secundum locos, cap. 2. Exhibeantur itaque ipsius medicamenti ex aloë, & potissimum ea elota drac. ij. aut ipsiusmet aloës (ubi ipsius medicamentum haberi nequit) drac. j. vel drac. j. s. formati ex ea seu iam dicto medicamento composito, catapotis, postquam per aliquod tempus vnc. ij. vel. iij. syr. ex pluribus infus. rosarum rubearum, vel persicarum exhibere convenit, vel drach. s. prædicti medicamenti ex aloë assumens diacath. drachm. iij. cum vnc. j. pulpa casia fistula bolus figuretur, ac tribuatur. Poteris quoque vice prædicti medicamenti drac. j. elotæ aloës admiscere, namque ea licet purget minus, roborat tamen ventriculum magis, ut eidem Gale. visum est. Verum quibus lenta pituita ventriculo est infixā, iis prius exhibenda sunt quæcunque hanc diffecent, postea purgandum. Quod si ad vomendum sunt idonei, non inutile erit per radicula ex oxymelite euomere, eodem Gal. auctore præcitato lib. 7. meth. med. cap. 11. Si verò inepti ad vomendum sint, nedum ipsum oxymel tribuendum erit, quo frigidi, crassi, & glutinosi humores attenuentur, ac diffecerint, verum etiam & ipsum oxymel scillinum cum aliquorum incidentium, repurgantium, calefacientiumque decocto, veluti est hyssopum, serpyllū, pulegium, absynthiū, feniculi, & oreofelini, ac caprarum radix, quibus sæpius assumptis, prædictum quoque pharmacū ex aloë præberi poterit, & si videbitur, robustis potissimum corporibus trochiscatum addas agaricum, ex eo drach. j. assumēs. Verum ubi

pituitosi succi acidi, aut dulces fuerint, eos concoquere tentandum est, ipsi natura in hoc opere ferendo, quiesce, inedia, & somno (ut diximus) ac aliis, quæ concoctioni tum intus, tum extra opitulantur. His quoque peractis ad ea, quæ stomachum, ac ventriculum ipsum roborant, ipsorumque intemperiem alterant intus, ac extra adhibita cōfugiendum est. Quapropter medicamentum, quod ex calamintha constat, seu pharmacum ex tribus piperis generibus, aut aliud quoddam consimile commodum existit, ex vino tenui, aut aqua potatum si drach. j. eorum exhibeas, in quem usum confert diacinnamomum, aromaticum rosaceum dianisum, ac medicamentum ex xyloaloe cōfectum, insuper diarhodon, si simili potest eodem modo exhibeantur. Forinsecus autem (ut inquit Aetius) stomacho mastichen chiam vnguento nardino dilutam, & tritam, purpureaque lana exceptam imposito. Vel recipe chiam mastiches, & aloes ana vnc. j. diluantur, & dissoluantur in oleo de absynthio, ac nardino, & similiter cum purpurea lana ventriculo imponantur, aut olei mastichini, & de absynthio, ac nardini, sing. vnc. j. excipe, & mentha sicca, cinnamomi, maceris, & galagæ ana drac. j. chiam mastiches drac. iij. permisce, & cum pauca cera vnguentum facito, ac imposito. Item utriusque mentha, & absynthij ana p. j. excipe, cinnamomi, chiam mastiches, & ligni aloes ana drac. ij. corticum citri, maceris, calami odorati ana drac. s. caryophyllorum scrup. j. rosarum rubearum siccarum manip. s. Omnia contundito, simulque misceto, & sacellos in scutiformi figura formato, ac stomacho imposito, qui insuper macerari in vino græco, aut guarreto poterūt, in quo absynthij parum fuerit decoctū, & sæpius iterati calidi applicentur. Verum ubi emplastris magis uti volueris, chiam mastichē assume, quæ in oleo nardino, ac de absynthio diluatur, ac maceretur quantum satis sit, ac dimidiam quantitatem eius, ipsius aloës adice, adeo ut in emplastri formam redigantur, in corioque scuti formā obtinente extendas, & vtere, & si maius cinnamomi, maceris, caryophyllorum, ac calami odorati exigui pulverem addere poteris, ex torrido item pane, vino græco, aut guarreto macerato, & vtraque mentha, ac absynthio confusis, ac cinnamomi aloes, & chiam mastiches pulvere optimum medicamentum ad frigidum, ac laxatum stomachum parabis. Sæpe tamen accidit, ut in ipso ventriculi sinu contentus humor vomitum excitet, qui humor per vomitum etiā expurgatus causa est, ut prior vomitus facile quiescat, & propterea non ab re prouocari etiam debet cum aliquo ex prædictis vomitus. Pari etiam ratione ubi multa, aut corrupta alimenta in eo taliter contineantur. Namque utilis est vomitus plenis, & biliosis omnibus, si vel nimium se repleverunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plus est quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur non oportet. Si verò corruptum est, nihil commodius est, quam id qua via prædictum expelli potest, eiicere, Celso auctore eodem cap. 3. libri primi. Id quod dicere solent medici, Vomitus vomitu curatur. Quanquam non propterea enertunt Hippoc. sempiternæ veritatis axioma, quod videlicet contrariorum contraria sunt remedia, & quod curatio perpetuo à contrariis fiat, cum per vomitum humores euacuantur, qui nauseam, & vomitum stomacho inferebant, & propterea per contrarium sit curatio. Nam prorsus euacuare alienum, naturæq; inimicum humorem, eius-

Commen. 2 dem retentioni contrariū est, Galeno auctore sexto
Commen. 9 de Morbis vulg. rescindit etenim vomitus eum affectum, ob quem prius & nauseabundi agri erāt, & vomebāt causa per eum abscissa. Verū vsque adeo iuuari à medico vomitus debet, quo ad naturā com modum fiat, ac per eum id quod contristat, expellatur: vbi autē immodicus fuerit, nec ad animalis cōmodum fiat, sed per eum id quod non deberet expelli, excernitur, & propterea non cōferat, is reprimi debet Hippoc. auctore aphor. 2. primi, & secundo quarti libri. Quo casu (vt inquit Aëtius) extrema corporis partes fricētur, manibūque calefactis palpentur, & violentius adstringantur, deinde pedes, & manus in aquam solito calidiorem demittantur. Stomachus quoque absynthij cremore irrigetur, apio insuper, cumino, aut petroselino adiuncto, vtraque mentha, ac spica, necnon cinnamomo, & chia mastiche, seu calamo odorato, macere, & galanga, pauco vino adstringēte odorifero addito. Ex iis quoque epithemata fiat, vbi prædicti fuerint redundantes succi frigidi. Nam si calidi fuerint à toto, vel ab aliis partibus trāsmissi, santalum, rosa, corallum, ac alia infrigidatā absynthij cremori adiungenda sunt. Odoramenta etiam, vbi immodicus fuerit vomitus, naribus olfacienda admoueantur, ex eiusdē Aëtij decreto, velut sunt rosa, mala cotonea, pulegium, mentha, spica nardi, vel ex aqua rosea, myrtina, ac florum citragulorum cum pauco aceto roseo odoramentum fiat. Poteris insuper addere santalos, citri corticis, ambra, seu moschi parū. Ceterū affectione diutius permanente, & cibis præ morbo non retentis, cucurbita ad os ventris cum plurima flamma affigatur, donec locus rubescat, atque ipsa adhuc affixa, cibus præbeatur, ex eiusdē Aëtij monumentis, ac Pauli cap. 55. lib. 2. Cibus autem frequenter, & paulatim dari debet, vt dictum est antea, post quem semper aliquod adstringens præbeas. Ex palmulis quoque, malicorio, & galla, vino adstringenti incoctis, & pane tosto simul contrito, puluereq; chiaz mastiches, ac cinnamomi cataplasma applicandum parari poterit. Et si biliosi fuerint succi, ac calida ventriculi intemperies acacia, hypocistis, balaustium, rhu cataplasmati adiungantur, ac prædicta in posca decoquantur. At quotidianas autem nausæas, & acescentem cibum, ac vomitus, coriandri semen tenuissimè tritum cochleari mensura veluti farinam aquæ inspersum bibendum præbet Aëtius, aut mastiches cochleare ex frigida aqua, vel lactuca alba semen cochleari mensura ex aqua iis qui stomacho exuruntur. Ad vomitum restinguendum confert ex Plinij Secundi sententia libro secundo, cap. 11. si mastiches vnc. j. cumini denarium vnum accipias separatim trita, postea vna passa enucleata permisceas, & linteo inductum stomacho suppones, similiter methacacumina cū succo mali granati trita, & potui data, & ad eos, qui cibū cōtinere nō possunt, & eiiciūt, betonica denarios duos accipe, mellis decocti, quod sufficiat pastillos facito, & ex his pastillū vnū glutiat, ex aquæ calidæ cyathis duobus, vt ipse inquit. Sanguinis autem vomitus cap. de cruenta spuitione studiosi remedia petant.

Περί φλεγμονῆς τῆς ἐν τῷ στομάχῳ καὶ ἐν τῷ ἐνδοκρίῳ. Id est, De inflammatione stomachi, vel ventriculi.

CAP. LXVIII.

VELVTI ceteræ corporis partes, sic quoque stomachus inflammatione tentari potest, quæ licet variis modis in Ga-

leni doctrina intelligi possit, hic ea duntaxat, quæ ex calidis redundantibus succis oriri consuevit, per φλεγμονὴν hoc est inflammationem intelligi volumus siue sanguis fuerit, siue bilis, aut vterque quomodocunque permixtus. Cum itaque ea oriatur siue in ore, siue in alia quavis ventriculi parte, ex dolore simul cum posito pars ipsa affecta facile dignoscitur, similiter & ex proprii eiusdem partis muneris oblatione, appetentiæ liquidem, si in ore ventriculi, concoctionis autem, si in eius cavitare excitetur. At quod ipsa morbus compositus sit in magnitudine primò, & secundò in intemperie, & tertio in soluta continuitate, luce clarius patet apud Galenum cum lib. de differentiis morborum, cap. 12. tum 3. de temper. cap. 5. lib. de inequali intemper. cap. 3. ac reliquis plerisque locis. Quapropter non ab re eam insequuntur tumor præter naturam, grauitatis, ac multi caloris sensus, & dolor circa partem affectam, accedunt ad hæc sitis valida, & febris ardens, tumor autem & calor etiam tactu à medico iudicari queunt. Nausea quoque consequetur, propterea quod inflammationis causa in ventriculi tunice contineatur. Verum vbi biliosus magis redundet succus, ita vt inflammatio erysipelatis naturam referat, vehementer erit ardor, sitis immoderatio, ac ardentissima febris, sed minor tumor, ac grauitas. Ex quibus etiam signis interstingui poterit diuersa causa eiusdem inflammationis, præcedente victus ratione, ætate, temperamento, anni tempore, ac reliquis non prætermisiss. At vbi stomachus inflammationem sustinerit, magna opus est diligentia, vt inquit Alexander cap. 14. lib. 7. Quoniam maximum morbum, & necessitatem corpori affert. Quod si imbecillis fuerint viribus, qui ea laborant, mortifera vt plurimum esse solet. Quamuis nedum ijs, sed etiam qui valentiores ipsis sunt, ab ea interimi consueuerunt. Nam quibus vel iecur, vel ventriculum phlegmone obsidet, veluti pleuriticis peripneumonici, ac synanchicis vna salus est, videlicet ipsum virum robur, ex Galeni decreto decimo methodi medendi, cap. 5. Pro eius itaque curatione aer temperatus, seu parum ad frigidum vergens eligatur. Somnus item moderatus, aut paulo breuior. Nam si longior fiat quam oportet, potius ipsa inflammatio augetur, deterto insimul in tali somno intus, nedum præter naturam calido innato, sed alieno, & eo qui præter naturam est, ad quorum deentionem non immerito inflammatio ipsa (vt diximus) augetur. Similiter quies iniungenda est, motusque vitandus, nam prima sunt (vt inquit Celsus cap. 5. libro quarto) quies, & abstinencia. Et si alius suapte natura humecta non sit, lenibus clysteribus lenienda erit. Immodici animi affectus non parum nocent, & propterea vitandi sunt. Quantum verò ad cibum, & potum attinet, dicebat Galen. decimotertio methodi medendi, cap. 13. quod in inflammatione cum iocinoris, tum ventriculi exquisitissimo victu est opus, quippe cum munus eorum toti animali commune sit, acceditque omnibus animalis partibus maximum incommodum, siue non probè concoctum alimentum sit, siue non ritè in sanguinem conuersum. Quamquam commune sit in qualibet partium internarum inflammatione tenuissimo vt victu, modò vires valeant. Speciatim autem vt possunt, qui stomachi, aut ventriculi inflammatione laborant, pro cibo, pristana, seu eius cremore, & si erysipelatis magis naturam referat,

*Partis affe-
ctæ digno-
scitio.
Quis affe-
ctus præter
naturam
inflammationis
eiusdē
stomachi
signa.*

Causa.

*Pregnatio-
ca.*

*Curatio
victus ratio.*

referat, uti poterant lactuca, cichorio, seu endiuia, quam vulgus scariolam vocat, in aqua hordei decoctis, aut in paruorum pullorum gallinaceorum iure. Pro potu aqua hordei vntur, aut ea, in qua semina coriandrorum preparatorum fuerint decocta, seu exiguum cinnamomum, cui iterum adicere poteris succi malorum puniceorum acidorum parum. A vino autem, & carnibus quibuscunque omnino abstinendum, quoad vires valeant. Confestim autem, modo nihil prohibeat, vena secanda erit, eaque interna, praesertim vbi totius corporis plenitudo addit omnium humorum ex aequo, aut ipsius sanguinis, & prout vires ferunt, sanguinis quantitas extrahatur, etsi opus fuerit denuo repetatur. Vbi vero bilis redundauerit magis, eade quoque vena secanda erit, minor tamen sanguinis quantitas educenda. Vtendumque pariter in vtrisque frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, ac reliquis diuersionibus, praesertim circa initia, ac omnino a medicamine, quod aluum deiciat, abstinendum eo tempore est, quo phlegmone ventriculum, aut intestina occupare coeperit, siquidem longissime a tentata fluxione parte quod redundat reuellere, nequaquam ad eam trahere conuenit, ex eiusdem Galeni sententia praecitato libro 13. methodi medendi, cap. vndecimo. Post haec ad ea, quae extrinsecus applicantur, confugiendum est, quae mixta facultatis esse debent, quemadmodum in inflammatione iocinoris dicemus, idque non in generatione phlegmone modo (vt Galenus inquit) nam id omnium inflammationum commune est, quando etiam si quis repellentibus tantum illo tempore vtatur, non peccet, sed etiam cum nec afficiat amplius quicquam, nec repelli possit, id quod in laborante particula continetur, propterea quod tunc multus in ea sanguis contineatur, isque crassior, atque vehementer impactus, & virtus partis iam debiliore est, vt pote cum in suo vigore consistat, quo tempore vna duntaxat quae a phlegmone sumitur, agendorum est indicatio, hanc *ἡσυχαστικὴ* Graeci vocant, huic tamen ea, quae a parte affecta sumitur indicatio eodem etiam tempore copulanda erit. Quae quoniam ex numero earum est, quarum munus toti corpori est ex vsu, siue os eius, siue cauitas afficiatur, propterea robur eiusdem seruari debet. Non ab re itaque coeuntibus contrariis indicationibus, compositum quoque esse medicamentum oportet, eodem Galeno teste praecitato libro 13. methodi medendi, cap. 16. Id quod commune existit omnibus partibus, quarum functiones viles toti corpori existunt, vt ipse inquit. Ob hanc igitur causam a principio ad finem vsque mixta curatio esse debet ex adstringentibus, ac laxantibus. Attendendum autem (vt inquit Alexander) quia re magis opus sit, atque eius copia magis intendi debeat: quamuis circa initia semper adstringentia intendi debeant. Nam etsi eis duntaxat vtaris eo tempore non peccabis, ex Galeni auctoritate, vt diximus eodem decimotertio methodi medendi, cap. 16. Qua de re oleum omphacinum, rosaceum, aut citoniorum adhiberi poterit, vel etiam de absinthio potissimum vbi non valida fuerit inflammatio, aut feruor ingens; vel ex rosas, & absinthio parte vna, floribus chamamelini, radicibus, ac foliis althaeae parte media in aqua pluuiali decoctum fiat, & paucis aceto, aut vino albo rosaceo omphacino, mastichino, ac de absynthio ana vnc. j. chamamelino, & amygdalarum dulcium ana vnc. v. puluere san-

talorum, & corallorum rubeorum, ac rosarum rubeorum sing. ij. drac. ceræ quod satis sit, modicoque vino albo, aut aceto addito vnguentum fiat, & vtetur. Quod si maiora adstringentia requiratur affectus, cenanthen, hypocistis, balauftium, rhu obsoniorum, flores rosarum, ac reliqua huiusmodi adicere poteris, quae ventriculo tum refrigerando, tum vero firmando sunt idonea. Quemadmodum vbi laxatibus magis indigeas, vt pote in incremento, aut summo vigore inflammatione existente, praedictis, quae laxant miscenda, ac augenda sunt, veluti chamamelinum, althaea, semen lini, melilotum, foenum graecum, adeps anserinus, seu gallinaceus, oleum chamamelinum, anethinum, liliaceum, mastichinum, ac vtriusque amygdale, quibus omnibus, aut quibusdam simul permixtis varia medicamenta, prout vsus exoptulabit componere valebis, cum epithemata, tum cataplasmata, tum etiam vnguenta. Actius vero cataplasmata huiusmodi inflammationibus maxime conuenientia fieri praecipit ex hordeo, semine lini, melle, vnguento nardino, modicoque vino, adiecta mastiche, & absynthij coma. Verum vbi moderata fuerit inflammatio etiam Gale. ceratum sufficiens est, cuius descriptio habetur 8. meth. med. cap. 5. Et vbi stomachus magis corroborari postulet, aloem augere conuenit, admiscereque cum eo aut succum absynthij, aut cenanthen, aut succum capreolorum vitis. Caterum vbi phlegmone prorsus inclinauerit, deiciendi ventris causa, qui prorsus non deiecerit, nihil laedes, si vnc. iij. mellis aerei cum decocto vnc. j. tamarindorum exhibeas, aut vnc. iij. syrup. ex pluribus infus. rosarum, vel violarum vbi vehementior sentiat ardor. Amplius si vnc. j. aut vnc. j. & scissae fistulae cum cichorij decocto, aut aqua hordei praebes, nedum nihil nocebis, sed summo opere proficies. Nam neque veretur Galen. hoc tempore etiam in iocinoris inflammatione (vt dicemus) vbi cauius afficiatur, purgantia medicamenta, modo valentiora non sint, exhibere. Immo etiam & valentiora cum pituita permixta approbat, vt patet eodem 13. metho. med. cap. 15. verbi gratia. filiculam, & corticem nigri veratri, quamuis ab hisce adeo valentibus medicamentis abstinere perpetuo, potissimum in internis inflammationibus, consulerem. Si quid vero scirrhum relictum est phlegmone est, ita vt emollientia requiratur, etiam corroborantia, ac adstringentia cum eis permisceri debet, ex Tralliani decreto, quorum medicamentorum magna copia apud eundem reperitur, necnon apud Aetium, & Paulum, & propterea ea vt ea conscribam superfluum fore putavi.

ἡσυχαστικὴ.

Id est. De cruditate.

CAP. LXX.

Alteratrice ventriculi facultate (quam concoctricem appellant, veluti & ipsam actionem, seu alterationem, concoctionem, quae nihil aliud est quam ciborum inconuenientem animali qualitatem alteratio, ex Galeni sententia lib. de differentiis symptom. cap. 4. Fit autem ea a ventriculo cibum sibi assimilare, propter certam quandam elementorum temperie, quae proprietate corporis eiusdem efficitur) accidit quandoque frustratio, quae quidem ipsius alterationis, seu concoctionis symptoma est, eodem Gal. teste 3. de causis sympto. cap. 1. Verum cum frustratur, propterea quod nulla omnino alteratio fiat, id symptoma praecipue a Graecis *ἀνέκτιστος* Bb

Lib. 9. c. 16

Quo tempore purgatio praebetur possit.

Loco citato. Aetio loco citato. Paulus lib. 3. cap. 36

à Latinis cruditas nominatur, modo quo in animi functionibus immobilitas, & insensibilitas dicitur, significantibus his vocibus actionis amissionem, ac priuationem. Quandoque vitiosa alteratio fit, quæ iterum à Græcis *ἀνέψια*, à Latinis quoque cruditas nuncupatur, significatur tamen non sicut prius priuatio, seu deprauatio duntaxat ipsius alterationis. Cum autem deprauatio hæc duplex esse possit, vel quod tardè, & nondum cōuenientem mutationem cibis suscipiat, vel quod corrumpatur omnino, ita ut naturæ gratiam prorsus recipere nequeat, priorem quidem Græci *σπασμένη*, Latini tardā concoctionem nominare solent, secunda verò nomen proprium nō inuenit, ut patet eodem tertio de causis symptom. Sed quoniam diximus *ἀνέψια* nominari posse tam priuationem concoctionis, quàm etiam eius deprauationem, tamē quia æquiuocè quæ vitiosa facta est, cum ea quæ omnino non fit, sic nominamus. Propterea clarioris doctrinæ gratia, priuationem alterationis *ἀνέψια*, eius verò vitium *δυσέψια*, sicuti tarditatem seu imbecillam alterationem *σπασμένη* nominabimus. Erit nanque *σπασμένη*, siue cōcoctionis tarditas mutatio quedam in cōuenientem qualitatem, sed agrè, & spacio longiore, nam velut inchoata, & deficiens in ea actio est. *ἀνέψια* omnimoda priuatio eiusdē actionis, *δυσέψια* verò alteratio in alteram qualitatem, non tamen in eam, quæ secundum naturam est, ut liquet apud eūdem Galenum præcitato lib. tertio de causis symptom. cap. i. Et quanquam cruditas propriè nuncupetur ea concoctionis frustratio, in qua omnimodè priuata est actio, ita quòd alteratio non fiat, nam concoquendi tarditas (ut diximus) *σπασμένη* & eiusdem operis pravitas *δυσέψια* propriè nominari poterunt, omnes tamen nos vniuersali vocabulo vtētes cruditates nominabimus, cum in qualibet earum cōcoctio ipsa frustretur, ut diximus, & ex eisdem ferè causis oriantur, maioris duntaxat, & minoris ratione dissidentibus. At quia concoctionis opus in partibus, ab ipsius ventriculi ore inferioribus fieri nemo negat, necesse est (ut Galenus inquit quinto de locis affectis cap. sexto.) hanc ipsam partem cum non benè disposita fuerit, cruditatum esse causam. Non ab re igitur ventriculus ipse secundum eius spacium seu cavitatem oblaesus est, cum & ipsum coctionis instrumentum sit à natura fabricatum, quomodocumque cōcoctio vitiosa fuerit, modo vitia eiusdē à quopiam externo errore non proueniant. Fieri nanque poterit cruditas aliqua (ut dicemus) absque hoc quod ventriculus afficiatur, ut apud eūdem Galenum liquet, cum primo & quinto de locis affectis, tum tertio de causis symptomatum, cap. primo. Quapropter licet prædicta tria concoctionis symptomata dixerimus, eiusdē functionis frustrationem insequi, non tamen semper intelligēdum erit, quòd facultas ipsa fuerit læsa. Nam cum ab aliquo errore externo aliquid prædictorū efficiatur, nequaquam ipsa facultas læsionem patitur. Erunt itaque facultate ipsa oblæsa prædicta symptomata in genere noxæ functionum naturalium alteratricis videlicet. Verum in vno symptomate, reputa in *σπασμένη* ipsa actio erit diminuta, in *ἀνέψια* ablata, & in *δυσέψια* deprauata. Duo autem priora symptomata facile dignoscuntur. Nam ciborum assumptorū qualitas siue ructare velint, siue vomere, planè seruatur, licet in *σπασμένη* acidi quandoque ructus fiant, interim ventri-

culus halituofo impletur spiritu. Verum deprauatam concoctionem ructus iniucundus proueniens manifestè indicabit, qui modo vnum, modo alterum vitiosum saporem præ se fert. Et si per alium corrupti cibi deiciatur, necessariò aderit deiectionum graueolentia. Causa autem eorum symptomatum communis, alteratricis facultatis frustratio est, ut sæpe diximus. Prima verò eiusdē frustrationis causarum genera duo sunt, ut idem Galenus inquit præcitato libro tertio de causis symptomatum, cap. primo. Alterum ex facultate ipsa læsa, alterum ab externo quopiam errore proueniens. Virtutis autem læsio adhuc bifariam esse potest, aut culpa propriæ substantiæ ex aliqua primarum qualitatū interperie, utpote cum præter naturam calfacta, infrigidata, humectata, aut exiccata fuerit. Vel læditur virtus ipsa ab aliquo instrumentali morbo, ut erysipellate, phlegimonè, ædemate, scirrho, abscessu, & aliis huiusmodi, quorum omnium occasione venter facultate eius concoctrice oblæsa malè concoquit. Verum in eiusdē ventriculi temperamenti vitii propria eius substantia labefactata concoctio læditur, in cæteris morbis, qui tantum sunt instrumentales duntaxat impedita. Qui verò ex intemperie simul, & instrumentali morbo compositi affectus sunt, utroque modo sunt noxij, ex sententia eiusdē Galeni præcitato loco. Ex tot itaque internis causis affectus ventriculus malè concoquit. Verum ipso minime affecto, à nonnullis etiam causis concoctio impediri potest, ut propter cibi, ac potionis immodicam copiam, vel propter eorum qualitatem alienam, aut propter intempestiuitatem, intelligo autem per intempestiuitatem, acceptionem ciborum antequam prior cibis probè subierit, ac etiam præter consuetam horam, similiter propter incongruum ordinem, vel somnum exiguum, aut vitiosum excrementum. Quanquam si ex eo concoctionem frustrari contingat (etiam ventriculo ipso minime affecto) inter internas causas connumerari debet. Cum denique tot possint esse frustratæ concoctionis causæ, quia via ipsæ secernendæ, ac dignoscendæ sunt, non ab re differendum putauimus. Verum si ex immodica cibi, ac potionis copia, vel praua eorundem qualitate, seu intempestiuitate, vel incongruo ordine, aut exiguo somno prædicta symptomata excitentur, haud agrè ex laborante ipso, seu adstante percipi poterit. Interim verò ubi corruptela assumptorū sequatur, ex ipsa corruptionis differentia, alimentorū qualitas præassumpta argui poterit. Nam si in fumosam qualitatem corruptela vergat, argumentum est ex calidioribus, magisque biliosis cibis prouenire. Si verò ad acidam, ex iis qui frigidiore natura sunt, magisque pituitosi. At si in ventriculo cibi non suapte natura in fumum transmutentur, & quispiam fumosum ructum emitat, efficientem huius causam calidam ipsius ventriculi intemperiem esse cōiiciendum erit. Si verò saporem acidum referunt, eam frigidam esse necesse est, quamuis similiter in excrementis fiat, cum in ipso ventriculo contineantur: nam acidas qualitates quidem creant, quæ pituitosa sunt & frigida. Fumosa verò quæ calida, & biliosa, ut liquet eodem libro tertio de causis symptomatum. Ut verò distinguas utrum intemperies aliqua duntaxat calida, vel frigida, an vitiosus quispiam humor ventrem infestet, dare oportet cibos, qui suapte natura modo corruptionis quàm maximè aduersentur, ex Galeni au-

ἀνέψια
δυσέψια
σπασμένη
ψια.

Quid per
cruditatem
intelligē-
dum sit.

Quæ pars
in crudita-
te afficia-
tur.

Quæ affe-
ctus præter
naturā sit
cruditas.

1. de locis
affectis. 3.
5. de locis
affectis. 6.

Signa.

Causa.

Si ob cali-
dam, aut
frigida in-
temperiem
ventriculi
fiat crudi-
tas signa.

Loco citato.

si auctoritate, primo de locis affectis, cap. 4. ut patet illis qui in fumum transmutare cibum consueverunt, mel autem iis, qui acidum à cibo saporem percipiunt, deinde considerare excrementa tum ea, quae euomuntur, tum per quae alium deiciuntur, num humor aliquis cum illis quidem biliosus, ac calidus, cum iis autem pituitosus ac frigidus excernatur, an nullo vacuato humore ipsa exigua quadam mutationem habeat. Nam si sine humore perquam exigua in ipsis facta mutatione, deici videbis, interperie duntaxat ventriculorum laborare percipies. Si vero humor quoque deiciatur, qui cibum corrumpere possit, videbis cibos huiusmodi humore subuersos, & ab ipsis ventriculi actione manifestius alteratos. Verum ubi in tunicis ventriculi impactum contineatur excrementum, id quod ex inani nausea, siue vomitu, quae irritat duntaxat, & nullum humorem euacuat, dignoscas. Si calidam fuerit, praeter nauseam sitis vehemens aderit, & interdum febris. Si frigidum, maior ciborum cupiditas excitabitur, nec sitis, nec febris affligentur. Sed quoniam in eiusmodi intemperies, calidam videlicet, & frigidam breui perducitur ventriculus, in humiditate vero, & siccitate, adeo intemperatus venter esse, ut actionem amittat, non potest sine prolixo temporis spatio, ut inquit Galenus praecitato lib. tertio de causis symptomatum: propterea humidam, & siccam eius intemperantiae signa conscribere praetermissimus. Quamuis humidam intemperiem praecessisse debet hydrops, siccam vero vel senium, vel marasmus, ut idem Galenus, inquit, & propterea ex eisdem dignosci possent. Similiter ex affectibus dictarum intemperierum, nam sicuti frigidum superante, frigidi affectus excitari solent, & calido contrarij, eodem modo ex sicco sicci, ex humidis quibusdam morbis praedicta symptomata oriuntur, ex eorundem instrumentalium morborum propriis indicis dignosci queunt, quorum partim in praecedentibus tradita est notitia, partim etiam ex dicendis praestabitur. Nunc autem tempestivum erit, cum valde ex usu sit, inuestigare, ex qua praedictarum causarum parata sit excitari *spasmodica*, seu *analeptica*, vel *diuretica*. Pro quo dicimus quod promptius *spasmodica*, oritur ex exiguo fomno, ex cibis, qui difficulter corrumpuntur, & si ultra quam vires tolerant, sumantur, ex eiusdem Galeni auctoritate praecitato loco, & Aetij cap. 24. libri noni. Quemadmodum ubi citra corruptelam concoctionis omnino privatio sit, ita ut quales accepti sunt cibi, tales permaneant iuxta omnem eorum qualitatem, quae proprie *analeptica* dicitur, scire licet prorsus superatum esse ventriculorum, aut ab immodica ciborum multitudine, ut ad virtutis imbecillitatem, vel à valido frigore, seu ob vehementem insiti caloris refrigerationem, ut apud eundem liquet. Adeo enim in tali statu venter non concoquit, ut etiam concoquere prorsus non tentet. Circa mediocres etiam, & consuetos cibos si nihil in totum effecerit ventriculus, maximam eiusdem esse intemperiem prodit. Ceterum si cum corruptione cruditas oboritur, quae proprie *diuretica* dicitur, ex calida, vel frigida intemperie, praesertimque ex calida excitatur, cum nullum esculentum vehementer calfactum durare imputare possit, ut liquet apud eundem Galenum. Similiter ex excrementis calidis, aut frigidis, aut vitiosis ciborum qualitatibus iuxta ventrem consistentibus. A-

liquando etiam ex inordinata sumptione ciborum, aut potuum, aut intempestiuitate fit, ut apud eundem Aetium patet. Ex quibus itaque causis quodlibet praedictorum symptomatum oriri paratum sit, ex his liquido constat. Quare ad eorum prognosticationem, ac curationem. Etenim vitanda maxime cruditas asidua est, cum ex ea vitiosi humores, morbi que gignantur, siue ex boni, siue ex mali succi cibis fuerit orta, quanquam ea deterius sit, quam vitiosi succi cibaria effecerunt, ut liquet à Gale. lib. de cibis boni, & mali succi. cap. 11. Quodcumque tamen praedictorum symptomatum ex cibis oritur, ex facili corrigetur. Quod autem ex ultimo virtutis lapsu in lieteriam, aut tympaniam hydropem finitur, Galeno teste eodem tertio de causis symptomatum, cap. 1. omnes quoque magnae ventriculi intemperies, veluti & aliarum partium virtutem deiciunt, ut ibidem patet, & commento aphor. 20. secundi libri. Et propterea cum circa mediocres, & consuetos cibos nihil in totum effecerit, maximam ostendit ventris intemperiem, ut dictum est. Pessima autem in amara bili abundantibus naturis cruditas est, citissimaeque febrem accedit, in qua cibi in nidorent tam, & fumosam qualiter corrumpuntur, quando ea, quae in acidum verti, ut raro talibus naturis contingit, ita minus nocet, eodem Galeno auctore octavo metho. meden. cap. 5. Nidoro etiam, ac fumosa cruditas minus eisdem noxia est, si alius lubrica fuerit, sin alstringitur, grauis est, siquidem ex adstrictione eius vitiosa natura in febres promptè incidunt, praesertim si ad solita conuertantur opera, eodem Galeno auctore ibidem. Omnium etiam praedictorum trium symptomatum pessimum est *analeptica*, si vitio facultatis fiat, sicuti *spasmodica*, minus afferat periculi. Causa vero ex praedictis colligi poterit. Nequis autem in cruditatem incidat, inquit Aetius, cautione in omnibus praedictis est vitandum, ut neque in multitudine eorum, quae in cibo accipiuntur, neque in qualitate, neque in acceptionis opportunitate, neque in ordine delinquant, & ut quaecunque concoquere valeant, ea tantum ingerant, & non quae appetitus expostulat. Mensura enim maxime omnium diligentem respectum habere oportet, appetitumque retinere, & neque plusquam vires tolerent, accipere, neque quae natura difficulter concoquuntur iuxta etiam tempus accipiendi cibi, neque impetiose, neque acervatim, neque solidis partibus, aut absque commendatione eos ingerere oportet, neque etiam potus cibum interpellat, id enim unionem ciborum impedit, singulosque ventri innatare facit, ut idem Aetius refert. Somnus autem, & quies conferunt. Haec communiter pro victus ratione seruanda in cunctis praedictis symptomatibus dicta satis. Nam si separatim cuiuslibet victus rationem conscribere tentaremus, diuersa quidem instituenda esset pro causarum diuersitate, ut puta si ex intemperie calida, aut excrementis calidis excitarentur, contraria victus ratio praecipienda esset, pariter si ex frigida intemperie, aut excrementis frigidis, ad calidum vergentem victum instituere oporteret. Quas victus rationes diuersas poterunt etiam studiosi ex iis, quae in praecedentibus ventriculi affectibus praecipimus, petere. Nec secus & medicamentorum rationem reperient, tam si calida fuerit, quam frigida ventriculi intemperies citra humores, vel cum humorum redundantia, potissimum cap. de nausea, & vo-

Prognostica

Curatio.

Victus ratio.

Medicamentorum ratio.

mitu. Ibi etenim & quæ alterant, purgant, ac roborant pro vtriusque intemperie, ac vtriusque excrementis corrigendis abundanter conscripta reperient. At si ex aliquo instrumentali morbo prædicta excidentur symptomata, nemini in dubium venit, quod in eorum curatione, & ipsa quoque delentur. Verum ubi ex alimentorum multitudine, quæ concoqui nequit, aut eorum vitiosa qualitate cruditas fiat, confestim procurandum erit vomitu, aut purgatione per infernas partes ipsos expurgari: eiiciendus etenim est cibus si coacuit intus, aut computruit, ex Celsi auctoritate libro quarto capite quinto. Dico vomitu si laborantes facili vomant suapte naturæ, nam cogere eum, qui vomere non potest, absurdum est, ex Galeni decreto primo de locis affectis. cap. 4. Erit quoque iis qui suapte natura facile euomere possunt, vomitus proritandus, quo promptius euomant potu aquæ tepidæ multæ, pauco aceto aut syrupo acetoso permixto, seu oxymelite. At si vomere haudquaquam valeant, præsertim ubi multum, aut corruptum nutrimentum notabiliter ad inferiora ventris sit motum, adiuvandum est, ut citius descendat, aut glande subdita, aut leui per inferius infusione, per clysteres videlicet, ut octauo metho. medendi, cap. 5. à Galeno scriptum est, veluti etiam si crudum, aut diminutè concoctum in superiori vetriculi parte alimentum adhuc consistat, modo concoqui possit, aliquid diatrion piperis eon dabis simplicissimi qui dem, modo quo ab eodem Galeno libro quarto de sanit. tuen. cap. 5. scriptum est. Vel si id haberi nequit, tantundem piperis longi, aut albi, si hoc adsit, aut nigri exhibere cõuenit. Similiter extrinsecus adhibitis concoctio iuuanda erit, ut si expansa manu os ventris apprehendatur, aut puerulus carnosus admoueat, ut Aëtius refert. Nam quid æquè concoctioni ventris conferre nouimus atque corpus humanum illi impositum, Galeno auctore, quinto de simplicium medicamentorum facultatibus, & septimo metho. medendi. Proinde quidam pueros boni habitus noctu admouentes per quietem longe euidentissimum adiumentum sentiunt, eisdem quoque utilitatis gratia quidam paruos catellos per quietem ventri imponunt, ut apud eundem liquet præcitatis locis. Verum seruandum ante omnia est, ne puellus humectæ sit cure, qui enim noctu sudore profunduntur, refrigerant potius, quàm calfaciant, ut ipse Gal. inquit, neque iis duntaxat, sed reliquis quoque medicamentis moderatè calidis ab extra adhibitis concoctio iuari poterit. Quorum syluam habes in præcedentibus conscriptam, & à Galeno octauo meth. med. cap. 5. Quod si non ex alimentorum praua qualitate, sed intemperstuitate, aut inordinata eorū sumptione, seu exiguo somno, cum corruptela cruditas generetur, nõ alia ratione curari debet, quàm si ex prædicta alimentorum vitiosa qualitate, aut multitudine fuisset excitata. Illud tamen particulatim attendendum erit, quod quibus ob fluxu bilis copiam, in vetriculo contentam, vel calidam admodum eiusdem intemperiem *δυσπεψία*, seu cruditas cum corruptela accidit, cibos corruptu difficiles; difficilisque concoctu offerre conuenit. Nam quæ concoctu difficilia sunt, non facili alterantur, ac corrumpuntur, sed si in multum calorem inciderint, cõcoquantur magis, quàm si moderato occurrerint ex Gal. decreto primo de alimen. facult. cap. 1. quod etiam confirmauit Celsus eodem cap. 5. lib. 4.

6. de simplic. med. facult. ca. 5.
6.
7. meth. c. 7

Περὶ πνευματώσεως, καὶ ἐμφυσήσεως τῆς κοιλίας.
Id est, De inflatione vetriculi.

C A P. LXX.

IRÆTER iam dictos affectus accidit quandoque ipsi vetriculo ut instrumento coctionis, retentricæ, seu complectente ipsius facultate imbecilla existente, affectus quidam, qui à Græcis, præsertim à Paulo cap. 38. lib. tertij, & à Galen. 3. de caus. sympt. cap. 2. *πνευματώσις καὶ φούσσις* dicitur, quamvis quandoq; ab eodem Gale. (ut patet 14. meth. med. cap. 7.) *ἐμφύσημα* nuncupetur, à Latinis autem inflatio vetriculi appellatur, qui affectus nihil aliud est, quàm eiusdem vetriculi distentio, & dolor ex flatuoso spiritu. Nā cum flatuosus spiritus in eo gignitur, aut per os excernitur, & sic ructum creat aut per sedem, quo casu sonorum, silentiue flatu gignit, vel ipse neutra parte emittitur, & sic affectum creat, qui inflatio vocatur ex Galeni auctoritate tertio de causis symptom. cap. 2. Ventre scilicet impotente ad excrementosum, nebulosumque excernendum spiritum, quos omnes Hippoc. simul cum Galeno ult. aphor. 5. lib. *πνευματώσις* hoc est, ventosus appellat. Inflationis verò generatio vitio retentricis, & cõplectentis facultatis prouenit, nam eius probitas in duobus cõsistit, cum videlicet tempus complectendi cibi cum tempore concoquendi exæquat, ac cum cibos prorsus vndique constringit, ita ut nullum locum relinquat inter ventrem, & cibos vacuum, ex eiusdem Galeni sententia. Verum iniustum complectendi tempus excretio celer, & ciborum in inferiori ventre corruptela consequuntur. Imbecillum verò ciborum complexum modo clydones, hoc est, fluctuationes cum sonitu succedunt, modo verò inflationes. Differunt autem hi duo affectus, quamvis ambo imbecillam retentricem facultatem consequantur, seu eam prorsus non complectentem, tum ratione materiæ, tum etiam ratione causæ efficientis, ut apud eundem Galenum liquet præcitato libro tertio de causis symptomatum. Verum relicta fluctuatione cum sonitu, quam Græci *καὶ φούσσις* appellant, quæ citra potionem fieri non potest, sed ventre valenter perfrigerato, vel cum in eo nihil contineatur, quod veri in flatu possit, efficitur, ad inflationis tractationem deueniamus; asserentes primò quod in ea venter ut coctionis instrumentum afficitur, ut eodem libro de differentiis symptom. cap. 4. liquet. Id verò liquido patere poterit ex frustrata eiusdem propria vetriculi coctione, propterea quod retentrix, seu complectens facultas non vndique prorsus cibos constringit propter eius imbecillitatē, sed locum quandam vacuum derelinquit inter ventrem, & cibos. Accedit ad hæc eiusdem vetriculi distentio, ac circa eundem tumor. Hic affectus à Galeno 14. meth. medendi, cap. 7. inter morbos reponitur in quantitate, seu magnitudine. Verum ab œdemate discrepat, quoniam œdema prementibus nobis cedit, digitisq; admodum altè in ipsum descendunt. Inflationis verò digitis pressa vestigium non retinet, ac sonitum veluti tympanum reddit, ex eiusdē Galeni decretis eodem 14. meth. medendi. Grauitas quoque, & distentio nedum circa ventrem ipsum, sed iuxta totum pectus. Aliquando verò retro iuxta collum, ac dorsum, atque ipsa veritula irruit. sæpè autem & vtrinque occupatos tenet. Aliquando & tumorem circa os ventris efficit, ructusque inanes fiunt modicè al-

Quid sit
inflatio
vetriculi.

Loco citato.

Que pars
in inflatione
ne afficitur.

Quin præter
naturæ affe-
ctus sit.
Quomodo
ab œdemate
te diffirat.
Loco citato.

leuantes, & inhibito flatuum, qui per aluum excerni consueuerunt. Quibusdam eorum dolores accidunt, & appetitus perditiones, ac capitis dolor, ut patet ex Aëtio Archigenis auctoritate, cap. 27. libri noni. Si verò ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cum dolore distenduntur, leuantur autem alimento inferne subeunte, & flatibus, siue per ructus, siue per intestina exclusis, ut idem Aëtius inquit. Vbi verò flatuosus spiritus per intestina mouetur, multiformes edit sonitus, quorum non omnes nomina sunt fortiti. Verum prudenti viro ex diuersis sonitus differentiis quales, quantumque excrementum sit, ac quo maxime loco voluatur indicare potest (ut eodem tertio de caus. symptomatum, cap. 2. apud Galenum legitur.) Ipsi itaque inflationis causa spiritus flatuosus existit (ut eodem 14. method. meden. a Galeno scriptum est.) Verum quoniam oportet medicum non solum sympto. agnoscendorum facultatem habere, ac generationis eorum inueniendae peritum esse, sed etiam modi quo generentur, qui inter effectricium causarum differentias numeratur ex eiusdem Galeni sententia præcitato lib. tertio de causis symptomatum, cap. 1. Propterea non ab re fuerit modum generationis eiusdem flatuosi spiritus, ac inflationis differere. Fit namque (ut Galenus inquit) halitusosorum spirituum, seu flatuum generatio in ipsis quæ in ventre sunt locis, succis quibusdam pituitosis, vel cibus inibi a deficiente calore in halitum solutis syncera enim frigiditas prorsum halitum non facit, quod scilicet ea nec attenuat omnino, nec conficit, nec alimentum dissoluit. Fortis autem calor cum longo intervallo nutrimentum superet, amplius quam pro halitu generando id attenuat, nisi tamen flatuosum sit natura. Nam tunc gignitur quidem spiritus turbidus, ac (ut sic dicam) nebulosus, exiguus tamen, & brevis temporis, ita ut vno, vel altero ructu vacuetur. Verum calor mediocris, qui in cibos agit quidem sed diminutè, is eos quodammodo dissoluit, non tamen prorsus conficit minoris efficacitæ existens, atque hinc oritur flatuosus spiritus. Nam tanquam extrinsecus tum frigidissimi status sunt fereni, solentque magis flante borea fieri, tum calidissimi, qui æstatis tempore incidunt ambientem aerem purum reddunt: qui verò inter hos sunt, nebulam gignunt. Itidem in animalibus, neque in caloris summa imbecillitate, nec cum idem nimium est vehemens, sed in iis (qui inter hos sunt) flatibus flatuosum excrementum gignitur, quemadmodum de cretum reliquit Galenus præcitato libro tertio de caus. symptomatum, cap. 2. Patet igitur ex iis flatuosi spiritus generationis modus, quoniam ex humilibus, vel cibus languida caliditate in vapores dissolutis in ventriculo generatur, ut liquet apud eundem Paulum, & Aëtium præcitatis locis, & cum ipse expelli nequeat, eodem ventre impotente ad excernendum, intus detentum prædictum affectum (quem inflationem ventriculi vocamus) creat. Verum si ex flatuosis cibus inflatio oriatur, ex exiguo, & brevis temporis spiritu flatuoso orto, qui vno, vel altero ructu vacuatur, comprehendi poterit. At si ex eisdem cibus natura siquidem non flatuosis, sed in vapores per mediocrem caliditatem resolutis, inflatio fiat, ab assumptione eorum paulo post tempore inflatio generabitur, & proinde ex laborantium, seu astantium sermone id promptè percipies. Verum si neque assumptio ciborum præces-

serit, neque eorundem natura flatuosorum, pituitosos humores in ventriculo contentos, ac in halitum solutos, inflationis causam esse existimabis. Nam si ex atræ bilis in eundem ventriculum effusione flatus quidam generentur, quam affectionem hypochondriacam, ac flatuosam nominat, præter reliqua peculiariter metus, & mæstitia aderunt, quemadmodum cap. de melancholia, disseruimus, & propterea non est cur hic iterum de ea mentionem faciamus. Quantum verò ad prognostica spectat, non omnino despicienda eius curatio est. Nam ubi diu perdurauerit, metus erit ne in hydropem siccam præcipue terminetur, & si multiplicetur ventriculi inflatio in conualescentibus recidivam significabit, namque qui a morbis immodicè se fatiant, flatuosi, ac toto corporis habitu turgidi redduntur, ut eodem tertio de caus. symptomatum, cap. 1. a Galeno decretum est. Quod verò qui morbo regio laborant non multum ventosi sunt, ab Hippocrate aphorif. 72. quinti lib. scriptum est. Indicatio verò curationis omnium inflationum communis est, Galeno auctore 14. meth. med. cap. 7. Ut quod præter naturam est vacuetur, in quocunque id contineatur loco. Propria verò post hanc communem est, ut tenuissimis, & calidis potestate medicamentis id perficiatur. Qua de re aer eligendus est ad calidum vergens, somnus solito longior concilietur, nam ubi somnus accesserit, inquit Paulus, etiam ex toto leuatur affectus, mirificè etenim concoctionem iuuat, ut patet 12. meth. meden. cap. 3. Exercitatio primò levis, deinde maior adhibenda est, maximeque ea, quæ superiores partes moueat, quod genus (ut Celsus refert cap. 5. libri 4.) in omnibus stomachi vitiis aptissimum est. Frictiones item extremarum corporis partium si adhibeantur, conferunt. Aluus omnino sit lenis, & ubi fuerit adstricta citra dilationem clyster infundendus (ex Aëtij sententia.) Interponenda quoque abstinentia est, ex decreto eiusdem Celsi. Nam inedia actioni huic necessaria existit, Aëtio teste, præsertim ubi ex dissolutis in vaporem cibus orta fuerit inflatio. At si eam ferre non possint, cibi exhibendi sunt calidi, minimeque inflantes: eodem modo calidæ potiones, sintque concoctu faciles, & boni succi, quantitate exigui, diuidantur autem ex sententia eiusdem Aëtij, ita ut in prandio tertiam, in cæna verò reliquas duas accipiant partes. Fructuum verò, ac olerum humidorum esum semper habeant suspectum. Potus cibum non interpellet, per omnem tamen cibum vinum meracius exhibeatur, at non multum. Nam multum potum tanquam infestissimum hostem deuitent, ut liquet apud eundem Aëtium, & si non ita diu ante cibum sumperit, aut cibus fuerit natura flatuosus præassumptus, primùm vomere præcipe, cui auxiliari poteris portione aliqua edræ, quas præcedete cap. commemorauimus. Post verò vomitum eos fouere oportet ex oleo, quod tenuium sit partium, quandoque rutam habeat incoctam, aut aliquod calidorum seminum, cuiusmodi sunt cumini apij, & petroselinij, ex Galen. decre. eodem 14. method. meden. di. Quandoque verò diutius perseverante affectione, maiori que existente frigiditate præter iam dicta daucus, baccæ lauri, nigellæ, & rutæ semen oleo incoquantur, ac ex eo irrigationes fiant. Interim etiam profunt calida, & sicca fomenta, quæ ex milio, aut etiam milio & furfure parari possunt, præsertim si mediocris fuerit dolor. Vel ex semine lini, hordeacea, & loliacea farina cumino, & semine anethi,

Prognostica.

Curatio.

Illustratio.

Medicamentorum ratio.

Loco citato.

Causæ. Loco citato. Modus generationis.

Flatuosi spiritus generatio, ex quibus fiat.

Concluditur modus generationis inflationis.

Causarum diuersarum natura.

anethi, aut apij, aut fœniculi, oleo rutaceo, aut hydromelite cataplasma conficiatur. Quandoque verò admiscendum est oleum laurinum, vel tragoriganum, centaurij coma aut eryngij semen, vel radix, baccæ lauri, aut melanthium. Cucurbitula etiam cum multa flamma admodum bonæ magnitudinis vmbilicum vndique comprehendentes toto symptoma- te frequenter vniuersum liberant, vt Paulo visum est, licet ante eum Galenus præcitato libro 14. method. meden. de ea sic scriptum reliquerit. Aliquan- do verò & cucurbita magna bis, tervè sine incisio- ne medio ventri affixa, tanta verò ac taliter applica- ta etiam totum vmbilicum comprehendet, & 12. lib. eiusdem pro curatione doloris ex spiritu flatuoso orti propriam quandam curationem ex cucurbita cum flamma copiosa subinde admodum moliri testa- tur, videbiturque tibi (vt ipse inquit) presidium hoc in huiusmodi affectibus incantamenti cuiusquam si- mile quid efficere, siue in intestinis, siue in quavis corporis particula talis dolor fuerit excitatus, illico enim cucurbita admodum, qui spiritu flatuoso crucian- tur tum à dolore liberi, tum omnino sani redduntur. Glandes quoque interim confidenter, & citra dila- tionem supponenda sunt ex rebus flatum discuten- tibus formata, velut est rutæ semen, & cuminum æ- quali pondere cum melle cocto, aut ex rutæ foliis contusis, cumino, pauco sale, & caricis simul inuo- lutis balanos confice. Poteris insuper clysteribus vti, quos sic parabis. Recipe foliorum rutæ, florum chamæmeli, pulegij, & calaminthæ an. manip. s. se- minis anisi, fœniculi, dauci, & cumini ana drachm. iij, fursuris p. j. caricarum num. iij, fiat decoctum se- cundum artem, de quo libram vnam assumito, adii- citoque vnc. iij. olei anethini, chamæmeli, vel ru- tacei, mellis rosacei vnc. ij. confectiois de dactylis drachm. iij, diacath. drac. vij. vel benedictæ drac. iij. misce, & fiat clyster pauco sale addito. Vtilis quo- que eis existit in ieiunio portio absynthij, aut hyssopi, aut rutæ, vt Celsus refert, aristolochia insuper lō- ga, siue rotunda drachm. pondere potata flatum dis- soluit, & tardè concoquentes iuuat, quod & cala- minthæ decoctū, aut etiam polium cum melle mo- dico, & paucissimo pipere tenuissimè trito facit ex Aetij testimonio. Similiter ouillus talus, aut suis, vt Paulo visum est, vltus, & potatus, torminibus, ac in- flationibus medetur. Vtile etiam est castorium ex posca bibitum drac. j. pondere acceptum, & acerrum scillinum, tum ante, tum post cibum, aut ante som- num, si ipsum absorbeat, vt patet apud eundem Aëtii. Nec minùs confert si drach. j. exhibeatur confe- ctiois de cinnamomo, aut de xyloaloe, dianisi, aut diacumini, diacalaminthæ, aut diatriopipereon cū exiguo vino diluto. At si ex pituitosis humoribus in- flatum dissolutis cum in ventre contineantur, in- flatio fiat, priusquam tales euacuentur succi, nullum prædictorum medicamentorum exhibendum erit, euacuabuntur porro aut vomitu, si laborantes na- tura proni ad vomitum sint (exhibito quandoque aliquo ex superscriptis medicamentis, quæ vomitum facilem reddunt, etenim eis necessarius modò in iei- unio, modò post cibum vomitus est, vt apud Cel- sum liquet) aut per inferiorem ventrem, eis tamen prius concoctis, ac præparatis, vel per clysteres, & eos quidem acres si fieri poterit: mirifice etenim ij ex acrum iniectione leuantur, vt Galenus refert, aut per aliquod purgans medicamentum eorum, quæ cap. de vomitu, & nausea, commemorauimus. Nam

intigent interdum, qui inflationem patiuntur, alii deductione, ex Celsi sententia. Poterit tamen & ante purgationem, vbi ex flatuoso spiritu genito ex prædictis humoribus pituitosis ingens dolor urgeat, ad- moueri cum flamma copiosa cucurbita, quo vento- sus prius digeratur spiritus. Post id euacuans hu- mor est, ex Galeni decre. 12. method. med. quoniam iis illico ad tempus cucurbitula dolor sedabitur, quā- uis tedeat (vt ipse Gale. inquit,) vel sequente nocte, vel postridie, vel etiā tertio die similis dolor. Cum verò per vomitum, aut aluum expurgatus fuerit re- dundans in ventriculo pituitosus succus, omnibus prædictis medicamentis intus, & extra vti poteris, prout magis videbitur expedire. Illud quoque (ex e- iusdem Cornelij Celsi decreto) in omnibus stoma- chi vitiiis recipiendum est, vt quomodo se quisque æger refecerit, eo vt sanus vtatur. Nā redit huic im- becillitas sua, nisi eiusdem defendatur bona valetu- do, quibus reddita est. Redit autem bona valetudo, vt vno verbo dicam, iis qui ex flatuoso spiritu dolo- rem, seu digerentibus adhibitis, & extenuantibus tum cibis, tum per sedem iniectionibus, tum cata- plasmatibus, tum humidis sicciisque fomentis, vt ex Ga- leni patet eodem 12. method. meden. cap. 8.

Περὶ λειψυτείας, καὶ κοιλίας, δὲ τὰς ἐν τοῖς ἐντέροις. Id est, De leui- tate intestinorum, & coeliacæ seu ventrali affectione.

CAPVT LXXI.

CVM eadem retentrix, seu completens ventriculi facultas tempus retinendi, ac completendi cibos cū concoque- di tempore haud exæquat, si prorsus eos non completatur, affectus qui- dam oritur, qui à Græcis λειψυτεία, à Latinis ven- triculi, ac intestinorum leuitas dicitur. Quod si ea- dem non vsque ad consummatam concoctionē re- tineat, & completatur, alter excitari solet affectus, qui à Græcis κοιλία, à Latinis coeliaca, seu ventra- lis affectio dicitur. Inuiatum namque completendi tempus (vt Galenus inquit libro de Differentiis sym- ptomatū, cap. 4.) omnino diminuta ciborum con- coctio excipit. Deinceps verò, vel celer ciborum ex- itus, vel eorum in ventre corruptela. At celeris ciborum exitus inseparabilia symptomata sunt deiectionis humiditas, & digestio in corpus diminuta. Verum prima affectio, quā λειψυτεία Græci nominant (vt quibusdam eorum antiquioribus visum est) tale no- men sortita est, quoniam qui prius talem ei indide- runt appellationem, fieri ipsam putabant propter intrinsecè superficiei intestinorum leuitatem, ob quā cibos in eis contentos non amplius retinent, quem- admodum retinebant cū suam seruarent sibi à na- turā inditam asperitatem. Cuius etiam sententiæ vi- detur esse Aetius, c. quinquagesimo primo libri no- ni. Cū dixit, lienteria quemadmodum ipsum no- men indicat, laetor quispiam intestinorum est. Quā opinionem tanquam erroneam Gal. commento a- phorismi 1. libri sexti, reprobauit, asserens quod in pluribus aliis, qui primi rebus nomina imposuerūt, sunt collaudandi, non tamen in leuitate intestino- rum. Causam autem erroris eorum asseruit esse i- gnorantiam causarum, propter quas aliqua excre- menta intempestiue excernantur, sicuti in ventriculo veloces ciborum exitus, neque enim intestino- rum leuitas est, vt ipsi opinabantur, sed alia causa, prout infra dicemus. Nec minùs ignorant quod i- plius ventriculi proprium est cibos amplecti, ac cir- cumscri-
Leuitas in- testinorum unde nomen sumptum se- cundū quos- dam.
Impugnata Gale. præ- dictorum a- pinionem.

cunstringendo certo tempore retinere, & postea ad inferiora demittere, idque proprio eius temperamento perficere, & non cum suam seruat à natura inditam asperitatem. Maxima autem affectionis huius proprietas in cita ponitur deiectione, propter quod cibi omnino incocti permanet. Quo fit, ut intestinorum læuitas nil aliud sit (vt eodem Galeno auctore præcitato commento aphorismi primi sexti libri, ac 22. tertij, & 12. quarti libri) quam velox exitus eorum quæ comeduntur, atque bibuntur, cum neque secundum consistentiam, neque secundum colorem, vel odorem, vel vllam omnino qualitatem in ventriculo facta fuerit mutatio ciborum. Quæ si quis vellet breuiorem huius affectionis asserere definitionem, diceret eam esse carentiam coctionis, vt idem Galenus inquit. Altera verò affectio, quam celiacam nominauimus, ab ea quæ afficitur parte, nomen assumens, ex Aëtij sententia cap. 37. lib. 9. velox quidam est exitus eorum quæ per os assumuntur, verum non omnino crudorum, & incoctorum. Nam in ea affectione solum læuia & humecta excrementa egeruntur, ventre pro imbecillitate ea digerere nequeunte vt ipse inquit, quapropter nec concoquantur omnino, nec digeruntur alimenta, sed humectia, imperfecta, cocta redduntur, neque ita celeriter, ea quæ assumpta sunt in celiacis egeruntur, quemadmodum in lientericis. Sunt verò ambo hi affectus cum ventriculi, tum intestinorum simul communes, quemadmodum Galenus testatur sexto de locis affectis, cap. 1. neque enim absurdum est symptomata quædam intestinis & ventriculo simul affectis euenire, vt ipse inquit. Idem confirmauit præcitato aphorismo duodecimo quarti libri. Cum dixit intestinorum læuitatem consequi ad omnium quæ ad aluum pertinent, instrumentorum imtemperaturas, hoc est, ipsius ventriculi, in quem cibos deuoramus, & eorum quæ illos ex hoc suscipiunt, atque transmittunt intestinorum. Insuper & ex excrementis illud argui poterit. Ambo etiam symptomata sunt in genere naturalium functionum naturalium, retentricis videlicet, & non concoctricis, vt quidam putarunt. Neque enim (vt Galenus inquit eodem commento aphorismi primi sexti libri,) quia omnino incocti permanent cibi ideo citò deiiciuntur, sed quia citò deiiciuntur, idcirco nullam habent coctionem. Quibus verbis liquet propterea cibos non concoqui in prædictis affectibus, quoniam citius deiiciuntur. Id autem prouenit ex offensa (vt diximus) retentricis facultatis, impotentis siquidem tanto tempore cibos detinere, quanto indigeret concoctricis facultas pro eorum concoctione, & deprauato motu expultricis intempestiue priusquam absoluta concoctio sit, expellentis. Verum quamquam ambæ (vt diximus) affectiones eiusdem facultatis symptomata sint, vtputa retentricis in vna tamen eadem diminuta est, vt in celiacis, in qua cibos non complectitur vsque ad consummatam concoctionem: in altera verò abolita est. Quod verò in intestinorum læuitate profusus retentrix facultas cibos non complectatur, sed omnimoda fiat eius actionis priuatio, apud Galenum liquet, eodem libro de differentiis symptomatum, cap. quarto. At quod in celiacis affectione non omnino ablata sit prædictæ facultatis actio, liquet ex Aëtio præcitato loco, & Paulo cap. 40. libri tertij. Et quoniam læuitas intestinorum subito euenire non potest, vt patet sexto de locis affectis,

cap. 2. propterea celiaca præcedere eam solet: nam ab initio paruo quodam tempore cibi in ventriculo retinentur, procedente autem, atque aucta passionem, ne hoc quidem (vt eodem commento aphorismi primi sexti lib.) liquet, præsertim vbi ventriculus frigidior fuerit, læuia autem & humecta excrementa egeruntur ventre præ imbecillitate ea digerere nequeunte, & non cibi crudi, & incocti interne prodeunt in celiacis affectione, vt Aëtio visum est; sequitur autem celiacos assidua egestio, aliquando foetida cum animi deliquij sensu, cibumque auersantur, ac decolores, & vehementer graciles fiunt, vt etiam Paulus testatur. Languida cum sit, & imbecilla ventriculi facultas in celiacis, nec concoquantur, nec digeruntur alimenta, sed cruda humectia, imperfectaque redduntur aluo continenter fluida, quamquam quæ assumpta sunt non ita celeriter, veluti in intestinorum læuitate egerantur, verum in intestinorum læuitate (vt Hippocrates testatur libro de affectis,) cibi secedunt non putrefacti liquidi dolor autem non adest, & corpus attenuatur. Vt verò Aëtio visum est cap. quinquagesimo primo libri noni. Cibi crudi in ea, & nihil immutati excernuntur, imò talia deiiciuntur, qualia fuere deuorato ex Galeni sententia. Egri quoque cibum non sentiunt, & malum corporis habitum acquirunt, quod vtrunque malum incorrigibile existit. Succedit enim (vt idem Aëtius inquit) assidua excretio cibi colore subalbida, inæqualis, & aquosissima citra sanguinis, ac bilis complexum atque intensa est cruditas in lientericis (vt Paulus refert) vt alimenti assumpti genus ex iis, quæ egeruntur, aperte cognoscatur, atque hæc nota potissimum à celiacis discernitur. Quapropter Galenus præcitato commento aphorismi primi sexti libri, paucissimis verbis læuitatis intestinorum signa pertrinxit, cum dixit, Atque ideo nos, & alij medici plurimi citam ciborum nullam habentem coctionem, deiectionem dicimus esse læuitatem intestinorum. Id autem quod in vtrisque affectionibus excernitur, symptoma est in genere excretorum immodicæ, vt in tertio de causis symptomaticum, cap. 2. liquet. Nam tum multitudine, tum qualitate præter naturam est noxam, vt diximus, perpetuò retentricis facultatis ventriculi, ac intestinorum insequens. Ex his itaque liquet in quo conueniant, ac quibus discriminentur inter se celiaca affectio, & læuitas intestinorum. Verum cum eadem causa, maioris duntaxat, ac minoris ratione differentes, vtriusque affectionis esse possint, quas trademus causas læuitatis intestinorum, eadem intelligendæ sunt de ventrali affectione. Et quoniam (vt sæpenumero dictum est ex Galeni sententia libro de differentiis symptomaticum, cap. 4.) semper quodlibet symptoma à morbo aliquo ortum habet, non ab re iam dicta symptomata aliquem consequuntur ventriculi morbum. Isque genere duplex esse potest, vt ex Galeni liquet præcitatis aphorismis, aut intemperies aliqua, propter quam imbecilla redditur retentrix facultas tam ventriculi, quam intestinorum, vel exulceratio occupans superficiem earundem partium similibus illis quæ in ore fiunt, quas Greci ἀφθὰς nominant. Verum vnam ab aliâ hoc modo discernes ex eiusdem Galeni sententia: nam in illa quæ accidit propter ventriculi, atque intestinorum imbecillitatem, absque vllò doloris sensu fiunt deiectiones: in ea verò quæ ex exulceratione proficitur, inest quidam morfus sensus cum deiectiones fiunt. Hæc

Quid sit in
relinquor læ
uitas.

Celiaca
unde nomē
sumptis.

Celiaca.

Quæ pars
in eis affi
ciatur.

Quis affe
ctus præter
naturam sit.

Quomodo
inter se co
muniēt et
differant.

Signa læui
tatis intesti
norum.
Ante me
dium.

Quæ nota
bos comi
tentur hæc
symptoma
ta.

Quomodo
vnum ge
nus morbo
rum ab al
tero sece
ratur.

Causa.

autem exulceratio à quorundam humorum mordacitate, ac acritudine, totius ventriculi, ac intestinorum abrasa superficie ortum habet. Et quamvis ipsæ vires non multum patiantur, si hac ratione fiat læuitas intestinorum necessarium, tamen est, ut permeatibus cibis partes exulceratæ dolorem sentiant, & ideò illos propellant, atque ex ipsis citissimè emittant. Hoc verò in omnibus partibus factò, velox ciborum exitus cōsequetur, & nullum fiet initium coctionis. Oboritur autem frequenter dysenteria magna precedente, & ex profunda ulceratione cicatrice densa, & leui succedente ex Aetii auctoritate. Idè fermè confirmavit Celsus c. decimo sexto lib. quarti. Cùm dixit ex torminibus interdum intestinorum læuitas oritur, quæ continere nihil possunt, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddūt. Quæ de re facilliter percipi poterit lienteria, si ex acris, ac mordentibus succis ventriculi, ac intestinorum superficiem exulceratibus originem trahat. At ea læuitas intestinorum, quæ potentia retentis sequitur imbecillitatem, omnino quidem fit (ut diximus) ex intemperatura. Verum ea nonnunquā habitualis est, sic nanque nominant illam, quæ ipso corporis habitu læso fit, vel propter humorem aliquem qui in ventriculo, atque intestinis continetur evenit ex sententia eiusdem Galeni præcatis aphorismis, & velut eadem ventriculi intemperatura calida, vel frigida esse poterit, licet sæpius frigida, ut liquet apud omnes artis medicæ auctores, raro autem calida: pariter si eadem cum humore fuerint, idem humor aut calidus, aut frigidus erit, raro tamen calidus, cùm & ipse præterquam quod cum deiectionibus excerneretur, fortè etiam exulcerationem pareret. Propterea distinguenda est primò vna ab altera temperatura, & secundo vnus ab altero humore. Verum ne longiores sumus, ac eadem sæpius repetamus, qui exactè hæc velint interstinguere cap. de nausea, & vomitu, ac etiam cap. de cruditate propria signa reperient. Interim nos ad prognostica deveniamus. Erit itaque primò ipsius cœliacæ affectionis, quòd si diutius duret, ad magnam omnino desperationem res devenit, agris ad conveniendam diætam pigrescentibus. Et si affectus autumnò incipiens ad hyemem vsque se extendat, difficilior omnino curatur, ex Aetii sententia præcatis loco. Cùm verò inseparabilia symptomata sint celeris exitus ciborum, qui diminutam concoctionem consequetur, propter iniustum complectendi tempus, deiectionis humiditas, & digestio in corpus diminuta (ut diximus ex Galeni sententia libro de differentiis symptoma. cap. 4.) si eadem cœliaca prorogabitur, necessario atrophia consequetur, propter diminutam in corpus alimentorum digestionem. Alexander autem de cœliaca c. 8. libri 8. sic retulit, Hic morbus curatione initio adhibita facillè tollitur, postea verò difficilior. Vbi autem inueteraverit, tardè remouetur. De lienteria verò sic scriptum reliquit Galenus commento aphorismi primi sexti libri. Quòd quæ sit humorum acritudine totius ventriculi atque intestinorum abrasa superficie, cessante humorum malignitate, statim sanatur cibus ac potibus qui vim densandi habent. Quòd si longiori tempore perseveret, in alteram passionem transmutatur, quæ dysenteria, hoc est difficultas intestinorum si ructus acidus superueniet, quòd prius non erat, signum bonum est, inquit Hippocrates

præcatis aphorismo. Indicat enim (ut Aëtius refert) eodem cap. 51. libri noni. Ructus acidus ieiundi quidpiam factum esse, & ventrem, ac intestina non velut inanima, cibum finire pertransire. Verum non simpliciter dixit Hippocrates bonum esse signum acidus ructus in læuitatibus intestinorum, sed primò quidem in longis adiecit, deinde addidit, Vbi prius non fuerit, pro veritate eiusdem sententia, quæ omnia à Galeno præcatis aphorismo primo sexti libri, diligenter exposita sunt. Etenim illis læuitatibus intestinorum, quæ neque adhuc incipiunt, neque ex pituita fiunt, non insunt acidi ructus. Quòd si aliquando fiant, ut idem Galenus inquit, significant tantisper cibum in ventriculo retineri, donec principium mutationis accipiat, & naturam suorum operum reminiscit. Ipsæ iterum intestinorum læuitates cum spirandi difficultate, & lateris punctura, in tabem desinunt, ex eiusdem Hippocratis sententia in coacis prænotionibus. Et quonià eodem medicationis ductu vtendum est in læuitate intestinorum, quoad cœliacos, & dysentericos (ut Aëtius refert) propterea quæ dicimus de vnius curatione, etiam alterius subintelligenda erunt. Commune itaque vtriusque erit (ut idem auctor refert) quòd vim retentivam, ac concoctoriam facultatem tum ventris, tum intestinorum omni modo refocillare oportet. Quòd sanè per ciborum convenienti exhibitionem fieri potest, perq; diætam refocillandis ac restituendis viribus aptam. Nam si ab exulceratione superficie ventriculi, atq; intestinorum propter humorum acritudinem intestinorum leuitas fiat, modus curationis eius patebit in cura dysenteria. Particulatim etiam nos præcipiemus curationis viam, primò lienteria ex calida intemperie, seu calidis etiam succis, adhuc nō exulcerantibus si redundarint ortæ, secundo eius quæ ex intemperie frigida, ac frigidis etiam succis redundantibus. Et cùm vna tutissima, & compendiosissima via ad affectionis extirpationem diætā existat, eodè Aetio teste, propterea more solito, de ea primò mentionem faciemus. Eligatur itaque aer ad frigidum vergens. Somni solito longiores præcipiantur, potissimum nocte, nam diurni nocentissimi sunt, nisi lassationis sensus adsit, aut nox vigilata præcesserit. Vespere autem à cœna dormiendum, maxime vbi à somno surrexerit, ad deambulationem prodibit, ita ut pro viribus aggrediatur, deinde frictionem simplicem adhibeas, parce videlicet, & minime confricando, maxime ventrem. Ceterum à prandio etiam deambulationibus indulgendum est, & animi aliqua laxamenta adhibenda, ut idem Aëtius inquit. Nam exercitationes, & frictions huic morbo necessariae sunt, eodem Celsi auctore præcatis loco. Vitet immodicos animi affectus, præsertim iram. Cibi eis conueniunt, qui non nimis adstringunt, & reprimunt, sed qui adstringentes facillè concoqui, & in totum corpus distribui possunt, ut placuit eidem Alexandro præcatis loco. Quapropter cibi ex chondro, oryza, & alica, & similibus, cum quibus adstringens aliquod decoquatur, pyrum scilicet, malum cydonium, mespilum, & id genus alia exhibeantur ex Pauli, & Aetii testimonio. Panis item bene elaboratus tribuatur, ac etiam similagō cum eisdem adstringentibus in pullorum iure decocta, similiter intybus, & cichorium, carnes etiam exhibendæ ex gallinis iuuenibus, columbis, perdicibus, phasianis, & montanis passerulis, & ex aliis quoque

*Versus sint libri.**Curatio methodus.**Si ex calida intemperie fuerit, et ta, curatio.**Lib. 9. cap. 37.**V. c. 110.**Aetius loco citato.*

Medica-
mentorum
ratio.

Purgatio.

Quæ post
purgationē
præbenda
sint.

Vernis

- Toxic

que medicamentis vtendum erit intus, ac extra exhibitis, relictis tamen eis quæ purgationem moliantur, ac vrinam ciunt, quibus etiam nec vomitus promoueri debet, sed tantum alteratibus, atq; adstringentibus modo dictis medicamentis vtare. Sin autem

Si ex frigida intemperie dicta symptoma excutitur, curatio. Vicius ratio.

tem ex frigida intemperie, aut pituitosis succis intestinorum læuitas, seu coeliaca hæta, ær eligatur ad calidum vergens, contrarij quoque cibi adhibeantur ad calidum scilicet vergentes, cum quibus etiam nulla calida, ac ventriculo ipsi grata admisceantur, veluti est anisum, cuminum, cinnamomum, galāga, calamus odoratus, & caryophylli, ac reliqua similia. Competit adhuc & bralsicæ bis coctionem expertæ, ex Pauli, & Aetij sententia. Vinum autem eis tribuatur calidius, ac vetustius modicè dilutum cum pluuiāli aqua. Reliqua pro vicius ratione seruanda sunt, vt præcepimus supra. Verum si cum frigida intemperie pituitosa adint excrementa, ea prius concoquenda, ac præparanda sunt cum syrupo ex absynthio, ex metha, & corticibus citri, aut myrtino cum melle rosaceo, aut oxymelite simplici. Demum aut vomitu expurganda sunt (præsertim si in ventriculo consistant, sique iuuandus erit cum iis quæ sæpius in

Medicamentorum ratio. Vomitus.

Medicamentum purgans.

Quæ à purgatione exhibenda sint.

Topica.

precedentibus adnotauimus, modo prout ad vomendum laborantes sint) aut purgans medicamentum præbendum est, ita vt per aluum expurgentur. In quem vsus infra scripto vtare, Recipe corticum myrobalarum chebularum drachm. iij. infundantur in aqua melissæ, & boraginis, & facta forti expressione in ea dissolue syrup. è pluribus infusionibus rosarum persicarum vnc. ij. agarici drachm. j. fiat potio, vel drachm. j. aut scrup. iij. pulueris hieræ simplicis Galen. & scrup. ij. prædicti agarici excipe, & catapota formato, ac præbeto, post quæ iterum assument mane, & vespere ante cibum per duas saltè, vel treis horas vnc. s. syr. aut ex absynthio, aut ex mentha cū pauco puluere cinnamomi, galangæ, aut calami odorati, aut cum aliquo prædictorum adstringentium medicamentorum eadem permisceas, ac præbeas. Confert etiam si thuris granum fabæ magnitudine in vini nigri cyatho vno dissolutū sanguinariæ succo pari mensura admixtū præbeas, aut radicis præoniæ decoctum, atque ipsa etiam radix sicca trita potui inspersa, vt inquit Aetius. Similiter si chiæ mastiches tantundem ac eodem modo exhibeas, nec minus antidoti theriacæ, aut mithridati, aut mictæ si drachm. j. cuiuslibet dabis, proderit, præsertim cum pauco vino adstringenti. commodè quoque in iis vti poteris prædictis vrinam cientibus, & calidioribus, atque acrioribus. Extrinsecus verò oleum mastichinum, de absynthio, myrtinū, ac nardinum adhiberi conuenit, aut vnguentum sic conficito, Recipe olei mastichini, & myrtini ana vnc. j. de absynthio vnc. s. cinnamomi, galangæ, & maceris ana drac. s. spicæ scrup. ij. chiæ mastiches drach. j. cum cera, & vino odorato fiat vnguentum. Sin autem mauis faccellis vt. vtriusque menthæ, & absynthij, singulorū p. j. assume chiæ mastiches, cinnamomi, ligni aloës, & corticum citri, cuiuslibet drach. ij. caryophyllorum, maceris, galangæ, & calami odorati ana drach. j. rosar. rubear. siccarum manip. j. s. figurentur sacculi scutiformes, qui pauco vino odorato calido inspersi sæpius iterentur, vel in vino Græco, aut guarneto, & pauco cydoniorū succo macerati calidi applicentur, ac iterentur sæpius. Eorum etiam vnus semper supra ventrem adhibitus, ac alligatus confert. Emplastrum quoq; ex chia mastiche dissoluta in oleo nardi-

dino, & de absynthio adhiberi poterit, quemadmodum etiam & Galen. ceratum stomachicum dictum aut emplastrum ex galia, quæ omnia præter tamen purgationem, ac vomitum, & ea quæ vrinam ciunt, conducunt, si prædictæ affectiones ex intemperie duntaxat frigida vetriculi, vel intestinorum fuerint ortæ. Et cum in omni fluore ventris, tum in hoc præcipue necessarium est (vt Celsus refert) non quoties libet desiderare, sed quoties necesse est, vt hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Propterea id prætermittere nolui, nam non parum conducet, si illud laborantibus præcipiatur, quemadmodum etiam, & medicamentum nostrum, quo vt consueuimus. Id autè recipit vtriusq; menthæ contusæ, & absynthij ana manip. j. micæ panis torrefacti vnc. j. cinnamomi, aloës, mastiches, galangæ ana scrup. ij. vini odorati, seu aceti, & aquæ rosacæ quantum satis sit, misceantur, & ventri applicentur abundè calens: nam tale esse conuenit cum primum imponitur, talium vnum quodque quippe quæ tepida sunt omnia vetriculi firmitudinem dissoluant, Galeno teste 8. method. med. cap. 5.

Πειρ τῆς χολέρας.

Id est, De cholera.

CAPVT LXXII.

CVM totus vetriculus ab aliquo, quod morfu ponderève contrislet vexatur, idque statim eiicere cupiat, superno, infernoque ore ad excernendū vtens, affectus quidam gignitur, qui à Græcis χολέρα, vt patet tertio de caus. sympt. cap. 2. à Latinis similiter cholera dicitur, quauis barbaram scētates medicinam cholericam, seu cholericam passionem nuncupent, nomen sumens, vt idem Galenus fatetur 2. meth. med. cap. 2. à causa putata, quamuis id non ex propria sententia fateatur, sed medicorum auctoritate, qui sunt à Cnido. Huius quoq; sententiæ videtur esse Celsus libro quarto, cap. 11. cum dixit, Ergo eo nomine morbum hūc χολέραυ Græci nominarunt, cum prius bilem esse eius causam asseruisset. Huius autem contrarium sentit Alexan. qui cap. 16. libro septimo, de hac affectione verba faciēs dicebat, Ne autem quis affectum hunc ideo χολέραυ vocari putet, quod à bile omnino fieri consueuerit, sed quia materia quæ per ventrem effertur, ex intestinis videtur excerni, intestina verò χολάδ ac veteres appellabant, vt etiam Homerus testatur his verbis, χέχυντο χαμαί χολάδ ες, quod est, fusa erant humi intestina. Quæ de re huius gratia affectum hunc (vt idem Alex. inquit) veteres χολέραυ nuncuparunt, eo magis cum non ab vna duntaxat causa, bile videlicet (vt ipse testatur) affectio hæc excitari soleat. Sed quicquid velint de eius nomenclatura, nihil aliud est affectio hæc (vt apud eundem Alexandrum præcitato loco patet) quàm immoderata perturbatio, quæ per aluum, & vomitum propter stomachi subuersionem, offensionemque prouenit. Paulus verò cap. 39. libro tertio, dixit quod cholera est immodica vetriculi perturbatio supra, infraque erumpens, & auctor libri, qui inscribitur de definitionib. medicis, in secunda descriptione eiusdem affectus ait, quod cholera est acutus affectus cum vomitibus biliosis multis, aluique deiectionibus. Verum quænam pars in hoc affectu oblaesa sit, non admodum liquet, nam Celsus præcitato loco circa principium capitis asseruit, cholera commune stomachi, atque intestinorum vitium videri posse, nam simul

Cholera vnde nomen sumpserit.

Quid sit cholera.

Quæ pars in ea affectu sit.

mul & deiectio, & vomitus adest. In calce verò eiusdem capituli dicebat, sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestina, stomachumque versatur, sic, ut cuius potissimum partis sit, non facile dici possit. At cum totus ventriculus per eius superiores partes stomacho, hoc est gula continuus sit, per inferiores verò ad intestinorum usque exortum extendatur, Galen. auctoritate sexto de locis affectis. cap. 1. non ab re hæsitaui Celsus cum inspexisset bilem in hac affectione supra, infraque erumpere, cuius potissimum partis affectus esset, quanquam ex præcæta Galeni auctoritate, tum ex verbis eiusdem lib. tertio de causis symptomatum. cap. 2. cum de hac affectione verba facit, facile patere poterit, ventriculū ipsum in hoc vitio affici, non tamen secundū superiorem duntaxat, aut inferiorem eius partē sed secundū totū, cum dixit, quod si toti illi talis affectus aliquando contingat, etiā utroque ore simul vitur ad expulsiōnem, veluti in vocatis cholera. Ipse itaque ventriculus totus primo afficitur, coarctatur autem cum eo tum stomachus, tum intestina ipsa, cum id quod eum contristat utroque osculo expellere tentet, per supernum quidem quod in gulā, seu stomacho existit, per infernum verò, quod in pyloro. Quod verò hæc partes simul affectæ sint, ostendunt (eodem Celsi auctore) plura indicia inter quæ vnum est, quod simul & deiectio, & vomitus accidunt. Et præter hæc, inflatio est, ac intestina torquentur. Verum sicut nausea, & vomitus expultricis facultatis ventriculi pravi motus sint, pari ratione, & cholera ipsa, ut patet 3. de caus. sympt. cap. 2. Quare symptoma est in genere noxæ facultatum naturalium, & propriè expultricis deprauata (quæ propriè cholera dicitur.) Nam quandoque citra eiusdem facultatis noxam fit, licet perpetuò aliquem præter naturam affectum consequatur, veluti supra de vomitu dictū est, quanquā eam non propriè cholera nominat, ut si fiat propter ciborum quantitatem Alexand. auctore. Eius autem indicia sunt (ut inquit Aëtius cap. 12. libro 9.) Vomitus biliosus, & nidorosus, & acidus ad plures horas continue perseverans, & venter infernè eadem excernit, sequiturque sitis, & exudatio, impeditus pulsus, mulciorumque, inanuum, ac pedum, maximè verò surarum contractio, & tensio, & (ut refert Celsus) nedum bilis supra, infraque erumpit, sed primum aquæ similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnunquam nigra, vel varia. Verum (ut Paulus testatur) ciborum cruditas apparet, quæ nonnunquam ex magna alimentorum pravitate, interim ex vitiosorum humorum superfluo trahit originem. Nam neque ex vna duntaxat causa excitatur, sed etiam multis, ut Alex. visum est. Nempe ob copiosorem cibum assumptū, ac corruptum, quia concoqui non potuerit. Item ob pravorum humorum, ac ciborum, seu potionum (stomachum præsertim offendentium) qualitatem, qualis est (ut ipse inquit) pepo, & pingues, dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis naturæ sursum ac deorsum ad excernendum irritantis. Necnon ob nonnulla frigida applicata. Aut frigidarum aquarum usum, si eas bibant, aut in eis diu natauerint. Nonnulla etiam aliæ particulares cibi, & potus, cholericæ bilis sursum, ac deorsum eruptionis esse poterunt causæ, ut 7. de morbis vulg. liquet. Quæ causæ omnes facile interlingui poterūt. Nempe alimentorum assumptorum copiam, aut co-

rundem (ac etiam potionum) pravam qualitatem ex laborantis, seu adstantium loquela percipies, veluti etiam si præcesserit usus frigidarum aquarum, aut frigidorum medicamentorum ab extra adhibitorū. Verum ubi ex copia bilis, seu aliorum pravorū succorum redundantia cholera fuerit excitata, ex propriis eorundem humorum signis, ac sæpius iam dictis eos discernes. Quod verò cholera acutissimus sit affectus, syncopen insignem, immodicamque virium resolutionem inducens, omnibus in confesso est, ut inquit Alexander. Idcirco accuratè internosci, & celerimè curari meritò postulat, etenim dilatio in omnibus acutis morbis nocua est. In hoc autem affectu, etiā exigua, ac levis curandi mora, haud simplicem offensam, sed etiam absolutam subinde tabem (quæ phthisis dicitur) conciliat. Idque ferè confirmavit Celsus, cum dixit. Neque tamē illi morbo minori momento succurritur. Colerica verò affectiones magis in æstate sūt, & febres intermittentes, & quibus errores accidunt, eæ quandoque malignæ sunt, & ad morbos acutos perveniunt, ut eodem 7. de morbis vulg. Hippocrat. scriptum reliquit. Quoniam verò nulli morbo (ut diximus) minori, quàm huic, momento succurritur, propterea relicta victus ratione, quæ ferè eadē est cum ea, quam instituiamus præcedenti capite de Iguitate intestinorum, nisi quod leniter adstringentia, nedum in cibis ipsis permisceri debent, aut parum ante assumi, sed etiam post eos cum simul ingruat vomitus, & alui fluor, quāquam & ea quoque moderata esse debēt, nec à principio, nam si quis in principio, aut coaceruatim ea quæ efferuntur cohibere aggredietur, is maioris mali auctor erit, ex Aëtij sententia præcitato capite duodecimo libri noni, inutilia enim cum sint (ut ipse inquit) euacuatione opus habent, quæ de re conuenit, si ea non sponte ferantur, oportune potius irritare, nos reliquam aggrediemur curationē. Corruptis itaque in ventriculo cibis siue propter eorum copiam, siue pravam qualitatem, aqua tepida exhibita agrū vomere iubeto, potissimum, ubi purum sit quod per ventrem, aut vomitum excernatur, sed nauseant, vellicenturque ægri. Quo casu etiam aqua multa utendū erit, ut quæ aluum, & vomitum sine noxa irritare potest, ut Alexander refert. Verum si eam non libenter sumant, modò dicta tepida aqua ipsis liberalior dari debet, atque vomitus sollicitari, aut digitis, aut pennis, donec corrupta abūdè euacuata tibi esse videantur. Per vomitus etenim opportunā prouocationē vomitus ipse soluitur, & cessat (eodē Aëtio teste.) Quod si post aquæ tepidæ potum vomitus incidat, miscuisse tamē nouam materiam corrupta prodest, partique sanitatis est vomitum esse suppressum, ex Celsi sententia. Quo tempore etiam somnum agris percipere oportet, ac quietem, & præcordiorum forum (ut idem Alexander asserit.) A somno verò paulatim cibo reficiatur, ita ut cruditas tantū vitetur. Nisi enim quid impediendi fuerit, celerimè rursus ad naturalem statum reuertuntur, potissimum, si corruptio ob copiam ciborum fuerit oborta, quanquam neque huiusmodi affectum propriè cholera nominant. Nec minùs ubi procliuiora fuerint corrupta alimenta, ut per aluum excernantur, eadēque via natura expellere tentet, conuenit iuuare excretionem per sedem, purgantibus tamen medicamentis leuioribus utendo, diuersis, pro natura corruptorum alimentorum, præsertim eis quorum mentionem

Progid-
stica.Loco ci-
tato.
Curatio.

Vomitui.

C e

Quis affe-
ctus præter
naturam
sit cholera.Eiusdem
affectus si-
gna.

Causæ.

Versus fine
libri.

Medicamentorum purgans. fecimus præcedenti capite. Quæ iterum in pauca exhibeantur quantitate, ne in grauiora pericula ægri ex immodica vacuatione ducantur. Id quoque seruandum erit ubi bilis, seu quiuvis alui succus vitiosus, ac corruptus ad excretionem procliuus naturam irritare videatur, nihil autem mentione dignum, vel per aluum descendat, vel per vomitum erumpat. Verum vomitus per solam aquam tepidam irritetur, derelicta aqua multa. Aluus verò ducatur aliquo prædictorum cap. præcedenti annotatorum, prout

Topica. diuersus requirit redundans humor. Cum verò humorum excretio quieuerit, veteri oleo masticchino, de absinthio, vel nardino cum vino exiguo fouendus, & probi fucci cibo vtendum erit. At si immodica fiat inanitio, ita quod vehementer, & vomitus, & deiectio vexent, cauendum penitus ne quicquam tribuatur, quod vomitum, vel aluum ciat, sed imbecillus ventriculus refici iis deuoratis debet, si fieri potest, quæ corroborant, & recreare queant, nepe victu, & medicina (vt liquet ex eod. Alex.) Exhibendi itaq; sunt in cibo pulli tui gallinacei, tum colubini, perdicæ, phasianii, turdi, & reliquæ montanæ auiculæ. Insuper poterit parari iusculum ex aliquo prædictorum, præsertim puliorum gallinaceorum cum omphacio, & pauca aqua rosacea, aut eorundem carnes contrusæ cum eisdem simul mixtæ: hoc etiâ tempore & ante, & post cibum maiora adstringentia adhiberi poterunt, veluti mespila, & sorba, citonia, & corna, & hi fructus, quas vulgus azarolas vocat, mala punica, & reliqua pyra adstringentia. Et ubi bilis adsit

Que denotanda sunt, ubi bilis adsit copia. copia, pituita cremor erit idoneus refrigeratus. Item lactuca refrigerata, pauco aceto adiecto, similiter etiam intybus, vt Alexand. refert. Nec erit absonum offerre mediocriter aquæ frigida potum cyathi mensura. Cauendum tamen erit ne nimium frigida existat, aut aceruatim exhibeatur, cui pampinorum vitis, aut mali punici acidi succus modicus instilletur, vel in eadem aqua capreolorum vitis decoctum fiat, aut rosarum, aut cenanthes, seu rhu, cui etiam menthæ paucillum sit adiectum. Itē eiusdem acidi mali punici succus cum menthæ succo absorbendus detur, multa tamen quantitate succus mali punici, menthæ succum excedat. In quem etiam vsus syrup. ex omphacio, è ribes, ex citri acido, ac succo malorum puniceorum acidorum, item myrtinum, & ex infusione rosarum siccarum, & incompletarum cum pauca quantitate eius qui ex mentha conficitur, tribuere poteris, nec minus cataplasmata, vnguenta, ac alia topica medicamenta ventri imponenda sunt, quæ vim adstringendi, ac ventriculum roborandi vim habeant, quorum copiam requiras præcedenti capite. Particularim autē ex palmulis, cenanthes, hypocistide, acacia rhu, & malicorio, succoque eiusdem cataplasma confici poterit, & ventriculo adhiberi ex Aëtij, & Pauli sententia, vel semperuidum, & lactuca cum mica panis, rosaceoque excepta imponatur. Quandoque verò capreolorum vitis, aut vitæ acerba, aut polygonij succus cum cerato probè confecto miscbitur, & maxime iuuabit, vt inquit Alexand. At ubi intolerabilis effusio existat, adeo vt fluxio sisti nequeat, vires vigeant, & extremorum refrigeratione, conuulsionesque, & animi defectio oriantur, ad vinum transeundum est medioeriter adstringens, neque viribus validum, & quod dulce quidem sit, non autem odoratum, sedque cum mica panis exhibeatur, aut in ipso eadem maceretur, exprimat ur-

Cataplasmata.

Vbi intolerabilis existat effusio.

que, atque ita paulatim, & per interualla cochleare absorbent. Nam vinum omnium maxime subito, & celeriter vires collapsas refocillare potest. Ac multos noui (vt inquit Alex.) ex sola illius potione præter spem mortis periculum euasisse. Salutare quoque erit, si eisdem vino menthæ decoctum admisceatur. Nam saluberrimum medicamentum erit, si vt idem auctor asserit, præsertim ubi vomitus diutius perseveret: omnique modo eisdem somnus procurandus est, & quies. At si ne his quidem auxiliis cibum retineant, magnopere conducit cucurbitulas admouere, statim cum æger illum assumpserit contra ventriculum ipsum. Nam valide retrahendo vomitum fieri prohibent. Præterea si diutius adherent, concoctionem iuuant & ventrē, ne amplius profluat, cohibent, eodem Alex. teste. Aluo autē adhuc egerente (vt inquit Aëtius) amyllum cum decoctione capitum papaueris per clysterem infundatur. Simul etenim cohibet, & refrigerat somnumque inducit, vt ipse refert. Frictiones quoque per manus adhibita quietat, & mites, & præterea extremorum deligaturæ, eisdem conducunt, & si quidem, aluus vrget, plures brachiis, & iuncturis, quibus illa cum manibus committuntur, cum frictione, tum vincula iniicienda sunt. Sin autem vomitus, tum femora, tum talos constringi, & paululum ipsa dissoluendo rursus deligare oportet, vt patet ex eodem Tralliano, quod materiam semper in contrarium reuellamus, odoramenta quoque nariibus admoueamur, ac illitiones soporiferæ circa frontem, ubi vigilie torqueant. At si extrema corporis partes frigent, vnguentis sunt calido oleo, cui ceræ paululum sit adiectum, calidisque fomentis nutritæ (ex Celsi auctoritate) & ad conuulsorias contractiones in musculis factas calida linimenta ex oleo modico imbuta circumponere oportet, tum cerata liquida, quibus adiectum sit aliquid castorei, & irini olei, ex Pauli & Aëtij sententia, quo etiam tempore interponenda potio absinthij est, vt idem Cels. statetur.

Περὶ τῆς διαρροῆς, καὶ πῶς αὐτὴν εὐχεῖται.

Id est, De alui profluvio, seu ventris fluxu.

CAP. LXXIII.



VBI & liquida aluus, & sæpius quam ex consuetudine fertur, affectus quidam exoritur, qui à Græcis *δυσπποια* communiter, simulatque ab Hippocrate 25. & 30. 3. lib. ac 32. 6. aliisque plerisque locis appellari cōsuevit. Quanquā ab eodem Hippocrate & Galeno quandoque *πῶς* nō nūcupetur, vt patet primo de morb. vulgari. à Latinis autem diarrhœa, seu alui profluvium, quāuis à Celsi cap. 19. libr. 4. ventris fluxus nominatur, qui copiosior fluxio est alui, diuturna sine phlegmone, & exulceratione, vt libro de definitio. medicis, scriptum est, vel (vt liquet apud Galenum, eodem primo de morbis vulgaribus) deiectio est, & semper affectibus, (vt ipse inquit) qui affectus prius ab eo descripti erant, dysenteria videlicet, lienteria, & tinesmus. Cum itaque aluus fluxione laborat, seu humidior efficitur citra cruentas deiectiones, tensionem, ac incoctorum ciborum excretionem, alui profluvium est, & dicitur. In quo quænam pars primo afficiatur, non admodum patet, nam licet deiectio optima, quæ mollis, cōstantque est, & eo tempore

Cucurbitula.

Frictiones & vnguenta.

Si vigilie torqueant. Si extrema partes frigeant.

Commen. 2. tex. 7. & 8. ment. 7. & 8.

Alui profluvium quid sit.

Lib. definit. medic. post. medium.

Commen. 2. commen. 35.

Dabit etiam pars affectus.

pore

pore secreta, quo secunda valetudine affuevit, quā-
titateque est pro ratione cibi assumpti, colore sub-
rufa, nec admodum graueolens, non solum inferior-
rem ventrem bene valere ostendit, sed etiam nihil
in eum decumbere ex aliis visceribus præter natu-
ram, ex Hippocrate & Galeni sententia 3. prognost.
intelligendo per inferiorem ventrem ventriculum
ipsum, & item ieiunum simul cum intestino omni,
vt Galenus asserit. non tamen contraria deiectio
(vt patet ex Galeno ibidem, & primo de crisi-
bus) confestim indicabit eundem inferiorem ventrem
præter naturam se habere. Nam quandoque permu-
tabitur tum in substantia, & colore, tum etiam co-
pia, ex permixtione alicuius confluentis humoris.
Neque etiam seruabitur tempus secretionis affue-
tum, & tamen venter inferior bene valebit. Sed à
iecore, aut liene, aut aliqua quauis alia parte, seu
corpore toto, vel duabus, seu pluribus in eundem
ventrem confluere contingit excrementa aliqua.
Qua de re alui deiectiones, vbi præter naturam se
habent, ventrem interdum solum esse affectum si-
gnificant. Sæpe verò decumbentis aliunde materie
in eum indicia habent. Atque hæc multiplicia sunt,
prout multæ quoque partes, vel corpus totum (vt
diximus) eandem materiam, seu humores in iam di-
ctum ventrem demittunt. Idque aut criticè esse po-
terit, vtputa cum per eos totum corpus, aut iecur,
vel quæpiam alia pars expurgatur, interim verò
symptomaticè. Quo casu affectionem aut corporis
omnis, aut partis alicuius (vt diximus) aut aliqua-
rum indicabunt. Et quibus liquidò constat in diar-
rhœa non perpetuò vnā affectam esse partem,
neque etiam ventriculum, aut intestina duntaxat,
sed interim iecur, aut lienem, seu cerebrū, aut cor-
pus totum affectum esse citra ventriculū, aut inte-
stinorum oblationem. Interdum verò contingit
quod ventriculus ipse, aut intestinorum aliquod af-
ficiatur corpore toto, aut reliquis eiusdem corpo-
ris partibus bene valentibus. Et quoniam tum pro
prognostico, tum etiam pro curatione huius affec-
tionis magnopere conducit determinatæ partis
primariò affectæ cognitio, veluti in cūctis aliis præ-
ter naturam affectibus necessariū esse monstraui-
mus, ea de re id docere conabimur. Interstingues
namq; si à toto corpore diarrhœa fiat, quoniam ade-
runt alicuius redundantis succi in toto signa, siue in
toto habitu fuerint, aut in vniuersis vasīs, qualiscū-
que etiam fuerit redundans succus. Particulariter au-
tem ea conscripta reperies apud Galenum cum lib.
de plenitudine, tum etiam 4. de sanit. tuend. ac aliis
plerisque locis. Præter id quod ociosa quoque vita
præcessit, consueti exercitij dimissio, ac ingestorum
ciborum, & potuum copia, aut consuetæ alicuius
excretionis retentio, neque vllum aderit signum
particularis partis affectæ. Verum si à toto fiat pro-
pter eiusdem corporis liquationē, cum portio car-
nis, quæ colligatur in ventrem defluit, tunc per al-
uum excernitur deiectio exigua, glutinosa, opima,
admodum graueolēs. Pariter si propter vniuersi cor-
poris retentricis facultatis imbecillitatem ex totius
corporis extenuatione precedente, ardentissimæque
febre, seu hectica, seu etiam tæbe, id conicere pote-
ris, quemadmodum Hippoc. scriptū reliquit apho-
ris. 11. 12. & 14. 5. lib. Cerebro autem affecto spumo-
sa aderunt excrementa, vt idem inquit Hippoc. 2.
aphoris. 30. 7. lib. nec minùs & imbecillitatis eius ap-
parebunt indicia, ac destillationes, & quādoque do-

lor. Quæ omnia scripta reperies cap. de dolore ca-
pitis, ac destillatione. Conuenit quoque vitio cere-
bri orta diarrhœa in somno potissimum longiori ma-
gis, quàm in vigiliis generari. A iecinore verò vbi
ortū fuerit alui profluuiū, vt plurimum chilosæ e-
runt alui deiectiones, probè tamē vetriculi coctio-
ne celebrata, potissimum si attractrix iecinoris fa-
cultas oblaesa fuerit, idque nō ob aliud (vt dicemus)
quàm propter distributionis imbecillitatem, nisi
plus cibi fuerit assumptū, quàm hepar indigeat, aut
citiùs fuerit deiectus propter ventriculū, & intesti-
norum retentricis facultatis imbecillitatem. Id
quod dignoscere valebis ex iis, quæ diximus cap. de
sæuitate intestinorum. Interim quoque bilis multi-
tudo in deiectionibus apparebit, ac signa aderunt,
aut inflammationis, aut immodicæ caliditatis eius-
dem quemadmodum si ab eius obstructione pro-
ueniat, obstructionis quoque aderūt signa. Sic si a-
lius quispia affectus iecinoris præter iā dictos affue-
rit, ex propriis eius notis id manifestabitur. Nos ve-
rò de eis in sequentibus fusissimè pertractabimus.
Sed quoniam idē iecur non solū sua ipsius extremē-
ta, sanieque, & humores præter naturam demittit
in ventrem, sed etiam corporis totius, quandoqui-
dem venter per id omnibus corporis partibus co-
pularur, ac per illud recipit excrementa earum, vt
liquet ex Galeni 2. prognostic. Propterea id distin-
guere poteris ex signis iam traditis. Si totū corpus
fuerit affectum aut si aliæ partes quædam, ex earū-
dem partium affectarū propriis indiciis. Verum si à
splene diarrhœa proveniat, vt plurimū deiectiones
ad nigrum vergentes, aut etiam nigra erunt, pate-
buntque particulares eius ægritudines ex propriis
earū indiciis, de quibus à nobis loco proprio me-
tio fiet. Accidit interim ab oris, seu linguæ affectio-
ne alui profluuiū, ab oris siquidem, vt in pueris cum
dentire incipiunt, maxime cum caninos edunt den-
tes. Quoniam alimentum non bene concoquitur,
neque distribuitur, vt patet aphor. 25. 3. lib. A lingua
verò, vt in blasīs, quemadmodū liquet aphor. 32. 6.
lib. Quoniam his qui balbi natura sunt contingit aut
cerebrum habere humidum, aut linguam, aut utrū-
que, atque inde fluentes humiditates in ventrem su-
scipi, vnde & longis profluuiis capiuntur, quemad-
modum Gale. scriptū reliquit com. iam dicti apho-
r. At si nullū aderit vniuersi corporis affecti, aut præ-
dictarum partium affectarum signum, vetriculum,
seu intestina affici putandum est. Alimenta quoque
interim non probè cōcocta cum humidioribus de-
iectionibus, admodumque aquosis apparebunt.
Neque tale alui profluuium determinatas habebit
periodos, deiectiones tamen aderunt crebræ, & e-
xiguæ, vt plurimum albæ, & piuitosæ. Interdū nau-
sea, & vomitus infestabunt, ac alia quædam sympto-
mata, quæ imbecillitatem retentricis ventriculū, &
intestinorū significabunt. Quæ omnia cap. de lien-
teria, & vomitu ostendimus. Verum inter reliqua,
vbi diuturnum fuerit alui profluuium, propriam
ventriculū passionem indicat ex Galeni decreto
commento præcitati aphoris. 32. sexti libri. Quod
verò quodlibet alui profluuium symptoma sit in ge-
nere excretorū immodicè, nemo veretur, nam
quæ in eo excernuntur, aut tota substantia, aut quā-
titate, aut qualitate à naturali recedūt. Itē quod (ve-
luti reliqua symptomata) omnino morbi succedat,
vel cōtinēter, vel aliis symptomatibus intercedēti-
bus, cuius patet. Etenim semper causam aliquā ha-

bet præter naturam, quæ ad talem motû, seu actionem naturam stimulat, ex Galeni sententia secundo de causis symptomatum, cap. 3. Ad hæc etiã quod ex necessitate ventris profluvia eueniant, vel coctione, vel distributione frustrata (nisi ad intestinorum exulcerationem consequantur) liquet apud eundem Galenum commento aphorif. 25. & 30. 3. lib. Non tamen necessario aut retetrix, aut expultrix facultas in eis oblaesa est, ex eiusdem Galeni auctoritate libro de differentiis symptomatum, cap. 4. Nam licet tum alimentum non bene concoquitur, neque distribuitur, consuevit alui profluuium euenire, immo absque iis fieri non potest, tamẽ cum ipsum, aut non probẽ concoctum sit, aut nõ distributum, vt decet, interim symptomaticẽ, hoc est non ad animalis commodum, neque tempestiue excernitur. Interdum autem tempestiue, & ad animalis salutem, & cũ virtutis robore. Id quod maximẽ in hac affectione attendendum est pro eius curatione. At quomodolibet fiat alui profluuiũ, crebriores, ac liquidiore deiectiones aderũt, cum leuiori, ac tolerabili interdũ dolore, interim autem grauissimo, vt Celsus fatetur, cap. decimonono libro quarto. Verũ nũquid ea, quæ deiciuntur bonæ sunt secretionis indicia, aut secus, sic interstingues. Nã si madens, seu aquosa deiectione crebro, & paulatim, aut vniuersim, & sæpẽ deiciatur, ac cum stridore, grauissimoque dolore, symptomaticis rationem obtinebit, ac symptomatica erit, natura non per se expurgante, sed ex aliquo irritamento stimulat, neque inde utilitas vlla prouenit, immo talis euacuatio prauæ dispositionis erit signũ, vt liquet commento aphorif. 2. quarti libri. Idque potissimum, vbi in principio apparuerit, nulla coctione præcedente, & in febribus. At si multo interposito tempore, ac vniuersim, citra stridorem, cum exiguo aut nullo dolore excernatur, præcesserintque coctionis signa, ac proportionata corporis dispositioni fuerit alui deiectione, agerque faciliẽ toleret, & iuuetur ex tali euacuatione, leuius se habẽs, virtusque robustior euadat, tunc bonæ secretionis indicium erit, quia natura expellit per se, atque expurgat noxios redundantes succos, qui corpus infestabant. Vtẽque verò fiat diarrhœa, eius causa erit, aut malẽ concoctus, aut malẽ distributus cibus in inferiori ventre, vel humor quispiam ad eum confluentis à toto vel aliqua corporis parte criticẽ, aut symptomaticẽ deductione à finibus concidente, & propterea vel iocinoris, vel reliquarum corporis partium concoctione, seu distributione oblaesa tale quoque fit alui profluuium, cum & quælibet madens deiectione fiat, vt testis est Galenus eodem secundo prognosticorum, propterea quod non fuerit ex ventriculo deductio ad iecur, vel quia de iecore, vel lie ne aliquid defluerit in eum. Cũ nanque humorum superabundantia per alium expurgatur, alui profluvia fiunt, ex eiusdem Galeni testimonio commento aphorif. decimiseptimi, tertij libri. Ex quorũ permixtione cum alui deiectionibus (vt diximus) variari cõtingit, non solum deiectionum color, verum etiam consistentia, atque odor, itẽ & copia, neque etiam seruabitur tempus secretionis assuetum, verũ si quis velit non propriẽ, sed vniuersaliori vocabulo hanc affectionem alui profluuium nuncupare, cum in ea nec concoctio ventriculi, seu intestinorum, nec distributio ex eodem ventre inferiori ad iecur fuerint per se lesæ, vel fateri in hac quoque

affectione coctionem, aut distributionem ventriculi, vel intestinorum oblaesam esse (& propterea alui profluuium dici) licet non per se, & primo, non reclamabimus. Nos verò diarrhœam, seu alui profluuium dicimus quancunque humidorum excrementorum crebram deiectionem, iuxta Galeni sententiam, primo de morbis vulgaribus, (vt superius adnotauimus.) At vbi admodum aquosa deiectione fuerit, minimẽque graueolens ad candidum potius vergens, quam croceum, seu nigrum, & interim spumosa, alimenti non probam concoctionem, seu eiusdem imperfectam distributionem indicabit, aderuntque nonnulla signa eorum, quæ ventrem ipsum affectũ ostendebant. Verũ si ex alimentorum copia, aut eorundem mala qualitate talia fiant excrementa, ex agro, seu assilientibus id percipere valebis, quo casu, nec coctio, nec distributio per se oblaesa erunt. Vbi verò ruffa, seu admodum crocea alui deiectione fuerit, bilem esse causam iudica, potissimum si ætas, temperamentum, habitus biliosi fuerint, ac tempus anni, regio, & aëris constitutio ad calidum vergent, similiter & antea cõta vita. Sic si pituitosa, aut melancholica deiectiones fuerint, ac modo dicto ad pituitam, vel ad melancholiam vergant, pituitam, aut melancholiam alui profluuij causam esse putabis. Quod si syntectica fuerint alui excrementa, id quod in calidissimis, ac pestiferis febribus contingit, si in corporibus generetur humidis, ac mollibus, & pinguibus, vt liquet decimo methodi medendi, cap. vltimo. colligationem tum carnis, tum adipis significabunt, habebuntque diuersum curationis modum: cum iis videlicet quæ refrigerant, & humectant corpus, nutriendes nos, ac quamprimum frigidam exhibentes, vt fusiũ dicitur, cum de febribus sermo habebitur. Vno autem die fluere aluum (vt inquit Celsus præcitato loco) sæpẽ pro valetudine est, atque etiam pluribus dum febris addit, & intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, vt ipse inquit, & quod intus laesum erat, vtiliter effunditur. Verũ spacium periculosum est, interdum enim tormina, ac febriculas excitat, virẽque consumit. Alexander verò cap. 5. lib. 8. dicebat alui profluuij in febribus difficiliorem esse curationem, animaduersionemque, & coniecturam requirere. Quod verò balbi à diuturno alui profluuiio capiuntur, liquet apud Hippocratem aphorif. 32. sexti libri, similiter quod longo alui laboranti profluuiio spontaneus vomitus superueniens morbum soluit, aphorif. 15. eiusdem libri scriptum est, quemadmodum quod exigua deiectione glutinosa, candida & subcrocea, mala sit, potissimum vbi leuis fuerit: exitiosior verò si nigra, aut liuida, aut opima, aut foetida, diuturnior, si vericolor sit, sed nihilominus etiam exitialis, idẽmet Hippocr. scriptum reliquit secundo prognosticorum. Quantum ad curationem spectat, animaduertendũ, quod licet alui profluuium tum in febribus, tum citra febres eueniat, & in febribus difficilior sit eius curatio, ex Alexandri & Aëtij sententia, tamẽ si citra febrẽ contingat, neque facilis eadem erit, cum & ipsa diarrhœa (vt diximus) vt per viam symptomaticam, ac vacuationem symptomaticam, vel per modum iudicationis prouenire possit. Et propterea non semper eodem modo curanda erit. Facta nãque per modum crisis, ita quod per eam totum corpus, aut aliqua eiusdem corporis pars expurgetur, ac vtiliter ea excernantur quæ sint corporis commodo, minimẽ

Modus distinguendi
num criticẽ
et, vel symptomaticẽ
per alui
profluuium
excernatur.

comment. 14

comment. 3
Causarum
cognitio.

Prognostica.

2. prognost.
tex. 21. 22.
Ex 23.
Que attinet
ad curationem
lib. 9. ca. 35.

minimè reprimere, seu inhibere conuenit, ne materia in aliam conuersa partem prauos alios affectus generet, veluti phrenitum, aut lethargum, seu perniciosas parotidas, vt eisdē Alexandro ac Aëtio visum est. Sed cum salubriter à natura aliena euacuantur, aut vsque quo eadem omnem curam suam impenderit, expectare oportet, aut ipsius etiā motus adiuuare, nam (vt idem Alexander fatetur) vidit quandoque ventrem initio affectus ad quartum, quintumve diem profluxisse, & postea fluorem, aut per se, aut medici auxilio substituisse, vnde ægri in magnum periculū inciderunt, vt pote in aliquem prædictorum affectuum. Quid plura? Hippo. aphor. 20. primi libri decretum reliquit, quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis siue aliter irritando, sed finire oportet, & Galen. in cōmend. dicebat, Nos Hippocrate docere quando sit totum ipsi naturæ permittendum, quod ad curā pertinet agrotatis, nihil aliud nobis agentibus, nisi victum conuenientem instituentibus, quando etiam non sit totum ipsi naturæ permittendum sed aliquid nos oportet operari, & proinde cum integra iudicatio facta iam est, vel adhuc sit, totū naturæ permittere, & nihil nos nouare oportet. Vbi verò nō integrè iudicatur, aut iudicatum est, id quod deficit, supplere nos conuenit, id quod etiam confirmauit nono meth. med. cap. 5. & libro primo de arte curatiua, ad Glaucon. cap. 14. cum dixit, Sed neque si fuerit febris cum profluvio ventris, alia est opus euacuatione. Verū hęc sola sufficit, quamuis non sit pro multitudinis ratione, quicunque enim his plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem mouere tentarunt, in grauiora pericula duxerunt. Reddeunt itaque ad ea, vnde oratio diuersa est, dicimus cū Hippocrate & Galeno ac reliquis præcatis auctoribus, quod cum integrè iudicatio facta iam est per alui profluvium, vel adhuc sit, totum naturæ permittendum erit, nihil aliud nobis agentibus, nisi victum conuenientem instituentibus. Erit autē conueniens victus, quod ad eius quantitatem, prout vires requirunt, ac reliqua, quod ad qualitatem spectat, diuersus pro diuerso redundante humore, & vt summam dicam, similis ei, quem instituimus, cap. de cruditate, de lienteria, aut cholera, donec ipsa se natura componat, & ad integram pertueniat sanitatem. At si non integrè videatur iudicare, ac segnis natura in euacuando fuerit, motum eius adiuuare oportet, & si criticè euacuet, vt prædictis Alexandro & Aëtio visum est, seu id quod deficit supplere nos conuenit, vt Galeno placuit præcatis commentis aphor. 20. primi libri, quod ex coniunctis amobus perficiatur quod postules, ex eiusdem Galeni auctoritate præcatis libro 9. method. meden. cap. 5. Sed mox quispiam inficias ibit, asserens pugnare hoc eiusdem Galeni sententiæ nunc citatæ, primo de arte curat. ad Glauco. cap. 14. vbi præcipit, quod quamuis euacuatio non sit pro multitudinis ratione, tamen ea sola sufficit quæ à natura fit, nec alia opus est euacuatione. Cui responsum sit, Galen. nō sibi ipsi pugnancia conscripsisse, si quis ea, quæ præcatis comment. ac primo de arte curatiua scripta reliquit, rectè inspexerit, nam licet quo tempore natura corpus expurgat, id quod excernit, nō sit pro multitudinis redundantis humoris ratione eo tempore: confidendū autem ei sit, quod in futurum valeat ipsum integrè expurgare, cuius dubiū venerit

totum naturæ esse permittendum, & nihil innouandum vt diximus. Id quod consulere voluit idem Galenus præcatis libro primo de arte curat. ad Glaucon. cap. 14. At si quæ iudicantur, tempore, quo iudicantur, neque integrè à natura iudicantur, neque omnino fidendum, quod ab ea in futurum perfectè, & integrè iudicari valeant, tunc oportet (vt idem Galenus præcipit præcatis aphor. comment.) id quod deficit nos supplere, & hanc sententiam sectati sunt Aëtius, & Alexander vt superius dictum est. Iuuanda itaque ipsa natura erit pro curatione diarrhœæ cum non integrè, perfectè, ac indeficienter ipsa iudicauerit, aut iudicat, neque fides habetur eam posse in futurū integrè iudicare, & corpus perfectè expurgare, per eandem siquidem viam, per quam natura expellere tentauerit. Nanque ducere oportet quod maximè natura vergit per loca conferentia, eō ducere iussit Hippo. aphorismo 21. primi libri. Quo loco subdebat Galenus, quod quæ videlicet, neque iudicantur, neque integrè sunt iudicata, illa sunt, quæ ducere oportet per locum, ad quem ex conferentibus natura vergit. Corruptis igitur cibis in causa diarrhœæ existentibus, pro natura corruptelæ eorundem assumptorum ciborum purgandi erunt. Nam si ad frigidum corruptela vergat, medicamentis, quæ frigidos expurgant succos, vt oportet. Si ad calidum, quæ calidos humores expurgant propinanda sunt, quemadmodum cap. de vomitu, & lienteria scriptum est. Deinceps verò eis quæ ventrem roborant eodē loco conscriptis vtendum. Verū vbi biliosa fuerint alui deiectiones, bile ad inferiorem ventrem confluente, eadē prius contemperata, domata, euicta, ac præparata ex oxy saccharo, seu syrup. ex infus. rosarum, aut cichorij succo, tale purgans medicamentum exhiberi poterit, Recipe tamarindo. vnc. j. fiat decoctum in aqua cichorij, & acetosellæ, in cuius expressione dissoluas rhabar. drac. j. vel scrup. iij. cui exiguum quid spicæ fuerit additum, maceretur autē per aliquod spacium, aut in vnc. j. s. sit succi rosarum, aut in parte prædicti decocti, & absque hoc quod per colum transfusum, misceatur ei mellis ærei vnc. ij. aut vnc. j. s. & exhibeatur. Poteris etiam prædicto decocto addere corticum myrobalanorum citrinarum drac. j. vel drac. ij. Perpetuò autem tam in hoc, quam in quolibet alio alui profluvio, vbi purgans medicamentum præbetur, moderatū sit oportet, ne ex immodica euacuatione vires prosterantur. Pari ratione adstringentia magis, vel minus admiscenda erunt cum purgantibus medicamentis, prout magis, vel minus alius profluvio laborat, ac vires ipsæ magis, vel minus euacuare permittunt, ac plus, vel minus ventris partes fuerint imbecillæ. Vbi verò pituitosus fuerit redundans succus, eodē prius concocto, ac præparato ex melle rosaceo, seu ex oxy mellite, syrup. è succo boraginis, vel è corticibus citri, aut reliquis similibus, idem expurgandus erit, aut ex agarici decocto cum syrupo è pluribus infusionibus rosarum vel rubearum, vel persicarum, & dia catho. vel loco prædictorum syruporum vnc. j. mellis ærei adiecto, aut ex eodem agarico simul cum rhabarbaro, ac pauca spica formato catapotia, & vtare. Post quæ aliquod leniens medicamentū exhiberi poterit, & si videbitur, prædictis medicamentis drac. j. aut drach. ij. myrobalanorum chebularum adiacere poteris. Quanquam nostris temporibus ea ne peius, & angue Medici quidā thessalici pro cu-

Si ex corruptis cibis, fiat medicamentorum ratio.

Si ex bilis fiat curatio per medicamentum.

Si ex pituita oriatur curatio.

De Agarico
Cap. pro-
prio.

Aduersus
Mesuem.

Si ex atra
bile fiat, cu-
ratio.

Clysteres.

Vbi diu-
tius perse-
nerauerit
alui proflu-
uium.

ratione alui profluuij agaricum vitent, quadam
Ioannis Mesues auctoritate (ab eisdem prauè in-
tellecta) freri, quod videlicet læsionem aliquam
imbecillis visceribus imprimat, ea debilitas, vt pro-
pterea indigeat permixtione abstergentium cum
ipso, velut ipse inquit. Verum cum agaricum i-
psum primo gustu dulce sit, sed paulò post suba-
marum, ac acrimoniz quandam speciem temporis
spacio inducens, leuiculaque adstrictiois sit par-
ticeps, & propterea digerendi vim habeat, inci-
dendi, ac expurgandi infarctus viscerum, ex Galeni
auctoritate sexto, de simplicium medicamen. facul-
tatib. cap. de agarico. Ad hæc cum omnibus in vni-
uersum interioribus vitiis accommodatum sit, vt li-
quet apud Dioscoridem cap. primo, libro tertio.
miror Ioannem Mesuem talia proferentem & à quo
sapiente (vt ipse inquit) ea transcripserit. At si & il-
lud quoque admittatur, per eundemmet liquet per-
mixtionē abstergentium cum ipso id vitari posse,
quod scilicet læsionem non imprimat in visceribus,
ea debilitans. Ipse verò cum sapius eo vsus fuerim
& in decocto, & in substantia, vbi vsus expostula-
uit, ingentem semper vtilitatem ex eo provenire
conspexit, nullumque incommodum agris ex eius
assumptione exortum fuit, nedum pro curatione
alui profluuij, verum etiam dysenteriz propriè di-
cta, ac hepatica, veluti nuper in Ferdinando de Ca-
pua primogenito filio Illustris Ducis Termularum
expertus sum, qui cum bis in catapotis simul cum
rhab. ipsum exhibuissem, præter aliorum medico-
rum votum, ex eo perfecte curatus fuit, tum ex alui
profluuij, tum etiam ex hepatico affectu, quibus
decem ferè mensibus laborauerat. Erat autem af-
fectio hepatica ex frigida iocinoris intemperie orta,
aluique profluuij pituitosum. Tuto itaque, ac cum
ratione agarici diluto, seu decocto, aut etiam eo in
catapotis redacto cum paucis rhab. ac chebulis pro
cura alui profluuij pituitosi vtare. Et vt Ioanni Me-
sue satisfacias, ac empiricis istis hodiernis medicis,
qui vires medicamentorum ignorat, & quod ex eis
proveniant diuersæ operationes, cum diuersarum,
ac inequalium sint substantiarum nesciunt, aliquid
abstergentium ei permisceto. Etenim quauis ætate
non dærent semper noui Thessali, veluti huc vs-
que adeò non defuerunt. Si verò ex succo melan-
cholico fuerit excitata diarrhœa, idem è fumariz
succo parato syr. aut boraginis, seu lupulorum cum
eo, qui ex infusione fit rosarum, aut è corticibus ci-
tri cum aquis mellissophylli, lupulorum, & oxalidis
prius concoctus, ac præparatus, expurgandus quo-
que erit ex infra scripto medicamento, quod recipit
senæ, epithymi ana drac. iij. corticum myrobalano-
rum indarum drac. ij. fiat decoctum in aqua cælesti,
vel acetocellæ, & boraginis, in quo vnc. ij. aërei
mellis, aut vnc. iij. syr. ex pluribus infusionibus ro-
sarum rubearum, cum vnc. s. diacathol. dissoluas.
Interim quoque qualiscumque fuerit redundans hu-
mor, clysteribus vtendum erit, ex hordei non de-
corticati, ac torrefacti decocto, gallinarum, seu pul-
lorum gallinaceorum iure, saccharo rubeo vocato,
ac oleo rosaceo paratis, præsertim vbi bilis redun-
darit. Pituita autem redundante in vicem olei rosa-
cci chamæmelino, aut anethino vtendum, & loco
sacchari rubei, rosaceo melle. Similiter etiã vbi ni-
gra bilis deiiciatur, eisdem, vel similibus vtare. A pur-
gatione verò, vel vbi alui profluuij diutius perseue-
rauerit vires consumens, ac habitum colliquas, tunc

sanè sistere ei oportet, tum per ea, quæ per os lu-
muntur, tum quæ per anum infunduntur, atque ea,
quæ forinsecus imponuntur, ex Aëtij decreto, & etiã
Alexand. Nam cum euacuatio modum excedit (vt
inquit Paulus cap. 38. libro 2.) cohibenda alius est.
Verum vbi biliosa, & pura recr. menta fuerint, non
statim admodum adstringentibus medicamentis
cohibere oportet, sed in magis salubria ea permu-
tanda sunt, ac cōtemperanda, iuxta eiusdem A-
lexandri & Aëtij sententiam, velut sunt cibi boni,
atque paulò crassiores succum generantes, cuius-
modi pitana est, & eius cremor, ex Pauli auctori-
tate. Poterit autem ea parari ex torrefacto hor-
deo propè contuso, seu extenuato, & aqua pluui-
ali, adiectis mali punici acidigranis, ac oxalidis fo-
liis, aut in iure gallinarum, seu pullorum gallina-
ceorum, eisdem quoque adiectis, hordeum sic para-
tum decoquatur. Biliosus nanque humor cibus le-
nientibus magis, vt descendat, quam in corpore re-
tineatur, est sollicitandus, vt inquit Alexand. aliis
torum morbum grauiorem efficit, & nonnulla alia
symptomata gignit, vt ipse refert. Verum ad talcis
biliosas fluxiones nullum compendiosius remediū
reperitur, vt prædictis Alexandro & Aëtio visum
est, quàm lac bubulum, aut caprillum. Qua de re si
febris non vrgeat, tepidum, recensque multum, ac
potatum magnopere auxiliatur, aut ad ignem deco-
ctum, & asidue agitarum, donec ad tertias sit reda-
ctum, similiter etiam, si per filices fluminales igni-
tos, & candentes ferri laminas in ipso extinctas co-
ctum fuerit, potui datum iuuat. Spuma verò dum
lac coquitur penna, aut cochleari auferri debet.
Hoc nanque nullum præsentius remedium, vt Ale-
xander inquit, ad biliosas fluxiones inuenire licet.
Si verò simul cum alui profluuij bilioso, febris
quoque vrgeat, lac ipsum purum assumptum plus
noxæ, quàm commodi afferre solet, quare ipsum
exhibere vitabimus. Verum si quarta pars aquæ la-
cti misceatur, coquatique vna, donec dimidium
totius consumatur, ipsum exhiberi poterit absque
periculo, vt eisdem Aëtio, & Alexandro visum est.
Sed mox obiiciet quispiam afferens hoc repugnare
Hippocrat. atque Galeni sententiæ aphorism. 64.
libri quinti, quo loco malum esse lac, quibus in fe-
bribus acutis biliosæ sunt deiectiones scriptum
est, quoniam in nidore celerrimè vertetur. Cui
respondebimus nos primò Hippocrat. ac Galeni
decretum veritatem habere, cum nulla præcesserit
corporis euacuatio, sed multa adhuc adsit in corpo-
re bilis copia, & febris acuta sit valida. Nos verò
post purgationem ipsum probauimus, ac febre non
adeò valida existente. Secundò, & melius, quod
cum simul aderunt biliosæ deiectiones, & febris,
aut lac ipsum non competit, vt Hippocrat. & Gale-
no visum est, aut si exhibetur, id affusa aquæ quarta
parte, & decoctum (vt diximus) donec dimidium
totius consumatur, exhibendum erit, quo modo
exhibitum approbarunt Aëtius, & Alexand. nec
Hippocrat. & Galen. illud negarunt. Etenim vita-
runt, purum ipsum lac, & non prædicto modo præ-
paratum. Verum adhuc Gale. verba præcitato cō-
mento aphorism. 54. quinti libri, præbent dubitandi
ansam, nam non solum vtrique simul iunctis, bilio-
sis scilicet deiectionibus, & acuta febre noxiū esse
lac ipse ex intentione Hippoc. statuit, sed etiã scor-
sum in alterutro aduersatur, vt ipse inquit. Qua de
re nec si absque febre acuta fuerit alui profluuium,
tribuen-

De lacte
notat.

tribuendū esset ex Galeni sententia. Nam in vniuersum, eo auctore celerrimē ab omnibus causis calidis in nidorem conuertitur, nisi esset quod ex iis quæ diximus prima responsione primi dubij, facile nodus hic dissoluitur, neque enim magna existente syncera bilis copia, nullaque præcedente, aut exigua euacuatione lac probamus. Nec probant eo casu Alexander & Aetius, sed eo tempore ipsum exhiberi præcipiunt, quò diutius perseverauerint fluxiones biliosæ adeo vt & habitum veluti colliquant, ac vires consumant, quo tempore lac ipsum euinci, ac mutari, à bilioso excremento, cum exiguum sit, in nidorem non valeat, citiusque distringitur, cum partes refectione indigeant. Vel dicas ex prædictorum sententia, vbi hæsitabis ne in nidorem conuertantur lac, quod ipsum ad ignem decoctum, aut per fluuiales filices, seu ferri laminas ignitas paratum, tutò exhiberi poterit; & sic sententiæ Galeni non repugnabit. Tale siquidem lac si præparatum, non adeo promptē in nidorem vertetur, veluti si purum exhiberetur, & cum hoc quod alui non subducit, contrarium etiam efficit, eodem Galeno auctore tertio, de aliment. facultatib. ca. 15. & decimo de simplicium medicamentorum facultatib. ca. de lacte. Quò fit, vt optimum sit remedium dysenteria, & omnium ventris acrim fluxionum, vt ipse inquit. Et vbi affectio adhuc non cesserit, viresque admodum ex biliosis defectionibus immodicis imbecillæ reddita sint, adstringentibus quoque sistere oportet syrup. ex citri acido, aut ē ribes paratum exhibens, pariter, & myrtinum, & eum qui ex infusione rosarum siccatum, ac cydoniorum succo conficitur, & si videbitur, puluerem margaritarum, cornu cerui vsti, & seminum oxalidis, ac plantaginis adiacere poteris, eiusdem pulueris assumens scrup. j. vel ij. cum vnc. j. vel vnc. ij. alicius ex prædictis syrupis. Nec minùs confert, & rosaceum saccharum vetustum cum aqua oxalidis, vel plantaginis exhibitum, & vbi hæc non suffecerint, ad trochiscos de spodio, seu ē succino deueniendum erit, seu de terra lemnia. Similiter per ea, quæ per aluū infunduntur auxiliari oportet, ex decocto videlicet plantaginis, rhu obsoniorum, balaustiorum, hypocistidis, ac hordei non decorticati, ac torrefacti, cuius decocti assumpta sufficienti quâritate vnc. ij. vel vncias iij. olei rosacei omphacini, & tantundem sacchari rubei, & vnc. ij. vel vnc. iij. succi plantaginis, aut portulacæ, duosque ouorum vitellos adiacias, & vtare. Extrinsecus verò irrigationes adhibeantur ex oleo omphacino, rosaceo, myrteo, seu citoniorum cum vino, quarto videlicet, vini parte ei admixta, sit autem vinum album, & subadstringens. Poteris insuper malicorium, gallas, cupressi pilulas, balaustum, hypocistim, & reliqua quoque adstringentia in ipsa irrigatione incoquere, similiter ceratis, vnguentis, emplastris, ac reliquis medicamentis, ca. de lienteria, & vomitu conscriptis vtare. Ad alias quoque alui fluxiones, vbi sufficiens iam euacuatio sit facta, fluxioque ipsa adhuc perseveret, adstringentibus etiam medicamentis eis resistere oportet, quomodocumque adhibitis, siue per os sumantur, siue per aluū infundantur, aut extrinsecus imponantur, vt diximus. Quæ de re syr. ex absinthio, ē corticibus citri, myrtinum, & eum, qui ex mentha conficitur, præbeto, aut diacotoneon cum speciebus, pyrisimum autem eo medicamento, quod à Galeno sextode de sanitate tuenda ex succo cotoneorum, zinzibere, ac pipere albo, aceto, & melle conficitur, vtare. Munui autem poterit, & piper, & zinziber, prout venter magis, & minùs frigida intemperie laborat. Cū prædictis item syr. scrup. j. aut drachm. s. infra scripti pulueris exhibe, qui recipit vtriusque mentha sicca drach. ij. cinnamomi, maceris, galangæ singul. scrup. j. seminis plantaginis, cornu cerui vsti, & seminis oxalidis ana drachm. ij. fiat puluis, in quem etiam vsum si recenti theriaca, aut mithridato vtaris, non parum confert. Nec minùs & drachm. j. vel scrup. ij. trochiscorum ē spodio, seu ē terra lemnia, si tribuantur cum iam dictorum syrup. aliquo conducit, mora etiam immatura, & adhuc acerba ad solem pluribus diebus desiccata, deinde trita, & reposita, vsque expetente bibita magnum pharmacum alui restrictum sunt, vt ad diurnas etiam colicatas affectiones commode exhibeantur, aliasque omnes, quæ fluidæ existunt, atque etiam dysenterias, ex Aetij auctoritate. Contunduntur quoque eadem mora, & obsoniis admiscantur quemadmodum etiam rhus culinariis consuevit. Magis tamen aluum cohibent rubi mora immatura, & acerba eodem modo exsiccata, & in potu exhibita, vt idem inquit Aetius. Decoctum insuper ex foliis, & corticibus pini, pilulis cupressi, fursure, gallis ac foliorum plantaginis cum oleo myrtino, aut masticino per anum infundas. Nec minùs extrinsecus ex oleo masticino, myrtino, de absinthio cum tercia, aut quarta vim odorati parte admixta, irrigationes competunt. Similiter ex oleo nardino, aut costino, & si maius vnguentum, hoc modo parabis, Recipe chiæ mastiche, corticis thuris ana drachm. ij. pulueris mentha, & cinnamomi ana drachm. j. s. olei nardini vnc. s. olei masticini, & de absinthio, singulorum vnc. j. vini odorati, & ceræ quantum satis sit, fiat vnguentum. In oleo quoque nardino, ac de absinthio si vnc. j. s. chiæ mastiche dissoluas, & in emplatri formam redigas, atque ventri superimponas, magno opere confert. Pariter & emplastrum ē galia, aut id, quod à Galeno describitur primo de arte curatiua ad Glauconem. Constat autem ex palmulis, vino, farina hordei, croco, aloë, ac mastiche. Adhibebis etiam ventri sacculos ex milio, sale, aut panico factos, aut etiam ex fursure, & hordeo torrefacto. Nam hi quoque fluxiones desiccant, vt Alexandro visum est, nec minùs & ex cumino, & apij semine, Nam & ij. vrinam quoque cient, cum & hoc etiam tempore conferat ea exhibere quæ vrinam ciunt, fluxionesque ad intestina eò diuertunt, vt eisdem Alexandro & Aetio visum est. Diuersa siquidem pro redundantis humoris diuersitate, nam quibus supremo dum humida aluus deprehenditur, iis potum humorem exhibebimus, ac præterea illi viam ad vesicam parabimus, Galeno teste commento aphorismi vltimi, quarti libri. Cæterum extremæ corporis partes nempe brachia, & crura, cum deligari debent, tum etiam fricari, nam & hæc quoque alui fluxiones diuertunt. quo etiam tempore & reliquis partibus ad ventrem fluxionem mitentibus, si ita fieri contingat alui profluuium prospiciendum erit, prout affectus partis dispositio exigit. Vbi verò alui profluuium ortum fuerit, natura non per se corpus expurgante, sed propter aliquod irritamentum, aut quia præ multitudine à vasis reducantes non contineantur succi, ita vt quicquid excernatur, symptomatis ratione sit, neque inde vlla proueniat utilitas, modo talis euacuatio prauæ dispositionis sit, signum,

Infusa per aluum.

Topici.

Loco citato.

Si quod excernitur per alui profluuium fuerit symptomatis ratione curatur.

potissimum si cum febre copulatur, siue simul cum ea inuadens, siue ad eam sequatur (circa initia tamē) siue ipsum alui profluuium febrem præcedat, & deinceps ipsa consequatur, tunc neque totum naturæ permittendum erit, nec ipsam iuuare oportet. Quinimodum ipsum alui profluuium cohibere necessarium erit, iuxta Hippocratis decretum aphor. 2. quarti libri, cum dixit. In medicationibus talia educere è corpore, qualia sponte prodeunt, utile. Quæ verò contrario modo prodeunt, cohibere oportet, neque enim in hoc imitari naturam debemus, cum ex eius euacuatione nulla proueniat corpori utilitas. Quæ de re ubi vires, aut ætas non prohibeant, in hoc alui profluuium audacter vena secanda erit, vt & ipsum alui profluuium cohibeatur, ac qui confluunt ad ventrem redundantes succi, cum quo non oportet, vergant, reuellantur, ex eiusdem Hippocratis sententia, sexto de morbis vulgaribus, cum dixit reuelleret, si quo non oportet, vergant: & si ex toto confluant succi, media vena secanda erit. Si ex iocino- re, interna cubiti cubiti, si ex liene, sinistra. Si ex capite, externa cubiti vena incidatur. Verum non tanta sanguinis copia exhaurienda erit, quantam exigit dispositio, sed minor, & potius, si oportuerit, iterari debet, quam simul multam sanguinis copiam educere. Et si quispiam obiceret asserens id aduersari Galeni sententiæ, quarto de ratione vitæ in morbis acutis, cum dicebat, fluente aluo, sanguinem non detrahes, nam si post detractionem perseverat fluor, virtutem prosterneat, respondebimus nos Galeni verba veritatem habere alio critice fluente, & non symptomaticè, id quod nos etiam cum eo asserimus. Verum si symptomaticè fluxerit, venæ sectionem cum non prohibere, quemadmodum nos admittimus. Quanquam etiam & de immodica sanguinis missione, immodicòque alui fluore, coctione, vel distributione cessante etiam orto, ibi loquatur, id quod ostendunt eius verba, cum dixit, nā si post detractionem perseveret fluor, virtutem prosterneat. Quo casu neque nos talem consulueremus sanguinis missionem. Similiter eiusdem Galeni verba intelligenda sunt, conscripta primo de arte curatiua ad Glauconem, cum dixit, Quicumque enim iis (loquens de alui profluuium cum febre) plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem vomere tentarunt, in grauiora pericula duxerunt. Neque enim aluo fluente sanguinem mittere oportet, si id quod excernitur, fuerit naturæ ratione, ac exinde iuuatur animal; velut etiam neque secanda vena erit, si alui profluuium adeo modum exceßerit, vt vires proster- nat, vires etenim tunc eam prohibebunt, & eò magis, si eadem copiosa fieret. Verum ubi circa initia alui profluuii, præsertim cum febre coniuncti, exacer- tē noueris naturam ex irritamento aliquo, aut ex multitudine grauata, per aluum excernere, neque exinde utilitas proueniat animali (vt diximus) ve- nam secabis, iam dictis Hippocratis auctoritatibus fretus, ac etiam Galeni commento aphorismi 22. quarti libri, cum dixit. Quando aliquis incipit mor- bus, si quid excernitur, nihil tunc excernitur naturæ ratione, sed sunt omnia symptomata earum, quæ præter naturam sunt dispositionem. Quo enim in tempore à causis morbum facientibus natura gra- uatur, & adest cruditas humorum, tunc aliquid uti- liter euacuari est impossibile, siquidem oportet co- ctionem præire, subsequi verò discretionem, & po-

stea euacuationem, vt bona sit crisis. Nec illud ra- tio, & auctoritas duntaxat affirmant, verum etiam experientia ipsa comprobant. Nam cum ferè annis viginti quinque in curandis agris vacauerim, sæ- piusque mihi talia occurrerint præ manibus alui profluuium, cum venam secari iussissem, semper egris bene successisse compleximus, nec vnquam quid- piam mali superuenit. Hac item ratione frictioni- bus, vinculis, ac aliis extremarum partium reuulsi- onibus salubriter vtendum esse consulo, & ibi iam dictis reuulsionibus tale alui profluuium etiam nō cesserit, prædictis quoque tum medicamentis, tum cibis adstringentibus intus, extræque adhibitis, ac per sedem iniectis vtare. Nam omnino quibusvis modis cohibere tale alui profluuium oportet, cum ex eo nullum animali pareat commodum. Nec illud obliuioni vnquam tradas rogo. Nam qui aliter curare tentarunt, nedum in grauiora pericula a- gros duxerunt, sed exitij causa fuere. Si verò ob re- tentricis facultatis imbecillitatem orta fuerit diar- rhœa, ea exhibenda sunt medicamenta, quæ ad a- lias immodicas alui fluxiones approbauimus, intus vel extra, prout requirit intemperies, quæ imbecil- litatis causa existit.

Id est d' dysenteria.

Id est, De dysenteria, seu torminibus.

CAP. LXXIIII.

INTER intestinorum mala, tormi- na esse cōsueuerunt, d' dysenteria Græ- ci vocant, Celsus auctore cap. 15. libri quarti. Idque nomen ipsum indicat, Nam ex numero eorum affectuum qui nomen à lasa particula sumpserunt, existit, vt liquet secundo method. medendi. Intestina etenim à Græcis *ēvtripa* nuncupatur. Cælius Aurelianus li- bro quarto cap. 6. dicebat à difficultate officij pas- sio nomen accepit dysenteria. Sunt qui difficulta- tem intestinorum eam appellat. Nos verò quan- doque dysenteriam, interim tormina affectum hūc nominabimus. Neque mirum, si Celsus, cæterique Latini tormina affectum hunc nuncupent, nan- que exulceratione intestina ipsa dolore torquentur in prædicto affectu. Verum in præsentiarum no- men dysenteria propriè audire oportet. Vtpote quod ex appellatione ipsa intestinorum vlcus si- gnificatur, vt liquet apud Galenum 6. de locis affec- tis cap. 1. Nam quamuis tum recentiores medici, tum antiquorum non pauci hanc solam dysente- riam nuncupant, vt idem Galenus testatur secundo lib. de locis affect. eorum tamen nonnulli non so- lum hanc, sed aliam quoque, quæ cruenta ob excre- torum speciem nominatur, dysenteriam appellat, vt ipse inquit, inter quos Hippocrates est, quod li- bro quarto de arculis, vocabulo dysenteria vsus est, non pro vlceratione intestinorum, sed pro cruen- ta ex intestinis proluvie, vt Galenus testatur in ex- positione eorundem verborum Hippocratis. Sunt etenim sanguinolentæ excretionis (in vniuersum) differentia quatuor, prout idem Galenus scriptum reliquit tertio de caus. symptomatum, quatuor suc- cedentes affectibus. Vna quidem ipsius sanguinis (in iis quibus aliquis artum est abscessus, vel qui e- xercitationem dimiserunt) per circuitum repetens, & hæc quoque solet mulieribus, retentis mens- truis accidere, vt apud eundem Galenum liquet quinto de locis affectis. Altera, cum ex imbecillitate ioci- noris

Vicius ra- tio.

Commenta- tio 2. text. 29.

Cōm. 116.

Concilia- tur Galeni sententiæ in diuersis locis.

cap. citato.

cap. 5

Tex. 40

Sanguinolenta excre- tionis differ- entia qua- tuor. Prima. 3. de caus. Sym. cap. 2. 4. de loc. af- fe. cap. 7. Secunda.

noris aquosus sanguis deicitur, quem utique lotura carnis similem dicunt. Tertia est, cum melancholici, splendentisque sanguinis deiectione fit. Quarta, & ultima est, cum & minutim & exiguo tempore expulso facta visitur, aliis quidem veri sanguinis, aliis concreti, in hac & puris non raro exiguum aliquid excernitur, etiam ulcerum crustulae, quae Graece *σφαλιδες* dicuntur. Præterea membranosa quædam corpora, quæ intestinorum sunt particulae, sed & stercus super his collectum sæpenumero excernitur, sanguinis in se guttas habens. De qua nos duntaxat pertractare intendimus, cum ipsa propriè dysenteria nomine appellari mereatur, imò nonnulli solam ipsam dysenteriam nominandam esse censent, ut apud Galenum liquet, nedum in præcitatæ locis, sed etiam tertio de causis symptomatum, ca. 2. & apud Alexandrum ca. 7. libri octavi. De reliquis verò tribus iam dictis cruentis excretionibus pertractare fufius distulimus, cum de iocinoris affectibus verba faciemus. Hæc autem nihil aliud est, quàm eorundem intestinorum exulceratio, ut eodem tertio de causis symptomatum, secundo & sexto de locis affectis, apud Galenum liquet, & quarto de articulis, ac sexcentis aliis in locis. Cælius Aurelianus eam dixit esse intestinorum rheumatismum cum ulceratione. Ab Aetio verò ca. 43. lib. noni, sic describitur, Dysenteria propriè exulceratio est intestinorum serpendo depascens. Nam siue dysenteria ipsa adhuc fiat, utpote mordaci humore intestina abradere, atque abstergere (quamvis id quod factum est nondum videatur) siue facta, atque constructa sit, semper intestina ipsa exulcerata esse dicimus, ac affectum ipsum dysenteriam nuncupabimus, ut apud eundem Galenum liquet, cum primo de locis affectis, tum etiam commento aphorismi 24. & 26. quarti libri. Et si libro primo de locis affectis, cum mordax humor ab initio intestina abstergit, atque abradit, priusquam ea exulceret, fateatur affectum ipsum nondum dysenteriam dici, tamen eodem libro paucis interpositis verbis, dispositionem hanc sub dysenteria specie comprehendere asserit. Id quod etiam confirmavit commento præcitati aphorismi 24. & 26. quarti libri. Et ne videatur pugnancia asserere, ambiguitas facile soluitur ex iis, quæ paulò ante diximus ex eius decretis in præcitatæ locis. Nam cum primum ex mordaci succo abstergantur, ac ut ita dixerim, abraduntur intestina, antequam vlcus in eis induxerit, quoniam id quod factum est, ferè non sentitur, tamen dysenteria est, & appellatur, nondum tamen facta, atque constructa, sed quæ adhuc fit, & propterea tum Galenus in expositione prædictorum aphorismorum, ac etiam sexto de locis affectis, cap. 1. tum etiam Aetius, tres posuerunt dysenteria gradus, siue differentias, quorum vnus gradus est, cum quædam corpora pingua excernuntur, post hæc ubi ramenta quædam intestinorum abrasa eorum superficie interiori, quæ membranosa existit, succedit. Et tertia differentia cum aliquid ex ipsa abraditur substantia intestinorum, quo tempore non adhuc fieri dysenteriam, sed iam factam, atque constructam esse dicimus, ut ipse Galenus inquit. Quod verò in hoc affectu intestina oblata sint, communi consensu Græci omnes, & Latini fatentur. Poterit etiam id patere ex dolore cum posito, atque ex ipsis excrementis, simulatque impedita ipsorum intestinorum functione, distributione inquam. Verum nunquid in

superioribus intestinis, ac tenuioribus, vel in humilioribus ac crassioribus vlcus consistat, cum non mediocriter ad eius curationem hoc nosse conducatur, isto modo discernas. Nam ubi abrasiones solæ excernuntur, considerandum est, ut idem Galenus inquit præcitato libro sexto de loc. affect. num pingue quidpiam simul cum ipsis deiciatur. Quoniam si ita euenerit, in crasis intestinæ vlcis consistere credendum est. Si verò cruor excernatur intueri oportet, utrum is reliquis excrementis ita sit admixtus, ut vniuersus miscetur vniuersis, an pars eius aliqua reliquis supernatet. Etenim si admixtus est, in superioribus, si verò supernatet, in humilioribus intestinæ vlcus esse portendit. Verum ubi neque deiectiones iis quæ ab vlcere emanant admodum permixtæ, neque omnino discretæ apparent, coniciendum est in mediis potius intestinis affectum existere, Tralliano auctore libro octauo cap. 7. Id quod etiam in abrasis excrementis videre est, licet non ita manifeste, ut in cruore. Similis quoque ratio est de crustulis. Nam & ipsæ quodnam intestinum fuerit oblesum, declarant, tum ab essentia propria, tum etiam modo quo vel commisceri reliquis excrementis, vel vni eorum parti supernatare videantur. Etenim si latitudine, & crassitudine fuerint multo maiores, quàm tenuia intestina exigent, ulcerationem in crasis intestinæ consistere indicant, ut patet eodem primo de loc. affect. cap. 1. Aetius verò cum circa intestina crassa ulceratio contingit, stercora ait quæ egeruntur, multa esse & coaceruata cum flatibus, & aliquando etiam spumosa, pingua quoque cruenta excrementis admixta apparent, inexplabilisque edendi appetitus oboritur. Tenuibus autem intestinæ vlcis dolores circa vmbilicum consistunt, biliosaque, & porri colorem habetia, atque omnino variegata, stercorei commixta plurimum excernuntur, citra tamen ramentorum complexum cum torminibus, & mordacitate, desperationeque, ac exolutione, ut non procul ab animi deliquio agri absint: à sitique infestantur, & febricitant, stercus quoque crudius ab eis prodit, & si ieiunium intestinum exulceratum sit (quod raro accidit) egestiones crudiores apparent, nigriorem sanguinem vehementer implacatum habentes, bilisque abundè flauam, sitis multa, itémque nausea affligunt. Vomunt etiam aliquando, ac cibos aduersantur, dolor vehemens supra vmbilicum confidet, & quandoque febres malignæ oriuntur, fiuntque ita affecti decolores, & ad animi deliquium vsque succedunt. Vires etiam ipsorum citò deficiunt, neque procul ab interitu absint, rosione etiam infestante non statim, sed post aliquod tempus æger ad excernendum vrgetur, ut inquit Alexander, & (ut summum dicam) ut rasura ipsa, & exitus tempore, & ex missione cum stercore, utrum in crasis, an in tenuibus intestinæ vlcus sit, coniciendum erit, Galeno teste, eodem primo de locis affectis, cap. 4. Affectus hic in quacunque intestinorum parte oboritur, semper morbus est in soluta continuitate, ut ex eius descriptione liquet, facileque ex eius indicibus deprehendi potest, ut Galenus testatur cum sexto de locis affectis, tum etiam 12. method. medend. quo loco, cum pleuritidis, tum etiam dysenteria agnitione scintificam esse certis videlicet definitisque notis comparatam, & non coniecturalem inquit. Verum prius ea discernenda erit ab iis, quæ ab hepate fluunt cruentis, iam dictis dysenteris, nam in hepa-

Loco citato.
10.
Nō crassior,
aut tenuior
intestina
fuerint affe-
cta, signa
distinctissima.

Loco citato.
2. de loc. aff.
se. cap. 5.
6. de loc. aff.
se. cap. 1.
4. de artic.
comm. 40.
Dysenteria
propriè dicta
quid sit.
1. de loc. aff.
se. cap. 2.
1. de loc. aff.
se.
Loco citato.

Soluitur cō-
tradictio in
dicto Gale-
ni de dysen-
teria.

Tres gra-
dus dysente-
rie propriè
dictæ.

Quis affe-
ctus præter
naturam sit
dysenteria
propriè dicta.
6. de loc. aff.
se. cap. 1.
12. meth.
cap. 7.

Quibus disticis excretionibus nihil abrasum expellitur, atque interduum duorum, aut trium dierum intervallo sup-
 primitur euacuatio, deinde rursus redit malū, excernunturque excrementa pricribus multo peiora, id
 6. de loc. af. verò per intestinorum videra haudquaquam appa-
 ret, quoniam in iis, neque affatim, neque ex longis
 Loca citat. temporum intervallis laborantes deicere, consue-
 10. uerunt, eodem Galeno teste, lib. sexto de locis affe-
 ctis. Ab hepate item ab initio tenuis sanguinis fa-
 nies deicitur, deinde aucto malo crassus humor fa-
 cibus vini haud abfimilis, vt idem Galenus inquit.
 Ex iis itaque interstingues dysenteriam hanc pro-
 prie dictam ab iis quæ ab hepate procedunt. Qua-
 rum distinctam dignotionem, cum de iocinoris af-
 fectibus verba fient, conscribemus. Reliquum est
 modò ipsius dysenteria notas conscribere, tum v-
 niuersalis, tum etiam particularis cuiuslibet dicta-
 rum trium differentiarum. Primum etenim com-
 mune cuiuslibet dysenteria signum est, quòd sem-
 per etiam præcedunt mordaces, quidam intestino-
 rum dolores, vt liquet secundo de locis affect. cap. 5.
 cum & ipsa à mordaci (vt dicemus) humore intes-
 tinum erodente, fieri solet, protinus etiam ab ipsius
 initio & ipse mordax humor excernitur, què dein-
 de interaneorum abrasiones sequuntur, postea pa-
 rum cruoris simul excerni videtur, vt sexto de locis
 affectis, scriptum est, minutim, & exiguo tempore,
 aliàs veri sanguinis, aliàs concreti, eodem Galeno
 teste tertio de cau. symptomatum. cap. 2. Non rarò
 etiam & puris exiguum aliquod excernitur, & vlce-
 rum crustulæ Græcè *ἰσχυρὸς* dicuntur. Præterea
 & membranosa quædam corpora, quæ intestino-
 rum sunt particula, sed & sterco super iis colle-
 ctum sæpenumerò excernitur sanguinis in se guttas
 habens, vt ipse inquit, vt autem Celso visum est,
 quoniam in dysenteria intus intestina exulceran-
 tur, ex iis cruor manet, vt ipse infert, modò cum ster-
 core aliquo semper liquido, modò cum quibusdam,
 quasi mucosis excernitur, interdum simul quædam
 carnosa descendunt, frequens deiciendi cupiditas,
 dolorque in ano est, cum eodem dolore exiguum
 aliquid demittitur. Atque eò quoque tormentum
 intenditur, idque post tempus aliquod leuatur, exi-
 guaq; requies est, somnus interpellatur, febriculæ-
 que oritur. Hippocrates verò libro de aff. ait, quòd
 in dysenteria dolor adest per totum ventrem, & tor-
 mina, & egerit bilem, ac pituitam, & sanguinem
 combustum. Hisce itaque notis tormina discernes.
 Eius verò gradus, quos treis esse animaduertimus,
 sic distingues. Primum etenim egestio malum au-
 spicabitur (vt Aetius facetur) cum rugitibus subpin-
 guibus, ac biliosis, pinguedine nimium, quæ intrin-
 secus intestinis adhæret paulatim circumliques facta,
 & quibusdam quidem cum torminibus, quibusdam
 absque iis excretiones contingunt. Breuibis au-
 tem verbis Gal. commen. citati aphorismi 26. quar-
 ti lib. dicebat quòd cum dysenteria adhuc consti-
 tuitur, quædam corpora pingua primùm excernū-
 tur, posthæc nisi finire anticipauerint, quædam ra-
 menta ipsorum intestinorum, abrasa eorum super-
 ficie interiore, quæ membranosa existit, & densa:
 hæc secundum dysenteria gradum significabunt, li-
 cet adhuc etiam fientem dysenteriam hanc nomi-
 nabimus. Hoc quoque tempore simul cum ipsis a-
 brasionibus cruor simul excerni videbitur. At vbi
 altius exulceratio penetrauerit, ac aliquid ex ipsa
 substantia intestinorum abraditur, adeò magnæ in-

testinorum partes excernuntur, vt possimus eas car-
 nes nominare, quo tempore adhuc fieri dysente-
 riam, sed iam factam atque constructam esse dici-
 mus, atque hic tertius est dysenteria gradus. Aetius
 verò asserit hoc tempore fordes pelliculas admixtas
 habentes expelli & si non celeriter cohibeatur, cõ-
 pendio vicinos locos depascitur. Saniosa verò quæ-
 dam excernuntur, qualia ab occisorum corporibus
 defluere consueuerunt. Id etiam confirmat Pau-
 lus cum dixit, excernuntur primùm biliosa varia,
 deinde subruenta, postremò saniei similia, cuius-
 modi à mortuorum cadaueribus solent profusare.
 Oritur autem dysenteria interdum ab externis cau-
 sis, interim verò ab internis. Externis quidem, vt à
 nimio frigore, ardore, venenatorum pharmacorum
 potu, peregrinorumque, & acrium ciborum acce-
 ptione. Iam etiam & à cruditatibus, & quæ iis simi-
 lia existunt, quorum singula absque labore, vel a-
 stantium relatione percipies. At internæ causæ cum
 cti humores acres, atque mordaces esse poterunt,
 siue à toto, siue ab aliqua corporis parte ad inte-
 stina confluant, siue in ipsis fuerint geniti. Hi ve-
 rò sunt, aut flaua bilis, à qua magna ex parte inci-
 pit dysenteria, vt liquet commento aphorismi 24.
 quarti lib. aut atra, vt ibidem apud Hippocratem &
 Galenum legitur, vel etiam ipsa salsa pituita, eod-
 em Galeno teste, commento aphorismi 12. tertij
 lib. Verùm quismam eorum dysenteriam efficiat,
 distingues ex qualitate eorum quæ excernuntur, si-
 mul cum ætate, ac temperamento ægrotantis, tem-
 pore anni, vita antea facta, ac reliquis similibus. Quòd
 verò plerisque dysentericos tenemus præcedere
 soleat, apud Aetium, & Paulum, atque Alexandrum
 præcitatatis locis liquet. Poterit quoque ex inflam-
 matione dysenteria fieri, quam ex eiusdem inflam-
 mationis signis facillè percipies. At quantum ad
 prognostica spectat. Dysenteria quæ adhuc fit mor-
 daci humore abradente, ac abstergente intestina,
 ita vt quædam corpora pingua duntaxat excernā-
 tur, facillè curari poterit ablata causa ipsam facien-
 te. Natura videlicet ipsam sanante etiam absque
 externo auxilio, velut reliquos similes consuevit e-
 xiguos affectus sanare, Galeni auctoritate primo de
 locis affectis. cap. 2. Verùm vbi iam facta est, atque
 constructa, ita vt veluti caruncula, hoc est magnæ
 intestinorum partes excernantur, letalis siquidem est
 talis dysenteria, & eiusdem Galeni atque Hippo-
 cratis sententia aphorif. 26. quarti libri. Nam, vt in-
 quit Galenus, neque caro concrefcere, neque cicat-
 rix obduci in tali potest exulceratione. At si in dy-
 senteria non adeò magnæ intestinorum partes ex-
 cernantur, nec corpora duntaxat pingua, sed veluti
 ramenta quædam ipsorum intestinorum, eorum su-
 perficie interiore abrasa, quæ membranosa existit, &
 densa, epidermidi quæ extimam cutis corporis am-
 bit, similis, nec adeò promptè curabitur, vt ea, de
 qua primò mentionem fecimus nec adeò ægrè, vel
 letalis erit, sicuti ea, in qua veluti caruncula deiciun-
 tur, cum media quodammodo existat inter vnam, &
 reliquam, vt ex Galeni verbis elicatur præcitato cõ-
 mento aphorif. 26. quarti libri. In longis quoque
 dysenteria cibi fastidium malum esse signum, in-
 quit Hippocr. aphorif. tertio sexti lib. & cum fe-
 bre peius. Graues quoque sunt dysenteria, quæ cum
 vehementi inflammatione oboriuntur, quæq; cum
 febri, ac deperditione appetitus, vt inquit Aetius.
 Pessime verò sunt, in quibus quæ excernuntur, por-
 ri aspe-

Citato lo-
co.

Ante me-
dum libri.

Tres gra-
dus dysen-
teria pro-
prie dictæ,
quomodo
distingua-
tur.

Lib. 3. et 4.

Causæ.
Externæ

Internæ

Prognostica

Lib. 3. et 4.

ri aspectum habent, suntque nigra plurima, varia, graueolentia, & quæ vnâ cum excrementis fordes pelliculis magnis commixtas excernunt. Mulieres item, quàm viri, senex, & pueri, quàm iuuenes, & in status vigore consistentes difficilîus curam accipiunt, vt idem Aetius refert. Cæterum in intestino recto, atque colo consistentes dysenteria facîle curabiles existit. Quæ verò in tenuibus intestinis, difficulter curatur maximè verò in ieiuno, ex eiusdem Aetij decreto, verum vbi longo tempore id malum inueterauerit, aut tollit hominem, vt Celsus refert, ac etiam si finitur, excruciat. Orta autem dysenteria, flaua bile sæpè curari poterit, quemadmodum si ab atra bile fiat, insanabilis omnino existit, cum nihil differat à cancro vlcerato, Galeno teste commento aphorif. 24. quarti libri, in quo aphorismo dysenteriam, si ab atra bile inceperit, lethalem esse decretum reliquit Hippocrates. Idem confirmauit Aetius, hanc Hippocratis & Galeni sententiam dilucidius scribens, cum dixit, si igitur ab acris cibis, aut à flaua bile dysenteria oboriat, ferè in totum ipsam curamus. Si verò ab atra bile initium sumat, siquidem ratione indicationis febrilium morborum atra bilis excernatur, transituque suo intestinum distendat, etiam hanc curare non desperamus. Si verò sua sponte nullo præcedente febrili morbo, neque concoctione bona apparente, atra bilis excernatur, immedicabilis dysenteria ex ea oborta existit, nihilque à cancro exulcerato differt, estque omnino letalis, nanque morbis quibilibet incipientibus, si atra bilis, vel supernè, vel infernè exierit, lethale est inquit Hippocrates aphorismo 22. quarti libri, etsi lib. de atra bile, Galenus velit semper exactæ bilis atræ humorem lethaliter excerni, experientia id comprobans in illa pestilentia prolixiore ætate orta, in qua, qui puram, exactamque atram bilem deiecerunt, omnes perierunt, non propterea sibi ipsi commento præcitato aphorifini 22. quarti libri nec Aetio pugnat, nam vbi exacta fuerit atra bilis absque signis coctionis, semper letaliter excernitur, ac exitialis casus est, præcedentibus autem coctionis signis, vbi ea excernatur, neque pura, neque exacta atra bilis erit, sed bonam significabit euacuationem, cum à natura corpus expurgetur, vt idem Galenus inquit præcitato aphorismo. Quinimò à qualibet defectione sincera, hoc est, impermixta aquosâ humiditati, siue humor, qui citur, flaua sit bilis, siue atra, dysenteria malum, vt inquit aphorif. 23. septimi lib. Lienosis etiam superueniens dysenteria bonum inquit Hippocrates aphorismo 48. sexti libri, quando humores crassi, ac melancholici, qui lieni erant infarcti, transponuntur, ac euacuantur. Neque hæc sententia aduersatur aphorismo 24. quarti libri. Nam ibi de atra bile, hic de succo melancholico loquitur, ex quo etiam dysenteria oriri potest. Quod si eadem immoderata, ac diuturnior fiat, malum est, vt liquet aphorismo 43. eiusdem libri sexti. At vbi à pituita salsa longior tempore mordente, atque abradente intestina, orta fuerit dysenteria, crudelissima ea existit, eodem Galeno auctore commento aphorifini duodecimi, tertij libri, & propterea periculosior, quàm si fiat ex bilioso humore, nam biliosus humor transiendo affligit, hic autem cum sit lentus moram trahit, & sua conctatione amplius exulcerat, suoque lentore, & transitu per intestina inhaeret, ac tardans semper aliquid deterit, vt idem Galenus inquit. Nō

autem ita exitialis erit, vt ea, quæ ex atra bile oritur. Dysentericus (inquit Soranus Ephesius) si post aurem sinistram papula in modum orobi innata fuerit, cum siti admodum frequenti, vigesimo die morietur. Cæterum pro dysenteria curatione ær primò ad succum porrò vergens eligendus erit, in ætius tamen temperatus, aut modicè ad calidum, vel frigidum declinans, prout diuersa exigit causa, à qua dysenteria oritur. Quies quoque præcipienda erit, ac motus omnino vitandus: oportet enim imprimis conuiescere, vt inquit Celsus: siquidem omnis agitatio exulcerat, & Aetius principium curationis dysentericorum à quiete, & modico cibo fieri dixit. Somnus item procurandus, vitandaque vigilia sunt, cum optimum remedium dysentericis somnus sit, eodem Aetio auctore. Si alui excrementa præter naturam detineantur, nulli in dubium venit ea excerni debere per ea quæ per aluum infundantur, & hoc est per lenes clysteres, cum ab eorum retentione non parum intestinorum exulceratio augeatur. Similiter vitandi sunt omnes immodici animi affectus. Quod ad cibum attinet, circa initia tenui victu, ac modico cibo vitandum est, etenim dysentericus propter intestinorum, & ventris imbecillitatem, vt Alexander inquit, haud multum potest concoquere, præsertim cum febricitat, quamuis quantum exhiberi debeat, ex ægri viribus maximè existimandum sit. Quæ de re cibi, qui non multum nutriant, nec tardè concoquantur, exhibendi, quantitatēque (vt diximus) modica, & si vires permiserint, primis saltem duobus diebus abstinentiam indicimus, eodem Alexandro auctore. Nā iis tenuissimo victu opus est, Galeni decreto libro quarto de articulis, præsertim vbi, & iocinoris quoque adsit imbecillitas, ac plenitudinis affectio. Tribus autem diebus exactis, lac propinamus, præsertim vbi febris permiserit, communi Alexandri & Aetij sententia, est nanque id temperatus cibus, cum hoc quod depurgat, simulque ea, quæ in corpore sunt, contemperat, & postremò aluum sistit, vt Aetio visum est, & (vt summam dicam) ex Galeni sententia decimo, de simplicium medicamentorum facultatibus, cap. de lacte, ac tertio, de alimentorum facultatibus, cap. 15. optimum est remedium dysenteria, & omnium ventris acrum fluxionum, præsertim vbi aliam quampiam desiccantem facultatem habuerit adiunctam, eam (vt ipse inquit) à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti, accipit. eò usque autem lac decoqui debet, dum pleraque ferosi in eo humoris absumpta pars fuerit, nec minus, si ferreos in ipsum cylindros candentes iniicias, eandem, aut etiam facultatem meliorem lacti adicias, nam ferrum adstringentis quoque facultatis est particeps. Facile tamen lac sic paratum in ventriculo in caseum cogitur, vt idem Galenus testatur præcitato libro tertio de alimentorum facultatibus, cap. 15. ob id mel illi admiscemus, quin & aquam etiam, præsertim pluuialem, vt plerique medicorum faciunt, affundere securius fuerit, quartæ nimirum lactis parti affusam, deinde cum paululum fuerit decoctum exhibeatur: nam & citra noxam etiam febricitantibus tale lac exhiberi poterit, Alexandro teste. Verum si huic lacti sic preparato parum stercoris canis, sola ossa per duos dies comedentis, desiccata, ac in puluerem redacta permisceas, mirabile etiam dysenteria medicamentum, à Galeno expertum (vt liquet eodem decimo de simplicium

Curatio.

Vetus ratio.

Aetius lib. 9. cap. 45.

Loco citato.

Commentus 40.

De lacte nota.

Cap. de lacte.

Ex illiatur
Gal. sententia
de atra bile.
Lib. de atra bile, c. 3.
& 4.

medicamentorum facultatibus (existit. Procedente verò tempore, prædictum lac poterit ad dimidium decoqui, & deinde etiam ad tertiam (vt Aetius inquit.) Quous autem morbi tempore lac caprillum eligi debet, & huius penuria vaccinum, vt idem Alexandro visum est. Nec propterea Galeni ac Hippocratis sententiæ pugnabis aphorismo sexagesimo quarto quinti libri, vt præcedenti cap. de diarrhæa, disseruimus. A lactis acceptione, panem mactatum offerri oportet, vt idem Aetius inquit. Præbunt etiam, nedum nutrimentum, sed medicamentum optimum, pulvis ex lacte apparatus, veluti oryza, amilum, simlago, aut ipsa etiam ptisana torrefacta cum aqua pluuiali parata, similiter & oua lacti commista. Poterunt etiam & ex milio, ac panico prædictæ plures cum lacte parari, aut ex siccis, & contritis panibus, & vbi adhuc fluxus perseverauerit, ea quæ adstringunt, ac aluum sistunt pulvis admiscere, oportet, veluti sunt mali punici acidi grana, mala cytonia, forba, præsertim sicca, aut pyra, mespila, corna, seu hi fructus, quos amarenas, quosque azarolas vulgus appellat. Præstabit item prædictorum aliquod in aqua, vnde pulvis sunt incoquere: sit autem ea pluuialis, vel in gallinarum, seu gallinaceorum pullorum iure prædictæ pulvis fiant, & pariter aliquod prædictorum adstringentium admiscebis, præsertim vbi quomodolibet paratum lac, in acidam, vel nidorofam qualitatem eis commutetur. Nec minus oxalis, plantago, portulaca, cichorium, intubus fatiua, aut etiam brassica quandoque, modo fuerit biscocta, in iam dicto iure decoqui poterit, & quamvis olera non valde probentur in dysenteria, prædicta tamen modicè degustare poterunt, Aetio, & Alexandro testibus. Danda sunt in super ororum affatorum lutea, modo in aceto per aliquod spacium fuerint præmacerata. Carnes autem, eo quod multum nutriunt, & tardè concoquantur, dysentericis non valde commodè existunt, vt eisdem Aetio, & Alexandro visum est, tamen eis qui diuturno malo vexantur, danda sunt, maxime verò volucrum eligenda primò, deinceps syluestrium ferarum: proinde turdi, perdicæ, turtures, merula, gregalium columbarum pulli, starna, phasiani, ac similes exhiberi poterunt, ebulliant autem primùm in posca myrti bacis cum eis incoctis vt idem Aetius fatetur, & deinde assentur. Præstabit etiam si ipsis euisceratis iniiciantur myrti bacæ, forba sicca, corna, mespila, pyra adstringentia, aut mala cotonea, deinceps confluantur, & assentur. Nec minus si elixentur, & eadem adstringentia cum eisdem carnibus decoqui possunt, parumque oxalidis, intybi, aut plantaginis adiciendum, fiatque elixatio in pluuiali aqua, & vbi vires imbecilliores fuerint, ex prædictarum auium cornibus contritum, aut ius, quod consummatum appellant, parari poterit paucò omphacio, & stillatitia aqua rosacea, myrtina, aut oxalidis adiectis. Id quod etiam fieri poterit ex caponum, gallinarum aut gallinaceorum pullorum carnibus. Nec minus proderit, si eisdem affatis modo quo diximus, ac demum fortiter expressis, qui prouenit succus dysentericis exhibeatur. Ex pedestribus verò interdum carnes exhiberi poterunt leporum, capreolorum, ac hœdorum prius in posca decoctis, & deinde similiter affatis. Fructus quoque adstringentes gustare poterunt, quamuis parce eis vtendum sit, veluti forba, corna, mespila, mala cotonea, ac viridia pyra cocta, necnon & ma-

lum punicum, præsertim austerum, aut acidum, cum eis tamen panis mandi debet, eo quod facile (vt inquit Alexander) corrumpantur. Nec minus & amarenis, ac azarolis dictis vti poterunt. Pro potu à principio aqua pluuii vtendum est, ex Pauli, & Aetij decreto, & si ea haberi nequit, fontana vtendum, in qua prædicti adstringentes fructus fuerint decocti, præsertim rhus obsoniorum, aut oxalis, vel plantago. Postea verò, vbi vires fuerint deiectæ, aut stomachus laborauerit, vinum quoque propinandum est, ex eorundem sententia. Sit autem adstringens, & non valde vetustum, ac pluuiali aqua dilutum, seu fontana, in qua oxalidis, plantaginisve folia fuerint decocta. Cæterum vbi ad exulcerata intestina adhuc à toto, aut ab aliis corporis partibus vitiosus succus confluxit, priusquam vlceri succurratur, fluxionem ipsam auertere studebimus, ac cum qui redundat succum vacuare, & si auersio hæc non sit vlceris, quatenus vlcus est, curatio, ex Galeni decreto quarto methodi medendi, quanquam illud quoque excerpserit, vt ipsemet fatetur ex Hippocratis doctrina, illudque præsertim seruandum erit, vbi non vitia ab ipsa natura sponte ferantur, seu criticè euacuantur, sed symptomaticè. Qua de re qualiscunque fuerint vitiosus succus, qui ad intestina cum sanguine confluit, ipsa exulcerans, siue à toto, siue ab aliqua confluat parte, modo critica non fiat expulso, viribus, ac aliis consentientibus, venæ sectio in brachio adhibenda erit, præsertim circa primos morbi dies, & si febris adsit, ac totius corporis plenitudo, totius sanguinis mittendus erit, ex Alexandri sententia, cap. sexto, libri octauo. Id quod etiam confirmauit cap. septimo eiusdem libri. Verum dicta venæ sectio paulatim administrari debet, vt ipse inquit, ita vt neque vniuersum neque copiosum educatur, ne ægri vires imbecilliores hinc redantur. Aetius quoque cap. quadragesimo quinto libri noni, vbi sanguinis impetus vehementer in dysenteria vigeat, aut etiam, si maxima subest inflammatio, præsertim in iis qui plurimo sanguine abundant, venam incidendam esse præcipit, si vires non resistant, & maxime in quibus consueti sanguinis excretio cohibetur. Auferre autem sanguinem oportet (vt idemmet Aetius testatur) neque multum, neque coaceruatim, quemadmodum præcipiebat Alexander. Nam ab utroque venter conturbatur, quanquam ipse Aetius in dextro cubito venam humeralem appellatam secare iussit, cum non similiter vena hæc incisa, vires labefactentur, vt ipse inquit, & insensibiliter quodammodo, furtimque sanguis offeratur. Quod si hæc non appareat, necessario media secanda erit. Cæterum fissura omnino tenuis esse debet. Nam non ob multitudinem sanguinis vacuandam sectionem facimus, sed vt materiam quasi per riuos transferamus, vt ipse refert. Paucus autem sanguis etiam multo tempore missus inflammationem mitigat, & sanguinis ad intestina confluxum reuellit, innatumque calorem sensum refrigerans, somnum magis, quam animi deliquium inducit, est quippe optimum remedium dysentericis somnus. At si malè admodum affecto iocinore flauæ bili admixtus sanguis ab eo ad intestina deferatur, ita vt strigmenta quoque intestinorum deliciantur, summa intestinorum tunica humoris acrimonia derasa, quinsam verebitur internam in dextro cubito venam secare, nedum euulsionis gratia, verum etiam ipsemet iocinoris alterationis.

tionis? Cum plerique medici in hoc casu, qui solam
 intestinorum exulcerationem, neglecto iocinore
 curare consueverunt, in causa sunt, ut acri morian-
 tur ex Galeni sententia libro quarto de articulis.
 Rursus ubi vehemens dolor, propter rodentium humorum acrimoniam ad intestina
 à toto, seu ab aliqua corporis parte confluentium,
 & propterea verenda sit phlegmonis generatio, aut
 virium defectus, cui absolum videbitur venam se-
 cari debere? cum & idem Galenus in maximis do-
 loribus nullum maius inuenit remedium, quam
 venam secare, aut purgare, ut patet cōmento aphorismi vigesimertij primi libr.
 Quamquam nos venam secandam dicimus, ubi cun-
 cta cum admissis, nec vique ad animi defectum,
 sed paulatim, ac sensim, ne vires imbecilliores red-
 dantur, ipsam probamus, prout Aetius, & Alexan-
 der probant. Valeant itaque barbaram sectan-
 tes medicinam, ac thesalici nostri temporis medi-
 ci, qui nunquam pro dysenteria curatione venæ se-
 ctionem admittunt, nec admittendam esse censent
 nulla auctoritate, ac ratione fusciti, nisi quod sic
 longo tempore in agrorum necem male obserua-
 runt. Nam viribus, ætate, ac aliis consentientibus
 circa initia, reuulsione gratia, ubi magna adsit hu-
 morum copia potissimum, aut sanguinis impetus
 vehementer virget, seu maxima adit inflammatio,
 aut dolor vehemens, siue iecur fuerit, modo quo di-
 ximus malè affectum, semper exordienda curatio
 erit à iam dicta venæ sectione. Id quod longa
 experientia, & diebus non longe elapsis etiam
 comprobauimus. Nam cum duo magnifici Ioan-
 nis Ferdinandi Rocchi filij dysenteria affecti essent
 eodem tempore, ac ex simili causa, quamquam vnus
 per tres, aut quatuor dies prius in dysenteriam in-
 cidisset, is (quoniam à precedente medico non fuit
 sanguis ei missus, quamuis alia fuissent debita ad-
 hibita medicamenta) tandem interit. Alteri ve-
 rò, cui nos fuimus accessi, licet grauior fuisset in
 eo ortu dysenteria, vires, ac ætas, & habitus imbecil-
 les, non tamen adeo, ut sanguinis missionem pro-
 hiberent, priori medico inuito me præcipiente fuit
 sanguis missus: sanguine missio, statim melius se ha-
 buit, ac deinceps debitis aliis medicamentis adhibi-
 tis, liber euasit, & adhuc viuit. Ei tamen (quo-
 niam ætas reluctabatur, cum nondum vndecimum
 ageret annum) non fuit vena secta, sed hirudines in
 cubito adhibita (id quod seruandum esse censemus
 in cunctis infra decimum quartum annum.) Nam li-
 cet eis sanguis mittendus sit, si ea adsint, quæ supra
 notauimus, tamen iis non per venæ sectionem, sed
 per hirudines, aut cucurbitulas, extrahi debet. Non
 nullos etiā alios dysentericos à venæ sectione libe-
 ratos & nos vidimus, & qui mecum affuerunt, ascle-
 testes sunt, quemadmodum etiam Deum testor me
 veritatem fateri, & firmiter tenere, quod liberatus
 fuisset quondam excellens Don. Gutterius de Car-
 dines filius Don Leonardi, si ei iterata fuisset venæ
 sectio. Is nanque ætate adolescens, cum ex malè af-
 fecto iocinore, ex confluente bilioso sanguine ab
 eo ad intestina, in grauissimam incidisset dysente-
 riam, cum vehementissimo intestinorum dolore,
 seu potius inflammatione, ac febre, fuit à me ac-
 cersito ei vena secta interna dextri cubiti, duæque
 vel tres ad summum extractæ sanguinis vnciæ, se-
 cunda aggritudinis die, & cum adhuc dysenteria
 perseverasset, & dolor, & febris valida, iterum ve-

nam secare mihi visum fuit, viribus iam consen-
 tientibus, verum altero superueniente medico bar-
 baram sectante medicinam, ac Erasistræo circa
 venæ sectionem existente penitus assentiri noluit,
 quinimò nec auctoritatibus, nec rationibus con-
 quiescens, primam quoque venæ sectionem con-
 demnauit, potissimum cum reliquis adhibitis me-
 dicamentis adstringentibus, resiccantibus, ac mor-
 dacitatem obtundentibus infra decimum quartum
 inualecente semper dysenteria, dolore ac febre
 morte præuentus fuerit. Hic ex numero fuit eo-
 rum, qui à Galeno damnantur libro quarto de arti-
 culis. Nam neglecto iocinore solam intestinorum
 exulcerationem curare tentabat, & propterea cau-
 sa fuit ut aeger moreretur, adeo vt de eius morte co-
 ram Deo rationem reddere debeat. Nuper quo-
 que dum hæc conscriberem excellens Asca-
 nius Caracciolus, cum dysenteria, tenesmo, ac febre
 laborasset, ex venæ sectione internæ dextri cubiti,
 incunctanter absque alio auxilio liberatus fuit. At
 si quid sanguinis missionem fieri prohibeat, aut
 post eam adhuc vitiosi redundabunt succi, ita vt in-
 testinorum vlcera adhuc efficiant, aut augeant, pur-
 gationem adhibere non erit alienum, quam ite-
 rum velut venæ sectionem non vniuersam, sed per
 vicem tentabimus, eodem Alexandro teste. Ete-
 nim fieri nequit, vt intestinorum vlcera curentur
 manente adhuc ea, quæ ipsa efficit, aut augeat, causa.
 Quamquam si iidem humores promptè per vomitu-
 m euacuari possent, id potius tentandum esse cen-
 serem, cum per eum, nedum eorum euacuatio fie-
 ret, verum etiam & diuersio. Id quod ubi fluxio va-
 lenter irruat, exequendum esse iussit pro vlcerum
 curatione, Galenus quarto methodi medendi, cap.
 sexto, dum dixit, Vtique si in superioribus vlceris cō-
 sistat, per inferna purgantes, si autem in inferioribus
 sit, superiorem ventrē vacuantes. At si per vomitu-
 m facile, qui redundat succi purgari nequeant, per
 alium eos vacuare non erit alienum. Nam etsi per
 exulceratas partes pertranscant, extra tamen edu-
 cuntur per conferentia, ac communia loca. Neque
 id per vehementia pharmaca tentandum erit, sed
 per mitiora, ac familiaria, quæ insuper vlceri nocu-
 mentum non inferant. Quorum copiam nostris
 temporibus inuenire haud difficile erit. Iis itaque
 medicamentis purgantibus leuem quandam adstri-
 ctionem etiam habentibus, siue vlceris in superiori-
 bus consistat intestinis, vel inferioribus, aut mediis,
 tutè vtare, cum neque hæc medicamenta purgantia
 sint vlceris, quatenus vlceris est, curatiua, etenim quæ
 propriè prædicta vlceris curant, pro locorum diuer-
 sitate, diuersimodè etiam adhiberi debent, vt infra
 dicemus. Quare si ex redundante bile dysenteria
 fiat, adhibitis prius (si occasio dabitur) quibusdam
 syrupis, veluti is est, qui ex infusione rosarum, ci-
 chorij, aut oxalidis succo, aut omphacio paratur,
 cum eiusdem intubi, oxalidis, aut plantaginis aqua
 permixtis, hoc purgans medicamentum dato, Re-
 cipe tamarindorum vnc. j. corticum myrobalano-
 rum citrinarum drachm. ij. fiat decoctum in aqua ox-
 alidis, aut plantaginis, & cichorij, in quo mollis-
 aëre vnc. j. aut vnc. ij. rhabar. in prædicto decocto
 macerati, & non colo transfusi drac. j. aut scrup. iij.
 & scrup. de infusione rosarum vnc. ij. dissolue, &
 præbero. Quod si nec iam dicto medicamento re-
 dundans bilis cesserit prædictis, aut aliis magis ad-
 stringentibus syrupis prius adhibitis, veluti is est, qui

Loco citato.

Quibus ab
 intestina
 secanda sit,
 exciditur.Medi-
 ca-
 sp. 56ene
 io.

Cōmen. 40

Medica-
 mentum
 purgans.

Vomitum.

Sunt etiam

Curatio dy-

senteria ex

redundante

bile orta.

ad iocinore

dysenteria

dysenteria

dysenteria

dysenteria

ribes, myrto, aut citri acetositate paratur, iterum medicamentum purgans dari debet, quod quidem maiorem adstringendi vim habeat, ac minorem purgandi. Quapropter in plantaginis, & oxalidis aqua drac. iij. aut vnc. s. corticum myrobalanorum citriharum decoquito, atque in ea mellis aërei vnc. j. aut vnc. s. & rhab. parum torrefacti scrup. ij. vel scrup. j. cum syrupo de infusione rosarum vnc. j. aduicito, & si opus fuerit, tam dictas myrobalanos, quam rhab. plus torrefacito. Vbi verò qui redundat succus, falsa pituita fuerit, syrup. ex succo boraginis, & myrtilino, de infusione rosarum, aut etiam rosaceo melle, cum plantaginis, aut oxalidis aqua, aut etiam absyntij decocto, adhibitis prius, quibus iam dicta pituita purgationi paratior fiat, ex chebularum myrobalanorum decocto, aut etiam agarico si opus fuerit

*Si ex falsa
pituita, in-
tatio.*

*Dioscorid.
lib. 3. cap. 1.
Gal. 6. sim-
pli. cap. pro-
prio.*

*Si ex atra
bile fiat, cu-
ratio.*

(Nanque & ipsum dysentericis confert, ex Dioscoridis auctoritate, leuiculaeque adstrictionis est particeps, ut Galeno visum est, & nos longo tempore eo vti fuimus, nullumque incommodum vnquam consecutum fuisse obseruauimus) ac praedictis aëreo melle, & scrup. de infusione rosarum, seu myrtilino, rhabarbaroque, modo quo diximus parato, medicamentum purgans tribue, & ubi vñs expostulauerit, id ipsum iterare conuenit. Nec minus, ubi dysenteriae causa atra bilis fuerit, ea prius parata ex succi fumarie, boraginis, aut oxalidis, infusionis rosarum, aut pomorum syrupo, quod bilem atram purgare valeat medicamentum dato, quod recipit sena, epithimi ana drac. ij. corticum myrobalanorum indurum drac. iij. aut drac. iij. fiat arte decoctum in aqua oxalidis, aut plantaginis, & boraginis, seu lupulorum, in quo iterum mellis aërei vnc. j. s. aut drac. ij. rhabar. (ut prius dictam est) macerati drach. j. & syrup. de infusione rosarum vnc. ij. aduicito. Idque etiam iterare conuenit, si redundans praedictus perseverauerit succus, myrobalanosque, & rhabar. torrefacere si opus erit. Nam quae in secundo, aut tertio loco exhibentur medicamenta purgantia, minorem purgandi vim, ac maiorem adstringendi habere debent, & propterea à purgatione, qualiscunque redundauerit succus, quamuis amplius exulcerationem non pariat, aut augeat, perseverante tamē adhuc dysenteria, adstringentia medicamenta, nec non exsiccantia, ac obtundentia exhiberi debent, quemadmodum vniuerso medicorum cœtui visum est, quanquā etiam post purgationem, praesertim, ubi adhuc quispiam reliquus fuerit redundans succus, ea quae vrinam ciunt ab Aetio, & Celso commenduntur: quibus etiā & ipse vtor, aliquot adstringentibus permixtis. Possunt etenim ea, quae vrinam mouent (ut inquit Celsus) in aliam partem humorē auertendo, si ea consecuta sunt, si non sunt consecuta, noxam augent, ita quod, ut ipse refert, nisi in quibus promptē id facere consueuerunt, non sunt adhibenda. Verum ad ea quae modò diximus medicamenta accedendum erit, ea etenim sunt, quae alium sistunt; quoniam corpora plus iusto laxata adstringunt, vel influentes humores obducunt, ac inspissant, vel rescitā in intestinorum vlcerata sunt, quanquam eamet, neque indifferenter via eadem approximari debeant, nam si in crasis intestinis vlcerata fiant, iis quae per sedem iniiciuntur remediis magis egent, quippe cui magis sunt propinqua, quae verò in tenuibus habentur ab epotis medicamentis praesidium magis suscipiunt, ut patet apud Galenum tum quinto methodi medendi, tum sexto de locis

*A purga-
tione qua-
lia compe-
sant medi-
camenta.*

*Quae vrinā
ciunt, qui-
bus conue-
niunt.*

*Quibus in-
fusa magis,
et quibus
epota medi-
camēta con-
ferant.*

affectis. Quamuis quae in tenuibus habentur vlcerata quae medio situ posita sunt, ambo etiam requirunt, & quae superne fumuntur, & quae per sedem infunduntur, eodem Galeno teste libro quarto methodi med. cap. 7. Verum quae vicina ventriculo sunt intestina, si exulcerata sunt, iis per comesta & bibita succurritur. Quae verò inferius sunt sita, per ea quae iniiciuntur, quando neque ad ea quae vicina ventriculo sunt, subire potest, quod per sedem infunditur, nec integris viribus ad inferiora perungere, quod per os sit ingestum. Supponatur igitur in superioribus, atque gracilibus intestinis vlcus haberi, & praeterea magis iuuari per ea quae per os assumuntur, syrup. ē myrto, ē ribes, aut omphacio, vel ē succo oxalidis seu ex infusione rosarum, ac earundem incompletarum, & interim quoque aridarum paratus tribuatur. Similiter is qui ex plantaginis succo, portulacae, aut etiam polygoni paratur, cum quibus scrup. j. aduici poterit infra scripti pulueris, quo ipse vtor. Hic recipit seminum rosarum, oxalidis, plantaginis, ac portulacae, singulorum scrup. j. corallorum rubeorum, & cornu cerui vñs, cuiuslibet drac. j. amyli, draganti ana drachm. s. Hic etiam exhiberi poterit cum vetusto saccharo rosaceo, aut cum eo medicamento, quod conficitur ex tota substantia, seu succo citoniorum aut eorum fructuum, quos amareneas, aut etiam, quos corna vocant, & saccharo. Quod si nec is sufficiat ex pastillis de spodio, succino, seu terra lemnia scrup. j. vel drachm. s. cum praedictorum syruporum aliquo tribuatur, aut drachm. j. micet Nicolai. In hunc etiam vñm conferunt mora acerba in sole desiccata, & trita, aut etiam mora rubi similiter desiccata, & trita cum aliquo liquore, aut absinthii inspersa, Paulo, & Aetio testibus, althaeae radices, aut rubi, seu hippuris decoctum ex aqua (ut eisdem visum est) potissimum pluuiiali, aut etiam radices foliorum, seu seminis symphyti decoctum in eadem aqua, aut vino austero cōducit. Nec minus cortex thuris tritus, ac potatus, aut etiam maceris cortex, & mali punici flores conferunt, ex Aetij testimonio, potissimum ubi ex falsa pituita gentium fuit vlcus corporibus, ac naturis pituitosis, & praeter alia sanguinis eruptiones sistunt. Similiter, si coaguli leporis drachm. j. potui detur ex sapa, ut eisdem Aetio, & Alexandro visum est, & quo vetustius coagulum est, eo praestantius, nam tale profluuium alui mederi praecipue potest, atque etiā quod leporis est (ut inquit Aristoteles tertio de natura animalium, cap. 21.) sed laudatissimum est hinnuli, ut ipse refert. Stercus quoque canum sola ossa vorantium cum chalibeato lacte magnopere conferre dysentericis testatur Galenus decimo de simplicium medicamentorum facultatibus, cap. de stercore canum. quem sequutus est Paulus cap. proprio de torminibus, erinaceorum item testae vñs, ostreorum, & cancrorum, tam fluuiialium, quam marinorum tritae, ac etiam cornu ceruinum vñm resiccatur (ut inquit Aetius) intestinorum vlcerata curant. Vtilissimus etiam existit portulacae succus potus dysentericis, aut etiam ipsa portulaca cocta, & comesta. Nec minus conducit plantaginis semen, folia, & radix, & lapathi siluestris semen. Verum si pluribus diebus nihil remedia alia iuuerunt, vetustique iam vitium est, aque bene frigidae potio assumpta vlcerata adstringit, & inritū secundae valetudinis facit, Celso auctore. Sed ubi vñter suppressus est, protinus ad calidā potionē reuertēdū est, ut ipse inquit.

*Quae
ingeren-
tium
sunt.*

1.
pi.
34.
Lii
5.
Lii
su
cu
pi
ne

*Paulus lib.
3. cap. 42.*

Illud

Illud tamen memoriae semper mandandum, quod communis omnium interparum partium indicatio est, ut ea eligantur, quae animalis naturae maxime sint familiaria, siue ea cibi sint, siue medicamenta: fugiantur, respuanturque huic contraria, eodem Galen. auctore quarto metho. meden. cap. 7. Quapropter medicamenta quae ex opio, alterco, nigro papauere, aut mandragora componuntur, vitari omnino debent, nisi forte maxime urgeat necessitas, ex Tralliani sententia, nam licet somno dolorem leuare videantur, & propterea venter retineri conspiciatur, tamen humores in vnum collecti postea intermissione deiciuntur, capiteque grauato, ac vultu labefactis ventrem reddunt deteriore, & maius cibi fastidium inducunt. Crasis vero intestinis exulceratis, eis quae per sedem infunduntur, ut diximus, potius vtendum erit cum & ea quoque magis conferant. Quoniam si eisdem etiam vtaris, tenuibus intestinis affectis; nihil nocebis, quemadmodum si ea, quae per os assumenda conscripsimus, eis tribus quibus crassa intestina exulcerata sunt, nihil afferas nouementi. Eandem tamen facultatem habere debent haec medicamenta, utpote adstringendi, obtundendi, & resicandi, & ubi vlcera fordidata fuerint, eis vtendum etiam, quae vim habent detergendi. Excipitur circa initia aquae hordei torrefacti cum corticibus, & iuris gallinarum, seu puluerum allinaceorum salis expertis cuiuslibet librarii semis, quibus adde vitellos ouorum numero duos, olei rosacei vnc. j. s. & vnc. ij. sacchari rubei, aut mellis rosacei (si pituitosi dysenterici fuerint potissimum) tantundem, & fiat clyster, & si sanguinis copia profuat, polygoni, aut arnoglossae succi vnc. ij. vel vnc. iij. adice. Nec minus conuertit asini stercoreis succus maxime si a pastura moistana, & adstringente prodeat animal, ut inquit Aetius, potissimum si stercoreus plantaginis succo fuerit madefactum, deinde expressum, & infusum. Quod si dolor vehementer urgeat caprillum seuum, ut quod inter alia sit dysentericis vtilissimum, quia & facilius concreuit, & intestinis inungitur, plurimoque tempore inhaeret, nec habet acrimoniam, ut hircinum, Galeno auctore l. 4. n. de simplic. medic. facultate: & aliis plerisque locis. Aut si id haberi neque, hircinum: vel asinerium, seu gallinaceus adeps praedicto clysteri adiciatur, pondere vnc. j. aut vnc. ij. similiter & oleum rosaceum augeatur, sitque rosaceum omphacium. Haec tamen, veluti etiam & ouorum vitelli, ubi dolor non urgeat, vitari debet quoad fieri potest, quoniam vlcus curationem impediunt, aut exigua sit eorum quantitas, hoc etiam tempore si cremoris oryzae, tragacanthi, aut gummi, aut amili vnc. j. aut vnc. s. permisceas, conferet. Quod si maiori egeas adstrictione, ac resicatione, in modo dicta aqua hordei, foliorum plantaginis, polygoni, ac portulacae pugillum s. decoquens, rosarium rubeorum drach. iij. balaustiorum, hypocistidis, ana drac. ij. cui per eolum transfuso seui caprilli vnc. s. olei rosacei vnc. j. sacchari rubei vnc. ij. aut sacchari rosacei vetusti tantundem, succi plantaginis, aut portulacae vnc. j. s. misceas, & fiat clyster, & si magis adstringere volueris, luti armeni, & sanguinis draconis ana drachm. j. adice, vel tantundem pastillorum de spodio, seu terra lemnia, aut succino, quemadmodum si magnopere dolor urgeat, stupefacientia etiam medicamenta permiscere poteris. Nanque tutius per sedem, quam per os adhibetur, utpote drac-

s. aut scrup. ij. Philonij perfici, aut catapotorum de cynoglossa, seu eius medicamenti, quod a Nicolao Reques appellatur. Vbi vero vlcera intestina depascantur, eis quae crustam inducunt vtentur. Paulo, Alexandro & Aetio testibus. (Esti vlcera haec paruum omnino salutis spem promittant, ut inquit Aetius, potissimum si in tenuioribus consistant intestinis.) Verum nos medicamenta, quae crustam inducunt per sedem infusa probamus, ubi vlcus serpendo depascens circa crassa intestina consistit. Horum autem copia apud eosdem auctores, ac etiam apud Galenum lib. 9. de compositione medicamen. secundum loc. reperitur. At si ex venenatorum pharmacorum potu oborta fuerit dysenteria, his quae in venenorum potu conueniunt, erit vtendum, ut idem Aetius fatetur. Sunt autem remedia huiusmodi in triplici differentia, vomitoria videlicet, obtundentia, atque extinguentia. In quorum numero etiam acria comprehenduntur, ut ipse inquit, Cataplasmata vero, fomenta, ac vnguenta, seu cerata ventri imponenda haud magnopere probamus, potissimum ubi frigida, atque adstringentia fuerint: Nam quo magis cutem densaueris, tanto magis fluxiones augebunt, ut Galenus inquit primo de arte curat. ad Glauc. cap. 14. Vbi vero cogeris vehementi urgente dolore, eisdem uti, perpetuo acutum permisceas, ut medicamentorum facultas altius ad intestina penetrare valeat, aut vini albi & tenuis modicum. Sintque ea nec facultate, nec actu admodum frigida. Horum autem medicamentorum, quoniam multa copia apud artis medicae auctores eximios reperitur, propterea consulto de his nos non meminimus.

Nec tenesmus. Id est, de tenesmo, seu tinesmo.

CAP. LXXV.

TX eodem (quo iam dicta dysenteria) genere est, & qui a Graecis *tenesmus*, a Latinis quibusdam *tenesmus*, a Plinio vero *tenasmus* appellatur, quam apud eosdem Graecos interim *tenesmus*, cum ea, ut patet cum primo, & tertio de morb. vulg. tum etiam aliis plerisque locis in Hipp. & Galeni doctrina, quandoque vero cum *tenesmu*, scriptum reperitur, ut videre licet apud Celsum cap. 18. libro 4. id vero non ab re. Nam consueuerunt Doricam sectantes linguam pro, *tenesmu*, a, vsurpare, nec minus & apud Hippocratem, ut liquet aphorif. 27. septimi libri non *tenesmu*, sed *tenasmus* nuncupari solet pro, *tenesmu*, a, vsurpans: quo fit ut etiam Latine nedom *tenesmus*, seu *tenesmus*, sed etiam *tenasmus* appellari valeat, quemadmodum Plinius affectum hunc appellare consuevit. Nec quoque talis appellatio barbara dici poterit propter iam traditas rationes. Nam proprio, & Latino nomine nos carētes, nomenclaturā a Graecis vsurpamus, & indifferenter praedictis nominibus uti poterimus. Nomen vero sumpsit ab ipso symptomate, ut apud Galenum constat secundo method. medend. cap. 2. & comment. praedicti aphorifm. 27. septimi libri, quoniam in eo tenesio quaedam circa intestinum rectum fit, ob quam, cum cacare vehementer appetant aegri, continuo exurgunt, ut idem sit, quod desidendi quaedam cupiditas assidua, aut inanis quaedam egerendi voluntas, seu (ut inquit Paulus cap. 41. libro tertio) continua, & implacabilis desidendi cupiditas, qua nihil praeter modica cruenta, vel mucosa egeritur.

D d 2

Plin. lib. 28 cap. 14. Comment. 3. de morbis vulg. cum. 2. tex 7. & 35. 3. de mor. vulg. comment. 3. tex 53.

Tenesmus unde nomen sumpsit. Quid sit.

1. de simplic. fac. cap. 34. Lib. 4. cap. 5. Libro 1. de simplic. fac. cap. de pinguedine.

lib. 42.

Quibus cum
dysenteria
conueniat.

Quibus dif-
ferat.
Quas pars
in eo affi-
ciatur.

De locis af-
fectis.
cap. 1.

Quis affe-
ctus præter
naturam sit.

Loco cita-
to.
Signa.

Ante me-
dium libri.

Causa.

Id quod etiam Aetius confirmauit cap. 44. libro nono, cum dixit, est autem affectio hæc ad excernendum promptitudo, quæ differri, ac diuitari non potest, nihil tamen, præterquam pauca cruentum aspectum habentia propellens; & postea quædam muscosa. Qui quidem affectus symptomata infert dysenteria: similia, nixus tamen multo vehementiores habet, ut eodem libro tertio de causis symptomatum, cap. 2. liquet, eandem quoque habens causam ac dispositionem, ut patet comment. præcitati aphorismi. Conuenit itaque cum propriè dicta dysenteria tenesmus in dispositione, causa, & sympto. nisi quod ea sunt vehementia, præsertim nixus, ex Galeni sententia. Differunt autem loco, seu parte affecta, nam dysenteria propriè dicta indifferenter in cunctis intestinis excitari potest, præterquam in intestino recto, tenesmus verò non nisi in eodem intestino recto oriri consuevit, ut liquet apud Galenum, cum præcitato libro tertio de causis symptomatum, cap. 2. tum etiam sexto de locis affectis, comment. præcitati aphorismi, & aliis plerisque locis. Id etiam confirmauit Alexander, cap. 9. libro octauo, cum dixit, tenesmus recti intestini affectus est, inducant etiam ipsum affectum esse vehemens tensio, ac dolor cum positu, ac prompta deiciendi cupiditas, paucis admodum sequentibus excrementis, & quod per totum morbi spacium iis quæ à superius descendunt, haudquaquam misceri videtur. Affectus hic, velut & dysenteria, morbus est in soluta cōpinuitate, quoniā prædicti intestini recti exulceratio est, ut liquet apud Galenum præcitatis locis. Et propterea licet ab initio excrementa pituitosa, & pingua sint, progressu tamen temporis, ut liquet eodem sexto de locis affectis, etiam ramenti specie deiciuntur. Comitantur etiam affectum hunc conatus, & implacabilis desidendi cupiditas cum flatibus. Descendunt autem per aluum mucosa cum graui distentionis sensu, necnon aquosa, & interdum post excrementa sanguis destillat, eodem Alexandro auctore. Celsus verò sic de eo scriptum reliquit. In hoc æquè, ac in torminibus frequens desidendi cupiditas est, æquè dolor, ubi aliquid excernitur. Descendunt autem pituita, mucisque similia, interdum etiam leuiter suberuenta, sed iis interponuntur nonnunquam ex cibo quoque rectè coacta. At Hippoc. libro de affectio. ait, Quod ubi tenesmus apprehenderit, secedit sanguis, ac mucus, & dolor fit in ventre inferiore, maxime ubi ad secessum deuenit. Scribunt tamen nonnulli (ut Galenus asserit eodem sexto de locis affectis) quod à forti excernendi conatu præcedente dolore vehementi aliqui lapides callosos deiecerunt, iis qui in vesica nascuntur haud ab similes. Id quod neque ipse vidit, neque alium qui viderit, vnquam audiuit. Affectus hic cum eiusdem sit generis cum dysenteria (ut diximus) haud quoque circa eiusdem causas ab ea discrepabit, Galeno teste comment. aphorif. 27. septimi libri, modo ipsæ circa rectum intestinum exulcerationem pariant, nam citra eam tenesmus dici non poterit. Quamquam sint, qui velint, quod à iam dictis dysenteria: causis, tum externis, tum internis citra exulcerationem fieri possit tenesmus, necnon & à quibusdam aliis. Verum hunc tenesmus mendosum, seu non verum appellant, præcipuè Arabes, & qui eos sectantur. Nos verò cum Galeno asserimus tenesmus nec dici, nec appellari posse, etiam si quispiam dolorificus affectus à quapiam causa in intestino

recto fuerit ortus, nisi adsit eiusdem abrasio, seu exulceratio. Quomodo autem distinguenda sunt, ac dignoscenda tenesmi causa: diuersa, à præcedenti cap. petas. Quanquam sit propter stercoreum multitudinè eueniat grauis distentionis sensus, circa inum venter aderit, eruntque alui excrementa præter naturam detenta. Hæc autem multitudo non in cæco intestino, ut quibusdam visum est (pace tantorum virorum dixerim) cum hoc in hominibus intestinum adeo exiguum sit, ut nullum ferè habeat usum, neque intra ipsum faeces excipi possunt, velut in nostris anatomis sæpius impeximus. Verum in eodem met aderit intestino recto, vel cum primo, vel alligatum est, vel in alia eius parte. Quod verò tenesmus neque acutus, neque longis morbis annumerari debeat, cum & facile tollatur, neque vnquam per se iugulet, liquet apud Celsum præcitato loco. Quod si verò gerenti superuenerit, faciat abortum, aphorif. 27. septimi libri, ab Hippocrate scriptum est, id autem non ab re. Quoniam (ut inquit Galenus 3. de morb. vulg.) dolorificus, & molestus affectus est, dolorificus quidem propter tensionem, molestus autem, quod assidue desidendum sit. Quare & propter vehementes, atque frequentes exurrectiones, conceptus abortitur, quando etiam ex omnibus aliis fortibus moribus, atque doloribus mulieres grauidæ solent abortire. Pro cuius curatione prior ratio victus talis sit, qualem in tormina supra præcipimus, Celsi auctore, cibos quidem (ut inquit Alexander) boni succi, concocti faciles, & leuiter adstringentes exhibentes. Quod verò ad medicamentorum rationem attinet, id primo animaduertendum erit, num à causa quapiam tenesmus adhuc fiat, vel augeatur, vel ipse iam factus desinente eius causa amplius non fiat. Nam si adhuc fiat, pro causarum diuersitate, curandi ratio variari debet, quemadmodum dysenteria decretum est. Et propterea ea prius auferri debet, vel venæ sectione, si pletoricum fuerit corpus, seu ab inflammatione tenesmus originem ducat, vel purgatione, si ab acibus, mordacibusque succis in toto corpore redundantibus fuerit ortus, & licet id à iunioribus etiam Galenicis medicis cane prius, & angue vitandum esse consilium fuerit, tamen præter rationes, quæ hic afferri possent, Aetij auctoritas capite 6. libro quarto sufficiens esse debet. Ea autem talis est, Caterum quia tenesmi mordacibus, falsisque humoribus intestino recto in tactis oriuntur, num in toto corpore abundant expendemus, ac mediocriter purgantibus educentes, ægrum ab assidua exurgendi molestia liberabimus. Nemo igitur vereatur ubi pletoricum fuerit corpus, & alia non prohibeant, seu ab inflammatione fuerit ortus tenesmus venam secare, non semel duntaxat, sed sæpius, si opus fuerit, cum pro euacuatione, tum etiam pro reuulsione perficienda priusquam ad ea se conuertat medicamenta, quæ tenesmum ipsum curant. Haud quoque dissimili ratione, si vitiosi fuerint in toto redundantes succi ad intestinum rectum confluentes, aucter medicamento, purgante, pro redundantis succi ratione, uti debemus, quemadmodum præcedenti cap. de dysenteria docuimus, ut puta si flaua bilis redundauerit, medicamento eam purgante vtare, si salsa pituita, aut atra bilis, medicamentis quæ eosdem succos purgandi vim habent, uti oportet, prius tamen eis concoctis, ac præpara-

paratis, si eadem occasio dabitur. Quanquam nec eadem medicamenta magnopere acria, ac quæ vehementem purgandi vim habeant, esse debent, cum quibus perpetuo, quæ leuiter adstringunt permiscenda sunt, quemadmodum præcedenti cap. monuimus. Verum si ex stercoreum multitudinem tenesmus excitetur, tentandum primo est leuibus clysteribus, aut etiam aliquantulo acrioribus eandem moliri, & ubi non suffecerint, ad lenientia medicamenta purgantia transeundum erit, veluti est manna, cassia fistula, saccharum violaceum, syru. ex pluribus infusibus rosarum rubearum, aut persicarum, & si oportuerit aliquid diachati. addendum. Nam & Paulus medicamentum, quod emolliat per os assumptum hoc in casu probat. Cum verò tenesmi causa fuerit abscessa, aut idem non amplius à causa dependat, aut eodem exigua sit, cum discutientibus, cum modicè adstringentibus laborans sedes moueri debet, cum ex eisdem quoque agro opem feramus, eodem Actuario auctore, totisque viribus, clysteribus, aliisque topicis medicamentis ipsum curare nitendum erit, eisdemque adhuc diuersis, prout diuersa fuerint causæ, quæ ipsum effecerunt. Nam si inflammatio fuerit, facta venæ sectione, & adhuc eandem perseverante, pristinæ fucus cum paucis rosis, simul cum eo decoctis infundi debet (Actio teste) vel decoctum paratur ex hordeo non decorticato, & torrefacto, ac plantaginis foliis, cuius vnc. viij. aut librâ vnâ affumens, adiectis olei rosacei vnc. iij. & recentibus ouis totis sine cortibus numero ij. simulque permixtis, fiat clyster. Ad eundem usum iniici debet lac recenter multum caprillum, potissimum cum oleo rosaceo. Caterum lumbis præcipue circa os sacrum, sed, ac pubi, & interfemineo, perineon Græci appellant, fatus, ac illinitiones adhiberi debent oleo myrteo, rosaceo, ipsoque omphacino, paucio vino albo adiecto. Quod si dolor intendatur, fatus ex fenigræci, maluarum, rosarum rubearum, althææque, ac seminis lini decoctum hant. Vel in eorundem iure infusions faciant ægri, cum efficacissima in tenesmi affectione fomenta sint sedi admota, eodem Actio auctore. Procedente verò tempore reiectis rosis, ex reliquis, adhibitis chamæmeli floribus, ac meliloto fomentum paratur, & oleo rosaceo, seu myrtino camæmelinum, ac anethinum permiscere oportet, & temporis processu eisdem folis uti. A biliosis autem humoribus, si tenesmus fuerit ortus, clysteres fiant ex hordei, & foliorum plantaginis decocto, in pullo gallinaceorum iure, sacchari rubei, & olei rosacei, omphacini, singulorum vnc. ij. adiectis, & vitellis ouorum numero duobus, aut ex caprillo lacte, saccharo rubeo, & oleo rosaceo: pariterque fatus, infusions, ac allinitiones ex maluarum, althææ, rosarum, violarum, ac hordei decocto, & ex oleo rosaceo omphacino, myrteo, & amygdalarum dulcium fiant, vel ex oleo rosaceo, recenti butyro, & adipi anserino cum modica cera solutis, interius a nobis vngatur, vt Tralliano visum est, potissimum ubi vehementius dolor vrgeat. Possunt insuper verbenæ decocto inferiores partes foueri, aut in aqua calida ægri desidere, Celsi auctore. Posthæc ea quæ adstringunt, simulque contemperant iniicienda sunt, vt decoctum ex rubi, myrthi, seu plantaginis foliis, rosis, cytinis, hypocistide, balaustio, ac hordeo, cui olei rosacei omphacini, ac sacchari rubei vnc. ij. addas, ac vitellos duos ouorum, ubi in-

gens dolor addit. At si dolor absit, aut is exiguus fuerit, oleum rosaceum, ac ouorum vitelli auferatur. Si vero pituita sit, quæ ægrum infestauerit, ac tenesmum excitauerit, fueritque adhuc exigua quantitas in recto intestino eiusdem impacta, detergentibus huiusmodi clysteribus vtare primo, ac leuiter adstringentibus, deinde adstringentia magis, ac excitantia medicamenta adhibeas, quæ etiam ad calidum vergant, vt Recipe hordei cum corticibus, ac cicerum rubeorum ana P. j. furfuris P. s. corticum pini, foliorum lauri, & horum camæmeli ana manip. s. pilularum cupressi numero iij. fiat decoctum in aqua pluuiali, aut iure pullorum gallinaceorum, è quo excipe lib. j. & adde olei anethini, chamæmelini vnc. ij. si dolor vrgeat, vitellos ouorum numero ij. mellis rosacei vnc. ij. misceantur, & fiat clyster. Pariter circa pectinem, sedem, & fœmen calida fomenta, ac etiam olea adhibere oportet, fiant autem fatus, seu infusions ex floribus chamæmeli, meliloto, fenogreco, anetho, corticibus pini, lauri, ac cupressi foliis, malicorio, ac myrthi baccis, parato decocto ex tribus partibus aquæ pluuialis, & vna vini adstringentis. Illinitio autem ex iam dicto oleo anethino, aut chamæmelino fiat, liliaceo, irino, aut rutaceo. In hunc etiam usum conferunt sacculi ex fursure in vino adstringenti decocto parati, si sedi admoueantur. Per propriam quoque experientiam ab Actio commendatur later perquam vetustus, & à fumo denigratus vnâ cum contentis in eo paleis, si tundatur, deinde feruenti aceto subactus, linteolique alligatus subdatur sedi. Id verò statim ab excretionem admoueri debet, & maximè si dolor infestet. denum prædicto hordei, ac cicerum decocto malicorium, lentes, myrthi baccæ, ac gallæ adijci debent, corticem pini, cupressi pilulas non prætermittendo. Idque infundi debet per sedem, mellis rosacei vnc. ij. adiectis. Quid si vigilæ vna cum dolore perseverante consequantur, neque prædictis cedat affectio, sedi aliquod soporiferum collyrium subdetur, vt inquit Actius. Aut alicui ex prædictis clysteribus solani, hyosciami, aut mandragoræ decoctum adijciatur. Eorundem autem quantitas exigua sit, neque ea adhibeantur, nisi maxima urgente necessitate. At si tenesim frigus præcesserit, eisdem calidis, discutientibusque fatus, infusionsibus, sacculis, ac vnguentis uti licebit, & similibus, prout usus exposulabit.

Περὶ τῶν αἰμορροΐδων. Id est, De hemorrhoidibus.

C A P. L X X V I.

IN sanguine generando quicquid admodum crassum, ac terreum ex ciborum natura in nutrimentum fertur, nec commode à naturali calore alteratur, sed prorsus eam quæ in iocinore sit, mutationem subterfugit, id lien ad se trahit: quod verò mediocri est crassitudine, ac planè à iocinore absolutum, simul cum sanguine in omnem partem diffunditur: requirit etenim sanguis in non paucis animalis partibus crassitudinem quandam, vt liquet secundo de natur. facult. ac seponitur quidem tanta talisque iam dicti succi portio, quanta, qualisque, si in totum ferretur corpus, noxam aliquam referret. Cum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucum generauerit, & ratio victus adhibita confert, & splen satis attrahit ex eo qui generatur, haudquaquā huiusmodi extremæ copia in

D d 3

venis generatur : at ubi contraria eueniunt : dico autem contraria , vt scilicet hepar ad generandam huiusmodi superfluitatem sit aptum, sit etiam ratio victus per tales cibos adhibita, qui crassum & feculentum humorem naturā apti sint procreare, splen verō sit naturā imbecillior, & quicquid de ea superfluitate generatur ad se minime trahere potens, in hoc inquam corpore turbidus fit, ac crascescit, qui in venis generatur sanguis, & nonnunquam à venis eisdem habentibus (sicut alia omnia) vim excernendi id quod extraneum est, ad sedis vasa, quādam reponitur, interimque propter multitudinem, & crassitudinem eiusdem sanguinis, eorundem vasorum ora aperiuntur, atque per eadem vasa excernitur : quam affectionem Græci αἱμορροϊδῆς appellant, vt liquet secundo de arte curatiua ad Glauconem, sexto de morbis vulgaribus, & commen. aphorism. 12. sexti libri, nam αἱμορροϊδῆς nil aliud significare videtur quā sanguinis profluium per venas sedis, idem confirmatur auctoritate eiusdem Galeni libro de atra bile, cum dixit, sæpenumero autem natura recludens venā vasorū quæ sunt in sede, talē permixtū sanguini humore excreuit, loquens de melancholico succo, quo & nomen symptomati imponunt αἱμορροϊδῆς, Latini quoque alio proprio nomine carentes eodem modo affectionem hanc hæmorrhoida, siue hæmorrhoidas appellant. Sumpsit itaque appellationis originem hæmorrhoids à sanguinis fluxu, vt liquet ex præcatis Galeni sententiis, & ab Aetio cap. 5. libro 14. qui etiam affectum hunc asseruit esse velut dilatationem quādam locorum in sede factam vasis quibusdam isthic apertis, & progressu temporis callosioribus factis. Verum quamuis sæpius accadat, quod dilatatis, ac admodum impletis iam dictis venis ob copiam sanguinis feculentis, ac crassis, vt diximus, quod per eas sanguis excernatur : & propterea tale fortitus sit nomen affectus hic ; tamen non ideo si is non excernatur, modo dilatata, impleta, ac inflata eadem sint venæ ex iam dicto crassiore sanguine, hæmorrhoides quoque appellari non debent. Quapropter Aetius præcitate loco duas hæmorrhoidum dicebat esse differentias : quoniam aliæ sunt cæcæ, aliæ sunt apertæ : cæcæ, quæ omni tempore inflatæ sunt, & nihil excernunt : apertæ verō sunt, quæ per tempora sanguinem effundunt, idem confirmauit Paulus capite 59. libro tertio. Pars quæ afficitur in ambabus differentiis, adeo oculis conspicua est, vt nullo alio signo opus habeat, quoniam semper venæ sedis affectæ sint : quanquam non adeo conspicuum sit, neque mihi ita certum, num dictæ sedis venæ progerminationes sint venæ portæ dictæ, vt quibusdam visum est, vel venæ magnæ chyli, seu cauæ appellatæ, vel vtriusque, cum ex vtriusque, rami ad eandem partem pertineant, & ex porta venæ maiores : quamuis Hippocratis & Galeni doctrinæ magis consentiat eas ramos esse venæ cauæ propter ipsius Galeni verba, tum secundo de nat. facul. tum 2. de arte curatiua ad Glauconem, cap. de cancri, & 6. de locis affectis, & Hip. aphorism. 11. & 21. & sexti libri. Nam si perpetuò ubi minus quā iustum est atrum succum ad se trahit lien, vt sanguis impurius, crassior, ac nigrior ; sic vniuersum corpus redditur decolor, non propter aliud, nisi quod eius facultate attrahente imbecilliori reddita, sanguis in vniuersum corpus impurus transmittitur vt liquet tertio de nat. facult. & 6. de locis affectis, & deinceps ab

ipsis venis vim excernendi habentibus ad venas fedis quandoque delegatur : vt patet 2. de arte curatiua ad Glauconem, & per eandem excernitur : necessariò sequitur eas venæ cauæ dictæ, & non portæ esse ramos, cum non prius excernatur quā per vniuersa totius corporis vasa fuerit diffusus, tam si ad vniuersam cutim, quā si ad varices, aut ad iam dicta sedis vasa decumbat, aut ad quampiam aliam partem, quæ imbecillior fuerit. Ad hæc si propterea melancholia, & nephritide laborantibus hæmorrhoides conferunt non solum ratione euacuationis, sed qualitate humoris euacuari : quoniam pellit natura ad partes ignobiliore eos, qui per affectus efficiunt humores, præsertim cum melancholici, ac crassi fuerint, vt liquet citatis aphorismis, cui in dubium venerit tales humores per ramos cauæ, & non portæ venæ ad dicta sedis vasa permutari, atque transferri tanquam per conuenientiora loca, per quæ promptius, ac facilius talis fiat permutatio. nulli inquam. Audacter itaque cum Hippoc. & Galeno, tenemus (quicquid alij sentiant) hæmorrhoidas ramos esse venæ cauæ potius quā portæ, quāuis ex porta maioris forte progerminationes, quæ ex cauā ad eundem pertinent locum. Cæterum, licet huic affectui nomen inditum sit hæmorrhoids, propter sanguinem, qui magna ex parte cum succo melancholico à natura recludente horū vasorum ora excerni consuevit, & propterea dici posset esse symptoma in genere excretorum immodicè toto genere præter naturam, quemadmodum & reliquæ hæmorrhagiæ, præter mensium profluium : tamen illud non ita facile assererem, cum nonnullæ sint hæmorrhoides cæcæ, vt diximus ex Aetij & Pauli auctoritate, & nos indies crebrò obseruamus, ex quibus ne tantillum quidem sanguinis profluit. Quà ratione nec hæmorrhoides nuncupari deberent, neque symptomata esse in genere excretorum immodicè, nisi quispiam diceret id raro euenire, cum etiam ex eisdem cæcis semper aliquod profluat sanguinis, licet minimum sic. quod si nec omnino quippiam excernatur, non propterea hæmorrhoides nominari non debent ; cum omnes sic appellatæ sint, propterea quod sæpenumero, & non semper, vt inquit Galenus citato libro de atra bile, capit. 4. natura sanguini permixtum humorem melancholicum recludens dictorum vasorum ora, per eandem excernit. Quod item confirmari posset Celsi auctoritate cap. 18. libro sexto, cum dixit tertium vitium est ora venarum tanquam ex capitulis quibusdam surgentia, quod sæpe sanguinem fundunt αἱμορροϊδῆς Græci vocant. At si quis propterea assereret hæmorrhoidas non symptoma esse, sed morbum non simularium, sed instrumentalium partium, & propriè in cavitare, eadem non adstricta, aut constipata, sed dilatata, aut parestacta, non reclamarem. Nam Aetius dicebat, quod hæmorrhoids est dilatatio venarum sedis, ad quā dilatationem si earum orta referabantur, sanguinis fluor consequebatur, & sic apertæ dicebantur hæmorrhoides, si verò vasorum ora haudquaquam aperiuntur, nihil excernitur, etiam si ipse venæ admodum dilatatæ sint, & impletæ, & propterea cæcæ appellantur, communis est itaque vasorum dilatatio cunctis hæmorrhoidibus, & non sanguinis per ea excretio. Quare morbum potius quā symptoma asserendum erit. Illud quoque cum Galeno affirmari poterit. Nam cū ex eodem humore melan-

Quid sint hæmorrhoides 2. ad Glauconem cap. 10. 6. de morbis vulgaribus. 3. text. 37. & 38. c. 1.

¶ unde nomen sumpsit.

¶ Hæmorrhoidum duæ differentie.

¶ Pars quæ afficitur. Venæ sedis unde oriantur.

cap. 9. 2. ad Glauconem cap. 10. 6. de locis affectis in principio. Locis citatis.

Cap. citat.

Affectus præter naturam.

V. c. 1.

melancholico varices, & hæmorrhoides fiant, vt li-
quet secundo de arte curatiua ad Glauconem, cap.
10. & aphorif. 21. sexti libri, & libro de atra bile, cap.
4. quemadmodum varices fiunt, cum fœmorum &
crurum venæ latiores fiunt: ita quoque & hæmor-
rhoides, cum sedis venæ dilatantur, quinimo omnes
dilatatas venas antiqui medici *hæmorrhoides* appellant, vt
ipse inquit libro de tumore præter naturam, cap.
decimonono. Quare cum distentis, ampliatis, ac
dilatatis venis sedis hæmorrhoides cunctæ fiant, &
non cum ex eis sanguis profluat (id enim sympto-
ma est earum, quod sæpe eis aduenit, non autem
seper) propterea morbum potius, quàm sympto-
ma se non ab re quispiam dixerit, quamuis à sym-
ptomate nomen sumplerit, quod magna ex parte
ei superuenire solet. Nam illa venarum sedis am-
pliatio, seu dilatio propriè hæmorrhoides est, non
autem illud sanguinis profluvium, quod non solum
ipsis venis dilatatis, sed etiā patefactis orificiis ea-
rundem consequitur, potissimum cum non per-
petuò id omnibus superuenire contingat, vt dictū
est. Cognosces autem eas non difficulter: oculis e-
nim conspicuæ sunt, interna quoque sedis pars in-
tumescit, & capita venarum supereminet, & in in-
ternam intestini recti partem velut uæ acini luci-
dæ apparent: cæcæ dolorem vehementem excitant,
potissimum dum à stercore exeunte comprimun-
tur, quamuis cæcæ plus doloris, quàm apertæ af-
ferant, teste Oribasio libro nono sui compendij cap.
42. nihilque cruenti excernunt. Apertæ verò san-
guinem eiulantur, maximè quidem vnā cum ster-
core, aliquando etiam sine stercore, vt inquit Hip-
pocr. lib. de hæmorrh. plurimis quoque habentibus
hæmorrhoidas adest dolor vniuersi corporis
proprius eis, vt pote citrinus ad viriditatem decli-
nans, vt quibuldam visum est. Si verò accidat quòd
hæmorrhoides magis interius fiant, si vehementer
exprimatur æger, sedesque prius aqua calida fouea-
tur, cōspiciæ fient tam si cæcæ, quàm si apertæ sint.
Verum quòd hæmorrhoides originem habeant ex
copia melancholici succi, seu fæcis sanguinis aut ex
eodem sanguine multo fæculento, & crassiori exi-
stente: cum videlicet iecur ac vniuersæ venæ eun-
dem humorem à se ipsis excernentes, in dictas se-
dis venas reponunt, liquet apud Galenum libro de
atra bile, cap. 4. & 2. de arte curatiua ad Glaucon.
cap. 10. ac luce clarius commen. aphorif. 12. 6. lib.
cum dicebat hæmorrhoidas fieri impossibile est
absque hoc, quòd propter multitudinem, & crassi-
tudinem sanguinis, ora quarundam venarum ape-
riantur, hepate ad ipsas reponente fæcem, & quan-
doque sanguinem melancholicum. At qui iam dixi-
mus nos circa initia huius sermonis, quibus corpo-
ribus, & à quibus causis talis coaceruentur succi seu
sanguinis melancholici copia: quæ vbi non adeò
multa fuerit, & dictorū vasorum sedis expultrix fa-
cultas non vehementer irritata, ac retentrix nō ad-
modū imbecilla, cæcæ fiunt hæmorrhoides: quem-
admodum vbi contrarium euenerit, apertæ: ex qui-
bus sanguis profluat crassus, niger, & fæculentus ma-
gna ex parte, dico magna ex parte: nam quandoque
contingit, quòd sanguis per easdem venas profluat,
natura duntaxat multitudinem sanguinis euacuare:
quemadmodum accidit sanguinem per nares effun-
dentibus: nonnunquam patefactis eisdem venis ex
sanguinis impetu ad eas irruentis, id natura haud-
quaquam tempelūe ad animalis commodum effi-

ciente: quæ sit, vt effusus sanguis interdū niger non
sit, interim quoque accipit vt natura attri sanguinis;
seu succi euacuanda causa venam aperiat, quo malo
sanguine euacuato, bonus etiam subsequatur, vbi
diutius patefactū remaneat os eiusdē venæ, neque
prius fuerit oclusum. Quare audacter cum Galeno
tenemus, quòd licet magna ex parte per has venas
ater sanguis, ac succus melancholicus per modū fæ-
cis genitus expurgari consuevit, tamen non omnis
hæmorrhoides talē melancholicā bilē, aut melanco-
licum sanguinem euacuat: vt liquet sexto de morbis
vulgaribus. Neque propterea Galenus sibi ipsi pu-
gnantia scripsit. cum cōment. præcitato aphorifmo
12. sexti libri, dixerit hæmorrhoidas fieri impossibi-
le esse, præter multitudinē, & crassitudinē sangui-
nis, hepate ad eas venas reponente sanguinē quan-
doque melancholicū, & ipsius fæcem: nam de veris
loquebatur hæmorrhoidibus eo loco, quæ ex hu-
iusmodi humoribus verè, & propriè, vt plurimum
hortū habent. At libro sexto de morb. vulgar. om-
nes connumeravit causas, ex quibus per sedis venas
sanguis profluere consuevit, tanquā necessariū pro
faciliori intelligentia textus Hippoc. ac veritate sen-
tentia eiusdem textus: quam opinionem testari vi-
detur Actuarius in sua medendi methodo libro pri-
mo, cap. 20. quo loco præter melancholici succi re-
dundantiā alias quoque nonnullas meminit causas,
ex quibus per sedis venas sanguinem profluere acci-
dit, vt pote iis qui solita exercitia omiserunt, aut ple-
niore victu vt cœperunt quàm antea, vel quibus
consuetæ ē nare, aut vtero (ceu in mulieribus) excre-
tiones supprimuntur, aut quibus imos erat venā tun-
dere, aliæ quapiā ratione sanguinem euacuare, &
consuetudinem mutarunt: vt iam quia corpus vni-
uersum peruadat, copia imbecillitasque addit, iis in-
quam hæmorrhoides oboriuntur. At vbi melanco-
licus succus, siue ater sanguis ex eisdē profluat venis,
haud agrè ex eius colore, ac substantia dignoscitur.
Si vero alterius sit coloris suam seruans naturam, si
propter eius multitudinē natura ipsum excernat, ex
quibusdā, aut omnibus modò iam dictis causis præ-
cedentibus illud percipere poteris: similiter ex na-
tura, habitu, & ætate ægotantis, ac ex eo quod se-
quitur, vt puta conferētia. Quæadmodum vbi idem
sanguis immodicè profluat, vel post nigri sanguinis
excretionē, natura haudquaquā potente propter e-
ius imbecillitatē, ac cōceptaculorū diutinā refera-
tionē bonum sanguinem retinere, vt eodem san-
guine impetu quodam ad eadem vasa irruente oris
eorundem patefactis, aut si propter multitudinem,
sanguinis propriam prius vacuare tētaffet, & demū
propter eorundem vasorum apertionem, ac reten-
tricis imbecillitatem, eundem reprimere non vale-
ret, ex contrario iudicari poterit. Neque enim ægri
facilè tolerabunt: quinimo decolores, ac omnino
in dies imbecilliores reddūtur. Quapropter quem-
admodum hæc affectio à multis morbis tutos red-
dit, quando videlicet melancholici succi copia per
has venas vacuatur, aut non immodicè sanguis pro-
fluat, vt liquet ex Hippocrate sexto de morbis vul-
garibus cum dixit hæmorrhoidibus laborantes, ne-
que morbo laterali, neque pulmonis inflammatio-
ne, neque phagedæna, neque furunculis, neque ter-
minthis, neque lepra, neque aliis fortasse similibus
morbis (supplendum est) capiuntur, inquit Gale-
nus. Ita quoque cum contrarium euenerit, nonnul-
lorū malorum causa hominibus existit: nā & defor-

Commen. 5

Commen. 25
Contradi-
ctio.Concilia-
tio. Loco cō-
tato.Signa cōsti-
tuta.Prognō-
sticā.Commen. 3
Tex. 37

mitatem, & miseram vitam hemorrhoides inducunt: multos etiam vita priuant, & deformitatem quidē propter coloris totius corporis vitium ex euacuatione succedens: miseram verō vitam propter corporis debilitatem, quandoque etiam de vita periclitantur sic affecti, cum ob excedentem euacuationem perfrigeratum hepar aquam intercutem operatur Aëtio teste præcitato cap. 5. lib. 14. Quæ omnia idem Hippocrat. in aphorism. scribere haudquaquā oblitus, nam quod superuenientes hemorrhoides à nonnullis aliis malis liberent laborantes, decretum reliquit aphorism. 11. sexti lib. cum dixit. Melancholia & nephritide laborantibus hemorrhoides superuenientes bonum. Neque enim solum ratione euacuationis, ut inquit Galenus in comment. sed etiam ipsa qualitate humoris euacuatī hemorrhoides iam dictas affectiones sanant. Hæ enim sanguinem crassum consueverunt euacuare humore plenum melancholico, & aphorism. 21. eiusdem lib. dicebat, in infanientibus si varices, vel hemorrhoides superuenierint, infantiæ solutio fit, propter eandem causam. Quemadmodum, quod si quis tentauerit intercludere his, quibus consuevit per hemorrhoidas longo tempore talis succus euacuari, quod periculum est ne in tabem, aut aquam intercutem incidant, idem Hippocrates aphorism. 12. eiusdem libri, sub his verbis docuit, à diuturnis sanato hemorrhoidibus si vna non feruatur, periculum est aquam intercutem, aut tabem aduenire. Hinc est quod nō ab re decreuerit aphorism. 25. 4. libri, quod ubi sanguis infra deiciatur (hoc est per hemorrhoidas ut inquit Galenus in comment.) bonum est, quando videlicet hominis natura multum talem accumulauerit sanguinem. Nam aliter ut Galenus testatur, non est assuefaciendum ei, quæ fit per hemorrhoidas euacuationi, quæ periculosam habet utranque immoderantiam, quo vel supra modum sanguis excernatur, vel ex toto supprimitur, ex quibus liquet quantum aberrant nonnulli hac nostra tempestate medici, qui ferē indifferenter cunctis laborantibus, hirudines sedis venis adhibere iubent, etiam si non consueuerit talis ex eisdem venis succus, seu sanguis confluere, neque hominis natura multum talem cumulauerit. Hemorrhoidas item inquit Soranus Ephesius cap. 18. habentes si in plantis pustulæ multæ nigro colore affusæ suboriantur vigesimo octauo die moriuntur. Paulus verō de eisdem sic scriptum reliquit præcitato loco, venulis, quæ in ano extant iusto largius inanitis, habitum in aquam subtercute resoluti cōtingit, & affectos infelicitè cibos sentire, ac contabescere, periculum quoque est ne largum etiam sanguinis profluvium accidat, quemadmodum, ne idem in totum supprimatur, unde laboriosa est curatio. Quod quidem ad curandi rationem attinet, ubi cæcæ fuerint hemorrhoides, aut modicæ ex eis sanguis fluxerit, ea vtendum est victus ratione, quam cap. de melancholia institui-mus, adeo ut per eam inhibeatur, ne multa copia talis melancholici succi generetur, sed quoad fieri possit exigua, ut quæ à liene facillè expurgari valeat. Verum ubi magnos circa sedem dolores excitaue-rint cæcæ, quando ex arido stercore exeunte comprimuntur, & propterea vehementes fiant dolores, alius non semel duntaxat, sed sæpe mollienda erit. Solet enim oriri inflammatio, maxime ubi dura alius cum locū læsit, ut inquit Celsus præcitato loco, qua de re mollibus, ac lenibus clysteribus alius sub-

Ratio curandi cæcæ hemorrhoidas. Vtendum ratio.

ducenda erit, ex decocto foliorum maluarum, violarum ac betæ in gallinarū iure, additis vnc. iij. vel iij. olei violæ aut amygdalarū dulc. vnc. ij. sacchari, & vnc. j. adipis anseris, aut renū caprarum, in quæ etiam vsum cōfert vnc. j. vel j. s. cassiæ fistule per horā ante cibū deuorata; cōfestimque malleoli vena incidenda nō semel duntaxat, sed bis, ubi opus fuerit, & vires cōsentiant, ac corpus sanguine potissimū crasso, & melancholico plenū fuerit: nā in cruribus scæcæ venæ hemorrhoides prouocant Galeni auctoritate libro de curandi ratione per venæ sectionem, cap. 19. præter id quod per deriuationem sanguis qui in eis continetur, vacuatur, ac dolor tollitur: apponenda quoque ubi vehemens persisterit dolor, quæ illum mitigare possunt. Quare in aqua dulci modicè calida detidendum est, aut decoctis in ea maluarū, althææ, & violarum foliis, interrim meliloto, scœnugræco, chamæmelo, lini semine, & anethositem & ubi hæc non suffecerint hyosciami, ac lactucæ folia, & papaueris, tum albi, tum nigri cortices adici poterunt, & ubi desidere æger in ea non potuerit, spongiæ in iam dicto decocto irrigatæ, & madefactæ dolenti loco adhibeantur, fouendus insuper locus erit ex ouorū vitellis, rosarū foliis, oleo rosaceo, & cera parato medicamento: quādoque miscei poterit mica panis in aqua dulci mediocriter decocta: idque si intus fuerint hemorrhoides digito illinendū, si extra super illitū linēum panniculum imponendum est. Poteris insuper, ubi iam dictum medicamentum dolorē non sedauerit, infra scripto vti, quod recipit foliorum althææ, meliloti ana manip. s. adipis anseris vnc. ij. vitelli ouorum numero iij. olei rosacei & de sem. lini ana drac. ceræ albæ parum misce, & fiat vnguentum, & in vehementissimo dolore, infra scripto quoque vtaris: ex foliorum hyosciami manip. s. violarū, & lactucæ tantundem bulliant in aqua, & exprimentur, deinde in dicta aqua maceretur mica panis, cui adde vitelli ouorū num. ij. cremoris seminis lini & scœnugræci ana drac. ij. olei rosacei vnc. ij. misceantur, & vtare modo iam dicto. Vbi verō prædicta non contulerint, sanguinem ab iis vacuare oportet hoc adhibito medicamento, ex olei de chrysomelis, de sem. lini, amygdalar. amararum, ac nuclei persicorū ana drac. succi capæ, & ciclamini ana drac. ij. ster-coris columbini vnc. iij. medullæ, seu sepi ceruini vnc. iij. cum pauca cera fiat vnguentum. Vel fricentur dictæ hemorrhoides cū tici foliis, aut lineis linteis asperis, & crassis: & ubi hæc non contulerint, aut ægri ferre nequeant, hirudines imponantur eisdem hemorrhoidibus: nā ex eis aperiri absque dolore consueuerunt, prout indies obseruamus: & ubi opus fuerit, iterari debent: nam magnopere conferunt, ubi cautè adhibeantur, aperiunt itē eas perdicij herbe folia viridia asidue affricta, insuper & mercurialis trita & velut glans immissa, & fel bubulum per lanæ tomentū inditum Aëtio teste eodem libro 4. cap. 6. Vbi verō apertæ fuerint hemorrhoides, si modicè ex eis profluat sanguis, adeo ut vires nequaquam imbecilliores reddantur, eadem victus ratione vtendum, potissimū si sanguis niger, & crassus fuerit, ac per certa intervalla fluere consueuerit: neque aliter eas suppressimere tendendū, tum quoniam à multis liberant vitiis, ut supra annotauimus Hippoc. auctore, tum etiam quod si quis eas curare tentauerit, quidam cum sanguinis exitū non haberent, inclinata in præcordia, ac viscera materia, subitis, & grauissi-

grauissimis morbis correpti sunt, ut inquit Celsus præcitato loco, illi inquit, qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt. Quod insuper idem Hippoc. decretum reliquit aphor. 12. sexti libri, cum dixit, à diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si vna non servatur, periculū est aquā inter cutem, vel tabē aduenire, consuluit itaque Hippocrates in hac sententia iuxta Galeni expositionē, vnam saltem seruare hæmorrhoidē, ut per hanc vacuetur scilicet, ac vitiosa materia hepatis: præsertim in quibus solita est tempore lōgo per tales venas excerni, si quis eas sanare tentauerit, aliās prædicta ab Hippocrate vitia superuenire periculum est. Aëtius verò illa Hippoc. verba (Si vna non servatur) aliter exponit. Ait enim Hippoc. noluisse quòd vna hæmorrhoidis seruari debeat ad sanguinis excretionē, ut Galenus sentit, sed dixit, si vna nō seruatur, hoc est, si nō adseruetur, id est, si non conuenienti diætā vtetur post earum sanationē. Probat ex eiusdem Hippoc. verbis in eodē aphor. nā dixit hæmorrhoidas inueteratas sanant: est autē sanatio perfecta liberatio, & legitima curatio. Quare cōcludit ipse cum Hippoc. quòd nō oporteat aliquam hæmorrhoidē relinquere, sed omnes excindere, & post perfectā curationē ipsarum, per conuenientem diætā ad naturalem statū corpus curatum reducere, incidereque cubiti venā tempore opportuno, quo videlicet coaceruatus in corpore sanguis euacuatur. Hoc itaque modo possibile est incolumes euadere, nulla penitus hæmorrhoidē relicta. Atqui vera erit perpetuò Hippocratis sententia quomodo libet fuerit intellecta: si quis enim hæmorrhoidas inueteratas sanare tentauerit, aut vnam ipsarum relinquere debet, aut si nullam penitus derelinquerit, præseruare eo modo detentos oportet, conuenienti victus ratione, ne talis succi copia gignatur, etsi quā fuerit genita, venæ sectione statim quibusdam temporibus vacuare, præcipue in eunte vere. At si immodicē sanguinem fundat, quoniam ex immodica profusione ad extremā frigiditatem hominem ducit, ac sæpe aquam inter cutem accersuerunt, vt liquet 2. de natur. facul. cap. 8. cōfessum vbi robur virium deiciatur, suppressæ sunt, simili propterea victus ratione instituta, quam cap. de cruenta spuitione præcepimus (nisi quod vbi vires plurimum prosternantur facilis cōcoctionis, ac multi, & boni nutrimenti cibi semper exhibeantur, cum quibusdam adstringentibus permisti, similiter & in potu vinum adstringēs) si vires ferant, interna cubiti dextri vena incidenda erit reuulsionis gratia. Nam vbi cohibere voles hæmorrhoidas, quæ in brachio sunt venas secare conuenit Galeno auctore lib. de curandi ration. per venæ sectionem, cap. 19. quando videlicet veremur ne in tantam immoderationem hæmorrhoidum euacuatio euadat, vt hominem vel protinus interimat, vel aquæ inter cutem obnoxium, aut cathecticum, hoc est, mali habitus reddat. Quod si vires venæ sectionem non ferant, hypochondriis cucurbitulæ affigendæ sunt, manus itē, ac brachia vincienda, & frictiones asperæ eisdem partibus adhibendæ. Intra corpus interim quæ adstringunt sumenda, vt syrup. ex infusione rosarum, præsertim aridarum, & incompletarum, myrtinus, miua citoniorum, è rhibes, aut ex oxalidis succo, seu plantaginis, paratus cum eiusdem plantaginis, aut oxalidis aqua: etsi non adeò extremæ imbecillitatis vires fuerint, sed mediocrē ferre possunt purgationem, redundantibus vitiosis

succis in sanguine, (vt magna ex parte prouenire prospeximus immodicū sanguinis per hæmorrhoidas profluvium) purgans aliquod medic. propinandū erit, ex eis quæ præterquā quòd leuem habeant vim purgandi talē vitiosum succum redundantē (quiuis is fuerit) facultatem insuper habeant adstringendi, quemadmodum sunt myrobalanorum tria genera, rhubar. agarici, & syr. ex pluribus infus. rosarum rubearum: insuper & syrup. domini Augustini, ex his poteris purgans medicamentū diuersimodē componere pro diuersa ratione redundantis succi. Sit autem eius quantitas virium robori potius, quàm quantitati humoris redundantis accommodata, deinceps ad alia adstringentia confugiendū, tam intus, quàm foris adhibita. Intus sumenda cap. de spuitione eruenda requiras. Cōducunt itē si scrup. ij. lapidis hæmatitis tribuas cū vnc. iij. aut iij. poscæ. Aut R. lapidis hæmatitis scrup. j. radices symphiti, & althææ, ana vnc. s. boli armeniaci scrupul. s. chiæ mastiches gra. iij. fiat puluis, qui cum vnc. ij. vini adstringētis aut vnc. iij. decoctionis aquæ sanguinariæ præbeatur, nec minus confert si drac. j. trypharæ saronicæ, aut trypharæ Foenonidis dictæ, aut theriacæ corporibus, maximē frigidioribus, ac pituitosis, & melancholicis exhibeas cū vnc. ij. aut iij. vini adstringētis, aut si dra. j. trochiscorū de spodio, aut de terra lemnia, aut de succino, calidioribus præsertim corporibus cū vnc. ij. aut iij. aquæ plantaginis, aut acetosellæ propinabis, extrinsecus quoque ea adhibenda sunt, quæ sanguinē reprimere valent, vt infessius in aqua ex verbenis, Celfo auctore: aut in aqua pluuiali fiat decoctū rosarum aridarū, foliorum plantaginis, & myrtillorū, & in eo desideat æger, interim malicorium, gallæ, cytini, balauftium, & magna imminente necessitate, hyoscyamus, alumen, papauer album, & nigrū quoque, si opus fuerit, prædicto decocto adiciatur. In corporibus verò frigidioribus in vino adstringenti prædicta decoquantur, aut saltem, permixto eo cum dicta aqua pluuiali, folia insuper, ac flores verbasci admisceantur. Quòd si quis in eo desidere non poterit, spongiæ in dicto decocto madefactæ affectæ parti adhibeantur, ex iam dictis etiam saccelli parari poterunt, qui in vino adstringenti prius irrigati admoueantur: vel infra scriptus puluis inpergatur, ac ligeretur, qui recipit aloës drach. ij. corticum thuris drac. j. balauftiorum, sanguinis draconis, terræ lemnia ana scrup. j. gallarum, malicorij, & seminis rosarum ana drac. j. fiat puluis tenuissimus. Hoc insuper medicamēto uti poteris, R. succi plantaginis, sanguinariæ, & solani ana drac. ij. aloës, corticum thuris, terræ lemnia ana drac. ij. s. olei myrtini, mastichini, & rosacei ana drac. j. albuminis ouorū drac. vij. ceræ, & aceti, seu vini adstringentis parum, fiat vnguentum. Aëtius præcitato loco, tanquam mirum in modum sanguinem sistētia commendauit aloën, squamam ferri, aut plumbum vstum cum posca impositum. Inter cetera verò medicamenta, illud præstantissimū, ac vnicū existit, quod à Galeno describitur s. metho. meden. cap. 4. ex aloë, & thure, ouisque candido compositum, adeò vt ad mellis crassitudinem deueniat: dein leporis mollissimis pilis excipitur. & vasis ipsis vnde sanguis profluit liberaliter, imponitur, quinimo, & toti vlceri, vbi ipsum circa vasa fuerit: alligaturque forinfecus fascia ex tenui linteo. Modum autē administrandi, ac ipsum diuersimodē cōponendi, ex eodem loco studiosi petant. Illud tamē nō prætermitt-

Purgatio.

Que extrinsecus adhibenda.

tant, quod in duris corporibus plus aloës immiscendum erit, in mollibus verò pus thuris, ut ipse inquit. Oribasius cap. 18. libro 19. hemorrhoidas nimium apertas sistere inquit aloën illitam, aut dissolutam, & impositā, sistit etiā perfusio ex posca, in qua ferri squama, plumbūque vltum sit, ut ipse refert.

Nec par ad op. Id est, De rhagadijs.
CAP. LXXVII.

Rinter alia quoque multa, tēdi que ple-
na mala; quæ sedes recipit: quod pri-
mū saepe & pluribus locis in ea sit,
cutis exciditur. Quod malum Græci
paradisa xai paradac vocant, Latini
fistulas, seu rimas. Quæ quidē fissuræ, seu rimæ, non
perpetuū sunt cum callosis labris, ut quidā recēti-
ores sentiunt, sed tantūmodo, cum diuturniores sūt,
tunc etenim indurantur, & callosa earum labia red-
duntur, ut inquit Aëtius cap. 3. lib. 14. Paulus quo-
que cap. 75. libro 3. Rimas, tum recentes, tum diu-
turnas, & quæ callum contraxerint meminit: quan-
quam de his quæ in vulua, non autem in ano sunt
loquatur. Quare cutis sedis fissuræ sunt rimæ, in-
terim quoque cum callosis labris morbus in solu-
tione continui existentes: sunt verò quandoque
in extrema ipsius intestini recti parte quam anum
nuncupant: interim autem in musculo eundē anum
adstringente, ac claudente, quem *σφιγκτηρα* Græci
nuncupant eodem Aëtio auctore. Hoc malum a-
deo oculis conspicuum est, ut aliis haudquaquam
indigeat notis pro eius cognitione tam si recens
fuerit, & citra labiorum duritiem, seu callum, quā
si diuturnum, adeo ut labra intumuerint & obcal-
luerint, seu callum contraxerint. Nec minus prom-
ptē pars, quæ afficitur oculis obuiam sit, siue anus,
siue musculus ipsum adstringēs, seu claudens fuerit.
Habent autē rimæ non vnam duntaxat generatio-
nis causam: nam aliquando ex influentium humo-
rum mordacitate, ac acrimonia consistunt: interim
ob inflammationē, aut cōdylomatū distentionē,
circumscriptæ partes fissuram sustinent. Si ex consuen-
tibus mordacibus succis fiant, indicia eorundē ade-
runt citra cōdylomatū præsentia: quinimo cum
non aderunt cōdylomata, citra alia indicia, humo-
res acres esse causam iudicabis. Quod si circa sedem
aliquod aderit cōdyloma, adeo intumescens, ac cir-
cumscitas partes distendens, ut cutis findatur, ipsum
rimæ causam esse nō dubitabis. Est autē cōdyloma,
ut inquit Celsus cap. 14. lib. 6. tuberculum, quod ex
quadam inflammatione nasci solet, quāquā Pau-
lus cap. 18. libro sexto, non quodlibet tuberculum
insequens harum partium inflammationem, sed ip-
sum obcallescens cōdyloma appellauerit, ut qui
manu ipsum curare intendebat: & propterea recēs
tuberculū, non cōdyloma, sed absolutē tubercu-
lum nuncupabat: cum verò contraxerit callū tunc
cōdyloma appellari asserebat, tam si inflammatio,
quā si rimæ ipsum præcefferint. Quæ etiā ratione
rimas ipsum præcedere fatetur, cum per rimas, eas
sedis fissuras intelligat, quæ callosa habent labra, &
manus curationem desiderant. Celsus verò tubercu-
lum quodlibet ex inflammatione ortum, siue recēs
fuerit, & nondū callum contraxerit, siue diuturnum
& obcallescens cōdylomatis nomine nuncupavit,
nec minus & Aëtius cap. 3. lib. 14. per cōdylomata,
quodlibet circa sedem ortum tuberculum, tam mol-
le, quā durum, & callosum, tam recens, quā

diuturnū significari voluit, ut liquet ex eius verbis.
Præterea ipsum fieri, cum ruga aliqua corporum in
ano reduplicatorum insurgit, ac præter naturam in-
tumescit, scriptum reliquit: nam cum sinuosus sit
anus, coagmentatas habet rugas: ubi verò earum
aliqua præter naturam intumuerit, tunc sanē sit cō-
dyloma, aliquando extra inflammationem existēs,
& molle: interim verò cum inflammatione du-
rum, ac dolorosum: à similitudine fortē extremo-
rum in pugno clauso in quatuor digitis nodorum
appellat cōdylomata. Quo fit ut a thymis, qui in
eadem parte oriri consueverunt, cōdylomata dis-
ferant: nam thymi tuberculosa quædam emina-
tiæ sunt doloris expertes, præter naturam ac-
aspera, oblonga, subrubra, interim alpicantis co-
loris, præsertim ubi mansueti fuerint, a cacumini-
bus eiusdem nominis herbæ in montibus nascen-
tis sic appellati: quæ eminentiæ ubi parua fuerint,
thymi, ubi verò magnitudine excedunt, ficus ap-
pellantur, eodem Aëtio auctore cap. 4. eiusdem li-
bri. Quod autem rimæ multi tædij plena sint mala,
ex Celso patet, eodem cap. 18. libri sexti, propterea
ubi recentes fuerint, confestim eas curare tentan-
dum est, utpote quæ medicamentis cedant, nam
cum protelatur earum cura, indurantur, & earum la-
bra callosa fiunt: quo tempore non amplius medi-
camenta, sed chirurgiam adhibere oportet, ut in-
quit Aëtius præ citato loco. Caterum, quod sedis
vitia omnia ob multas causas difficilem curationem
accipiunt, scriptum reliquit Galenus nono de com-
positione medicamentorum secundum loc. cap. 6.
quoniam & multo sensu particula hæc prædicta est,
& propterea per aciora & austeriora pharmaca fa-
cile irritatur. præterea & ipse excrementorum ali-
menti transitus per se mordax est & magis ubi eru-
perit bilis ipsa, & serosi quidā humores. Item quo-
niam neque statum tempus habent medicī ad im-
ponenda medicamenta, cum plerumque minimē
conuenienti tempore ægri ad excernendum concen-
tentur, quia etiam humiditas, & caliditas eiusdem
loci siccantibus, simulque frigefaciētibz opus ha-
bent, non parum confert ad hoc, ut ægrē curabilis
an affectio existat, siquidem mordent adstringen-
tia, locus verò subtili sensu præditus acrimoniam
ferre non potest: quod etiam confirmat sub eis-
dem verbis Aëtius cap. 1. lib. 14. Pro earum itaque
curatione vniuersa victus ratio ad humidum incli-
nans institui debet, & propterea, nec acribus cibis
vtendum, neque asperis, nec aluum comprimentibus,
nec aridum quidē quicquā satis vile est, ni-
si admodum paulum ut Celsus testatur. Quapro-
pter liquida, lauia, pingua, glutinosa meliora sunt,
ut ipse inquit. Vino etiam lini ut nihil prohibet,
talis autem victus nō propterea ita instituitur, quia
talem exigat affectus: nam contrarium potius de-
sideraret: sed quoniam acria, aspera, mordacia, ad-
stringentia, & sicca, aut mordaces succos generant,
ex quibus rimæ, & earum dolor magis irritantur
ex eorum cum alui excrementis transitu, aut eadem
saltim alui excrementa ob ea aridiora reddita suo
transitu curationem seu conglutinationem impe-
dirent: idcirco tali victu vtendum esse omnes præ-
cipiunt. Huius generis cibi sunt gallinarum, pullo-
rum, phasianorum, vitulina, hædine, & veruecinæ
carnes elixæ, & præcipue earum iura pinguiora: malū
item spinachia, borago, endiuia, cichorium, & tri-
fana, si in eisde iusculis decoquantur, conferunt, si-
militer

Quid sint
rimæ.
Quis affe-
ctus.
Pars affe-
cta.

Causæ ri-
marum.
Causarum
signa.

Cōdyloma
quid
sit.

Cōdyloma
quid sit.

Quibus
seriatim
mis.
Thymi
deductis
Ficus

Prognosis
sicca.

Curatio.

Vitæ ratio.

militer si ova recentia forbilia tribuantur, & reliqui cibi cum butyro, & adipe anseris, aut gallinae, aut lacte amygdalarum dulcium parati, & huius generis reliqui: nec minus quies praecipienda erit, eodem Celso auctore, somnus concilietur, animi perturbationes vitent, praecipue immodicas, alvus mollis seruetur, quae si non natura, arte saltem mollienda clysteribus lenibus, & pinguibus: interim per ea quae ore sumuntur lenientia, ut pruna, vel casta fistula in parua quantitate, paulo ante cibum sumpta. Quod vero ad reliquam medicamentorum rationem attinet, si rimae ob confluentes acres, ac mordaces succos fuerint ortae, eisdem prospiciendum est, deinde ad topica configiendum medicamenta. Quare eisdem preparatis, contemperatis, ac concoctis purgans medicamentum adhibeas, quod suapte natura tale sit, ut tales humores ducat citra acrimoniam, ac mordacitatem, quin id & quoniam cibis, ac etiam medicamentis semper vitare oportet, huius generis sunt mel aëreum, manna appellat, casta fistula, saccharum viol. syr. è pluribus infusionibus rosarum rubearum, vel viol. & interim syr. domini Augustini, aut diacat. cum dictorum aliquo permixtum. Si vero propter condylomata acciderint rimae, non minus inter initia eisdem purgantibus medicamentis utendum erit, & ubi eadem inflammata fuerint, vena prius secanda erit in cubito reuulsionis causa, & deinceps purgans medicamentum adhibendum, necnon si opus fuerit vena in talo etiam incidatur, pro deriuatione simulatque euacuatione sanguinis in inflammatione contenti. Caterum rimae ab huius inflammatione, quemadmodum & reliqua sedis vitia, ea medicamenta desident, quae citra morsum, ac aspritudinem adstringunt, ut liquet ex Galeni eodem nono de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 6. cuius generis est infra scriptum vnguentum, quod recipit cerussa, argenti spuma ana drac. j. ophol. lot. drac. j. sem. ros. drac. ij. succi plantaginis drac. j. vnc. ij. oui assati vitellum vnum, adipis anseris drach. ij. excipiantur omnia cum rosaceo, & vtare, vel rasuram linteolorum vrito, eiusque cinerem cum pari amylo tritum succo foliorum oleae admixto, illini-
 cap. 7. to, ut scriptum reliquit Galenus Asclepiadis auctoritate, eodem libro nono de compositione medicamentorum secundum locos: in vicem vero succi foliorum oleae, plantaginis succo uti poteris. id quoque Galenus lib. primo eiusdem Apollonii auct. tamquam optimum medicamentum approbavit infra scriptum ad ani rugas intumescences, rimasque, ac fissuras sedis, ad vicerumque dolentia, & omnia alia, quae ex fortiori pharmacorum usu exacerbata sunt: etenim egregie ea lenit etiam si serpendo exedicta, aut etiam cancerosa, aut quomodocumque maligna existunt: quo etiam medicamento cum saepius usus fuerit perpetuo ingentem ex eo vitilitatem provenire observari. Componitur autem ex olei rosacei, aut myrti, ut ipse inquit, haemina, hoc est vnc. ix. in pilam plumbeam infusa, & plumbeco pistillo tantum agitata, donec crassum, & subnigrum oleum reddatur, deinde seorsum spuma argenti libram vnam, & cerussa tantundem terito, oleoque admisceto, & vtare, prius tamen affecto loco eloto, & siccato, id quod fieri posset ex rosarum, gallarum, foliorum plantaginis, & radices symphyti decocto in tribus partibus aquae pluuiialis, & vna vini dulcis albi, & odoriferi, & ubi ingens, & ardens fuerit sedis dolor oui as-

sati vitellum, vino albo terito, & cerato rosaceo exceptum illinito ex eiusdem Galeni auctoritate eodem nono de compositione medicamentorum secundum locos. cap. 7. Aëtius vero cap. 3. eiusdem lib. 14. magnopere commendavit hoc medicamentum videlicet, Resinam pinus siccam cum rosaceo terito, donec strigmetosa fiat, & oui assati vitellum admisceto, ac illinito, ex cuius auctoritate hoc etiam uti poteris. Recipe pompholygis lota, & plumbi vsti loti an. drac. ij. cerussa, & spuma argenti an. drac. j. amyli, gummi tragacanthi an. drac. j. thuris & radices symphyti an. drac. ij. omnia probe terito, & ad ceratum rosaceum admisceto, ac affectum locum illinito, huic etiam medicamento quoadque adici poterit succi plantaginis, vel centaury minoris drac. j. seu halicacabi corticis radices dra. ij. interim aluminis scissi, & gallarum an. drac. j. Interim ex eo aliquod minuere licebit, prout magis, vel minus sicce aut humidae, dolorosae, vel citra dolorem magis, minusve profunde fuerint iam dictae sedis rimae. Cuncta namque praedicta medicamenta separatim, & coniunctim ab eodem Aëtio commendantur, quae item non minus condylomatis ubi recitae fuerint, conferunt, nam ut ipse dicebat in summa, perfusiones in condylomatis adstringentes esse oportet, & medicamenta ipsorum adstrictione quadam participare debent: cum vero nedum condylomata ipsa, sed & rimae diuturniores fiunt, induratur, ac callosae fiunt, & proinde praedictis medicamentis haudquaquam cedunt, chirurgiam desiderant, tam earundem rimarum labra callosa redita, quam iam dicta condylomata (nisi medicamento ex charta vsta Gal. rosaceo potissimum diluto prius dissiciantur) quem curationis modum hic scribere non intendimus, studiosi vero petant ex Aëtij praecitato loco, & Paul. cap. 80. libro. 6. quemadmodum & thymorum, tam si mansueti quam si maligni fuerint, ac ficuum, & verrucarum, seu a crochordonum curationem cap. 4. citati libri 14. apud Aët. reperient, non admodum a praedicta dissidentem.

Περὶ τῆ προπίπτουσας, ἢ τῆς προπίπτουσας ἀρχῆς.

Id est, De procidente ano, vel de procidentia ani.

CAP. LXXVIII.

PRÆTER iam dictum musculum anum adstringentem, ac claudentem, quem Graeci σφιγνλῆρα nuncupant, qui etiam eiusdem sedi transuersus circumiectus est, reliqui duo musculi à natura fabricati sunt obliqui, quorum munus existit sedem ipsam sursum attollere, vterque vnus, inserti eisdem sedi, ne in crebris, ac violentis alui deiectionibus aliisque conatibus propterea sedes ipsa extra prolaberetur: quibus aliquando affectis contingit quaedamque, ut & sedes foras procidat: quem affectum ani procidentiam Latini appellant, Celso auctore cap. 18. lib. 6. Graeci vero προπίπτουσαν ἀρχῆν, ἢ προπίπτουσαν ἀρχῆν, morbus siquidem in compositione existens, & proprie in situ, relicta enim sua propria sede anus foras prolabitur, adeo patens oculis, ut aliis non indigeat indicibus pro sui cognitione, nec minus & pars quae affecta est, quoniam anus ipse, licet quoadque per se, interim per consensum afficiatur, affectus primò musculi ipsi sursum attollentibus: at afficitur per se & primò anus cum inflammatione tentatur, & adeo magna, ut sua gravitate cogat musculos ipsi sursum attolentes cum contrahuntur, violenter distendi: quo fit, ut

Quid sit, & uicennae recidentia. Quis affectus praeter naturam. Pars affecta.

ipsi quoque muscoli saltem per consensum affecti
Causa. sint, si ob hanc causam anus extra prolaturus, cum
 præter voluntatem ipsi distendantur, ob inflam-
 mationis tumorem, ac grauitatem coacti. Interim
 nullo proprio affectu laboras anus procidit ob re-
 solutionem eorundem musculorum, aut ob quam-
 piam aliam causam illos imbecillos reddentem, ita
 ut sum retrahere ipsum iam foras prolapsum ne-
 queant: quo casu dicimus non propter aliud anum
 affectum esse, nisi quod à propria exciderit sede ob
 musculorum aliquod vitium. Cæterum, si ob in-
 flammationem anus procidat, haud ægrè dignosci
 poterit, per indicia eiusdè inflammationis, dolore
 inquam, tumorem, tensionem, ac ruborè. Verum
 ubi citra inflammationē à proprio loco exciderit a-
 nus ob resolutionem, seu stuporem, aut imbecilli-
 tatem musculorum provenire putandum est, quæ
 licet ex nonnullis causis externis & internis proue-
 nire possunt, quarū facilis est dignotio, magna ex
 parte ex eorundè musculorū frigida & humida in-
 temperie cum humorum præsentia, vel absque ea
 resolutionem, aut imbecillitatem patiuntur. Cæte-
 rum medici omnes cōueniunt, facilius curari posse
 hunc affectum, si sine inflammatione, quam si cum
 inflammatione fiat: item quod & iam si sine inflam-
 matione generetur, ut quamprimum introducat
 anus, ac curetur affectio conandū sit, ne temporis
 diuturnitate, structura mali inueterata iam ad vltio-
 nē peruenire oporteat: quanquā hanc partem inu-
 rere haud magnopere periculosum existat, cum ex-
 tremas hæc intestini recti pars principalis non sit,
 quinimò dum oritur, & secatur, nullum periculum
 inducit, ut inquit A. et. cap. 8. lib. 14. Cum primum
 itaq; anus procidit, considerari debet, purum ne id
 sit, quod prouolutum, an humore mucoso circun-
 datum ex Celsi auctoritate præcitato loco: præter-
 ea cum dixerimus, & cum inflammatione, & citra
 eam contingere, id quoque exactè dignoscendum
 erit: nam si anus nulla tentatur inflammatione, nec
 humore mucoso fuerit circumdatus, illico intro re-
 ponendus erit, ac in pristinum locum restituendus,
 id quod digitis leniter, ac sensim ipsum retrudēdo,
 fieri potest, prius tantē in aqua desidere homo de-
 bet, aut salsa, aut cum verbenis, vel malicorio inco-
 cta, decreto eiusdem Celsi, aut abluatur anus ex
 decocto foliorum myrti, malicorij rhu obsoniorū,
 rosarum, gallarum, balaustiorum, acaciæ, & hypo-
 cistidis in aqua, vel in vino adstringenti, ubi po-
 tissimum humidior fuerit anus, deinde aridus in-
 spargatur pulvis, ne repositus iterum excidat. Reci-
 pe foliorum rosarū, & myrtillorum vtriusque drach.
 iij. sem. ros. & cornu cerui vsti singulorum drach.
 j. rhu obsoniorum drach. j. thuris drach. j. s. fiat pulvis.
 Vbi verò multo mucoso humore anus circumdatus
 fuerit, tunc potissimum in aqua salsa æger desidere
 debet, aut vino austero abluendus, ac detergendus
 anus erit, in quo etiam si opus fuerit, gallæ, myrrhæ,
 cupressi pilulæ, ac pinus cortex incoquenda sunt,
 deinde infra scriptum aridum medicamentum in-
 spargere licebit, ex myrrhæ, thuris an. drach. ij. pilu-
 larum cupressi, aluminis, gallarum an. drach. j. s. ce-
 russæ, seminis rosarum, rhu obsoniorum an. drach. j.
 fiat pulvis, poteris & medicamento Galeni aucto-
 ritate Asclepiadis vti. Recipe gallæ omphacinæ,
 malicorij sicci, rhois coriarij singulorum drach. ij.
 plumbi vsti drach. iij. spumæ argenti drach. viij. trita
 inspergito, vel hoc alio eiusdem. Recipe corticis pi-

nus, spumæ argenti, manna singulorum drach. ij. pi-
 lularum cupressi aridarum drach. ij. plubaginis drach.
 ij. trita insperge, ubi prælaues vino acerbiori: idem
 & hoc etiam vtare ex eiusdem auctoritate. Recipe
 balaustiorum drach. j. malicorij drach. ij. seminis hypo-
 cysami drach. ij. cerussæ drach. viij. myrrhæ drach.
 ij. plumbi loti drach. ij. tritis vti tor, nec minus & re-
 liquis ibidem nono de compositione medicamen-
 torum secundum locos, descriptis medicamentis
 vti poteris. Iuuat item, ut inquit Paulus cap. 60. li-
 bri tertij, vrina ipsius ægri calens adhuc superfusa.
 Aëtius tanquam proprium ipsius medicamentum in
 commendat præcitato loco, infra scriptum, quod
 recipit fructus cricæ, gallarum, acaciæ, cerussæ, suc-
 ci hypocistidis, corticis pini, myrrhæ, thuris æqua-
 les partes, siccas insperge inquit, ubi vino austero
 sedem prius laueris, licet à Galeno eodem nono de
 compositione medicamentorum secundum locos,
 prius Asclepiadis auctoritate fuerit descriptū, & à
 Paulo similiter loco citato. Subinde verò cū taliter
 repositus fuerit anus, ne denuò excidat, probè de-
 ligandus erit, cruribus etiam inter se deuinctis, ut
 inquit Celsus. Id tamen animaduertere oportet,
 quod in pueris si contingat hic affectus, adstringen-
 tium vsum remittere oportet, & miora adhibere
 ex Aëtij decreto. Ad hæc quod ubi res virgeat, ita
 ut iam dictis medicamentis non cedat affectio, e-
 tiam lumbis adstringentia cataplasmata imponen-
 da sunt ex palmulis, malis cotoneis, & similibus e-
 iusdem Aëtij auctoritate, & sed etiam similia. At si
 propter inflammationem prolapsus anus intro re-
 poni non valeat, eadem prius curanda erit, venæ
 sectione prius adhibita in cubito, & si opus fuerit
 etiam in talo, præsertim ubi in generatione fuerit,
 ac plenitudo adsit. Sedi quoque potissimum appo-
 nenda inter initia, quæ leniter adstringunt, vt oleū
 rosaceum tepidum, deinde paulatim chamæmeli-
 num, aut anethinum adiciatur, aliæque apponantur
 medicamenta leuiter digerentia, ac etiam sedantia
 dolorem, in quem vsum confert, desidere ægrum in
 aqua calida, in qua maluæ, & althææ folia fuerint
 decocta, aut flores chamæmeli, sennæ græcum, ser-
 tula campana, semen lini, & anethum. At si noluerit
 eandem aquam descendere, spongia madefacta in
 prædicto decocto sæpius adhibeantur, & deinceps
 oleo chamæmelino, aut anethino, & rosaceo inun-
 gatur anus, atque aliquo prædictorum aridorum
 medicamentorum inspergatur. Eligantur autem,
 quæ minus calida, & minus adstringentia, ac miora
 fuerint, ligeturque vt supra, postquam intus re-
 positus fuerit, ne iterum procidat. Victus ratio ubi
 adsit inflammatio, qualis in reliquis inflammatio-
 nibus fuerit instituta, præcipiatur, si citra inflama-
 tionem contingat affectus hic, victus sit boni succi,
 & vinum detur aquosius, vt refert Aëtius præcitato
 loco.

Περὶ κολικῆς δὲ νόσου.
 Id est, De colico affectu, seu coli dolore.

CAP. LXXIX.



ST aliud vitij genus, quod in laxiori
 intestino (A Græcis colo nūcupato)
 gigni consuevit, à Paulo κολικὴ νόσος
 nominatū, à Latinis verò coli-
 cus affect. seu coli, vel colicus dolor,
 quanquā Celsus morbū intestini plenioris eū appel-
 let cap. 14. libri quarti. Vulgus autem medicorum
 colicam.

colicam. Vtunque tamen affectus hic ab ea, quæ afficitur parte denominationem assumpsit, intestino videlicet colo dicto, quod quidem in hac affectione oblatum est, cuius affectio dolor existit. Verum quoniam ipsius partis affecta, ac affectus signa adeo inter se confusa sunt, ac permixta, ut ne vnum ferè sit, quod vnum tantum significare possit altero excepto, sunt verò & eadem numerosa quidem, licet nec ex eisdem exacta haberi possit notitia, sed artificiosa potius quædam coniectura, ut patet ex Galeni 12. meth. meden. cap. 7. propterea eadem enarrabimus signa, sic confusè, ut ex eisdem, tum partis affecta, tum ipsius affectus notitia coniectura quadam, artificiosa tamè (ut diximus) haberi possit. Et quoniam diximus eiusdem laxioris intestini affectus dolorem esse, qui in quoniam præter naturam affectuum genere reponatur, dictum à nobis est cap. de dolore capitis. Propterea percipi potest primò affectus hic ex vehementissimo dolore in intimo ventre teretbro perforanti simili, aut per quem palus videatur in dolente loco infixus, ut secundo de locis affectis, cap. 5. patet, aliæque apparebunt symptomata, quæ ad affectum iam dictum intestini pertinent. Nam protinus inflatio quædam, & extensio, & flatus complures, & tormina, ac excrementa, si ab alio deiciuntur flatibus plena videbuntur. Ea autem discernere licebit, si super aquam narent, ac bubulo stercorei simulentur. Quinetiam, ut inquit Gal. eod. secundo de locis affe. cibi tum cupiditas, tum concoctio deterior euadit, & præsens, & præcedens, & quæ sequitur. Accidit etenim in hac affectione, & ventriculum male affici, ut qui parti primario affecta continenter adhæreat, Insuper & eosdem colicos nominatos affectus magna ex parte præcedit, & cruditas, & spiritus flatuosus, & vomitus, & nausea, quæ multo tempore inanis permanet, necnon in præcordiis mordacitas, fastidium, & indigentia plurima, ut ibidem ex eodem Galeno patet, & quoniam ab ea parte, qua dolor sentitur, nullum indicium sumi potest, qui magis colon, quam tenue intestinum dolor afficiat, licet minor sit, qui in tenuioribus consistit, propterea quo modo interstinguendi sunt sequenti cap. docebimus. Nunc autem eo quod hæc eadem doloris species euenire potest cum lapis in renibus, aut vteris fuerit impactus, quod quidem discerni non potest, nisi quis accidentia, quæ postea consequuntur, expectauerit eodem Galeno auctore secundo, & sexto de locis affectis, quo fit ut nedum vulgares, verumetiam & peritissimi medici decipi soleant, adeo difficilis est ab initio horum affectuum distinctio, quemadmodum & ipse Galenus deceptus fuit, qui credens se à calculo in altero vterum impacto dolore affici, injecto ei rutaceo oleo, simulque cum eo grauissimo cum dolore excreto humore vitreo (à Praxagora appellato) statimque dolore sedato, cognouit, neque lapidem fuisse causam, neque in vteris, aut renibus locum fuisse affectum, sed in intestinis potius, præcipue vero crassius interstinguendi potest indicium, & quomodo huiusmodi affectus interstinguendi potest describam. Quamvis ob huiusmodi ignorantiam circa doloris potissimum initium, quantum ad doloris mitigationem attinet, nullam laboranti noxam inducamus, si isdem medicamentis utamur. Siquidem vtriusque doloris præsidia omnia communia sunt, & quidem calorifica imprimis, siue ea extrinsecus adhibeantur, siue iniciantur.

Tempore verò subsequente oportet diuersa auxilia adhibere, ut eidem Galeno præcatis locis visum est. Symptomata itaque, quorum magna est in iis affectibus copia, diuenter intueri oportet. Nam in coli dolore sæpenumero dolor veluti circuire videtur, atque plurima loca occupare, qui modo in hac, modo in illa parte vehementior sit. Nephritici verò dolores eodem in loco stabiles iugiter infestant. Quod si dolor in loco fuerit renibus altiore, manifestum colicæ indicium portendit. Quanquam si vno loco, vbi scilicet renes ponuntur, stabilis constiterit, nihil ad notitiam potest positus ipse conferre, & proinde aliæ notæ considerandæ sunt, nam & nausea, & vomitus multo grauior, & magis assidui aderunt dolente colo, eorumque ita laborantes & biliosæ, & pituitosæ quædam, atque corrupta, quibus præsumpti quoque cibi aliquid admixtum videtur, ac retinent etiam magis excrementa, ut nec flatum quidem, neque autem excrementa possint, quæ omnia, ut Galenus inquit eodem sexto de locis affectis, cap. 1. colicis duntaxat euenire solent, sed alia quidem magis, alia verò minus. Insuper & colicorum cruciatus multo magis quam nephriticorum lenientibus mitigantur clysteribus, & si quid ab alio deiciatur (ut diximus) id flatuosum quodammodo est, & sæpenumero aquæ supernatare consuevit similem habes bubulo stercorei consistentiam, quemadmodum si lapis dolorem excitauerit, ipse interdum solus, interdum vnà cum cruore excernitur, maxime si vel asper, vel acutus fuerit. Ac si postea urinas inspexeris, fabulosa quædam subsidere inuenies, licet nephritici ab initio dilutas, purasque reddant urinas, quo fit, ut nephritici cum urina lapide exeunte à dolore liberentur. Verum si in colo affectus constiterit, neque lapis, neque cruor, neque arena, sed humor aliquis pituitosus, ac crassus subsidere videbitur, ut eidem Galeno visum est præcatis libro secundo de locis affectis, cap. 5. & licet coli dolores vehementes dextra magis parte eueniant, omnino negandum non erit in sinistra quoque parte eos gigni posse, cum colon ipsum à dextris partibus, quas Græci *ταγίνας* nuncupant, ad sinistras cincturæ modo deferatur; Paulo auctore, cap. 43. libri tertij, & adeo ab infernis sinistris partibus ad superiores dextra reuertitur, donec sæpenumero, & lienē, & icur attingat, atque etiam ventriculo continenter adhæreat, Galeno teste, cum secundo, tum sexto de locis affectis. Quanquam & id sapius propriis oculis inspeximus in anatomicis nostris administrationibus. Dolor hic colicus plures ob causas oboritur, vehementissimus quidē, licet interdum mitior fieri possit, quemadmodum is, qui in tenuibus consistit intestinis, cum videlicet à leuiori causa fit, veluti eodem secundo de locis affectis, liquet, præcipuas tamē quatuor habet internas causas, quemadmodum 12. meth. med. d. à Galeno scriptum est, & à Paulo cap. 43. libri tertij. Hæc namque sunt quæ potissimum vehementer calfacientes, vel refrigerantes, vel substantiam diuidētes coli dolore excitant, citraque dolor, neque in vna parte generari potest, ut liquet eodem 12. meth. med. c. 7. sunt autē hæc quatuor causæ, crassus, pituitosusque humor, cum intra coli membranas subsidet, spiritus crassus, ac flatulentus præter naturam in colo retentus, qui nec illine transmitti potest, vel inflammatio, cum iam dictum intestinum male habeat, aut acris mordaxque succus ipsum infestans, ac vehementer affligens. Per-

Ee

Quibus signis coli dolor, a renibus dolore ex calculo distinguatur.

Locis citatis.

Coli doloris causa.

2. de loc. aff. se. citato loco. 12. meth. c. 7 & 8.

Quæ pars afficitur in coli dolore.

cap. 6

Signa tum affectus, tum partis affectæ.

De partibus

De partibus

Loco citato.

utroque videtur flammam esse in ipso.

2. de loc. aff. se. cap. 5. 6. de loc. aff. se. cap. 1.

loci.

*Si à pituita
fiat coli do-
lor, signa.*

capitur autem, si humor crassus, ac pituitosus coli
dolorem excitat, quoniam ipse per totum abdomen
in alto ex cruciatur, ac intestinum ipsum pertundi,
seu perforari quasi sentiunt, tormina quoque affli-
gunt, ructus, nausea, vomitus cuiuslibet humoris,
sed pituitæ potissimum. Alius grauius impedita
nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Ster-
cus etiam quâdoque excrementum bouino simile vide-
tur, leue, & flatu plenum, ex Pauli testimonio præ-
citato loco, præcessitque continuus ciborum quàm
maximè frigidorum, crassique succi usus, satietas,
cruditas, ocium, & id generis similia (vt ipse inquit)
grauiusque dolorem hunc irritabunt frigidiore cib-
bi, ac potus assumpti, veluti ex contrariis sedari per-
cipies, aut saltem mitiorem fieri cognosces. At si ex

*Si ex spiri-
tu flatuoso
signa.*

flatuoso spiritu coli dolor fiat, tensionem magis ex-
periuntur laborantes, atque rugitum sentiunt, præ-
cessitque flatu generantium ciborum, ac potuum
usus, veluti sunt olera, & fructus, aqua frigida, & re-
liqua huiusmodi. Si verò ab inflammatione coli do-
lor exciteretur, interdum quendam feruorem ægri
sentient, aderitque febris non ignaua, vrinaque re-
tentio, simul & stercoreis, pulsus iuxta ventrem mo-
lestabit, similiter sitis, ardor, nausea, bilis potius vo-
mitiones, quæ nihil leuant malum, vrgebunt. At si

*Si ex infla-
matione
fiat, indi-
cia.*

acres, mordacesque succi coli moueant dolorem, si-
cut eos qui propter inflammationem eundem ex-
periuntur, sic etiam hos ardor, sitis, & vigilia tor-
quebunt, sed minùs ac illos, imò & febriculae ade-
runt, vrina reddetur acris, & biliosa deicient, ac
sæpè & alui deiectione maiorem excitabit cruciatum,
grauiusque irritant calidiores cibi, potusque as-
sumpti, ex eiusdem Pauli sententia, veluti è contra-
rio magnopere iuuantur ex contrario tum cibo,
tum potu. Id autem magnopere attendendum est
pro huius affectus dignotione. Nam agnitiones af-
fectuum, quæ ex coniecturalibus notis incipiunt, cum
eorum quæ profunt, obfuntque, cognitione sunt

*Loco cita-
to.
Prognosti-
ca.*

coniunctæ, Galeno auctore eodem duodecimo me-
thodi meden. Inter omnes verò colicas affectiones
ea, quæ ex inflammatione ortum ducit, est grauissi-
ma, Paulo teste, vt quæ in ileum transitionem mi-
netur. Vehementissimi quoque coli dolores peri-
culosiores sunt, quàm nutiores, vtpote qui à leuior-
ibus causis fiant, Galeno auctore secundo de locis
affectis, cap. 5. & vbi non omnino excrementa de-
tineantur, neque in vna ipsius coli parte fixus dolor
sentiat, adhuc minùs periculosus erit coli dolor.
Similiter & minùs minatur periculū, cum clysteri-
bus iniectionis aliquod excrementum deiciatur, aut
flatuosus quispiam spiritus, ex qua deiectione dolor
leuetur, quàm si nec quicquam per eos excernatur,
nec dolor leuetur. Alexander verò cap. primo libri
decimi, sic de colico affectu scriptū reliquit, Quod
grauis quidam morbus, & dolorificus sit, ac vehe-
mentes cruciatus inducit, quia intestinum colum
dictum densum est, crassum, & neruosum, ac nihil
quod in illum confluit, facile discuti possit, quem-
admodum in tenuioribus intestinis. Huius affectio-
nis curatio pro causarum diuersitate variari debet.

*Curatio si
ex crasso
ac luto suc-
cis excite-
tur, coli do-
lor.*

Nam si ex crassis lentisque succis exciteretur in vniuer-
sum (Aëtio auctore cap. trigesimo, libri noni) cun-
cta, quæ colicis exhibentur, attenuatoria diata esse
debent, & propterea (vt Paulus inquit) victus ra-
tio utilis erit calidior, ac ficior, talis ergo qualita-
tis aer eligatur. Et quanquam per initia morbi à ci-
bo abstinere melius sit, nam nisi finito tormento,

rectè, neque cibo, neque potio assumitur, vt Celsus
præcitato loco testatur, deinceps tamen illi offeren-
di sunt, qui boni succi, ac concocti faciles existunt,
ita vt satietas, cruditasque vitentur, vt Paulus refert,
cum quibus acra quoque assumi possunt, ac reliqua,
quæ vim habent extenuandi, & incidendi. Sit ita-
que panis, neque aridus, neque calidus, vt inquit
Aëtius, in clibano coctus, aut si is non addit, in fur-
no. Ex carnibus conueniunt imprimis volucrum,
secundo loco piscium quorundam, vt eorum qui in
petris degunt, tertio ordine terrestres carnes ha-
bent. In quorum genere omnia in consuetudine rep-
benda sunt, vt patet ex eodem Aëtio, consuetudine
rò eligenda. Quare ex volucrum genere gallina om-
nibus præstantiores sunt, deinde perdicæ, turtu-
res, columbæ iuuenes, ac phasiani, fugiendaque sunt
omnia, quæ in aquis degunt, tanquam graueolen-
tia, & quæ superfluitatibus multis abundant, hoedi-
næ quoque carnes, & vitulina ex quadrupedum ge-
neris exhiberi possunt, & pauca quædam ex syluestri-
bus feris, varietatis gratia. Inter olera, fœniculo, ap-
pio, asparago, ac oreofelino vt conuenit. Verum
ea non cruda, sed cum prædictarum carnum iure
decocta, in quo insuper decoqui poterit exigua
quâtitas sampsuchi, serpilli, saturciæ, thymi, pulegij,
aut origani, præsertim si febris absit, quo iure dun-
taxat à iam dicta causa colicos in primis saltem die-
bus nutrire consueui. Leguminum usus vitari de-
bet, pitifana excepta, quæ cum lapathio in ea colli-
quato cōmoda existit, vt Aëtius refert, aut vice la-
pathi, saturciæ, serpilli, vel hysopo, vel prædictorū
aliquo vtare. Prædictorum autem ciborum quanti-
tas moderata existat, ne venter in multis cibis con-
ficiendis fatigetur, carnes præterea, ac pisces elixati
potius, quàm tostati præbentur, ne ficitas excre-
menta apprehendat, iucunditatis etiam, & gratifi-
candi stomacho gratia, vna alba dulcis, præ aridita-
te corrugata cum pane præbeatur, Aëtio auctore,
ac ficus maturæ, cuticula auulsa, porra, item, allia,
ac capræ exhiberi poterunt, maxime iis, qui talibus
non offenduntur, vt Paulus inquit. Inter hæc verò
allium, si cum pane comedatur, summopere à Ga-
leno duodecimo methodi medendi, cap. 8. com-
mendatur, præsertim vbi dolor intestinorum citra
febrem fuerit, cum ipsum ex eorum ciborum gene-
re sit, qui & flatum discutiunt, & minime situm gene-
rant, & propterea ipsum agrestium theriacam ap-
pellabat. Vinum pro potu sit subastringens, album,
tenue, perlucidum, mediocri acate, tēperatura dilu-
tione, modicèq; bibatur, vt ex Aëtio liquet. Quod
si sitis à cibo accedat, aqua calida præbeatur, infen-
sissima enim ipsi frigida existit, vt ipse inquit, si-
miles quoque de reliquis entibus non naturalibus
(quorum consilio, vt breuitati indulgeamus, non
meminimus) ratio habenda erit, vt videlicet at-
tenuent, calfaciant, ac exsiccant. Quod verò ad medi-
camentorum rationem attinet, illud primū anim-
aduertendum, quod licet eis vtendum sit, quæ si-
mul incidere, & concoquere crassos humores va-
lent, id quod attenuantia medicamenta præstant, ea
tamen vehementer calida esse non debent, imò
quæ valenter exalfaciunt, vitare omnino oportet.
Quippe cum lenti omnes, crassique, & frigidi humo-
res ab iis quæ calfaciunt, nisi etiam valenter digerant,
liquantur, ac in flatum mutantur. Quo fit, vt à nul-
lo in huiusmodi succis tam sit metuendum, quàm
à calore, qui eos liquet, atque in flatum vertat, sed
digerere

*Medica-
torū ratio*

digerere non valeat, Galeno auctore, duodecimo metho. medendi, cap. 8. Horum quoque ipsorum ea maximè deligenda sunt, quæ magis flatu discutiunt, magisque siccant, similiter alienissima sunt, quæ torporem inducunt, cavendisque magnopere in huiusmodi affectibus eorum usus, ut patet à Galeno libidè, cum neque huiusmodi succos comitetur (modo soli sint) dolor vehemens. At si ex accidenti aliquo coniunctus his sit halitus spiritus, gravissimis omnino doloribus, qui ita se habent, cruciantur, sed nec propterea quæ torporem inducunt, triuenda sunt. Nam licet ad tempus quidem, qui tales medicamen biberunt, prorsus indolentes reddantur, affectus tamen is omnino fit maior. Nam & intestinorum tunica medicamentorum frigiditate densiores, minisque flatui transmittendo habiles redduntur, & humor ipse tum crassior, tum ad motum ineptior euadit. Itaque & spatio longiori ad agri curationem, & medico, qui egregie in arte sit exercitatus, est opus, ut idemmet fatetur Galenus eodem loco. Nisi enim certa ratione postmodum curationem aggrediat, verèdum erit, ne succi secundo in flatuosum spiritum versi, eundem dolorem renouent, unde rursus stupefacientium aliquid medicamentorum exhiberi sit opus, eadem scilicet necessitate urgente, ac pari modo tertio, & quarto, & sæpe deinceps, quoad homo insanabilis effectus in malum totius corporis habitum perueniat, & post longa tandem tædia pereat. Et propterea qui generosi animi, fortesque sunt, si medicocri vtuntur victu, tutius longiori in tempore percurantur, quam qui violenter calefacientibus, aut etiam torporem inducentibus medicamentis vtuntur, ex eiusdem Galeni sententia. Quanquam vbi vehementissimus fuerit dolor, qui aliis medicamentis mitior fieri non potuerit, iis quæ mediocriter leniunt, ac dolorem mitigant, non autem quæ valenter stuporem inducunt, uti licebit. Nam ea omnino vitari oportet, ex Pauli testimonio, id quod nec etiam negauit Galenus eodem duodecimo methodi medendi, cap. 8. vbi præsertim febris quoque adfit. Verum quæ & qualia esse debent hæc medicamenta, infra docebimus. In principio itaque statim congrui iniciantur clysteres ex communi oleo, etenim Paulo auctore, sæpe vi-tream simul cum facibus pituitam expulit, ac dolorem subito finivit talis clyster, aut ex eodem oleo, in quo prius fuerit decocta ruta, seu semen aliquod, quod flatum dissipet, ex Galeni sententia secundo de locis affectis, cap. 5. & duodecimo method. medendi, cap. 8. & Paulo præcitato loco, liquato prius in prædicto oleo adipe anserino, in cuius penuria gallinaceo vtendum. Curandumque imprimis est, ut expers sit salis, nec admodum vetus, ut patet eodem duodecimo methodi medendi, cap. 8. Nec minus & clysteres parari possunt ex oleo chamæmeli, vel anethino, cum eodem adipe anserino, seu gallinaceo, aut etiam recenti butyro, quod si neque ex iis dolores remittuntur, conducunt mirifice in hunc modum clysteres parari, Recipe foliorum maluarum, althææ, mercurialis, & betæ, ana manip. vñi, anethi, rutæ, foliorum chamæmeli, fœnugræci, & seminis lini, singulorum manipulum s. anisi, fœniculi, & cumini, ana drach. ij. fiat decoctum in aqua fontana, cuius per colum transfusi, accipe lib. j. vel lib. j. s. mellis rosæci vñc. ij. olei chamæmeli, anethini, vel rutæci vñc. iij. salis communis drach. iij. diacath. drach. viij. aut confectionis de dactylis drach. iij. vel

hieræ picæ simplicis vñc. s. & fiat clyster. interim hæc vbi non suffecerint benedictæ, vel hieræ picæ compositæ drach. iij. adicere poteris. Nec minus etiam cõfert, si vñc. i. adipis anserini, vel gallinacei, aut recentis butyri addas. Quod si ob doloris vehementiam etiam clysteres nō retinuerint, glans aluo demittenda, ex Pauli decreto. Componatur autem ex melle probè decocto, cumino, semine fœniculi, ruta, hiera, sale gemma, & agarico, hunc in modum, Mellis cocti excipe ad sufficientiam, pulueris hieræ ex septem rebus, agarici, & salis gemmæ, singulorum drach. i. foliorum rutæ drach. 2. fœniculi, & cumini ana scrup. 1. formentur glandes longiusculæ digitorum ferè sex, eiusdem Pauli testimonio. Hoc etiam tempore fomentum siccum ex milio adhibendum est, Galeno teste eodem duodecimo methodi medendi. Vel ex milio, fursure, chamæmeli floribus, meliloto, fœnugræco, lini semine, & anetho sacculi componantur, & in calfactis lateribus, vinoque albo irroratis prius calsiant, & applicentur. Potus itè mirifice cõducunt, si ita fiant, Recipe foliorum, & radicem althææ, & maluarum ana p. j. florum chamæmeli, fœnugræci, seminis lini, anethi, meliloti, singulorum manip. s. anisi, cumini, & seminis fœniculi ana drach. iij. bulliant in hydrelæo, & cum spongiis dolentibus partibus applicentur. Insper & infusus valde vtilis sunt ex decocto fœnugræci, althææ, & chamæmeli, artemisiæ, anethi, lauri, & similitum (ut inquit Paulus.) Item in oleum calidum, aut hydrelæon descendere alienum non est, ut ipse refert. A balneo verò bibant absynthij, & cumini æqua proportionē decoctum, quo etiam tempore vinum absynthites conuenientissimum ad colicos pharmacum existit, si prælibatione, à balneo, seu exercitio opus habeant, estque eis nō sitientibus valde commodum, si cyathi temperati mensura ante aridorum ciborum comestionem accipiantur, ut inquit Aëtius. Conferunt non minus quoque cataplasmata, & illitiones, ut Recipe foliorum, & radicem maluarum, & althææ, ana manipulum vñm, farinæ seminis lini, fœnugræci, & milij cuiuslibet vñc. s. anisi, seminis fœniculi, & cumini, singulorum drach. 2. misceantur, & cum oleo anethino, chamæmelino, aut rutaceo, & oxymelte fiat cataplasma. Illitiones ex eisdem fiant oleis adiecto butyro recenti, aut adipe anserino, seu gallinaceo, & interim fœnugræci, aut seminis lini, seu althææ cremore. Vomitus præterea, si quis facile vomat, ante cenam præ omnibus auxiliatur, Aëtio teste, & si dolor non conqueuerit, propinandū erit ipsis medicamentū diatrionpipereon, vel theriaca, ut inquit Paulus. Et vbi pituita fuerit extenuata (eodem Paulo auctore) purgante medicamento vtendum, hiera præsertim. Illud idem confirmat Aëtius, dum dixit. Post dies verò septem purgatio ex hiera Archigenis suscipiatur. Poteris autem purgans medicamentum hunc in modum componere. Recipe pulpæ calsiæ recentē tractæ vñc. i. s. diacath. drach. 7. pulueris hieræ simplicis drach. i. s. fiat bolus. Vel sic, Recipe confectionis de dactylis drach. 4. pulueris hieræ simplicis drach. 1. pulpæ calsiæ recetæ extractæ vñc. i. vel vñc. i. s. fiat bolus. Aut vñc. iij. excipe syrup. de tribus infusionibus rosarum (quas damascenas vocant) & drach. 4. diaphinicon, aut drach. viij. diacath. & cum aqua boraginis, & absynthij fiat potio. Verum vbi dolor adhuc vehemens fuerit, neque ex iam dictis remissus sit, iterum ij (quos supra monuimus clysteres ex oleo,

Glandes.

Fomenta.
Loco citato.

Sacculi.

Infusus.

Balneum.

Aëtii lib.
9. cap. 31
Cataplasma.

Illitiones.

Vomitus.
Lib. 9. cap.
30Aëtii lib.
9. cap. 31
Medicamentum
in purgans.Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31Aëtii lib.
9. cap. 31

& adipe confectos) iniiciendi sunt adiecta etiam
 num castorei, & papaueris succi vtriusque fabæ non
 amplius magnitudine, ex Galeni præcepto eodem
 duodecimo meth. medendi. Tu autem minori quan-
 titate tutius uti poteris, utpote ciceris magnitudine.
 Commendat etenim & eodem loco Galenus me-
 dicamentum, quod ex castoreo, & papaueris succo
 conficitur, ad oculorum, dentium, ac etiam aurium
 dolores, si idem auribus instilletur, & Paulus ex ca-
 storeo pastillum approbat in coli dolore ex crasis,
 ac frigidis, & lentis succis orto, ubi is vehemens fue-
 rit, nedum per inferiores partes, ac aluum inditum,
 sed etiam potum. In quem etiam vsum in præscriptis
 clysteribus, papaueris capita, folia item solani, aut
 etiam hyoscyami simul cum aliis iam dictis decoqui
 possent, perpetuo tamen (ut diximus) ea quæ valen-
 ter stuporem inducunt cauentes, propter superius
 assignatas causas. At si flatulentus spiritus doloris
 auctor fuerit, eisdem quoque medicamentis vtend-
 um erit. Nanque similis est eorum omnium cura-
 tio, tam scilicet si ex crasis, glutinosisve, aut frigi-
 dis succis, quam si ex flatuoso spiritu dolores exci-
 tentur, ut patet eodem duodecimo methodi me-
 dendi, cap. 8. Poteris tamen tam clysteribus, quam
 reliquis medicamentis extrinsecus adhibitis ea quæ
 magis flatum discutit, permiscere, ac eorum quan-
 titatem augere, ut cuminum, anisum, semen fenicu-
 li, pulegiū, origanum, calamintham, fursur, milium,
 careum, daucum, anethum, & similia. Insuper drach-
 j. dianisi, aut diacumini, seu diacalaminthæ cum paucis
 vino albo præbere poteris. Propriam tamen cura-
 tionem quandam fortitus est is dolor, qui spiritum
 flatuosum comitatur ex cucurbita scilicet cum flam-
 ma copiosa subinde admotâ, quemadmodum à Ga-
 leno eodem duodecimo methodi medendi, decre-
 tum est. Videbiturque tibi (ut ipse inquit) prædiciū
 hoc in trauismodi affectibus incatamentum cuiuspiam
 simile quid efficere, siue intestinis, siue in quavis
 corporis particula fuerit excitatus, illico enim cu-
 curbita admotâ, qui spiritu flatuoso cruciantur, tum
 à dolore liberi, tum omnino sani redduntur. Quos
 verò non spiritus, modo flatuosus, sed etiam humor
 quispiam, unde is oritur, malè habet, iis illico ad tem-
 pus dolor sedatur, redit tamen vel insequente nocte,
 vel postridie, vel etiâ tertia die similis dolor, ac po-
 tissimum ubi in victu aliquid deliquerint, aut im-
 portunius particulas excalescerint. Tibi verò hoc
 quoque maximè indicium affectus erit, ac curatio-
 nem pro ratione prosequeris, nec impensè parti-
 culas excalescens, extenuatoria curationis ratio-
 ne vtens, ut dictum est, dolore tamen prius per eu-
 curbitalam sedato, cum per eam ventosus digeratur
 spiritus. Vbi autem inflammatio intestinum
 exercet, victu tenui vtendum erit, ac febricitan-
 tium proprio, quousque inflammatio discutiat
 (ut inquit Paulus.) Speciatim verò eo victu uti po-
 terunt ægri, quem cap. de ventriculi inflammatione,
 instituiimus, ac protinus ubi vires ægri valen-
 tes fuerint, sanguis mittendus erit, Galeno teste eo-
 dem libro duodecimo methodi medendi, venâque
 in cubito aperienda, ex eiusdem Pauli decreto, præ-
 ferim interna. Quod si vrina etiam propter in-
 flammationis magnitudinem retineatur, ex mal-
 leolo quoque sanguis detrahi debet, eodè auctore.
 Prædicta item admoeri possunt præsidia, præter
 quam quæ acria sunt, & valenter purgant, magisque
 lenientibus clysteribus vtendum, cataplasmatibus,

ac irrigationibus, ubi dolor per sanguinis misio-
 nem sedatus non fuerit, sed adhuc persistet, indicat
 enim profecto in ægotante particula impactum
 esse quod contristat, nec minus patet, & quod cura-
 tio ipsa per digerentia medicamenta sit molienda,
 ut liquet præcitato libro duodecimo meth. meden-
 di, cap. 8. Componantur itaque lenientes clysteres.
 Recipe foliorum maluarum, althææ, & violarum,
 singulorum manipulum j. hordei p. j. s. fiat decoctū,
 cui adde olei violacei, vel amygdalarum dulcium,
 seu rosacei vnc. iij. sacchari rubei, aut violacei mel-
 lis vnc. ij. pulpæ casia nouiter extractæ vnc. j. adicis
 recetis anseris, vel gallinæ drac. iij. fiat clyster. Pro-
 cedente, verò tempore, scenugræcum, chamæme-
 lum, semē lini, aut anethum prædicto decocto ad-
 dices, militer in vicem olei violacei, vel amygdala-
 rum dulcium, seu rosacei, chamæmelino, vel anethi-
 no vtare. Non minus etiam confert circa initia, si a-
 sininum lac cum casia fistula, & oleo amygdalarum
 dulcium per sedem infundatur. Quantum verò ad
 cataplasmata, irrigationes, sacculos, fotus, infesius,
 balnea, ac reliqua topica medicamenta attinet, præ-
 dictis uti poteris, ea quæ minus acria, & quæ ma-
 gis lenientia sunt eligens. Nec minus in oleum de-
 scendere conuenit, ut Paulo visum, ac cucurbitulas
 ipsis defigere. Sin mordens tumor est, qui affli-
 git, aduersissima huic sunt quæ extenuant, & calfa-
 ciunt, ex Galeni sententia eodem duodecimo me-
 thodi meden. cap. 7. & 8. Quapropter abstinendum
 (ut inquit Paulus) ab acerbis omnibus cum cibis,
 tum medicamentis, fortique, & irrigationibus, item
 cataplasmatibus, & vini potione potissimum vete-
 ris. Vniuersus autem in fumma victus sit humidior,
 ac frigidior, ut idè Paulus refert. Cibi verò (ex Ga-
 leni decreto) exhibendi iis sunt, qui etiam boni sint
 succi, nec facile corrumpantur (præsertim potissimum)
 adiectis mali punici grani. Sed quoniam (ut idem
 Galenus testatur) huius generis affectus postulat,
 si modo curandus est, ut ea quæ contristant, va-
 cuentur, propterea statim per sedem iniicere con-
 uenit, quod eluere huiusmodi humorem sit aptum,
 id autem deterisum omnino esse oportet, & cum
 talium pleraque mordicent, comodissime ex iis, a-
 liquod deligitur, cui morsus absit. Eius generis ma-
 xime est præsertim cremor, ut liquet præcitato libro
 duodecimo methodi medendi, aut idè cremor præ-
 sertim cum rosaceo, seu succo seminis lini infundatur,
 ex Pauli testimonio, vel decoctum maluarum, al-
 thææ, scenugræci, seminis lini, chamæmeli, & vio-
 larum, cum recenti adipe anseris, vel gallinæ, ac e-
 tiam rosaceo. Poteris item vitellos qui numero 2. &
 vnc. i. pulpæ casia nouiter tractæ adicere, quibus
 omnibus simul commixtis fiat clyster. Quod si neq;
 hæc sufficiant, ut mordens humor vacuetur, pro-
 pterea quod in ipsis intestini tunicis imbibitus sit,
 purgans medicamentum exhibendum erit. In quem
 vsum aptissimum medicamentum est amarum, quod
 ex aloë componitur, vulgò picram appellat, ex Ga-
 leni decreto, cum primo de locis affectis, cap. 4.
 tum duodecimo methodi medendi, cap. 7. quem se-
 ctati sunt Paulus & Aëtius, eiusq; aut semel tantum
 exhibere, ut hominem iussit purgare possit, viribus
 consentietibus, aut in quibusdam intervallis paula-
 tim, & moderate purgatione faciens. Poteris autem
 ipsam hieram cum rorido melle, aut casia fistula,
 saccharo violaceo, seu syrup. ex pluribus infusio-
 nibus violarum, vel rosarum permiscere: aut in eun-
 dem

dē vsum vnc. ij. mellis toridi, seu vnc. j. s. pulpæ castiæ fistulæ cum vnc. s. diacath. aut drachm. vij. eiusdem cum aqua hordei præbeas. Si autem omnino fieri nequeat, vt ea quæ contristant, vacuentur, affectus hic per epicrasin, hoc est contemperamentum, sanandus est, eodem Galeno auctore. Quapropter cum cibus, tum medicamentis, qui temperare infestantem humorem possunt, vt oportet, vt priusana, intubo, eichorio, endiuia, lactuca, syrupo etiā violaceo, rosaceo, seu ex succo cichorij, vel endiuæ paratis, similiter & balneis ex dulci aqua vtendum, vt Paulus refert. Si verò id quoque fieri non possit, ea quæ torporem inferunt medicamenta, exhibeantur, vt liquet apud eundem Galenum eodem 12. methodi meden. cap. 8. quæ minus hos affectus, quam alios lædūt, licet sint & reliquorum cōmunia. Nam simul omnino refrigerant, & siccant talia medicamenta. Quæ ratione, non solum, vt sensui torporem inducētia salutaria sunt, sed etiam vt humorum tenuitatem cogentia, atque crassantia, præterea vehementem calorem refrigerantia, in quæ vsum drach. i. philonij perfici, aut romanij, aut scrup. ij. exhibere poteris, aut tantundē eius compositionis, quam trypheram magnam, seu eius, quam requiem magnam nuncupant, tutius tamen erit, ea prius cum iis quæ per sedem infunduntur, permiscere, & vbi non suffecerint, eadem deuoranda permittas. Reliquum est, vt ea conscribamus, quæ indifferenter colicis exhiberi possunt, quorum quædam à tota substantia cōducunt, seu lupinum stercus ex vino albo, & tenuis consilientia epotum. Interim vero ex aqua, idque non tantum in ipsis paroxysmis, sed etiam in interualis, potissimum si phlegmone vacent agri. Horū quosdam ego vidi, inquit Galenus decimo de simplic. medicament. facultatib. non amplius inuadi, & qui erant inuasi, non amplius id grauiter passos, sed nec post paucum temporis. Accipiendum est etiam albidius potius stercus, quale vbi ossa comederint, solent excernere, & quod in terram non delabatur, sed in spinis, fruticibus, vepribus, herbisque processibus. Ea enim est luporum natura, quæ canum, vt suspensio altero posteriorum crurum, & meient, & cacent in emineti quopiam ex terra. Inuenitur etiā in illorum stercore nonnihil osium deuorati animalis, quod item ipsum contundens, ac conterens cum iam dicto stercore bibendum præbeto, vt diximus. Poterit & idē stercus, ex eiusdem Galeni sententia, instar amuleti ægroti partibus vacuis, quas Græci λαρύνας vocant, alligari vinculo confecto ex lana ouis, quæ à lupo esset laniata. Quod si talis non adesset lana, ex pelle ceruina lorum cōfici possit, quo stercus contineatur, ac prædicta loca præcingantur, modum autem illigationis reperies apud Galenum præcitato loco. Aëtius galeritam auem, quæ in capite veluti cristam, siue galeam ex pennis sponte naturæ enatam habet, & circa vias reperitur, hyeme præsertim, commendat, si in simplici iure decocta, assidue quæ vnā cum iure accipiat. Verum ante eum secundo de simplic. medic. facultat. à Galeno eodem modo, si sumatur, cōmendata est. Hanc etiam auem, quæ Alauda dicitur, siue ea assata in cibo sumatur, siue cum pulmis cōbusta, & in cinerem redacta, ac diligētissimè trita, si ex ea, terna cochlearia ex aqua calida potui per triduum exhibeantur, summo perē cōmendat Marcellus suo libro de medicamētis, cap. 29. Caltorum item assidue potatum totius affectionis apparatus, demolitur, omnibuf-

que medicamentis præstare repertum est, vt Aëtius inquit. Datur eius drach. i. in tribus cyathis optima aquæ mullæ. Thymi cacumina insuper in aqua ad tertias decoquito, & ad pereolatam decoctum mel despumatum adiiicito, bibendumque præbeto, ex eiusdem testimonio. Adhuc mentham viridem aliquandiu decoquito, ex eodem auctore decoctumque bibendum ad dies tres exhibeto, & nunquam dolore afficietur. Marrubium quoque in vino mulso decoctum bibendum præbeto, à quo nedum æger (vt ipse inquit) liberabitur, sed neque vnquam postea incidet in affectionem. Plinius Secundus libro 2. de re medica, cap. 30. tantum expertum commendat cochleas tres in olla noua clausas, & circumdatas, ac in furno combustas, si earum puluerem in vino, aut vbi volueris dabis. Alexander cap. i. libro. o. id scriptum reliquit. Iecur caprillum adustum laugato, datoque ex vino potui, multum ipsis auxiliatur. Item vmbilicum infantis nuper nati præcisi paululum in argentum, aut aurum incluito, cum modico sale, qui gestat hoc alligatum, dolore prorsus non corripitur.

Περί εἰλεῶν, ἢ χόρδ᾽ α-φῶς. Id est, De ileo seu voluulo.

CAP. LXXX.

SÆPE verò, & in tenuiore intestino (similis quodammodo ei, qui in pleniori) affectus quidam oritur, quem Græci εἰλεὼν, interim χόρδ᾽ α-φῶς appellant, Latini verò voluulum, seu ileum, Celsus tenuioris intestini morbum, Barbaram sectantes medicinam iliacam passionem nominant à symptomate (vt inquit Galenus secundo methodi meden. cap. 2.) nomen sumēs: nam εἰλεὼν, verbum Græcum, Latine verto, seu voluo significat; inde εἰλεὼς, quasi versus, seu circumuolutus, quoniam ægris dolor circumuolutus accedat, Aëtio teste cap. 28. libri noni. Nec minus si χόρδ᾽ α-φῶς appelletur, & nomen à symptomate sumptit. Nam χόρδ᾽ α-φῶς, verbum Græcum, idem Latine significat, quod in chordo, implico, seu irretio. Quare cum in hoc affectu tumor emineat in tenuium intestinorum parte, vt videatur intestinum ad chordæ similitudinem conuolutum (Galeno auctore 6. de locis affectis cap. i.) propterea non ab re ab hoc symptomate, si χόρδ᾽ α-φῶς appelletur, nomen sumptit. Quod verò morbus sit peracutus, qui grauissimos moueat dolores, liquet à Paulo c. 44. lib. tertij, seu quod affectio sit intestinorum letale dolorem inferēs, patet apud Aëtium præcitato loco. At quod intestina in eo afficiantur, & inter ea, quæ sublimia sunt, atque gracilia, non autem crassa, liquet apud Galenum commento aphor. 44. libri sexti, ac sexto de locis affectis, cap. i. cum dixit, Atque interdum alij quoque dolores, & quidem vehementissimi in sublimioribus intestinorum partibus eueniunt, grauiter vomitionibus cruciantes, adeo vt nonnulli sub fine stercus quoque euomere conspiciantur. A quo affectu vix vnquam aliquis potuit sanus euadere. Hunc ileon quidam, nonnulli chordapsum appellant. Ex vehementissimo itaque dolore in sublimioribus intestinorum partibus eueniente, ac ex tumore apparente in eisdem partibus, ad similitudinem chordæ conuolutæ, ac vomitionibus grauiter molestantibus, eo quia ventriculo intestinū hoc vicinum est, pars hæc intestinorū, quod affecta sit, nobis innoscere po-

Ee 3

Aet. loco citato.

Celsus lib. 4. cap. 13. Ileos, seu voluulum, unde nomen sumptit.

Pars affecta.

Signa.

Dubium.

test. Et si quispiam oppugnabit dolorem hunc, relatione ad eum qui in colo excitatur, vehementissimum esse non posse, id quod manifestavit Galenus cum 2. de locis affectis, cap. 5. ubi dixit, Igitur ex huiusmodi doloribus ij, qui vehementissimi sunt, haud ab re in crasis intestinis consistere putantur, qui verò mitiores sunt, ex duobus, alterum necessarium est, aut quod in his ipsis sunt, sed à leuiori causa, aut quod in tenuibus consistant intestinis, tum eodem sexto de locis affectis, cap. 1. dum asseruit, ergo probabile est frigidum, eundemque crassum, aut viscosum humorem seu flatuosum spiritum in corpore crasso, de quoque genitum, sed egredi nequeuntem dolorem excitare, vehementem quidem geminam ob causam, intemperantiam scilicet, & corporum, quibus continetur, tensionem, longum verò, quia difficulter vacuatur, nam corpora ambientia, tum ob crassitudinem, tum ob spissitudinem ipsum arcere possunt, tenuium autem intestinorum tunica rara, tenuique essentia constant, ut non ita diu huiusmodi causas continere possint, neque propterea etiam tendi, & proinde dolor neque tam vehemens, neque tam perseverans esse potest, sicuti in colo accidit, ex eiusdem Galeni sententia: non propterea tamen in se ipso consideratus dolor, qui in voluulo excitatur, vehementissimus non est, licet non adeò, ut is, qui eum cruciat. Non igitur sibi ipsi contradicit Galenus, neque eius sententia in præcatis locis inter se pugnant, sed ambæ veræ sunt. Symptomataque est voluulus in genere noxæ functionum naturalium ipsorum intestinorum, excretis videlicet, & propriè ipsius ablata, ut libro de differ. cap. 4. & 3. de causis symptomatum, cap. 2. patet. Nāque in eo (ut idem Galenus testatur comment. apho. 44. 6. & 10. septimi libri) nihil exit inferius, ne quidem si quispiam acerrimo utatur clystere, idque propriū est, atque inseparabile huius passionis signum, seu symptoma, & commen. aphorif. 22. 3. libri, dicebat, quod voluuli seu ilei, sunt cibi superfluitatum, quæ per aluum inferiorem excernuntur, retentiones, quæ magna ex parte fiunt ex alicuius intestinorū partis inflammatione. Vomitus autem non semper adest, & si quando exitialis fuerit voluulus, stercoris quoque vomitus aduenit, dolores aderunt ad præcordia, potū continere non possunt, & tormina cum doloribus in ventre: quemadmodum mulieri, quæ apud Tifamenum decumbebat, voluuloque detinebatur, euenit, Hippocrat. teste 3. de morbis vulgar. cum. 2. sex. 6.

Resolutio.

Quis affectus mater naturā sit ilei, seu voluulus. Signa.

3. de morbis vulgar. cum. 2. sex. 6.

non potens se hac via exonerare propter factam in partibus inferioribus obstructionem, cogitur contra naturam violenter mouere, & ad loca superiora materiam noxam extrudere, quoniam motus hic confringendi, complectendique infernè incipit. Ad quem etiam modum & acer succus, & crepitus quoque descendere prohibitus, interim ex tam violenta intestinorum constrictione ad ventrem præter naturam reuertitur, deinde ad exitum properat, quemadmodum apud Galenum constat comment. præcatis aphorif. 10. septimi libri, 3. de natu. facult. & tertio de causis symptomatum. Quod verò interclusa via exitus iam dictorum excrementorum, hæc affectio fiat, omnium ferè medicorum consensu testatur Galenus præcatis comment. aphorif. 44. 6. libri. Et quoniam meatus, seu viæ possunt intercludi, ac aboleri propter coalitum, angustiam, obstructionem, compressionem, ac subsidentiam, propterea quæcunque causæ tales possunt in cavitatibus, seu meatibus intestinorum affectus excitare, possunt etiam, & ileum, seu voluulum gignere. Cunctæ autem reducuntur vel ad intemperiem, vel propter collectiones aliquas non naturales ipsius intestinis tenuiores, vel propter ipsa, quæ in eo continentur excrementa, eodem Galeno teste 3. de causis symptomatum. Quapropter licet idem Galenus in com. præcatis apho. inflammationem, scyrrhum, vel abscessum, ac obstructionem stercoris sicci, & duri in aliquod iam dicti intestini volumen impacti tantam posse facere loci angustiationem, ut nihil possit ad inferiora transmitti, & per consequens ileum oriri fateatur, de reliquis verò causis, ut puta de humoribus crasis, atque tenacibus dubitare videatur: tamen veniam præbet cuique si libeat, hanc inter causas ilei ponere, & etiam si quid aliud dicatur præter hoc: non enim negauit Galenus ex aliis causis, quàm ex inflammatione, vel obstructione aridi stercoris posse voluulum excitari, sed frequentius, ac sæpenumero, ac magis probabiliter, & à pluribus confirmatum esse quod à prædictis excitetur causis, ita ut 6. de locis affectis, cap. 1. sic scriptum reliquerit. Itaque nō ab re visum est medicis antiquioribus, vel ab inflammatione, vel obstructione aridi stercoris huiusmodi tenuium intestinorum affectus oriri, de voluulo, seu chorda pso verba faciens. Concludimus itaque cum Galeno, quod quauis prædictæ duæ causæ præcipuæ sint ipsius voluuli, inflammatio inquam, & obstructio sicci stercoris: tamen quæcunque alia valet adeò intercludere viam exitus, aut tantam facere loci angustiationem, ut nihil possit ad inferiora transmitti, sufficiens quoque est voluulum ipsum excitare, siue dicta interclusio sit per coalitum, siue per angustiam, siue per obstructionem, seu compressionem, aut subsidentiam. Et propterea ab Aëtio præcatis loco nonnullæ narrantur voluuli causæ, ut cōtinua ciborum corruptio, præsertim si multi, aut varij accipiantur, & non assueti, maximèque ex pinguibus carnibus, similiter & ex plagis quibusdam, frigore vehementi, & acruata frigida potione, maximè si ab exudantibus accipiantur, affectus hic excitari potest. Item contingit iis quibus intestinum in scrotum vnā cum stercore delapsum est, indeque violenter retrusum, ex eoque inflammatum existit. Fit etiam ob veneni potionē, & ob induratum stercus circa tenuia intestina impactum. Singulæ autem prædictæ causæ facillè dignosci poterunt. Externæ quidem

quidem, ex aegroti, seu adstantium loquela. Internæ autem, ex teipso propriis signis, ac eorum, quæ præcesserunt perperione, & reliquis, quæ subsequuntur. Sic enim inflammationem ab obstructione aridi stercoris propriè fecernes, aut si propter eius delapsum in scrotum ortus sit voluulus, vel etiam quispian alius redundans, succus potissimum frigidus, crassus, & lentus, licet non admodum probabile sit, ut diximus ex Galeni sententia, ex prædictis succis adeo posse fieri prædicti intestini angustationem, ut nihil valeat ad inferiora transmitti. Quod verò ab ileo vomitus, singultus, desipientia, vel convulsio malum sit, decretum reliquit Hippocrates præcitate aphorismo 10. septimi libri. Nam vomitus (ut inquit Galenus eodem loco) non semper in ileis adest, sed quando exitiales sunt, & si vehementius distorqueantur, (ut ipse ait) stercus eis superiora petit, atque singultuunt. Quidam verò desipiunt, & conuelliuntur compatiante nervorum principio stomachi passioni, ut ipse refert. Si vomitus autem stercoris contingat, exitialis erit affectus, à quo vix unquā quis potuit sanus euadere, ut eodè comment. aphorism. 44. & 6. de locis affectis. Quod verò hic voluulus acutissimum sit malum, ac quod periculosus sit omnis voluulus, idem Galenus testatur 3. de morbis vulgar. De quo Paulus sic scriptum reliquit. Qui enim hoc malo sunt oppressi, miserabili tandè morte pereunt stercus per os reddentes. Familia autem hæc affectio existit ætati puerili, ut Aetius inquit, euadunt tamen beneficio humiditatis. Senibus verò non valde familiaris est, si tamen ipsi in hanc affectionem incidant, ferè nunquam conualescunt. Iliacorum verò passio acuta est, & sub angusto tempore periculosa, Theodoro Prisciano auctore cap. 9. lib. 2. ad Timotheum. Eius autem curatio pro causarum diuersitate variari contingit. Quod si ab inflammatione ortum ducat, aliis consentientibus, à venæ sectione exordienda curatio erit, ut omnes cōsentiant, & ratio dicat, eaque iteranda, si opus fuerit. Incidatur autem interna cubiti vena, eadem virtus ratione instituta, ac reliquis medicamentis adhibitis, quæ in cura coli doloris ex inflammatione præcepimus: id tamen seruantes, tam in ileo orto ab inflammatione, quàm ex quauis alia causa, quod medicamenta, quæ per os voranda præbentur, magis competunt, quàm in coli dolore sumpta à positu indicatione, prout capite de dysenteria recensuimus. Quapropter à venæ sectione vno, vel altero leniente clystere adhibito, (prout præcedente capite docuimus) confestim medicamentum leniendo purgās exhiberi debet, ceu est manna, cassia fistula, saccharum violaceum, seu syrupus ex pluribus infusionibus violarum, & interdum cum aliquo prædictorum vnc.s. vel drachm. 7. diacatholicon adiacere. Sape etenim id auxilij satis est, ut inquit Cel-sus, tumore præsertim in umbilico existente. At si ex siccorum stercorum multitudine, facta obstructio, ne ileos excitetur, quæ stercus ipsum emolliunt, atque humectant, & per aluum subducunt, tribuenda esse cenfeo, veluti est ius pingue gallinarum, seu pullo-rum, aut phasianorum, aut in eorundem iure decocta prifana. Pariter conuenit lenientes clysteres post prædictorum assumptionem, qui sic parentur, Recipe foliorum maluarum, violarum, mercurialis, & althææ, cuiuslibet manip. j. florum chamæmeli, scœnugræci manip. s. salis communis parum, bulliant in aliquo prædictorum iurium, cuius decocti per colum

transfusi, assumpta sufficienti quantitate, adicias olei communis, amygdalarum dulcium, aut chamæmelini, aut anethi vnc. iij. mellis rosacei vnc. ij. quib. simul commistis fiat clyster. Interim poteris butyri recentis, aut adipis anseris vnc. s. addere. Nec erit alienū (potissimum vbi ægri ventriculus valeat) vnc. iij. vel libram s. olei communis dulcis, at tantundè olei amygdalarum dulcium absorbendum præbere, & vbi hæc non suffecerint, audacter aliquod medicamentum purgans, eorum, quæ modo meminimus, præbeto. Nam obstructio quæ fit à stercore duro, quod intersepit intestinū (ut Galenus testis est lib. art. medic.) primū quidem habebit duritiei remedium ex humidis, pinguibusq; clysteribus: demum ex acribus euacuationem exposcet, in hunc etiam usum (utpote vtrumque perficiens) confert ius galli à Mæse descriptum. Extrinsecus insuper irrigationes, fomenta, ac cataplasmata, quæ emolliendi vim habeant, ac leniendi, applicentur. Quorum copiam præcedenti cap. reperies. Commodum est etiam in oleum calidum descendere, aut in bāneum descendere ex aqua, & oleo refertur. In aqua verò prius decoqui possunt malua, aut althææ. Si autem contingat ab humoribus crassis, ac tenacibus voluulus excitari, simili modo curari debet, quo & curari debere præcepimus coli dolorem ortum ex eadem causa. At si ex cruditate, seu ex ciborum corruptione voluulus fuerit excitatus, si adhuc crudus, seu corruptus cibus ventri insidere videatur, confestim æger cogendus est, ut vomat sumpta aqua tepida cum pauco acetato, seu syrup. acetoso, aut etiam aqua mulsa, similiter tepida. Verū si nihil ciborum crudorum in ventre contineatur, omni conatu (ut inquit Aetius) nitendum est, quo tum flatus, tum stercora infra trahantur, idque per glandes illitionesq; & clysteres, ut ipse refert, atque magna diligetia in singulis adhibita perficiendum. Purgans medicamentum, vbi prædicta nō suffecerint, exhibeatur ex hiera videlicet, & cōfectione de dactylis, aut diacath. cū aliquo prædictorum lenientium medicamentorum compositū. Est etiam vsitatum, & accommodatum anethi decoctum potum, ex Pauli, & Actij auctoritate. A potu autem panem in aquam feruentem coniice, cuiusque frustra calida confestim edenda præbe, ut iidem inquirunt Aetius, & Paulus, idq; præsertim si ab inflammatione voluulus ortus non fuerit. Item si anethum ipsum in aqua, & oleo decoquatur, atque ita bibatur, deinde frustra panis ex aqua feruenti præbeatur mirum in modum egri iuantur, ex Oribasij sententia. Commodum est etiam malua semen tritum, ac potui inspersum, eodem Actio teste. Nec minùs opitulabitur chamæmeli decoctū, quod quidem, si quid aliud hypochondriis, ac reliquis visceribus, quæ circa hypochondria sunt, gratum existit, condensata corpora rarefaciens, indurata emolliens, ac tensa relaxans, doloresque sedat, ac mitigat Galeno teste 3. de simp. med. facult. cap. 9. quin & tale quoq; esse lini semen, vetus sermo prædicat (ut ipse inquit) quauis minùs chamæmelo sit visceribus gratum, minùsq; calidū, & præterea essentia, crassè hæc inquam medicamenta præberi possunt voluulo ex quauis prædictarum causarum orto, præterquam si ab inflammatione fuerit excitatus. Fouendus insuper & podex erit per spongas calidas indifferenter voluulis ex quauis causa ortis, nedum eo tempore, quo glandes fuerint appositæ, ut Aetius inquit, sed in reliquis quoque tēporibus, ut ex eis qui ad inum

Curatio, si
ex inflam-
matione
fiat.
Vene
sectio.

Purgatio.

Si fiat ex
stercorum
multitudine
ne curatio.

cap. 94.

cap. pro-
prio.

Si ex humo-
ribus cras-
sis fieri con-
tingat volu-
lus cura-
tio.
Si ex crudi-
tate.

Quibus po-
dex fomen-
tus sit.

intestinum positus est musculus, relaxetur, nec ab ipso constrictionis motus incipiat. Ex foliis itaque maluarum, althææ, chamæmeli, ac feminis lini decoctum in aqua, & oleo paretur, ac per spongas calidum applicetur sæpius. Vel in eodem decocto infideat ager. Doloribus verò adhuc perseverantibus & maxime quibus infusi clysteres non infra rursus prodeunt, etiam ea quæ dolorem leuant, exhibenda sunt, itemq; conuenientes antidoti ante somnum, ex decreto Aëtij, ceu ex viperis theriaca existit. Andromachi, post eam verò, quæ mithridati nomē habet. Si verò à venenoso pharmaco quis in voluulum incidat, aquam tepidam multum bibendam dabimus, vomereq; cogemus. Deinde oleum calidum in potu dandum, aut iura pingua, vt denuò vomant ex moderato eorū potu. Deinde ita parumper quiescant, & postea theriacen accipiant cum vino dilolutam, quemadmodum Aëtius, & Paulus præcipiunt: Et si adhuc perseverauerit, purgante medicamento vtare aliquo eorum, quæ supra commemorauimus. Quod si ex intestinis in sērotum prolapsu voluulus contingat, confestim tentandum est, vt decubitu sursum versus vergente adornato delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atque post leuiter citra violentiam, ac compressionem ligamento adhibito contineatur, vt patet ex præcimatorum auctōrū sententia. Resistit ileo discerpti vespertilionis sanguis ventri illinitus. Item senectus serpētium decocta cum rosaceo in vase stanneo, si ventri illiniatur, ceu apud Plinium secundum legitur libro secundo legitur libro secundo de re medica cap. 33.

Curatio si
fiat volu-
lus ex ven-
enoso phar-
maco.

Περὶ τῶν ἐλμύνων. Id est, De lumbricis.

CAPVT LXXXI.

QUEMADMODVM in magno Mundo animalia quædam non ex feminibus, sed ex putredine generationē habent, ita quoque proportionabiliter in paruo mundo ex eadem putredine parua quædam animalia gigni consueverunt, quæ Græci ἐλμύνες, Latini verò lumbricos appellare solent. Quanquam apud Græcos præsertim Galenum quod Græci ἐλμύνες nuncupant, modo quid commune intelligitur omnium lumbricorum differentiarum, vt liquet primo de locis affectis. cap. 5. Vbi cum à locis ipsius morborum indicia sumere præciperet, dicebat, lumbrici in intestinis gignuntur, vsus verbo ἐλμύνες. Hoc namq; quod commune sit cunctis lumbricorum differentiis infra patebit. Illud idem cōfirmavit Paulus cap. 57. libri quarti, cum dixit, tres esse vniuersas ἐλμύνων, hoc est lumbricorum differentias, & ab Aristotele quoque sic scriptum est libro 5. de natura animalium cap. 19. ἐλμύνες, hoc est lumbrici, quorum genera tria sunt, & cætera. Interim verò per ἐλμύνες duas duntaxat lumbricorum differentias intelligere videtur idem Galenus, quemadmodum patet lib. de differ. morbor. cap. 8. quò loco dinumerans eos affectus, qui toto genere in numero sunt præter naturam, ait, quemadmodum sunt ἐλμύνες, & ἀσκαρίδες, vbi luce clariùs liquet per ἐλμύνες, nedum teretes lumbricos intellexisse, verum etiam & latos, qui nec minùs toto genere præter naturā sunt, veluti & teretes. Quāuis Hippocr. aphorism. 26. tertij libri, illos στρογγύλους ἐλμύνες appellet hoc est teretes, & idem Galenus simul cum Hippocrate 14. method. med. teretes στρογγύλους nuncupauit, latos autem πλατείαις; cum

cap. ult.

dicebat, εἴτε ἐλμύνες, εἴτε στρογγύλαι τινές εἰσιν, εἴτε πλατείας, hoc est lumbrici, siue hi teretes sint, siue etiam lati. Sic etiam Paulus ἐλμύνες, στρογγύλους teretes, & πλατείας latos nuncupat. Quemadmodum etiam & Arist. præcitato loco, quamuis etiam latos alicubi κρείας nominet idem Galenus, vt patebit. Non raro autem Gal. per ἐλμύνες vnam duntaxat lumbricorum differentiam, eorum videlicet, qui teretes Latine dicuntur, subintelligit, ceu liquet constare præcitato libro 14. method. meden. Vbi eorum, qui toto genere præter naturam sunt affectuum meminit, post enarratas abscessum tres differentias, nedum semel, sed bis dicebat in vno loco ἐλμύνες, & ἀσκαρίδες & κρείαι, & post pauca iterum ἀσκαρίδες τε, καὶ κρείαι, καὶ ἐλμύνες, quo etiam modo Aëtius teretes lumbricos ἐλμύνες duntaxat appellat, vt liquet libro 9. cap. 39. Ex quibus omnibus liquet Galenum inconstantem haudquaquam fuisse, licet diuersis in locis diuersimode lumbricis verba fecisset. Perpetuò enim in eius doctrina palam est tres eorum differentias conscripsisse, vt præcitato libro 14. meth. est videre, & comment. aphorism. 26. tertij libri. Quarum vna ἐλμύνες, seu ἐλμύνες στρογγύλους altera ἐλμύνες πλατείας, seu κρείαι, & tertια ἀσκαρίδες dicta est. In hisce etenim locis particulatim, ac distinctè magis de eis loqui fas erat, id quod in reliquis iam dictis nequaquam necessarium fuisset. Audacter igitur cum eo, Paulo insimul ac Aëtio tres tenemus esse vniuersas lumbricorum differentias, seu species, teretum videlicet, latorum, ac ascaridum, seu tenuium. Quod si Hippocr. aphorism. præcitato 26. tertij libri duarum tantum meminit, teretum videlicet, & ascaridum, non propterea tertiam negauit differentiam, quæ est latorum, quoniam dicens ἐλμύνες στρογγύλαι, aliam ἐλμύνων olfecit differentiam, quæ est latorum, aliàs sufficisset ei dixisse ἐλμύνες καὶ ἀσκαρίδες, nec addidisset illud στρογγύλαι. Adde quòd propterea latum lumbricum subtrixit eodem in loco, quoniam (vt Galenus inquit in commen.) rarior est eius generatio, tum etiā quòd neque eius erat propositum de omnibus agere passionibus, quæ mortalibus accidunt, sed de illis tantum, quæ singulis ætatibus accidunt. Atqui lati lumbrici generatio ea ætate fieri nequaquam poterat. Nec propterea bis ipsi aduersatur, etiam si liber de morb. sit germanus eiusdem Hippocrati, & non Polybi, seu alterius cuiusdam; cum libro 4. eiusdem de teretibus ac latis duntaxat mentionem fecerit, ascaridas subtriciens. Nam duo eodem loco disserere intendebat de lumbricis, vt cuilibet eius verba rectè intelligenti patere poterit, quorum vnum erat, nunquid vtraque differentia gigni potuisset in puero adhuc in vtero existente, secundum propositum erat, nunquid lati, veluti rotundi parerent: cum itaque tenuis lumbricus ἀσκαρίδες dictus, nec infantibus oriatur, donec vterò geruntur, vt ex eius verbis colligi potest, nec præter eius tenuitate parere potuisset, nam ex eo nihil procreari aliud potest, ex Aristotelis sententia præcitato cap. 19. libri quinti, de natura animalium, iure ascaridas missos fecit, & tantum teretum, & latorum meminit. Sed quid Celsus dicendum sit, qui cap. 17. libri quarti, duas tantum lumbricorum tetigit differentias, latorum videlicet, & repletum, cum dixit, nonnunquam autē lumbrici quoque occupant aluum, iiq; modo ex inferioribus partibus, modo fecidius ore redduntur, atque interdum latos eos, qui peiores sunt, interdū teretes videmus.

An quia

An quia vel ascarides non nouit, vel cum ad eò exi-
gui sint, ac tenues, ac in infima, & ignobiliore parte
orti, nullamque ex eis paruum sequatur symptoma,
eos paruifecit, nec in aliorum numero comple-
xus est: Auicennas autē licet obscure, ac confuse (vt
eius mos est) de eis loquatur, adeo vt quatuor lum-
bricorum differentias admittere videatur, si quis e-
ius uerba intro inspiciat, tres etiam duntaxat posuit
Paulum sectatus, id quod argui potest ex diuersitate
materiæ, ex qua generantur, quam triplicem esse as-
serit, ex cuius diuersitate uoluit eorum quoque di-
uersitatem argui posse. Communicant autem diuersæ
eorum differentia in materia generationis quodā-
modo. Quoniam (vt inquit Aristot.) in excrementis
oriuntur, adhuc intra animantem cōtēntis, & vt re-
fert Galenus comment. præcitati aphor. 26. 3. lib. ex
putredine generationem habent ex corruptis cibis
præsertim orta. Hoc autem excrementum, seu putre-
do (vt isti asserunt) cruda, crassa, pituitosaque ma-
teria est, putredini quæ accommoda, Paulo auctore.
Nec propterea ab Aristotele discrepat, qui neq; ne-
gavit talia debere esse excreta, sed fatius ei fuit
vniuersaliore vocabulo uti. Est etenim in excremen-
torum numero cruda, crassa, ac pituitosa materia, &
putredini accommoda in intestinis contenta, vel
saltem alui excrementis quodammodo permixta est.
Ex reliquis uero humoribus nullum lumbricorum
genus gigni potest. Nam biliosus fæcus, nedū im-
proportionata materia eorum existit, uerū eos sua
amaritudine, & acrimonia perimit vt inquit Paulus.
Et si quando flaua bilis uñ cum lumbricis infra, aut
etiam vomitu eruperit, ipsos quidem intestina ob-
sidere, humorem uero biliosum ventriculi os, aut a-
liam quampiam particulam occupare scito, vt ipse
fatetur. Neque ex atra bile oriri possunt cum frigida,
& sicca existens, longinqua ab animalis tum pro-
portionalitate, tum uita existit. Quapropter non ab-
re dicebat Paulus, quod hæc due substantia alimenti
naturam egressa lumbricis procreandis inepte red-
duntur. Nec minus inepta materia eorum, sanguis
existit, quoniam substantia proprietatem, ac pro-
portionem habet pro nutrimento partium hominis,
& non pro lumbricorum generatione, intraque va-
sa continetur. Quod si accidi præter naturam ad in-
testina effundit, aut infrigidatus in grumos vertitur,
aut calfactus suppūrat, interim autem liuescit, aut
alio quodammodo corrumpitur, ita ut omnino im-
possibile sit, vt sanguis permaneat, Galeno auctore
commento aphorism. 20. sexti libri. Quapropter ex
sanguine lumbricos procreari impossibile est. Con-
ueniunt etiam in agente, qui calor est non absolute
putridus. Etenim sola putredo non est sufficiens ad
eos generandos, vt inquit Galenus, sed & calore plu-
rimo indiget, naturali inquam, qui materiam obti-
neat, idoneam siquidem ad talium animalium ge-
nerationem. Non itaque imbecillus, ac exiguus re-
quiritur calor innatus pro lumbricorū generatio-
ne, sed validus, ac plurimus. Quoniam si talis fuerit,
vt in valde tenellis existit, nondum poterit tam pu-
tridam materiam obtinere, ex eiusdem Galeni sen-
tentia. Nam quamuis plurimum habeant ipsi insitū
calidum, vt patet 14. aphorism. primi libri ratione
gratis, illud tamen habent cum humiditate permix-
tum, quoniam plurimum sanguinis habent, Gale-
no teste tertio prognosticorum. Necnon propterea
quia cibi copiam, aut lactis ingerunt atque inordi-
natam, magnam quoque crudi, ac pituitosi succi copia,

cumulant, quæ cum ab eodem eorundē calore ob-
tineri nequeat, vt qui nō adeo validus existat, ea de
re in valde tenellis lumbrici generari non possunt.
Corrumpit itaque, ac idoneā quodammodo efficit ma-
teriam putredinis calor, in cruda, crassa, ac pituitosa
materia existens: perficit autem in quantum potest,
informat, ac præparat, modo quo potest ipsam ob-
tinens innatus, vt exinde lumbrici procreentur. Ni-
hil etenim putrescens sed cōcoctum gignitur, vt in-
quit Aristot. 3. de gener. animal. cap. 11. loquens de
animalibus quæ sponte oriuntur. Neque ipsi lum-
brici ea ratione, qua in vniuerso generantur, pro e-
iusdem expurgatione. Nam satis est pro intestinorū
expurgatione, seu abstersione flaua bilis ad intesti-
na effusio, vt patet quinto de vñ partium. Sed po-
tius id, quod melius, natura eligens, putredinem eā
haudquaquam derelinquens, nec omnino eam ob-
tinere valens, quod melius est eligit, ipsamque lum-
bricorum speciebus informat. Arist. quoque quart-
to Meteor. dicebat, animalia fieri in iis quæ putre-
sunt, propterea quod segregata caliditas naturalis
existens, hoc est ab iis quæ putrescunt propter ad-
uentum alienæ caliditatis: eadem caliditas naturalis
relatione ad id, quod ex putredine generatur ani-
mali usque adeo materiam putrescentem obtinet,
quod constare facit segregata, hoc est putrida excre-
menta, ea concoquens, & exinde constituens, vt li-
quet citato loco de generatione animalium, id quod
in valde tenellis perficere nequit (vt Galeno visum
est.) Nec minus & in loco conuenienti conuenien-
tiam habent. Quoniam singula iam dicta tres lum-
bricorum differentia in intestinis generationē ob-
tinent, quemadmodum apud Galenū lib. primo de
locis affectis, cap. 5. ubi morborum indicia sumens à
locis ipsis, eò quod quibusdā locis solis morbus hic
accidat, quibusdā uero solis nunquam eueniat, di-
cebat, quippe soli oculi suffusione laborant, lapis in
renibus, & vesica duntaxat nascitur, atque (vt non-
nullis placet) & in colo, & in intestinis, id est lumbrici in
intestinis gignuntur. Ex quibus patet toto cōlo a-
berrare eos, qui in ventriculo lumbricos generari
posse Galen. ascripserunt, malè eiusdem uerba intel-
ligentes comment. aphorism. præcitati 26. tertij li-
bri cum dicebat, Cibus autem puerilis nonnunquā
corrumpitur in vêtre, & præcipue inferiore, uerū
caliditas in valde tenellis nondum materiam obti-
net. Nanque si paucis interpositis uerbis in eodem
comment. perlegissent Galen. noluisse ventriculum
intelligere in præcitatis uerbis, sed intestina perce-
pissent; dicebat etenim idem Galenus. Aliud uero
genus lumbricorum est rotundorum, seu teretrum,
qui in superioribus magis intestinis generantur, a-
deo quod ad ipsum quandoque ventriculum ascen-
dunt. Nōluit itaque Galenus per ventrem, eumque
inferiorem vetriculum intelligere, sed intestina, vt
patet. Est namque, nedū eius mos, uerū etiam &
Hippocr. (quemadmodum legitur secundo Progn-
osticorum) per inferiorem ventrem, nedum vetricu-
lum ipsum, sed ieiunum, atque vniuersa intestina in-
telligere. Cæterum concessio, quod etiam vetricu-
lum subintelligat Galenus, cum dixit, plerumque in
ventre puerilis cibus corrumpitur, quo medio de-
monstrabis lumbricos uoluisse in eo gigni posse: cum
possit cibus in eo corrumpi: nec propterea lumbricos
in eo gigni, quoniam ab eodem ventriculi pro-
prio calore ita corruptus cibus nequit adeo obtine-
ri, neque corruptus fuisset, si eum euincere, ac obti-

cap. 4.

cap. 4.

Cap. 10.

13.

Quod in lo-
co etiā con-
ueniant.Quod in v-
triculo lum-
brici nō ge-
nerantur.
Tex. 26. cō-
ment. 13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

nere potuisset, sed cum primum ad intestina descenderit, ibi generantur, id confirmavit paulo infra, cum dixit, in superioribus magis intestinis teretes lumbricos generari, adeo quod quandoque ad ipsum ventriculum ascendunt, & nō dixit, quod in ipso generantur. Secundo etiam de ratione victus in morbis acutis, sub proritationis nomine morsum comprehendens, quem acris humor in intestinis, siue in ventriculo, & praesertim ipsius ore parit, & vigiliae, (inquit Galenus) & ira, & moror, & lumbrici, qui ab intestinis ad ventrem vsque ascendunt. Cui ergo in dubium venerit hic aperte Galen. negasse lumbricos in ventriculo oriri posse: Quoniam cum de morfu intestinorum, ventriculi, & praesertim oris eius verba fecisset, ac de eius causis, inter quas lumbricos connumeravit, non utique dixisset, qui ab intestinis ad ventrem vsque ascendunt, sed qui in ipso ventre generantur, aut saltem id addidisset, si insufficientia euitare voluisset, possent etenim pariter morsum ventriculi causare lumbrici in eo geniti, si generari possent, ceu iidem ab intestinis ad eundem ascenderes. Id etiam confirmavit Aristot. quarto Meteororum, cum dixit, In coctione animalia non generantur, & cetera. Nam in ea aut Hepseis fit, cum cibi perfecte concoquantur, aut Molyntis, hoc est cruditas ei opposita, ex quarū neutra lumbrici gigni possunt; nisi prius excrementa, quae hepseim subterfugiant, fuerint segregata atque corrupta: quamprimum autem fuerint segregata, ea intestina excipiunt, ubi putrescentia vtpote destituta à ventriculi calore, idonea lumbricorum materia fiunt, continentium partium calore adeo ea euincente, ut alia generet animalia. Id enim est quod Aristot. dicebat. Digestum est enim in superiori ventre, putrescit autem in inferiori segregatum. Pariter & Paulus, qui de teretibus lumbricis verba faciens ait, eos in gracilibus pleuranque intestinis consistere, & superiore ventriculum subire, ideoque frequenter per os deiiciuntur, quibusdam & è naribus redduntur. Celsus autē lumbricos aluum occupare dixit, quanquam faedius interdum ore reddantur. Theodorus verò Priscianus libro 2. ad Timotheum cap. 17. si lumbricos aliquando stomachum, aliquoties inferiora possidere scriptum reliquit, haud propterea eos in stomacho generari dixit: quandoquidem tum stomachum possidebunt, cum ad ipsum ascenderint, veluti Galenus & Paulus praecitatis locis scriptū reliquerunt, & non quia in eo geniti sint. Id quod haudquaquam ipse fatetur, qui item tres eorum esse differentias eodem loco asseruit. Ceterum quamuis iam dictae tres lumbricorum differentiae in materia efficiente, ac loco communicent vniuersaliter, si quis tamē magis particulariter ea scrutari voluerit, differre inter se inueniet tum materia, quoniam licet ea putredo sit, vnā speciem quam alteram à maiori, vel minori putredine ortum habere reperiet, sic etiam ex multa, vel pauca materia putrefacta. Nec minus diuersitatem quandam reperiet in agente, nam quamuis eorum omnium generatio à calore plurimo fiat, tamen idē calor respectu diuersarum differentiarum lumbricorum iam dictarum, quandam habebit in eius magnitudine differentiam. In loco quoque (licet vniuersaliter, ut diximus, communicent) quoniam non nisi in intestinis generari possunt, differunt tamen: quoniam teretes in superioribus magis intestinis generantur, ascarides in parte maximē inferiori crassius intestini. Ipse verò lumbricus latus, qui & longif-

simus quoque est, saepe per tota extenditur intestina, quamuis rarior sit eius generatio, (ut inquit Galenus praecitato commento aphorismi 26. libri tertij) licet in tenuibus praesertim oriri incipiat, Aetio auctore, cap. 40. libri noni. Quo fit ut propterea diuersa sit eorum forma, seu figura. At quicquid tandem sit de eorum conuenientia, ac differentia, quod in intestina afficiantur, qualiscunq; fuerit lumbricus genitus, ex iam dictis liquet, licet in teretibus intestinalia, gracilia praesertim, in ascaridibus crassum, seu rectum, & in latis, ubi longius extendantur, tam tenuia quam crassa affecta sint. Patet insuper eos morbos esse in numero, tota substantia praeter naturam, quemadmodum Galenus testatur libro de differentiis morborum cap. octauo, & decimo quarto methodi medendi, cap. decimonono. Ex cuius sententia eorum ruit opinio, qui volunt lumbricos in intestinis genitos aliquem praestare usum, pro eorum videlicet expurgatione, seu deterfione. Nam cum tota substantia praeter naturam sint, nulla ratione fieri potest, ut actionem aliquam, aut usum naturalem animatis corporibus praestent: quinimodo eas potius impediunt, atque viciant, nonnullos, eosque non spernendos praeter naturam affectus generantes: referuntur etenim & actiones, & usus, secundum naturam, ad partes secundum naturam nostri corporis existentes. Cum itaque neque partes, neque secundum naturam sint, sed toto genere praeter naturam (ut diximus) valeant, qui talia ad pauca respicientes, temerarie effutunt. Nos verò ad eorum inditia descendemus, primo teretum, cum inter alios frequentiores fiant, cum febribus, & citra febres, atque speciem habeant omnibus perspicuam, Paulo teste, similes namque sunt vermibus in terra ortis, quos Graeci ἐν τῇ γῇ, hoc est intestina terrae appellant, vulgus onisculos vocat. Secundo latorum, & tertio ascaridum, seu tenuium. Conscribuntur autē teretum non pauca ab Aetio, & Paulo inditia, quāuis (ut Paulus inquit) non omnia in omnibus signa inquirere oporteat, sed plurima, aut nonnulla eorum. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos continent, incredibilis morbus stomachi, ventris, ac intestinorum, tussis exiguae cum siccitate irritantes. In somno tremunt, & praeter rationem exurgunt nonnulli, & cum clamore expergescunt, & iterum sopiuntur, quosdam comitatur singultus: quidā verò, & linguam foras protendunt, oculosq; claudunt & taciturni sunt, excitantēque moleste ferunt, ob inbecillitatem vigilare nequeunt, & dentibus fiendentes, ac superuacue mandunt, praesertim si infantes fuerint, & quidam eorum neglecti motu pulsus destituantur, ac refrigerantur, atque eorum instar, qui animo linquuntur, tenuem quendam, ac frigidum sudorem exsudent, & ut plurimum liuescunt. Contingit autem aliquando faciem eis fieri rubicundam maximē circa malas, verum color hic rursus in pallorem solito maiorem transit. Quidā etiam pulsuum inaequalem habent, obscurum, deficientem, ac recurrentem. Alii etiam appetitus perditio accedit, & febres augescunt inordinatae, quae cum extremorum perfictione tertia interim quarta die, vel nocte accessionem sine ratione habent. Alij instar delirantium peregrina in somnis loquuntur, interim cum clamore praeter rationem exurgunt, citoq; rursus collabuntur. Alij decubitus transmutant continue dormientes, angoreque vexantur, & ex loco ad locum sese vicissim proieciunt, atque multi in-

Comments.
55

Cap. 3. lex.
28

Quibus inter se differunt, dicte tres lumbricorum differentiae.

Parti

cap. 4

Quo

cap. 4

Pauli

cap. 5

Labi

signa

70

lumbricorum

signa

Hiipp

4. de

versum

1. de lo

sect. ca

1. de lo

sect. ca

1. de lo

sect. ca

1. de lo

sect. ca

1. de lo

sect. ca

1. de lo

sect. ca

noca-

uocales omnino persistunt. Interim præter id, quod cibū auerſantur, si quid acceperint, illi nauſcabundi vix deglutire poſſunt. Plurique verò alijs deſcendit corruptos cibos egerens, & tympani modo venter eis inflatur, & quidam etiam oculos ſanguine ſuffuſos habent. Cuncta verò hæc accidunt, tum ab iſtis animalibus in teſtibus obuolutis, ſeu cum per eadem ſerpunt, ac rodunt & morſum inferunt, tum ex febrili calore prauos vapores ad cerebrum tranſmittente, ex putrida in ventre collecta humiditate exhalantes, vt Paulus reſert. Ex ea ite, quæ præſeſit victus ratione poteris lumbricorum generationem percipere; namq; craſſorum nimirum, & quæ diſſimiliter conſiciuntur; alimētorum vſus præceſſit ac eadem largius ingeſta fuere & maxime frumentacea, eoſdem item competes balneis à cibo vſas fuiſſe, vt teſtatur Aetius libro nono c. 39. Cum verò qui latus appellatur lumbricus, mutatio ſit, (ſi ita dicere libeat) ſeu permutatio membranæ intrinſecus tenuia inteſtina ambientis in corpus quoddam viuum, ex Aetio, vt autem Paulus inquit, mutatio eſt adnatæ in interiori inteſtino membranæ in materiam animalis modo mobilem, quæ ſæpe tota redditur longitudine incredibili, & in his, qui febre carent abundat, quandoq; in longis, ac diuturnis morbis etiam cum febre accidit, propterea nō ab re continuo ſtomachi morſus inferit, & ad cibos incorrigibilem appetitum, nam quod animatum euasit (vt Paulus reſert) in inteſtini obiectum alimentum rapit, vt alio ſtatim opus ſit, & niſi aſſumpſerit, inteſtina roduntur, cæterum ea, quæ accipiuntur, non ſubcenturiata, ſeu copioſe digeruntur, ſed citò excernuntur: iis occupatis comitatur corporis gracilitas, etiam impotentia, ſeu imbecillitas cum tarditate, nam quod viuificatum eſt in inteſtinis, vbi recens exhibitum cibum conſumpſit, poſtea ex ipſo ſolido corpore rodit. At certifiſimum & minime fallax indicium eius erit, ſi cum recrementis, quædam ſemini cucurbitæ, ſeu cucumeris ſimilia excernantur, auctore Hippocrate libro 4. de morb. quem ſecuti ſunt Galenus primò de locis affectis, & Paulus, ac Aetius locis præcitatis. Decipiuntur autem qui talia excrementa euſdem lumbrici parus eſſe dicunt, ab Ariſtotele illud capientes præcitato c. decimonono. 5. libri de natu. animal. cum dixit, latum autem illud ſolum inteſtino adherens parit ſimile cucumeris ſemini, quo inditio Medici id genus lumbrici ineſſe intelligunt. Non enim intellexit Ariſtotele tale excrementum ſimile cucumeris, ſeu cucurbitæ ſemini eſſe lati lumbrici partem, tanquā aliud animal, ſed veluti quoddam proprium iplius excrementum, ſeu pars euſdē. Sunt etenim excrementa, ex quibus Medici in affectuum ſedium, ſeu earundem affectuum notitiam deueniant in triplici differentia, vt patet, tum prius, tum tertio de locis affectis. Nam aliquādo partes ſunt ſedium affectuum, aut iſtorum affectuum, quæ eorum eſſentia ſoluta, vel diſſecta excernuntur. Interdum ea quæ in iſtis continentur, nonnunquā aliquod, quod morboſas diſpoſitiones ſequitur, excrementum excernitur. In primo itaque excrementorum genere continentur recrementa illa ſemini cucumeris, ſeu cucurbitæ ſimilia, ſi excernantur, quoniam tanquam partes latorum vermium eorundem certifiſimum, ac minime fallax inditū ſunt, vt quā dilucidiffimè patet apud Galenum eodem primo de locis affectis, vbi de affectuum notis, quæ ex excrementis deprehenduntur, verba faciens, quæ pro-

prie ſunt iſtorum affectuum, vt ramentum vlceris, inquit, ſi in vrina ſabuloſum reſidet, lapidis; cucurbitæ verò ſeminibus ſimilia excrementa latorū vermium inditia ſunt. Inquit itaque Ariſtotele. Medicos ex iam dictorum excrementorum inditio, intelligere id genus lumbrici ineſſe, non tanquam ex fecibus, ſeu pullis euſdem, cum ipſum (Hippocr. auctoritate) non pariat, ſed tanquam pars ſubſtantia, ſeu eſſentia, ac proprium excrementum euſdē lati vermis exiſtens. Ex hoc etenim excrementorum genere non in artiſcioſam coniecturam, ſed in exactam notitiam deuenimus tum affectus; tum partis affectæ, vt latius eodem primo de locis affectis eſt videre. Huius enim lati lumbrici quandoque partes conſiſe prodeunt, quæ ſemel ſanè exolutæ nō amplius ſecundario cōgregantur. Interim & iſti integri excernuntur, vt incredibilem magnitudinis de ſe præbeant affectum, ex Aetij teſtimonio. Sunt quoque (vt diximus) aſcarides lumbricorū ſpecies vna, circa extrema inteſtini recti, & ani ſibulæ initio, & a Græcis appellatum cōſiſtentes (vt liquet ex Aetio, & Paulo) vehementem pruritus iis locis inferentes, ex quo vehementer huius loci pruritus, ac alſidua ad egerendum irritatione, & iſti dignoſci poterunt: hi quoque vt plurimum ab excretionē melius ſe habent. Et plurimi eorum manifeſte apparent in iumentis malè cibum concoquētibz, quorum malā coctionē faetor indicat excrementorum, Galeno auctore commēto, præcitati aphoriſmi. Quapropter & eorundem inditia (vt Aetius aſſerit) poſſimum ex graueolentia excrementorum ſumuntur: indicat enim paucos aſſumptos cibos, ac eorundem corruptiones, & frigiditates, ex quibus ſpecies hæc lumbricorum generatur, velut eodem Aetio, tum etiam Paulo viſum eſt. Omnium verò trium ſpecierum cōmunis, ac vniuerſalis cauſa (vt diximus) putredo eſt, ex Galeni teſtimonio. Paulus autem crudam, craſſam pituitoſamque materiam, ac putredini accommodam omnium generum originem, ac cauſam eſſe ſcriptum reliquit, ſeu ſuprà adnotauimus. Quare de re cur amplius de eorum cauſa pertractare debeamus, non inuenio. Reliquum eſt vt ad Prognosti- veniamus. Quorum primum Hippocratis eſt ſecundo prognosticorum, cum dixit, Lumbricos quoque teretes eunte in iudicationem morbo; deſcendere idoneum eſt, magnam autem curam habere conuenit circa eorum curationem; præſertim teretum, nam multi nulla lumbricorū cura habita (vt inquit Paulus libro quarto, cap. 57.) exſi ab iſtis ſunt, & conuulſi interierunt. Alij produnt ſe lumbricos viſiſſe, qui ex inguinibus ægri eruperint, vt ipſe reſert. Quod autem in infantibus, & pueris, atq; iis, qui ad pubertatē accedunt, maxime abundant teretes lumbrici, ſcriptum reliquit Aetius ex Herodoti auctoritate præcitato loco. Itē quod peiores ex iſtis cenſentur maiores minoribus, paucis multi, & albis rubri, viuentes etiam mortuis deteriores ſunt. Circa initia autem morborum, præſertim februm generati ſubſtantiam ſuam ex ſubiacente corruptione capiunt, circa vigore vero ex malitia morbi: circa declinationē autem ex permutatione omnium in melius, qui ſanè citius ſeparantur. Natura etenim iſtos reliquorum recrementorum inſtar foras propellit, vt idem auctor, ſimul & Paulus fatentur. Inter omnes autem lumbricorum ſpecies minùs periculofus eſſe cenſentur ij qui aſcarides nominantur, quauis fortè ex deteriori gignantur materia, tum quia te-

lib. 9. cap. 40

Aet. lib. 9. cap. 41

Paul. lib. 4. cap. 58

Aſcaridum ſigna.

Communis lumbricorum cauſa.

Prognostica.

tex. 18

Lib. 9. c. 39

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

lib. 10. c. 10

Lumbrico-
rum curatio.

Vitui ra-
tio.

Medica-
mentorum
ratio.

nues, & exigui sunt, tum etiam quod in loco gene-
rentur à principibus partibus remotissimis, intesti-
no inquam recto. Præterea quoniam cum alui deie-
ctionibus facile excernuntur, necnon adhibita me-
dicamenta statim eos attingunt, minus verò quam
teretes, in pueris gignuntur. Teretes autem ipsis
peculiares sunt, ut ex Galeno & Paulo liquet. Inter
reliquas autem duas differentias, latos videlicet, &
teretes, latos peiores sunt, quam teretes, Celso aucto-
re. Pro lumbricorum autem curatione, primò victus
rationem instituemus vniuersalem, ac communem
cunctis iam dictis tribus speciebus, deinde particu-
larem per medicamenta curationem, prout quali-
bet species exigit, conscribemus, à teretibus exorfi-
Aer itaq; eligatur ad calidum, & siccum parum ver-
gens, potissimum, ubi febris non adsit, somno me-
diocri vtantur, ac potius nocturno, quam diurno,
eoque non à cibo statim, sed per duas saltem horas.
Exercitium confert, veluti vita desidiofa, seu longū
ocium lædit. Id autem prandium præcedat. Aluus
lenis esse debet, quod si id sponte non fiat, balano,
aut clystere citanda erit. Vitentque animi affectus
omnes immodicos, veluti iram, tristitiam, timorem,
& id genus reliquas perturbationes, potissimum à
cibo. Quod verò ad eorum cibos attinet, probi fucci
esse debent, & qui facile in membra digerantur, nec
lumbricorum effectricem causam foueant, vel adau-
geant, nec etiam vires susperari permittant. Quam-
obrem & vinum aquosum exhibebimus pro potu,
ut Paulus refert, liberalius autem ipsos nutrire ob
hoc ipsum oportet, ne alimenti expertes lumbrici
rosiones pariant. Dabitur autē cibus tum præcipue,
cū nō omnino inaniti fuerint (ut ipse inquit.) Quod
si insimul alui profluuium adsit, ex quo lumbricos
magis abundare sciendum est cibo non distributo,
sorbiles agris cibi dari debet, admixtis quibusdam
etiam adstringentibus, verbi gratia, pyris, forbis, ut
malis punicis præcipue acidis, iidem etiam sorbiles
cibi infantibus præbendi sunt, quemadmodum iis
etiam qui cibum auersantur, eodem Paulo auctore,
veluti sunt contuse pullorum, aut gallinarum car-
nes, seu eorundem iura, in quibus iam dictæ carnes
prius liquatæ sunt, brodia consumata vulgus appel-
lat. Reliquis prædictorum pullorum, gallinarū, pha-
sianorū, itarnarum, columbarum iuuenum, turdo-
rum, merularum, ac aliarum paruularum auium mon-
tanarum carnes exhibeantur. Cappares quoque, &
colymbades cum aceto cōducunt. Inter olera verū-
que intubum, sonchus, ac fenecio competunt, præ-
sertim si cum prædictis carnibus decoquantur, in
quibus etiam ea quæ extenuandi vim possident, mi-
sceri possunt, potissimum si febris non adsit, veluti
perpetuò vitari debent, quæ infrigidandi vim ha-
bent, ac crassam, lentamque pituitam gignere pos-
sunt, seu legumina sunt, pisces, lac, caseus, præsertim
vetus, panis non fermentatus, & cuncti cibi, qui ex
eo parari possint. Quantitas autem prædictorum
ciborum multa pro vna vice non sit, sed sæpius exi-
guo cibo vtendum. Porro cum & ipsi è genere eorū
sint, quæ tota substantia præter naturam sint, prorsus
quoque eos è corpore expelli conueniet, ex Ga-
leni decreto decimo quarto meth. medendi. cap. vlt.
Expelles autē (ut ipse inquit) si prius necaueris. Nec-
abis verò amarum medicamentis, viuentes nanque
obstunt intestinis adhaerentes. At mortui vna cum
stercore expelluntur, expelluntur cum hoc etiam
vniuersis, sed stupefactis, & uti quispiam dixerit, semimor-

tui facti. Verum quoniā non ita vehementiora me-
dicamenta desiderant teretes, quemadmodum latos,
& ascarides, ut patet eodem 14. methodi medendi
cap. 19. propterea de medicamentis, quæ teretibus
competunt primo pertractabimus, quorum primū
absinthium est, ab eodem Galeno ibidem descriptū
præsertim si pueri non fuerint, ipsius autem cremor
assumatur aut etiā abrotoni, ut inquit Aëtius. Pueris
verò mixarum decoctum mentha admixta præbea-
tur, ex eodē auctore, febre non existente, aut si eadē
sit exigua. Illud etenim animaduertendum est, quod
si febris adsit, & eorum curatio, cum ea quæ febrici-
tantibus conuenit, coincidat, mitioribus, ac simplici-
oribus sanè remediis uti oportet, ab acris autem
tem febres magis exacuuntur. Potui igitur dabitur
(ut Paulo visum est) chamæmelorum, vel myxario-
rum decoctum, aut etiam ipsamet myxaria decocta
esui præbeantur, vel eorundem decoctum chamæ-
melorum cum modico rosaceo, ut Aëtius assentit. Itē
sercos succus aut coriandri semen cum aqua calida,
vel cum posca. Similiter & auriculæ muris decoctū,
vel cornu ceruini ramentum, ac olei immaturi ama-
rissimi cochlearia duo absorbeant. Nam qua amarū
est (ut idem Paulus fatetur) lumbricos occidit, qua
lubricum, detrahens ipsos cum stercore reddit. Sunt
etenim amara omnia nedum ad interficiendos lum-
bricos idonea, verum etiam ad fecrum viuum eue-
candum, & mortuum eiiciendum, quemadmodum
liquet octauo de simplicium medicamentorum fa-
cultatibus, cap. de filice, ac etiam de myrrha. Et pro-
pterea idem oleum omphacinum cum pusana deco-
ctum præberi debet. Aetio teste. Cunctis verò
tam infantibus, quam adultis febriculis, vel non
febriculis, ex eiusdem auctoris testimonio confi-
denter exhiberi possunt, etiam si trimestres fue-
rint infantes, vermes terreni cum sapa. Si verò sapa
non admittant cum hydromelite, aut ut libet præ-
beto, nihil veritus. Neque vtilitate contempta, se-
ptem numero dato. Nos verò cum syrup. ex acetosi-
tate citri infra scripti pulvisculi drachm. j. indiffe-
renter infantibus, ac adultis febriculis, & non fe-
brientibus exhibere consueuimus. Qui recipit se-
minis, quod lumbricorum vocant, drachm. ij. corhu-
ceruini vlti, seminis citri, & portulacæ ana drachm.
j. & s. fiat puluis. Item eiusdem acetosifatis citri vnc.
j. & vncis: succi menthæ assumentes, laborantibus
sape salubriter tribuimus. Cataplasma insuper (ex
Aetij testimonio) confici poterit ex lupinorum fa-
rina in hydromelite decocta, illudque imponendū.
Vmbilicus autem felle taurino illiniatur, aut me-
lanthio cum lacte muliebris trito, seu absynthio, aut
abrotono pinguis fici bus admixtis. Insuper vni-
uersa spina ex medulla ceruina inungatur. Humido
etiam totū ex oleo chamæmelino, vino, absynthio,
& aloë præcordiis accommodato (ut inquit Paulus)
vtare, præsertim si agrotantes inflammationem, seu
distentionē in visceribus experiantur. Atqui nos ex
theriaca terra lemmia, luto armeno, aqua rosacea,
ac aceto medicamentum parantes temporibus, na-
ribus iugulo ac carpis vtriusque applicari præcipimus.
Et vtraque item mentha, & absynthio, ac persicæ so-
lis insimul contusis adiecto aloës puluere, lupino-
rum farina, atque torrefactis micis panis cum aceto,
& aqua rosacea medicamentum ventriculo impo-
nendum paramus. Interim chiam mastichen, ac cin-
namomum adicientes. Insuper ex absynthij, ac per-
sicæ folijs contusis, felle taurino, aloë, ac farina lu-
pinorum

Tene-
lumbrico-
medica-
ta.

pinorum adiectis, cum oleo de absinthio, & amygdalarum amararum cataplasma ex oxymelite paramus, umbilicoque imponimus. In quem etiam vsum Paulus ceratum probat sumptis aloes, absinthij, faring lupinorum, seriphij, melanthij, singulorum scrup. 6. ceræ vnc. j. s. chamæmelini quod satis est, felle taurino arida laeuigantur, & ceratum conficitur. Si autem febres non molestant, quinimo ad integritatē, aut totius morbi declinationem ventum est, acrioribus, ac efficacioribus medicamentis vtendum erit, præsertim robustis corporibus. In quem vsum seriphij decoctum, vel calaminthæ, seu ptereos vtendū, vel cardamoni semē, vel mali punici acidi radicis ius ad tertias redactum præbeto, vel fantonicum, vel abrotonum, vel etiam ambo simul cum melle in catapotia cocta, vt inquit Paulus, aut brasiæ, seu erucae semen laeuigatur, seu absynthium solum, quod etiam frequenter abunde fuit. Similiter si terni lotæ aloes scrupul. præbeantur, remedium est laudatissimum, eodem auctore, acetum etiam scyllinum præsertim ætate provecioribus confert, vt ipse inquit chamæpithos, marrubij, ac etiam helenij decoctum, thymi, & pulegij. At Celsus contritum semen viticæ, aut brasiæ, aut cumini cum aqua, vel mentham cum eadem, vel absynthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulla, vel nasturtij semen cum aceto contritum, & pueris dari iubet. Prodest insuper ab inferioribus partibus mulsam iniicere copiosiore, quo lumbrici mellis dulcedine illecti deorsum descendant, vt idem inquit Paulus. Nos verò in hunc vsum consueuimus cum pauco sale, aut saccharo lac per clysterem iniicere asinum, aut caprillum. Quandoque vero ex gallinarum, seu pulorum iure, saccharo, & ouorum luteis clysterem componimus, ac iniiciendum mandamus. Si autem putrefacti lumbrici in alto corporis, aut per pharmacorum potiones enecati non excernantur, sed potius vapores sursum mittant, educendi sunt, aut aloes, (vt inquit Paulus) aut medicamenti amari ex ea confecti portione. In quem etiam vsum, si febris valida infestet, rhabarbarum cum melle rorido in myxarum, ac tamarindorum decocto dissolutum præbere consueuimus. Quandoque etiam, febre valida non existente, agaricum imponimus, ac cum prædictis commixtum exhibemus. Neque enim (vt ipse Paulus refert) expers præsidij erit mercurii alui euacuatio: & in vniuersum omnia, quæ lumbricos educunt, aut per acridinem occidendo, aut per amaritatem subducendo, aut ad excretionem irritando, aut per consequentem ad ea quæ exhibentur, lumbricitatum efficacia cognoscuntur, vt liquet ex Aetio. At si qui sunt, qui lumbricis cum alui profluuii infestentur, eos fluorem inspissando, & concoctionem, tum per cibos, tum per cataplasmata in melius permutando curare oportet. In quantum enim fluxiones inualescunt, tantum etiam lumbricorum generatio augetur, vt idem Aetius testatur. Quæ de re præparationibus vtendum erit, inter quas plantaginis succus est præferendus, ipsamque plantaginē aridam absument, nam ex æquo vtri que & fluori, & lumbricis efficax est. Licebit autem & in hoc casu vermibus terrenis, quemadmodum antea dictum est, vti. Cōiicienda item sunt in cataplasmata ad fluxiones sistendas concinnata ea, quæ ad lumbricos sunt prædicta, & quæ fluorem nō exacerbant, velut est absynthium, abrotonum, fantonicum, malicorium, acacia, & balaustium, galla, pteris,

cisquæ similia cum cruda, hordeaceaq; farina (vt liquet ex Aetio, & Paulo.) Insuper extrinsecus ventri imponatur medicamentum ex aloes, melino, & vino. Hoc etiam appetitiam excitat: sæpius autem & absynthium cum eisdem misceatur, vt inquit Paulus. Latorum vero lumbricorum curatio licet cum præcedenti concordet, ex Aetij, & Pauli testimonio, quare iam dictis etiam vti possumus, tamen vt Galeno visum est 14. method. meden. id quod etiam videtur confirmare Celsus præcitato loco, vehementiora medicamenta lati lumbrici desiderant, quam teretes. Huiusmodi est filix (inquit Galenus eodem loco) maxime radix eius, vt idem Galenus scriptum reliquit octauo de simplicium medicamentorum facultatibus, latum enim lumbricum interficit, si quis eam drachm. iij. in melicrato ebibat, vt ipse refert. Ad quem modum mirum non est partum viuum enecare, & mortuum eiicere. Item centaury decoctum potum, & ab inferioribus partibus inditum, calaminthæ, dictamni, vel pulegij confert, vt ex Paulo liquet. Poterunt etiam & in potu vermes terreni (vt dictum est) exhiberi. Proprie autem ad ipsos facit auriculæ muris succus duorum cyathorum mensura cum vino cyti cyatho, potatus, celerrimè namque ipsos educit, vt liquet ex Aetio. Nec minus aqua potui dari debet, in qua lupini, aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectum sit contritum, vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scammonia paululum, vt Celsus testatur. Vel in hunc modum (ex Aetio) medicamentum paretur. Recipe corticis radicis mali punicæ acida in suprema parte delibrati, piperis cuiusque drachm. iij. cardamomi drachm. 6. marrubij drachm. ij. mellis despumati quantum sufficit, præbe ex eo cochlearium, post alij comediosum (vt ipse præcipit.) Id quoque medicamentum Paulus scriptum reliquit. Verum vt ex toto affectus discutiatur, vt idem inquit, theriacen quoque exhibebis. Pari modo, & qui ascarides nominantur, vehementiora medicamenta desiderant, ex eiusdē Galeni decreto, minimèq; eorum curatio negligenda est, sed citra dilationem perfici (vt inquit Aetius) debet. Quare acrimia infusa, aut absynthij decocto oleo admixto vacuandi sunt, vel centaury decocto cum nitro, & melle, aut absynthij, aut chamæleontis, aut hyssopi, vel pulegij, seu calaminthæ, aut lupinorum. Infantes verò glandibus ex melle cum salis momento vacuari debet, vt inquit Paulus. Poteris & tu prædictis glandibus adicere stercoris murium, salis gemmæ, agarici, ac pulueris hieræ simplicis parum. Vbi verò recremēta prodierint, affectus locus illiniendus est simplicibus quibusdam medicamentis, vt acacia, hypocistidis, rhoisq; succo cū alumine liquido, aut alio eiusdem generis adstringenti medicamento. Coacta etenim ab adstringentibus affecta pars corroboratur, aptitudinemque ad animalculorum generationem amittit, atque ascaridas ipsos excludit, vt liquet ex Aetio. Eadem quoque, ac similia adstringentia in aqua maris, aut adstringenti vino decoquantur, & eo calido alius foueatur, ac irrigetur. Carterum ab eodem Aetio medicamentum pueris & iis qui perfectæ sunt ætatis conuenientissimum scriptum est, id verò est, Carnem veterem salitam pinguedine derafa sublōgam, & rotundam formabimus, atque ita adaptatam podici, ac adstrictiori ani parti intrudemus, ligamentisq; adhibito, quandiu sustinere possint, inditam finemus, deinde soluemus, prædictaque infundemus,

F f

Latorum
lumbricorum
curatio, per
medicamē-
ta.
cap. 9.
8. de simpli-
facult. cap.
de filice.

Ascaridum
medicamē-
ta.

14. method.
in fine.
Aet. lib.
9. cap. 42.

Lib. 4. c. 58.

atque illinemus. Idem etiam remedium sæpius repetentes, in quam etiam figuram casei, præsertim quod vulgus siculum nominat, portio quædam si redigatur, melleque illinatur, ac sæpius immittatur, confert; ut nos non raro experti sumus. Conducit quoque ad teretes educendos etiam infantibus.

Περὶ ἰστικῶν. Id est, De hepaticis, vel iis, qui iocinoris imbecillitate laborant.

CAPVT LXXXII.

HVIC parti, quemadmodum & cæteris omnibus, duplex morborum genus euenire consuevit, Galeno teste quinto de locis affectis. cap. 7. Quorū vnum à sola intemperie citra tumorem præter naturam ortum habet, alterum vbi vnà cum intemperie tumor quoque infestat, ut inflammatio, erysipelas, scirrhus inflatio, aut à crassiss, & viscosis humoribus obturatio (idque in extremis vasorum partibus) interdum etiam abscessus, aut exulceratio ipsum exercet, ut liquet ex Paulo cap. 46. libri tertij. Nos verò de iis hepaticis affectibus pertractare hic intendimus, in quibus affectus ipse, iocinoris imbecillitas duntaxat est, nanque hos solos propriè iocinorosos, seu hepaticos medici nominare consueverunt, quando videlicet, citra aliquod manifestum in viscere malum in propriis actionibus debilitatur, tunc etenim ægrum hepaticum appellant, ut liquet apud Galenum cum quinto de locis affectis, & octauo de compositione medicamentorum secundum locos, tū etiam tertio de causis symptomatum, quem postea sectati sunt Paulus præcitato loco, Acetius capite primo lib. decimi, & Alexander capite tertio libri octauo, quemadmodum etiam celiacos & stomachicos vocare consueuerunt eos, qui neque inflammationem, neque aliquem alium præter naturam tumorem in visceribus habent, sed tantum imbecillitate laborat ventriculus, seu stomachus. Cum verò viscus hoc non vnum duntaxat, sed plures actionum facultates habeat, contingatque sæpè vnam ipsarum præcipuè lædi, interim duas, & tres, atque etiam omnes quatuor simul, ut liquet apud Galenum præcitatis locis, præsertim eodem octauo de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 6. munus autem vnius est attrahere cibum, & alimentum in sese, alterius verò ipsum attractum obuolueret, & continere donec permutans ipsum suum ipsius faciat partem, quæ facultas (permutans scilicet) principalissima, & ferè prima ipsius est, quam aliteratiam vocamus, hæc inquam concoquere, permutare, seu alterare, atque assimilare sibi ipsi alimentum debet, at ea, quæ iuxta hanc alterationem remanent recrementa per aliam facultatem, quam excretiam & expulsoriam nominamus, expelluntur, harumque facultatum quædam omnibus corporis nostri partibus communes esse dignoscantur, ceu attratrix, retentrix, & expultrix, velut etiam reliqua, quæ generatim alteratrix nuncupatur, speciatim verò huic visceri (quam principalissimam eius nominauimus) sanguifica appellari solet, vt eodem quinto de locis affectis, patet, ac sexto de Hippocratis & Platonis decretis, propterea cum iocinoris imbecillitatem dicimus, non eam, ex qua facultates illæ, quæ communes sunt singulis corporis partibus; imbecilles redduntur, intelligere volumus. Nam si hoc modo subintelligeretur, non propria esset iocinoris affectio, sed communis singulis cor-

poris partibus, veluti & tres illæ facultates attratrix videlicet, retentrix, ac expultrix communes sunt, sed eiusdem iocinoris propriæ facultatis imbecillitatem subintelligimus. Appellamus autem eam propriam, propterea quod nulli alteri corporis parti communis sit, seu cæteræ modo dictæ: & quamuis ea contineatur sub alteratrice facultate generatim dicta, speciatim tamen sanguifica vocatur, ex propria dicti iocinoris essentia, seu substantia, ac peculiari quadam eiusdem temperie orta, ex qua substantiæ proprietate, ac specie propriam quoque esse functionem oportet, veluti in singulis aliis instrumentariis partibus, ex substantiæ proprietate propria quædam functio consequitur, & propterea redditum à ventre succum sibi ipsi similem efficit, maxime nanque rubrum & ipsum cernitur, perinde ac sanguis, idcirco carni, substantiæque suæ, quæ à quibusdam Medicis parenchyma nuncupatur, quasi interfusionem dixeris, prædictum succum similem efficit. Nam vnumquodque instrumentarium animalis membrum compositum cum sit ex aliis simplicioribus partibus, proprium quiddam in substantia ita adeptum est, ut nihil aliud in vniuerso animalis corpore simile reperiatur. Nihil itaque mirandum est, si iecoris corpus ex propria sua natura functionem propriam consequutum sit, quæ quidem sanguis generatio existit (Galeno auctore præcitato libro sexto de Hippocratis, & Platonis decretis, & quarto de vfu partium) cum vnumquodque membrum succo substantiæ suæ quàm simillo nutriatur, eumque sibi alterando, & immutando præparet. Sanguinis igitur generationem nihil aliud, nisi caro iecoris procurabit, quæ quidem caro, sicut supra demonstrauimus, proprium corpus iecoris est. Cum itaque hæc oblaesa est propter imbecillitatem duntaxat ex aliqua intemperie ortam, tum hepaticum affectum peculiariter ipsum nominabimus, ac ægrum hepaticum appellabimus. Nec quispiam mirari debet, quod affecto iocinore, ac eiusdem propria substantia oblaesa, ceu quauis alia nostri corporis parte, vna duntaxat eiusdem functione vitietur, reliquis illas permanentibus, licet omnes ex proprio temperamento, ac substantia eiusdem orientur, nec quod omnes eius virtutes simul lædantur, aut aliæ magis, aliæ minus, aliæ illas in totum sint (vt Galenus scriptum reliquit tertio de causis symptomatum) non enim omnes (vt ipse inquit) similem instrumentis statum requirunt, quo fit, ut licet tota particula secundum eius temperamenti proprietatem agat, tamen in quolibet instrumento aliæ alia facultas, vel fortior, vel imbecillior sit, facta ad actionem relatione, vt eodem quinto de locis affectis, liquet. Verum cum functio hæc peculiaris ipsius iocinoris existens trifariam, velut quælibet alia, lædi possit, neque etiam si quomolibet ipsa oblaesatur, hepaticum nominabimus. Nam si ablata esset, aut eadem vitata, nequaquam hepaticus affectus dici posset, sed cum ipsa duntaxat diminuta fuerit (vt liquet apud Galenum eodem octauo libro de compositione medicamentorum secundum locos, & tertio de causis symptomatum) quo loco similem affectu iocinori incidere in hepaticis dixit, iis qui imbecillo vtri accidunt quando is quidem appetit, sed cibos, quos sibi admouet, cum non concoquat iisdem grauatur, & semicoctos ad intestina demittat, atque is quid ad vomitum quoque concitatur, Iecur autem, cum vomitione aliquid ad portionem facit, quod

Hepatici, seu iocinorosi, qui appellantur. 5. de loc. aff. cap. 7. 8. de comp. medic. sec. loc. cap. 6. 3. de cau. sym. cap. 2.

5. de loc. aff. cap. 7. 6. de Hipp. & Plato. decret. cap. 4. & 8.

Qui pro partibus sectis recitatur.

Lib. pref. pul. Lib. huius. 5. de sec. Part. 6. de par. 8. de par. 10.

3. d. sym. 8. d. mea. loc. 5. de sec. Loc.

cap. 7.

cap. 7.

8. de comp.

med. sec. cap. 6.

3. de cau. sym. cap. 2.

4. con.

quod nutrimentū per vasa quæ in mesenterio sunt, veluti per ora quedam attraxit, rursus per eadem semicoctum ablegat. Quo fit, ut hoc symptoma (ut ipse refert) semicoctorum ciborum vomitioni ad portionem se habeat. Verum quanquam id accidat circa initia, nondum magnam debilitatem hepate habentes, sed adhuc concoquere, & alimentum alterare veluti in formam sanguinis potente, aucta tamen affectione distributum alimentum diminutè coactum ad sanguinem in viscere prius existentem admiscetur, corrumpiturque temporis progressu etiā hic vna cum alimento circa ipsum non concocto, ut prædicto libro 8. de composit. medicam. secundum loc. cap. 6. patet: exinde fit, ut nedum diminutè, sed etiā deprauatè functio oblaesa sit. Ex his itaque constat affectionem hepaticam, de qua hic verba facimus, nihil aliud esse, quam imbecillitatem actionis propriæ eiusdem iocinoris ex aliqua intemperie ortam circa aliquod aliud manifestum in viscere malum. Nam omnium facultatum essentiam in peculiaribus partium temperaturis consistere clarum est in Galeni doctrina, præsertim libro primo de prælagitione ex pulsibus, libro de multitudine, ac quinto de locis affectis. Proinde non ab re, cum iecur ad aliquam octo intemperaturarum labitur, viribus ipsius, ac propriæ eius facultati noxa accidit. Quod verò in hac affectione iecur oblaesum sit, ex eiusdè propriæ facultatis noxa liquet. Percipitur autem ea ex specie excretionis (veluti etiam assimularunt, qui ante Galenum fuerunt) maxime simili carniū loturæ, præsertim cruentarum, atque recentè enectarum. Quinimod si quis id, quod excernitur, aquosum sanguinem nominet, clare quoque illud interpretari videretur, quemadmodum scriptum est ab eodem Galeno prædictis locis, tertio scilicet de causis symptomatum, octauo de compositione medicamentorum secundum locos, & quinto de locis affectis. Nam si faci sanguinis similia per aluum excrementa deiciantur ita quod qui excernitur sanguis & nigrior quam pro natura, & splendens apparuerit, vtpote sanguine, & nigra bile commixtis, licet iecur affectum quoque esse coniciendum sit (ut eodem quinto de locis affectis, liquet) indicium tamen est ipsius hepatis superflantis sanguinis. Quare eius affectio humidæ deiectioni ventris est assimilis, quæ ad exactam quidem perducta est concoctionem, non tamen diductionem est consequuta. Nam sicuti hanc quoque venter omnino ab ipsa grauatus excernere cupit, sic iecur vbi affatim diducti in ipsum nutrimentū fructū capit, non patitur id amplius apud se morari. Cum verò id recta progredi quauis ex causa nequeat, necesse est retro ad ventrem recurrat, & propterea is, quem mox diximus, sanguis in tali affectione apparet, in qua non in propria essentia, veluti in modo dicta affectione iecur affectum est, nec peculiaris eius actio oblaesa, sed propter frustratam sanguinis diductionem ab eius multitudine grauatum, cum amplius retineri non possit, necessum est retro iterum ad ventrem, ac intestina recurrat. Deuenit autem ad dictum statum, qui ex ventre in iecur deductus est fuscus, cum is, propterea quod vterius in corpus non diducitur, inibi diutius moratur. A nonnullis autem talis excretionis species dysenteria quoque nominatur, ut liquet tertio de causis symptomatum, seu prædicta cruenta deiectione, quæ ex iocinoris imbecillitate prouenit, appellari consuevit eodè Galeno teste libro quarto de articulis. Quæ-

uis errent (ut ipse inquit quarto de locis affectis.) hinc affectum putantes esse dysenteriam. Alexander hepaticam dysenteriam appellat. Interim verò contingit, quod pars aliqua cum affecta sit, viribus ipsius iam factis robustioribus, præsertim ob expultricis facultatis robur, per ipsum hepar expurgetur, etiam dum integra constat valetudine: sed tantum ratione plenitudinis affecta, & proinde excretio sequitur synceri sanguinis, similis ei, qui ab hostia interfecta profundi consuevit, ac per circuitum repetit. Id autem euenire solet, vel mutilato aliquo membro, aut vbi quis in exercitatione educatus ad otium se conuerterit, vel etiam mulieribus retentis menstruis, qui etiam affectus à nonnullis cruenta dysenteria vocatur, in qua affectione neque iecur ipsum oblaesum est, quamuis per ipsum partium aliqua purgetur, propter aliquam iam dictarum causarum. Cum itaque sanguinolenta excretionis per sedem (præter eam, quam in propria iam dicta dysenteria euenire diximus) tres sunt differentie, ut eodem tertio de causis symptomatum, scriptum est, ea duntaxat iecur in eius propria essentia, ac facultate oblaesum esse ostendit, in qua per alium excernitur sanguinolentus humor, talis consistentie, veluti si quis sanguinem cum aqua confudisset, seu velut si quis victime recens mactatæ carnes aqua lauisset (ut diximus.) Nam in aliis duabus, aut iecur oblaesum non est, aut secundum aliam quandam facultatem noxam patitur, in qua item affectione sensum homo, moraque temporis læsionem in alimento, & colore contrahit, seu sexto de Hippocratis, & Platonis decretis scriptum est. Ex quo duntaxat colore iecur affectum esse nouit Galenus (ut patet quinto de locis affectis.) Quod verò ex eiusdem propriæ facultatis læsionis modo qualitas affectus percipi potest, nulli in dubium venit. Est autem id sympt. in genere noxæ functionum naturalium, alteratricis scilicet, ac magis speciatim sanguificæ ipsius iocinoris, quæ non ablata, neque deprauata est, sed diminuta, ac imbecilla. Cuius imbecillitatis causa quævis intemperies esse poterit, ut etiam dictis colligitur, & licet hæc intemperies possit generari circa contentas in ipso iocinore venas & arterias, & iuxta materias in ipsius ipsarum contentas, necnon iuxta propriam ipsius hepatis substantiam, quam Erasistratus πᾶσις, quæ Græcè appellat, affusionem, seu perfusionem Latine dixeris, ut eodem octauo de compositione medicamentorum secundum loc. cap. 6, a Galeno scriptum est, quoniam facultas hæc, quæ sanguificatur, in iocinoris proprio corpore, seu propria substantia consistit (ut sexto de Hippocr. & Platonis decret. cap. 8. liquet) propterea & eadem substantia, seu idem corpus intemperatum reddi oportet quo affectus hic generationem habeat, non negantes, quod interim primò, interdum vero secundariò ipsum obladi possit, tunicis videlicet vasorum, aut humoribus in eorum cavitatibus contentis, siue uti si que primario affectis. Calida igitur intemperie circa hepar existente, imbecillitatem quæ iocinoris generante colliquationes sunt primum humorum, deinde etiam carnis ipsius hepatis, & euacuatur per ventrem bilis crassa, graueolens & abundè colorata, quemadmodum in pestilentibus febribus contingit, assat præterea eadem, & adurit cum contentos in ipso humores, tum eos, qui per mesenterij venas deferuntur. Item in ea inappetentia adest, sitis vehemens, febris insignis, ac viciosorum humo-

Quid sit
propterea
hepaticæ af-
fectionis, seu
recentis imbe-
cillitas.

Lib. 1. de
presagi. ex
puls. cap. 4.
Lib. de mul-
titud. cap. 3.
5. de loc. af-
fect. cap. 7.
Partis af-
fectus digno-
scitur.

6. de
poc. 1.
cap. 8.
7. de
3.

3. de causis
symptom. c. 2.
8. de compo-
sitione medicam.
loc. cap. 6.
5. de loc. af-
fect. cap. 7.
Loco citat.

cap. 8.

cap. 7.

de compo-
sitione medicam.
apud Galen.
de causis
symptom. cap. 1.

cap. 2.

4. de artic.
comment. 40.

5. de loc. af-
fect. c. 10.
Alexand.
lib. 8. cap. 3.

Sanguine-
lenta excre-
tionis differe-
rentia quos
sint.
cap. citato.

6. de Hippo-
cratis decret.
cap. 3.
Loco citat.
Quæ affe-
ctus sit.

Causæ.

Si ex calida
intemperie
fiat, siue
qua.

rum vomitus, Galeno teste octauo de compositione medicamentorum secundum locos, & quinto de locis affectis. Sape etiam æruginosa vomunt, ac similes apparent deiectiones. Linguam habent scabram, corpus sicum, & gracilius videtur tanquam iecore colliquefcente, & in cruentas sanies cõtabescente. Temporis autem spatium etiam ex ipsa substantia tandem particule longè sordidissimè deferri cernuntur, Alexandro teste præcitato capite tertio libri octauo. Caterum (vt ipse inquit) ex temperamento ægri, ætate, anni tempore, & prægresso victu reliquum licet firmioris cognitionis gratia capere. Nam temperamento calidi sunt, & tenuous habitus, pilosque densos habent, curis dediti, & animo iracundi. Qui verò ex frigida iocinoris intemperie laborant, eis neque assidua excretiones, neque multae fiunt, durat tamen affectus diutius, & per aliquos dies profluet ipsis venter maiori copia, cuius neque faecor similis est iis, quæ ex calore sunt liquefacta, neque color similis, aut cõpages, verum minùs graueolentia ab his excernuntur, specie putrefacti sanguinis, non colliquata carnis habentia, aliquando id quod excernitur, veluti sanguis niger apparebit, verum diligenter consideranti neque sanguis niger est, neque grumus, sed velut limus quidam sanguinis crassus, qui propè ad atram bilem accedat. & plures, ac ægrè iudicabiles colores circa eiusmodi affectionem in egestionibus apparent, & nonnulli eorum, non solum non perdunt cibi cupiditatem, verum etiam interdum multò magis, quam antea se appetere aiunt, contentos autem in iocinore humores crassos, atque ad fluxum, & motum contumaces reddunt, id verò, quod ad ipsum fertur & pituitosum, & crudum, & semicoctum efficiunt, quemadmodum Galenus præcitatis locis scriptum reliquit, facies in istis non collabatur, febris tamen languida in eis apparet, reliquum etiam corpus, temperamentumque ad frigidius magis inclinare videtur, ad hæc præcedens victus talis deprehenditur, item vita ociosior, balnea copiosiora, & intempestiua, eaque post cibum, vt ex Paulo, ac Alexandro liquet. Vbi autem sicca fuerit iecoris intemperies, recrementa ficciora erunt, corpus siccius, & tenuius, sitim magis conciliat, & deiectiones alui paucae, & crassiores apparebunt. Quemadmodum, si humida fuerit neque sitim efficiet, neque siccitatem, sed magis etiam lingue humiditatem, neque vlla sitis vrget, & vultus, totumque corpus diu non collabatur. Postea autem deiectiones ventris plurimæ apparent, magisque tennes, & aquosiores reddit humores, vt liquet ex præcitatis auctoribus. Si autem humida, vel sicca intemperies calida, vel frigida fuerit admixta, hæcmet indicia ipsam demonstrabunt insimul permixta, & prout variè permiscetur, varias indicabunt compositas temperaturas. Huius affectionis curatio haudquaquam despicienda est, quoniam nonnulli propter curantiū incertiam (vt Galenus inquit quarto de articulis) perierunt. Quomodo autem causa fuere medicandi, vt ægrè morerentur, ibidem declarauit. Ex calida item intemperie, si iocinoris imbecillitas fiat, quamprimum ritè curari debet. Nam temporis spatium colliquationes ex ea fiunt, primum humoris, deinde etiam carnis ipsius hepatis, quinimò totum corpus absumitur (vt ex Galeno, & Paulo liquet.) Nec minùs, si ex frigida intemperie ortum duxerit, parui facienda non erit eius curatio. Nam tractu temporis, corrupto in viscere sanguine, febris

superuenire solet, quæ tamen ab imperitis medicis vsque adeò negligitur, vt laborantem interdum nequaquam febricitare putent, quinimò si vltro ea intemperies frigida augeatur, permucabitur ad aquam intercutem, quemadmodum idem Galenus quinto de locis affectis, scriptum reliquit. Scopus autè curationis in huiusmodi affectionibus communis, ac primus est, iuxta intemperiei contrarietatem, hoc est, vt intemperiem ad contrarium deducamus. Peculiaris autem vnicuique per cuiusque contrarietatem: nam calidam dispositionem semper refrigerare oportet, frigidam verò calefacere, similiter humidam exsiccare, & siccam humectare, Galeno & Aetio testibus. Caterum pro scopo perficiendo, quæ à parte affecta sumitur indicatio adicienda est, cum princeps membrum sit, iecur vniuerso corpori dispensans alimenti materiam. Quæ de re omnibus hepaticis remediis, pro quacunque intemperie curanda, tum quæ per os sumuntur, tum quæ forinsecus imponuntur, aliquid ex adstringentibus admiscere oportet, quo firmitas visceri conferretur. Id quod scriptum reliquit Galenus 13. method. medendi, quem postea sectati sunt Paulus, & Aetius. Si igitur calida fuerit iocinoris intemperies, ægr eligendus est ad frigidum vergens, formis moderatus, atque nocturnus, quies præcipienda, curaque oportet vt alius humecta sit. Quod si natura perfici nequeat, arte perficiatur lenitibus clysteribus. Immodicæ animi perturbationes cauendæ sunt, ira præsertim, curæ, ac sollicitudines. In vniuersum autem cibi erunt, qui mediocriter refrigerant, nec obstruant, vt inquit Paulus, atque illi magis deligendi sunt, qui probè distribuuntur, & robur, temperiemque inducunt, & vim abstergendis visceribus, aperiendisque efficaciam habeant, Alexand. teste. Quapropter cremor ptisanæ, atque etiam ipsa ptisana magnopere conducunt. Seris item, & cichorium interim crudum, interim coctum cum coriandro assumptum. Item decoctum ipsius, succusque epotus, denique melle iniectus & calidis, & frigidis iocinoris vitiis opitulatur, vt inquit Paulus, eiusdem quoque generis sunt intubus, & fontichus, & cætera, eiusdem Pauli, & Alexandri auctoritate. In hunc etiam vsum lactuca quoque dabitur cum apij radice, & betæ percocta, aut eadem per se, licet commodior sit, si acetum inter coquendum recipiat: vt idem refert Alexander. Quandoque eadem, & reliqua modo dicta olera in Gallinarum, seu pulorum iure decoquantur, quamuis multa iura, præsertim pingua vitanda sunt, eorundem etiam pulorum, seu gallinarum, perdicum, seu phasianorum, turdorum, aut turturnum, & paruarum auium carnes gustare poterunt cum aliquo prædictorum olerum decoctas, anserum quoque ventres conferunt, quemadmodum anates, ac omnia, quæ in paludibus degunt, nequaquam offerri debent. Saxatiles pisces offerri possunt, & si non admodum magna fuerit calida intemperies, aut obstructio iocinoris, cibos validos offerre conuenit, qui ægrè conficiantur, vt patet ex eodem Alexandro. Caterum fructus pomacei, pepones, mala dulcia, & cotonea bene maturata præberi possunt, item malorum puniceorum grana, & ante cibum modicum, & cum pane dare conuenit, nam iecur admodum imbecille, & stomachum collapsum firmare possunt, vt idem inquit Alexander, maxime si æger ingenti siti crucietur. Præberi insuper possunt cerasia, & pyra adstringentia,

Si ex frigida intemperie laborant signa.

Si ex sicca signa.

Humide intemperiei signa.

Prognostica. Comment. 40.

Galen. de compositione medic. sec. loc. cap. 6. Paul. lib. 3. cap. 46.

gentia, forba, vel mespila, non tamen sapius adhibita. Caltaneæ quoque turd sumuntur, nam boni succi sunt, & non citò à calidis intemperiebus corrumpuntur, præsertim decoctæ. Verum nihil adeo hepaticis opiculatur, vt vua passa, quæ licet contempnibilis videri possit ob familiarem eius usum, vt Galenus inquit octauo de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 7. hoc ipsum tamen (vt ipse refert) eam facit vtiliorem, nam cum familiaris nobis sit, intantum adstringens est, quantum opus habet viscus affectum. Habet autem & vim concoctoriam crudorum humorum, & vini coercendi magna, estque ipsa haud facile putredini obnoxia, & ultra hæc secundum totam substantiam visceri ipsi familiaris est, & propria. Noces autem, pistachia, & noces pineas vitare oportet vt inimicæ (eodem Alexandro auctore.) Pro potu vinum omnino circumcidatur, nisi altera ob causam (nempe stomachi imbecillitatem) illud requirant, tunc etenim tenue, & quod Græci *διήγησάρον* vocant, & dilutum aliquod exhibeatur, vt Paulus præcipit. Verum pro eo vtantur succo malorum puniceorum acidorum, aut aqua hordei, seu aqua in qua cichorium fuerit decoctum, aut feris, siue fenchus, adiectis coriandri seminibus preparatis. Asclepiadis auctoritate, Galenus octauo de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 8. nonnulla medicamenta pro huius affectionis curatione approbavit, inter quæ primum est, si succi cichorii cyathum vnum cum aquæ calidæ cyathis tribus dabis, mellis atici cochleario addito, quod medicamentum Asclepiades Antonij Musæ esse dicebat, aut picridis recentis, seu seridis recentis succi cyathum vnum cum aquæ mulsæ calidæ cyathis tribus. Est namque prædictorum oleum, præsertim cichorii, & seridis facultas subfrigida, & subamara, ac moderatè adstringens, & propter has qualitates optima pharmaca calidis intemperaturis ipsius hepatis exsistunt, vltra hoc enim quod moderatè refrigerant, vilius & robur visceri addunt per adstrictoriam facultatem, insuperque commissuras osculorum venarum in sum visceris parte ad eas, quæ in gibba sunt, extergunt, neque frigidas intemperies magnopere lædunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem absque adstrictione, aut amaritudine possident, facere solent. Vtilis autem non fucus ipsorum est, tum recens, tum exsiccatus, sed & ipsa olera exsiccata, tursique, ac trita potui inspersa, & eorum decoctum in potu acceptum, similiter & radices ipsorum, præsertim cichorii. Eiusdem quoque Asclepiadis auctoritate medicamentum approbat ex radicis chamæpithyos drachm. viij. radicis cichorii drachm. iij. contulis, & melle cocto exceptis, si eiusdem nucis ponticæ magnitudinem præbeas, & aquæ calidæ cyathos tres insuper bibendos. Atqui melius fortè esset radicis chamæpithyos drachm. iij. radicis cichorii drachm. viij. affumere. Ex Archigene autem trifolij acidi decoctum ad tertias, & per triduum bibendum, datum pro vice cyathum vnum commendat, aut radicis rubi corticis heminam vnam, cum aquæ congio vno in nouo vaseculo ad residuum quartæ partis coquito, & ad succum per noctem sub dio expositum mellis cyathos sex admisceto, & ieiunis ad triduum bibendum dato. Similiter senecionis decoctum, tanquam valde commodum approbat. Aëtiis quoque præter feridis, ac intubi succum, senecionis etiam succum, aut decoctum, seu etiam perdicij succum com-

mendabat. Quinetiam Philonis antidotus semel tamen exhibita (vt ipse refert) omnem aliquando calidam intemperiem mirabiliter sanauit, id quod prius scriptum reliquerat Galenus eodem octauo de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 7. Nec mirum si semel tantum exhiberi debeat, quoniam (vt idemmet Galenus testatur) nullum hepaticum pharmacum vehementer refrigerans esse debet. Nos verò ex cichorii succo, seu hortulanæ (quam scariolam vocat) syrup. parari præcipimus, ac prædictis exhibemus, interim oxylaccharum, aut syrup. ex succo, vel infusione rosarum adiucentes. Item in morsulis medicamentum componimus, quod recipit triasantalorum drachm. j. diarhodon abbatis scrup. j. seminis cichorii scrup. s. vuarum passiarum drachm. iij. seminum melonum drachm. iij. sacchari dissoluti in aqua rosarum, & cichorii quantum satis sit, formentur morsuli, quorum quilibet sit ponderis vnc. i. exhibeaturque cum pauca aqua, in qua folia, & radices cichorii, vel hortulanæ endiuia fuerint decoctæ. Extrinsecus autem epithemata adhiberi possunt. Vt Recipe succi cichorii, & hortulanæ endiuia, & lactuæ, seu solani, singulorū vnc. iij. aque rosarum rubearum, & cichorii, seu endiuia ana lib. j. santalorum, corallorum rubeorū, cuiuslibet drach. 4. aceti albi vnc. 2. misceantur, & fiant epithemata, æstate subfrigida, hyeme verò actu calida. Potetis insuper hoc vnguento vti, Recipe olei rosacei, de absinthio, myrtini, & de papauere, seu nymphaeana vnc. i. santalorum omnium, & corallorum rubeorū ana drach. 2. succi cichorii, & lactuæ, singulorum vnc. s. aceti parum, & ceræ quantum sufficit, fiat vnguentum. Insuper ex folijs plantaginis, & cichorii, ac malo cotoneo in aqua & oleo rosaceo decoctis, ac contulis, adiecta hordeacea farina & exiguo croco cum paucis aceto, fiat cataplasma, & vtere. At vbi frigida intemperie iecur laboret, contrariis pugnandum est. Quapropter vniuersa victus ratio ad calidum vergere opus est. Cibi qui promptè concoquantur, ac boni nutrimenti sint offerendi, hinc panis cum vino rectè assumitur, Alexandro & Paulo testibus, ex oleribus brassica bis, tærve incocta potius cõuenit in gallinarum, pullorum, seu perdicum iure, phasianorum, aut starnarū, item carnes prædictarum gallinarum, perdicum, phasianorum, pullorum, starnarum, aut turdorum, aliarumque paruarum auium gustare, atque anserum ventriculos, vt inquit Alexander. In quarum carniū iure serpillum, saturcia, hyslopum, sceniculus, sampsuchus, oreoselinum, ac similia decoqui poterunt, condien- daque iura sunt, cinnamomo, aut caryophyllis, interim quoque, sed rarò, prædictas carnes assas edat, præsertim cum alios cibos ægri fastidiant. Inter pisces maximè omnium nullus, etiam si assetur, conducit. Insuper castaneæ mediocriter assæ iuuant, si non admodum crebrò edantur. Cõueniunt quoque & vuæ passæ. Pistachia autem, & amygdalæ caueri debent, eo quod faciliè corrumpantur, & oleosa sint, promptèque in bilē mutantur, & recrementum asperius reddant, vt hinc venter magis, crebriusque irriteretur, vt ex eodem Tralliano libro octauo cap. 4. liquet. Pro potu vino vtantur, præsertim tenui & odorifero, nam ipsum conuenientissimum existit, quoniam nutrit, concoquit, roborat, & putrefactioni resistit, & si intemperies ex humiditate facta sit, & frigiditate, eam citra omnem mole- stiam, ac securè sanat, Galeno teste eodè octauo de

Topica

Si ex frigiditate intemperie iecur laboret curatione.

*Medica-
mentorum
ratio.*

*Gale. libro
citato, ca. 8*

*8. de com-
positio. me-
dicam. sec.
loc. cap. 7.*

compositione medicamentorum secundum locos, cap. 7. Quod ad medicamentorum rationem attinet, calfacientia adhibeantur. Verum magis, minusve calfacientia, pro frigiditatis obtinentis magnitudine accommodare oportet, ut idem inquit Galenus, in quem usum filicis, vel anethi succi cyathum unum cum aqua mullae cyathis tribus dato, ex Asclepiadis auctoritate. Item nardi celtice partes tres, absynthij partē unam, tusa, & cribrata melle cocto excipito, & mystrum delingendum dato. Vel Recipe anisi, seminis apij, asari, amygdalarum amararum mundatarum, singulorum drach. 4. præpara cum aqua, & reduc in pastillos, ac exhibe drach. 1. cum vini diluti cyathis tribus: febricitantibus autem cum aqua mulla, aut costi triti cochlearium præbe cum aqua mulla calide cyathis tribus. Insuper fœniculi recipe drach. 1. petroselinii drach. 2. anisi, amygdalarum amararum, absynthij, singulorum drach. 1. croci myrrhæ utriusque obolos tres, excipe aqua, ac redige in pastillos, & dato drach. 1. ut supra dictum est. Hæc ex Asclepiade. Verum eorum medicamentorum quædam magis, quædam minus excalfaciunt, ut liquet ex componentibus ipsa. Propterea cisdē vtare, pro ut, intemperies exigit. Similis quoque ratio habeatur omnium, quæ infra conscribentur intus, & extra adhibita. Atqui idem Galenus præcitato loco antidotum Cyphoidem, ex Andromachi auctoritate magnopere commendat, ac cuncta, quæ eius compositionem ingrediuntur, accuratè examinat. Eius autē descriptio talis est, Recipe vuar passæ carnis drachm. 2. 5. aliis centum. croci drach. 1. aliis obolos 3. calami drach. 2. s. bdellij drach. 2. s. cassiæ sesqui drachmam, cinnamomi obolos 3. spicæ nardi drach. 3. floris iunci odorati drach. 2. s. myrræ drachm. 4. terebinthine drach. 4. ramentorum aspalathi drach. 2. mellis drach. 16. vini quod satis est. Aëtius calfacientibus, ac firmitatem addentibus vtēdum esse præcipit, velut est, nardi spica, capnium, semen pelecini, & quæ his similia existunt. In quem etiam usum miro quodammodo conducit compositum Galeni ex malorum cotoneorum succo medicamentum, in fine 6. libri de sanitate tuen. descriptum, non magis salutare (ut ipse refert) iis quibus venter imbecillus est, quam iis quibus inualidum iecur existit, ceu ipse in nonnullis, præsertim in primogenito filio illustri Ducis Thermularum expertus fuit, qui ex iocinoris intemperie frigida, hepatica dysenteria (ut dicunt) laborabat, quibusdam tunc temporis medicis inuitis, corpore tamē prius purgato, ut cap. de diarrhœa, scriptum est. Eius autem compositionem, ac assumendi modum cap. de *ἀνὸς ἐξία*. studiosi requirant. Poteris etiam in eundem usum præbere syrup. ex absynthio, ex fumarie succo, aut de byzantiis cum additione, seu de eupatorio, ac nonnulla antidota calfacientia, ceu aromaticum rosaceum, dianisum, diacinnamomum, diarhodon abbatis, diacalamyntham, & reliqua huiuscemodi, vel hoc nostro efficacissimo medicamento vtare, Recipe seminis anisi fœniculi, apij, & plantaginis singul. grana 4. costi, glycyrrhizæ ana scrup. 1. cassiæ lignæ, cinnamomi utriusque scrup. s. vuar passarum drach. 3. croci, spicæ, calami aromatici, & schœnu anthus, ana grana 2. s. cornu cerui vsti, & amygdalarum amararum cuiuslibet drach. 1. seminum melonum drach. 4. sacchari dissoluti in aqua rosacea quantum satis sit formentur pastilli, quorum vnum vice qualibet assumat cum exiguo vino albo odorifero. Si vero tractu temporis, ob frigidam intemperiem

humor etiā pituitosus sanguini permixtus in viscere putrescat, seu corrumpatur, retineaturque in ipso iocinore, aut venis circa ipsum, ac febris superueniat, ipsum euacuare oportet, his medicamentis, quæ nedum educendi pituitam facultatem habent, sed etiā viscus ipsum roborandi, cuius farinae agaricum est (Paulo auctore) quæ sectatus est Arabum princeps. Id quod nedum ratio, & auctoritas, sed experientia comprobatur. Nanque prædicto ægro, reliquis medicis omnino pugnantibus audacter exhibui, exigua quantitate myrobalarum chebularum, ac rhabarbari adiecta, nedum semel, sed bis, ac feliciter succelsit, ceu in nonnullis aliis & ante, & post eum expertus fui, quemadmodum cap. de diarrhœa, & rursus conscripsimus. Nec minus, si circa ipsum iecur biliosus retineatur fucus, medicamento ipsum educente purgandus erit, quod vim etiam habeat ipsum corroborandi, veluti rhabarbarum est, ac reliqua, quæ eodem cap. de diarrhœa, ac dysenteria, recensuimus. Nanque in hunc usum (ut Paulus refert) idonea medicamenta, quæ ad celiacos, & dysentericos scripta sunt, deligi debent. Extrinsecus vero illitiones faciendæ sunt ex oleo chamæmelino, nardino, anethino, fampfuchino, & lentiscino, seu de absynthio. Vel in hunc modum vnguentum paratur, Recipe succi eupatorii, marrubij, fumarie ana drach. 3. asari, spicæ nardi, & celticæ ana scrup. 1. cinnamomi, iunci odorati, & ligni aloës ana scrup. s. olei rosacei, chamæmelini, & de absynthio ana vnc. 1. cere quod satis sit, & aceti parum, misceantur, & fiat vnguentum. Item ex fœnugraci, farina hordeacea, seminis lini, ac lupinorum ana drach. 4. florum chamæmeli, eupatorii, absynthij, meliloti, & iunci odorati, singul. scrup. 1. myrrhæ, mastiches, & corticum thuris cuiuslibet drach. s. olei anethini, nardini, rosacei, ac de absynthio, cuiuslibet drach. 1. cera, quod satis sit, fiat ceratum, & vtare. Nec minus & epithemata quoque conueniunt, quæ in hunc modum parentur, Recipe succi eupatorii, marrubij, fumarie, ac cichorij ana lib. s. deinde Recipe radices capparorū, filicis, & cichorij, cuiuslibet drach. 3. absynthij, florum chamæmeli, ac foliorum plataginis ana p. s. chamædryos, chamæpityos drach. 4. seminis dauci, anisi, & fœniculi ana drach. 1. spicæ, itœchadis drach. 1. s. fiat decoctum secundum artem in aqua pluuialis sufficienti quantitate, de quo Recipe lib. 2. miscetoque cum prædictis succis, ac aceti vnc. 2. adiciro, & vtare. At quoniam humidæ huius visceris affectiones exolutum, & imbecille ipsum facere solent, veluti sunt articuli laxati, siue cum frigiditate, siue cum caliditate, siue sine his laxatis ipsius sola consulterit, pernitens adstringentibus pharmacis opus habent (Galeno auctore octauo de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 8.) Verum hoc (ut ipse inquit) aut cum calfacientium mixtura, si frigida qualitas prædominetur, aut cum refrigerantium, si calida. Aëtius verò in humidâ intemperie, iisdem oleis discutientia, ac resiccantia incoquenda præcipiebat, veluti est iris, cuminum, ac ruta. Olea autem, quæ ipse conscripserat, erant chamæmelinum, lentiscinum, nardinum, absynthinum, ac rosaceum. Similiter vbi sicca iecur laborauerit intemperie, per contraria curanda erit, atque (ut inquit Aëtius) humectans victus ratio commoda existit, ac balnea sufficiunt dulcium aquarum, quanquam cerata, epithemata, ac fomenta extra (quæ humectare possunt) adhibere non erit alienum. Nunquam tamen ab iis,

ab iis, quæ vim adstringendi habent, absolunda erunt. Vnum tandem restat medicamentum conscribendum, quod indifferenter cuiuslibet hepatis imbecillitati à quacunque causa ortæ præberi poterit. Nanque à proprietate totius substantiæ efficax existit, non autem secundum vnam, aut alteram qualitatem, cuius abunde experimentum habuisse fateatur Gale. præcitato loco, quem sectati sunt Aëtius, & Paulus. Id autem lupinum iecur existit, cuius diligenter triti pondere drac. i. cum vino aliquo dulci præbetur, quamvis febricitantibus manifesta febre, aut non obscure, melius sit ex aqua calida pharmacum præbere, aut ex aliquo prædictorum succorū, veluti est feridis, aut cichorij, eiusdem Galeni præcepto. Quanquam idem et de simpl. medicament. facultat. de lupino iecore, sic scriptum reliquerit, lecur lupinum sæpenuerò medicamen indidi hepaticum, quod ex eupatorio conficitur, nec tamen, quod mentione dignum sit amplius præstare compari, ad illud videlicet comparans, quod sine ipso componitur, fortè quoniam per se solum exhiberi debet, quemadmodum præcitato libro octauo, & sexto de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 2. scriptū reliquit, & non aliis comixtum, quæ manifestis qualitatibus operantur. Nam ipsum à totius substantiæ proprietate efficax est, ut diximus, aut Asclepiadis verba sunt, dum dixit, cuius abunde experimentum habemus: cuius etiam auctoritate hoc medicamentum etiam à tota substantia efficax commendauit, videlicet: Cochlearum trium carum valde probe terito, & affusis vini nigri cyathis tribus calfacito, & bibendum dato.

Περί τῆς ἡπατος ἐμπροσθεν.
Id est, De hepatis obstructione.
CAP. LXXXIII.

INTER alios instrumentales affectus quibus crebro iecur laborare contingit, potissimum is est, qui à Græcis ἐμπροσθεν, à Latinis obturatio, oppilatio, seu obstructio dicitur, idq; geminam ob causam, ob eius videlicet constitutionem, ac eiusdem actionem (Galeno auctore lib. de constitutione artis medicæ, cap. 17.) ob constitutionem inquam, nam venæ, quæ à portis in sima prædicti visceris vniuersa finduntur, ac in tenuissimas extremitates finiuntur, quod quidem haud obscure apparet, oscillis, quæ in gibbo sunt distributæ, à caua vena ortæ sensu obscuro committuntur, nam quomodo per sua ora ipsæ inter se coniungantur, videre nequaquam possumus. Nemo tamē dubitat (ut liquet ex eodem Galeno quinto de locis affectis, cap. 7.) sed omnes ferè medici ex vno ore enunciant, quod cibus vniuerso corpori distributus, ex omnibus simarum partium venis exiens, ad gibbas partes per dictas extremitates transfunditur. Alimētum etenim omne sursum ex vetriculo ad locum vnum affertur iecoris, quem ab hoc ipso, quod nunc dictum est, portam nominant, cum neque vrbes introire quis potest, antequam in portas peruaserit, neque prius penetrare in iecur alimētū, quam ad id loci peruenerit. Inde autem in sima vniuersa distribuitur iecoris, postea per quos diximus fines in gibbum transfunditur. Ob dictorum ergo vasorum angustiam nil mirum, si crebris obstructionibus iecur laborat. Additur & secunda causa, quæ est eius actio ἀπιδρωσις, inquam, hoc est, sanguificatio, est nanque sanguinis

officina (ut diximus) vniuerso corpori eum pro alimento suppeditans. Quo fit, ut ob copiam permeatis substantiæ adhuc crebro viscus obstructione corripatur, quemadmodum à Galeno eodem libro de constitutione artis medicæ, cap. 17. scriptum est. Verum cum in eo non vna tantum adsit cauitas, quæ viciatam humiditatem suscipere possit, veluti venter, & intestina, sed tot sint numero, quot sunt arteriæ, & venæ, & hæc omnes angusta oscula habeant, quæ parte sima huius visceris cum gibbis coeunt, ac committuntur, propterea eisdem partibus totidem etiam obstructiones, seu oppilationes generari cōtingit, ut ab eodem Galeno octauo de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 6. decretū est. Caterum cum partium cauitates multifariam lædantur, ut propterea quādoque coalescant, interim cōstipentur, seu constriuantur, aut in sese resideant, aut obstruantur, quandoque verò ipsarum oscula aperiuntur, ut liquet libro de causis morborum, cap. 7. Apertione hac relicta, simul & coalescentia, constipatione, residentia, ac cōstrictione, hoc loco nos de obstructione earum duntaxat verba facere intendimus, prout vnus duntaxat ipsius visceris affectus existit, non cum altero morbo compositus, veluti phlegmone est, erysipelas, aut reliqua huiusmodi. Est autem ea læsio, seu amissio prædictarū iocinoris cauitatum, ex infarctu alicuius substantiæ, humoris videlicet, seu flatuosi spiritus, quemadmodum ex Galeno colligitur, quinto de locis affectis, cap. 7. ac aliis plerisque locis. Ex quibus error patet eorum, Arabum præsertim, qui volunt interim iecur ipsum in eius propria substantia, quæ ἀπιδρωσις, dicitur obstructione laborare. Nanque perpetuò in extremis iam dictis vasorum partibus fieri conuenit, veluti præcitatis locis apud Galenum scriptum reperitur. Nec in eadem visceris substantia cauitates, aut viæ adeo sensiles sunt, ut eadē obstrui possint, quāquam spatia quædam, tantum ratione contemplabilia, in ipso, velut in reliquis partibus, reperiantur, iuxta quæ etiam si oppleta sint præter naturam obstructio, seu oppilatio non dicitur, ut libro de differentiis morborum, cap. 7. & de causis morborum, cap. 7. scriptū est. Afficitur itaque iecur in hoc affectu nō ut similis pars, sed ut instrumentum secundum prædictas partes, venas scilicet & arterias, per quas ἀπιδρωσις, seu distributio alimenti efficitur. Dignoscimus autē ipsum obstructione laborare, ut ex Gale. percipitur secundo de locis affectis, cap. 8. & quinto de locis affectis, cap. 7. tum ex dolore cum posito, tum etiam ex qualitate prædicti doloris. Nam in dextra hypochondriorum parte dolorē sentiunt laborantes, eumque grauatiuum, & præcordia etiam veluti suspēsa, quāquam dolor hic interim fit obtusus, aliquando verò vehemens (ut inquit Aëtius cap. 2. lib. 10.) qui iterū asserit quandoque absque febre quandoque cū febre esse, quamquam Gale. præcitato libro 2. de locis affectis, cap. 8. (quem sectati sunt Paulus cap. 46. libri 3. & Alexander cap. 2. libri 8.) velit hunc sensum doloris grauatiui in dextra præcordiorum parte citra febre muenire, cum in obstructione (ut ipse refert) tum etiam cum hepar dura dispositione laborat. Verum nō propterea condemnandus venit Aëtius. Nam idemmet Galenus lib. de constitutione artis medicæ, cap. 17. febre superuenire iocinoris obstructioni, cum ea multiplex fuerit, testatum reliquit. Qua de re non ex propria obstructionis natura febris consequitur, sed cum ea multiplex fue-

Iecoris ob-
structio
quid sit.

Vide Aui-
cen. libr. 3.
sen. 14.
tract. 20.
cap. 4.

Pars affe-
cta. Eius-
dem partis
affectus si-
gna.

Nū semper
iecoris ob-
structionem
febris se-
quatur.

rit, & propterea bene dicebat Aëtius, quandoque sine febre esse, & quandoque cum febre. In recenti nanque, ac exigua, & non multa existente iocinoris obstructione febris non excitatur, in diutina verò, ac multa non mirum, si ea consequatur, magnitudinis tamen, & diuturnitatis ratione, quinimò idem Galen. octauo metho. medendi, cap. 4. dicebat obstructionis magnitudinem discerni ex ipsa magnitudine febris, ut quæ ex maiore obstructione, maior, ex minore minor fiat. Similiter si ea inueterata sit, nedum in hepate, sed in omni membro putrefactionem operatur, febrémque accendit, Aëtio auctore, breui etenim tempore putrefactio consequitur ab obstructione ex vitiosis humoribus in frigidis intemperaturis, in calidis verò non citò, sed temporis progressu accedit, ut liquet ex Galen. octauo de compositione medicament. secundum loc. cap. 6. & consequenter ad putredinem febris. Affectus hic morbus existit non in intemperie, sed instrumentalis in via, seu cauitate. Nec in eo via, seu cauitates hepatis apertæ, seu dilatatæ sunt (ut diximus) seu obstructæ, ac infarctæ, ut propterea alimenti, seu sanguinis distributio per totum corpus, aut non fiat, aut diminutè fiat. Hæc nanque est illa actio, quam per se primo iocinoris obstructio lædit (Galen. auctore libro de differentiis morbor. cap. 7.) Nec per alias diuersas notas quicquam inuestigare tentabit affectum hunc, quam per easdem, per quas iecur ipsum hoc morbo affectu esse nouimus. Quamquam de hac obstructione non admodum certæ habentur coniecturæ, ut patet eodem quinto de locis affectis, cap. 7. Est vero obstructio ex eodem genere aggritudinum, quæ quidem ex lentis, ac crasis humoribus fiunt (eodem Galeno teste libro artis medicæ, cap. 94.) quamquam præcitato lib. 5. de locis affectis, cap. 7. nedum à crasis, & viscosis humoribus iocinoris obstructionem fieri fassus est, sed halitusoso quoque spiritu ibi concluso, cui non pateat exitus. Confirmauit idem Aëtius præcitato loco, cum dixit, iocinoris oppilationes fieri à flatibus nebulosis, & concoctu difficilibus, aliquando autem & à crasis humoribus, viscosisque in sinibus venarum ex sima hepatis parte natarum, per quas ex ventre, ac intestinis alimenti digestio ad hepar contingit. Nec propterea quispiam audeat de insufficiencia Gale. condemnare, ut qui lib. artis medi. cap. 94. vnam duntaxat meminerit obstructionis causam, cum & præcipuam scripserit, & reliquam ibidem non negauerit. Dignoscitur autem cum vaporosi, & crassi flatus multitudo coaceruetur, quæ exitum non habet, quoniam non grauitatis solum, sed etiam distentionis sensum sentiunt laborantes, ut liquet ex eodem Galeno, & Aëtio. Cum verò obstructiones à crasis, vicidisque humoribus ortum habent, grauitatis duntaxat sensus percipitur circa dextrum ilium. Fiunt item & iocinoris, velut etiam reliquarum partium obstructiones ex aliorum calidorum humorum multitudine. Nam ob copiam permeantis substantiæ ipsum crebrò obstructione corripitur, pro vna præcipua causa Galen. præcitato libro de constitutione artis medicæ, cap. 17. testatus est, octauo item methodi meden. cap. 4. Cernimus (dicebat) aliquando etiam quòd multum est, cum simul totum confluit obstruendo hætere, insigique non minus, quam ea quæ glutinosa sunt, & crassa. Quòd si per meatus angustos est transitus, multò profectò magis retinetur; propterea quia, quòd multum est, quauis,

tenax, & crassum non sit, obstructionem parere potest, ut eodem 8. & 11. methodi medendi, cap. 4. scriptum reperitur. Verum quoniam non admodum crebrò id euenit, & si euenit cum febribus copulantur obstructiones ex humorum copia ortæ, putredine eas consequente, quemadmodum præcitatis locis, apud Galenum liquet. Nos verò de ea obstructione tractare proposuimus, quæ per se sola citra alium complicatum morbum iecur exerceat. Propterea sit, quòd Græcos sectantes auctores, Galenum inquit, Paulum, Aëtium, ac Alexandrū duntaxat prædictæ obstructionis causarum meminimus, spiritus videlicet flatuosi, ac crassiorum, viscosorumque humorum, ex hisce nanque causis iocinoris obstructio per se sola, & circa initia, cum multiplex non fuerit, etiam sine febre excitari consuevit. Reliquas, quæ mox à principio cum febre inuadunt, à calidorum humorum multitudine, ac putredine ortas, cum de febribus verba faciemus postponentes. Nam si ex crassitie prædictorum calidorum succorum etiam obstructiones iocinoris generentur, haud difficile erit eas dignoscere. Nec alium requirunt curationis modum, quam reliquæ, nisi quòd non adeò calidiora attenuantia exigunt, ut dicemus. Verum quoniam oppilatio omnis inueterata, non tantum in hepate, sed in omni membro putrefactionem operatur, ac febrim accendit, ut Aëtius inquit, propterea celerrimè eas curare oportet, citius autem, ac breui tempore in frigidis consequitur intemperaturis, in calidis verò non ita citius, sed temporis progressu si ex vitiosis humoribus contingit (Galen. auctore 8. de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 6.) nec minus & aqua intercus consequi poterit viscosis, frigidis, ac crasis humoribus diu in iocinoris vasis consistentibus ex quibus vasa ipsa primò infrigidentur, & demum ipsius iocinoris propria substantia, ad cuius infrigidationem perpetuo sequitur aqua intercus (ut liquet 5. de loc. affectis.) Quòd verò totius etiam corporis extenuatio, ex eius diuturnitate necessariò consequatur propter alimentum penuriam, quam Græci ἀσποπία dicunt, cui libet patere poterit, nec alia indiget ratione, seu auctoritate. Pro huius obstructionis curatione vnica habetur indicatio morbo contraria. Ea autem apertio est, Galeno teste lib. art. medicæ, cap. 94. Causæ verò salubres sunt attergentia, atque incidētia medicamina, ut ipse inquit. Quamobrem erit ipsius medela priusquam fiat obstructio multiplex, & homo febricitet, ingestio tenuatium ciborum, ac medicaminum: ut apud eundem Galenum liquet libro de constitutione artis medicæ, cap. 17. Hoc idem confirmauit Aëtius, dum dixit, quare attenuantium, & oppilationem dissoluentium quam celerrimus requiritur usus, & Alexan. huic se subscripsit sententiæ, dum asseruit. Cum igitur obstructionem esse animaduertitis, cum fiducia medicamentis vtitor, quæ incidunt, & extenuant. Aër itaque eligatur ad calidum vergens, somno vtantur moderato, ac nocturno potius, nam vigilæ quoque moderate conferunt. Quies vitanda erit, nam exercitatio maxime idonea existit, ut liquet primo de sanitate tuenda, cap. 14. eaque magis confert, quam medicamenta dissoluentia, & discalcantia, propter causas ibi traditas. Alui excrementa, si non natura, arte saltem clysteribus, aut lenibus glandibus expurgentur singulis diebus animiq; affectus immodici omnino vitandi. Cibi eisdem dandi sunt calidiores, & qui re-

Quis affectus præter naturam sit obstructio.

Causæ.

Si ex halitusoso spiritu fiat signa.

Gal. 5. de locis affectis. lo co citato.

Si ex crassis, ac viscosis humoribus.

Progre-
ssu.

Loco
to.

Causa
medicæ.

Vitæ
tio.

referandi facultatem habeant, ex Pauli auctoritate. Cuius farinae sunt asparagus, cappares, fœniculum. Carnes item gustari poterunt pullorum gallinarum, turdorum, merularum, phasianorum, perdicum; ac aliarum paruarum avium motanarum, quæ item decoquantur cum fœniculo, hyssopo, oreoselino, saturia, pulegio, apio, sampso, cichorio, intubo, aut reliquis huiusmodi. Nec negligenda erit pituita; præsertim ubi ad calidum vergant crassi redundantes succi, ipsa namque inter omnia, quæ ut medicamenta, seu ut nutrimenta exhibentur, principatum obtinet, inter ea, quæ modicè attenuant, ac incidunt cum corporis madefactione, ac optima nutritione, ut à Galeno decretum est libro de pituita. Vitanda quæ sunt omnia alimenta, quæ crassum succum generant, balnea crebra, & ea potissimum à cibo, eodem Paulo auctore. Vinum autem tenue, & vetus utile est pro potu, ut eidem Paulo visum est. Præter hæc quam celerrimum requiritur visus attenuatum; & oppilationem dissolventium medicamentorum (ut diximus) ex Aëtij sententia, inter quæ magnopere confert iecur lupi aridum, tritum, & cochlearium datum ex vino dulci (Paulo teste) Similiter Plantaginis radix, & semen, foliaque, sicca, trita, siue per se vnumquodque, siue simul exhibeantur. Itē anagallidis, quæ cæruleum florem habet, succus, ac radicis dulcis decoctum. Pellicini item, qui in frumentis nascitur, semen tritum cochlearij mensura cum vino, aut aqua mulsâ in potu acceptum præclarè & citra molestiam ab oppilatione liberat; simulque firmitatem, tum hepatis, tum stomacho addit. Capni, quod fumariam appellant, succo eius expresso, & deficcato, si reponatur, & in pastillum redigatur, semel exhibitus, dolorem omnem adimit, ter autem præbitus in totum ab affectione liberat, ultra hoc quod & firmitatem visceribus addit, decoctum quoque huius herba potum similem efficaciam habet, etiam si valde febricitent aegri. Aliquando autem herba ipsa efficitur, contusaque, & cribrata cochlearis mensura præbetur, ex Aëtij testimonio. Quod si crassiores glutinosioresque sint humores, ex quibus obstructio orta fuerit, præsertim in hepatis gibbo, validiora tribuenda erunt medicamenta, & propter ea eupatorium tribuendum erit ex oxymelite. Similiter quoque stœchas tum cocta, tum trita data, spicanardi, ac chamæmelum, marrubium, lauri cortex tritus, ac potatus, amygdala amara, ari, ac cori radix, & asarum, apium, absinthium, calsia lignea, rhaponticum, anisum, fœniculi semē, viticis, ac dauci semen, similiter & centaury decoctum, ac lupinorum, flos iunci odorati item Galli veteris decoctum ius, ac etiam cicoris decoctum, quæ omnia tum ab Aëtio, tum à Paulo, & Alexandro commendantur. Ex quibus licebit varia medicamenta componere, & potissimum decocta. In quæ etiam visum (ubi ad calidum vergant crassi obstruentes succi) syru. ex succo cichorii aut endiuiz, quam scariolam vocat oxysacccharo, seu acetoso simplici, ac vulgato ex tribus radicibus Gentilis cum aceto, seu è fumaris uti poteris. Et si frigidiore sint, ac viscosi, qui redundant succi, syru. ex absinthio, ex hyssopo, marrubio, de byzantiis, de quinq; radicibus Mesue de eupatorio, oxymelle, tum simplici, tum composito, ac etiâ scilicet vitare. Poteris etiam eos præbere cum aliquo prædictorum medicamentorum decocto. Nec minus exhibere licebit quandoque pastillos ex medi-

camento, quod ex tribus generibus santalorum componitur, & ex semine melonum cum saccharo formatos aut ex diarhodon Abbatis, ac prædictis melonum seminibus. Interim trochiscis de eupatorio, de absinthio, seu de rhabarbato. Reliqua verò, quæ extrinsecus adinueri possent, epithêmata scilicet, vnguenta, ac cærata studiosi præcedenti capite requirant. Quo loco frigida iocinoris intemperiei curationem instituiamus. Si verò multe fuerint iocinoris obstructions, non solum tenuantium ciborum, ac medicaminum ingestio sufficiens erit pro earum curatione, sed etiam euacuatio est necessaria. Gale-
no teste præcitato libro de constitutione artis medicæ, cap. 17. Id quod nec etiam negat Paulus ubi morbus in vetustate incidit, cum dicebat, si morbus in vetustatem incidit, etiam venæ sectio, purgatioque adhibenda, si nihil prohibet. Qua de re venæ sectio fiat, ubi reliqua non prohibeant, humoribus præsertim ad calidum vergentibus, ac eorum quoque copia molestantibus, potissimum ubi eadē obstructio adhuc quoque fiat, ex interna dextri cubiti vena. Nam curabitur quod obstructionis iam factum est per ea quæ obstructa liberant, propulsabitur quod futurum est, si affluxum confluentium humorum compescas, quemadmodum in meth. med. cap. 10. à Gale. scriptum est. Propulsabitur itaque quod futurum est ipsius obstructionis, saltem ex iam dicta venæ sectione, quoniam defluxum obstruentium humorum per eam inhibebis. Vel si inueterata eadē sit cum putrefactionem operetur, ac febrem accedat. Huic quoque non nihil præsidij afferet, reliquis consentientibus ex Pauli testimonio. Quomodo autem purgatio faciendâ sit, si ea quoque fuerit necessaria pro multa, sed diuturnâ iocinoris obstructionis curatione cum figura, seu formatio, tum etiâ situs eiusdem visceris indicabit, per quæ scilicet loca eam facere oporteat, nam quæ in finis iecoris sunt, excrementa, ad intestinum: quæ verò in gibbis, per vrinâs euacuabimus, eodem Galeno auctore præcitato libro de constit. artis medicæ, cap. 17. Quamquæ etiam eadem iocinoris gibba, si multo vitioso succo sit referta, per deiectiones, & pharmaca deiectionia hæc prædicta Græci vocant, expurgari debeant, si verò mediocri, per vrinarios meatus, ex decreto eiusdē Gal. 7. meth. med. Qua de re sic intelligi debent eiusdē Galeni verba 2. de arte curatiua ad Glauco. 13. meth. med. ac reliquis in locis, ubi dixit, & quidem laborantibus gibbis partibus hepatis, quod per vrinâ trahere oporteat, concauis autem per excretionem inferiorem, situs ipse visceris indicat, namque quando mediocriter vitioso succo sunt referta, & non quando multo exponi debent, quoniam tunc etiam per deiectiones eadem gibba expurgantur, ut eodē 7. meth. med. decretum est. Neque prius ad detergendas obstructions accedere debemus, nisi vitiosi succi maiore parte emissa, alioquin metus est, si obstructionibus liberâdis priusquam vacuaueris, studeas, ne ipsas magis impingas, ex eiusdē Galeni præcepto octauo meth. o. medendi, cap. 4. etiam lib. 11. eiusdē sic dicebat. Ostensum enim in prioribus libris est, si his auxiliis, quæ obstructions eximât, utri non vacuata prius abundantia, velimus, fore ut non modo nihil proficiamus, sed etiam affectum maiorem reddamus, pugnantibus scilicet inter se indicationibus. At si vacuata prius multitudine ad curandam obstructionem accedamus, medicamentis

Quando ve
na sectione,
& purgâ
te medica
mento vit
dum sit.

cap. ult. 2.
ad Glauco.
cap. 2.
13 meth.
cap. 10.

In fine.

lib. 11. meth. 10.

his quæ obstructions expediant, erit opus. Cum igitur ex vitiosorum succorum abundantia iocinoris obstructions fiunt multa cum febre, seu diuturna, priusquam prædictis obstructionem laborantibus vtaris, purgans medicamentum pro diuersitate redundantis succi exhiberi debet, quod quidem per alium expurget, potissimum, si in eiusmodi hepatis sima orta fuerint, aut licet in gibbis generationem habent, eadem sit multo vitioso succo referata, nam si mediocri, per vinales meatus expurgare oportet, ea quæ vrinam ciunt exhibendo. Vbi itaq; ad calidum vergant obstruentes succi, nec nimiam crassitudinem habeant, hoc purgante medicamento vtare. Recipe rhabbarbari optimi cum spica, ac squinanto vigorati scrup. 4. vel drac. j. s. maceretur per decem, vel 12. horas in aqua cichorij, seu intubi, demum per colum transfundatur, & adice, vel pulpa casia recentè extracta vnc. l. s. vel mellis roridi vnc. 2. diacatholi. drac. 7. misceantur, & fiat potio cum aqua intubi, aut cichorij. Poteris item potissimum vbi crassiores fuerint redundantes succi, inuicem rhabbarbari, agarici trochiscato vti, vel decoctum in prædicta aqua cichorij, vel intubi drac. l. agarici fiat, quo demum expresso, ac per colum transfuso, vnc. 2. mellis roridi adiciantur, ac scrup. 4. rhabbarbari vt supra macerati, & drac. 4. vel vnc. s. diacath. Catapotia item formari poterunt ex eodè agarico, & rhabbarbaro drac. l. vtriusque accipientes, & cū succo cichorij, intubi, vel fumarie, vel syr. ex eisdem paratis formantur catapotia. Post quæ per aliquod tempus vnc. 2. mellis roridi, vel iij. syr. de cichorea Nicolî præbeantur, quanquam hicmet syr. cum melle rorido, ac rhabbarbaro vt supra parato, calidis redundantibus succis, cōmodè exhiberi poterit, quemadmodum si magis crassi, ac lenti fuerint redundantes succi, catapotia de rhabbarbaro, vel de agarico, aut pilulas aggregatiuas exhibere conuenit, quibus semper adicere poteris agaricum seu rhabbarbarum, prout vnum magis, quam alterum redundans succus exigit drac. l. asilumens ex aliquo prædictorum catapotiorum, seu scrup. 4. & scrup. 2. seu drac. l. prædicti agarici trochiscati, aut rhabbarbari cum spica, seu squinanto, & cum syr. ex succo cichorij, fumarie, aut intubi composito catapotia figurentur, demum corpore vacuato, quæ supra conscripsimus medicamenta obstructions eximentia, propinari debent. Nam vitiosi succi maiori parte emissis, ad detergendas obstructions accedere debemus extrinsecus quoque ea adhibeatur, quæ præcedenti capite, pro frigide iocinoris intemperiei curatione, annotauimus.

Id est, De inflammatione hepatis.

C A P. LXXXIIII.

10. metho.
c. 3.
13. metho.
c. 13.
14. metho.
c. 1.
De tumor.
præter nat.
cap. 2.
De iniqua.
intemperie.
cap. 3.



NON raro autem, & idem iecur inflammatione laborare cōtingit quæ haud aliter in ipso, quam in cæteris nostri corporis partibus gigni consuevit, nec etiam ab alia causa. Nam communis omnium phlegmonarū generatio (Galeno auctore 10. decimotertio, & de iniqua intemperie, ac cæteris plerisque locis) ex sanguinis influxu est copiosioris, quam pars postulet. Hic verò sanguis cum in aliquam animalis partem procubuit,

maiora eius vasa protinus distenduntur, vtpote abundantia continendæ non sufficiens, ab his deinceps, quæ minora sunt, mox vbi nec in iis satis continetur exudat foras in ea ampla spatia, quæ inter vasa sunt, sic etiam vt omnia, quæ in carne habentur, loca occupet. Est enim visceribus quoque sua quædam caro, quam quidam Græcè *σάρξ* vocant, in quâ sanguis ex refertis vasis halitus specie exudans inflammationem gignit, vt patet eodem 14. metho. meden. cap. 2. Influxit autem copiosior hic sanguis alia quapiam, aliisque particulis eum aliquando intuentibus, ac ea quæ phlegmone laborare incipit precipiente, aliquando particula quæ affligitur huc ad se trahente, vtpote cum morboſo calore, aut dolore excruciat. Partes autem quæ mittunt, aut copia, aut qualitate, aut vtroque nomine moleſtate transmittunt, vt liquet eodem 13. metho. meden. c. 3. sexcentis aliis in locis, de qua inflammatione cum nonnulla fuerint in præcedentibus à nobis dicta, præsertim cap. de pleuritide, hic quoque de ea protelare sermonem non libuit, sed tantum de ea dixisse satis sit: quod per inflammationem, eam quæ propriè sic appellatur, & à copia optimi sanguinis generationem habet, subintelligere volumus. Et propterea ad dignotionem affectæ partis descendentes dicimus, iecur ipsum deprehendi, quod inflammatione laboret ex dolore cum positu, quoniam in dextro latere ad nothas costas dolor à laborantibus sentitur, & cum magnam trahunt spirationem vehementius excruciat, sentiuntque in eadem dextra præcordiorum parte grauitatem, & interim iugulū ad infernas partes detrahi. Nam id non omnibus commune est, sed iis tantum, quibus iecur collicis aligatur, atque sic dolor ad succingentem costas membranam peruenit. Ex longis quoque intervallis tussis exigua, arida, & quæ nihil expuunt, moleſtare solet, atque spiratio parua, & crebra, quemadmodum 2. & 5. de locis affectis, à Galeno scriptum est. Quod autem inflammatio sit quæ iecur exerceat, tum ex eisdem quibusdam signis, tum ex reliquis dicendis percipi poterit, nam & linguæ color in primis quidem ruber, deinde niger apparebit, aderitque cibi vehemens fastidium, litis in exhausta, vomitus tum syncera bilis, tum eius, quæ ouorum vitellis similatur, quæ postea aruginis aliquando colorem referre conspicitur: alius quoque constringitur, nisi vna cum visceri huius imbecillitate inflammationem excitari contingat, vt liquet eodem 5. de locis affectis, à Galeno, ab Aëtio cap. 3. libri 10. & Paulo cap. 46. libri 3. Color corporis subuertitur in arquati morbi speciem permutatus, & singultus quoque consequitur, ac accessionis tempore quidam delirio apprehenduntur, ac acre lotium excernunt, (vt liquet ex Aëtio,) qui etiā fatetur, quod febris adeſt acuta, inæqualis, quæ plerumque ad vesperam, & noctem exacerbatur. Quod verò febrem ad iocinoris inflammationem comitari necesse sit, à Galeno decretum est eodem secundo de locis affectis. Verum quod ea acuta sit, nequaquam falsus est, nisi præcitato quinto de locis affectis. Vbi de eryſipelate verba faciens scriptum reliquit, arduas febres ac vehementissimas euēire, cum ipsum in iocinore, & vtriculo, aut pulmone fuerit ortū, vel inflammatio eryſipelatis particeps fuerit, quinimo libro præorthetorum 2. phlegmone in iocinore, vel ventre orta quod non continuū, ac perpetuū maligna, nec acuta

acuta consequatur febris decretum reliquit. Nam inflammationum magnitudinē perpetuo febris ex proportionē sequitur. Et propterea nisi valenter iecur inflammari contingat, licet febris excitetur, quoniam princeps viscus est, tamē ea acuta nō erit, nisi eadem inflammatio magna sit, pro cuius magnitudinis proportionē ipsa quoque & maior, & vehementior excitabitur, de qua fortē Aëtius intelligere voluit, cum dixit, febris adest acuta, inaequalis. Sic quoque Alexandri verba intelligi debent, cum dixit exiguum hepatis inflammationem non statim febrem inducere, scilicet vehementem, & acutā, aliter falsum esset, nam orta inflammatione in eo, cum princeps membrum sit, vniuerso corpori impetit & tensionem, & calorem immodicum, qui febris est, eodem Galeno teste quarto de causis pulsuum, & propterea necessario (vt ipse secūdo de locis affectis scriptum reliquit) ipsam iecoris inflammationē febris comitatur. Pulsus, velut in ceteris inflammationibus, durus aderit, inaequalis quodammodo, ac veluti serrans tactum, licet non adeo, ac si nervosae partes inflammatae essent, quinimō & maior erit, ac celerior, cum & in parte consistat, venis, & arteriis consistat, vt liquet eodem 4. de caus. pulsuum, & 4. de praesagatione ex pulsibus, quo indicio potissimum iocinoris inflammatio ab ea, quae in succingente membrana exorta est, secernitur, licet & alia quaedā sint, quae capite de pleuritide annotauimus, quo fit, vt eadem hic transcribere superuacaneū sit. At quia interdum musculus hepatis incumbens inflammationis quidam decepti, eiusdem visceris eam inflammationem esse suspicati sunt, propterea visum est, quo pacto distinguendae sint praedictae affectiones, describere. Etenim iocinore inflammato tumor secundum lineamenta, rotundus, figura videlicet ipsius hepatis succumbit, vt Aëtius facit, qui etiam ad corporis decubitus simul conformatur, maior enim apparet corpore ad sinistrum latus reclinato, minor autem rursus ad dextrum reuoluto, nimirum hepate sub nothas cedente costas, neque visui, neque tactui similiter succumbente. Amplius autem (vt idem inquit Aëtius) in hepatis inflammatione incumbens cuticula naturali modo habere conspicitur: musculus autem inflammatus cutis circumtenditur, vt si quis digitis apprehensimē autem tactus discerneret siue in alto, siue in superficie inflammatio ipsa consistat, rectorum denique musculorum tumores praeter naturam oblongi, atque per totum ventrem extensi videntur, vmbilicum (veluti haec quoque musculorum coniunctio) comprehendentes. Quapropter haud obscura est eorum dignotio, vt pote quos & positus & figura declarat, accedente adhuc, quod ipsi à nullo exteriori musculo conteguntur, Galeno auctore praecitato libro quinto de locis affectis. Haec autem obliquis quoque musculis, qui à thorace descendunt, sunt communia, vt ipse inquit, sed multo difficilior est notitia musculorum, qui iis subiecti sunt, difficillima verò transuerforum. Cum ergo iecur intra hos musculos sub peritoneo positum sit, cum tribus contegatur musculis, fieri nō potest, vt tactus aliquam ipsius notitiam praestet, nisi vel magna in ipso oriatur inflammatio, vel incumbentes ei musculi extenuentur, vt liquet ex Galeno. eodem loco. Et propterea si in gibba parte consistat inflammatio, praecipue si ingens ea fuerit, per facile vel solo tactu dignosci potest. Ea nanque hanc propriam

à musculorum tumoribus sortitur differentiam, quod moles sub manibus ad coaceruatam circumscriptionem definit: quippe soli iocinori proprium est, vt tumoris cumulum vniuersum habeat circumscriptionem, sed musculus quilibet, cum totus sibi continuus sit inflammationis ipsius moles sensim diminui consuevit. Simarum autem partium inflammationes per alia potius symptomata, quam per tactum inaequare oportet, vt liquet eodem 5. de locis affectis. Num verò in eadem summa hepatis parte inflammatio sit orta, an in eius gibba interlingues. Nam quae in sumis eueniunt magis, quam illae, quae in gibbo sunt, salidum, nauseam, vomitum biliosum, sitimque ingentem inducunt: quae verò in gibba parte oriuntur, maiori quam illae inter spirandum dolore laborantem excruciant, magisque tussim excitant, atque dolorem vsque ad dextrae partis iugulum, adeo vt detrabi videatur, extendunt (vt ibidem à Galeno scriptum est.) Quamuis (vt idem testatur) in neutra praedictarum partium exquisitè distincta inflammatio possit consistere, nam omnium eius partium carnes inter se continuantur. Quis verò, ac quatuorplex morbus sit inflammatio, in praecedentibus saepius dictum est. Quod autem eius causa sanguis optimus sit, mediocrēque crassitudinem obtinens, ex nullo alio indicio clariùs patere poterit, quam ex eadem morbi specie, ex qua necessario eius causa arguitur, vt liquet aphor. 2. primi libri. Reliquum est vt ad eius prognostica transeamus, quorum primum Hippocrates est aphor. 17. libri 7. Cum dixit, In hepatis inflammatione singultus, malum. Nam semper singultus iocinoris inflammationem comitatur, sed quando ea in magnitudinem attollitur, ac feruescit, in quo feruore stomachus ad compulsionem trahitur, nonnunquam propter nervorum communicationem. Quare (vt Galenus commen. eiusdem aphor. dicebat) tunc solum comparsio fit stomacho cum hepate, quando inflammatio, & maxima, & pessima fuerit, nonnunquam etiam bile multum calida & multa in huius visceris inflammationibus genita, ac confluente ad intestinorum principium, qua superfluitante, atque ad ventriculum recurrente, contingit os eius morderi, atque ideo singultire. Quidam autem arbitrantur magnitudinem inflammationis ventriculum premere, ac singultum facere, non habente exitum spiritu. Verum fiat ex quauis causa singultus propter hepatis inflammationem, semper malum est, quoniam eam maximam, atque pessimam esse significat, Gale. auctoritate praecitato aphor. & commen. aphor. 58. 5. libri. Si verò iocinoris inflammationem vehemens, atque acuta febris comitetur malum quoque est. Nam valenter idem viscus inflammatum esse ostendit, quemadmodum si eadem febris exigua, & non acuta fuerit, minus malum portendit, quia exigua quoque esse inflammationem significat: propterea quod inflammationum magnitudinem perpetuo febris ex proportionē consequitur, Galeno teste 2. prorrhetic. At si eadem febris acutissima, vellementissimaque fuerit, ac vehementissima quoque sitis laborantes excruciet, pessimum erit indicium: quoniam inflammationem erysipelatis participem, aut ipsammet erysipelas in iocinore ortum significabit: quae febres magna ex parte (vt liquet 5. de locis affectis.) in tabem transmutantur. Idemmet Galenus 10. metho. medend. de iocinoris in-

Lococitato.
Si inflammatio in gibba, aut summa iecoris parte sit orta, quibus signis comprehendatur.

Causa.

Prognostica.

Comment.
20.

cap. vlti.
10. meth.
cap. 5.

inflammatione sic scriptum reliquit. Quod si in abū-
dē calido, & siccō corpore generetur, potissimum
si notatu digna fuerit, omnino æger morietur, pro-
pterea quod imbecillis sit viribus, & quæ vna salus,
tum iis, tum etiam pleuriticis, & peripneumoniacis,
& qui angina, seu ventriculi inflammatione labo-
rant, est ipsum virium robur (vt ipse inquit) & nos
in præcedentibus capit. adnotauimus. *Curatio.* Quantum
ad eius curationem spectat, exquisitissimo victu est
opus, & quæ ac si ventriculus sic laboret, (vt eodem
capite scriptum est) quoniam munus eius visceris
toti animali est commune, acceditque omnibus a-
nimalis partibus maximum commodum, vbi
non probè concoctum alimentum sit, siue non in
sanguinem ritè fuerit conuersum, vt ab eodem Ga-
leno 13. metho. meden. decretum est: cibi propte-
rea eligantur, qui tenui sint consistentia, recremen-
torum, ac mordentis qualitatē expertes: sed tamen
citra morsum detergant, huiusmodi esset mulsā, ni-
si esset (quod vt Galenus eodem 13. metho. meden.
cap. 14. fatetur) omnibus dulcibus tum iecur, tum
lien maximè intumescit: superest igitur, vt quæ cul-
pa vacet in cibo, p̄stana sit, quippe quæ sine morsu
detergit, eodem Galeno teste. Præterea & ipsius
p̄stana cremor his idoneus est, vt qui vim habeat
aperiendi, & abstergendi, præterquam quod affe-
ctas partes non affligit, aut calefacit, vt liquet ex
Alexan. Eadem quoque p̄stana in gallinaceorum
pullorum iure, viribus præsertim existentibus im-
becillis parari poterit, similiter & phasianorum, star-
narum, iuuenum columbarum, perdicum, turdoru,
merularum, ac aliarum paruularum auium, quarum e-
tiam carnes quandoque gustare poterunt, & etiam
eas contusas, si vires exigunt. Nec minus in earum
carnium iure olera quoque decocta interim assu-
mant, præsertim vbi inflammatio feruens fuerit, seu
erysipelatis particeps, veluti est intubum, cichoriū,
senecium, fenchus, & reliqua huiusmodi, quæ vim
habent detergendi, & digestionis vias ab obtura-
tione vindicandi cum leuicula quadam iocinoris
refrigeratione, ac adstrictione. Nam à vehementer
refrigerantibus, ac adstringentibus cauendum est,
quoniam iocinoris phlegmonis sunt incommoda.
præsertim si in cauo visceris consistent, arctant e-
nim os meatus bilis, ac bilem ipsam excerni prohi-
bent, præter eas angustias, quas facit ipsa phlegmo-
ne, & (vt inquit Alexander) propterea quod con-
stringunt, contrahuntque tumores, ad discutiedum
difficiles ipsos reddunt. Ob quod neque malum pu-
nicum exhiberi debet, (vt eidem Galeno ac Alexan-
dro visum est.) Sic etiam vinum pro potu magno-
pere vitandum, vt quod omni feruenti inflamma-
tioni in totum sit aduersarium (eodem Alexandro
auctore.) Sed pro potu aqua hordei vtendum, aut
aqua, in qua prius cichorium, aut intubum fuerit
decoctum, vel etiam parum radicis glycyrrhizæ.
*Medicamē-
torū ratio.* Confert item, vbi eiusdem visceris gibba fuerint
inflammata, pro cibo p̄stanam, aut eius cremorem
cum apij decocto exhibere, quoniam modicè vri-
nam mouet. Reliqua verò, quæ ad victus rationem
pertinent, si ad caput de ventriculi inflammatione
confugas, scripta reperies. Cæterum quoniam om-
nium phlegmonarum primus scopus est euacuatio
humoris, qui in partē phlegmone conflictatā graf-
fatur, vt lib. de constitutione artis medicæ, cap. 17. &
eodem decimotertio metho. med. cap. 2. & 9. liquet,
Vena sectio. quo pacto ipsum educere conueniat ex posito, ac

formatione desumitur. Propterea vbi totum corpus
inanitione indigeat (ipsa inflammatione adhuc in ge-
neratione existente) si vires tolerāt, ac etiam ætas, ad
sanguinis missionē cōfessum cōfugiendū erit, per quā
tum reuellendus, tum educendus, qui ad iecur fluit,
sanguis est, interna dextri cubiti vena secta, propter
ea quod & ē regione, seu directio, & ampla via cum
vena, quæ caua dicitur, societatem habet hac nō ap-
parente, media secanda est. Quod si nec ea se osten-
derit, reliqua, ac tertia est incidenda, quæ humeralis
dicitur, ex Galeni decreto eodem 13. methodi me-
dendi, cap. 11. quem demum sectati sunt Aëtius, Pau-
lus, & Alexander. Modum verò vacuationis, tum ex
redundantiæ modo, tum ex ætate, natura, tempore,
anni, regione, consuetudine, & ante hæc ipsa labo-
rantis virtute inuenies, vt eidem Galeno visum est.
Quoniam si id ferre queunt, semel quātum satis est,
detrahendum. Si verò non, per vices partium, Aëtio
teste. Hæc autem vena incilio, opportunè in prima
& secunda die contingit: si verò dolores virgeant, &
ad sint vires, etiam septima venæ incisione facimus,
vt ipse inquit. A venæ sectione, vbi totum corpus
plenum fuerit (vt supposuimus) ad topica remedia
confugiendum est, quibus vacuari possit id quod in
phlegmone obfessa parte continetur. Hæc nanque
communis est indicatio curationis omnium phleg-
monarum (vt diximus.) Nam antea priusquam to-
tum corpus à recrementis liberum fecerimus, cau-
endum est ne ea applicemus (vt Alexander inquit).
In quorum adhibitione duo perpetuò seruanda sunt,
quorum primum est, ne frigida admoveas, etiam si
inter initia adhibeantur, alias magis noxæ, quàm
vtilitatis causæ erunt: secundum est, quod eadem
medicamenta nunquam ab solui debent ab his quæ
mediocriter adstringendi vim habent, indicatione
sumpta à parte affecta, propterea quod animalibus
altriciis facultatis principium sit, & venosam ab hoc
oritur genus, vt ideo eius robur seruandum sit.
Quo fit, vt etiam eo tempore, quo quicquam am-
plius non influit, nec repelli quod in laborante par-
ticula continetur, possit, adhuc mixta facultatis esse
debent medicamenta, vt ex eodem Galeno liquet
præcitato libro 13. methodi medendi, cap. decimo-
sexto. Nam coeuntibus vnā contrariis indicationi-
bus, compositum quoque esse medicamētum opor-
tet, quo etiam tempore clysteres, iidemque lenes
iniici debent, maximè si non sponte egerat aluius.
Fiat itaque illinitio extrinsecus in hepatis regione
ex oleo rosaceo, aut lentiscino, aut melino, aut
cenantino (vt ait Aëtius) pariter & ex myrtino,
aut eodem oleo rosaceo cum oleo amygdalarum
dulcium, vel amararum permixto, seu absynthite,
& procedente tempore eodem oleo rosaceo, myr-
tino, seu cydoniorum cum masticino, chamæme-
lino, seu anethino permixto vtare. Et sumpta à situ
visceris indicatione parum aceti, aut vini albi mis-
ceto. Quod si libeat cataplasmatas vti ex farina hor-
deacea, scænuagræci, & seminis lini cum palmulis, vel
malis cotoneis, meliloti flore, absynthio, & cha-
mæmelino conficiantur (Paulo auctore) pauco
etiam aceto, vel vino albo addito. Insuper ex semi-
nis lini, scænuagræci, hordeacei; farina, aut triticea,
his vel omnibus, vel vno aliquo ex eis, aut quibus-
dam in aqua mulsā decoctis, admixtis absynthio,
mastiche, ac meliloto fiat cataplasma, ex Ae-
tij sententia, cui etiam, veluti & cunctis reli-
quis medicamentis aceti, aut vini albi parū iniicito.
Quod

Quod si vehementior fuerit ardor, mala cotonea, aut oleum rosaceum, vel citoniorum adduntur, item plantaginis, cichorii, aut intubi folia contusa. Epithemata quoque hunc in modum parabis, Recipe, rosarum rubearum, foliorum plantaginis, & cichorii, seu hortulanæ endiviæ, ana p.j. totorum chamæmelis, meliloti, absinthij, & anethi ana p.s. bulliant in aqua pluuiali, demum adde succi cichorii, & endiviæ, singulo lib.i. acceti vnc.2. misceantur, & fiant epithemata. Poterunt item ex prædictis cum cerata, tum etiam emplastra formari, ac eisdem uti, illud perpetuo adinimæ quærens, quod quantum inflammatio eius principio recedit, in tantum relaxantia, seu digerentia vires præsidiorum adstringentium vincere debent, licet semper (vt diximus) ea mixta facultatis esse necessum sit. Procedente verò tempore, si in gibba viceris parte phlegmone consistat, ubi phlegmone iam concoquitur, nedum eis quæ modicè vires mouent, sed etiam valètiorebus vtili licebit, asaro inquam, nardo æthica, phyllo, hoc est valeriana, petroselinò, sinyrinio, & meo, ex Galeni auctoritate & oxymeli ipsi dandum est, vt Paulus refert. Item syrup. de byzantiis cum additione, de tribus radicibus, ac de eupatorio, nonnulla etiam decocta tum eorum, quæ diximus, tum etiam & aliorum medicamentorum, quæ vrinam ciunt, eocinnari poterunt, ac eisdem præberi. Verum si cauum eiusdem visceris inflammatione afficiatur, procedente (vt diximus) tempore, per ventrem eos vacuare licebit, ex eiusdem Galeni sententia præcitato libro 13. metho. medendi, cap. 5. quem sectatus est Paulus, licet eandem per alium purgationem, cum iecer phlegmone laborare incipit, tanquam valde nocuam, cum maximè excitaret phlegmonem, eodem loco prohibuerit, quæ vacuatio cum videlicet phlegmone iam concoquitur, vel inclinauerit, partim per clysteres fieri potest, partim per ea medicamenta, quæ per os sumuntur, vt eisdem auctoribus visum est, quos primò quidem ex aqua multa cum sale fieri præcipiunt, postea verò in remissione videlicet hyssopum, vel origanum, vel minis centaureum, aut cnicum, seu colocynthidem imponi iubent. Sed tutius hunc in modum parari poterunt, Recipe foliorum maluarum, althææ, & betæ ana p.j. mercurialis, & centaurei minoris, cuiuslibet p.s. salis communis parum, fiat decoctum, cuius recipe lib.j. aut lib.s. & adiectis vnc.3. vel 4. olei communis, aniygdalarum dulcium, vel chamæmelini, & vnc.2. mellis rosacei, ac vnc.1. cassiæ fistulæ, necnon drachm. 7. diacath. fiat clyster. Vbi verò per clysteres phlegmone curari non valeat, purgans medicamentum audacter exhibere licebit, eo cibis admixto, quemadmodum à Galeno eodem decimotertio method. medendi, decretum est, veluti vrtica est, mercurialis, epithymum, ac filicula, seu polypodium, & reliqua, quæ ipse dicit quod modicè aluum deiciunt. Verum in remissionibus tum iis ipsis audaciùs, quam antea vtendum, tum verò quæ sunt valentiora partim præsanà coctis, partim tuis, ac in mollissimum puluerem redactis, quæ vel ex præsanà vel ex aqua exhibeantur. Et idem quoque Galenus filiculæ aliquid in præsanà, ac nigri verratri corticem aliquando in coctis, ac præbuit. Atqui nostris temporibus mitiora, ac tutiora medicamenta comperiantur, quibus vti poterimus, vt pituita mel acreum, cassia fistula, syrup. ex pluribus infusionibus rosarum, tum purpurearum, tum persicarum, diacathol. tryphera persica, ac etiam rhabbarum :

ex quibus etiam simul mixtis hunc in modum purgantia medicamenta parari poterunt, Recipe mellis acerei vnc.2. vel 3. aut tantundem prædictorum syrup. diacathol. drac. 6. tryphera persica drac. 4. cum aqua cichorii fiat potio. Inuicem quoque mellis acerei vnc.1. s. cassiæ fistulæ, aut vnc.2. cum prædictis exhibeatur, vel rhabbarum cum spica, recipe drach. 1. seu scrupul. 4. maceretur in vnc.2. per noctem succi rosarum, demum per eolum transfusi vnc.2. s. mellis acerei adiectis, & vnc. s. diacath. aut drachm. 4. tryphera persica, fiat potio cum aqua intubi, aut cichorii, & si maior pro melle aëreo tantundem prædictorum syrup. aut vnc. 1. cassiæ fistulæ commisceas. Verum ubi neque eisdem inflammatio conqueuerit, sed ad suppurationem permuetur, adiuvare naturam oportet, vt quam, celerrimè puris generatio fiat. Cum autem perfecta suppuratio fuerit, abscessus quoque rupturam adiuvare licebit, & post eius eruptionem per eandem viam, per quam puris transmutatio contingit, iuvanda quoque natura erit, siue per sedem, aut vrinam, aut etiam os transmissio fiat, quibus verò medicamentis eadem perficere oporteat, copiosissimè ab Aetio cap. 4. lib. 10. conscripta sunt, ac etiam à Paulo præcitato loco, & propterea nos breuitati indulgentes ea hic non transulimus. Si verò in scirrhi naturam prædicta inflammatio vergat, eius curationem sequenti cap. requirasi. Quod si fluxionis ad ipsum recur causa ex ipsomet oriatur, adeo vt propterea ad ipsum multum confluat sanguinis, ac phlegmone generetur, ne amplius phlegmone increseat, auferri hæc quoque causa debet primo, & quia hoc bifariam esse poterit, aut propter aliquem calorem præter naturam in ipso iocinore existentem, aut propter eiusdem dolorem, inuenta quæ ipsarum causarum phlegmonem excitat, eam prius pro eius curatione auferre tentabis, vt eodem 13. meth. med. cap. 6. à Gale. scriptum est, & deinceps ad prædicta topica medicamenta te conuertas.

Id est, De scirrhi, seu tumore scirrhi hepatis, qui dicitur C. A. P. L. X. X. V.

NEC minus & eadem iocinoris substantia, vt potè quæ naturaliter lutosum quiddam continet, (veluti medicus quidam Galeni tempore per iocum dicebat) maximè opportuna est duris tumoribus, quos Græci σκίρρως, & σκίρρως & quædamque σκίρρως α appellat, nos verò scirrhos, seu tumores scirrhosos nūcupamus. Est autem affectus hic, quem scirrhum nominamus, tumor durus, qui sine dolore est, non tamen omnino sine sensu. Quamvis si quis velit quod tumor sit præter naturam durus, & omnino insensibilis, is verò affectus, qui σκίρρως à Græcis dicitur, Latine scirrhus tumor sit. Scirrhi dicitur non omnino durus, neque omnino insensibilis, non ferètia dicitur, quemadmodum Galen. 14. method. med. cap. 6. decretum reliquit. Illud tamen animadvertentes, quod duplex eiusdem scirrhi differentia sit, vt habetur à Galeno 2. de arte curatiua ad Glaucanem, cap. 4. Quarum una exquisitus scirrhus dicitur tumor præter naturam existens sensu priuatus, durisque. Reliqua non exquisitus appellatur, qui non omnino insensibilis est, difficulter tamen sentitur, vt ipse inquit, qui dupliciter à medicis vocatur, vt patet decimo

quarto methodi medendi. cap. 6. Nempe vel scirrhus, propterea quod ex scirrhorum genere sit, vel scirrhus tumor. Nam & quod Græci *σκληρὸς* vocant, sub scirrhorum genere comprehenditur, Paulo auctore, cap. 68. libri 3. Sunt nanque inter eos scirrhus quidam, qui ubi plurimum increuerint, simulatque indurati fuerint, non modo dolore carēt (vt Galenus inquit quinto de simplicium medicament. facult. cap. 8.) verum etiam sensum exiguum, aut etiam nullum habent reliquum. Dignoscitur autem cum iecur tali laborat affectu manifestius, quā si inflammatum esset, ac multo euidentius, eod quod eius moles durior sit, & in huiusmodi dispositione extenuata sunt corpora, quæ ei incumbunt, verum tractu temporis quamuis magis increseat scirrhī cumulus, non tamen æquē facile fuerit per tactum ipsum cognoscere, intercipiente scilicet iudiciū aqua intercutē, quæ illico scirrhū sequi cōsuevit (eodē Galeno auctore 5. de locis affectis, cap. 7.) Multo etiam minore dolore iecur vexatur in scirrhus, quā in inflammatione, Actio teste cap. 7. lib. 10. Color etiam vniuersi corporis (vt ipse refert) in nigredinem pallore permixtam permutatur, vter, & pedes intumescunt, supernæ corporis partes gracilescunt, & corpus ipsum tepefcit. Aliquando autem aluus multa, & tenuia excernit, propterea quod his sufficienter angusta sunt ora vasorum, per quæ transmittitur cibus ex finis hepatis partibus in cōtexas, vt Galenus refert eodem 2. libro de arte curatiua ad Glauconem cap. 5. Vrinæ verò à principio quidem multæ, verum ubi iam ad aquam intercutem dilapsi sunt, omnino pauca (vt patet ex eodem Actio.) Quod verò affectus hic morbus sit in quantitate primò (quoniam in genere tumorum præter naturam existit) sexcentis in locis liquet in Galeni doctrina, præsertim 13. & 14. method. med. Secundo in intemperie, quoniam frigidus affectus est, vt 5. de simplic. medicament. facultat. cap. 6. & 8. legitur, & tertio in soluta continuitate, quoniam (vt diximus) ex genere est tumorum præter naturam. Cuius affectus inditia non alia requiras, quā ea quæ supra narrauimus, pro dignotione partis affectæ, præsertim ex tumore, duro quidem existente cum exiguo, aut nullo dolore, interim sensu priuato, quādoque non omnino insensili. Eius autem causa est humor lentus, & crassus insolubiliter partibus induratis infixus, (vt liquet eodem libro secundo de arte curatiua ad Glauconem, cap. 4.) qui interdum statim à principio congregatur, & paulatim augetur, crebrius autem medicorum imperitia paratur cum vehementer erysipelata, & inflammationes adstringunt, & infrigidant. Id verò commune est omnibus scirrhīs à quacunque causa ortum habeant, vt libro de tumor. præter naturam, cap. 10. scriptum est. Perpetuò tamen ex humore crasso, frigido ortum ducunt, quales sunt in animalium corporibus, bilis atra, & superexsiccata pituita, & proinde scirrhusi tumores omnino, aut pituitosæ sunt substantiæ, aut atrabiliaria, aut ex vtraque mixti, vt eodem 5. de simplicium medicamentorum facultat. cap. 8. liquet, & 14. methodi medendi, cap. 4. Et propterea etiam duri fiunt. Nam cum omnia dura fiant, aut resiccatione, aut concretionē, aut nimia impletione, vel harum quapiam coniugatione, eodem Galeno teste præcitato libro 5. de simplicium medicament. facultatib. cap. 4. scirrhī, seu scirrhusi tumores ex frigidi humoris impletione, simulatq; congelati, seu

concreti à vehemēti frigore generantur, propter quod aut insensiles omnino sunt, aut exigui sensus participes, cum exiguo etiam, aut nullo dolore consistentes, vt præcitato libro 5. de simplicium medicament. facult. cap. 8. decretum est. Verum nunquid à crasso, & glutinoso humore, ac pituitoso originem ducant, an ex ea nigra bile, quæ veluti fæx sanguinis existit differens ab ea, quæ propriè atra bilis nuncupatur, à qua nō scirrhusi tumores, sed canceri gignuntur, ex colore inquit Galenus præcitato libro de tumor. præter naturam, cap. 10. intertinguere valebis. Sed cum scirrhusi tumores, de quibus hic verba facimus, eorum colore dignosci non valeant, dicimus nos quod ex vniuersi corporis colore scerni possunt. Nanque si ex nigra bile orti fuerint, color totius corporis ad nigrius declinabit. Si verò ex crassa, lentāq; pituita originem traxerint, ad albidius: aliquando veluti plumbi colorem habent. Nam pro diuersa natura redundantium in iocinore humorū, ex quibus prædicti affectus fuerint excitati, quod totū corpus simili colore inficiatur, nemini in dubiū venit, cum viscus sit princeps toti corpori alimenti materiam suppeditans. Proinde Galenus fassus est 5. de locis affectis, sapenúmero solo colore comprehendisse, modo iecur, modo splenem esse affectum. Insuper ex ætate, temperamēto, regione, anni tempore, ac præcedenti victus ratione illud confirmare poteris. Et ubi prædicti succi permixti fuerint, idem color, ac eadē quæ sumuntur ex modo dictis, indicia permixta erunt. Cæterum ex quacunque causa in iocinore exquisiti scirrhī fuerint orti, omnino sine sensu persistentes, omnino quoq; insanabiles sunt, velut in cæteris etiam partibus (vt liquet apud Galenū 14. meth. med. cap. 6. & 2. de arte curatiua ad Glauconem, cap. 4.) Quamquam neque is, qui difficulter sentitur, facile curationem admittat, (vt ipse inquit) eodem quoque 2. de arte curatiua ad Glauconem, cap. 5. de hepatis scirrhusi sic scriptum reliquit, quod ab initio quidem sapius ipsum sanauerit: ubi verò ad plures dies fortē fuerit extensus, neque ipse potuit sanare, neque alium vidit, qui posset. Nam omnibus iis, qui ita affecti sunt ex necessitate subsequitur aqua intercutis. Pereunt autem quamplurimi in tempore longo: quidam etiam breui, qui ventris profluuiū laborant. Propterea Paulus præcitato loco dicebat, si verò iecur induratum fuerit, parū in medicina spei est, affectu in aquam subtercutem decedente. Qui autem iocinoris scirrhusi tumores, præsertim circa eorum initia curari poterunt, ea curationis ratio, quæ musculofarū partium scirrhīs competit, sanare eos consuevit, Galeno teste eodem secundo de arte curatiua ad Glauconem, cap. 5. Quoniam viscus hoc fortia medicamenta non perfert, veluti splen (vt ipse inquit.) Communis autem curandi scirrhum indicatio est, vt quod præter naturam in particula continetur, totum vacuetur vt 14. meth. med. cap. 4. scriptum est. Id verò perficitur nedum medicamentis extrinsecus adhibitis, verum eis, quæ in potu sumuntur vim habentibus aperiendi, atque extergendi eum, qui in viscere continetur, humorem, ac etiam victus ratione conuenienti adhibita. Et propterea ex his scirrhusus tumor in hepate factus sanari poterit, ex eiusdem Galeni testimonio præcitato libro secundo de arte curatiua ad Glauconem, cap. quinto. Ea de re nos primò victus rationem conuenientem præcipimus, secundo quæ in potu medicamenta sumuntur, & tertio quæ foras adhibentur

*Iocinoris
scirrhusi laborantis
indicia.*

*Quis affectus præter naturam sit scirrhus.
13. meth. ca.
4. & 14. meth. cap. 9.*

Causa.

*Quomodo
diuersi
scirrhusi
causam
dignoscantur.*

*Medica
pauca*

Cap. 10.

Propter

*Methodi
causam*

*Emoll
medic
na quo
curatur.*

hibentur, conscribimus. Verum quantum ad victus rationem spectat, cum eadem victus ratione vten- dum sit, qua in obstructionibus liberandis vtimur, breuissimis verbis eam absoluemus. Nam cibi, qui facile concoquuntur eis exhibendi sunt, qui que & incisoriam vim, & repurgantem complectuntur, vt inquit Aetius. Neque etiam inepte eis acrim re- rum comestiones sunt, si per interualla, & post exer- citia, ac gestationes sumantur. Pro ratione etiam motuum, & exercitiorum tum quantitatem tum qualitatem ciborum augere oportet. Vitanda sunt crassa, & viscosa edulia, atque ea quae difficulter co- coquantur, sic etiam & dulcia omnia: quoniam (vt diximus) hepatis affecto nocentissima sunt. Vinum pro potu coepit tenue, odorum (moderata quanti- tate acceptum). Reliqua vero, quae ad victus ratio- nem spectant, supra cap. de obliuio. requiras. In potu autem sumantur cuncta ea quae in renibus co- tentos lapides comminere apta sunt, quibus admi- scere oportet aliquid ex iis, quae vrinam mouere possunt, Galeno auctore, praecitato libro secundo, de arte curatiua ad Glauconem, cap. quinto, quem sectatus est Paulus cum dixit, Portiones expediunt, quae angustias visceris recludunt, absterguntque: ha- iusmodi sunt quae vrinam citant, & calculos confrin- gunt. Ad haec ea quae nuper ad iccoris obliuio- nem dicta a nobis sunt. Non est igitur cur hic spe- ciatim de eis mentionem facere debeamus, cum infra locupletissime de his quae calculum confrin- gunt, atque vrinam citant, pertractaturi sumus: fusi- us verò pertractauerimus de his, quae iccoris obliu- tionem liberant, eiusdem igitur locis studiosi ea re- quirant. Vnum tamen ex Aetio non praetermit- tant, vt potè anagallidis, quae caeruleum florem ha- bet succum, qui exsiccat, itémque liquidus ex a- qua multa, immoderatis autem febribus ex aceto multo, potatus confert. Similiter etiam si viticis tor- refactis, aut radicis eupatorii drach. i. eodem modo exhibeatur. Ceterum cum affectus hic ex superfluo humore simul cum frigidityte trahat originem, id- circo compositam esse eius medela oportet, ob re- frigerationem scilicet, exalfaciencia poscente affe- ctu, ob alienam verò, & superuacancam humida- tem, euacuantia. Attamen vitanda ea sunt, quae im- modicè vim habent calfaciendi, ac valide exsiccan- di, nedum intus assumpta, verum etiam de foris ad- mota. Nanque (vt Galenus inquit quinto de simpli- cium medicamentorum facultatib. cap. sexto.) nul- lus, scirrhus tumor curari valet, neq; a valide ex- siccantibus, neq; a fortiter exalfacientibus, neque ab iis, quae vtrique haec praestare possunt, propter causas ab eo ibidem traditas. Et propterea sola ea, quae calfaciunt, sed non admodum, vnaque exsiccat non magnopere eiusmodi affectus sanare possunt: vocanturq; Graecè μαλακνόμενα, Latine emollientia, eodem simul tempore vtrunque agentia: nempe quod congelatum est fundentia, & sensim per hali- tum digerentia: peculiariter etenim medicamentum emolliens non de omnibus induratis, ex quavis cau- sa dicitur, sed de iis, quae congelatione induruerunt, magisque si in eis contentus sit humor praeter na- turam: velut in hisce scirrhis tumoribus: quem- admodum idem Galen. testis est praecitato libro 5. de simplic. medicamentorum facultat. cap. 4. Cuius farinae sunt ea medicamenta (vt diximus) quae calo- rem habent tepidum, humiditatem verò nec mul- tam, nec omnino minimam, & propterea modicè

exsiccantia. Nanque oportet induratum corpus à medicamento, quod auxilio futurum sit, simile quid pati iis, quae sub sole funduntur, alias si quis medica- menta, quae vehementer dissoluant, trahunt, ac di- gerunt, induratis corporibus adhibuerit, eisque va- cuare tentet, nec iis vtatur, quae exalfaciendo mol- liunt, ac liquant, huiusmodi paucis primis diebus e- gregiè processisse curatio videbitur, quod de affe- ctu tamen restabit tantum insanabile erit: siquidem toto, quod in eo tenuium partium erat, digesto: quod reliquum est veluti lapidosa conerectio linque- tur (Galenus auctore 2. de arte curatiua ad Glauco- nem, cap. 14. & 14. methodi meden. cap. 4.) Hac igitur de causa ad scirrhusos affectus (vt diximus) nul- lum vehementer exalfaciens, siue aliudque medi- camentum aptum: sed ea tantum, quae cum molli- do digerere possunt, ex eiusdem Galeni sententia. Quanquam eiusdem indicatione sumpta à parte af- fecta, quae semper, vt Galenus inquit eodem 14. me- thodi med. cap. 5. in omnibus tum morbis, tum sym- ptomatibus in memoria habenda erit, ea quae ad- stringendi vim habent, admiscenda sunt, ita tamen, vt semper, quae digerendi, dissoluenti, ac molliendi vim habent, adstringentia superent. Quapropter augere oportet ea, quae ratione inflammationis ip- sius apponuntur cum cataplasmata, tum etiam & fo- menta ex Galeni & Aetij sententia, & fortiora qua- dam annectenda sunt. Ea autem constabunt ex ab- syntij coma, nardo, tum inda, tum celtica, croco, ce- nanthe, mastiche, chia, nardino, ac lentiscino vn- guento, adhuc autem & mastichino, & melino (vt ia- ppi inquit.) His igitur ammoniacum thymiam, bdellium, althaeaeq; radicem, ceruinam, seu vitulinam medullam, ac anseris, seu gallinae adipem miscere o- portet. Nec minus & aliquid eorum, quae incidere possunt, admiscendum est, vt eodem 2. de arte cura- tiua ad Glauconem, cap. 5. & 14. metho. med. cap. 5. liquet. Hac etenim incipientem in hepate scirrhum sanare poterunt conuenienti simul adhibita dieta, simulq; medicamentis aperientibus, atque abster- gentibus humorem, qui in viscere continetur. Pote- runt autem hunc in modum medicamenta parari, *Topica.* Recipe absyntij p. s. foliorum, & radicem althaeae ana manip. i. bulliant in oleo communi, quo sepius per spongas supra hepar fomentum admoveatur, dein recipe olei de absynthio, & mastichini, singul. vnc. i. nardini. & cytoniorum, cuiuslibet vnc. s. spicae nar- di, indicae, vel celticae ana drach. s. croci scrup. s. ad- pis anseris, seu gallinae, & medullae ceruinae, seu vi- tulinae ana vnc. i. ceræ quantum satis sit, & aceti pa- rum, fiat vnguentum, quod mane, & vesperi appli- cetur, praecedentibus semper praedictis fortibus. Pro- cedente verò tempore addere poteris praedicto vn- guento vnc. s. vel vnc. i. ammoniaci, aut bdellij hu- mectioris exstantis, siue stryacis similiter humectio- ris, quae prius aceto dissoluantur, & si maior in cata- plasmatibus formam redigere, folia excipe, simulque radices maluarum, ac althaeae quantitate cuiuslibet manip. i. & cum modicè prius fuerint decocta, contrundantur, addeque adipis anseris, seu gallinae vnc. 2. lenti cremoris foenugreci, seminis lini, & al- thaeae ana drach. 3. olei mastichini, lentiscini, & de absynthio ana vnc. i. ammoniaci, seu bdellij in ace- to dissoluti vnc. 3. misceantur, & fiat cataplasma cum oximelite, quod item praecedente semper fomento adhibeatur. Interim addere poteris nardi spicae, in- dicam, aut celticam, cuiuslibet drachm. i. assumens

& croci scrupulis. Illud tamen perpetuò seruandum erit, ne admodum fortibus medicamentis vtare, eum ea viscus hoc non perferat, vt diximus ex Galeni auctoritate. Et proinde non audeas quæ supra medicamenta, quæ vehementer discutiunt, trahunt, ac digerunt, nisi eorum exigua sumatur quantitas, admisceaturque lenibus semper medicamentis nuper conscriptis. Nec eadem vnquam omnino ab adstringentibus absoluantur: qua habita methodo, poteris ex communeratis medicamentis varios (vt vltus requirit) potius diuersaque cataplasmata, ac vnguenta componere tum lenia, à quibus semper incipias, tum valida, tum mediocria: & proinde huic capiti finem imponimus. Illud tamen animaduertentes, quod vbi multò sanguine abundauerint laborantes, priusquam modo dictis medicamentis vtaris, vena secanda erit interna dextri cubiti. Et si copia adsit pituitosi, vel melancholici succi, ij quoque prius purgandi sunt. Sæpius autē talia pharmaca fuerunt adnotata, præsertim capite de melacholia, & de obstructione iocinoris.

Id est, De ictero seu morbo regio.
CAP. LXXXVI.

IN excrementorum separatione, omnino ea nō peracta, vel non ritē, symptomata quædam fiunt, aliqua nomine proprio vacantia, alia verò vulgò nominata, veluti *icteros*, à Græcis dictum quemadmodū Galenus testatur libro de differentiis, & tertio de causis symptomatum. Hunc affectū Latini quandoque icterum, interim auriginosum nominant. Celsus autem & arquarum, & interdum regium morbum appellat, vt liquet cap. 24. libri tertij. Medicorum vulgus icteritiam nuncupat. Cur autem morbus regius nominetur hic affectus, ab eodem Cornelio præcitato loco ostenditur. Verū eum Græci affectum hunc *ictēpov* nuncupent, ab Aetio cap. 17. libri 10. declaratur. Ait enim *ictēpov*, à similitudine ad animalculum, quod *ictē*, id est viuerra appellatur, nominatus est. Est autem id animalculum mustella syluestris, quæ auricolores oculos habet, sed quicquid sit de eius nomine, hoc pacto ipsum describit eodem loco, quod biliosi humoris circum corpus effusio est, secermentis eum facultatis debilitatem, quæ eum segregare, & ad proprios excretionis locos demittere non valet. Paulus quoque cap. 50. libri tertij, dicebat, regium morbum esse bilisper totum corpus effusionem, modò atræ, de qua in lienosis dictum est, modò flauæ. Atqui nos de eo ictero verba facimus, qui effusio est flauæ bilis per totum corpus, hæc tamen effusio verè, & propriè icteros dicitur: nam de atræ bilis effusione in sequentibus pertractabimus. Et cum dixerimus affectum hunc vitio segregationis excrementorum prouenire de eo excremento intelligimus, quod flaua bilis appellatur. Hæc inquam, cum non omnino, vel non ritē segregatur, ac expurgatur, per totum corpus cum sanguine diffusa, huius mali auctor est. Verū cum ex triplici causa id pronenire possit, vt tertio de causis symptomatum, à Galeno scriptum est, nanque vel vitio particule, quæ excrementum ipsum expurgat, vel ratione viarum, per quas expurgat, vel vitio ipsiusmet excrementi, quo fit, vt non perpetuò in morbo regio idem locus affectus sit, neque etiam iecur (vt à Galeno demonstratum est quinto de loc. affe. cap. 7.) quamuis interdum ipsum afficiatur, item neque ipsa vesica bilis semper afficitur (vt eodem lib. scriptum est, similiter à Paulo, & Aetio præcitatis locis) propterea nos cum nuperosa sint morbi regij differentia (eodem Paulo auctore) pro earum diuersitate conabimur affectas partes inuenire, cum aliæ partes afficiantur, si eiusdem excrementi vitio morbus regius proueniat, aliæ si propter viarum angustiam, vel propter ipsius particule expurgantis imbecillitatem. Quod verò biliosum hoc excrementum vesica, quæ iocinori subest, expurget, liquet apud Galenum præcitato libro tertio de causis symptomatum, & quarto de vltu partium, ac quinto de locis affectis, & sextis aliis in locis. Cum itaque non vnus locus perpetuò in morbo regio afficiatur, errauerintque qui hepatis affectionem in omnibus ictericis adesse putauerunt (vt inquit Aetius) iure indagandum putauimus quorū partes in eo affici possunt, ac quo modo, & quibus notis interstinguui poterunt. Atqui compertum est in Galeni, Pauli, atque Aetij doctrina in quouis morbo regio aut iecur, aut vesicam bilis, vel vniuersum corpus affectum esse. Quapropter vbi iecur affectum sit, excrementa alui flaua bile vehementer colorata, similiter & vrina videbuntur, pariter & sudores, si ij quoque effundantur. Excrementorum namque proprietatem in morbo regio considerare perquam necessarium est, vt quinto de locis affectis. cap. 7. decretum est, præsertim si cum eis eorum, quæ præcesserunt, memoriam habuerimus. Interim febris quoque aderit, ac præcordiorum in dextra parte dolor, quandoque verò etiam dorem, ac grauitatem, & febrem, feruorem ea parte sentient, aderitque sitis, ac corporis exsiccatio, ac eiusdem coloris varia mutatio, manifestè etenim quandoque videmus (eodem Galeno teste præcitato loco) iocinoris secundum naturam temperie mutata, vniuersum corpus herbis candenti pallore infectis similari, interdum plumbeum, aut etiam magis fuscum referre colore, interdum etiam alias quasdam inefabiles colorum proprietates, quæ iocinore suo munere non rectè fungente, accidere solent. At vbi citra febrem morbus regius accidat, vrge in dextra præcordiorum parte grauitas cuiusdam sensus, & alba sint, quæ per aluum deiciuntur, ac statim vrina biliosissima, & affatim excernantur, vesicæ bilis vitio talem morbum regium fieri haudquaquam verendum est. Verū si non vniuersum, sed paulatim morbus regius procreetur, sic vt nullum ferè ex commemoratis adesset (vt Paulus testatur) sintque alui excrementa proxima consuetis similiter & vrina, fiatque cutis pruriginosior, ac magis arida vitio vniuersi corporis, seu solidis partibus nimio calore intemperatis, hunc procreari morbum regium manifestum erit. Caterum quæuis pars in eo afficiatur, perpetuò icterus symptoma est, eorum genere quæ in corporis affectibus consistunt. Et cum primæ eorum differentia numero quatuor sint, sub visibilibus comprehenditur, quæ in coloribus, qui præter naturam sunt, consistunt, idque non alicuius, vel aliquarum partium, sed vniuersi corporis, Galeno auctore libro de differentiis symptomatum, cap. 5. Communiter autem omnibus ictericis pigricies, & tumor grauians ad motum corporis contingit, & ad dulces cibos animum habent alienatum, amarus verò non admodum auersantur, & variis imaginationibus vexantur, pruritus etiam vniuersi corporis comitatur, ac difficulter exsudent: alba oculorum, & par-

Lib. de differentiis symptomatum. cap. 4. 3. de causis symptomatum. ca. vi.

Morbus regius quid sit.

Quod flaua bilis, ut non ritè expurgatur, trisariam continet. cap. 2.

Cap. Si ob tu in matris fiat n regis gna.

Si cap. bilis.

Si ex dem inter calid signa.

Si ex pruritu seu ris se fiat n regis gna.

tes faciei temporibus propinqua, itēq; malā pallorem ostendunt, venā etiam sub lingua repleta reperiuntur, & abundantem humorem significant, Actio auctore. At, vt inquit Celsus, color cum morbum detegit, maximē oculorum, in quibus quod album esse debet, fit luteum, solētque accedere & fitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum dextra parte durities: & vbi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumq; resolutio. Atqui vbi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbefcit. Verū licet morbus regius (quomodocunq; fuerit ortus) perpetuo sympt. sub eodem genere sit, ac biliosi excrementi separatione frustrata fiat vt dictum est, quæcunque etiam pars in eo primò affecta sit, tamē non semper in eo segregatrix facultas oblesā est, neque ad functionum noxam sequitur, vesica bilis imbecilla existente in seipsa, ita vt non valeat, aut ipsam bilem attrahere, vel eandem expallere, sed inter viarum angustiam consequitur: quandoque verò ex ipsiusmet excrementi vitio fit, vt diximus. Id quod etiā fortē innuere voluit Aetius, quamuis eius verba videantur asserere, semper icterum ob fecerentis bilem facultatis debilitatem oriri. Nanque subdit demum, quæ eam segregare, & ad proprios excretionis locos demittere non valet, quòd nedum ob facultatis imbecillitatem, verum etiam ob viarum angustiam, ac excrementi vitium fieri potest. Propterea id perfectē dignoscere, atque exactē interlinguere operæpretium duxi. Ex quibus insimul patebit eiusdem morbi regij causarum diuersitas. Oritur itaque interdum morbus regius ex iocinoris inflammatione, propter quam sanguis omnino à bile ipsa expurgari nequit, imò vnā cum ipsa sanguine bilis per totū corpus defertur, & hinc morbus regius generatur, propterea quòd & eiusdem bilis copia ob eandem causam in eodem viscere gignitur, & constipatio quædam fit, seu angustia locorum, per quos ipsa bilis ex venis transfertur ad canales vesicæ bilem recipientis, vt Galenus inquit commento aphorismi 64. quarti libri. Cuius quidem morbi regij indicia sunt præcordiorum dextra parte dolor, biliosa deiectiones, & febris, vt inquit Paulus. Nanque ij omnino febricitant, Galeno teste nono de compositione medicamentorum secundum locos. cap. 1. Similiter & vrinæ flaua bile vehementer calorata videbuntur. At si citra grauitatem feruor in ipso existat, ex sola iecoris calida intemperie vitium gignitur, vt idem Paulus testatur. Ex qua calida intemperie cum multa copia bilis progignatur, quæ præ multitudine expurgari nequit, eadem per totum corpus diffusa, propter eiusdem excrementi copiam, icterus excitatur. Nec minus & ex obstructione, non siquidem paruorum vasorum per substantiam iocinoris distributorum, per quæ alimenti, ac sanguinis digestio in vniuersum corpus fit, sed eorum locorum per quos transfertur bilis ad canales ipsam recipientes ex eadem vesica bilis ortos, ac per iocinoris substantiam extensos, vt patet commento præcitati aphorismi, excitatur morbus regius propter viarum vitium, hoc est ipsarum obstructionem: quæ etiam ratione angustatis videlicet iam dictis viis ex eiusdem visceris scirrho, morbus regius generari poterit. Verū si scirrhus fuerit causa, eiusdem indicia præcedēti cap. de scirrho, requiras. Si verò ex obstructione ortus fuerit, sine febre permanent ægri (eodem Gale-

no teste præcitato libro nono de compositione medicamentorum secundum locos. cap. 1.) Necnon & grauitas quædam in eadem dextra præcordiorum parte aderit, præsertim inter vehementer respirandum, nullūque aderit scirrhi indicium. Quòd si absque febre alba deiciantur alui excrementa; vesicæ fellis (vt diximus) malum ostenditur. Verū id bifariam esse poterit, nanque vel ob eius imbecillitatem, propterea quia biliosum humorem veluti confuevit in se ex hepate non attrahit, & ob id impurum sanguinem reliquit. Quamquam etiam contingat eandem nimis repleti, & propter repletionis multitudinem idem excrementum expelli ad intestina nequeat: & excretice insimul facultate existente imbecilla. Poterit & secundò morbus regius vitio viarum ex ipsa vesica ortarum oriri, vt pote cum ipsæ obstructæ fuerint: & hoc, vel cum obstructæ fuerint viæ per quas ex iocinore ad ipsam vesicam biliosum excrementum trahitur: vel eæ per quas ab eadem vesica ad intestina propellitur: quippe omnibus prædictis modis non expurgatus à bile sanguis in totum corpus diffunditur, ac morbus arquetus efficitur. Ex viarum vitio, si propter earum obstructionem fieri contingat. Ex imbecillitate verò separatricis facultatis, si eadem vesica bilis in attrahendo, seu excernendo prædictum succum propter aliquam eius intemperiem fuerit debilis. Nanque fellis folliculus, cum inter naturalia instrumenta connumeretur, vnicum habet veluti reliqua imbecillitatis principium à partis intemperie ortum, vt eodem quinto de locis affectis, in fine, Galeno visum est. Atqui interlingues, si ob meatuum ipsius obstructionem fiat morbus regius: nanque cum albis excrementis grauitatis cuiusdam sensus circa dextrum hypochondrium vrgebit citra febrim. At si propter eius imbecillitatem fiat, talia excrementa citra grauitatem deiciuntur, vtrisque tamen statim vrinæ biliosissime affatim excernuntur, vt inquit Paulus. Cæterum, si hoc vitium febriente ægro repente, ac cumulatim superueniens febrem finierit, crism testatur, materia ex alto foras prorumpente, prorupte nimirum ad cutem bilioso humore ratione bonæ indicationis, vt ex Paulo, & Galeno liquet: qui morbus regius, ex excrementi vitio quoque generationem habet, eo siquidem crasiori existente, potius quam multo. Nam si tenuis eadem fuisset bilis, vtique & in eadem crisi foras propulsa fuisset. Id quoque confirmabunt alui excrementa, & vrinæ, quoniam vtraque secundum naturam se habebunt, & ob eam causam nullum visceris affectum declarabunt. Contingit etiam citra febrim aliquando sanguine in bilem exagitato, propter corruptionem aliquam peregrinam ortam ex noxiæ medicamenti potione, aut venenatarum bestiarum morsu, quòd propterea morbus regius fiat, Actio & Paulo testibus. Quòd verò ex ferarum morsu fieri soleat, exemplo probat Galenus quinto de locis affectis, cap. 7. cuiusdam imperialis serui, qui vipera rum venationi deputatus erat, cum à vipera morsus esset. Huic vniuersi corporis color fuit mutatus, adeo vt porri colorem referret. Ex multitudine quoque biliosi excrementi, & hic morbus regius ortus, propterea quòd sanguis extraneæ quadam corruptione in bilem fuit versus. Neque etiam difficulter is dignosci poterit, si ab aliqua prædictarum duarū causarum fuerit ortus, ægrotantis, aut astantium interrogatione percepta, quæ earundem præcesserit

Si vitio ve
sicæ fellis or
iatur, si-
gna.

Signa mor-
bi regij ex
crisi.

Locis cita-
tis.

Si ab ali-
qua causa
externa
fiat signa.

*Si vniuersi
corporis
vicio fiat,
signa*

causa. Si verò non vniuersum, sed paulatim procreetur morbus regius, nullumque ex commemoratis addit, ita ut neque dolor, neque grauitas circa illa infestet, neque febris præcesserit, plurimum in vniuerso corpore procreari bilem pendere debemus. Idque bifariam esse poterit, vel propter solidarum partium calorem immodicum, vel ratione alimenti, quod ipsis distribuitur. Ex vtraque tamen causa propter excrementi multitudinem icterus oritur, quoniam cum expurgari nequit, vna cum sanguine per totum corpus defertur. Vna autem ab altera causa distinguitur, interrogatione facta eorum, quæ præcesserunt. Nam si multo tempore calidioribus cibis, ac potibus usus fuerit æger, ciborum vitio tribuenda erit occasio: vbi verò hæc non præcesserint, ex calida vniuersi corporis intemperie, audacter morbum regium excitari censeto. Tot itaque sunt morbi regij differentia à diuersis causis orta: quæ iam dictis signis facile dignosci, ac inter se distingui poterunt. Reliquum est, ut eiusdem prognostica enunciemus: quorum primum Hippocratis est aphor. 62. quarti libri, dum inquit, Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum accedit, malum. Nam cum iudicatorius esse non possit, sed symptomatice potius, iocinore male se habente (ut in comment. Galenus asserit) nec propter aliud malum ipsius hepatis ante septimum oriri possit morbus regius, quam ex inflammatione, vel obstructione eiusdem visceris, cum citius non possit iudicatorie bilis perducere in corpus: quoduis prædictorum effectum consequatur, semper malum est, nec post septimum, si propter eosdem affectus iocinoris excitetur, periculo vacabit, ut liquet ex eodem Galeno ibidem. Hoc idem confirmat tertio de morbis vulgaribus, Galenus, cum dixit, Reduc item ad memoriam ante concoctum morbum crebro te auduisse nullum quemlibet abscessum proficere, nedum auriginosum, is enim impediri significat bilem, quominus ex viscere expurgetur, & per ventrem effundatur, vel propter oppilationem eius, vel propter inflammationem. Verum morbo iam concocto decretorie interim natura ad cutem excrementum effundit, cum quorundam aliorum humorum, tum fluxus bilis. At huius Hippocr. sententia contrarium quarto de ratione victus, scriptum reperitur. Ait enim auctor, in biliosa febre morbus regius cum rigore ante septimum diem enatus, morbum soluit. Si verò absque rigore præter occasionem superuenierit, pestiferum. Nisi esset quoddam (ut Galenus refert in expositione prædictæ sententiæ) neque ante septimum diem, neque post septimum cum rigore enatus morbus regius febrem soluit. Sed ita distinguere oportet, quod febrientibus morbus regius superuenit interdum quidem tanquam affectionis hepatis symptoma, quod malum est (ut diximus ex eius sententia) interdum quoque, & natura post coctionem per cutem excernere contendente, sed nequeunte, veluti in abscessibus omnibus fieri consuevit, quod nequaquam malum est, imò si cum rigore fiat, morbum soluit in biliosa febre: quoniam & natura vehementiori motu mouetur ad expellendam bilem, eam, quæ mordacior, ac acrior est, id quod per rigorem significatur. Et licet ipsa eadem bilis ante septimum iudicatorie effertur sit impossibile (ut

Prognostic.

*3. de morbis
vulgaribus
lib. 1.
comment. 5.*

ex. 81.

Loco citat.

patet comment. eiusdem aphorismi 62. quarti libri bene tamen decretorie ad cutem effundi poterit (ut eodem tertio de morbis vulgaribus inquit.)

In biliosa scilicet febre, circa aliquem iocinoris affectum, ut puta inflammationem, seu obstructionem (ut diximus) morbo iam concocto, & potissimum vbi per aliam viam natura eandem postea bilem excernere valuit, per alium videlicet, aut vesicam, vel largum sanguinis profluuium, quemadmodum Hippocrates, & Galenus primo de morbis vulgaribus, scriptum reliquerunt. Idem quoque Hippocrates aphorismo 64. eiusdem libri quarti, dicebat. Quibus in febribus morbus regius, septimo, vel nono, vel vndecimo, vel decimo quarto superuenit, bonum, nisi dextrum hypochondrium obduerit: si verò non, non bonum, & apho. 42. lib. 2. scilicet, sic de morbo regio scriptum reliquit. Morbo regio laborantibus, si fiat hepar durum, malum. Celsus verò Dioclis auctoritate testatur, quod si morbus regius post febrem oriaur, ex toto proderit, si post hunc febrem, occidet. Quantum verò ad curationis rationem spectat, si icterici fiant ratione bonæ iudicationis in febribus, facile hi curantur (Galeno teste nono, de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 1. & Aetio cap. 18. lib. 10.) ex aquarum potabilium balneis, ac olei disculforij affricu, & omnibus cutem rarefacientibus, quale est anethinum oleum, & chamæmelinum, irinum, & amaracinum. Similiter, si (ut inquit Aetius) rosmarinus herba oleo incocta ipsum plurimum disculforij facit; cum his præterea victus adhibendus est humidior; qui humorum crassitudinem moderatè extenuare possit, ut eidem Galeno visum est quinto de locis affectis, cap. ult. & Aetio præcitato loco, quamquam idem Galenus eodem loco præceperit taliter laborantibus, ut aqua suapte etiam natura calida, & cui discutiendi vis esset, vterentur. Ex his nanque quidam bonam valetudinem consequutus fuit, ut ipse inquit. Si verò ex letalis veneni portione, aut ex virulentorum animalium moribus quispiam ictero corripiatur, is vtendū erit alexipharmacis, quæ aduersus talia suo loco conscribuntur: quanquā Galenus imperialem serum viperarum venationi deputatum, cum à vipera morsus esset, per theriacam potionem curauerit, ut eodem quinto de locis affectis, testatur, & propterea eadem vi poteris. At vbi ex solidarum partium calore immodico in regium morbum inciderint, ad sanitatem reducetur (Paulo auctore) cibis humidis, & mediocriter refrigerantibus, præsana scilicet, intubis, seri, cichorio, piscibusque, & vino tenui aquoso, nec non simplici frictione, exercitiis moderatis, vntione, ac balneis (ut ipse inquit) quæ ex potabili aqua tepida fiant, in qua decoquantur medicamenta frigida, & humida: qua etiam ratione curabitur, si ratione alimenti, quæ ipsis partibus distribuatur, fuerit excitatus morbus regius. Verum si non vniuerso corpore primario affecto, sed iocinore male se habente morbus regius excitetur, quouis fuerit eius affectus, siue calida intemperies, siue inflammatio, vel obstructio, seu scirrhus, non alia ratione indigebit, quam ea, quæ à nobis prius instituta est, pro eorundem effectuum curatione: quare non est cur iterum hic eandem repetamus, sed illam in hoc caput transferre oportet. Restat itaque, ut eius morbi regij curationem præcipiamus, Si vbi qui vitio vesicæ bilis excitatur. Hic omnino his, quæ obstructiones aperiunt, cibis, potibus, & medicamentis extenuantibus, deinde his, quæ bilem ducere possunt, curari desiderat Galenus auctore quinto de locis affectis. Propterea aer tempe-

ratus

peratus eligatur, aut parum ad calidum vergens, somno item moderato vtantur, nocturno potissimum, lecto etiam, & conclauis cultiore clauso loco, ludis, lasciuia, per quæ mens exhilaratur (vt Celsus inquit.) Conueniunt item exercitationes, & gestationes (vt Aëtius refert.) Per omne etenim tempus vtendum est exercitatione, frictione, si hyems est, balneo, si æstas, frigidis natationibus, ex eiusdē Celsi sententia. Alui excrementa quotidie expurgari debent: quæ si non natura excernantur, clysteres adhiberi debent. Clyster enim, eodem Aëtio teste, propter stercorum euacuationem spirandi facilitatem inducit, intestinæque irritando, ac mordendo humores ad cutis superficiem delatos ad ipsa retrahit, & reuellit, præsertim ubi acrior fuerit. Animi affectus immodicos virent, vtantur tamen animi laxamento, ac iucunditate. Nam maximum adiutorium & magis utilis est, ægotantibus animi purissima laxatio, siue serenitas, Cælio Aureliano teste capite quinto libri tertij. Cibi eligantur faciles concocti, simulque incisiu, & attenuatorii, vt patet ex eodem Aëtio. Ex volucrum quidem genere maximè montanæ, vt sturnæ, phasiani, turdi, merula, ac reliquæ aues parue. In earum verò penuria, gallinis, ac gallinaceis pullis vtantur, cum quibus olera ea decoqui poterunt, quæ vim extenuandi, ac vrinam ciendi habeant, veluti feris, intubum, asparatus, oreofelinum, feniculum, serpillum, sinyrinum, carduus, & eryngiū, daucus, ac reliqua huiusmodi. Inter quadrupedum etiam carnes, ferinæ mansuetis magis sunt aptæ: quibus etiam interim vti poterunt, ea preolorum præsertim, à fructibus abstinendum est: amygdalæ modicè sumi possunt. Pro potu vinum conuenit album, subadstringens, neque valde vetustum, vt eidem Aëtio visum est. Vbiq; tamen medicritas optima cõsetur, vt ipse inquit. Verum ubi meatus vesicæ bilis vtrique sunt obstitati, vel alter duntaxat, vt Paulus testatur, consilium est venam in dextro cubito secare, namque duo maxima remedia in huiusmodi ictericis principatum obtinent, (vt inquit Aëtius) sectio videlicet venæ, & purgatio, potissimum, ubi multitudo sanguinis vnà cum bile in toto corpore abundat. In his namque nihil venecisione commodius fieri poterit, si nihil impediatur. Sanguis autè particulatim, & per vices detrahendus erit, ne per coacervatam euacuationem vires ægri prosterantur. At purgationes magis propriæ, & familiæ huic morbo existunt (vt idem Aëtius testatur Ruffi auctoritate) propterea tutius eis vti debemus, potissimum ubi sanguinis multitudo vnà cum bile in toto corpore non redundet, neque circa iecur dolor, aut distentio infestet. Et propterea Galenus quinto de locis affectis, cap. 7. prætermisit venæ sectionem, & purgationem cõmendauit. Quanquam neque his vti debeamus, nisi prius humores edulsi, ac portionibus itémque pharmacis prius fuerint attenuati, atque oburationes de oppilate, præcepto Galeni præcitato libro quinto de locis affectis, & Aëtij præcitato loco. Purgationes namque in principio date, priusquam bilis fuerit attenuata, ac vasa fuerint reaserata, maximi mali causam præbuerunt. Ex quibus colligi potest bilem interim præparatione, ac attenuatione indigere, quemadmodum in nostra methodo. M̃ verò attenuetur humor, reaserenturque vasa, ictericis dari potest apij, vel adiantij, vel lapathi decoctum ad tertias. Vtilis quoque est absynthij cremor per se, & cichorij succi cy-

thi bini, aut terni per se, aut cum vino poti. Similiter & verbenacæ rectæ, aut oxalidis decoctum, vt liquet ex Aëtio, & Paulo. Si quis autè velit eos, quibus vtimur, prædictorum loco syrup. adhibere pro extenuatione, & reaseratione perficienda, caput cõsulat de iocinoris obstructione: qua reaseratione, ac extenuatione peracta, medicamentum, quod bilem ducere possit, exhibe, iuxta Galeni sententiam. Sit autem forte pharmacum purgatiuum, vt iubet Aëtius, nam ictericis purgationes exhibendæ fortiores sunt. Etenim ob ventris siccitatem imbecilliores, inefficaces in ipsis cognoscuntur, vt ipse inquit. Adde & secundò, quod parum quidem habemus in tali purgatione naturam adminiculantem, namque vel attrahere, vel expellere ob copiam, seu obstructionem bilem nequit ipsa vesica bilis, vt diximus, in prædictis ictericis, imbecilla siquidem existente eius separatrice, ac expultrice facultate. Vt autem noxi humoris promptè fiat euacuatio, vtrisque indigemus, natura siquidem expellente, & medicamento attrahente, quemadmodum ipse Galenus commento aphorismi 22. primi libri, scriptum reliquit. Poterit autem purgans pharmacum ex casia fistula, seu melle rorido, rhabbaro, seu agarico, diacath. & tryphera componi hunc in modum, Recipe mellis roridi vnc. ij. s. vel casia fistulæ vnc. j. s. rhabbari cum spica in vnc. j. s. succi rosarum macerati, & per colum transfusi scrup. 4. diach. drac. vij. tryphera perficæ drach. iij. cum aqua cichorij, vel lupulorum, in qua prius drac. j. agarici, seu scrup. iij. fuerint decocti, fiat potio. At si neque dicta purgatione liberari poterint, iis rursus valentioribus ad aperiendum datis potionibus, medicamentum quod vehementius purget, exhibendum erit, ita vt etiam ad finem purgationis, vnà cū vehementissima mordacitate bilis excernatur, quæ carulea magis sit, quàm flaua, vt inquit Aëtius ex Ruffi auctoritate, & Galen. præcitato loco. Propterea cum cremore absynthij nardus indica, ac iunci rotundi odorati flores adiciantur. Item conuenit pulegij, aut calaminthæ decoctum. Prodest etiam rumex satius, anchusæ radix, rubeæ tinctorum radix, chamæpityos, rorismarini, & aristolochiæ, item serpillum, hypericum, & eius generis plurima alia, singula in aqua ad tertias decocta cum vino dulci bibenda præbeto, aut contundito, & cribrato, ac singul. drac. j. dato, vt inquit Aëtius. Datur item valde commodè cornu ceruini ramentum cochlearij mensura, petroselinū, anisum, asarum, leucanthemos, & bupthalmos. Galenus Archigenis auctoritate eodem nono de compositione medicamen. secundum locos, cap. 7. cagulum leporis commēdat, si cum meraco ad dies quinque, vel sex præbeat: quibus sapius adhibitis, aut vice eorum exhibitis syrup. qui validiorem vim habent extenuandi, incidendi, ac reaserandi, seu vrinam ciendi præcitato. cap. adnotatis, validius, quàm nuper dictum medicamentum purgans præbendum erit, adiciens drac. iij. eclegmatis de fucco rosarum, aut diaprunis solutiu, vel catapotia formabis, sumens pilularum aggregatiuarum drach. j. aut scrup. iij. cum altera drac. rhabbari cum spica, seu agarici trochiscati, quæ oxymelite excipiantur, & catapotia formentur; post quæ portionem exhibebis ex mellis aërei vnc. ij. aut sacchari violacei tantundem cum aqua cichorij, aut boraginis, & in robustis corporibus cum prædictis catapotijs grana 4. aut 5. diacry diij permiscebis. Verum vitandâ pro-

bamus, frequentem, & variam medicaminum potationem, qua fella deducere promittuntur, siue ven trisua, siue vrinaria fuerint (vt Celsus Aurelianus inquit) propter causas ab eodem ibidem traditas. Quod si circa oculos, & faciem vitiatas duntaxat color relinquatur, narium infusus vtendum erit anagallidis videlicet succo, aut succo radices betæ, & si fortiori indigeant, cyclamini succo, aut melanthio cum aceto, ex Aetij auctoritate. Acetum verò acerrimum, si naribus attrahunt in folio desidens, contineatque etiam pressis naribus paulisper, mirificè conducit, Paulo auctore.

Πνεύματις ἰκτερός.

Id est, De nigro ictero.

CAP. LXXXVII.

VM triplex sit in venarum concoctione excrementum, Galeno auctore tertio de causis symptomatum, cap. 2. Quorum vnum (vt diximus) anara bilis est, atque ab ea vesica, quæ iocinori subest, expurgatur. Alterū nigra bilis, seu melancholicum excrementum appellatur, quod lien expurgat, eodem Galeno teste præcitato loco secundo de naturalibus facultatibus cap. 9. ac quarto de vfu part. cap. 15. Tertium serosum existit excrementum, quod renes expurgant, non ab re cum eiusdem nigra bilis separatio, seu segregatio, vel omnino peracta non fuerit, vel non rite, symptoma quoddam sit, nomine proprio vacans, quemadmodum idem Galenus scriptum reliquit lib. de differentiis sympt. cap. 4. & tertio de causis symptom. cap. vlt. Namque separationis excrementorum à sanguine frustratio necessariò coloris symptomata inducit, vt ipse inquit. Verum id sympt. quod melancholico excremento succedit, proprio nomine caret. A Paulo verò cap. 49. libri 3. *μέλας ἰκτερός*, hoc est, niger icterus, seu ater morbus regius appellatur. Qui nihil aliud est (vt ex eodem auctore colligitur) quam delatio quædam sanguinis impuri in expurgata ab eo nigra in vniuersum corpus. Parum autem commodè, veluti & reliqua excrementa iam dicta purgabitur, vel proprii instrumenti expurgatis imbecillitate, vel viis, per quas expurgatur, quomodocunque obstructis, vel ratione ipsiusmet excrementi, cum immodica fuerit eius quantitas. Atque constat, nedum Hippocratis, & Platonis auctoritate, verum etiam tum medicorum, tum philosophorum nonnullorum, vt liquet ex Galeno eodem 2. de naturalibus facultatibus cap. 9. 4. de vfu partium, cap. 15. & lib. de atra bile, cap. 6. (quanquam Erasistratus aliter senserit) lienem vnum esse viscus ex his, quæ sanguinem purgant, atque iecur, quoniam ad se quicquid in sanguine limosum, crassum, ac melancholicum est (veluti in vino sæx, aut in oleo a murca) trahit per vas venosum, tanquam per stomachum quendam. Id autem non protinus in ventriculum per aliud vas excernit, sed prius per multum otium conficit, atque immutat: ita vt quicquid in succum huic visceri maximè conuenientem fuerit elaboratum, alimentum eidem efficiatur, quod verò ab ea quæ in splene fit elaboratione, excidit, tanquam omnino inutile ad nutriendum, per alium quendam modo dictum venosum stomachum, lien ipse ad ventriculum eructat. Verum quāquam plures partes instrumentum hoc constituent, facultas tamen hæc quam habet ad seipsum trahendi succos melancholicos, in eius proprio corpore (quod non-

nulli parenchyma, id est affusione vocant) consistit. Quapropter rarum admodum, ac laxum, instar spongiæ cuiusdam effectum est viscus hoc, vt crassos facile attrahat, & excipiat, eodem Galeno teste quarto de vfu partium, cap. 15. Quo fit, vt præter eius quatuor facultates, quas suæ conseruationis gratia habet, veluti reliquæ omnes particulae, ex earum genere sit, quæ per accidens magnopere habent totum corpus iuuare, vt nono de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 2. à Galeno scriptum est, trahens in seipsum ex hepate, vt diximus, veluti faciem sanguinis: per quam actionem vniuerso corpori ad humorum bonitatem confert. Quare vbi imbecillitate affectus est, præsertim attrahendi facultate facta imbecilliore, vniuersum corpus colore nigrius euadit; quoniam sanguis ex iecore in ipsum impurus transmittitur: & propterea inter alia symptomata, quæ cum hepate cōmunia habet (sunt autem & ea multa: nisi quod quædam magis, quædam verò minùs euenire solent, vt sexto de locis affectis habetur) id quoque symptoma, quod ad coloris rationem pertinet, cum eodē commune obtinuit. Quanquam in hoc vniuersum corpus, vt ipse Galenus inquit, magis nigricare videtur. Etenim regij morbi, qui à liene agrotatē ortum habent, nigriores sunt, itemque vlcera cicatrices nigrae, vt secundo de naturalibus facultatibus, cap. 9. liquet. Quod itaque affectus præter naturam lien, atrum morbum regium constituat, luce clariùs patet in Galeni, & Pauli doctrina. At quod idem affectus sit præter naturam, coniectari poterit ex eo, quod vbi suo munere vitiosè fungitur, coloris vitia magis, ac magis ad nigrum declinando toti corpori impartit, vt libro de atra bile, cap. 6. scriptum est. Item quod manifestè quādoque videbitur vniuersum corpus herbis candelæ pallore infectis similari; interdum plumbeum, aut etiam magis fuscum referre colorem, interdum etiam alias quasdam ineffabiles colorum proprietates: quæ licet iocinore suo munere nō rectè fungite, accidere soleant, tamē ob splenis quoque vitia huiusmodi quoque colores eueniunt. Verū multo nigriores, quā ab hepate, ex Galeni sententia quinto de locis affectis, c. 7. indicat etiā lienē affectū esse dolor sub sinistro hypochondrio (Aëtio teste cap. 7. lib. 10.) aut distentio, aut grauitas, seu tumor, qui in eadem parte subiacet, & dum conuertuntur, veluti aliquid ex illis locis conuellatur, imaginatio contingit, vt ipse refert. Quod verò affectus hic similiter symptoma existat in genere affectus corporis, & in eorum numero, quæ visibilia dicuntur, ac totius corporis, lib. de differentiis sympt. cap. 5. & tertio de causis symptoma, cap. vlt. liquet. Eius autem indicia sunt, nam hoc vitio affectos consequitur tristitia præter rationem, & mordacitas eorum, quæ circa ventrem sunt, difficultasque spirandi, cibos auersantur, & nigra lotia excernunt: aliquando autem & per interualla quædam corpora ipsorum tepescunt: stercora verò calanthi colorem referunt, & alius reficatur, vt liquet ex Aëtio cap. 17. lib. 10. Inter omnia verò signa, id præcipuum existit, ater videlicet vniuersi corporis color. Verum non diuersa ratione ab eas quam præcedenti capite conscripsimus, frustratio separationis huius excrementi à sanguine, aut ex eiusdem lienis imbecillitate, facultate attrahente existēte insignia, vel meatus per quem illud attrahit, obstructione provenire poterit: At vbi meatus obstructio adfit, grauitas, & distentio, vel etiam dolor lienem.

Quid sit icterus niger, seu ater morbus regius.

Lienis descriptio.

In principio.

Prognosis.

Causa.

Curandi methodus.

lienem exercebit. Si verò nihil eorum euenerit, at-
trahendi potentia imbecillitas indicabitur: prout
scriptum reliquit Paulus præcitato loco. Eius verò
imbecillitatis causa cuncta intemperantia esse po-
terit, cum simplices, tum compositæ: quæ quomo-
do dignoscendæ ac inter se distinguendæ sint, Aëtius
fussissime docuit præcitato cap. 7. lib. 10. Et inter re-
liqua signa, tanquam certum, & compendiosum in-
temperiei splenis est id, quod sumitur ab his, quæ
eduntur, ac bibuntur, ac ex eis quæ forinsecus cuti-
culæ iuxta sinistram hypochondrium accedunt nun-
quid conferant, vel lædant, calida, seu frigida fue-
rint, quæ eduntur, ac bibuntur, aut quæ foris admo-
uentur. Nam frigida intemperies ab omnibus cibis,
ac potibus, qui efficaciter refrigerare possunt, auge-
bitur, ac manifestè magis splenem lædunt, sic & ab
iis, quæ foris admoventur. Eandem verò intempe-
riem omnia calida iuuabunt. Sic quoque de calida
splenis intemperie, ac reliquis sentiendum erit, ut
liquet ab Aëtio ibidem. Quod si fortè fortuna ex
lienis inflammatione, seu scirrho ater morbus re-
gius fuerit excitatus, ex eorundè propriis signis iu-
dicari poterit, de quibus in sequentibus pertracta-
bimus. Sed quoniam eiusdem extremi vitio, non
minus potest affectus hic gigni, quam morbus re-
gius propriè dictus, cum ipsum fuerit multum, nul-
lo proprio affectu liene laborante, propterea hoc
quoque dignoscere non erit inutile. Promptè au-
tem id percipies, quoniam nullum aderit ex prædi-
ctis signis lienem affectum indicantibus, præterea
neque idem totius corporis color adeo nigrican-
tior erit. Cæterum cum hæc excrementi multitudo
à geminis causis oriri possit, quarum vna est ipsa io-
cinoris intemperies, & reliqua est ciborum vitium,
id intertingere poteris ex iis quæ præcesserunt.
Nāquid vltus præcesserit eorum ciborum, ac potuum,
qui melancholicæ naturæ fuerint, necne? Nā ubi ta-
lis præcesserit victus assumptis cibis ac potibus, qui
crassum, & sæculentum humorem procreare natura
apti sunt, ex vitio victus rationis provenire atrum
morbum regium iudicabis. Vbi verò talis non præ-
cesserit victus ratio, aderintque signa frigidi, ac heci
hepatitis, à Galeno libro artis medic. cap. 44. adno-
tata, ac reliqua quæ ipsum affectum esse indicabunt,
vitio hepatis, quod ad generadū huiusmodi excre-
mentū sit aptū, provenire putabis. Quandoque etiā
vtrique vitio laborante regius morbus euenire po-
terit, nigriore, quā pro consuetudine veri morbi re-
gij subsequente colore, ita ut putaretur flava bilis fu-
ligini esse permixta, ut Galenus inquit sextode loco
affectis, aderintque indicia alia iam dicta differēter
affecti tum hepatis, tum lienis. Quod verò omnino
gravius afficiantur ij, in quibus atræ bilis humor v-
nā cum sanguine ad cutem est delatus, quā in qui-
bus pallida, seu flava bilis, ab Aëtio scriptū est cap.
17. libri decimi. Idem quoque ater morbus regius,
si diu perseverauerit, nec obsequatur medicamen-
tis rite adhibitis, accedat, malum est. Nam consen-
tiente iocinore, aqua intercus succedet, ut liquet ex
eodem Aëtio. Urina verò, si suam seruauerit natu-
ralem dispositionem in atro morbo regio, salubre
erit indicium; exiguum namque indicabit lienis af-
fectionem, nec adhuc eidem iecur consentire. In v-
niuersum autem quantum ad eius curationem spe-
ctat, si ex lienis intemperantia ortum duxerit, eas-
tum per cibos ac potus, tū per simplicissima phar-
maca, ac fomentorum irrigationes, quæ intempe-

rici contraria sunt, corrigere oportet, Aëtio aucto-
re. Et quoniam (ut inquit Paulus) lienis Intēperies
eādem cū iocinore curationē postulat, & si quis ve-
lit, particulatim earum curationem inueniet apud
Aëtium cap. 8. lib. 10. propterea breuitati indulgētes,
eamdem particulariter cōscribere recusauimus. Po-
terunt tamen studiosi caput de iocinoris imbecilli-
tate consulere. Vnū tamē non prætermittam; quod
vbi accidat per aliquam eiusdē lienis intemperiem,
aut viarum obstructionē, seu etiā iocinoris intem-
peraturam; quod per vniuersum corpus vna cum
sanguine multa copia nigra bilis fuerit coaceruata,
aliis consentientibus, secūda primò vena erit cubi-
ti interna sinistri, liene affecto obstructione, vel in-
temperie; dextri autē, si iecur fuerit affectum, haud
tamē multa copia sanguinis extrahēda erit, sed po-
tius, si opus fuerit iterari debet. Nam, quod perpe-
tuò per venæ sectionem ingentem conspexerit vti-
litatem in lienis affectibus, à Galeno scriptum est
libro de curandi ratione per venæ sectionem, cap.
decimosexto. multum etenim (ut ipse inquit) iuuat
afflictum lienem sanguinis ex sinistro brachio de-
tractio: nec minùs hepatis opem feret, si ex dextro
cubito sanguis auferatur. Si verò non cum sanguine
permixta nigra bilis redundauerit per vniuersum
corpus, aut quidpiam aliud venæ sectionem impe-
derit, eadem succi melancholici copia, seu multitu-
do ex quacunque causa fuerit orta, purgatione ex-
haurienda erit, eodem humore prius concocto, ac
præparato. Nā in redundantia humoris melanco-
lici sanguinem mittere præstat; aut certè omnino
medicamento vti atram bilem expurgare, ut liquet
eodē libro de curandi ratione per venæ sectionem,
c. 10. Verū quibus præparari, ac purgari debeat,
cap. de melancholia, studiosi requirāt. gratia autem
exempli pro neotericeis ex syrup. succi fumarie, aut
de pomis cū oxymellite, & aqua lupulorum, ac sco-
lopendrij, concocto, ac parato humore eisdem sæ-
pius assumptis, hoc purgans medicamentum præbe-
ri poterit. Recipe scolopēdrij, lupulorum, & bora-
ginis ana drach. 3. vñq; passū decorticatū drach. 4. se-
næ, epithymi cuiuslibet drach. 2. s. myrobalarum
indarum drach. 1. s. fiat decoctum in aqua fontis, &
in eo per colum trāsuso dissolue cassiæ fistulæ vnc.
1. s. aut mellis roridi vnc. 2. s. diacathi drach. 7. confec-
tionis hæmæ, aut eclegmatis indi drach. 2. vel diase-
næ drach. 4. fiat potio. Euacuato tandem vitioso re-
dundante succo in toto, vel in parte, si propter ob-
structionem meatus, per quem lien ad se limosum
sanguinem attrahit, excitatus fuerit ater morbus re-
gius, eadem victus ratione extenuante, ac eisdem
quoque medicamentis vtendum erit; quibus vti
præcepimus pro curatione obstructionis iocinoris.
validiora tamen inter ea eligenda, namque lien sine
molestia validiora medicamenta tolerat, ut liquet
apud Galenum secūdo de arte curatiua ad Glauco-
nem; cap. 5. Cum eisdem tamen semper aliquid ex-
stringentium genere admisceatur. Id autem nedum
in obstructione curanda, sed in cunctis aliis lienis
affectibus seruandū erit, opus namque est ipsius na-
turalem firmitatem custodire, quo conueniens ipsi
alimētum attrahat, quoniam per hanc actionem vni-
uerso corpori ad humorum bonitatem confert (ut
diximus ex Galeni auctoritate nono de cōpositio-
ne medicamentorum secūdo locos, cap. 1.) Ea au-
tem potissimū, quæ extenuandi vim habet phar-
maca citra manifestam calfactionem eligantur, inter

Vena se-
ctio.

Purgatio.

In princip.

Prognosti-
ca.Curandi
modus.

quæ magnopere, tanquam huic visceri commoda, sunt acetum, & acetum mulsum; præsertim ubi idem viscus, nedum obstructione laboret, sed induratum fuerit, ut patet ex Galeno ibidem. Verum cum eisdem exhiberi poterit decoctum corticum radicum capparorum, aut scolopendrij, vel radicum, seu germinum myricæ: nam quale medicamentum iocinori est absynthium, tale est lienii capparum cortex: & quale rursus iocinori eupatorium, tale est lienii scolopendrij (ut liquet decimotertio methodi medendi, cap. 17.) Siquidem similia genere medicamenta ambo viscera postulant, ceterum tanto valentiora lienis, quanto crassiori vitur alimento, ut ipse Galenus refert. Ex quibus cum liqueat, qua methodo curari debeant lienis tum intemperantia, tum obstructiones, non est cur scorsum de eis iterum mentionem faciamus. Vbi autem ater morbus regius ex lienis inflammatione, seu scirrhus fuerit excitatus, eadem inflammatione curata, seu scirrhus, & ipse quoque curationem recipiet. Nos vero in sequentibus eorundem affectionum curationem præcipiemus. Ex intemperie autem iocinoris ortus præcedente prius venæ sectione, aut purgatione, vel utrisque (ut diximus) in toto, vel in maiori parte melancholici succi redundantis, facta euacuatione, ubi eius copia addit, per contraria eiusdem iocinoris intemperiem corrigere oportet tam cibos, quam potus, quam etiam medicamenta, eo non neglecto, quod perpetuo ea, quæ adstringunt, permiscere oporteat, quibus autem particulatim eadem intemperies corrigenda sit, capite de imbecillitate iocinoris, studiosi reperient. Nec minus, si vitio alimentorum, ac potuum vim habentium succum melancholicum gignendi, ortus fuerit ater morbus regius, contraria etiam victus ratio adhibenda erit, quam locupletissime conscripsimus capite de melancholia; Ea igitur hæc transferenda sunt pro optima victus ratione prædictis instituenda. Si vero utrisque simul visceribus laborantibus regius morbus euenit, stante redundantia utriusque bilis cum sanguine, venæ secunda erit utriusque cubiti interna; & pro ratione maioris, redundantia alterius bilis, ac magnitudine, affectus alterius visceris, maior ex vno, quam altero cubito quantitas sanguinis exauriatur, quantum semper eadem venæ sectio moderata esse debeat. Victus ratio quoque communis esse debet, utrisque visceribus conducens. Similiter & purgatio, ubi adhuc facta venæ sectione utrique succi per vniuersum corpus redundant. In quem visum præparatis eisdem succis ex syrup. ex succo fumarie, & cichorii, atque oxymelite, & aqua boraginis, & lupulorum, & hortulanæ endiuie hoc medicamentum purgans præbeatur. Recipe florum boraginis, lupulorum, fumarie ana drac. 4. vix passæ decorticatæ vnc. s. senæ, epithymi ana drac. 2. eupatorii, absynthij, scolopendrij, & radicum capparorum ana drac. j. s. fiat decoctum in aqua fontis, & in eo per colum transfuso, dissolue calsæ fistulæ vnc. j. s. aut mellis rosidi vnc. j. rhubarbari optimi cum spica præmacerati in parte prædicti decocti per diem, aut noctem, & deinde per colum transfusi drach. j. aut scrup. iij. diacath. drac. vj. dialonæ, vel eclegmatidis indi drac. ii. vel iij. misceatur, & fiat potus. A purgatione utrique visceri consulendum, magis autem, aut minus vni, vel alteri, prout vnus visceris affectus, vel alter magis urgebit, nunquam tamen altero derelicto.

Περί τῆς φλεγμονῆς τῆς σπλῆνος.

Id est, de inflammatione lienis.

CAP. LXXVIII.



Vamuis rarius (ut Alexander inquit cap. 10. lib. 8.) quam alia viscera lien inflammatione conflictetur, interim tamen & ipsum inflammari contingit, ut liquet apud Galenum sexto de locis affectis, 13. meth. meden. cap. 17. & aliis plerisque locis. Cuius inflammationes facile ob duritiem tangendo deprehenduntur, ut ipse inquit. Insupei & ex iis, quæ de iocinore diximus, facile etiam inueniuntur notæ, quibus lienis affectus discernuntur. Quapropter cum nonnulla in præcedentibus nedum de iocinore, verumetiam & de ipsa inflammatione dicta sint, non opus est hic eadem repetere, sed ad tradenda indicia inflammati lienis deueniam. Sunt autem ea dolor sinistri hypochondrij, ac etiam feruor, distentio, tumor, & multa grauitas vehementer vrgens, Paulo, & Alexandro testibus, qui tumor ob duritiem facile tangendo deprehenditur, ut diximus ex Galeni sententia, præsertim processu temporis. Næque imprimis, dum scilicet humor adhuc fluit, lienis tumor apparet humidior, ut testatur Alexander. Nec mirum si lienis inflammationes diuiores deprehendantur: nam sanguis, qui ad eum pro nutrimento deuenit limosus, feculentus, ac crassius existit. Ex quo cum inflammationes fiant necessum est eas duriores fieri. Ex his itaque notis facile quæpiam, tum partem ipsam affectam, tum affectum ipsum dignoscere poterit. Quis autem affectus sit inflammatio, sexcenties in præcedentibus dictum est. Verum hic per inflammationem non propriè dictam intelligere oportet. Nanque rarius ex sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem habente, ipsam in liene oriri contingit, sed sæpius (ut mox dicemus) ex sanguine crassiori excitatur. quo fit, ut neque laborandum sit in inuestigandis signis pro dignotione causæ eiusdem inflammationis, cum semper ferè ex iam dicto sanguine feculento, limoso, ac crasso generationem habeat, facillèque possit dignosci, ubi fortè fortuna à sanguine optimo, vel bilioso existente ipsa inflammatio fuerit excitata, præsertim ex iis quæ præcesserunt, temperamento, ætate, habitu, anni tempore, victus ratione, ac reliquis. Cognosces autem (ut inquit Aëtius cap. decimo, libri decimi.) irruentis humoris magnitudinem ex magnitudine, & velocitate generationis ipsius inflammationis. Inflammato autem liene, si ex sinistra nate sanguis erumpat, magnam fert utilitatem. Nam quibuscunque *εἴς τὴν* eruptio sanguinis accidit, summum id commodum laborantibus affert: quemadmodum Hippocrates memoria prodit: quibus verò contra euenit, nihil iuuat, aut etiam interdum nocet, quòd vires scilicet citra morbi leuamē deiciat, atque exoluat, ut libro de curandi ratione per venæ sectionem, à Galeno scriptum est. Insuper quamuis rarius, quam cætera viscera lien inflammatione tenetur, tamen si in eo excitetur, magna cum diligentia curanda erit, aliis nedum praua consequentur symptomata, verumetiam temporis processu perniciem causabit, potissimum si eadem in scirrhum vertatur. Pro eius itaque curatione ratio victus similis insinuanda erit ei, quam in cæteris visceris inflammationibus præcepimus, solo putrefactione ægrum nutrentes, potissimum circa initia, illius verò penuria aqua, & solo pane, atque interim

interim vinum tenue, albumque exhibeatur, Alexandro teste, præsertim vbi inflammatio diutius proteleatur, quo tempore etiam auicularum carnes montanarum, pullorumque, ac gallinarum concedendæ sunt. Quod verò ad reliqua attinet, primum sanguis detrahendus est, deinde purgationes adhiberi, postea medicamenta extrinsecus imponi debent, vt liquet eodem Alexandro. Nam si venæ sectio omnibus visceribus inflammatis præsentissimū est remedium, maxime certè in lienis inflammatione adhibenda est, si nihil contra suadeat, nempe ætas, aut vires, aut locus, aut consuetudo, aut aeris constitutio, aut præcedens ciborum cruditas, aut magnus ventris profluuium, vt ipse inquit. Secunda autem vena est sinistri cubiti, vt liquet decimotertio methodi medendi, cap. 11. Multum nanque iuuat afflictum lienem sanguinis ex sinistro brachio detractio, vt liquet eodem libro de curandi ratione per venæ sectionem, cap. 16 & nos præcedenti cap. adnotauimus, atque eadem interna, quod si ea non appareat, media feriēda est, sine ipsa quidem in cōspectum proueniat, humeraria incidēda erit. Quod si nec ipsa quoque conspicitur, ea quæ minimo digito vicina est, aperiri debet, ex decreto eiusdem Iuliani. Quod verò huius venæ in extrema manu existentis, sectio conferat, pro lienis inflammatione curatione, cōfirmavit Paulus præcitato loco. Id quod fortè innuere voluit Galenus eodem libro de curandi ratione per venæ sectionem, cap. 16. Quamquam quidam negatiue literam legant. Præstat autē non semel quantum conueniat extrahisse, sed in duos dies, id partiri satius est, vt idem Galenus refert. Sic nanque extrahendus sanguis est, ne vitalis facultas deficiat, vt Alexander attēstet. Post sanguinis missionem ea dari oportet quæ aluum soleat ducere. Sunt tamen ea medicamenta, quæ alui ducendæ idonea sunt, lenia eligenda; ex eiusdem Alexandri testimonio, præsertim per initia. Licet etenim per initia purgari potest, tamen processu temporis validiores purgationes exhiberi possunt, vt ipse refert. Hac namque via duntaxat lienis superflua vacuari debent: nam ea quæ per renes agitur, nulla huic visceri vacuando via patet: proinde vbi phlegmone premitur, deiectionis id medicamentis, tum detergimus, tum lacescimus, quo dimittat, deponatque superuacua, atque id potissimum medicamentum deiectionum superne exhibendum erit, à situ, societateque sumpta indicatione, quemadmodum à Galeno eodem decimotertio methodi medendi, cap. 17. decretum est, quamuis venter etiam per clysterem assidue elui debeat, & maxime si venæ incidendæ medela relinquatur, ex Aëtij sententia, & præcipue in morbi initio, vel incremento, vt inquit Alexander. Verum priusquam purgans medicamentum exhibeatur, parari humor debet ex oxymelite, serapio ex succo fumarie, seu boraginis cum aquis melissæ, & lupulorum, deinde hunc in modum purgetur æger. Primò recipe florum fumarie, lupulorum, boraginis, violarum, & hordei, singul. drac. 3. senæ, epithymi, singulorum drac. 2. vix passæ decorticate vnc. s. fiat decoctum in aqua fontis, in quo per colum transfuso dissolue mellis roridi vnc. 2. s. aut calsiæ siliulæ vnc. 1. s. & diacath. drach. 6. vel 7. & fiat potio. At vbi neque huic purgationi cesserit inflammatio, procedente tempore, si opus fuerit, validius exhibebis purgans medicamentum, quantitatem senæ, & epithymi in decocto adaugens, adiiciensque poly-

dium, ac enicū, & in vicem diacath. eclegmatis indidrac. 4. aut diasenē tantundem apponens. A purgatione medicamenta extrinsecus imponi debent quæ citra euidētem calorem extenuent, admixtis quibusdam etiam adstringentibus, iuxta Pauli doctrinam. Nam ea mixtæ facultatis esse debent, nedum in generatione phlegmones, sed etiam cum nec affluat amplius quicquam: quanquam si quis in principio repellentibus tantum vtatur, non peccet, Galeno auctore 13. meth. med. cap. 16. Communis tamen indicatio (vt ipse inquit) omnibus his partibus quarum munus eiusmodi est, vt toti corpori sint ex vlu, vt medicamenta exigant, quæ mixtæ facultatis sint. Et propterea nec lienem tantum relaxantibus curare oportet, cum hic quoque ex iocinore quicquid limosi, & melancholici est, expurget, propterea scilicet, quod ex eo humore nutritur, quinimò semper eius robori consulendum est, relaxantibus, quæ adstringunt medicamenta adiciendo, eodem Galeno & Alexandro testibus. Sint autem adstringentia medicamenta robusta, vbi floris impetus tortis cōtingat, moderata verò vbi mediocris. Quapropter si moderata fuerit inflammatio splenis, ex vino veteri, ac austero, tenuiūque partium, olei dulci permixto fortis adhiberi debent, lana succida, excepto medicamēto (vt inquit Aëtius) vel linteis, & vbi maior sit caliditas, oleum sit rosaceum, aut omphacinum. In cuius penuria eiusdem oliuæ folia, aut rubi, aut mali arboris, atque etiam ipsa mala in oleo decoquantur: & quædam tenuium partium addantur, velut est absynthium, & pulegium, item lentiscinum, & melinum oleum prædicto vino admixtum superuenire confert, aut cum prædictis linteis lineis lapiis sinistram hypochondrium fouere, vel ex olei anethini, vel chamæmelini vnc. j. & rosacci, seu cytoniorum, & myrtini, singul. vnc. j. s. paucō vino, ac cera vnguentum parabis. Verum vbi forti impetu fluxus feratur, acetum pro vino effundendum est, similiter si nimius calor infestet (vt liquet ex Aëtio, & Alexandro.) Post fomenta autem cataplasmata imponi debent, quorum primum ex Aëtio ex hordeacea, & loliacea farina cum posca, & mellis, ac olei omnino paucissima mensura, in quibus absynthium, ac pulegium sint decocta, formari potest. Vel hunc in modum ipsum componas. Farinæ foenugraci, seminis lini, ac hordeaceæ excipe, cuiuslibet vnc. j. s. caricarum aceto quam acerrimo macearatarum vnc. j. adipis anseris, & butyri recentis singulorum drac. iij. olei anethini, chamæmelini, & rosacci, singulorum vnc. j. omnibus prius tunsis, ac simul commixtis cum paucō oxymelite, fiat cataplasma. Vtimur etiam aliquando, ex eiusdem Aëtij sententia, ob cataplasmatum penuriam ad splenem inflammatum furfuribus in vino, aut posca, & oleo decoctis: quibus etiam absynthium, & pulegium, aut thymum, aut origanum, aut lauri folia, aut artemisiam, & reliqua incidendi, ac attenuandi vi prædicta, adiciamus, non feruente videlicet inflammatione, & corpore præuacuato. Nam si quispiam corpore nō euacuato calidioribus vtatur medicamentis, ipse sibi scirrhi auctor fiet, eodem Aëtio teste. Paulus verò sterus caprillum cum cruda polenta coctum, ex posca illitum commendat. Tu quoque ex prædictis diuersa etiam medicamenta parare poteris, prout vsus exoptulabit, methodum semper seruans, vt relaxantibus, ac digerentibus medicamentis, quædam ex adstringentibus permisceas.

Topica quæ
lia esse de-
beant.

Gal. 13. me-
tho. cap. 17.
Alexan. li.
8. cap. 10.

Gal. 13. me-
tho. cap. 17.
Alexan. li.
8. cap. 10.

Gal. 13. me-
tho. cap. 17.
Alexan. li.
8. cap. 10.

Gal. 13. me-
tho. cap. 17.
Alexan. li.
8. cap. 10.

Id est, de scirrho lienis.

CAPITULUM XXXIX.

Artus quam alia viscera lienem in-

flammatione conflictari praecedenti

cap. ex Alexandri testimonio notauimus;

opporunitissimum autem eum

esse ad scirrhum, veluti & iecur, qu-

quam ipse propterea quod rarioris sit substantia,

crebrius, quam iecur scirrhosis vitius affligatur pro-

pter nocerimentum, quo vititur, speciem, a Galeno de-

crus cap. lib. 13. metho. meden. cap. 16. Nutritur e-

tenim crasso sanguine, demonstratum est; qui vela-

mentis purioris exstiter. Propterea de hoc affectu

pertractare intendimus. Confluunt autem eos,

qui indurati splenis affectionem habent proprie

medici splenicos appellare, ut non de composi-

tionis medicamentorum secundum locos; cap. 21. a

Galeno scriptum est. Summatim vero de eo verba

faciemus, cum fufissime verba fecerimus cap. de io-

cinoris scirrho, & ex iis, quae de iocinore diximus fa-

ciile, inueniantur notae, (ut sexto de locis affectis,

scriptum est) quibus lienis affectus discernantur, &

ipse multa etiam habet accidentia cum hepa-

te communia. Ea de re ad tractanda eius indicia ac-

cedamus. Sunt autem tumor cum duritie sub fini-

stro hypochondrio; os foetet; gingivae exeduntur,

ulcera in cruribus cicatricem non recipiunt; ut te-

statutur Paulus. Celsus vero ait cap. nono lib. 4. quod

lien ubi affectus est intumescit, simulque cum eo pars

sinistra, eaque dura est, & prementi renititur; venter

intentus est, aliquis etiam cruribus est tumor, vlcera

aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem

vix recipiunt. In intesta ambulatione cursuque, dolor,

& quaedam difficultas est. Idem fere confirmat

Aetius cap. 11. lib. 10. cum dixit, immedicabilia

enim ulcera hoc modo affecti habebunt, & maxime

circa crura; addidit tamen, & colorem corporis vitia-

tatum ad nigredinem vergentem. Nec putandum

est ab aliis causis oriri posse lienis scirrhum, quam

ex eis, a quibus hepatitis scirrhus generatur. Commu-

nes quoque habet cum eo, & generationis geminos

modos. Namque vel a principio paulatim congre-

gatur, & augetur, ac in magnum tumorem attolli-

tur, vel medicorum imperitia paratur. Id quod cre-

bris accidere consuevit, ubi vehementer inflamm-

mationes, & erysipelata adstringunt, & refrigerant.

Sed quoniam ex flatuoso quoque spiritu indurari quo-

dainmodo quandoque splen videtur, atque renites

esse, propterea a vero scirrho interstingues. Namque

si status causa fuerit, tactui tumor non pertinaciter

resistit, immo imposita manu ad tactum cedit, &

lien punctiorem, tensionemque experietur, citra

tamen pondus, duritiem, ac grauitatem. Verum ubi

cum renitentia, tumore, ac duritie, grauitas cum

pondere in sinistro hypochondrio percipitur, ex

humore lentio, & crasso lien indurato infixo, tu-

morem durum ortum esse iudicabis, quem proprie

scirrhum, seu scirrhosum tumorem appellamus. Ex

hoc quod consentiente iocinore, potissimum, ubi

diutius fuerit, aqua intercutem generari possit, li-

quet apud Galenum 5. & 6. de locis affectis. At quod

si fuerit exquisitus, omnino incurabilis sit, ab eodem

Gal. scriptum est 2. de arte curat. ad Glauconem. Re-

liqua scirrhii prognostica cap. de scirrho iocinoris

requiras. Quatum vero ad eius curationem attinet,

provisus ratione laborantibus ipsis conuenientia

nutrimenta sunt; genere quidem eadem, quae scir-

rho iocinoris laborantibus competunt, maioris, m-

norisque duntaxat ratione differunt, ut idem Gal.

testis est 13. meth. med. Itaque & si capparitis ex oxy-

melite edatur, vilis sane est vtrique videri. Carteri

nec ipsa pari modo; nec similiter mixtum habeat

oxymel. Nam & ipsa copiosior, & ex minus diluto

oxymelite lien erit utilior, atque hae differentia est,

quae ex maioris, minorisque ratione accepta est, ut

ipse inquit. Cautela tamen sunt dulcia omnia; nam

ex his tum iecur, tum lien maxime intumescere co-

suevit. Similiter glutinosi cibi vitandi, atque ij ex-

hibendi sunt, qui concoctu sint faciles, & bonum

ac tenuem succum generent, simulque cum iis effe-

rant, quae extenuant, obstructions eximunt, ac de-

tergunt: acida vero maxime conueniunt, Celsus au-

ctore. Vino autem vitantur non valde veteri, quod

aqua permiscetur, in qua ferrum saepe ignitum sit

extinctum, ut refert Aetius. Et quoniam hoc vitium

quies augeat, propterea exercitatione, & labore o-

pus est: habita tamen ratione, ne febre mixta, si ni-

miu procceserit, exciteur. Vnctiones, frictiones

que, & sudores necessarii sunt, eodem Celsus aucto-

re. Plurimum nanque fiducia in exercitiis ponen-

dum, quibus ante cibum vi conuenit, corpore su-

perfluitatibus non abundante: ex eorum autem ge-

nera ex superabundanti faciunt deambulationes, &

cursus: & noui sane aliquos qui ex his solis ab omni

affectione sine liberati, ut idem Aetius testatur cap.

13. lib. 10. Reliquam vitium rationem particularim

studiosi cap. de scirrho iocinoris requirant. Carte-

rum ubi laborantes praedicti multo sanguine abun-

dant, internam in sinistro cubito venam secare co-

modum est, ut liquet ex Aetio: neque tamen multa

sanguinis copia ferenda erit. A venesectione, si mul-

tus redudarit crassus, seu lentus succus eo prius pra-

parato ex aceto mulso, ac syrup. de succo fumaris, seu

aceto simplici, & melle rosaceo, nanque acetum, &

acetum multum huic visceri commodum sunt, ut pote

secare, & attenuare crassos humores potentia citra

calefactionem, ut inquit Galenus, nono de compo-

medicamen. secundum locos, cap. 2. purgans medi-

camentum exhibendum erit pro ratione redunda-

tis succi. Nam pituita redundante, quae eandem ex-

purgant medicamenta, exhibeantur. Si vero melan-

cholicus succus, quae ipsam expurgant, praebeto; de-

inde portiones quasdam ac topica medicamenta, quae

induratum splenem curare valent, adhibeas. Sine

autem & portiones ipsae fortissimae: similiter & quae

de foris medicamenta applicantur: nam eas sine mo-

lestia splen tolerat, ut secundo de arte curat. ad

Glauconem, a Galeno decretum est. E quorum nu-

mero primas partes sibi vendicant cortices radicis

capparitis, & scolopendrium, & myrtica radix, atque

germina: omnibus huiusmodi in aceto, vel oxyme-

lite coctis, ut ipse inquit. Attenuantibus itaque opus

habet induratus lien pharmacis citra manifestam

caliditatem, cuius gratia valde amara medicamenta

ipsi offerimus, ac quaedam ipsis ex austeris miscemus,

ut eodem nono de compositione medicamentorum

secundum locos scriptum est. cap. 2. Potui deni-

que ieiuno dari debet absinthium incoctum, at post

cibum aqua a ferrario fabro, in qua candens ferrum

subinde extinctum sit: haec enim vel praecipue lienem

coercet, quod animaduersum est in his animalibus

quae apud hos fabros educata exigui lienes habet,

ut liquet ex Celso. Haec aqua, in qua ignitum ferrum

saepe sit extinctum, febricitantibus sola, non febricit-

tibus

Qui proprii
splenis ap-
pellantur.

In princip.

Paul. lib. 3.

cap. 49.

Scirrho. lie-

nis signa.

Causa.

Si ex flatu

so spiritu lie

induretur si

guia.

Prognost.

5. de loc. af-

se. cap. 7.

6. de loc. af-

se.

In princip

2. ad Glau-

conem.

cap. 4.

Curatio.

cap. 17.

Ratio vi-

ctus.

cibus verò cum vino, auctoritate Archigenis, à Galeno nono de compositione medicamentorum secundum locos commendatur. Conuenientissimum etenim spleni in scirrhum indurato remedium existit, ferrum, aqua, aut vino, aut posca extinctum. Ea ipsa enim aqua, aut vinum, aut posca in principio exhibita iucunda, & vtilissima existit, & per plures ex ordine dies datur, Aëtio teste. Datur autem per se aqua cyathis tribus, febris verò carentibus, cum vini, vel aceti cyatho vno, ut inquit Paulus. Ceterum eis qui corpora natura habent calidiora, præsertim scirrhus inveterato, citra molestiam myricæ folia dantur, virgultaque, & radix scolopendrium item, & rumicis sylvestris, maxime verò acuti semina, foliaque, & radix probè etiam facit anchusa, si radicis eius drach. j. detur. Item polytricon, & capni decoctum ad tertias redactum, folia salicis, & cortex, item & radix limonij, quod & cynoglossum vocatur, hisce vtendum esse præcipit Aëtius in prædictis naturis & in principio affectionis, namque à mitioribus auspicari oportet, ut ipse inquit. Verum in inveteratis scirrhis, & corporibus agrestioribus, atque eis qui omnem corporis habitum habent frigidior, exhiberi possunt trisago, genitiane radix, calamintha, pulegium, cyclamini radix, scordium, trifolij bitumen olentis semen, hyperici comæ, acori, asari, & eringij radix, viticis semen torrefactum, centaurij minoris succus, etiam si sit exsiccat, chamæpitys, polium, anagalidis, quæ cæreulea habet florem, succus. Item dracunculi radix, tum viridis, tum sicca. Omnia verò iam dicta medicamenta simplicia in principio cum posca diluta coquantur; postea vero meraciores, progressu autem temporis etiam ipsa contusa, & cribrata cum aceto, aut aceto multo exhibentur. Certam autem vniuersi horum mensuram definire difficile, & periculosum est, cum diuersa eorum, qui ea accipiunt, sint nature. Quare in principio parum quid ex vnoquoque exhibendum & pro ratione deinde exhibitionis mensura augenda iuxta ipsius pharmaci, atque etiam ægri vires, ex eiusdem Aëtij sententia. Licet ite, ne dum singulis prædictis simplicibus pharmacis per se vti, verum & duo item vel tria, aut quatuor permixta æqualiter, vel inæqualiter præbere. Præter iam dicta medicamenta, serpillū cū aceto, aut panacis radicem viridem cum aqua multa, vel semine, aut corticis radicis periclymenij, & feminis eius quantum tribus digitis apprehendi potest, in vino albo meraco calido ieiunis bibendum ad dies quadraginta exhibitum, aut vulpis hepar siccum cum aceto multo similiter bibendum exhibitum commendauit Gal. 9. de comp. medic. secundū locos, ex Archigenis auctoritate. In adhibendis autem topicis medicamentis eadem seruanda methodus erit, quam seruari præcepimus, cap. de scirrhus iocinoris: semper etenim emollientem, & diffusoriam medicamentorum facultatem præcellere oportet, quibus parū quiddam eorum, quæ adstringendi vim habent admiscendum est, Gal. auctore 2. de arte curat. cap. 5. ad Glau. ac Aëtio præcitato loco, nisi quod tutior erit visus aceti in lienis scirrhus, etiā à principio, cum naturaliter rarus sit, nec est quod metuas, ne quis nervus eius vi lædatur, quemadmodum in tendonibus, ac nervosis musculi partibus, ut liquet 14. metho. med. cap. 5. In hunc vsum capparidis cortex ex aceto contritus, illitusque, item & salicis cortex consimiliter illitus, necnon & centaurij succus, ac cinis fabrorum cū cru-

da polenta ex oxymelite illitus, aut etiam lupinorū farina magnopere conferunt, ex Pauli auctoritate; nec minus & ammoniacū (ut ipse inquit) cum aceto applicatum lienis sæpe profuit. Possunt item & fortius hoc modo parari; Recipe centaurij minoris, & scolopendrij ana manip. j. corticum radicū cappariorum vnc. s. radicum, & foliorum althææ ana manip. s. bulliant in aceti, & olei partibus æqualibus, & cū spongij fiant totus, quibus sæpius admotis, infra scirprum adhibeto vnguentum. Recipe olei amygdalarum amararum, liliaci, irini, & de capparibus, singulo, vnc. j. succi scolopendrij, & centaurij minoris, cuiuslibet drach. 4. corticū radicū cappariorum, & myricæ, cuiuslibet drac. 2. adipis asenini, seu gallinacei drac. iij. medullæ cervinæ, seu vitulinæ drac. 2. s. ammoniaci in aceto dissoluti vnc. s. aceti, & ceræ quantum satis sit, fiat vnguentum. Processu tamen temporis inuicem vitulinæ medullæ seuum tum hircinum, tum taurinum, ac etiam caprillum adici poterit, augerique quantitas ammoniaci, ac adiciendum bdellium, & galbanum, quæ prius in aceto dissoluantur, similiter & styrax, seu oppopanax, cyclamini, ac cynoglossi succus, lentus cremor, seu farina seminis lini, seu nigræci, ac althææ: ex quibus poterunt varia medicamenta componi, & prout affectus exigit, tum addere, tum adimere ea quæ emolliunt, attenuant, discutunt, & robur addunt. Verum capparidis cortex (ut inquit Aëtius) admixtus vitæ hoc quod dissecat, & repurgat, etiam splenem corroborat, multisque modis huic rei capparidis aptus est. Nā & ipsum cum cibo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere commodum est: quinetiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum furfuribus, aut ipsum capparim cum melle contritum imponere expedit, ut Celsus inquit. Quemadmodum etiam ammoniacum cum aceto ad luti crassitudinem redactum non pauci lienis quidam imponentes, eius scirrhum curant, idque solum ei curando sæpe satis fuit, ut liquet ex Galeno codē 14. meth. med. cap. 5.

Πνεύματις.

Id est, De malo corporis habitu.

C A P. X C.



Vm vniuersus corporis habitus in æquositate diffunditur, affectus quidam oritur qui à Græcis πνεύματις, à Latinis malus corporis habitus nuncupatur, principium liquidem existens hydropicarum passionē, ut inquit Paulus cap. 47. libri tertij. In qua affectione (Aëtio teste capite 19. libri decimi) vniuersa corporis miscella laxior fit, ac emollescit. Ex cuius verbis liquet, quod non vna duntaxat pars, sed totius corporis habitus oblectus sit in hac affectione. Per totius autem corporis habitum nunc intelligentes partes maxime, quæ primæ oculis subiiciuntur; sunt autem eæ, musculi, qui omnia ossa ambiunt, Gal. teste lib. de artis med. cap. 50. cutis quoque ab eis non secludens, namque & ipsa quoque coactitur, ut liquet, necnon & partes internæ; quæ oculis non subiiciuntur. Vniuersum etenim corpus in hac affectione cum virore albicans redditur ac inualidum: ita ut crura inter eundem vacillent, ut refert Aëtius, & in principio quidem concoctiones impediuntur, manente etiam appetitu, postea verò & fastidium accedit, & respiratio ipsis fit rara, ac debilis, quæ motibus, & actionibus condensatur: alius etiam inæqualia recrementa excernit (ut ipse refert.) At in quo genere affectuum præter naturā,

Flh

Quod totius corporis habitus afficitur. Signa huius affectionis.

*Dubium est,
quid affectus
præter natura
sit.*

*Concluditur
quid affectus
præter natura
sit.*

reponatur, adhuc nec in Galeni doctrina, nec in aliorum Græcorum, quos legerim, reperi, nisi quod libro primo meth. med. cap. 9. aduersus Olympicum, qui non rite pathos, ac symptoma finiuerat, pathos etiam cum morbo confundens, ubi concluderat aduersus eum, non omnem mutationem ab eo, quod secundum naturam se habet (etiam si permanentia illi adfit) ad id quod præter naturam est, morbum esse, inquit, coloris vitium atque atrophiam in symptoma. & nequaquam morborum numero connumerari; quemadmodum etiam *νεκροψυχή*, & *καταξία*, quamuis præter naturam sint, & permanentia ipsis accedat, adhuc inter morbos non numerabuntur, nisi illud adiiciatur, quod ab eisdem aliqua actio lædatur. Videtur itaque in his verbis Gal. velle *καταξία* inter symptomata numerari, quauis & præter naturam sit, & permanentia ei accedat, quoad ab ea nondum actio aliqua lædatur. Nam quod illa se feruatur omnes actiones, etiam si milles corpus fuerit alteratum, mutatumque: nullus tamen eorum affectuum adhuc morbus est, ut ipse Galenus inquit: quod enim curationem desiderat, aliud planè non est, quam affectus, qui vitiat actionem. Verum ubi *καταξία*, seu malus corporis habitus, nedum permanentiam habeat, sed actiones vitiat, negandum non erit morbum esse (ut ex eiusdem Galeni verbis patere potest, ac etiam liquèdò constat ex Aëtio, qui vult, nedum naturales actiones, sed etiam animales, motrices, videlicet, oblati ab hoc affectu.) Concludamus itaque, aut mali corporis habitus symptoma esse in genere affectuum corporis, & propèriè visibilibus, frustratà totius corporis coctionem, seu nutritionem insequens propter frigiditatem, ac humiditatem vniuersi habitus intemperaturam, vel eundem morbum esse, si sumatur pro hac eadem intemperantia frigida, & humida totius corporis, quoniam ab ea, & propter eam iam dictæ actiones oblatæ sunt, & totius corporis color vitiat, cum virore albicans, ut ex sententia Aëtij dictum est, idque non ab re. Nam licet quæ in corpore animalis sunt, omnia gubernentur calido, frigido, humido, & sicco; quemadmodum libro secundo de natura facultatib. cap. 8. à Galeno omnium philosophorum optimorum auctoritate decretum est, tamè calidum in iis, (ut ipse refert) tum ad alias actiones, tum verò præcipue ad succorum generationem plurimum valet. Vel si maius, dicas hoc vitium totius habitus considerari, vel respectu coloris ipsius, & sic erit symptoma affectus corporis, vel respectu essentia eiusdem, quæ in eius temperamento consistit, & tunc erit morbus, quoniam hoc vitium temperamenti, erit intemperies frigida, & humida, quam necessariò sequitur vitiosus color, seu decoloratio totius. Verum hæc eadem totius corporis habitus immodica refrigeratio, ac molities ex nulla alia re, quam ex sanguificationis defectu provenire poterit, quæ ubi immodicè amplius augeatur, generandi hydropis causa erit, ut dicemus. Et propterea Paulus principium aquæ intercutem appellavit hanc affectionem, & Arabum princeps dispositionem antecedentem hydropisum. Quod sit, ut neque generari idem malus corporis habitus possit, nisi & iecur ipsum siue primario, siue per coctionem fuerit affectum, ac imbecillum redditum propter frigiditatem eius intemperaturam, ob quam sanguinem optimum generare nequit, ac pro nutrimento vniuerso corpori eum suppeditare, sed ipsum frigiditatem, serosiorum, & (ut ita dixerim) ma-

gis pituitosum generat, ac distribuit. Et propterea (ut inquit Aëtius) ut plurimum hæc affectio ex longo morbo congregatur, aut ex viciere quopiam in seipsum indurato consequitur, maxime hepate, & splene, neque raro in dysenteria diuturna, & affectionibus cæliacis contingit; item ob consuetam aliquam cohibitam excretionem. Sæpenumero ex immodica sanguinis profusione, in viris præsertim per hæmorrhoides, aut in mulieribus per menses purgationes; quemadmodum & aqua intercus generari consuevit; & (ut in vniuersum dicam) quæcunque causa iecur ipsum, ac vniuersum habitum in frigiditate valent, siue internæ, siue externæ fuerint, huiusmodi affectionem generare poterunt: quas dignoscere haud difficile erit, tum ex te ipso, tum etiam ex laborantium seu afflictorum loquela. Capiuntur autem hac affectione maxime senes (ut inquit Aëtius) qui etiam maxime liberantur, immo & pueri, qui facile pereunt propter vitalis firmitatis debilitatem, & quod ob cutis raritatem facci in eis facile transpirant. At qui in vigore sunt, raro incidunt, & facile se inde extricant. Non negligenda autem erit huius affectus curatio. Nam si diutius protelabitur, in aquam intercutem transit, eodem Aëtio auctore. Quod verò ad eius curationem attinet, aer eligendus est ad calidum, & sicco vergens, somnus moderatus sit, ac nocturnus, longus autem, atque diuturnus omnino vitetur: moderatis deambulationibus, gestationibus, vociferationibus, & frictionibus siccis per lintheola ex lino crudo vendit. Post quæ & exercitamenta moderata conducunt (eodem Aëtio teste) Alius humecta sit natura, vel arte cum clysteribus, ac glandibus. Cibi eis offerantur simplices, & qui facile concoqui possunt, optinuntque sanguinem gignere: vitanda sunt omnia bellaria, item nidiosa, graueolentia, humoris crassi, viscosa, & quæ difficulter concoquuntur. Vinum autem conuenit eis album, tenue, & odoratum, ut liquet ex eodem Aëtio. At aquæ potus omnino vitandus erit, & in vniuersum victus sit tenuis, & siccus, ut inquit Paulus: verò diætæ vniuersa viribus reparandis sit apta, per quam (ut refert Aëtius) spes est, eos qui huic malo sunt implicati, ad restitutionem in integrum perueniuros. Verum si ex consuetæ excretionis cohibitione affectio contingat, prouocare, ac irritare eam ipsam excretionem oportet, ut liquet ex eodem Aëtio, aut veniam incidere in cubito, si nihil sit, quod id fieri prohibeat, paulatim, ac partitis vicibus per triduum sanguine detrahendo, eodem Aëtio, ac Paulo testibus. At si venæ incisio impediatur, aut vitiosorum humorum copia laborant agrotantes, ipsos purgare oportet (relictâ venæ sectione, quæ eisdem noxia est) non semel duntaxat, sed sæpius, ac paulatim, ubi vltus postulat. Purgans autem medicamentum ex hiera, rhabarbaro, agarico, ac myrobalanis parari poterit. Particulatim autem conferentia medicamenta purgantia sequenti capite de aqua intercutem conferipta studiosi reperient: post quæ mirifice quoque inuat ipsos absynthij potio assiduâ, aut syri. eius ac aquarum naturalium vltus; primum aluminosarum, nitrosarumque, mox sulphurosarum, ut inquit Paulus. Hæc namque aquæ naturales calidæ, robori ac viribus reparandis conducunt, ex Aëtij sententia. Conferunt item eis theriacæ, ac mithridaticæ antidotes, similiter diacurcuma, seu dialacca, si drac. j. separatim eorum cuiuslibet cum vino albo tenui, ac odorato tribuatur, seu cum absynthij cremore, nec minus, & eisdem

& eisdem vtēdum erit antidotis, theriaca videlicet, & mithridati, si ex immo dico sanguinis profluuiū excitatus fuerit malus corporis habitus, præcipue tamen eis confert vniuersa victus ratio, quæ viribus reparandis sit apta. Perpetuū autem ex quacunque causa ortum duxerit, hepatis succurrendum erit, ipsumque roborare oportet, cum sanguificationis instrumentum sit, ac sanguinis officina, vt in præcedentibus dictum est. Vberius autem sequenti capitulo de aqua inter cutem idonea medicamenta pro curatione mali habitus reperies, propterea huic capitulo finem imponimus. Vbi autem ex scirrho, aut alio quopiam proprio affectu iocinoris, aut splenis, seu alterius cuiuspiam visceris, malus corporis habitus fuerit ortus, pro ratione affectus, medelam ipsis adhibere cōuenit (prout in præcedentibus docuimus) per auxilia ad singulos ipsorum supra conscripta.

Περὶ ὕδρωπος, ὅς ἐστιν ὕδρωψος, καὶ ὅς ἐστιν.
Id est, De aqua inter cutem, seu hydropico morbo.

CAP. XCI.

Non quemadmodū Erasistrato visum est propter viarū angustiam impedita sanguinis distributione per iecur ad vniuersas corporis partes, tantum eo qui magis tenuis, atque aquosus est transumpto, ita vt his duntaxat per vniuersum corpus vehatur, syneerus autem sanguis in visceris substantia permaneat, sed sanguificandi facultate vitiata, ex Galeni sententia nō raro is gignitur affectus, quē Græci quādoque ὕδρωπον, interim ὕδρωπα, sæpius verō ὕδρον nuncupant, Latini autem aquam inter cutem, seu hydropicum morbum, vt liquet apud Celsum cap. 21. libri tertij, à symptomate nomen sumens, siquidem aquosus humor hæc passionem necessario comitatur (Celsio Aureliano teste cap. 8. libri tertij, ac Plinio secundo libro 3. cap. 12.) Cuius differentia à quibusdam duæ duntaxat connumerantur, quidam autem quatuor esse hydropum differentias affirmant, vt 4. de ratione victus scriptū est. Veruntamen nedum Galenus præcitato loco prædictorum opinionones tanquam erroneas cōdemnavit, sed tres hydropum statuit esse differentias, id quod etiam confirmauit libro 5. de locis affectis, cap. 7. & 4. de causis pulsuum, cap. 24. Eundem autem sectati sunt Aëtius cap. 20. libri decimi. Paulus cap. 48. libri tertij. Alexand. cap. 1. libri noni, & Celsus præcitato loco. Nos verō cum de earundē causis pertractabimus, quod neque plures, neque pauciores esse poterunt, demonstrabimus. Quarum vna τυμπανίτης altera αἰκίλης & tertia ἀνὰ ἄρτην ὑποσάρκα, ἢ κατὰ σάρκα, ἢ λευκοφλεγματίας, ἢ ἄρτηνης, ἢ ἐν ἄρτηδιον, ἢ ὑποἄρτην appellatur. Tympanites quidē à tympano sic appellata, quoniam in tali affectione imus venter percussus talem sonum edit, qualem tympanum, Galeno teste commen. aphor. 11. quarti libri, quo loco Hippoc. ἔρπον ὕδρωπα nuncupauit, quemadmodum αἰκίλης, sic dicta est, quod αἰκίς hoc est vtrius modo in peritonæo humor continetur: vt liquet eodem loco. Et tertia differentia sic appellata est, quoniam per carnem, vel sub carne, vel iuxta carnem, seu secundum carnem, vel supra, seu infra carnem humor continetur, aut propterea ipsam λευκοφλεγματίαν nominant, vt quæ pituita liuida conficit, vel sui quidem ratione semper alba, sed quæ propter mixtionem quorundam aliorum humorum verum mutet

colorem, vt liquet apud Galenum cōmento aphor. 29. 7. libri. Communis autem omnium (vt inquit Celsus) est humoris nimia abundantia, ob quam ne vlcera quidem in his ægris facillè sanescunt, vt patet etiam apud Hippocrat. & Galen. aphorif. 8. sexti libri. At quoniam cuiusvis aquæ inter cutem communis genitura est, vbi sanguificationis officium intercidat (vt liquet apud Galenum secundo prognosticorum) ea de re necessum est (quoniam iecur eius facultatis, quæ sanguinem gignit instrumentū existit) vt ipsum vitietur in huiusmodi affectibus, quinimo nisi hepar afficiatur, vt quinto de locis affectis, scriptum est, haudquaquam aqua intercus fieri potest, & si non semper ob primariā eius affectionem exciteretur, licet hoc quoque sit quā frequentissimum, sed interim iecur ipsum per consensum afficitur aliarum partium, quæ aut eidē vicinæ sunt, aut societatem, seu consortium quoddam cum eo habēt mediis conceptaculis, venis videlicet, quemadmodum ab eodem Galeno tū 5. de locis affectis, tum 2. prognosticorum decretum est. Quod autē interim primario iecur, interim lege consortij, quod cum aliis partibus habet, iam dictis aquæ inter cutem speciebus afficiatur, ab Alexandro, & Paulo præcitatis locis cōfirmatum est. Atqui dignoscēs num ipsum primò affectum sit, ex Hippoc. & Galeni testimonio eodem 2. prognost. ex cupiditate quadā, seu propensione, quā ægrotantes ad tulsimum obtinent. Nam incitati ipsi ad tulsim, tanquam ad accidens, statim ab hoc desistunt, tantummodo tentantes initū tulsendi, etenim iecoris moles incidens præcordijs facit angustiam in pulmone, ob quam ad tulsim ægri veniunt frustra, ceu auxiliaturā affectui naturalis facultatis, nequaquam habentes ministerium, continuo desinunt. Ob hæc itaq; propensiores ita affecti ad tulsim redduntur, sed eis citò tale deficit munus, propterea quod nihil dignū cōmētatione excreāt. Dignoscitur etiam ex paucitate, ac ariditate deiectionum, nam venter non deiecit nisi dura, ac pro necessitate imperpelis existētibus intestinis, vel laetibus (vt Galenus inquit) nec vitiato alimento, neque grauitas ab eo partibus, etenim bene valent, nec alui fluor infestat, manēntq; diutius inibi reliquæ alimenti, quæ partim mittuntur ad intimā peritonæi sedem, partim inflammatione iecoris torrentur, præsertim si ad acutū morbū consequatur aqua intercus: aderūt quoque & reliqua signa, quæ ipsum primario affectum indicabunt aliquo prædictorum affectuum, quorum indicia propriis eorum capitibus requiras. Vbi autē nullum tale præcesserit signū primario affectui iocinoris, ac venter magis profluuiis infestetur, sitque alui fluor diutinus, neque dolorē exoluens, neque molliens ventrem, ventriculi, vel intestinorū, maximèque ieiuni vitio (mesentericis venis mediis) iecur ipsum per consensum oblaesum erit. Nāque ex prædictis partibus affectis potissimum venę debiles fiunt, per quas iecur ad se trahit alimentum, ita fit, vt nequaquam deferuiant viscera ad deductionem, & cum in tenuioribus intestinis maneat, grauata ab eo, vt pote debilia, statim id omne pellūt deorsum, atq; hæc alui floris in huiusmodi aqua inter cutē causa est, eodem Galeno teste præcitato 2. Prognosticorum. Altera causa est, quoniam & alimentum corrumpitur, ac bilis copia in intestinis colligitur, & ob eam rem eadem admodum mordentur, proindeque incitantur ad excernendum cōtenta ibi excremēta, idque potissimum

Hh 2

Communis
causa gen
rationis om
nium triū
differentia
rum.

Commen.
cap. 7.
Quæ pars
afficiatur,
quæve iecur
semper.

5. de locis
aff. cap. 7.
2. prognos
tic. cōment.

Alex. libro
9. cap. 2.
Paulus lib.
3. cap. 48.
Si iecur pri
mario affi
ciatur, si
gna.

Tex. & cō
ment. 5.

non huius
modi aqua
inter cutem
afficiatur
sed cutem
subiugam.

Si per con
sensem iecur
afficiatur,
signa.

Cōment. 1.

accidit, ubi inflammatione vexentur, & propterea fluor hic alui neque dolorem cedat, neque ventrem mollit, cum per eum aqua inter cutis causa non vacuetur. At si indurato liene, seu infrigidato, aut quomodolibet aliter affecto, eique contenti iocino re aqua inter cutē genita fuerit, ex prædictis signis indurati lienis, aut aliter affecti patebit. Sic etiam, si vel pulmonis, vel septi transuersi, aut renū occasione iecur affectum fuerit eorundē viscerum affectorum signa præcedent, qualitas autem affectus ipsius iocinoris frigida perpetuò intemperies existit, nāque nisi ipsum primario infrigidatū sit, aut ad ipsum frigus impertiat, à reliquis iā dictis partibus primario refrigeratis, aqua inter cutē subsequi potest minime, vt ab eodem Gal. 5. de locis affectis, cap. septimo, & sexto eodem, in principio, decretum est, quæ frigida intemperies, nedum ad omnes eiusdem iecoris venas peruenire debet, verum quoque ad eius corpus, quod *παρὰ τὴν ἥπαρ* Græci dicunt, nāque secundū hoc propriæ eius facultatis, quæ sanguinē gignit, instrumentū est. Et propterea ubi vitium sit, actionem quoque eius vitari oportet, adē vt non amplius cibos in sanguinem, sed in aliam qualitatem transmutet serosam, ac tenuem inquam superfluitatem, aut pituitosum humorē, seu statum, & proinde sit, vt trifariam duntaxat aqua inter cutem constitui possit. Nec obstat ea aqua inter cutē, quæ ad acutos morbos sequitur, nāque ab iis quoque iecur tam grauitur afficitur calida, & sæpenumero sicca quoque intemperie, vt cibum in sanguinē transmutare nequeat, vt liquet eodē 6. de locis affectis, ita vt valeamus absque controuersia asserere, hanc etiam aquā inter cutem ex frigida iocinoris intemperatura ortum habere, priuariū saltem admodū imbecillo eius insito calore reddito, quo medio sanguinem gignit, ex iam dicta præter naturā eiusdem caliditate in eo genita. Atqui frigida hæc iocinoris intemperies haud æquē in gignendis iā dictis aquæ inter cutem speciebus se habet. Nāque à maiore frigiditate generatur aquosus hydrops, quæ ascitum vocat à minore autem tympanites. Etenim humida substatia in flatuosum aërem sine aliquo colore transmutari nequit, vt inquit Gal. præcitato comment. aphor. 11. 4. lib. Sed quemadmodum ascites à maiori frigiditate, quā tympanites excitatur (vt diximus) pari ratione & anasarca, seu leucophlegmatia à frigidiore iocinoris intemperie, quā ascites, ortum ducit, quoniam totum habitū pituitæ plenum habent laborantes, Galeno auctore quarto de ratione victus. quanto etenim pituitosum excrementum seroso, ac tenui humore frigidius existit, tanto anasarca, quæ ex iā dicto pituitoso excremento excitatur, à frigidiore intemperie generationē habebit, quā ascites, qui ex seroso excremento producit. Accedit item, quod (vt facit Aëtius) talis humor tenuis, & serosus, qui ascitis causa existit, falsus est, & putrefactus, vt propterea largior potum appetant, qui ascite laborant, quā reliqui hydropici. Est itaque anasarca, seu leucophlegmatia pituitosi humoris in toto corpore collectio, seu per omnē corporis miscellam diffusio (vt inquit Aëtius) ita vt instar spongiarū, aut papyri vniuersa caro permadefacta appareat, atque ob id totum corpus similiter, vt hypochondria, intumescit, ac mortuo simile euadit. Ascites autem collectio aquosi humoris existit plurima inter membranam, peritonæum appellatā, & intestina, vt verē vitis modo membrana ipsa repleta esse videatur, spa-

tium etenim quod inter peritonæum, & partes ei subiacentes est, aquoso humore impletur, Galeno teste quinto de locis affectis, cap. 7. Aliquando verò ubi peius habent agri vsque ad sœmora tumor producit, vt idē Aëtius asserit. Tympanites autem plurima collectio est superflui status aëre repleti in iisdē ventris incubentibus locis, vt in principio sola inflatio esse videatur, postea tamē status inspissatur, & veluti nubilus redditur, atque ita vnā cum statu, quasi nebulosus humor consistit, atque cōgregatur, vt liquet ex eodē Aëtio. Ex quibus liquet quālibet aqua inter cutē differentiam, seu speciem morbum esse in quantitate, seu magnitudine. Nāque ex genere præter naturam tumorum existunt, vt liquet libro de tumor. præter naturam circa finem, id quod confirmat idem Galenus de ascite lib. 14. metho. meden. cap. 13. quo loco eam in numero eorum tumorum, qui præter naturā consistunt, cōnumerat, qui etiam toto genere præter naturā sunt. Nec obstat, quod idem Galenus lib. de differentiis sympto. cap. 4. inter ea symptomata, quæ incidunt in sanguinis generatione frustrata, hydropis vitia connumerat, nam vel symptoma vniuersaliter dictum voluit intelligere, vel per vitia aquæ intercutis, eius causam immediatā intellexit, quæ quidē symptoma est incidens in sanguinis generatione (vt ipse inquit) non peracta, vel non rite peracta. Communiter autem omnis aqua inter cutem spirandi difficultatem, tumorem, & grauitatem, ac vitium colorē inducit, ex virore nimirum albicantibus ægris, falsidit & cibum, potum autem largiorem plurimi appetunt, maxime qui ex ascite laborant, etenim humor, qui in locis detinetur, falsus est, & putrefactus, quare, & sitis, & febris augebit: ferē enim in totum plurimi ex hydropicis febriunt, vt ab eodem Aëtio scriptū est. Commune item omnis aquæ inter cutem esse pedes intumescere, quippe cum procul à calidissimis partibus absint, vt liquet ex Galeni 2. prognosticorum. Particularim autē ascites inde internosci debet, quod fluctuationes excitentur ex humore, qui veluti in vtre quodā contentus circūuoluatur. Tympanites autē, quod ubi nos ferimus ventrē tympani modo strepitum quendā elidere videatur, vt inquit Alexander. Et propterea in huiusmodi aquis inter cutem humor sit, an spiritus, qui in regionibus ventris continetur tactu explorare non valemus, nisi cauta pressu cute: etenim frequēter nō cauari cōspicis in synceris ascitis, & aqua inter cutē, quā tympanitem vocant. Sed ad verā notitiā comparandā p. Ilare cogimur abdomen, vt attendamus, si veluti tympanum resonet. Secundo loco aliter cōponere hominem & in latera conuectere, quo fluctuationē aliquam exaudiamus, ac nobis strepitus in modum tympani spiritum annuntiat, fluctuatio humorem: vno verò admoto tactu dissentit abdomen non deprehendas ex aëre sit, an ex aqua, tametsi cutis his, & quicquid carnosum erat secundum peritonæum, & crassa cute tectum contabuit, quemadmodum à Galeno lib. quarto de dignoscendis pulsibus, cap. 3. scriptū est. Anasarca verò hinc deprehenditur, quod ager carnes habeat emortuo corpori similes, & totum corpus intumescat, ac ubi nos digito id imprimimus, cavitatis oboritur, cūq; imprimere desierimus, non statim in pristinū reuertatur, vt apud eundem Alexandrū legitur. Ceterum quævis prædictarum specierū aquæ inter cutem ad iocinoris refractionem (vt iam dictum est) consequitur: etenim

Ad quem
iecoris affe-
ctum aqua
inter cutem
cōsequatur.

Quod non
nisi tres a-
qua inter
cutem diffe-
rentia esse
possint.
Loco cita-
to.

Commen. 3

Lib. 10. ca.
20.

Quid sit a-
nasarca.
Loco cita-
to.
Ascites
quid sit.

citra eiusdem refrigerationem impossibile est aliquid in hydropem incidere, Galeno & Aëtio testibus. Hæc autem refrigeratio, aut per se, aut per cōsensum fieri potest, ut diximus. Et propterea ex nonnullis causis iecur ipsum refrigerantibus aqua intercus oriri poterit, vtpote ex immodica hæmorrhoidum profusione, aut ex eisdem diuturnis suppressis similiter ex menstruæ purgationis omnimoda cessatione, aut immodica vacuatione, aut ex immodico muliebri profluio, ut liquet ex Galeno 2. de natural. facult. c. 8. & 5. de locis aff. cap. 7. Pariter ex intestinua, ac immodica aquæ frigide portione iecur affatim refrigerari potest, ac statim aqua inter cutem induci, quāquā sic affecti (ut Galenus eodem quinto de locis affectis, cap. 7. asserit) iob refrigeratum os ventriculi, vehementi ciborum desiderio teneantur, opposito modo quam ceteri hydropici. Similiter si ipsum iecur scirrho afficiatur, vel ipsum, plene induratum, seu refrigeratum, coafficiatur, aut ieiunio, seu reliquis intestinis iuxta ipsum, aut mesenterio, vel pulmone, vel renibus, seu septo transuerso, simili ratione primario affectis. Multi autem & à podagra, & à coxendiculi dolore vexati aqua inter cutem inciderunt frequentissimè etiā eos, qui cibū nō sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, itemque ab arquo infestatos hydrops corripit, item quosdā eorum, qui non nisi recta ceruice spirant, cæliaca affectione laborant, ac dysenteria, in aqua inter cutem deduci nonimus (ut inquit Aëtius) sæpe etiam febribus longis superuenit (ut inquit Paulus) & interdū ad morbos acutos consequitur, ex Hippocr. sententia secundo prognosticorum, cum ex eo sanguificationis officiū intercudit, adeo ut iecur cibum in sanguinem transmutare nequeat: quæ omnia & dignoscere, hæcque agere intertingere licebit, ex prædictarum partium affectarum, ac prædictorum affectuum dignotione, per enarrata in propriis locis, ac capitibus signa, & propterea eadem breuitatis causa scribere recusamus: quædam autem ex infirmorum, seu adstantium loquela promptè percipies. Huic autem affectioni non minus foemina quam viri sunt obnoxii: pueri verò plurimū ab hydropē facite apprehenduntur, quæ quandoque curabilis fit. Est tamen tympanites omnino periculosa, minus eo affcites: facites quoque aliquando curabilis fit, per ea quæ cuti adhibentur humores detrahentia ac resiccantia pharmacha (ut idem Aëtius inquit.) Omnes autem inueterati hydropes, & qui iam habitum corrumpunt, sunt periculosi (ut ipse faretur.) Sæpe verò hoc malum per se incipit, sæpe alteri vetusto morbo, maximè quæ quartana superuenit. Inter initia tamen nō difficilissima curatio est: at si malū inueterauerit, nō sine magna molestia discutitur. Celso auctore, facilius quæ in seruis, quam in liberis tollitur, quia cum desideret famē, sitim, mille alia tædia, longamque patientiā, promptius his succurritur, qui faciliè coguntur, quā quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur, ut idē refert Cornelius. Omnis item aqua inter cutem, si ex acuto morbo existit, mala est, ut liquet apud Hippocratem, eodem secundo Prognostici. non enim sedat febrem, sed dolorem admodū infert, ac mortē, ut ipse inquit. Quod verò aqua inter cutem laborantibus vlcera in corpore facta difficulter sanentur, idē scriptū reliquit aphor. 8. lib. 6. & apho. 14. eiusdem. Hydropē correpto, (inquit) si aqua è venis in

vetrem defluerit, soluitur morbus, quemadmodū si eisdem tulsis superuenierit, quod malum sit, decretum est ab eo aphorif. 35. 6. Vel quod desperati sint (ut liquet aphorif. 47. 7.) Si quis autem leucophlegmatia detineatur, & foris ventris fluxio superuenierit, à morbo liberatur, ut patet aphorif. 29. 7. libro. Nanque (ut Galenus inquit) ex forti seu diuturno alui profluio, soluitur albe pituitæ superabundantia. Verum licet difficilis sit aquosa affectionis curatio, & plurimo artis auxilio opus habeat (ut inquit Aëtius) inter initia tamē nō difficilissima curatio est, Celso auctore, cuius prima, & principalissima pars ratio victus existit, nedum in aqua inter cutē, verum etiā in omnibus affectibus, & potissimum periculosis (Alexandro teste) Ea de re communem omnibus speciebus aqua inter cutē victus rationem instituit, deinceps particulare aggrediemur cuiusque curationē. Aer itaque eliquatur ad calidum, & siccum vergēs, moderata autem sit, & probe temperata ipsa domus secundum anni tempus (ut inquit Aëtius) Lectus nō valde mollis sit, (is præsertim, qui aëne farca laborant) subternantur etiā arundinū folia, & herbæ resiccantes, velut est, vitex, pulegiū, calamintha, & similia, opercula etiam ipsa, quibus teguntur, apparentur duriora: nimirum est etenim quantum huiusmodi per somnum resicent, ut cōstet iā quosdam frumenti acervis obuolutos, & absconditos à somno surrexisse firmos, ac resiccatos, ut liquet ex eodem Aëtio, qui itē somnus eisdem competit moderatus, aut paulo breuior consuetudo: nanque vigilie moderatæ non minùs conferunt: digerunt etenim (ut liquet ex Galeno, duodecimo methodi medendi, cap. 3.) motus insuper, si quid aliud (ut Trallianus refert) hydropicis conducit, præcipue qui sit per mare, equum, & lecticam. Iis autem, qui viribus constant etiam ambulatio est utilisima: pariter frictions hydropicis adhiberi debent, nanque externos corporis meatus rarefaciunt, humores extenuant, ac discutunt (eodem Alexandro teste.) Celsus quoque multum ambulandum, currendūque aliquando esse præcipit, quāquā inter initia idem, quietem, sitim, ac inedia, pro huius affectus curatione probauerit. Addidit etiam, quod superiores maxime partes sic perficiendæ sunt, ut spiritum ipse contineat, euocandus est sudor, non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusque aliis, maximèque vtilis naturales, & sicca sudationes sunt, quales super Baias habemus in myrætis (ut ipse refert) modo autem vulgo sudatorium Tripuli fortè appellatur. Alius quoque in singulis hydropicis seruanda lenis est, si nō natura, saltem arte clysteribus leniētibz, aut glādis vtens. Cibus autē esse debet ex media materia, sed tamen generis durioris (ut refert Celsus.) Sit autem vniuersus facilis cōcoctus, & sufficienter coactus, exolutus enim aptus est, ut in aquositate commutetur (Aëtio auctore) Melius nanque ita affectis est dare (Galenus teste quarto de ratione victus) quæ probe cōcoctæ re possint. Prospiciendum etenim est, ut alimentū, quod ad iecur peruenit, faciliè sit ad distribuendum, & nequaquam impediatur, quò minùs in corporis partes dispenseretur, ut faretur Alexand. Quare optimum alimentum ipsis est panis fornaceus probe fermentatus, qui semina flaribus discutendis apta contineat, ut amisi, aut cumini, aut feniculi. Cuius etiam copia vitari debet, ut liquet ex eodem Alexandro, vel panis sit optimus clibanites, qui saltem, am

Loco citato.
so.

mium, & foeniculū habeat admixtum, vt refert Aë-
tius. Ex auibus conueniunt perdice, turtures, pha-
siani, turdi, merulae, & starna, & reliqui minuti pas-
ferculi: qui pingues nō sunt. Interim gallina, ac gal-
linacei pulli, quanquam feræ māsuetis præponi de-
beant, vt testatur idē Iulianus. Ex quadrupedum
itē carnibus moderatē comedant, & eas potius, quæ
non sunt pingues, præcipuē ferinas, vt ceruinās, a-
prinas, & caprearum, ac leporum, quarum ius cum
extenuante cibo paretur, apio videlicet, petroseli-
no, dauco, eruca, pulegio, rapa, caualide, coronop-
o, eryngio, pastinaca, porro capitato, ac aliis, præ-
sertim hominib. ruralibus, has casidē maximē assas,
si gratæ sunt, assumere ipsos alienū non est. Verū
tam assatis, quā elixatis semper aromatica quædā
redolentia adicias, præsertim cinnamomum, aut ca-
ryophyllos. Ex piscibus gustari poterunt cancri, lo-
custæ, & erinacci recentes. A leguminibus verō ab-
stineant in totū. Inter bellaria cōcedendæ sunt pal-
mule, nuces, amygdalæ, vua pensilis, ac vua passia, ma-
la punica, pyra cōsta, ac carica: omnia tamē mode-
ratē, neque omnia quotidie. In vniuersum tamen
maximam ciborum partē in cœna accipiant, quan-
doque etiam assatas cochleas, atque oua insuper as-
sata gustare poterunt, vt Aëtio visum est. Pro potu
sit vinum tenue, præsertim vetus. Item & quod vri-
nā ciet. Aqua in vniuersum vitanda est, verū quo-
niam incōmodus est eis plurimus potus, tantū præ-
bendum erit, quantū ad infringendā aliquo modo
sitim sufficit, nanque potio non vltra danda est, quā
vt vitam sustineat, optimāque est, quæ vrinam mo-
uet, vt à Celso scriptū est. Si tamen intensa sitis in-
flet, parum quid delibandū dabimus, solatij tamen
gratia, & leniendæ sitis: dulcia verō vina, & vinū mul-
sum vitanda sunt, nanque ex his sitis nō sedatur, e-
potū tamen acetum optima eisdem medela est, vt
liquet primo de simplicium medicamentorū facul-
tatibus, cap. 30. Quod si velint factitiis vinis vri, id
sit absinthites, præcipuē quod spicam nardi copio-
siorem recipit, vel apiatum, aliis autem abstineant,
ex Alexandri testimonio, & vt summatim dicā cum
Galeno quarto de ratione victus in morbis acutis,
Comm. 3. quamminimū bibere, & quamplurimū laborare
prædictis confert, nempe talis viuendi modus calfa-
cit, & siccit. Hæc quoad communē victus rationē
attinet, dicta sint satis. Quantum verō ad medica-
Comm. 3. mentorum rationem attinet, communis etiam om-
nium curatio ab euacuatione incipienda est, Paulo,
Commonis medicamen-
torū ratio. & Alexandro testibus: quanquā ascites, & tympani-
tes purgans medicamentū duntaxat quod aquā e-
3. cap. 48. ducat, requirunt: Anasarca verō interdum venæ se-
Alex. lib. ctione, vt ipsi referunt: quinimō hic solus hydrops,
9. cap. 2. cum incipit, Galeno teste 4. de ratione victus, cō-
ment. 3. interdum sanguinis detractione indiget,
cū scilicet ex retēione vel hæmorrhoidarū, vel mu-
licbriū, vel ex quapiā, quæ ita plethorica sit causa in-
ceperit. Tympaniā verō, & ascitē (vt ipse inquit)
Anasarca nullus per sanguinis misionē sanare est ausus. Hu-
curatio pro priā. ius itaque speciei aquæ inter cutem propriam me-
Vena se- dicamentorum rationē aggredientes dicimus cum
ctio. Galeno, circa initia venam secandam esse, præser-
tim cum ex modo dictis causis fuerit orta. Nā licet
ex sanguine frigidiore nascatur, & frigiditatis ra-
tione illa non indigeat, tamen quoniā copix detra-
ctio naturā leuat, vt hæc minorem illam effectam
facile superet, nō alienum, sed rationi consentaneū
est venæ sectione vri, Alexandro teste. Nam propē

Loco citato.
so.

ad extinctionē accedēte naturali caliditate, vt igni
contingit in hac affectione, etenim quemadmodū
ignis propē extinguitur immixtis lignis, tum humi-
dis, tum multis, nisi quis multitudinem sustulerit, sic
& in frigidiore ob copiam sanguine, vbi calor na-
turius propē extinguitur præsentissimum est reme-
dium sanguinis mīssio: quo tempore periculum ita
prehenderit, vt liquet ex eodem Galeno præcitato
lib. 4. de ratione victus in morbis acutis, comm. 3.
Ante omnem itaque aliam curationem venæ sectio
adhibenda est, si vires, ac reliqua permiserint, &
candāque interna cubiti dextri vena erit. Ea nāque
vena velocissimē, & plurimum ex iis, quæ principes
sunt, partibus corpus vacuat, ex Galeni sententia co-
dē 4. de ratione victus in morbis acutis. Nec vnica
vice multa sanguinis copia exhaurienda est, ne vi-
res deiciātur, sed satius erit, vbi oporteat, ipsam i-
terare, ac paulatim, & tutō magis euacuare, quā se-
stinādō vnā cum morbo etiā ægrū ē medio tollere.
Verū vbi vires non permiserint, sed imbecillæ sunt,
aut ex quauis alia causa, quā ex iam dictis, anasar-
ca originem duxerit, sanguinis mīssio vitari debet:
sed copia pituitosi excrementi per vniuersum cor-
pus redundantis purgante medicamento vacuatio
debet. Sic etiam vbi opus fuerit, facta venæ sectio-
ne eadem purgatione vtare, quæ iterum per vices
tentanda erit, ex sententia eiusdē Alexandri à lenio-
ribus inchoando, & demū ad ea, quæ paulo valen-
tius purgare queunt, transire, prius tamen humore
ipso preparato, ac viis referatis per ea medicamen-
ta, quæ extenuandi, incidendi, ac meatus aperiendi
vim habent: ea sunt syrup. ex absinthio, eupatorio,
de byzantiis, oxymel simplex, ac scillinum, seu syr-
ex hyssopo, qui exhibeantur cum aliquo etiam ex-
tenuantium, ac aperientiū medicamentorum deco-
cto, quorū copiā cap. de iocinoris obstructione, re-
quiras, pariter cap. de eiusdē iocinoris imbecillita-
te: quibus sæpius adhibitis purgans medicamentū
tribuendum erit, quod conficiatur, vt infra. Recipe
pulueris hieræ simplicis Gal. drac. j. agarici trochi-
scati, ac rhabarbari vigorati, singulorū scrup. 2. for-
mentur pilulæ cū oxymelite. A quibus per aliquod
tempus exhibeantur vnc. 2. vel 3. syr. ex pluribus infu-
sionibus rosarū cum aqua cichorii. At vbi hæc pur-
gatio satis non sit, iterum quæ maiore vim habent
extenuandi, ac aperiendi medicamenta exhibeto
(eorum, quæ modō recensuimus) post quorū vsum
ad ea quæ paulo valentius purgare queunt, trāsit:
veluti sunt catapota ex rhabbarbaro, seu ex agarico,
idque non vna vice faciendum erit, sed pluribus,
prout vsus vrgebit. Semper tamen à mitioribus ad
valentiora transeundū. Necnon cum eisdē medica-
mentis perpetuō ea misceri debent, quæ vim habēt
adiiciendi iocori robur, quemadmodum rhabarba-
rum est, ac myrobalani, præsertim chebulæ. In hunc
etiam vsum cōferunt pastilli de rhabbarbaro, de ab-
sinthio, seu eupatorio, si per vices exhibeātur. Quo
etiam tempore, vbi ab his purgantibus medicamen-
tis se abstinerint ægri, vt poterunt aromatico ro-
saceo, antidoto diarhodō, dialacca, vel diacurcuma
eorundē drac. j. deuorantes cum exiguo vino albo,
aut aqua ex absinthij decocto. In quæ adhuc vsum,
si tantundē mithridati, seu theriacæ assumpserint,
non parū confert. Præbenda etiam erunt ea, quæ v-
rinam cient, velut est daucus, sciseli, cardamomum,
radicum asparagi, aut trifolij decoctum, aut etiā trif-
saginis, similiter etiā si drac. j. eiusdē radicis trifolij,
aut

Yomit
Que ex
serus ac
unda f

Li. 10.

Cap. de
rha.

Act. Li.
10. cap. 7
Gale. 11
simpli. n
dic. fac
cap. de
chiosi.

Celsus
3. cap. 2
Actius
10. cap.

aut eryngij sicce, vel seminis viticis tantundem cum vini cyathis tribus exhibeatur, commodè vrinam cient, vt liquet ex Aetio cap. 31. libri decimi. Maximum item eiusdem auxilium præstat vomitus, vt ex eodem Aetio liquet. Extrinsecus verò ea adhiberi medicamenta licebit, quæ vim immodicum humorem exsiccati habeant. Quapropter & in puluere volutationibus vtendum est. Aliquando etiam & arena probè à sole ignita, aut pellibus similiter à sole seruatis ægrum oculere oportet; capite tantum velato, & facie cum spongia asiduè extersa, eodem Aetio auctore: fluuiales etenim, ac marinæ ænæ communem vim possident omnium lapidum, siquidem exsiccant tumentem ab aqua inter cutem carnem, ægroto videlicet in eis exsiccatis decumbente, ex Galeni auctoritate, non de simplicium medicamentorum facultatibus. Post hæc aqua marina, aut aluminosa, aut sulphurea lauentur ægri, etenim aliquibus, qui ad huiusmodi lauacra assueverunt, ea ipsa, tum ad delendum morbum, tum ad habitum valentiorum reddendum suffecerunt. Optime etiam conuenit & his cataplasmatum admotio, eorum præferim, quæ resiccare simul, & visceribus firmitatem addere possunt, quæ madmodum stercus bubulum est conuenienter resiccatum, non ineptè cum posca, aut aceto mulso impositum, infarcta sulphuris quarta parte, similiter & cochleæ crudæ tritæ, & impositæ, agglutinantur etenim, neque discedunt, prorsusque vniuersus humor resicetur (eodem Aetio teste) quanquam ante eum Galenus II. de simplicium medicamentorum facultatibus. illud scriptum reliquerit, cum dixit, Porro cochleæ, quæ vitionem non sunt expertæ: si tritæ vnà cum tellis imponantur, & toti ventri aqua inter cutem laborantium, & in arthriticis, articulorum tumoribus ægrè quidem diuelli poterunt: cæterum impenitè desiccant, & sanè inlharere sinere oportet, quoad sponte decidunt: fermentum etiam sale multo permixtum commodè adhibetur, aut panis cum puluere hyssopi, aut fabaceæ farina, aqua marina, & melle coacta, pari absinthij modo adiecto. Vel sic cataplasma conficies, Recipe caricarum, & fermenti, cuiuslibet vnc. i. farinæ hordeacæ, loliacæ, fabacæ, scenugræci, & seminis lini, ana manip. s. radicum, & foliorum ebulli, & absinthij, ana manip. j. s. hyssopi, & origani, ana drac. 4. sulphuris drac. 3. misceantur, & cum posca, aut oxymelite fiat cataplasma. Si verò corpora teneriora sint, quemadmodum puerorum, & aliorum, qui mollem carnem habent: quæ reprimunt cataplasmata magis adhibere oportet, qualia sunt malicorum, thus culinari, mala cotonea, myrthi bacæ, & vitis pampini, aliquando quidem per se, aliquando inuicem permixta cum quibusdam eorum medicamentorum resiccantium, quorum supra mentionem fecimus. Verum vbi prædictis affectio non cesserit, efficacius auxilium adhibere oportet, quod chirurgia præstat, fissuras inquam circa internum talum inligere oportet, in loco quatuor digitorum spatium supra talum eminentes, ea profunditate, qua quis in venæ sectione vatur, ita vt per aliquot dies, per easdem humor frequens feratur, quemadmodum Celsus, & Aetio visum est, neque periculum vllum hic verendum est, velut in hydropsi ascitæ pertussione, non enim coaceruatim, quemadmodum illi euacuantur: & si quis velit excretionem plurima factam cohibere, nihil vetuerit ipsas in talis fissuras linamentis obturare, ligamentisque constringere: at-

que vbi rursus prodire quid velimus, laxatis ligamentis, & ablatis linamentis, gestatòque, ac moto ægro excretionem irritabis, vt idè inquit Aetius. Ea autè species aquæ inter cutem, quæ ascites appellatur, non minus (vt diximus) ab euacuatione initium curationis exigit, quanquam non venæ sectionem, sed purgans medicamentum requirat. A tenui nanque, ac seroso humore originem ducere superius conclusum est, & à Galeno decretum tertio de causis symptomatum, cap. 2. Is itaque primò præparari debet syrupus è corticibus citri, melle rosaceo, aut oxymelite, & demum infra scripto medicamento purgante expurgari: quod recipit pulueris hieræ simplicis Gale. drac. i. agarici trochiscati, & rhabarbari vigorati ana drac. s. formentur pilulæ cum oxymelite: a quarum assumptione per aliquod tempus infra scripta potio exhibeatur, quæ recipit corticum myrobalanorum chebularum drac. 3. citrinarum drac. i. fiat decoctum in aqua cichorii, & absinthij, in quo vnc. 2. syr. domini Augustinii, ac tantundem syrup. ex pluribus infusionibus rosarum dissoluas, deinceps iterum adhibitis syrupis magis extenuantibus, vt eo qui ex tribus radicibus conficitur, aut ex duabus, vel quinque radicibus Mesuæ, oximelle simplici, aut scillino, seu syrup. de byzantiis, vel de eupatorio cum syrupo de absinthio, & aquis sceniculi, & melissæ, iterum purgans medicamentum exhibeatur, quod parari poterit ex pilulis de agarico, vel de rhabarbaro eiusdem Mesuæ cū pulueribus hieræ simplicis, vel pilulas nostras tribuas, quarum sapius experientiam habuimus, & citra noxam pluries singulis septem, vel decem diebus exhiberi poterunt; mirabiliter etenim serosos purgans humores citra aliquod nocuum hotatu dignum. Conficiuntur autem hoc modo, Recipe foliorum plantæ, quam communiter seplasiari mezereon appellant, & propriè eius, quæ nuncupat Dioscorides chamælaam, vnc. 2. vel 3. infundantur per viginti quatuor horas in sufficienti quantitate aceti vini albi, in quo prius mala cydonia fuerint decocta, demum in vmbra exsiccantur, & iterum parato decocto ex pomis dulcibus & acetosis, in eodem aceto vini albi prædicta folia infundantur, vt supra, ac exsiccantur. Contundantur, & eisdem adice hieræ pieræ simplicis tantundè, & cū succo radicis iridis fiant pastilli, & seruentur, quorum dosis est drac. i. vel scrup. 2. pro qualibet vice. Interim verò drac. s. agarici trochiscati, aut rhabarbari vigorati, & tantundem trochiscorum ex myrobalanis chebulis adicere poteris: eisdem nanque catapotis (Deum testor) me nonnullos hac specie aquæ inter cutem laborantes sapius, per intervalla eis exhibitis, perfecte curasse. Nec etiam parum conferunt pro curatione aliarum aquæ inter cutem specierum, vbi eadem purgatione indigeant: quemadmodum hoc in anno 1557. obseruauimus in illustrissimo Petro Antonio Sanseuerino Bisignani principe, qui cum ascite, simulatque anasarca, laboraret adeo, vt ferè à cunctis pro deplorato haberetur, vbi ter, aut quater dicta catapotia per intervalla deuorauit, liber euasit, testes sunt nonnulli cum medicis, tum magnates, qui ipsum aqua inter cutem laborantem, ac demum ab ea solutum, & liberatum inspexerunt, quanquā non exiguam etiam huic opem tulerit sudatorium Trituli hodie vocatum, cuius supra meminimus. Cæterum mirificè confert pro educenda hydropicorum aqua, seu humore seroso decoctum radicis sambuci, seu ebulli in vino. Nanque

Ascites
quomodo eu
ari debeat.

Purgatio.

Diosc. li. 4.
cap. 153.
Pilule pro
priè exper
ta.

eadem utriusque vis est, & cutem subeuntibus aquis
Diosc. lib. auxiliantur, Dioscoride auctore; licet & à Paulo, &
4. cap. 155. Alexandro succus corticis radicis sambuci commin-
Paul lib. 3. detur, si in vino potui exhibeatur: quidam etiam ex
cap. 48. iunioribus succu marinae brassicae cum vino, aut sapa,
Alex. lib. seu aqua lactis approbanti (hodie vulgus medicorum
6. cap. 2. soldanam, seu soldanellam appellat.) Cuius usum
 non valde admitto: namque ventriculo mirifice ad-
 uersatur, & ipse pluries experientia vidi noxam in-
 ferre, potius quam auxilium aliquod hydropicis
Lib. 10. ca. praestare, imò quosdam citius perisse obseruavi.
29. Verum (ut Aetio visum est) per interualla longiora
 pharmacis aquam ducentibus omnibus uti conue-
 nit. Nam incommodus est eorum usus, utpote qui vi-
 res ipsas dissoluit, ut ipse inquit. Tutius propterea
 erit per interualla, ac eodem non longiora (ut dixi-
 mus) nostris pilulis uti: quae cum hoc, quod aquam
 ducunt, vires haudquaquam dissoluunt, his vero, quae
 urinam ciunt per modica interstitia utendum est, eo-
 dem Aetio teste, ea sunt trifolium, bitumen olens, si
Que urina
ciunt.
Loco citat.
10. eiusdem drac. j. ex vino praebatur, aut tunc odora-
 ti, nardi, seu asari similiter ex vino decoctum; vel si
 feminis uticis drac. j. ex vino tribuas. Conducit item
 anagallidis capulae succus per se, aut cicurum de-
 coctum, seu feminis hyperici drac. j. ex vino, simili-
 ter si polium, aut sampuchum ex vino decoctum
 bibendum praebatur. Praeter etiam opinionem faci-
 unt vermes terreni cocti, triti ex vino potati, ut li-
Citato lo-
co. quet ex eodem Aetio: vel erinaceum terrestrem ex-
 coriato, eiusque carnem in sole exsiccatam, ac drac. j.
 ex vino tritam praebeto. Toto itaque curationis
Ibidem. tempore aliquo istorum potuum utendum erit, ex
 sententia eiusdem Aetij, qui etiam non parum ap-
 probauit succum solani hortensis expressum, si quo-
 tidie, donec perfecte curentur, cyathum vnum bi-
 bendum praebitis: multam etenim aquam per alium
 ducit. Paulus vero scriptum reliquit, quod stercoreis
 bubuli vsti cochlear ex vino potum quotidie stre-
 nuè auxiliatur. Poteris insuper, & eisdem uti medi-
 camentis, quae pro curatione anasarcae commemor-
Clysteres. auimus. Clysteres etiam adhibendi sunt acres, nisi
 venter sua sponte humescat: tunc enim exsiccare ip-
 sum magis conuenit, ut inquit Paulus, fiat itaque
 ex mercuriali, polypodio, floribus chamemeli, cari-
 cis, & ebullitum foliis, tum radicibus decoctum; cuius
 recipe lib. i. aut. lib. i. s. & in eo dissolue mellis
 despumati, aut mellis rosacei vnc. ij. olei anethini,
 rutacei, vel chamemelini vnc. 4. hierae picrae simpli-
 cis drac. 7. aut diacath. tantundem, vel confectionis
 de dactylis, seu antidoti indi, vel benedictae laxatiue
 drac. 4. salis communis drac. iij. commisceantur om-
 nia & fiat clyster. Interim quoque agarici drac. j. s.
Topica. adiacere poteris. Extrinsecus vero praeter ea quae
 pro curatione anasarcae conscripsimus, quibus etiam
 omnibus tuto uti poteris, cataplasmata adhiberi
 poterunt circa initia ex farina hordeacea, & althaea,
 ac caricis cum aceto nullo composita. Post princi-
 pium autem efficaciora sunt cataplasmata adhiben-
 da ex farina fabacea, lupinorum, & foenugraeci, ac lo-
 tiaceae cum caricis, absinthio, hyssopo, origano, ac
Lib. 10. ca.
25. aceto mulso, ex Aetij auctoritate, aliudque admi-
 randum, & minimè praetereundum (ut ipse inquit)
 ex armentariae bouis stercore, posca, siue aceto mul-
 so quarta parte sulphuris viui inperla conficien-
 dum praecipit. Similiter si stercoreis columbini par-
 tem vnam accipias, & caprini tantundem, & buph-
 thalmi, seu leucantemi similiter tantundem, & tusa

in acerrimo aceto, ac melle coquantur, optimè te-
 rit (ut ipse refert) ad ascitem medicamentum. Aliud
 cui testimonium praebet Oribasius (ut ipse dicit) est,
 Recipe foenugraeci trientem, farinae hordeaceae qua-
 drantem, stercoreis columbini trientem, resinae pin-
 nus siccae lib. j. picis lib. j. cerae lib. j. xungiae veteris
 libr. ij. quae eliquari possunt, eliquato, & ad alia in
 mortario contusa, & cum aceto trita affundito. Si
 vero neque praedictis cessarit remediis, cute com-
 puncta (quam Graeci *παυλίστην* dicunt) pernicio-
 sus humor elici debet, modo, quo Paulus scriptum
 reliquit cap. 50. libri sexti. caueri tamen debet tan-
 quam valde periculosa vniuersa eiusdem euacuatio,
 quemadmodum ab Hippocrate, & Galeno decre-
 tum est aphorismo 27. sexti libri. Ipsa quoque aqua
 inter cutem differentia, quae tympanites vocatur
 purgantia medicamenta, & quae vniuersum corpus
 emaciant, atque etiam, quae urinam ciunt, exiguit. Si-
 militer & quae extenuare, & digerere spiritus fla-
 tuosos possunt, tum intrinsecus, tum extrinsecus ad-
 hibere oportet, Paulo auctore. Etenim verendum
 non est simul cum flatuoso spiritu in hac aqua inter
 cutem differentia serosos quosdam, ac tenues hu-
 mores redundare, qui in flatuosum aërem à dimi-
 nuto colore transmutantur: quinimò vanum est,
 ac intellectu carens, sine vilo humore superfluo la-
 borantem hydropem vocare, Caelio Aureliano te-
 ste. Et propterea eisdem purgantibus medicamen-
 tis pro eius curatione utare, quae pro ascitis curatio-
 ne praecipimus; eisdemque redundantem humo-
 rem praeparantibus, atque etiam urinam ciuntibus.
 Perpetuo tamen praedictis adiciantur ea, quae fla-
 tum dissipant, ut semen feniculi, anisi, cumini, ani-
 mi similiter & praedictis antidotis diacuminum, aut
 dianisum commisceatur. Non temere etiam, & con-
 scriptis clysteribus, in eorum decocto cuminum, et-
 tiam anisum, feniculi semen, ac rutae folia, origani,
 pulegij, seu calaminthae permiscebis, ac furfur. Glan-
 des item magnopere auxiliantur, si ex foliis rutae,
 cumino, ac caricis, exiguoque sale figurentur, vel in
 hunc modum, Recipe mellis disputati ad sufficien-
 tiam, feminis anisi, feniculi, & cumini ana drac. j. a-
 garici, salis gemmae, & pulueris hierae, singulorum
 scrup. iij. misceantur, & fiant balani. Capite vero de
 coli dolore, studiosi reliquos clysteres, seu balan-
 os requirunt, & pro curatione istius affectus utantur.
 Venter etiam quotidie foueatur ex saccellis, qui sic
 componantur, Recipe milij, salis, & furfuris, singu-
 lorum manip. j. feminis anisi, apij, feniculi, dauci, &
 cumini ana drac. iij. foliorum chamemeli, meliloti, &
 foenugraeci ana drac. 4. foliorum rutae, lauri, & pu-
 legij, cuiuslibet manip. s. contendantur contunden-
 da, & fiant saccelli, qui calfacti in latete ignito, vino
 albo inperfo, applicentur, ac saepius iterentur. Cu-
 curbicula quoque leues crebro toti ventri affigan-
 tur, Paulo auctore. Poteris item salubriter uti com-
 memoratis cataplasmatibus, potissimum, si eisdem
 quaedam ex feminibus flatuos discutientibus com-
 misceas, vel in hunc modum ipsum componas, Re-
 cipe farinae foenugraeci, loliaceae, & hordeaceae ana
 manip. j. absinthij, foliorum rutae, cuiuslibet P. j.
 feminis apij, feniculi, & cumini ana drac. 4. feminis
 anisi, ammeos, & dauci ana drac. iij. cum melle, vino,
 & oleo quantum satis sit, fiat cataplasma. Vel iuxta
 Aetij sententiam hunc in modum cataplasma com-
 ponas. Stercoreis caprini recipe sextantem, tantun-
 demq; stercoreis bubuli, & columbini, farinae faba-
 ceae

ceæ ſequiſiſſimam, calamithæ, ſalis nitrî, ſeminis apij, ſeminis dauci, ſeminis fœniculi, & cumini, cuiuſque vnc. j. panis aridi quadrantē, mellis ſequiſiſſimam, terebinthinæ quadrantem, miſce, & vitior. At ſi cum aqua intercutem febris quoque complicitur, admodum calidis auxiliis vtendum non eſt, neque in viſceribus, neq; in cibis, aut potibus, aut antiſepticis, aut purgationibus, vt inquit Alexander. Etenim nullum valde calfaciens ipſos iuuare poteſt. Nam huiusmodi medicamenta ſitim ipſorum augent, & febrem incendunt, & cauſas inflammantes magis adhibere, & ei, quod magis vrget, quatenus licet inſiſtere, vt liquet ex eodem Alexandro. Nec metuendum eſt, vbi febres vehementiores apparuerint, refrigerantia potius tunc exhibere. Nam vbi inuicem copulatur morbi, eatenus habebunt communem curationis indicationem, quatenus copulabuntur, vel nobis ſcilicet ad id quod magis vrget obuiantibus, non tamen alterius cura omnino poſthabita, vel omnibus pari ſtudio auxiliantibus, quemadmodum Galenus commento aphoriſmi 16. primi libri (de eadem aqua intercutem cum febre complicata verba faciens) ſcriptum reliquit. Ea colliquatione item, ſeu reſolutione ſuecorû, qui in venis continentur, eiſdem in ſeroſam ſaniem ſolutis, vbi renes eoſdem trahere non valent, ſubitanei hydropum ſtatus oriri conſueuerunt, venis eiſmodi ſerum in venterem inſertentibus, aut toti corpori id patientibus, vt liquet tertio de cauſis ſymptoma. cap. 2. Verùm de hac nedum ſanguinis, ſed etiam carnis, ſeu totius corporis colliquatione aliàs pertractabimus.

T. vel d. i. c. 1. Id eſt, De diabete.

C A P . X C I I .

QUONIAM triplex erat (vt diximus) in venarum concoctione excrementum, ac triplex quoque inſtrumenta, quæ ipſa expurgant à natura fabricata, cum de duobus iam verba fecerimus, biliſo inquam, ac melancholico, pertractauerimusque de cunctis vitiis, quæ circa eorum ſecretionem, ac inſtrumenta ipſa expurgantia eueniunt, reliquum eſt de eo quod adhuc ſuper eſt excremento verba facere, quod quidem tenue, atque aquoſum exiſtit, Græci *apor*, nos vrinam appellamus, cuncta ſymptōmata quæ circa eius ſeparationem contingunt, ac omnia vitia, quæ inſtrumentis pro eius ſegregatione fabricatis, euenire ſolent, conſcribentes. Conſtruxit etenim natura, quo id à ſanguine ſecerneret renes, quorum vrinæ à ſanguine ſegregantur, atq; illinc per vieteras ad veſicam emittuntur, indeque excernuntur, quo ſcilicet tempore ratio ipſa inſerit (Galeno auctore quinto de vſu partium) quanquam Eraſiſtratus, Aſclepiades, ac Lycus aliter, ſed falſo ſenſerint, vt liquet primo de facult. natur. Circa quam renum facultatem nonnulli affectus præter naturam oriri poſſunt ipſam impediētes, aut deprauantes, in quorum numero (quamvis rariffimè euenire ſoleat, vt apud eundem Galenum liquet ſexto de locis, affectis, namque non niſi bis i-

pfum videre potuit) vnus eſt, qui à Græcis *diaβētis*, petur. 6. de quandoque *d. i. c. 1.*, interim *id eſt, d. i. c. 1.* a quādoq; verò *d. i. c. 1.* *apor* appellatur, Galeno teſte libro ſexto de locis affectis, primo de criſibus, & libro de differentiis ſymptom. Latini verò diabetem, vel aquam intercutem, ſeu hydropem in vas vrinale, interim verò diarrhœam in vrina vocant: etenim prout diuerſimodè affectio hæc conſiderabitur, diuerſa quoque nomina ſortietur. Nam ſi celerem vrinæ tranſitum, ſeu traductionem, diabetem nominabimus, à verbo *diaβaivo*, quod Latine traicio, pertranſeo, ſeu traduco ſonat, ſic nominabitur. Quidam verò ingentem, ac inexplibilem, quæ hunc affectum conſequitur, ſitim animaduertētes, *d. i. c. 1.* ipſum appellarunt, à verbo *d. i. c. 1.*, quod idem eſt *q. i. c. 1.* ſitis. Vnde *d. i. c. 1.*, quaſi vehementer ſitiens dicitur. Alij magnam vrinæ copiam inſpicientes, quam intercutem ad matellam, ſeu vrinæ profluuium nominarunt. Verùm quicquid ſit de eius nomine, nam neque vt idoneum ei nomen imponamus, id ſcrutari animus eſt, ſed vt curationis viam tū ex loco affecto, tū ex ipſa diſpoſitione inueniamus, vt Galenus inquit. Quapropter diabetes nihil aliud eſt (Actio loc. aff. c. 2. teſte ca. 1. lib. 11.) quàm affectio diuturna circa renes conſiſtens multum potum inducens, vnā cum hoc quod quicquid bibitur, ſimul vt acceptum eſt, per vrinas reiicitur. Vt verò Paulo viſum cap. 45. lib. 3. potioniſ tranſmiſſio eſt protinus qualis fuerit aſſumpta. Ex Galeni autem auctoritate eodem libro ſexto de locis affectis. cap. 2. Velox exitus exiſtit per vrinam, ac exuberanter eius quod potatur eſt, eodem à ſua qualitate non mutato. Propterea tum eodem loco, tum etiam primo de criſib. cap. 12. ſimilem dixit eſſe affectum hunc ventriculi, in teſtiorumque leuitati, quod ad tranſitus celeritatem pertinet, poſſiſſimum ei, in qua vehementiſſima quoque excitatur ciborum cupiditas, ac etiam caninæ appetentiæ: nam quemadmodum in his, qui canina vocata appetentia vexantur, in ore ventriculi cupiditate exiſtēte, videmus vt affatim impleri, paulo poſt aut euomant, aut alui fluore deiciant, non potente ventriculo ipſo deuoratorum pondus ſuſtinere, ita renibus quoque accidit ſeroſæ humiditatis cupiditas vnā cum virium imbecillitate, vnde & humiditatem affatim attrahere, ac eamſeinde in veſicā impellere coguntur. Verùm non propterea quod affatim, celeriterque ad veſicam vrina deſertur, ventriculi, aut in teſtiorum præſertim tenuium imbecillitati cauſa referenda eſt, nam ſi ob id, quod potum ſuſtinere non poſſunt ad excretionem properant, quid obſtat, quo minus per ſedem excernatur, quæ admodum in læuitatibus in teſtiorum fieri videmus: tranſmiſſionem item à totius ventriculi partibus ad hepar, non propter hepatis, aut venarum, in lactibus aut ventre, aut earum quæ ab hepate exortæ ad renes tendunt, imbecillitatem fieri didicimus: quinimò iecur ex ventriculo per meſenterij venas (veluti arbores à terra per radices) cibum ad ſefe allicit, eis veluti manibus quibuſdam vtens, quemadmodum ab eodem Galeno libro quinto de locis affectis, cap. 7. & tertio de naturalibus facultatibus cap. 13. ſcriptum eſt. Et propterea abſonum eſt affectum hunc referre ventriculi, in teſtiorum, hepatis, aut venarum, quæ in meſenterio ſunt, ſeu earum quæ ab hepate exortæ ad renes tendunt imbecillitati, neque etiam veſicæ: nam neque ea à renibus vrinam trahit, ſed ipſi per vieteras excernendo in veſi-

*de af.
por. cap. 5.
de facult.
nat. c. 15. 16.
c. 17. c. 18. 2.
Cur diuerſe
modi affe-
ctio nuncu-*

*Que pars
affecta sit
in diabete.
Loco cita-
to.
Ad idem ge-
nerationis
eius.*

*Loco cita-
to.
Dubium.
Solutio.*

*Quis affe-
ctus prae-
naturā sit
diabetes.
cap. vlti.*

*cap. 12.
Que renum
facultas in
diabete ob-
lata sit.*

*Concilia-
tur diuerse
Galenie
sententiae.*

eam mittunt, quemadmodum neque intestina à vetriculo attrahunt, vt patet eodem sexto de locis affectis. cap. 2. Reliquum itaque est postquam renes ipsi, id quod aquosum in sanguine est, ad se alliciunt, vt in hac affectione eorum potius imbecillitas accusanda sit, & non aliarum partium, per quas potus transire solet, ex eiusdem Galeni testimonio præcitato libro sexto de locis affectis. Modus autem generationis eius est, quoniam imprimis renes trahunt sanguinis serum ex venis, quæ cum totum attraxerint, videaturque sanguis in venis huiusmodi humiditate spoliatus, exsiccata tum vasa humorem trahunt ex hepate, deinde hoc ex intestinis, & vetriculo. Cum verò exsiccata fuerint venæ, quæ in ore vetriculi sunt, potum desiderat homo, deinde exhibita potione, venæ ex hepate ad vetriculum venientes, vt pote aridæ totam rapiunt, atque ex his aliæ deinceps, donec ad renes perueniat transfumptio per eorundem attractionem facta. Est itaque diabetes proprius renum affectus, qui caninæ in ore vetriculi cupiditati proportionem respondet, accedente præterea retentricis facultatis imbecillitate, vt pote quæ continere diutius vrinam non valeat, quemadmodum eodem sexto de locis affectis à Galeno decretum est. Atqui obiiciet quispiam, cum infirmi fuerint renes, quomodo fieri potest, vt tam celeriter vrinam ad se attrahant? An dicere possumus ex Galeno, quod quemadmodum in vetriculo quibusdam lientericis vehementissima excitatur ciborum cupiditas, ita in renibus quoque cupiditatem simul oriri, atque hanc ob causam eos vrinam per concauam venam ad se trahere, sed illico ab attractionis impetu grauius censendum est. Vnde licet infirmi fuerint renes, propter ingentem, quam habent serosæ humiditatis cupiditatem, cum assatim attrahunt, ac deinde cum eandem continere non valeant, in vesicam impellere coguntur. Est itaque affectus hic symptoma in genere excretorum immodicæ, vt liquet lib. de differentiis symptomatum, excedens à naturali statu, nedum quantitate, sed qualitate: idque noxam functionum consequitur ipsorum renum. Nanque ad eos pertinere affectionem hanc, supra demonstraui. Verum cuiusnam eorundem renum facultatis læsio fuerit, inquirendum est. Namque Galenus præcitato libro sexto de locis affectis, cap. 2. asserere videtur, tum attractricem, cum etiam retentricem eorum facultatem oblatam esse. Libro verò primo de criticis virtutem retentricem simul, atque etiam alteratricem eorundem renum extinctas, seu ablatas esse in hac affectione asserit, dū dixit. Verum hæc passio talis est, qualis circa aluū læuitas intestinorū, extinctio, vt diceret quispiā vtriusque virtutis, & retentricis, & alteratricis. Deinde post pauca concludit, Idcirco potissimum esse affectum vrinæ profluum, quando duplex est vitium. At si fas est verum fateri, ubique locorum Galenus veritatem conscripsit, nam vt hæc generetur affectio, necessum est, vt ipsi renes assatim humiditatem serosam attrahant, eorum vehemēti cupiditate, præcedere aliàs nulla omnino insignis vrinæ copia ad renes perueniret. Accedit præterea retentricis facultatis imbecillitas, quoniam citra hanc nō tanta celeritate sequeretur vrinæ profluum, quamuis multa copia eiusdem ad renes perueniret, propter cuius facultatis imbecillitatem, cum eam detinere non valeat tanto tempore, quanto indigeret alteratrix facultas pro eius alteratione,

ex consequenti sequitur & eiusdē alterationis ablatio; quo fit, vt id quod biberūt laborantes, exuberanter reddat, eo à sua qualitate nō mutato. Tres denique facultates offensa sunt in vrinæ profluo, attractrix videlicet, retentrix, & alteratrix ipsorum renum. Verum attractrix primo, & deprauatē, quoniam immoderatē attrahit: & propterea similit Galenus hanc renum appetentiam, propter quam attrahunt, cupiditati in ore vetriculi, cum canina molestatur appetentia. Subsequitur deinceps retentricis facultatis noxa, quæ adeo imbecilla existit, vt ablata dici possit. Hanc eandem consequitur & alteratricis ipsorum oblatio, seu extinctio, cuius licet non meminerit libro sexto de locis affectis, in eius tamen verbis comprehenditur, cum dixit, quod infirmi in hac affectione exuberanter id quod biberunt, reddunt, eo à sua qualitate non mutato. Siquis autem inficis ibit, Pauli verba in medium ducens, vbi habet. Origo ipsius ex retentricis renum facultatis impotentia contrahitur, attractricis autem tanto robore, vt totum corpus ob immodicū calorem exhauriat, volens per hæc verba, quod attractrix renum facultas non fuerit in hac affectione oblata, propterea quod eam robustam esse Paulus asserat, dicimus non propterea offensam esse eandem facultatem, quia immoderatē attrahat. Nec propterea facultas simpliciter robusta appellanda erit, cum immoderatē operetur, nanque ianatis incommode ratione consistit, nec Paulus simpliciter eam robustam, ac sanam esse fatetur, imò ægram, & oblatam esse, dum dixit, tanto robore, vt totum corpus ob immodicum calorem exhauriat. Id quod etiam declarauit Aetius, dum ait, Caterum proprius renum affectus diabetes existit, qui videlicet immoderatē humorem appetunt. Nec minus & Alexander idem confirmauit cap. octauo libri noni, inquit, Fit autem ob retentricis renum facultatis imbecillitatem, & propter attractricis robur, quæ ob caliditatem, non humores solum venarum, sed etiam totius corporis immoderatius attrahere compellitur. Comitatur autem eos qui prædicta affectione laborant, pertinax sitis, adeo vt neque vlla satietas ex alio liquoris exhibitione contingat, aliquando & sitis super a sitim inexplēbiliter ægros urget, hoc est, vt assidue potum assumere cogantur, neque tamen satiantur, propterea quod citissimè per forium expellitur potatum, vt idem inquit Aetius. Quod verò subinde bibentes ægri exuberanter quoque reddunt id quod biberunt, eo à sua qualitate non mutato, liquet apud Galenum eodem sexto de locis affectis, cap. secundo. Viscera quoque ipsis vri videtur, anxii sunt, ac animo dubij, & non longè post moriuntur: igne amplius ardere se putant, acceditque sitis, & mictio festina, & quamuis aliquando parumper vrinam retineant, intumescunt lumbi testes, & coxæ. Quod si adhuc amplius mordens caliditas in visceribus augeatur, superior venter corrugatur, & venæ in ipso eleuantur, vniuersum habitum gracilem habent, & tabes totius corporis grauis accedit, quemadmodum idem Aetius ex Aretæi auctoritate scriptum reliquit, præcitato loco. Hæc autem functionum noxa ob immodicam ipsorum renum caliditatem exoritur, quemadmodum ab Alexandro, & Paulo decretum est. Quapropter aduersus hanc vtrique purgandum esse scriptum reliquerunt. Aetius verò vitiosos humores in ipso renum corpore imbibitos affectionem hæc inducere testatur.

Vt verò

Vt verò hi concilietur, asserendum est interim
 abiq; vitiosorum succorum redundantiâ ob calidam
 renum immodicam in temperiem affectionem ip-
 sam oriri, velut Paulus, & Alexander testantur: qua-
 doque verò cum eorum idem humorum præsentia, v-
 bi in renum corpore fuerint imbibiti (vt Aetio vi-
 sum est) qui, aut biliosi, aut pituitosi falsi erunt. At
 si calida duntaxat aderit intemperies, hæud ægre di-
 gnosci poterit, similiter si iam dicti humores in re-
 nibus, aut in vniuerso corpore redundabunt, ex his,
 quæ in præcedentibus sæpius conscripsimus. Reli-
 quum est, vt ad eiusdem prognostica transeamus,
 quorum primum ex Alexandro colligitur, quod ma-
 gnopere attendendum est pro eiusdem curatione,
 nam ob immodicam renum caliditatem, non solum
 humores venarum, verum etiam totius corporis im-
 moderatius attrahere compelluntur, vt ipse inquit,
 & propterea totius corporis siccitas, & tabes diu-
 turnitate temporis necessariò consequitur, potissi-
 mum quia hæc affectio paulatim cum inceperit, in-
 crescit, vt eius principium, & incrementum vix per-
 cipiantur, sed dum ad statum peruenit, adeò vt vi-
 deatur subito aduenire, Galeno teste sexto de locis
 affectis, cap. 2. propterea quòd renum desiderium
 non animale, veluti ventriculi est, sed naturale. Quòd
 verò pessimum sit vitium vrinæ profluuium, quo-
 niam duplex est, ex Galeno constat libro primo de
 Crisibus, cap. 12. etenim quāto plures instrumen-
 torum cuiusque generis actiones, & vires impeditæ
 fuerint, aut ex toto perierint, tantò deterior est mor-
 bus, vt ipse refert. Pro cuius curatione (vt liquet ex
 eodem Paulo, & Alexandro) aduersus immodicum
 renum calorem pugnandum est, refrigerando qui-
 dem partem, & confirmando, contemperando au-
 tem totum corpus, & humectando, quoniam id ne-
 cessario siccum ob largam vrinarum excretionem
 prehenditur. At Aetius qui non nudam voluit
 esse calidam renum intemperiem diabetis causam,
 inquit. Scopus igitur in curationibus nobis sit, vt
 humorum acrimoniam deleamus, sanguinemque, ac
 cum eo permixtum serosum humorem ad motum
 tardiores reddamus, & renum intemperiem corri-
 gamus. Vtunque tamen sit, aer eligatur ad frigi-
 dum, & humidum vergens. Somnus præcipiatur
 solito longior. Exercitium, & immodicus motus
 vitetur, sed quies iniungatur. Alius sit lenis natura,
 vel arte, nam iecur calidius euadens in hac affectio-
 ne, ventrem siccior efficit, dum ciborum humidi-
 tatem attrahit, & exhaurit. Vitæ animi affectus im-
 moderatos, cibi elegantur, qui difficulter conficiun-
 tur, nec liquidi sint (vt ait Paulus) nec facili in vrin-
 am conuertantur, attenuenturque, Alexandro tes-
 te, sintque crassi, bonique succi, mordacitate carē-
 tes, & qui acrimoniam obtundere possint, ac frigidi,
 ex sententia Aetij. In quantitate etiā necessario co-
 piofiores exhibeantur, & crassi, vt perdurare pos-
 sint, ex Alexandri decreto. Propterea inter carnes,
 suillæ macræ, & probè coctæ conueniunt, potissi-
 mum pedes, & rostra, item leporem, & capreolo-
 rum, pedes item vitulini, hædorum, ac castrato-
 rum, caseus recens compactus citra salem, & lac per
 filices, aut ferrum ignitum scissum, seroso humore
 adempto, quæ etiam sorbilia, & ex oleribus intu-
 bum, seris, portulaca, aut lactuca. Inter pisces fa-
 xatiles elegantur. Inter fructus, pyra, poma, mala
 punica: similiter castaneas comedere alienum non
 est, Alexandro teste. Vitæ ad sunt falsa omnia, & acria,

nemòq; in iuscula iniicit aut anisum, aut cuminū,
 aut huiusmodi aliquòd semē, vel ea quæ vrinas pro-
 uocant, ex Alexandri decreto. Potio quoq; his soli-
 ta amplior dari debet, vt neque in totum sitim fieri
 permittamus, sitque eadem frigida, eligaturque vi-
 num rufum, crassum frigida amplius dilutum: nan-
 que vinum corporis micellam ad dulcorem permu-
 tat (Aetio teste) & omnes humores optimos reddit,
 ex Galeni commento aphorismi 56. septimi libri.
 Poterit insuper pro potu exhiberi aqua hordei, ex
 tosto hordeo confecta, aut succus malorum punico-
 rum cum frigida permixtus, vel decoctum myrti-
 lorum, pomorum, seu pyrorum adstringentium, &
 pro sorbitione præparatus succus frigidus, similago, &
 alica ad sorbitionis formam apparatus probantur, ex
 auctoritate eiusdem Aetij. Ceterum mox ubi occu-
 perit malum, nondum ad perfectionem progres-
 sum, optimum est cubiti venam secare, & moderatè
 sanguinem auferre, ex eiusdem Aetij, & Pauli sen-
 tentia. Et ubi in renum corpore vitiosi fuerint im-
 bibiti humores, vtendum est etiam mediocriter vr-
 rinam cientibus, quæ vitium in renes imbibitum
 humorem repurgare possint. Verum si inueteratum
 sit malum, neque venæ sectio adhiberi debet, nec
 quicquam exhiberi, quod vrinam cit, concidunt e-
 nim in inueteratis vires, & ex venæ incisione totum
 corpus acrius redditur, & vrinam cientia in ipsis mul-
 tiplicant malum, quemadmodum maximum huic
 affectioni remedium est, vt statim potatum reuo-
 matur: sit autem perquam frigidus ipse potus, vt li-
 quet ab Aetio, & Paulo. At ubi vitiosi in toto re-
 dundarint succi, quod purgante medicamento
 tendum sit, nemini in dubium venit, eis prius con-
 coctis, ac præparatis ex syrup. rosaceo, myrtino, &
 nymphæa, violaceo, aut eo, qui ex succo boraginis
 paratur, seu oxalidis. Sit autem purgans medica-
 mentum lene, quod bilem, aut falsam pituitam cum
 quapiam alteratione, ac adstrictione expurgare va-
 leat: veluti est mel toridum, cassia fistula, tamarin-
 di, myrobalani tum citrini, tum chebulæ, syrup. ex
 pluribus infusionibus rosarum, saccharum violaceū,
 & interim diacath. Ex his itaque poterit purgans
 medicamentum parari, quibusdam eorum simul
 permixtis, prout usus postulat: materia etiam ipsa
 ad exsudationem diuertenda est: optima verò erit
 (vt inquit Aretæus) in dolio facta euaporatio ad ex-
 sudandum, eo modo, vt caput extra dolium promi-
 neat, frigidumque aerem attrahat, reliquum verò
 corpus omne calciet, in cuius vicem nō parum con-
 fert naturale balneum, quod apud Puteolos repe-
 ritur (balneolum appellatum.) Nam ex eo, nedum
 materia ipsa ad exsudationem diuertitur, verum re-
 nes ipsi corroborantur. Ab ipso autem, & ante ip-
 sum ex aliquo infra scriptorum medicamentorum
 illiniri poterunt renes. A balneo item vnc. i. vel i. s.
 sacchari rosacei cū lib. s. aut lib. i. aquæ hordei prius
 torrefacti, & oxalidis tribuatur, qua curationis via
 huc vsque reliquis ritè adhibitis diuersis in tempo-
 ribus duos perfectè curauit, Excellentem videlicet
 Ioannem Franciscum Carrasam, & magnificum Vi-
 centium Marcellum. At ubi hæc nō suffecerint, aut
 ex calida duntaxat renum intemperie ortum fuerit
 vrinæ profluuium, sanguinariæ succus ex vino nigro
 assidue præbeat, ex sententia Pauli, & Aetij. Simi-
 liter palmularum, aut baccharum myrti dilutum, &
 etiam pyrorum, ac symphyti cremor. Nec minus co-
 ferunt vermes terreni ex aliquo prædictorum suc-

Vene
clio.

Purgatio

Balnea

Que demò
deuoranda
sint.

corum decoctis: syrupo item ex omphacio, è ribes, myrtinus, ex infusione rosarum, & oxalidis succo, seu platanis, vel portulacæ exhiberi poterunt. Similiter pastilli de spodio, vel terra lemnia, seu de succino. Quod si prædicta auxilia frustra adhibeantur, affectioque ipsa augeat, non absurdum fuerit etiam stuporem inducentibus uti, ex Aetij decreto. In quem usum scrup. 2. vel drach. 1. Philonij perfici, seu romani, vel nouellæ theriacæ cum polygoni succo, seu decocto, ac paucio vino nigro præbeto. Extrinsecus autem ad lumbos, seu renes, pectinem, & hypochondrium præsertim dextrum illitiones, vnguenta, ac cataplasmata refrigerentia adhibenda sunt, eodem Paulo, & Aetio testibus. In quem usum ex oleo rosaceo omphacino, præcipue citoniorum, & myrthino, adhuc etenim ex oleo depapauere, seu de nymphæa cum paucio aceto, ac cera illitio confert. Vel hunc in modum vnguentum componas iecori adhibendum. Santalorum omnium excipe drach. 2. succi plantaginis & cichorij, cuiuslibet vnc. 1. olei rosacei, & myrtini ana vnc. 1. s. ceræ, & aceti parum, fiat vnguentum. Renibus autem, & pectini infra scriptum a dhibeatur, quod recipit succi lactucæ, & portulacæ, ac foliorum pampinorum vitis, seu solani, seu vmbilici veneris, singulorum vnc. 1. farinæ hordei vnc. s. gummi tragacanthi infusi in aqua rosacea drach. 3. cremoris seminum citoniorum drach. 4. olei rosacei, myrtini, & de nymphæa ana vnc. 1. hypocistidis, balaustiorum, corallorum rubeorum, & rhubarbii vnc. 1. s. aceti, & ceræ parum, fiat vnguentum. Processu etiam temporis adici poterit papaueris succus, seu hyoscyami, cremor etiam seminum papaueris, & oleum eiusdem. Et si maior cataplasmatibus magis uti, folia recipe hyoscyami, papaueris, solani, ac rosarum singulorum manip. 1. portulacæ, vmbilici veneris, cuiuslibet manip. s. cremoris seminum papaueris, & cotoneorum ana drach. 3. farinæ hordeaceæ p. 1. s. santalorum, & corallorum rubeorum, ac balaustiorum sing. drach. 1. olei rosacei, myrtini, & citoniorum ana vnc. 1. quæ contundenda sunt, contendantur, misceantur, & cum succo solani, seu foliorum vitis cataplasma fiat paucio aceto addito, quibus etiam adicere poteris, ubi hæc non suffecerint, ea quæ magis torporem inducunt, pariter & quæ validius adstringunt. Nec minus, si libeat, poteris ex eisdem emplastra conficere. Infunditur etiam vtiliter eisdem oleum, in quo vermes terreni sint decocti, aut aliquod ex foporisferis medicamentis, ex sententia Aetij.

Id est, De sanguinis renum profluvio.

C A P. X C I I I

QUOD si trifaria sint alimeti instrumenta, ut liquet quinto de usu partium. Nam quædam sunt prima, principalissima, quæ scilicet concoquunt, vilesque alimentum aliis transmittunt, quædam & secunda, quæ purgant, quæ deducunt, & quæ excrementum excipiunt, & tertia sunt, quæ excernendis excrementis sunt destinata, adhuc genere duplicia existentia, ut ibidem patet. Inter ea quæ secundo loco connumerauimus, renes quod contineantur, palam est, sunt etenim instrumenta sanguinem purgantia, id quod aquosum in eo est, fecerentes, ut diximus. Verum cum id non per admodum tenuia, atque porius angusta vasa, velut utraque vesica attrahant, sed per duo admodum magna, ac ampla, quorum

alterum oritur ab arteria, quæ spinæ incubat, alterum à vena caua iure putandum est, id excrementum non purum, atque exactè syncerum trahere, sed diuersi cuiusdam alterius generis admixtione adulteratum, atque permixtum. Nam multum quidem bilis flauæ, ac multum sanguinis, præsertim quod in eo humidius est, ac tenuius attrahunt. Verum biliosi excrementi quicquid non admodum crassum fuerit, cum vrinis permeat, sanguis verò carni ipsum renem aspergitur, instar facis cuiusdam. Inde iam paulatim vaporis modo in tota ipsam inspergitur, adhærescit, vnitur, atque demum alimentum fit renibus. Et propterea, ne cum vrinis per aliquod foraminum, quæ in dictis renibus habentur, quemadmodum tenuis biliosum, ita & sanguis elaberetur, præstitit eorum corpus densum esse: licet id quoque ad facilem huius humidi attractionem conferat, quemadmodum ab eodem Galeno præcitato libro 5. de Vsu partium. cap. 6. & 7. scriptum est. Accidit autem interdum simul cum ipsis vrinis, propter eorumdem renū imbecillitatem, aut aliam quampiam causam, ut idemmet tenuis sanguis elabatur, & propterea tenuis quædam sanguinis sanies mingatur, similis excrementis, quæ in hepaticorum affectu in initio excernuntur, nisi quod magis videtur cruenta. Hanc affectionem Græci *αἱμορρῆαν*, latini sanguinis renū profluvium nuncupant. Quanquam ubi per circuitum quendam (quem admodum ora venarum in ano extantium *αἱμορροΐδα* dicunt) renes sanguinis profluvio laborent, sic etiam appellatur, ut patet ex Paulo cap. quadragesimo quinto, lib. 3. & Aetio, cap. 2. & 3. lib. vndecimo, quinimo si propter rupturam, vel erosionem venarum in renibus consistentium eveniat tale sanguinis profluvium, haud aliter nominandus erit talis affectus, ex eiusdem Aetij testimonio, ita ut quomodolibet qualiscunque sanguis à renibus cum vrinis excernatur, eorumdem sanguinis profluvium nominare licebit. Quod verò renes afficiantur, cum tenuis sanies sanguinis mingatur, ac ad eos attingat hæc affectio, liquet apud Galenum 6. de locis affect. cap. 2. & tertio de causis symp. cap. 2. Horum namque (ut diximus) munus existit, hanc tenuem sanguinis saniem secernere, eaque nutriri: quod si ea non nutriantur, eosdem lætos esse, palam existit. Nec minus, si per circuitus quosdam sanguis profluat, manifestum erit, eum à renibus excerni, eo quod ipsi ægri excreti sanguinis transitum iuxta renem locum sæpe sensu percipiunt, & maxime cum vrinæ admixtus sanguis reperitur, Aetio teste præcitato cap. 3. lib. 11. Quod si contingat propter vasorum rupturam à renibus sanguinem mingi, ex eo quod repente profluat, renes affectos esse diiudicabis, Hippocr. auctore aphor. 78. 4. lib. cum dixit, Quicunque sponte sanguinem mingunt, iis à renibus vena rupta significatur. Ab erosionem verò profluentem ex dolore cum posito liquido renes affectos esse argui poterit. Cunctæ autem iam dictæ differentiæ quatuor symptomata sunt in genere excretorum immo dicuntur toto genere præter naturam, ut liquet lib. de diff. sym. cap. 11. & 3. de causis symp. cap. 2. quanquam ad diuersas renū dispositiones consequantur. Namque si sanguinolentum serum mingatur, eius causa erit dispositio haud abfimilis ei, qualis in icore diximus imbecillitatem esse. Insuper cum ora, aut meatus, vti quæ nominare volueris, per quos ex concaua vena in renes vrina percolatur, supramodum dilatatur, Galeno auctore, eodè sexto de locis aff. cap. 2. admodum tamè tenuis, & aquosus erit sanguis. Si propter renū imbecillitatem

cillitatem excernatur, similis excrementis, quæ in hepaticorum affectuum initio excernuntur, nisi quod tenuis hæc sanies sanguinis magis cruenta videtur, vt sexto de locis affectis, cap. 2. scriptum est. Et itaque cum noxa functionis, tum retentricis, tum etiam alteratricis ipsorum renum: quæ ex aliqua intemperie ortum habebit. Ad morbum itaque in intemperie cõsequetur tale sanguinis profluuium. At si propter amplitudinem osculorum vasorum fiat, vinam ad renes excolantiũ, erit iam dicti symptomatis causa morbus in via, eaq̃e dilatata, idque percipies, quoniam nedum tenuis sanies sanguinis meitur, sed quiddam etiã ex sanguine venæ laxatũ emittunt, & alia itidem crassa, adeo, vt postquam ea quæ micta sunt, confliterint, subditiã quædam in vase reperiatur, & supernè quædam cõcreta, marinum maximè pulmonem similitudine referentia, concoctiorac diltributo cibo in venas, & nihil, aut omnino parũ dolè ægri, cietq̃; lotio leuati melius habent, vt Aetio vifum est; neq̃; vnũersum ora vasorum aperta sanguinẽ effundunt, præsertim cum apertio parua fuerit, sed paulatim, atque tenui ore percolatum, eodem Galeno teste præcitato cõmentopho. 78. 4. libri. Sed mox non ab re queret quispiam. Num inter sanguinis profluvia contineatur hæc serosi sanguinis excretio. Item cum ex vasis sanguis profluat, vel propter eorum rupturam, seu erosionẽ, vel propter refectionẽ, vel *si iam dicitur*, quoniam istorum modorũ hæc tenuis sanguinis sanies profluit? A quoniam diapedesis bifariam oriri contingit: tunica siquidem ipsa vasorum rarefacta, & sanguine tenuato, vel ex gracilium vasorum ore ad aperto, vt liquet quinto methodi medendi, cap. secundo. Dicimus nos, quod vbi fiat ex exiguo vasorum adapertione, tale serosi sanguinis profluuiũ sub anastomosi continetur. Vbi verò propter debilitatem ipsorum renum prædictum sanguinis serum meitur, improprie sanguinis, proprie verò seri profluuium dicitur. Nanque sanguinolentum seruũ est, quod excernitur, ex Galeni sententiã, tertio de causis symptomatum, cap. secundo, quo loco, propter iam dictam causam, sanguinis diapedesin, tanquã quartum genus excretionis omnino excipit, quæ admodum etiam cap. de cruenta spuitione adnotauimus. Sanguis verò per circuitum excretus ab ipsis renibus, non minus symptoma est in genere excretorũ immodicè, ac ad eorundem vasorum refectionẽ consequitur, nec circa initia aderit noxa alicuius facultatis dictorũ renũ, sed ab excretice facultate (quæ admodum per hamorrhoidas fieri contingit) sanguis excernitur. Quapropter circa initia citra vllũ aliquem dolorem expellitur, leuantur ægri propter eius excretionem, & fortiores fiunt. Vbi verò diuturnior fuerit affectio, absq̃; latione retentricis eorum facultatis fieri non poterit. Dignosces autem affectionem hanc, quoniam excreti sanguinis ipsi egri transistunt iuxta renum locum sæpe percipiunt. Item quoniam vrinæ admixtus sanguis reperitur, præcessitque victus ratio multum sanguinem generas, aut consueti alicuius exercitij omisio, seu cuiusdã membri mutilatio, aut quæpiam alia naturalis cruenta excretio præter naturã retenta est, similiter si propter rupturã in renibus sanguinis profluuium fiat, symptoma erit, vt reliqua soluti nẽ cõtinui cõsequens. Erigque is affatim purus, & multus excretus, ac repenit, vt superius dictũ est, seruabitq̃; naturalẽ sanguinis dolorẽ. Cuius causa, & ipsius sanguinis copia

erit, aut propterea quod graue onus leuarit quispiam, seu valde saltarit, aut ex alto ceciderit, vel aliud quidpiam tale violentum pertulerit, vt liquet ex Galeni commen. præcitati aphor. 78. 4. libr. & Aetio præcitato loco. Idem quoque symptoma erit, si per erosionem vasorum renum sanguis excernatur, insequiturq̃; dictorum vasorum cõtinui solutionem, quoniam exulcerationem, seu erosionem. Is tamen sanguis sensim, & paulatim excernetur, dolor renes excruciat, aderuntq̃; alia erosionis, siue exulcerationis indicia. Causam habebit acres succos ex supernis defluentes, vt fusius declarabimus sequenti cap. de vlcere renum. Qui autem propter renũ imbecillitatem, aut eorundem vasorum refectionem, tenue sanguinis serum mingunt, nõ negligẽter tractandi sunt, sed magna cũ diligentia circa initia eos curare oportet, nam temporis progressu extenuantur, & emaciatur omnes, & magis adhuc ij, qui plus sanguinis mixtu excernunt, Aetio auctore. Neque etiam despiciendi sunt, qui per circuitus sanguinem è renibus excernũt. Nã licet in principio, propterea quod citra vllum aliquem dolorem excernitur, nihil in totum mali formident ægri, vbi tamen diuturnior fuerit affectio, & aliquando cohibeatur, quod pro more excerni consuevit, grauitatẽ inducit, aliorũq̃; pelsimorum morborũ causa existit, sanguine nimirum ad alias particulas dilabẽte: quatione articulares affectiones in aliquibus accidunt, aut vertigines, aut deliria, & insanis, aut oculorum cæcitates, vt plurimum verò in malum corporis habitum, & hydropem delabendi aptitudo inde oboritur, eodem Aetio teste. Si verò ob venam ruptam sanguis profluat, quã celerrimè etiã præfidia adhibere oportet: nam verendum est, ne ob nimiam sanguinis copiam excretam, corpus totũ inanietur, ac infrigidetur, & propterea in lipothymiam, syncope, & demum in mortem incidant, aut propter concretum sanguinem, & in grumum versum, si in vesica detineatur, timor est, ne omnino vrina supprimatur, consequaturque etiam animi defectio, & color pallidus ac reliqua praua symptomata, quæ ad grumos vocatos sequi solent, vt apud Galenum 6. de locis affectis cap. 3. At is qui per erosionẽ sanguis meitur, quã celerrimè circa initia curari debet. Nam temporis processu difficilioris curationis existet, quemadmodum cap. de renum exulceratione dicemus. Quantum verò ad curationẽ spectat, similis victus ratio instituenda erit, quã cap. de cruenta spuitione præcepimus. Quod verò ad medicamentorum rationẽ attinet, ea primò conscribemus, quæ cruentæ excretioni per vrinam cõferunt ortæ propter renum debilitatẽ, aut amplitudinem osculorũ vrinas ad renes excolantiũ, licet ex Pauli auctoritate, eis quoque medicamentis vt possimus, quæ ad sanguinis spurum inscribuntur. Qua ratione à principio his conuenit quies, cibi adstringentes, & vinum nigrum in potu, potissimum vbi vires imbecilles fuerint. Ab iis verò quæ vrinam ciũt, & à coitu omnino abstinentum, vt inquit Aetius, maximè verò confert sanguinariæ succus, & radices symphyti decoctum: adhuc tragacanthus in vino nigro macerata, eodem auctore. Item cornu ceruini vsti drach. i. ex vino, aut lapidis hamatitæ drac. i. Necnõ folia salicis trita cum vino, ramentorum loti arboris cremor, & radices spinæ albæ decoctum, vt idem Aetio vifum est. Paulus verò præter symphyti radicem, & tragacanthum vino maceratam, po-

Aetius li.
11. cap. 3.
Si per erosionem.

Prognostica.

Lib. 11. c. 2.

Loco citato. cap. 3.

Curatio si tenuis sanies sit, quæ nis mingatur.

Potiones. Loco citato. cap. 2.

Aetius loco citato.

lygoni, & plantaginis succum cum posca commendaui. Ex quibus item succis cum saccharo syrup. parari poterunt, paucio aceto addito, ac exhiberi, vel in eorum vicem syrup. myrtinus, & de infusione rosarum ficcarum præbeantur, eisdem insuper addere poteris drach. 1. radices symphyti, cornu cerui vsti, aut lapidis hæmatitæ, seu boli armeniaci præparatæ paucio aceto addito, aut prædicti pulueres cum oxysaccharo adhibeantur, & ubi non suffecerint cum prædictis syrup. drach. 1. ex pastillis de spodio, seu terræ lemnis vel de succino addere poteris. Nec minus confert, si cum posca exhibeantur. Extrinsecus autem renibus, & lumbis imponi poterunt ea, quæ ad sanguinis per sputum reiectiones sunt descriptæ, & quæcunque vnâ cum eo quod adstringunt, & resicant, etiam robur addere possunt, ut inquit Aëtius. Cuius farinae sunt rubi folia, myrti, ac quercus, ite myrti bacca, malicorium, & balaustium, & perdicij folia, & similia (vt eadem Aëtio visum est) cum posca, aut vino adstringenti imposita. Ex quibus, ac aliis similibus simul permixtis omnibus, vel quibusdam poterunt etiam topica medicamenta hunc in modum parari. Recipe foliorum rubi, myrti, & quercus, sing. manip. s. malicorij, & balaustiorum ana drach. 3. farinae hordei P. j. olei rosacei vnc. 2. cum posca fiat cataplasma. Aut recipe palmularum in vino adstringenti, aut posca decoctarum vnc. 3. foliorum plantaginis manip. j. gummi tragacanthæ, & succi semperui ana vnc. j. aluminis, acaciæ, hypocistidis, singu. drach. 2. olei myrtini, & rosacei ana vnc. j. s. farinae hordei P. s. fiat cataplasma. Si verò per circuitus quosdam, aut propter venæ rupturam in renibus factam sanguis excernatur, conandum est statim in principio, vt sanetur, impetus cohibeatur. Itaque venæ sectio in cubito commoda est eis, quibus ob venam ruptam sanguis promanat, statim in principio. Iis verò qui per circuitum sanguinem excernunt, paulo ante circuitum adhibita, Aëtio teste; nisi etiam sanguinis impetus vergat, ac cogat, vt cohibeatur. Nanque tunc etiam ipso circuitu vena secanda erit. Caterum sanguinis detractionem partiiri melius erit, vt paulatim eius reuulsio, & diuersio fiat, eodẽ Aëtio auctore. Potiones ite prædictis. Loci autẽ circa renes spõgiis posca imbutis irrigentur, aut linteis cum rosaceo, & aceto, ex eiusdem Aëtij auctoritate, posthæc vnguentis, emplastris, ac medicamentis reliquis, tũ superius, tum cap. de cruenta spuitione descriptis vtendum erit. Et ubi sanguinis excretio cessauerit, diætã vtendum est, vnde non multus sanguis gignatur, maxime in his, qui per circuitum excreuerunt, suntque superne corporis partes assidue exercendæ. In his vero qui ob venam ruptam sanguinem minguunt, si exulceratio in locis relinquatur, aut eadem exulceratio ob acres defluentes humores fuerit orta, & sic ab erosione venarum fuerit ortum sanguinis profusum, ipsam erosionem, seu exulcerationem, post sanguinis suppressionem curabimus, per ea quæ capite de exulceratione dicuntur. Reliquum est, vt priusquam huic capiti finem imponam, emplastrum optimum, ex Aëtio conscribam, quod recipit ceræ vnc. j. s. vitellorum oorum numero ii. palmarum numero io. croci drach. j. (quantum Aëtius plus croci apposuerit) acetati, & rosacei quantum satis est, misceantur, & fiat emplastrum.

Topica.

Locis citatis.

Si per circuitum, aut propter venæ rupturam sanguis excernatur, curatio. Vene sectio, libro citato, cap. 3. Loco citato.

Reliqua medicamenta que competant. Eodẽ loco.

Eodẽ loco.

Περὶ λιθιδένων νεφρῶν. Id est, De lapide renum. C A P. XCIIII.



ON raro autẽ accidit, vt renes ipsi, siue secundum eorum cavitatem, siue substantiam, affectu quodã laborẽt, quẽ propriè Græci νεφρίτιν, siue λιθίαν appellant, quamquam νεφρίτιν quoque nominare consueuerunt, affectum omnẽ rerum, siue similis sit, siue instrumentalis, siue cõtinuis, propriè tamen ipsam intelligendo, nihil aliud νεφρίτις significat quàm λιθίαν, vt patet libro de rebus affectibus dignotione, ac curatione, Galeno ascripto, Latine autem calculi, siue lapidis morbum appellamus, quo morbo ex natura loci, præter ipsos, non nisi vesica laborare solet, & vt quibusdã visum est, etiam colon (Galeno auctore i. de locis affectis, cap. 5.) Affectus verò hic nil aliud est, quàm corpusculum quoddam durum toto genere præter naturam instar lapidis, seu topi, in substantia, seu sinibus ipsorum renum genitum. Percipies autẽ in eo renes affectos esse ex dolore cum positu, qui iugiter in renum loco fixus, ac stabilis infestabit in dextra parte, si dexter, in sinistra verò, si sinister fuerit affectus: similiter è regione affecti renis stupor femoris aderit, nam si dextrũ femur stupor occupauerit, dexter ren, si laeuum, sinister ægrotabit. Nec minùs affectũ renem coniciere poterimus ex retracto teste, nam si dexter testiculus retrahatur dextrum renem, si sinister, sinistrum pati argumento est, idẽmque testis indolebit, Paulo auctore. Id verò nõ nisi propter cõsensum vasorum dorso incumbentium causã scilicet venæ, ac magnæ arteriæ, quibus mediis tum crura, tum testes renibus consentiunt, vt in dissectionibus videre licet, ac liquet ex Galeni 6. de morb. vulg. & libro de renum affectorum dignotione, ac curatione eidem ascripto. Reliqua verò indicia (quoniã & in eiusdẽ cognitione eadem narrabimus. Est namque affectus hic morbus in numero, propriè in excessu, toto genere præter naturam, Galeno auctore libro de differentiis morborum. qui ex qualitate doloris primò percipi potest. Nam grauem in renibus laborantes dolorẽ aculeique infixi instar sentiunt, vt liquet ex eodẽ Paulo. Hipp. verò quod in renẽ dolor adsit grauis potissimum cum cibo impleti sunt, 6. de morb. vulg. scriptum reliquit, per quem dolorẽ duo intelligi possent. Galenus asserit, aut grauem, tanquam alicuius grauis loco incumbentis sensum inferentem, aut acerbum, etenim vt in quolibet verum est in renibus fieri, diuersis tamen temporibus. In calculorum namque creatio, atque exitu grauissimè dolent, reliquo autẽ tempore, vt rei cuiuspiã grauis loco incubentis dolorẽ percipiunt cũ perexiguus nervus præditi sint, quãquã à doloris qualitate renũ calculus cũ impactus fuerit à coli dolore planè discerni nõ possit, nisi quis acciderit, quẽ postea cõsequitur, expectauerit, vt liquet 2. & 6. de locis affectis. Excitatur autẽ dolor hic in renibus, vt Hipp. visum est, eo potissimum tempore, quo ægri cibo replentur, quod cõquã per cibũ significetur, cũ duo in eius doctrina significare possit, assupta videlicet cibaria, ex quibus sanguinis multitudo creatur & alimẽti recrementa, quæ in intestinis colliguntur. Gal. auctore, eodẽ 6. de morb. vulg. Inter initia quocunque pituitosi vomitus fuit per peritonẽ ipsi copulato vetriculo, in quo huiusmodi succus creatur, potissimum si crassi, naturaque pituitosiores extiterint laborantes. Verũ ubi increuerit, pseueraueritque affectus,

ita patientibus vomitus aruginosus superuenit ob dolores, ac vigilias corrupto sanguine (vt Gale. inquit) idque maximè cum vnà febricitauerint, & inedia macerati fuerint. A quibus vomitibus leuiore agri euadunt cum cibi euacuat sunt, & ab accelsionibus quidem liberantur, sed nō ab effectu, eodem Gale. teste, arenulæ quæ rubæ subsident, & cruentum meium hæc ex Hipp. Cruentum autem meium, nedum propterea quod cum angulosus sit egrediens calculus, proximas particulas vulnerat, & cruorem euocat, verum etiam quoniam si patetior fiat meatus ex vena caua in renem pertinens, vt præcedentibus cap. docuimus, sanguis autem liquidus sit, neque multus, neque viscidus, cruentum quoque ita lotiū reddetur, vt eodem 6. de morbis vulgaribus, Galenus scriptum reliquit, quamquam nephritici ab initio dilutas, purasque reddunt vinas, deinde sequentibus diebus crassum aliquid in ipsis subsidere videtur, demum omnino arenosæ minguntur, vt 6. de locis affectis à Galeno scriptum est, lapide verò cum vrina exeunte, & à dolore liberantur, & simul locus affectus manifestabitur, nullusque relinquetur questionis locus, vt idem Galenus inquit, nunquid videlicet coli, vel renum partes affectæ fuerint. Vt verò Aetio visum est, in prædicto affectu accedit ægris loci dolor, tumore nusquam foris apparente, nisi inflammatio per lapillos producat, spina egre flecti potest, & totum corpus admodum pigrum est, crura torpent, & maximè crus reni affecto propinquum: vrina circa obturationis principium paucæ, aquosæ minguntur, postea verò perfecta earum suppressio contingit; alius nihil excernit: verum promptitudines multas ad egerendum facit: excernitur etiam aliquando sanguis propter violentiam calculorum, præsertim asperorum. Cæterum vbi lapis in renibus fuerit emorus, & ad vesicam delatus, vrina multæ prodeunt arenosam subsidentiam habentes, & alius similiter largè egerit. Sensum autè æger percipit veluti calculo à renibus ad vesicam transiit. Quibus verò indicibus renum dolor à colidolore secernendus sit, à Gale. præcitato libro 6. de locis affectis. cap. 1. decretum est, & nos cap. de colidolore fusiùs cōscripsimus. Reliquū est vt eiusdē calculi causas, materialem potissimū, ac efficiētem reperiamus. A materiali exordientes, hanc crassum, terreūque humorem esse à Paulo præcitato cap. 45. 3. libri decretum est. Quod verò calculi originē ducant ex materia crassa, ac tenaci, modo crassitudinem maiorem, modo tenacitatem, ac modo vtrāque paribus portionibus habēt, eodem 6. de morbis vulgaribus testatur Galenus, & libro de renum affectorum dignotione, ac curatione: quamquam etiam ex purulento humore, aut ex purulento, pituitosiorēque composito (quemadmodum & in articulorum morbis euenire consuevit) nonnunquam topi in animalis corpore creati possint, ac similiter in renibus lapides concrefcere, vt idem Galenus testatur. Vbi autè ex sola pituita crassa, & viscida calculus fuerit ortus, vrinarum subsidentia similis color aliorum topiorum, qui in aquis sponte calidis, multis in regionibus, lapidibus adnasci, accrescere que cernuntur, cinerei erit coloris. Verum vbi parum sanguinis cum pituita crassa, & lenta mixtū sit, vrinarum subsidentia color pro succi maiori copia euadet: nonnunquā veluti ex palido, albōque mixtus, aut ex rubro, & albo, aut ex flauo, & albo: nonnunquam verò & rufus erit, pariter quoque & arenulæ

quæ in vrinis subsident, ipso siquidē sanguinis colore ad colorum differentias faciente, qui neque hominibus exquisitè ruber semper est, sed interdum quidem ad atrius, interdum ad flauius, & rufius vergit, eodem Galeno teste: quo fit, vt & ipsi etiam lapides inter se colore reperiantur differentes, similiter & arenulæ in vrinis subsidentes ob diuersam materiā, ex quibus fiunt: nigri enim, & subalbidi, & pallidi reperiuntur, vt inquit Aetius, quādoque etiā & rufi reuera, id quod sapius accidit: & propterea Hippocrates arenulas rufas in vrinis subsidere asseruit, tanquam eo sæpius contingente: quāquam per rufum colorem potuit omnes iam dictos intelligere præter cinereū, vt testatur Galenus. Non ab re itaque Aetius materialem causam generationis calculorum assiduas esse cruditates inquit, vnde materia incocta, ac cruda multitudo congregatur, & Alexander simul cum Galeno, humores crassos, ac lentos esse fatetur, cap. 4. libri 9. quādoque solos existentes, interim exiguū sanguini permixtos. Effectrix verò eorum causa est ignea renum caliditas, vt inquit Alexander & Paulus, seu ardor circa renes, vt fatetur Aetius. A frigore autem ipsi generari non valēt, namque fieri non potest vt viuo corpori tantum frigus accadat, quo cōcrefcere valeat in homine lapis, quemadmodum fieri in externis videmus, vt liquet eodem libro de renum affectorum dignotione, ac curatione: quamquam non semper ex eodem calore, sed quādoque vehemēti, interim autem nō ita vehemēti procreantur, prout eorum materia magis apta est vt induretur, ob quam etiam caliditatis diuersitatem lapides quoque colore differūt. Locus autem generationis eorum renes sunt, ac (vt quibusdam visum est) in eorū duntaxat cavitatibus cōcrefcunt. Verum nos cum Hippocrate & Gale. tum libro 2. de natura humana, tum 6. de morb. vulg. ac libro de renum affectorum dignotione, ac curatione, absque controuersia tenemus eos, nedū in renū sinibus posse concrefcere, verum etiam & in eorum carnibus procreari. Et quod quocunque loco generationem habeant, in renem adsit grauis dolor, siue per grauem acerbis significetur, siue tanquam alius grauis loco incumbētis sensum inferentē intelligamus, diuersis tamē temporibus. Nam si in renem caus fuerint orti, in solo per vrinarios meatus transitu grauissimè dolent laborantes. Si verò in ipsa renū carne fuerint creati, nō solum inter excundum, verum etiam creationis tempore dolorem inferunt. Pariter & quando in renum sinus peruadūt. Modus autè generationis talis existit. Nam cum renes quicquid lerosi, tenuisq; cum sanguine in vasis permixtū est, ad seipsos attrahant (vt superius demonstrauimus) meatibus id in renum vetriculos percolantibus latius patefactis, aliquid etiam ex crassioribus succis simul illabitur. Quando igitur istud calefactum in renis cauo, ad topi contentitiam redactum fuerit si renum vis expulforia omne id vnā cum lotio obstruxerit, arenosæ in ipso subsidentia fiunt. Quod si renis cauo impactum tenaciū inherescat aliquid aliud eiusdem materiæ ex vena caua suscipiens, sibi que apponens, plus augetur: semper enim quod recens influit, priori circūcūdatur, atque ita insigni magnitudine topus grandescit, exulto, arefactoque crasso, & viscido humore, atque ad topi corpulentiam redactō. Cum verò in renum carnibus generantur, proportionē topis in articulorū morbo genitis correspondēt, vt

Loco citato.

Effectrix causa caliditatis.

Loco citato.

Qua parte renum caliditatis generantur. 2. de nat. hum. sex. 18. 6. de morbis vulg. & lib. de ren. affect. digno. locis citatis.

Modus generationis calculi in renibus.

*Loco cita-
to.*

*Paulo post
principium*

*Prognosti-
ca.*

*Loco cita-
to.*

*Commēt. 3.
Comm. 15.
Aët. loco
citato.*

Curatio.

*Vitæ ra-
tio.*

*Commēt. 1.
comment. ci-
tato.*

*Aët. lib.
11. cap. 6.
Loco cita-
to.*

*Commēt. 3.
comm. 15.*

liquet ex Galeni Hippocratis auctoritate 2. de natu-
ra humana, & 6. de morbis vulgaribus. Nam si idem
sanguis, qui in renes derimatur crassior, ac pituito-
rior seipso existens, seu etiam ad atram bilē vergens
per venas, & arterias in renem substantiam feratur
quantitate, vel qualitate, aut consistentia excedens,
adstringitur, detentusque, concipit qualiditatem pre-
ter naturam, quæ amplius eum densat, agglutinatur,
& assat, assatumque ipsum in terram, & lapidē com-
mutat, quemadmodum si in cavitatem eorū delatus
esset (vtrique etenim modō lapides fieri posse in re-
nibus clarū est) cum succus tenax, & crassus tempo-
re aliquo assatur in iis, atque exsiccat, ut eodē lib.
de renum affectionum dignotione, ac curatione scri-
ptum est. Talis itaque est calculi in renibus genera-
tio ex humoribus crassis, & viscosis, tãquam ex ma-
teria, & ignea eorum caliditate tanquam efficiente,
veluti etiam in externis videmus. Nā ex igne, & tali
materia idonea figuli omnia vasa cōficiunt, ita ut ne
ab aqua quidem vnquam dissolui possint, ut inquit
Alexan. Affectus hic inter initia magna cum dilige-
tia curari debet, nanque vbi perseverauerit, ac ma-
gnopere increuerit ob dolores, ac vigilias sanguis
corrumpitur, & aruginosus vomitus superuenit (Ga-
leno auctore.) Vel magnum imminet periculū, ne
vires à vigiliis, & constanti dolore deficiatur, ut in-
quit Alex. Quod verō in adultis, ac in declinante po-
tius ætate magis, quā pueris renum hic affectus cō-
tingat, idem Gale. testatur 6. de morbis vulga. quē-
admodum vesicæ calculi pueri frequentius quā
ætate proeucti, ut fatetur Aëtius: idque non nisi ob
diversitatem caloris, qui in adultis crassos succos co-
git, atque inspissat, in pueris verō fundit, atque dis-
soluit, quemadmodū fusiū cap. de lapide vesicæ de-
clarabimus. In renibus verō consistunt lapides aut
parvi, aut maiores, & aliquando quidem pauciores,
aliquando plures magnitudine inter se differētes. Ex eo-
rum autē numero rotundi, & leues faciliē excernun-
tur, non item qui alia quacunque forma præditi sunt,
maximè tamen oblongi, & asperi difficulter excern-
untur, Aëtio teste. Pro curatione aër eligatur purus,
ac temperatus, somnus quoad fieri potest conciliā-
dus parū consueto longior, quies vitanda: est enim
desidia valde noxia, deambulationes autem, & exer-
cicia mediocria cōveniunt, quæ pro ætatis, habitus,
roborisque ægotantis ratione corpus exercere va-
leant. Nam magnæ exercitationes non conveniunt,
veluti equitationes, aut armis, aut lucta, aut pan-
cratio certare, aut humum fodere, aut id genus aliud fa-
cere, Galeno teste eodem sexto de morbis vulgari-
bus. Sit alius soluta assidue, modō ne instet aliud
quidpiam, cum nanque hæc probè excernit, urinæ
profluent liberè. Ab immodicis animi affectibus ca-
veant, præterquam quod irascantur interdum. Mo-
deratus autem cibus, & bonæ concoctiones præci-
pantur, facietates enim, & cruditates nō solum ex-
asperant morbum, sed etiam (cum non adsit) gene-
rant, ut liquet ex eodem Aëtio: etenim non imple-
ti cuiusque ætatis, & corporis habitus cōmune docu-
mentū est, Galeno teste. Cibi itaque eligantur, è qui-
bus neque fatietas, neque cruditates contingant. Ca-
uendum propterea ab his, qui durā substantiam ha-
bent, ac agrè concoquuntur, à casco præsertim: nam
qui frequentius eo vescuntur, lapides in renibus eis
suboriuntur, Galeno auctore. 6. de morbis vulga. Si-
militer etiā abstinentiū est & ab omnibus artibus,

dulcibus, crassis, tenacibus, ac pinguibus. Quapro-
pter pituitiā, vel eius cremorē adhibere cōvenit, vel
gallinarū, seu pullorū, sternarū, vel phasianorū ius,
aut in eorū iure panis maceratus tribuatur, & vbi vi-
res requirunt, confusa caro gallinarum, seu pullorū
præbatur. Vinum autē sit admodū tenue, & albū
non valde vetus: dulcia verō, & nigra vina vitanda
sunt, tãquam calculosis inepta: sit autem aqua lym-
pharum purissima, & purgata, atque decocta. Et vbi
renū hic affectus subito inuadat, & qui laborat, ci-
bo nuper refectus sit, cibique adhuc sint incocti, aut
semicocti, aut omnē aliā curationē pro doloris mi-
tigatione, (nisi quicquā impedimento sit) vomitum
prouocare expedit, ut eodē libro de digno. & curat.
renū affectionū scriptum est. Nam leuiore quidē à
vomitibus euadunt ægotantes, Hippoc. & Gale. tes-
tibus præcitato lib. 6. de morbis vulgaribus, quo-
niam ab accessione, sed nō ab affectu liberantur,
cum cibus vacui sunt, ut Galenus asserit: quia item ra-
tione, ex eiusdē Galeni sententia, & alimentis recre-
menta, quæ in intestinis colliguntur, sub cibi nomi-
ne comprehenduntur, cōfestim euacuari debent per
idoneos clysteres, modō nihil obster: idque omni-
bus calculosis cōmune est, etiā si dolores paulatim
irruant, & non repente incidunt, qui ex fursurū de-
cocto caricarum, sœnugræci, ac aristolochiæ parari
debent, ut inquit Aëtius: & si quidē deceter euacue-
tur, sinere, si verō non, etiam bis, aut ter infundere,
quibus adiacere poteris olei cōmunis vnc. 4. mellis
rosacei vnc. 2. ac salis cōmunis parū. Vel ex malua-
rum, althææ, mercurialis, ac betæ foliis, caricis, ac
fursure decoctū paratur paucō sale addito. Cui ad-
dicias olei cōmunis, anethini, vel chamemelini vnc. 4.
mellis rosacei vnc. 2. s. pulpa calsiæ nouiter extractæ
vnc. j. Et si ex his aliud non sufficienter excreuerit
vnc. s. diacath. aut hierę picræ simplicis, vel dra. 3. cō-
fectionis de dactylis, seu electuarij indi adicias, nec
minūs & vnc. i. butyri recentis, aut adipis asferini.
Cæterum vbi vter sufficiēter excreuerit, quēdā in-
fundere oportet, ex eiusdē Aëtij præcepto, quæ cor-
pusculorum circa lapidē sitorum inflammationes le-
nire, & laxare possunt: id ipsum verō oleum an ethi-
nū facere poterit adipe gallinaceo recenti in eo eli-
quato, seu asferino, aut etiam butyro; quæ si nō ad-
sint, etiam sœnugræcum, & althææ radicē oleo de-
coctā infundemus. Et vbi lapis in renibus adeo fue-
rit obturatus, ut vehemētissimos obtulerit dolores,
si quid aliud non prohibeat, vena cubiti propinquæ
manus in corpore ex repletionē affecto secāda est,
ex Aëtij testimonio. Nanque eis qui sanguinis mul-
titudinem congregarunt, hæc venæ sectio cōmoda
existit, ut ipse inquit. Hippoc. verō libro 6. de mor-
bis vulgaribus, cum opus fuerit, iuuenibus præser-
tim popliti venam incidere iubet, vbi sanguis mul-
tus, aut crassus in venis abundet, ut Galenus inquit.
Nā (ut ipse asserit) mēbra supra secur cubiti venę sec-
tionem postulat, infra verō crurum in poplitibus
videlicet, aut omnino saltē iuxta malleolos. Libro
autem de renum affectionum digno. ac curat. hæc op-
positæ sententiæ conciliantur. Scriptum nanque
ibidem est, quod vbi valida fuerit virtus, venam
quæ in poplite est aperimus, vel quæ ad malleolos;
sin imbecillis, venam, quæ est in cubito. Nam si
virtute debili infra euacuabimus, retentrix facultas,
quæ est imbecillis non retinebit, sed vniuersa in
præceptis rapietur, & partem assiduo deflexu im-
petet, succis videlicet in locum imbecillum
perpe-

Propria
cap. 18.Medicame
tu purgans.

Loco citat.

Loco citat.

A purga
tione, que
medicamen
ta adhiben
da sunt.

perpetuo procumbentibus. Sed cum perpetuo ve
na sectio in Hippoc. & Gale. doctrina virium ro
bur exigat, non video eisdem imbecillis existenti
bus cur vena secanda sit etiam, que in cubito existit.
Propterea cum eodem Gale. lib. de curand. rat. per
venge sectionem, sic de ea sentire, ac iam dictos au
ctores conciliarem, ait nanque ambiguum esse num
renes partibus superioribus, an inferioribus ascribi
debeant; & propterea eis affectis, neque perpetuo
in cubito secta vena, neque etiam in poplite, aut mal
leolis iunantur, sed ubi reces fuerit phlegmone, co
piam sanguinis affuerit, vena cubiti secanda est: qui
bus vero affectio inest, quam proprie nephritim no
minant, eam que in poplite est, secare expedit, aut
certe quae in malleolis sunt. Reuulsiois itaq; gra
tia, ubi copia sanguinis affuerit, & timor ne ex inge
ti dolore phlegmone exciteretur, Aëtius venam cubiti
propinqua manus secari iussit, ut ex eius verbis pa
tere poterit. Hippocra. vero euacuauonis gratia, cum
reuulsione, seu deriuatione, ubi sanguis multus, aut
crassus in venis abundet, cum eundem fursum reuel
lere promptum non sit, sed magis expeditum per in
feriores partes euacuat, seu per conuenientiore
regione, qua maxime natura vergit (ut sui moris est)
poplite venam secare praecepit a directo, videlicet
affectu renis, cum rectitudine perpetuo seruandam
esse iusserit. Verum quaecumque vena incidatur, mul
to minus euacuandum est, quam ipsa repletionis co
pia exposculetur, neque enim (ut inquit Aëtius) futurum
speramus ut omnino cito è renibus excidat lapis,
praesertim si magnus existat. Quare seruari oportet
sanguinem in eam, quae cum tempore futura est in
corpore expellam. A vena sectione, ubi etiam vitio hum
ore agri abundant, purgans medicamentum,
quod abundanti humori conueniens sit praebendum est,
neque omittendum hoc est, nisi aliud quippiam id fieri
prohibeat, notissimum namque est (ut inquit Galenus
eod. 6. de morbis vulg.) quod si vtroque auxilio ho
mo indigeat, a vena sectione incipiendum est, quon
iam si per sanguinis missionem corpus prius vacuatum
fuerit, purgans medicamentum exhibitum venas, &
arterias, & inanes corporis regiones inuenit non op
pletas, quo fit ut absq; villo impedimento in totum
corpus permeet ad attrahendum succos, facillimeq;
fiat eorum euacuatio per vasorum spatia & fusione,
renuitatemq; succorum. Nam si vasa sanguine repleta
sint, & purgans medicamentum dederis, non poterit
propter plenitudinem in corpus differri, unde fit, ut
subit, & nihil efficiat, aut si quicquam facit, male fa
ciat, ut liquet libro de renu affectu dignotione,
ac curatione. Pariter ubi sanguinis multitudo non
affuerit, sed vitiosi duntaxat humores redundarint,
eisdem purgatio apta est, citra vena sectionem pro
ratione redundantis succi. In quibus vsum bile redundate,
mel roridum, seu casia fistula praebatur, aliis vero
crassioribus redundantibus succis, ut pote bile atra,
vel pituita, praedictis diacatho, aut confectione de
dactylis, & puluerem hiera simplicis adungere po
teris huc in modum. Pulpa calis recipe vnc. 1. s. vel vnc.
2. diacatho. drac. 7. vel confectionis de dactylis. dra.
4. pulueris hiera simplicis, & pulueris radice gly
cyrrhizae ana drac. 1. fiat bolus vel parato decocto ex
eadem radice glycyrrhizae, floribus cordialibus, vna
passa, & sebesien, in eo vnc. 2. vel vnc. 3. s. rotidi mel
lis, & drac. 6. diacath. vel drac. 3. confectionis de da
ctylis dissoluas. Toto aut corpore expurgato quae
laxare meatus, ac renum corpora mollire valent me

dicamenta adhibenda sunt, fonticulis utens ex deco
cto foliorum maluarum, foliorum, & radice althaeae,
florum chamaemeli, fenugraeci, seminis lini, & radi
cis graminis in hydrelao, & cum spongiis saepius lu
pra affectum renem adhibeas. Ex eisdem quoque infu
sionibus parari poterunt. At omnium (ut inquit Ale
xander) optimum est balneum, ut quod non solum mi
tiget, sed etiam curare possit, id vero ex dulci aqua
fiat, aut ex hydrelao dolore adhuc vehementius in
festante, & renu regio, ac lumborum iungatur. Infa
scripto vnguento, quod recipit olei chamaemeli, vel
anethini, & amygdalarum dulcium ana vnc. 3. s. adipis an
seris, vel gallinaei, & butyri rectis ana drac. 3. ge
ra quod satis sit, fiat vnguentum, interim adiutensio
leum quod ex scorpionibus paratur, aut ex eodem cu
recenti butyro, & oleo amygdalarum dulcium, ac ce
ra, vnguentum fiat. Post fomenta vero incisiones,
ac balnea adhuc cataplasmata conueniunt. Inter quae
hoc primo vitare, farina tritici recipe, seminis lini, &
fenugraeci, cuiuslibet manipulum 1. olei anethini,
vel chamaemeli, & amygdalarum dulcium ana vnc. 3. s.
mellis vnc. 2. resinae terebinthinae vnc. 1. radice al
thaeae contusa dra. 4. misceatur arte, & fiat cataplas
ma, prius praedictis farinis in modo dicta decoctio
ne decoctis, optimum quoque cataplasma fiet ex lupi
norum farina, hordeacea, ac seminis lini in aqua, &
oleo decoctis. In decoctione autem althaeae ac peuce
dani radice, ac chamaemeli admisceatur. Bonum est
etiam (ut inquit Aëtius) panem passo decocto circa
lumbos, & ventrem imponere, neque tamen erit ab
surdum, peccunia, ac vesica eadem vnguenta, ac cata
plasmata adhibere, & ne qua primum frigescat, ca
lesfactorio extra ea contingere oportet, id quod co
mode fieri potest per sacculos ex milio, fursure, ac
floribus chamaemeli paratos, ac in latere paucis vino
insperso calfactos. Conducunt etiam non parum cu
curbitula absq; incisione adhibita, quae saepe lapi
dem celeriter adeo transferunt, ut subitam eius ma
li leuationem comparare possint, lapide nimirum in
locum ampliorem translato supra a renibus initium
facientes ad inguina per obliquam eandem par
tium (quas ilia appellant) positionem procedentes:
quo loco frequenter dolores incedunt propter situ
meatu, qui veteres appellantur: quemadmodum libro
de renu affectu dignotione, ac curatione, & ab
Aëtio scriptum est, quaequae ea, quae vias dilatant, ac re
nes laxant, non immodice adhibere conueniunt, na
que emollitio, & laxatio virium robur exoluit, sed
tantisper eis vtendum est, quantisper eis lapis in re
ne haeret. Cucurbitulas item iam dictas, ubi dolores
vehementius infestant, adhibere non conuenit, sed
ipsis aliquantulum lenitis, & inflammatione non im
pediente, ex eiusdem Aëtii sententia, quo etiam tem
pore ea quae vrinam cient, ac lapidem frangunt, ex
hibere tempestiuum est. Etenim transmoto lapi
de, & ex sede agitato dolores quiescunt, ut ipsemet
testatur Aëtius. Quae vero calculosis auxiliantur, vi
nica facultate indigent, quae secare, & absterge
re cum manifesta caliditate potest, Galeno teste
10. de compositione medicamentorum secundum
loens. Talia autem sunt omnia fere amara, ut ipse
inquit. A valde tamen calidis, ac diureticis om
nino abstinendum est, praesertim a longo, eb
rum vso. Nam effectricem calculorum causam ad
augent dum renes intemperatos, igne solue per
caliditatem reddunt, ut prompte alios aslare cal
culos possint, licet factos comminuant, Ale

Lib. 11. c. 3.

Locis cita
tu.Quo tem
pore vrinā
cient, ac
ea quae la
pidem om
minuit ex
hibenda sunt

cap. 1.

xandro teste. Admodum itaque calida, ac acris me-
 dicamenta studiosè vitari debent, unde calculosis
 quæ valde calfaciant dari nullo modo conuenit; vt
 liquet 6. de sanitate tuenda. Quod si necessitas te
 cogat eisdem vti, semel, aut bis eis vtare; & demum
 desistere ab eis debes ex eiusdem Alexandri testimo-
 nio. Quæ de re extenuantibus, ac incidentibus citra
 magnum calorem vtendum est, sed quæ tepidam (vt
 ita dixerim) facultatem habeant. Hæc etenim pau-
 latim citra noxam lapidem comminuunt, nec eum
 duriores reddunt. Sed hæstaret fortè aliquis, si cu-
 ratio quælibet per suum contrarium efficitur, quo-
 modo lapidem possint comminuere quæ tepidam
 facultatem habent, cum à calore fuerit genitus? Cui
 respondebimus nos, quod etiam calculus ab intem-
 perie, & valido calore sit factus, ob id meritò exhi-
 bemus quæ tepidam facultatē obtinent, vt quæ con-
 traria his sint à quibus lapis est effectus, si quidē te-
 pida seu minùs calida sunt valde calidis contraria,
 vt liquet eodem lib. de renum affectionum digno-
 satione atq; curatione. Hæc itaque medicamenta, quæ
 minimum caloris possident, callosos seu tephaceos
 consistentias incidere sunt idonea, Galeno auctore
 5. de simpl. medic. facult. veluti sunt radices regionū
 asparagorum, & rubi, & betonica, & posium, ac ace-
 tum scillinum, & vitrum combustum, & quæ eius ge-
 neris sunt, eodem teste. Præter hæc autem à Paulo
 graminis radix, adiantum, althææ semen, sponsia-
 rum calculi, cicer nigrum, seu eius ius, phumion, asar-
 on, carpesion, & saxifragia commendantur. Sion
 vero, & scolyini radix, atq; erysimus, & potu pro-
 sunt, vt idē Paulus testatur. Alexan. verò cardui de-
 coctum cum apio, seu etiam decoctum radices quinq;
 folij cum oxymelite tanquam valde efficax comen-
 dat in vicem autem quinque folij eryngij decoctum,
 aut erysimi præbet. Similiter & radices graminis, &
 plantaginis radix, & folia, atque semen, ius cicerum,
 viticis semen, & amygdala ab eodem commendā-
 tur. Præter hæc etiam peucedani radix, atque ipsa ra-
 dicula, paliuri semen, & tribuli decoctum, radix cy-
 peri althææ semen, & radix, rumicis domestici ra-
 dix, & vermes terreni cocti approbantur, quorū sin-
 gula partim decocta, partim tenuissimè trita præ-
 beto bibenda, vt ipse refert. Vbi verò hæc non suf-
 fecerint, ad valentiora medicamenta transire oportet,
 quæ (vt Aetius fatetur) communia etiam sunt &
 calculosæ vesicæ remedia, inter quæ sunt præcipua
 lapis iudaicus, cicada sicca sine pennis ac pedibus
 cōrūsa, ac hircinus sanguis inarefactus, qui præexi-
 stentes lapides soluit, atque ita per lotiū excerni eos
 facit, vt etiam alij amplius non gignantur, præterea
 dolorem sedat, Aetio auctore. Quomodo autem is
 parari debeat, ab eodem auctore cap. 12. lib. 11. scri-
 ptum est. Accedunt adhuc alia, quæ à tota substantia
 magnopere conducere videntur, inter quæ passer-
 culus quidam inter sepes & murum victum quæritas
 troglodites appellatus ab Aetio, & Paulo conscri-
 bitur, cuius descriptio ab eodē Paulo cap. quadrage-
 simo quinto, lib. 3. & Aetio e. 11. lib. 11. scripta est. Hic
 sale conditus, & in cibo crudus acceptus; morbum
 perfectè sanat, in posterumque generari prohibet.
 Conditur autē, ac diuersis modis præparatur, quem-
 admodum ab eisdē auctoribus in prædictis locis seri-
 ptū est. Aetius itē hoc etiā medicamentū, tanquam
 efficacissimū scriptū reliquit. Leporis pellē in illu-
 lam conice, & in furnū demitte; atq; vbi vsta fuerit,
 vt probè cōteri possis, acceptam tere, & ex ipsa co-

Lococitato.

chlearium vnū cū vino ieiunis in folij aquæ calidæ
 insensu præbeat; asplenij quoq; decoctum (quod vul-
 gus ceterach nominat) cū oxymelite non parū con-
 terit; nam & ipsum lapides frangit, Galeno teste sex-
 to de simplicij medicamentorū facultatibus. Vlti-
 mo loco nostram, quo vtitur, puluerem cōscribe-
 re libuit, quo perpetuò vsus sum, & præter id, quod
 nullā noxam affert, misce lapidem cōminuit; re-
 cipit autem feminis althææ, & violarū albarum, sin-
 gularū grana quinq; lithospermatis, & radices gly-
 cyrrhizæ ana scrupul. s. lapidis iudaici, & sponsiæ,
 cuiuslibet grana tria, pulueris ossium dactylorū, de-
 rasorum, & mespilorum ana scrupul. seminū melo-
 num drach. 4. fiat pulvis, cuius drac. 11. pro qualibet
 vice cum vnc. 2. vini albi aquosi aut oxymelitis, aut
 3. decocti asplenij in aqua parati, ac exiguo aceto
 addito tribuatur. Interim verò corporibus, præser-
 tim natura frigidioribus, feminis apij, asparagorum,
 cinnamomi, ac saxifragiæ, cuiuslibet grana septem
 adiacere poteris. Vbi verò doloris vehemētia, ac vi-
 gilæ infestauerint, & magnum vitæ imminet pericu-
 lum, viribus præsertim consentientibus cum his
 quæ torporem inducunt, succurrendū erit, ex Pauli,
 & Aetij sententia, præbeatūque Philonis medica-
 menti, aut theriacæ nouellæ drac. 7. cum vnc. 2. vini
 albi aquosi. Vt verò post exactū lapidē, alij nō rena-
 scantur, si obesa fuerint corpora, audacter exquirite
 extenuans victus præcipiendus erit. Vbi autem cali-
 diora fuerint corpora, atq; gracilia, neq; extenuan-
 tem victū, nec medicamētā, quæ extenuare possunt,
 requirūt, cum ea gracili corpori sint inimicissima,
 sed mediā esse cōuenit inter extenuantē, impingue-
 tēque victus eorum rationē, Galeno auctore sex-
 to, de sanitate tuenda, cap. vndecimo, & Aetio cap.
 15. libri vndecimi. Scopus nāque est, ne crassior, aut
 frigidior materia, quæ ad calculorū generationem
 idonea est, congregetur, sed contrā studendū est, vt
 bonā temperiē conciliemus, & extenuantibus citra
 magnum calorem vtamur, vt inquit Alexander. Qua
 de re in tēperatis locis degant, in quibus anni tēpo-
 ra, & horæ nimio feruore non infestent, frigora ta-
 men magis, quàm æstus cauendā; assumantur etiam
 ociosæ deambulationes, & exercitia moderata: ete-
 nim segnitias, & otium eis nocent. Cæterum veni-
 tre semper probè laxū habere oportet: somno vtan-
 tur moderato, neq; culcitris indormiāt ex asnerum
 plumis confectis: hæc siquidē renes valde calefaciūt,
 eodē Alexandro auctore. Caueāt cibos substantia
 durā, & qui ægrè manducatione atteruntur; itē eos
 qui multam substantiā habent, plurimumq; nutriūt
 & qui acuatim digerūtur, antequam perfectè co-
 quantur, & qui grauis sunt qualitates, seu difficulter
 cōmutantur, ac supernant, & ægrè per aluū subeūt,
 & instant, item eos, qui meatus obstruunt, aut aliū
 diutius corporibus insident, ex Aetij sententia. Sit
 autem cibus boni succi, & moderatus (vt inquit Pau-
 lus) rarūque leguminum omnis generis, frumentū
 ceorumq; vsus. A caseo, & lacte, & quæ ex ipsis præ-
 parantur, caueant: nā omne lac, præter asininum, eis
 in cōmodum existit: propterea quod cæteris omni-
 bus est tenuius asininum, ideo confert ex eiusdē Ca-
 leni & Aetij sententia: præ omnibus verò satietatē
 vitare oportet. Vino vtantur tenui vinā ciete, non
 valde veteri. Nā dulcia vina calculosis sunt nocua,
 similiter & nigra, & summatim omnia quæ crassi
 sunt succi, ac nimis calida, seu acris nocēt. O omnibus
 verò cōfert calculosis, vt à cœna sepe vomitū simili-
 ter

Signa-
num
clorum

sexto de loc. affect. cap. 2. Nam dum pus gignitur, dolores ac febres magis eueniunt, ut inquit Hippo. aphorism. 47. 2. libri. Tumor item circa ilia quodammodo apparebit, & vehementis caloris sensus agros circa renes affligit, minguntque ruffa, & pura (ut cap. 18. eiusdem libri inquit Aetius.) Quod si in faciem partem inclinatur ager ex affectu, grauitatem magnam magis se sentire dicit, antea quam inflammatio in abscessum peruenisset, Alexandro teste cap. 5. libri 9. Nam circa renem dolentem veluti suspensi cuiusdam ponderis sensum percipiet, ut ait Galen. 6. de locis affectis, cap. 2. Perfecta autem suppuratio, & febrim, & dolorum accessiones minores contingent, & grauitatis sensus magis circa affectum renem infestabit, ac tempore rupture magis exacerbat, ad quam etiam cum ipsis urinis puris excretio consequitur, & nonnulla alia, de quibus sequenti cap. verba faciemus. Caterum ob plurimas causas renes inflammari contingit, ut liquet ex eodem Aetio: nam plaga, & attritiones, pharmacorum potiones, & humores corrupti inflammationem generant, & praesertim equitationes continuas, & vehementes, ut ipse inquit: quorum notitia facile haberi poterit. Verum in eisdem inflammationibus si urinae prodeant multae, & crassae, in quibus bonum est quod subsidet, quoniam ipsae maxime indicant, ac fecerunt morbum, propterea quod inflammationis concoctione indicant, bonum portendunt, quod admodum, si urinae aquosae, purae ac perlucet prodeant, agere morbum fecerunt indicant, eodem Aetio teste. Conferunt etiam renum passionibus haemorrhoides superuenientes, utpote quae velut faciem sanguinis vacuare sunt, nare, ex Hippo. & Galen. sententia aphorism. 11. 6. libri. Victus ratio pro inflammationis renum curatione similis instituenda erit ferè ei, quam in inflammatione iocinoris praecipimus, nisi quod (ut inquit Aetius) licet à primo die à cibo abstinere debeant, non tamen in multos dies inediam extendere oportet: etenim urinae puriores & aciores per inediam redditae (ut ipse inquit) vehementissimos morsus infligunt. Quapropter in principio forbitionibus tenuibus morsus lenientibus agros nutrire oportet, veluti est ptisanæ succus, & aqua calida potus. In cuius vicem aqua hordei, seu ea in qua cortandrorum preparatorum semina fuerint decocta, uti poterunt. Viteat autem aquam nullam in principio, prius quam concocta fuerint inflammationes, ac vsus eorum, quae urinam ciunt: obla dunt enim mordaces humores inflammatis partibus inducendo, eodem Aetio auctore. Nam ubi in vesica, vel renibus phlegmone est coepta, medicamenta quae urinas prouocant, bibenda haudquaquam danda sunt. Sed ad partes quae maxime longinquae sunt, semper reuulsio facienda erit, ex Galeni decreto decimotertio method. medendi, cap. 11. extimata tamen tum phlegmone magnitudine, tum corporis totius statu. Quapropter sanguis detrahendus, statim est, praesertim ubi maiori acumine renes affligantur, & vehementior exurgat dolor, ex Pauli, & Aetij sententia, vel omnibus succis ex quo redundantibus, seu ipso sanguine exuperante, ut inquit Alexander. At quae vena secanda sit, non admodum liquet. Nam Aetius venam cubiti secare iussit, Galenus verò 13. methodi medendi renibus, vesica, pudentibus, & vtero phlegmone laborantibus, eas quae in cruribus sunt sitae, venas esse secandas praecipit, potissimum, quae circa popliteum sunt, sin minus, eas

quae iuxta malleolum perpetuo autem, quae è directo sunt posita, quamuis in eodem libro paulo ante dictam sententiam, ad partes maxime longinquas reuulsionem fieri in istis inflammationibus iussit: ambae tamen sententiae verae sunt. Nam ubi reuellere duntaxat opus sit, in contrarium ac maxime longinquas partes pericienda erit, & propterea venam cubiti, eamque internam secare conuenit. Si vero vacuare simul cum deriuatione intendat medicus, crurum venae, quae è directo sunt sitae affecto reni secanda sunt. Nam (ut ipse inquit) statim prima vacuationis diuersitas pro particularum diuersitate variatur, & propterea vnde, aut quomodo vacuatio sit facienda ager ipse docet locus. Hinc cum eodem Galeno concludamus quod ubi recens fuerit phlegmone, copiose sanguinis affuerit, reuulsionis potissimum gratia ex cubito vena secanda est. At si nec recens fuerit, nec sanguinis multitudo adsit, euacuandi praesertim causa, eam secare expedit, quae in poplite est, aut quae in malleolis, quemadmodum idem Galenus libro de curandi ratione per venae sectionem, cap. 18. scriptum reliquit. Vel si maius primo ea, quae in cubito est pro reuulsione fecerit, deinceps (si opus fuerit) eam quae in malleolis pro euacuatione rectitudine seruata, nam & Aetius quoque repetitam sanguinis detractionem commendauit. Verum priusquam ad venae sectionem deuenias, elypheres adhibendi sunt ex maluae decocto, aut semine lini, & fenugraeci cum oleo, & melle, aut ex pituita succo cum oleo, & melle ex eiusdem Aetij sententia. Caterum copia non multa infundenda est, ne repleta intestina comprimant renes: & ubi stercorea prodierint oleum anethinum cum butyro quibusdam adipibus in his eliquatis, anserino videlicet, aut gallinaceo, iniiciantur, ut ipse inquit: aut ex maluarum, betae, aut violarum foliis, & hordeo decoctum parietur, cuius recipe lib. 1. aut lib. 1. 5. & adde olei violacei vnc. 4. aut chamamelini, vel anethini vnc. 3. mellis rosacei vnc. 2. salis communis parum, casia tracta, aut pulpa casiae fistulae vnc. 1. butyri recentis, & adipis anseris, seu gallinacei, cuiuslibet drachm. 4. vel drachm. 3. s. misceantur, & fiat clyster. Interim (si videbitur) addere poteris drachm. 4. diacath. Caterum si vitiosus quispian humor, praesertim acris, & biliosus cum sanguine redundarit, à venae sectione purgationem adhibere conuenit, quae humorem praepollentem educere possit. Verum exhibenda nequaquam erit priusquam humorem contemperaueris, ac solutum facilem paraueris, aut si crassus fuerit, ipsum extenuaueris, ex Alexand. testimonio, potissimum ubi virtus vitiosum humorem euincere, ac superare nequeat. Et propterea inter initia humoribus existentibus crudis, & inflammatione ipsa feruescente nequaquam purgans medicamentum exhibendum est, ut liquet ex eodem Alexandro, id quod etiam annuere videtur Aetius, cum dixit, neque etiam purgantium pharmacum exhibendum, veluti quidam consueverunt: quanquam & idem Aetius vehementiora medicamenta purgantia vitauerit. Nos verò nec eadem humore etiam contemperato, concocto, ac praeparato etiam post initia probamus, sed ea duntaxat, quae vim habent redundantem humorem leniendo expurgare, veluti tamarindi, casia fistula, mel acereum, saccharum violaceum, syrup. ex pluribus infusionibus rosarum, aut violarum, & interim diacath. Hisce itaque uti poteris medicamentis purgantibus

Topica.

Vnde in
ta quo te
pere ex
tendatPurgan
tationes q
do opus
dum sit,
et quia

separatim, aut quibusdam eorum simul permixtis, ubi vitiosi in corpore redundarint succi, eis prius concoctis, ac preparatis, ut dictum est. Nam con- quiescere oportet in renum morbis, eubare molli- ter, solvere alium, si aliter non respondet, etiam du- cere, ut inquit Celsus cap. 10. lib. 4. Quod si post di- cta auxilia adhuc inflammatio inualuerit, extrinse- cus etiam inter initia feruente adhuc inflammatio- ne refrigerantia admouere conuenit, potissimum ubi biliosus fuerit sanguis, qui inflammationem ex- citauit, renisque ardorem igneum sentiant, veluti est oleum rosaceum, & ipsum omphacinum, seu me- linu paucio aceto addito, & succo polygoni, aut por- tulacæ. Aut ex oleo rosaceo, vel melino luteis ouo- rum, polygoni succo, aceto paucio & cera ceratum fiat, & supra renes accommodetur, ex Pauli senten- tia. Alex. verò ex rosaceo, paucio aceto, succo poly- goni, aut portulacæ, & cera ceratum fieri iussit, quo nullum reperit efficacius, ut ipse inquit. In incre- mento autem ipsius inflammationis aliquid prædi- ctis medicamentis admiscendum est, quod digerē- di, ac discutiendi vim habeat, veluti est chamæmel- lum, & eius oleum, fenugræcum, semen lini, scitula campana, & althæa, ac nonnulli etiam recentes adipe- pes, ut gallinaceus, & anserinus: declinatione autem facta, ea quæ plus discutiunt miscenda sunt, veluti est chamæpitys, polium, abrotanum, trislagio, asfa- rum, flos iunci odorati, & reliqua huiusmodi, & ad cataplasmata procedendum, quæ ex farina fenugræ- ci & seminis lini fiant, hordeacea, ac fabacea, radi- cibus, ac foliis althæa in iure chamæmeli decoctis, additoque oleo chamæmelino, seu anethino, & cha- mæpitys, seu trislaginis, vel alterius ex prædictis pharmacis parum, cum aqua mulla, seu cum sapa, po- tissimum ubi etiam crassior videbitur esse, quæ de- relicta est, materia. Hoc etiam tempore confert fo- tibz per spongiarum uti ex decocto chamæmeli, semi- nis lini, anethi, ac althæa foliis, & radicibus, paucu- lo calamo aromatico, ac flore iunci odorati addito, ac paucio etiam aceto. Nec minus & calefacientibus balneis tutò vtare, eisdem quoque in incrementò in- flammationis, ac summo vigore tutò uti poteris, ubi quæ inflammationem parit materia, crassior fuerit, quamquam ne id prætereundum est, ex Alexand. & Pauli auctoritate, quod admodum calida vitanda sunt, ne materia, quæ in parte inflammata continetur, in pus conuertatur. Item quæ impendit refrigerant non minus vitare oportet ex eorumdem sen- tentia, ne quamprimum renes inflammati induren- tur, potissimum cum ipsi suapte natura facile scir- rhis deprehendantur, tum propter eorum substanti- æ qualitatem, tum etiam propter excrementorum naturam, quæ per ipsos dilabuntur, ut liquet 13. me- thodi medendi, cap. 16. At ubi perfecte concocta fuerint inflammationes, & quiescerint dolores, tunc etiam per urinam clementia purgandum. Quapropter tribuenda sunt, acorum, phis, petroselinum, gramen, casia, chamæpitys, & polium, ex Aetij decreto. Ho- rum vnumquodque (ut ipse inquit) ex aqua coquen- dum est, & cum vino, & melle bibendum, in cibisq; tribuenda sunt feniculum, apium, daucus, pastina- cæ probè percoctæ crithma, scandix, & gingidium. Verum si inflammatio ad paris permutatiōē ver- tatur, quam celerim adiuuare oportet tum suppu- rationem, tum puris eruptionem, ex eiusdem Aetij doctrina. In quem usum conferunt spongiæ foris gratia admotæ assidue imbutæ aqua, & oleo aut eg-

dem decocto imbuatur foliorum, & radicū althæa, chamæmeli, fenugræci, & seminis lini, & sapius (ut supra) calidæ admoueantur. Eundem usum præbe- bit cataplasma ex farina hordeacea cum sicuum & al- thæa ex aqua mulla decocto. Bonum quoque est i- psas ficus admiscere tritas, & absynthij comam con- tulsam, vel ex eadem farina hordeacea, & erui oleo, & resina terebinthina cum melle, & ficibus pingui- bus cataplasma fiat. Interim addere poteris carda- momi, vel columbæ stercoris parum, ut Paulo visum est. Et ubi maligna fuerit inflammatio ex putrescē- tibus humoribus orta, quos ex febrium acrimonia cognoscēs, etiam rosæ in cataplasmata commiscen- da, myrtique bacca, & erui, ac lentis farinæ hæc et- enim humorum putrefactioni resistunt, ut eisdē Ac- tio placuit. Genito verò pure, ipsius eruptio procu- randa erit, in quem usum ea, quæ urinam ducunt in potu exhibeantur, veluti cucumeris semen decori- catum ex aqua mulla, palmulis in ipsa incoctis: dan- da etiam iris est cum melle despumato delingenda, eodem Aetio teste, aut feniculum glycyrrhizæ, iui- disque radicem in aqua mulla decoquito, ac exhibe- to, vel etiam chamæpithyos, feniculi, pulegij, vel origani, & aliorum similium decoctum in potu præ- beto, remorantem quoque rupturam iuuant cumi- num cum passō, & ruta cum vino mulso (ut idem fa- tetur Aetius.) At quæ præbenda sint post abscessus rupturam pro puris repurgatione, ac quomodo id dignoscendum sit, sequenti cap. docebimus.

Περὶ ἐλκώσεως τῶν νεφρῶν. Id est, De exulceratione renum. CAPVT. XCVI.



UONIAM non solum post absces- sus rupturam contingit renes ipsos ex- ulcerari, sed ab aliis quibusdam cau- sis, ut dicemus, propterea de hac ex- ulceratione verba facere intendimus.

Appellant autem Græci affectum hunc quandoque ἐλκος, interim ἐλκωσις, Latine verò vlcus, & exulce- ratio dicitur. Nihil autem aliud est, quam continui solutio in carnosa substantia contringens, nam si in aliis partibus eueniat, cum in omnibus incidere pos- sit, diuersa quoque nomina sortitur, ut liquet 4. & 6. methodi medendi. Quæ de re renum exulceratione appellabimus eorundem solutam cōtinitatem. Ex dolore verò cum grauitate circa lumbos, si ambo af- fecti fuerint, coniciēs eos affectos esse; & alter, si dexter, in dextra parte, si sinister, in sinistra do- lor sentietur. Sunt verò nonnulla alia signa, ex quibus renes exulcerati dignoscuntur, quæ cum simul, & af- fectum, & sedem affectam indicent, propterea nos in eiusdem affectus dignotione cuncta dinumerabi- mus. Est porro affectus hic sub eo morbo, qui com- munis à Galen. appellatur, contentus, solutio con- tinui dictus, & propriè in carnosa parte, hoc est re- num parenchymate eueniens: quo fit, ut præter lum- borum dolorem cum grauitate sine impedimento urinam reddant, cui pus mixtum reperitur carnosus particulis innatantibus (Paulo auctore) Galen. au- tem 6. de loc. affec. cap. 2. scriptum reliquit perseue- rantis vlcis notas (ex abscessu potissimum orti) ex urina haud obscure deprehendi: adde quod laboras creberrimè in affecto rene dolorem sentit, atq; in- terdum cum urina exiguum pus, veluti ab vlcere ex- cernitur, similiter ramentum nonnunquam cum u- rina expelli videtur, per partes quasdam ipsius urinæ inæqualiter dispersum, mediam conditionem seruās

Quæ tribuē- da sint pro abscessu ruptura.

4. metho. c. 2. 6. metho. c. 1. Quid intel- ligendū sit per renum exulceratio- nem. Signa renū affectorum. Vlcera re- num signa. Pau. lib. 3. cap. 45.

Prima cien- tia quo tem- pore exhi- benda sint.

Puris gene- rationi quā- do capitulan- dum sit, & quomodo.

in eius commixtione pus ipsum, ac interim sanguis quoque cum urina excernitur, qui erosi iam ulceris indicium est. Nam si sanguinem, aut pus mingat pluribus videlicet diebus, ac mentibus, aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat Hippocr. & Gale. auctoribus aphorism. 75. 4. lib. In qua verò earum partium euenerit, dolor distinguit, qui in differentiis accidit locis, & ea, quæ cum urinis excernuntur, adeo ut si velut caruncule parue cum urina crassa una exeant, propriè renum exulcerationem significabunt, vt 76. aphorism. 4. lib. ab Hippocr. & Galen. decretum est, etenim vocatum quidem ramentum ulceris, essentia verò proprietas affectus partis proprium indicium est, eodem Gale. auctore 6. de loc. affect. cap. 3. Ceterum si disrupto abscessu exulceratio succedat, caruncula parua oblonga cum urina excernuntur, & si maligna fuerint vlcera, humores foetidi, liuidi, & mucosi. Si verò benigna fuerint, etiam pus ipsum album, & æquale, & leue absque odore graui, & paucum reperietur, vt inquit Aetius, præcesseruntque alia præcedentis abscessus indicia, velut præcedenti cap. adnotauimus, quemadmodum si disrupto, vel exco vase aliquo, renum exulceratio consequatur, eiusdem ruptionis, seu exfionis signa præcedent, quæ cap. de profluio sanguinis renum fusiis demoustrauimus. Nec minus & lapidis signa præcedent, si ex eo pererodente exulceratio contingat. At si propterea quod acres, & mordentes succi urinae permixti per renes pertranseunt, iidem exulcerentur, eorundem acrium, ac mordacium succorum indicia redundantium aderunt, quæ nedum ex urinis percipi poterunt, sed ex temperamento, ætate, habitu, anni tempore, præcedentique victus ratione, ac reliquis, nullumque aderit indicium rupti, seu erosi vasis, nec ruptionis abscessus, aut lapidis. Ex his etenim quatuor causis internis renum exulceratio oritur, vt liquet ex Pauli testimonio. Potest insuper quandoque ex externarum causarum aliqua excitari, vt ex assumptione alicuius medicamenti vim habentis renes erodendi, ac exulcerandi, aut ex illato vulnere. Id quod ex infirmi, seu astæti loquela promptè coniiciet. Exacto autem studio laborandum est, vt renū vlcus cicatrice inducatur, quod nisi illico contigerit, difficiliorem reddet curationem, Galeno auctore 6. de loc. affect. cap. 2. quamuis minoris malitiæ sint renum, quàm vesicæ vlcera: quoniam carnosæ partes, quàm nervosæ facilius sunt curationis. Tamen nosse oportet omnem exulcerationem, & vesicæ, & renum ægrè curabilem esse, præsertim quæ erosione sit oborta, adeo quod paucos nouimus, qui ab ea perfectè sint liberati, vt liquet ex Aetio, licet recentia vlcera non adeo ægrè vt diutina curari possint, siue in renibus, siue in vesica fuerint orta. Renum quoque, & vesicæ vitia in senioribus difficulter sanantur, vt inquit Hippocr. aphorism. 6. 6. lib. quoniam & earum partium opus indefinens est (quiete autem opus est, siquid sanari debeat) & quia excrementum acre exacerbare natum est. Multo autem difficilius sanantur in senibus renum, & vesicæ passiones, quoniam & omnes alij morbi præcipuè longi, vt testis est Galen. commen. eiusdem aphorism. Quinimo iidem diuturnis morbis correpti ferè commoriuntur, vt eidem Hippocr. visum est aphorism. 39. 2. lib. Pro cuius exulcerationis curatione aer eligi debet ad siccum inclinans, in ætatis temperatus, aut paulò ad calidum vergens, frigidus autem vitari debet. Nam ipsum vlcerebus mor-

dax est, vt liquet aphorism. 20. 5. lib. somnus modicus, aut consuetio longior præcipiatur, cum immodica vigilia oblitusque inuigenda est, vitentque ægri omnem delatationem, ac effluentem gestationem, maximè quæ fit in equo, & omnem vehementem concitationem, & e conuerso perpetuum otium, ex Aetij decreto cap. 30. lib. 11. In vicem autem exercitij ægrum decumbentem molliter fricare singulis diebus mane conuenit. Repletiones omnes vitari debent, quinimo mollienda aliis erit mollibus, ac lenientibus clysteribus, vbi natura faeces quotidie non excernantur. Animi affectus immodici omnino inhiabantur, similiter & coitus, nam omnibus renum, & vesicæ affectionibus insensibilis est, & maximè senibus ac natura imbecillioribus, vt inquit Aetius. Cruditates autem cauendæ sunt, & ne quid crudum in cibo accipiant, neque quod ægrè concoquitur, aut faciliè corrumpitur, aut inflationem parit, sumant. Maximè tamen vitare debent quæ faciliè acefcunt, & quæ crassi humoris sunt, quæ ægrè secernuntur, quæ urinam cient, & quæ amplius ventrem perturbant: item omnia acria, effluentia, & quæ accepta amplius adstringunt, & magis resiccant, & non nutriunt, & quæ stomacho inimica sunt, & quæcunque bilem, aut pituitam præcipuè gignere possunt. Idoneus autem cibus erit pitifana cremor, aut eademmet pitifana, aut amyllum, aut similago lota cum lacte cocta: dandum & lac ouis permixtum, & iusculum gallinæ pingue, ex Aetij decretis. Item oua gallinarum tepida, & molliissima, si edantur, valde proficiunt. Ego sane noui quendam (vt inquit Alex.) qui oua, quamprimum essent posita sorbebat citra coctionem, dicebatque se plurimum adiuuari & rosiones, ac dolores, qui circa vesicam oriebantur, mitiores fieri, vt ferè posset, affirmabat. Ex oleribus conueniunt malua, feris, rumex, portulaca, asparagus palustris, cucumis, & lactuca, omnia tamen cocta, nanque hæc morsus obrundunt: nec quicquam crudum vorent, cruda enim olera tam renum, quàm vesicæ vlcerebus inimica sunt, ex sententia eiusdem Aetij. Ceterum pane vtantur recenti decenter apparato. Carnibus gallinarum, pullorum, phasianorum, starnarum, & reliquarum volucrum montanarum teneram carnem habentium, & non antiquarum. Ex pedestribus autem conuenientiores sunt hec dorum extremitates. Ex piscibus conueniunt aselli parui, & qui gobij appellantur, gammari, locustæ, & fluuiales cancri, qui velut remedium præbentur, vt ait Aetius. Erinaceus quoque reces familiariter permittatur. Ex bellariis vna passa non incommoda est. Similiter conueniunt nuces pineæ recentes duabus aquis maccata, pistachia, & amygdalæ virides, maturæ tamen & probè mundatæ, sicæ verò non vetustæ, sed præmaceratæ, & decorticatæ. Voluptatis quoque gratia acetum modicum concedendum. Eduliorum autem varietates, & superflua condimenta, omniaque nidorosa, graueolentia, & putrida inhienda sunt. Sint item omnia, quæ in cibo sumuntur, mediocris multitudinis, etiam si vitia esse ferantur. Multus etiam potus, & meracior, ac ieiunis potus omnes incommodi existunt. A frigido quoque potu in totum abstinentium, cum frigidum vlcerebus (vt diximus ex Hippocr. auctoritate) fuerit inimicum. Aqua tamen pluuia non corrupta omnino aliis melior existit (vt inquit Aetius) quæ tamen actu non sit nimis frigida. Vtuntur autem pro potu tutius vi-

no albo adstringenti diluto, aut aqua, in aqua hor-
deum torrefactum, & radix glycyrrhizæ fuerint deco-
cta. Confert item pro potu ut aqua mulla, ubi vl-
cus non fuerit ex vitiosis succis, & mordacibus or-
tum. Quod si ex iam dictis acribus, & mordacibus
humoribus renum vlcus contingat, ab eorundem
humorum purgatione curatio aulpicanda erit, iplis
tamen prius concoctis, ac præparatis. Sit autem
medicamentum purgans, quod leniēdo soluat. Ve-
luti est mel æreum, saccharum violaceum, calsia fi-
tula, & syrup. ex pluribus infusionibus rosarum. In-
terim modicum diacath. adicere poteris, & ut eo-
rum morsus obtundatur, syrupis ut licebit ex malua,
cichorio, seu hortulana endivia (quam scariolam vo-
cant) confectis, itē eis, qui ex portulaca, violis, nym-
phæa, rosis, seu papaver conficiuntur. Quanquam
vomitu etiam eos, & fortē tutius euacuare licebit,
ubi ad eum fuerint potissimum p. rati. Nam nō so-
lūm ad repletiones vomitus laudatur, verū si quis
omni mense audacter vomat, forsā & renum vlcus
& quicquid inde mali accedere posset dissoluet, Ac-
tio teste. Post quæ ad ea quæ vlcera repurgant, præ-
benda te conuertas: quanquam ea (ex quacunque a-
lia causa fuerint iam dicta vlcera exorta) confestim
præbenda sunt. Inter quæ magnopere conducit lac,
præsertim cum melle, adinum potissimum, aut e-
quinum: sit autem recens mulctum, ac calidum, ani-
mali in domum, ubi æger decumbit, deducto, nan-
que & aliorum etiam internorum vlcerum optimū
est pharmacū, & graui puri maximē amicum, & cor-
pus probē nutrit, ut inquit Aetius. Confert etiam a-
quæ mullæ aquosæ potio, necnon & cremor ptisa-
næ cum modico melle (ut inquit Alexand.) aut fœ-
nugræci decoctum cum melle, seu cucumeris semen
cum passo (ut voluit Paulus) Vel maluarum, seu cucu-
meris, aut melonum semen cum eadem aqua mulla,
aut adianthi, equiseti, seu graminis decocto præbeas.
Insuper & decoctum parabis ex hordeo cum corti-
cibus torrefacto, adianto, ac glycyrrhizæ radice, cu-
ius vnc. 3. vel vnc. 4. cum vnc. i. s. seminis melonum,
ac cucumeris exhibeas. Pastillos quoque ex melo-
num, seu cucumeris semine, ac maluarum, & halica-
cabi cum abrafa radice glycyrrhizæ, ac tragacantho,
ac vna passa, & saccharo cōficias: quorum vnum, vel
duos vice qualibet cū prædicto decocto, seu aquo-
sa aqua mulla dabis. Ex his verō quæ vrinam ducunt
simpliciora superius iam dicta ad repurganda etiam
renum vlcera bibantur. Etenim à situ, & figura par-
tium indicatione sumpta in renum, & vesicæ vitiis,
nedum mel ipsum, sed etiam eorum, quæ vrinam mo-
uent quidpiam vlcerū medicamentis misceri opor-
tebit, ex Galen. auctoritate 4. method. in eden. Pau-
lus eis qui per vrinam pus reddunt, bolum armenia
præbet, aut ferularum combustarum cinerem quan-
tum tribus digitis comprehendī potest ex passo. Ex-
hiberi autem poterit cuiuslibet eorum drach. i. cum
aqua mulla aut lacte, potissimum ubi munda fue-
rint vlcera, quod inde tibi palam fiet, si neque tecto-
rium etiam vlceri obductum cum vrinis excretum
appareat, neque etiam pus excretum sit fæculentum
sed subalbum, leue, & æquale, & paucum, ex Aetij
auctoritate. Hoc enim tempore pro his quæ vrin-
am ciunt, quæ exsiccant, ac cogunt, cogunt, tum a-
limenta, tum medicamēta, simul atque ea quæ con-
glutinant, adhiberi debent. In quem vsum hoc no-
stro medicamento vtare, exsiccat etenim, congluti-
nat, atque adstringētium hoc, quod dolorem sedat.

Excipit verō vna passæ, phisticorum, pinci fructus,
& amygdalarum dulcium torrefactarum, cuiuslibet
drachm. s. seminis althææ, & halicacabi ana scrup. j.
seminis lactuæ & hyoscyami scrup. s. amyli, traga-
canthi ana scrup. j. s. radices dulcis scrup. ij. s. seminū
melonum, & cucumeris ana drach. iij. boli armenia,
seu cineris ferularum combustarum scrup. ij. saccha-
ri dissoluti in aqua rosarum, & capillorum veneris
quantum satis sit, hæt in morsulis. Ad inueterata au-
tem renum vlcera, ea pharmaca assumēda sunt, quæ
ad exulceratam vesicam describentur. Extrinsecus
quoque quæ renes exsiccare, ac roborare possunt
admoueantur, vnguenta, cerata, cataplasma, seu em-
plastra, quæ ex oleo myrtino, cytoniorum, rosaceo,
ac mastichino, polygoni, seu plantaginis succo, ma-
stiche, thuris cortice, bolo armenia, santalis, hordea-
cea, seu fabacea farina, ouorum albugine, cera, & a-
ceto, ac similibus conficiantur. Hæc studiosi fusiū
conscripta cap. de vesicæ vlcere reperient.

Περὶ τῆς οὐρῆς. Id est, De stillicidio vrinæ.

CAPVT XC VII.

NON satis erat (ut diximus) pro eo ex-
cremento, quod Greci οὐρῆς, Latini v-
rinam, seu lotium appellat, excernē-
do, naturam renes fabricasse, nā cum
eos iuxta iecur, quod promptius tale
excrementum à sanguine secerneretur collocaſſet,
nec eodem loco commodē excernere potuiſſet, iu-
re quibusdā prælongis meatibus, ac fortibus, à Gra-
cis vreteris dictis, indigerunt, quibus mediis vi re-
num eadem vrina secreta ad proprium receptaculū
deueniſſet: ij etenim sunt, qui renes vesicæ commit-
tunt, qua ratione in infernis partibus, ut commodē
tale excrementum excerneretur, vesicam tanquam
cisternam quandam, ac proprium eius receptaculū
construxit, ut proinde ipsa quoque vesica inter ali-
menti instrumenta secunda ratione à natura fabri-
cata meritō connumerari mereatur, inter ea potis-
simū, quæ excrementa excipiunt. Eius itaque mu-
nus est, ut susceptum lotium statuto tempore, cum
scilicet ratio iuſſerit, foras propellat, Galen. aucto-
re 5. de vſu part. cap. 5. Propria nanque eius actio est
(ut idem Galen. testatur 6. de loc. affect. cap. 3.) vri-
næ excretio. Num verō tale excrementum vesica at-
trahat, an à renibus duntaxat ad ipsam excernatur,
Galenus reperio diuerſis in locis aliter sentire. Nā
6. de loc. affect. vesicam non trahere à renibus, quē-
admodum neque intestina à ventriculo, sed renes
per vreteras excernendo in vesicam mittere, ventri-
culum autem inieciunum per eam partem (quam He-
rophilus dodecadactylon vocat) scriptum reliquit.
At 5. de vſu part. oppositum sentire videtur, cum di-
xit, Porro vesica, nō ea solūm quæ bilem, sed & quæ
vrinam recipit, purum vtraque, atque ab aliis secre-
tum cum attrahant excrementum proprium, iure o-
ptimo vasa alia alimentum sibi ipsis suppeditatura
flagitarunt. Atqui nos vbique locorum Galen. ve-
ritatem fateri aſſerimus, nam non à renibus, prius-
quam ab eis ad vreteras excreta fuerit, vrinam ve-
sica attrahit, sed ab vreteris ipsis postquam ad eas vi-
renum fuerit expulsa, aliās non minū vesicæ, quā
renum vitio pāſio dicitur appellata ortum dedu-
cere poſſet. Attrahit itaque lotium vesica ab vreteris
suis vtens fibris rectis, quas non alia ratio ne à natu-
ra obtinuit, quā ut tale excrementum attraheret,
& non à renibus (ut dictum est.) Quod si quis infi-

*Vesica mu-
nus.*

*Num vſu-
ca vrinam
attrahat à
renibus.
cap. 2.
cap. 7.*

*Dilucida-
tio verborū
Galen. diuer-
ſa in locis.*

cias ibit, qui fieri possit ut alienum, atque excrementosum ab eadē vesica, aut quavis alia parte trahatur, cum facultas hęc partibus insita sit omnibus, ut familiaria, & non aliena, ac excrementosa attrahant? Cum eodem Gale. respondebimus nos, vesicam non pro sui nutrimento lotium attrahere, sed ut instrumentum à natura fabricatum ipsum recipiat, ac statim tempore (ut diximus) excernat, & quam superfluum quoddam sit vrina, ac excrementosum, adhuc ipsa naturale instrumentum affinitatem quandam, cognitionem, ac familiaritatem (ut ita dixerim) cum eo habet, seu saltem qualitatis communitem quandam, lotio potissimum, ac eadem vesica secundum naturam se habentibus, alias neque trahere huiusmodi excrementum potuisset, neque innoxie, ac citra dolorem notabili quodam tempore retinere, ut ex eodem Galen. liquet præcitato lib. 5. de vfu part. cap. 10. Quicquid tandem sit, sepe numero contingit, ut eiusdem vesicę functio multifariam oblaedatur, ipsa aut propriis, aut communibus affectibus præter naturam offensa. De quibus iam tēpestiūm est verba facere, ab eis exordientes, qui ipsi soli proprii sunt, quorum vnus, atque præcipuus is est, quem Gręci *σπαγγικία* appellant, eodē Gal. auctore 6. de loc. affect. cap. 3. & 3. de caus. symp. cap. 2. Latini verò vrinę stillicidiū nuncupāt. Quod verò vrinę stillicidium significet vrinę stillatim excretionem, nomen ipsum ostendit, ut inquit Gale. comment. aphorism. 48. 7. lib. Nam quando aliquis parum & frequenter mingit, passio vrinę stillicidium nominatur, eodem Galen. auctore comment. aphorism. 58. 5. lib. Eandem sententiam confirmavit Aetius cap. 19. lib. 11. cum dicit. Stranguria autem appellatur cum paulatim, & guttatim vrinę destillant, & assiduam ad mingendum irritationem faciunt. At quod solius vesicę propriū symptoma sit vrinę stillicidium, præter id quod Galen. scriptum reliquerit 6. de loc. affect. ipsius proprię actionis læsio ostendit, quę est vrinę excretio. Immoderatus etenim excretrix facultas in hac affectuone mouetur. Quamquam eadem vesica non perpetuò proprio, ac primario affectu laboret, sed interim ex accidenti, ac per consensum pro diuersitate causarum, ex quibus tale vitium excitatur, ut dicemus. Porro quod affectio hęc symp. sit in genere excretorum immodicę, deprauatum motum excreticę vesicę facultatis insequens, ex eodem Galen. liquet lib. de differ. & 3. de caus. symp. Excitatur autem excretoria vis ad immodicum motum quotiens retentiuā facultas, vel ex multitudine excrementorum, acrimonię, vel ex propria imbecillitate laborat, ut eodē 3. de caus. symp. cap. 2. scriptū est. Quapropter non ab re duas esse in vniuersum causas stillicidij vrinę cum Gale. fatemur commen. aphor. 16. 3. lib. 58. 5. & 48. 7. Quorum vna eiusdem vrinę acritudo existit, reliqua verò potentię retentię, quę est in vesica imbecillitas; assiduę etenim excretiones fiunt, vel propter imbecillitatem, vel demorsum, eodem auctore 3. de caus. symp. cap. 2. Quamuis vbi acrimonia in causa sit nedum ex humoribus acris, qui in venis existunt, & per renes, & vesicam expurgantur, fieri possit vrinę stillicidium, sed interim ob renum vitium, præsertim ipsis purulentis existentibus, oriri poterit, Hippocrati auctore præcitato aphor. 58. 5. lib. Aliquando etiam ob alias partes, quę cum vrinis humorum suorum vitia, aut pus, vbi abscessus aliquis infestaue- rit, transmittere possunt. Id verò interstinguere va-

lebis. Nam si ex humoribus intra vasa redundantibus acrioribus proritetur affectus hic, vrinę ipsa ostendēt, & totus habitus ad acriorem, biliosiorēque erit conuersus, Alex. teste cap. 6. lib. 9. Si verò ob purulentos renes, aut aliud eorum vitium aciores nent vrinę, ex his quę in præcedentibus conscripimus pro renum affectu dignotione perdisces. Nec minus, si ex alia quapiam parte mordaces succi, aut pus cum vrina excernantur, & propterea vrina acrior fiat, promptē dignoscere valebis ex propriis iudiciis talium affectuum, ac partium affectuum. Ex quibus omnibus causis vesica ipsa non per proprium affectū laborabit, sed vrinę vitio moriam sentiens, ad excretionem excitatur. Et propterea vrinę stillicidium non eiusdem proprius dicitur affectus, sed symptoma (ut Gale. inquit eodē 6. de loc. affect. cap. 3.) Possunt insuper & vrinarum acritudines fieri à quibusdam intemperaturis, & præcipue ab ea quę est secundum caliditatem, tum ab ea quę est secundum caliditatem, & humiditatem, & tertia ab ea quę est secundum caliditatem, & siccitatem, auctoritate Gal. com. præcitati aphor. 16. 3. lib. Quo loco animaduertant studiosi codicem, tum Græcū, tum Latinum esse deprauatum, cum dicat, tertio ab ea quę est secundum humiditatem, quod cum aperte falsum sit, castigandus locus erit, qui dicat, tertio ab ea quę est secundum caliditatem, & siccitatem, vel ab ea, quę est secundum siccitatem, à qua immordica tamen existente in eodem commento dixerat fieri posse vrinę stillicidium. Id enim Gal. phrasim ac ratio ostendit. Verum vbi neque vna iam dictarum causarum affuerit, vesicam ipsam proprię, ac primariō affectam esse propter eius imbecillitatem coniciendum erit. Imbecillitas autem, aut propter eiusdem intemperaturam aliquam, seu tumore præter naturam, aut vlcus cōtingit, ut in præcitatis aph. à Galen. decretum est, & 6. de loc. affect. Omnis autem immodica intemperatura imbecillam reddere vesicam potest, præsertim autem frigida, eodem Galen. teste præcitato comment. aphorism. 48. 7. lib. & 6. de loc. affect. Tunc etenim planē grauius videtur, vel paucio admodum contento in ipsa humore, ut eodem Galen. inquit. Ceterum cum ab intemperie vesica imbecillior redditur eius essentia oblaesa, leditur propria ipsius actio, quę (ut diximus) est vrinę excretio. Ob frigidam autem intemperiem, si vesica fuerit reddita imbecillior, & vrina magis alba apparebit, & ea quę præcesserunt frigidiora fuere, tum victus, tum balnea, similiter temperamentum, & ætas, ac reliqua, id promptē indicabunt. Nec admodum difficile erit percipere, si ex quapiam alia immoderata intemperie (licet rarò id eueniat) eadem vesica imbecillior facta fuerit. Similiter, si ob instrumentales affectus eiusdem vesicę talis fuerit orta imbecillitas, cum & ipsi imbecillitatem interdū inducere possint, ex sententia eiusdem Gal. eodem 6. de loc. affect. cap. 3. haud ægrè perdiscere valebis, tum ex te ipso, tum ex his, quę infra dicemus, veluti si inflammatio, erysipelas, aut abscessus aliqui de tale in ea fuerint orta, aut etiam vlcus aliquod. Nec te præteribit quod interim per compatiendi rationem vesica patiente, vtero videlicet, aut recto intestino inflammatis, possit & vrinę stillicidium excitari, nam vicinitatis ratione pari vesicam est necessariū, ut quę intemperaturam participet, & inflammacionem, & præter ea prematur, atque angustetur à tumoribus præter naturam, qui in illis existunt. Hipp. & Galen.

Quid per
vrinę stil-
licidium in-
telligendū
sit.

Quod vesica
in eo affe-
ctatur.
cap. 3.

Quis affe-
ctus præter
naturam sit
vrinę stil-
licidium.
Lib. de dif-
fer. symp.
cap. 5.

Causa.
Loco cita-
to.

ratio sit
id est vrinę
a primariā
affectu
ne prone
nat.
vrinę va-
le.

Medici-
mentorum
ratio.

Purgatio.

Alteran-
tio, & con-
temporan-
tio.

& Galen. testibus iam citato aphorif. 58. 5. lib. Idque ex propriis indicis dictarū partium inflammatione laborantiū percipies. Ceterum si ob vrinā acrimoniam vrinę stillicidiū exordium sumat, ager assidue ad mictionē cogēdus est, & plurima aqua calida dulcis exhibenda in potu. Nam si acrecrementum diutius in vesica moretur, partes ipsas corrodit, & exulcerat, Actio teste. Quod si senioribus talis affectio eueniat, difficulter sanabitur, veluti & quodlibet aliud renum, & vesicę vitium vt Hippocr. visum est aphorif. 6. sexti libri. Idque potissimum fiet, vbi ex frigida intemperie cum frigidiorū humorum redundantia ortum habebit: tūior etenim erit ne ad mortem vsque eos conitetur, quemadmodum & alij frigidī, ac diuturni morbi. vt liquet commen. aph. 40. 2. lib. Porro si ab acribus fucis intra vasa redundantibus, biliosis inquam vrinā stillicidium cōtrahatur, eis in vniuersum vtendum erit, quę alterant, humectant, ac contemperant, Paulo, & Alexandro testibus. Quapropter aer eligendus est in pascuis ad humidum inclinans, in actius temperatus, somnus moderatus, aut consuetū parum longior, vigilię immodice vitentur, quiescant egrotantes, & exercitiū vitent. Alius seruetur lenis, si non natura, saltem arte lenibus clysteribus. Animi aciditē vitanda sunt, præsertim ira. A cibis calidis, acribus aut falsis omnino abstinentium, & a tarda comestione, vt inquit Paulus. Quapropter his utilis est pitiana, eiusq; cremor per se, interdū etiam cum lacte, vbi magna pars acrimonię finierit, quoniā lac (vt inquit Alex.) corumpitur, si qualitate feca, & acri propollente multum exhibeatur. Poterit insuper eadem pitiana aut pulorum, aut gallinarum iure parari, seu etiam cum amygdalarum dulcium cremore. Inter pisces quoque laxatiles eligi possunt, & inter olera lactuca, buglossum, malua, ac portulaca. Pro potu vinum præberi non debet, nisi id dulce sit, optimęque dilutum, & eis exhibeatur, qui alio potu vti non valent, propter eiusdem vini consuetudinem, aut corporis imbecillitatem. Reliquis verō pro potu aqua præbenda est dulcis, calida, quemadmodum Aetius, & Alexan. iubent. In vicem cuius aqua etiam hordei, aut decocta aqua dulcis cum pauco saccharo rosaceo permixta, seu radicis glycyrrhizę decoctū præberi poterit. Optimū quoque est & lac ipsum calidū potatū, vt inquit, & amyllum cum lacte decoctum, itemq; cum palmarum decocto absorbendum præbere. Quod si neque his contemperetur redundans succus, ac eius acrimonia obtundatur, tunc exuperantem viciosum humorem quā celerrimē purgare oportet, aliisque medicamentis contemperantibus, ac morsum obtundentibus vtendum. In quem vsū conferunt mel æreum, calsia fistula, saccharū violaceū, ac syr. ex pluribus infusionibus violarum, aut etiam rosarum, poteruntque vnc. 3. mellis ærei, aut sacchari violacei, seu vnc. 2. calsiæ fistulæ cū myxarum, vix passæ, radicis glycyrrhizę, ac hordei decocto, seu aqua lactis exhiberi. A dicta purgatione, & ante eam syrup. etiam violaceus, ex infusione rosarum, ex nymphæa, papauere, aut buglossi succo paratus contemperandi gratia commodē exhibeatur. In hunc etiam vsū exhibita purgatione cremor seminis citruli, cucumeris, vel melonis competit cum aqua hordei, aut palmarum, seu radicis glycyrrhizę decocto, vel pastilli hunc in modum parati præbeantur. Recipe seminis melonis, citruli, & cucumeris ana drachm. 2. vix passæ, & succi radicis gly-

cyrrhizę ana drachm. 1. seminis lactucę, portulacę, sing. scrup. 3. amyli scrup. 1. s. sacchari in aqua rosacea dissoluti, quantum satis sit, misceantur, & fiant pastilli. Clysteres quoque interim adhibeantur parato decocto, ex hordeo, foliis maluarum, althææ, betæ, ac violarum, exiguoque sale, cui adiecto olei violacei vnc. 4. mellis violacei vnc. 2. calsiæ fistulæ vnc. 1. misceantur, & fiat clyster. His quoque apta sunt continua aqua dulcis balnea, vt Alex. & Paulo visum est. Insuper & continuis fomentis (vt inquit Aetius) vti oportet circa pubem adhibitis ex decocto foliorū maluarum, violarum, & althææ, rosarum, florū chamæmeli, ac fenugraci paratis, inungendęque partes circa vesicam ex oleo violaceo, de nymphæa, seu papauere, amygdalarum dulcium, ac rosaceo. Quod si acrimonia adhuc ardeat, etiam per colem lac ipsum cum amylo in vesicā iniiciatur, vt inquit Aetius. Confert item in hunc vsū lac ipsum per se, caprillū potissimum, item cremor seminis papaueris, melonis, seu cucumeris, ac etiam maluarum, & althææ cum aqua hordei, in qua etiam radix glycyrrhizę fuerit decocta, si iniiciatur. At si vrinā stillicidium ob frigidam vesicę intemperiem fieri contingat, is quę calfacere possunt, & in victu, & in medicamentis vti necesse est, Tralliano auctore. Cibis itaque, & potibus validioribus vtantur. Inter olera apii, ac dauco, feniculo, seu oreofelino. Pro potu vianū calidius his est idoneum. Similiter & aromatum decoctiones in potu exhibere conuenit, vt inquit Aetius, aut artemisię, seu scordij decoctum, ex Alex. auctoritate. Item conuenit theriacam præbere in potu cum passo, & vino mulso, vt eidem Actio visum est. Nec minus confert oleo rutaceo calido pectinem fouere, ac agrum in sampfuchi, aut rutę decoctum desidere, inumque ventrem contegere, ac calfacere. Aliquādo & per sedem oleum rutaceū infundere, ex sententia eiusdē Aetij. Conueniūt itē quę vrinam ciunt, tum cibi, tum medicamenta, ex eiusdē Aetij, & Pauli auctoritate, & insuper confert aquis naturalibus pro balneis vti, & reliquis calidis vnguentis, Alexandro teste: quorum speciatim syluam sequenti capite studiosi inuenient. At si ex alia quapiam intemperie vrinā stillicidium excitari contingat (quamvis rarō id eueniat) perpetuo suo curabitur contrario: quemadmodū si aliud membrum primō sit affectum, & id ipsum per vesicam expurgeretur, aut vicinatis ratione per consensum offēdat, manifestū est illud primō curari debere, ita tamē, vt neq; vesicam negligamus, vt inquit Aetius.

Ne ei d'vseletur. Id est, De difficultate vrinę.

CAPVT. XC. V. III.

NEC minus, & inter eos præter naturam affectus, qui soli vesicę proprii sunt, cōnumerandus est is, qui a Grecis d'vseletur, à Latinis verō vrinę difficultas dicitur, cum videlicet meiere ager cupit, & cum vrinā excernuntur, vt inquit Aetius cap. 19. lib. 11. Quanquam à Galeno con mto aphorismi 48. septimi libri, bifariam mingendi difficultas interpretetur. Vno modo quando cū dolore sit mictio, alio, quādo cū difficultate aliqua, adeo quod vix vesica operetur. Hinc Trallianus cap. 6. lib. 9. dicebat, Vrinę difficultas partim cum dolore, partim sine dolore oritur. Id autē (vt dicemus) euenit ob causarum, ex quibus oritur, varietatē. Si ę itaque cum dolore, siue citra dolorem, sed cum dif-

Clysteres.

Balnea.

Fom.

Si ob frigidam vesicę intemperiem oriantur, curatio.

Quid per vrinę difficultatē intelligendū sit.

*Pars affe-
ctus.*

*Quis affe-
ctus præter
naturam sit.*

Causæ.

*Causarum
signa.*

*Lib. 3. cap.
45.*

*7. aphorif.
comment.
42.*

ficulitate aliqua, adeo ut vix vesica operetur, fiat hæc affectio, perpetuo vrinę difficultatem eam nominabimus, ex Galeni decreto præcitato loco. Quod vero, nedum vesica, sed ipsa sola in hac affectione semper laboret, ex eius functione oblaesa patere poterit, quæ vrinæ excretio est, ut præcedenti cap. notauimus. Hæc etenim ita oblaesa est, ut imbecilla, & vultu torpens reddita sit. Similiter ex dolore cum posito, si cum dolore mictio fiat. At quod symptoma sit in genere retentorum, vel excretorum immodicè, libro de different. sympt. cap. 5. & tertio de causis symptom. cap. 2. scriptum est. Ex eius quoque excretionis modo liquere id poterit, namque cum dolore, aut saltem cum difficultate sit mictio. Vbi autem cum dolore fuerit, ex inflammatione, aut abscessu, & vlcératione, inæquali intemperatura, aut spiritu flatuoso ortum habebit. Si vero motus duntaxat difficilis fuerit, aut propter potentiam imbecillitatem, vel tumorem contra naturam (indolorosum inquam) excitabitur, ex eiusdem Galeni sententia præcitato aphorismo 48. septimi lib. Verum si dolor cum grauitatis sensu fuerit, quod inflammatione aut abscessu vesica infestetur, suspicandum est. Distingues autem inflammationem ab abscessu ex aliis propriis eorundem morborum indicibus. At si cum dolore pus quoque cum vrina excernatur citra grauitatem, sed cum vehementi rosione, vlcérationem in causa esse indicabis. Sed si absque grauitate, verum cum distentione sola dolor in vesica percipiatur, spiritum copiosum, ac flatuosum difficultatis vrinæ causam esse suspicabimur, Alexandro teste. Vbi autem nullum tale affuerit indicium, & cum dolore mictio fiat difficilis, ex inæquali eiusdem vesicæ intemperatura eandem vrinæ difficultatem oriri censeto. Verum quamquam ea, & calida, & frigida, & etiā sicca quandoque esse possit, sæpenumero ex frigida contingit: etenim vesica exanguis, & frigida est, & propterea à causis frigidis plusquam alia partes, promptius afficitur, quemadmodum euenit in aquilonis flatu. Tunc namque vrinæ difficultates oriri cōsueverunt, Hippocrate & Galeno testibus aphorismo quinto tertij libri. Id autem percipere poteris, nedum ex aquilonis flatu, sed ex reliquis quoque causis in frigidantibus, quæ præcesserunt, atque etiā ex aritate, temperatura, vrinęque tenuitate, & albore, ex Pauli auctoritate. At si ex reliquis inæqualibus intemperaturis excitari contingat cum dolore vrinæ difficultas (quamquam non sæpius id contingat) ex propriis earundem indicibus, haud agrè percipi poterit, quemadmodum interim contingit in ardentissimis ac siccissimis febribus, ut Aetio, & Paulo visum est. Ex eisdem quoque intemperaturis, licet non inæqualibus dolorem inferentibus, redditur potentia imbecillitas, ex qua citra dolorem cum difficultate mictio fit, licet præcipue ex frigida, quæ haud aliter dignoscuntur, quam prædictæ: quāquam vbi cum frigiditate simul pituitosus humor redundet, præter alborem vrina crassa apparebit, Paulo teste, necnon & alia aderunt indicia redundantis pituitæ: potissimum si in toto redundarit, & demum ad vesicam demittatur, eiusdem vesicæ ceruicē obstruēs. Ex tumore item quopiam præter naturam (eodem Galeno auctore) difficilis quandoque sit motus in vrinæ excretionē, de eo tamen intelligendū est, qui dolorem non parit. Nam de his iam meminerat inter eas causas, quæ cum dolore faciebāt vrinæ difficultatem. Sunt verò hi, scirrhi, & oedematosi tumo-

res, qui quonam modo dignoscendi sunt, promptè cuilibet patere poterit, ex propriis eorundem tumorum indicibus. Quare non est cur hic ea particulatim conscribam. Porro si vrinæ difficultas in ardentissimis, ac malignis febribus fiat, mala est. Nam nedum vesicam affligi significat, sed indicium est, quod omnes neruose partes sint affectę, ex Aetij testimonio. Verum ex aliis causis vbi oriatur, tanto salubrior erit, quanto dolore vacabit. Ex frigida tamen intemperie si excitetur, senibus periculosior est, vultu & ceteri morbi frigidi. Verum vbi ex ea reddita fuerit imbecilla vesica, adeo ut eius actio lædatur, & mingendi difficultas iam originem traxerit, pro eius curatione aer eligatur ad calidū vergens. Somnus moderatus, ac moderatum exercitium. Cibi in quantitate modici, & boni succi, in qualitate verò ad calidum vergentes, qui & vrinæ quoque cienda facultatem habeant. Propterea cum eis vtdum est oreoselino, apio, feniculo, asparago, dauco, & reliquis similibus: qui item cum aromatibus præparantur, cinnamomo videlicet, caryophyllis, macere, galanga, zingibere, necnon & aniso. Vino quoque vrantur calidiori, imò etiam eo, quod cum aromatibus quibusdam est compositum, quemadmodum id est, quod vulgus Neapoli hypocrasium appellat. Cōpetit quoque & aqua mulsa cum aromatibus quibusdam parata. Pro medicamentis, eis vrantur, quæ calfacientibus, ac vrinam ciendi vim habent, ut diximus, quemadmodum est scordij, & artemisiz decoctū, hyssopi, pulegij, feniculi, origani, vel thymi cum aqua mulsa: nec minus interdum theriaca, aut mithridatum, diagalanga, aut diacinnamomum, aut diacalamentum, aut dianisum præberi poterit, prædictorum scilicet drachm. j. assumens cum vini albi vnc. iij. aut tantundem prædictæ aque mulse. Extrinsecus quoque fouendæ sunt partes circa vesicam ex decocto pulegij, sampluchij, origani, & foliorum rutæ, calaminthæ, florum chamæmeli, & fenugræci. Fiat autem quandoque decoctum, nedum in aqua, sed etiam in vino albo, aut in duabus partibus aquæ & vna vini, prout magis expedire videbitur. Ex quibus quoque infusus parari poterunt. Item eadem partes illinendæ oleo anethino, chamæmelino, rutaceo, irino, nardino, de castoreo & reliquis similibus. Clysteres quoque iniiciantur ex florum chamæmeli, pulegij, furfuris, ac caricarum decocto, pauco sale communi addito, ac vnc. 4. olei rutacei, anethini, vel irini, & vnc. 2. mellis rosacei, ac mellis communis despumati adiectis. Vbi verò cum frigida intemperie simul pituitosi succi redundarint, nedum in vesica, sed in toto corpore, priusquam ad iam dicta medicamenta deuenias, iidem cōcoquendi, præparandi, ac purgandi sunt. Præparantur autem melle rosaceo, oxymelite simplici, aut scillino cum syrupo è succo boraginis, vel è corticibus citri, & aquis feniculi, lupulorum, & melissæ, seu betonicæ. Purgentur verò agarico, pulueribus hierę simplicis, cassia fistula, diacath. seu confectioe dactylis. Vel si maius, catapotiis vtare foetidis, seu de sagapeno cum agarico permixtis. At si in vesica duntaxat prædicti succi redūdēt, benefacit etiam compositū oxymeli & mulsa, decoctum radices rhamni, ac origani, quod mirificè iuuat, ut inquit Alexander. Item vtridū est hyssopi, pulegij, origani, vel thymi decoctis cum aqua mulsa, ex Pauli auctoritate, interimque vtridum prædictis medicamentis extrinsecus adhibeās. Quod si ex flatuoso spiritu dysuria gignatur, quæ fla-

*Prognosis.
ca. Lib. 11. cap. 20.
Causa ex frigida intemperie oriatur, gendi difficultas.
Videtur.*

Atque meminerat.

Dupliciter.

De quibus.

Si cum frigida intemperie simul pituitosi succi redundarint, di quibus.

Quædam.

tum discutiant, medicamentis intus, & extra exhibitis vtendum erit, quorum copiam requirant studioli cap. de coli dolore. Ex ceteris item vesicæ intemperantiis, si excitetur, perpetuo eorum contraria medentur. Quapropter si in ardentibus, ac malignis febribus fiat vrinæ difficultas, fouendæ partes sunt imi ventris, pectinis, inguinum, & coxendicum oleis, superfusionibus, fortibus, ac cataplasmatibus, quæ laxandi, ac humectandi vim habeant cum exiguo, aut nullo calore. In quem vsum conuenit oleum chamæmelinum, anethinum, oleum commune dulce, fofus, ac superfusiones ex maluarum, althææ, ac fenugræci decocto: similiter & infusiones, quæ etiam salubriter in hydrelæo fient, ex Pauli testimonio. Et si alius quoque adstricta fuerit, prædictorum decoctum oleo communi, anethino, chamæmelino, aut amygdalarum dulcium addito iniicitur. Si verò difficultatis vrinæ causa fuerit inflammatio, abscessus, vlceratio vel quiuus alius tumor præter naturam, ex eorundem vitiis curatione, quorum in frequentibus mentionem facimus, curabitur.

Περί τῆς ἰσχυρίας, Id est, De suppressione vrinæ.

CAPVT XCIX.

VESICÆ insupers, velut vrinæ receptaculo, ac meiendi instrumeto id symptoma superuenire solet, quod à Grecis *ἰσχυρία*, à Latinis suppressio vrinæ dicitur, quinimò ipsi soli propriū est, Galeno teste sexto de loc. affect. cap. 3. Quod verò ischuria vrinæ suppressæ affectionē significet, ipsum nomen declarat. Aegris enim in totum in hac affectione vrina supprimitur, ac cohibetur, vt liquet ex Aetio cap. 21. lib. 11. Quanquam nos ex Galeni sententia, non quamlibet vrinæ suppressionem, seu cohibitionem *ἰσχυρίαν* appellamus, cum dixerimus eā solius vesicæ propriū esse symptoma, sed illā duntaxat, in qua in vesica vrina omnino supprimitur. Supprimi namq; potest vrina ipsa vesica haudquaquam affecta, sed renibus, vel vteris, eodem Galeno teste primo de locis affect. cap. 1. verum hanc vrinæ detentionem, seu cohibitionem (licet vulgus medicorum nō secus *ἰσχυρίαν* vocet) *ἰσχυρία* tamen non est, cum videlicet vrina in vesicam omnino non venit, vt liquet ex Galeno tertio de causis symptomatum. cap. 2. Permittendi tamen sunt (vt ipse inquit) ita nominare, cum propriam eius affectionis appellationem non habeant. Non tamē latere debet amborum affectuum differentia, si quidem alter eorum est cum vesica quidem est plena, sed nihil excernitur, de quo modò tractare intendimus, alter cum vacua est nihil omnino in se continens. Ea de re diximus veram ischuriam esse omnimodam vrinæ cohibitionem in vesica, quæ sola, & necessariò in hac affectione laborat, quoniam propria eius actio, quæ est vrinæ excretio, oblesā est adeò vt ab ea nihil excernatur, tumorque aliquis apparebit in pube satis euidenter in circumscriptione vesicam impletam esse ostendens, vt liquet ex Galeno eodem primo de locis affectis, cap. 1. Quod verò symptoma sit in genere retentorum immodicè, testis est idem Galenus libro de different. symptomat. cap. vlt. & tertio de causis symptomat. cap. 2. In totum etenim vrina detinetur, atque supprimitur. Id verò bifariam fieri potest, decreto eiusdem Galeni eodem tertio de causis symptomatum, & primo ac sexto de locis af-

fectis, quoniam vel occlusum est eius os, vel si hoc se pro lege naturæ habet, ipsa ad sese adstringendam, ac lotium foras extrudendū est imbecilla. Quæ de re hic affectus cum plena vesica vrinæ est, eadem que supprimitur, interim noxam propriæ functionis eius consequitur, quoniam præter imbecillitatem non valet seipsam contrahere, ac vrinam foras propellere, interim verò eadem illa existente, occluso tamē eius ore efficitur. Redditur autem in lotio excernendo vesica ipsa imbecilla in hac affectione dupliciter, vel propter quampiam eius intemperiem, præsertim frigidam, vel obtuso eius sensu: ita vt laborans vesicam impletam vrina non sentiat ob affectos eiusdem vesicæ nervos, citra tamen expultricis eius facultatis læsionem, cum videlicet propriæ vesicæ nervi afficiuntur. Tunc etenim immodicè extensa ipsa vesica propter vrinæ multitudinē, quam in se continere nō sentit (inter dormiendum potissimum) seipsam contrahere non valet, nihilq; excernitur, contractrice eius facultate læsa propter immoderatam tensionem. Id quod etiam interdum euenire solet aliis quibusdam sanis, cum vrgentibus negotiis, vel in concionibus, vel senatu, vel foro, vel conuiuio, vel propter aliquam similem causam longo tempore vrinam retinuerint; fuit etenim & vesica ipsa velut quodlibet aliud naturale instrumentum neruorum particeps, vt quæ molestiam sibi exhiberent sensu quoque, velut reliqua dignosceret; quibus adeò affectis, vt torpeat vesicæ sensus, quod immodicè repleatur, ac immoderatè extendatur vesica accidit: quapropter & contractrix eius facultas læditur, quoniam in seipsam contrahi mediis transversalibus fibris, quibus in tali actione vtitur, haudquaquam potest. Quo fit vt vrina supprimitur, neo excerni quicquam eius possit, citra tamen expultricis facultatis læsionem: namque ipsa expelleret, utiq; si contractrix facultas, quæ excretionem præcedit, suum munus perficeret: quippe vesicæ officium (vt patet eodem sexto de locis affectis cap. 3.) vnicū est, contractio inquam: imbecilla itaque redditur vesica in hac affectione, aut ad sese cōstringendam, aut ad lotium foras excernendum, eius corpore adeò affecto, vt quod in ea continetur, exprimere non possit. Verum primi causa est immoderata extensio propter immodicam repletionem, quinimò quantum amplitudo ipsius vesicæ expleta circumdenditur, tantum angustior seipso fit meatus, vt inquit Aetius, reliqui verò intemperatura aliqua, sæpissimè autem frigida. At si ex occluso eius ore, seu meatu, quem vrinæ fistulam vocant, vrinæ suppressio fiat, in vniuersum tribus modis fieri potest: aut enim corpus ipsius in tantum tumorem præter naturam attollitur, vt meatus inde occupetur: quemadmodum si inflammatione, scirrho, vel abscessu, vel alio quouis tumore fuerit affectum. Interim & clauditur propter meatus conuiuentiam ex nimia siccitate, aut aliquid ei præter naturam innascitur, velut caruncula, vel callus, aut à re quapiam obstruitur meatus, veluti à lapide, pure, grumo, vel crasso, lentoque humore. Quæ de re hæc omnia distinguere oportet, non solum ex præsentibus symptomatibus, sed etiā iis quæ præterierunt. Præsentia ex teipso inspicias oportet. Præterita verò non solum à laborantibus, sed etiam à ipsius familiaribus interrogando perdiscere, ex Galeni auctoritate primo de locis affectis, cap. 1. Vbi autem ex vesicæ imbecillitate orta fuerit vrinæ suppressio, sic percipias.

Kk 2

6. de locis
affect. ca. 3.
Causa.
Vesica bi-
fariam in
hac affe-
ctione im-
becilla red-
di potest.

Lib. 11. cap.
21.
Ex quibus
et quod eius
sit vesicæ os
occludatur.

Duplex is-
churia.

De qua tra-
ctatur.
Quæ pars
in ea affe-
ctum.

Quæ affe-
ctum præter
naturā sit.

Si ex vesica imbecillitate oritur suppressio urinae, signa.

nam si hominem ita figuraueris, ut declivis sit cervicis vesicae positus, ac manibus tumorem præter naturam compresseris, utique expelletur urina: quemadmodum si ita nihil profeceris, urinae fistulam constipatam esse cognoscēs. Verum nunquid expultrix duntaxat facultas ipsius fuerit oblata, vel torpidus fuerit ipsius vesicæ sensus propter proprios eius nervos affectos, adhuc non liquet, sed illud hoc pacto distingues. Nam si propter excreticis facultatis læsionem originem sumperit, cum fieri non possit, nisi propter aliquam intemperaturam, præsertim frigidam ipsius vesicæ, ex propriis intemperaturæ indiciis, quæ præcedenti capite notauimus, haud

Si ex obtusosensu vesicæ sensu oritur, signa.

agrè dignoscere valebis. Quod si nullum tale affuerit indicium, præcesseritque læsio alia spinalis medullæ, ut verbi gratia, si fuerint ipsius ad externas partes vertebræ luxatæ eo loco, quoad vesicam proprii nervi distribuuntur: similiter si quomodolibet prædicti nervi fuerint affecti, ita ut animalis facultas ad vesicam non pertingat, ex obtuso, seu resolutio eius vesicæ sensu causari urinae suppressionem censeto, propriis vesicæ nervis affectis, atque ipsa propter immodicam repletionem immoderatè extensa.

Si ex externa causa aliqua.

Verum si sanis quibusdā corporibus urinae suppressio accidat, propterea quod longo tempore propter aliquam urgentiam ipsam detinuerint, ex eorundem loquela, & quod nullus alius præcesserit præter naturam affectus, qui ipsam cohibere poterit, facile percipies. At ubi urinae cohibitio non ex corpore eiusdem affecto, seu imbecillitate proveniet, sed occluso eius ore (ut diximus) figurato etiam ægro adeo ut declivis sit cervicis vesicæ positus, ac manibus tumore præter naturam compresso, minime expelletur urina. Occluditur autem vel ab inflammatione (ut dictum est) vel scirrhus, vel abscessu, vel alio quouis tumore præter naturam. Sed inflammatio ex propriis eiusdem signis, tumore videlicet, dolore, ac febre, & reliquis dicendis cap. proprio dignoscetur. Similiter scirrhus, vel abscessus, aut alius quivis tumor præter naturam. Si autem ob carunculam aliquam ab ulcere innatam vesicæ cervix obstruatur, ex præcedentibus vlcis notis, & ex eo, quod demissa aenea fistula, urina vacuatur, intelligere possumus. Interim cum urinae excretionem sequuntur & cruor, & carnis fragmenta, Galeno teste primo de locis affectis. Verum si fuerit tophus, seu calculus in cervice vesicæ innatus, præter id, quod longo temporis spatio ex crasso, lentoque humore paulatim nasci potest, neque fortè vlcis signa præcedent, neque ortæ carunculæ signa aderunt. Quod si à lapide meatus obstruatur, ante urinae cohibitionem lapidis indicia apparuerunt, urina videlicet aquæ similis, in qua subsident sabulosa quædam, insuper quod pudendum assidue scalpant taliter affecti, postea verò urina de repente supprimitur, aliæque signa præcesserunt generati lapidis, aut in renibus, quæ eodem capite conscripsimus, aut in vesica, quæ proprio capite conscribemus. At nulla lapidis nota retentam urinam præcedente, si sanguis effluerit, par est, ut grumus urinae fistulam obtureret, quocirca demissa per eam fistula, paulum urinae reddunt; qua deinde extracta, in ipsius ore grumi indicium apparet; quanquam fieri possit, ubi vlcera fuit vesica, ut paulatim in ipsa grumus crescens, vel non præcedente sanguinis fluore, ex eiusdem Galeni sententia primo, & sexto de locis affectis, ad quos grumos, qui in vesica continen-

Signa, si ex occluso ore vesicæ urinae suppressio.

Locus citatus.

Locus citatus.

tur, veluti etiam ad alios, qui in intestinis, ventriculo, atque thorace, animi defectio, & color pallidus sequi solet, pulsus verò parvus, obscurus, frequensque apparet, & laborans ipse cum anxietate resolvitur, adeo ut mirari aliquis possit, quænam sit huius euentus causa, ut eodem sexto de locis affectis, cap. tertio, scriptum est, quam nos brevitati indulgentes omittimus, potissimum cum studiosi apud eundem Galenum præcitato loco, libro de cibis boni, & mali fucci, cap. 3. ac aliis plerisque perlegere eam possint. Probabiliter quoque conicies cum pus eundem meatum obstruxerit, si renes, aut vesica, aut alia quæpiam pars, quæ per vesicam expurgari potest, ante affectu aliquo laboraverint, per quem talem, tantumque pus colligi poterit, tenueque pus prius cum urina profluere visum est, quemadmodum ubi ob crassum, lentumque humorem obstruatur, eiusdem humoris redundantis indicia aderunt, quæ nos cap. de difficultate urinae adnotauimus, similiter ex præcedentium notitia in huiusmodi coniecturam inducimur, ex præcedenti videlicet victus ratione, nam cibus crassus, lentisque, ac multis, & in ocio educatus est æger. Neque negligenda erit uniuersi corporis dispositio. Conniueat autem iam dicto meatu ex immodica siccitate, exsiccantes quoque causæ præcesserunt, veluti contingit in ardentissimis, ac siccissimis febribus, in quibus laborantem sæpenumero nec loqui posse videmus, nisi os madefecerit. Porro urinae suppressionem, quæ ob fauciatam spinam, aut casum, aut vertebræ luxationem, aut ob lætales accessuum concursus suborta est, impossibile est curare. Quare cautè remedia adhibere oportet, ut inquit Aetius cap. 24. lib. II. Idem quoque auctor citato loco dicebat, quod cum ex his, qui paralyti exoluta vesicâ habent, alij præter voluntatè urinam emittunt, alij autem lotium non excernunt, minus periculo sunt obnoxij, qui præter voluntatem eam emittunt, ac magis hi, quibus detinetur, nam lotio suppresso vesica, & lumbi eis distenduntur, similiterque pecten, femora autem tumefacta habent, & cum non eiciant lotium, subiecta membra mortificantur, neque ita longè post moriuntur, ut ipse inquit. Quod verò perniciofa etiam sit urinae suppressio ex concreto sanguine, seu grumo, decretum reliquit Gal. 6. de loc. affect. Nam & putredo partium, & marcor ipsum sequi solet, ut ipse inquit, & licet nonnullis medicamenta exhibuisset pro eius curatione, nihilominus omnes perierunt, vno quodam seruato solutis grumis, quos paulò post cum urina excreuit. Curandi verò ratio non vna duntaxat erit, cum plures sint eiusdem causæ, sed pro causarum diuersitate variatur. Qua de re si propter vesicæ imbecillitatè generetur, citra tamen casum, relicta victus ratione quam cap. de stillicidio urinae reperies, primò figurandus erit æger modo, quo iuxta Galeni sententiâ, diximus, ac manibus tumor præter naturam comprimatur, ita ut urina expellatur, musculi quoque ab domis, maximè medij ægrotantis manibus, seu alterius comprimantur iuxta Gal. præcepta 6. de locis affectis. Deinceps assidui infusus, seu foris in scænugregi, feminis lini, althææ, rutæ, sampluchi, ac artemisii decoctum cum oleo eis apparentur. & loci ex oleo rutaceo calido sæpe per diem, & noctem, & maximè post infusum irrigentur, & perfundantur. Curbitur etiam locis affligantur, & cataplasmata imponenda ex cruda hordeacea farina, ex vino dulci, & mulso

Lib. II. ca. 24. & mulso, vt testatur Aëtius, praesertim si obtusus fuerit vesicae sensus. Insuper confert, si vnguento hoc irrigentur loci. Recipe olei nardini, coltini, & rutacei ana vnc. j. olei de scorpiionibus, & irini, singulorum vnc. s. mastiches, florum stēchadis ana drach. 2. castorei drach. i. sagapeni, & bdellij ana drach. s. dissoluantur gummi in vino albo, & addita cera fiat vnguentum. In hunc etiam vsum confert vnguentum, dialthaea dictum, & reliqua medicamenta conscripta capite de difficultate urinae tam intus, quam extra adhibita. Et vbi propter agrum vesicae sensum contigerit, praeter infusus, ac irrigationes iam dictas excitare eius actionem oportet, nitro, aut nitrifumina ad meatum admotis, aut cimicibus contritis. Quod si ita non procedat, ad catheterum vsum confugiendum, & per hoc ipsum instrumentum immisissum urinae proleatandae Aëtio teste. Urinam ducta nequaquam bibant, ne multitudine eius vesica distendatur: quibus etiam confert castoreum, itemque theriacam in potu propinare, & post euacuationes, sinapis tum pectini, tum lumbis optimi sunt, vt eidem Aëtio visum est: quibus cerata, quae partes mitigent, & malagmata odora imponantur, vt ipse inquit, viscera quoque ei inaccitereltris exsiccata, ac suffusa, agro vndequeque contexto, urinam supressam sanant. Oportet autem ipsa sale condire, ac exsiccare, quin & in potu accepta sicca, trita quantum tribus digitis apprehendi potest, ex vino iuuant. Carnis item erinacei in sole exsiccati drach. i. in vino data confert. Vermes quoque terrenos tres, aut quinque tritos ex vino mulso, aut aqua multa prebeto, eiusdem Aëtij praecepto. Item forinsecus artemisiae folia cum myrrha trita, pectini, & imo ventri illinantur, seu perdicium herbam terito, & affuso oleo feruefacito, atque vesicae imposito: sed & sedes quoque his illinenda est, quibus obtusus est vesicae sensus, ex decocto origani, thymi, anethi, ac centaurij cum oleo rutaceo pauco admixto castoreo. In fundimus etiam per colem oleum rutaceum de scorpiionibus, aut nardinum, seu irinum, etiam pauco castoreo addito, vt vesicae actio reuocetur. Si verò crassi humores in causa sint, fomentis infesionibus, ac cataplasmatibus iam dictis, cura concredenda est, ac reliquis vtendum, quae capite de difficultate urinae conscripsimus. Ab his autem quae urinam ciunt, in totum abstinendum. In sanis autem, si accidat (vt dictum est) ob negotiorum importunitatem, aut aliquod tale simile, vt lotium diutius retentum vesicam debilem reddat, auxiliari oportet ipsis ambabus supra inum ventrem admotis, ac urina lentē expressa in ardentissimis, ac acutissimis febribus si hoc symptoma accidat, in fine praecedentis capitis curatio nem reperies. Si verò propter inflammationem, aut alium quempiam praeter naturam tumorem urina supprimatur, ex propriis eorundem capitibus curatio petenda erit, quemadmodum si ob carunculam, aut callum retenta fuerit, per emollientia, ac relaxantia remedia, ac urinae fistulam dilatantia curanda erit, & vbi ea non suffecerint, aenea fistula, seu argentea demittenda erit, vulgus syringam vocat. Vbi verò multitudo, ac crassities puris vesicae ceruicem obstruxerit, per eadem medicamenta mollientia, ac relaxantia, necnon & incidentia cura tentanda erit, intus, & extra huiusmodi medicamentis adhibitis. Quod si nec his finem assequaris, modo dicta aenea, seu argentea fistula immittenda erit. At si ex lapide

vesicae ceruix fuerit obstructa, ex proprio cap. curandi ratio petatur. Verum vt lapis ex meatu recedat, supino figurato agro, vt crura reliquo corpore sint sublimiora, multatariam ipsum coecuties, quibus peractis iube vt aeger urinam reddere tēter. Quod si nihilominus urina adhuc supprimatur, rursus concute sed vehementius, atque si sic quoque permanserit, demissa aenea fistula, simul & lapidem a ceruice repelles, & urinam reuocabis, Galeno teste i. & 6. de locis affectis. Vbi verò grumus vesicae fistulam obturet, medicamentum quod lapidem terere possit, ex oxymelite, atque ipsum quoque oxymel per se in potu dandum erit, praeccepto eiusdem Galeni praecitato libro sexto de locis affect. cap. 3. Artemisia quoque in potu praebenda est, rubi, aut betae succus, leporis coagulum, aut hordei, vnumquodque cum acetum mulso, ex Aëtij auctoritate cap. 27 libri II. Quod si hoc modo nihil proficias, necessitate inducet catheteris adhibendi: per quem vbi urinas eduxerimus, rursus praedicta in potu exhibeantur. Si verò neque sic grumi dissoluantur, intercapedinem inter anum & pudendum (Graecis dictam) inferne dissecare oportet, vt eidem Aëtio visum est.

Id est, De his qui in seipsis vringunt, vel de his qui urinam continere non possunt.

CAPVT C.

LICE T. musculi, tanquam motus voluntarij instrumenta à natura fabricati fuerint, nihilominus & quidam eorum quodammodo inter alimentum instrumenta, quae tertia ratione superfluum inquam gratia fuerint constructa numerari possunt, quoniam excernendis excrementis fuerunt destinati, Galeno teste 5. de vfu partium, qui adhuc genere duplices sunt: quoniam alij tempestiuum effluuium incitant, alij verò intempestiuum ipsorum cohibent. Excitant autem in tempore musculi omnes epigastrij, intempestiuē quidem effluere non sinunt, & musculus qui transuersus rectum intestinum fortiter claudit, & is qui vesicae collum similiter circumambit, obliquus admodum existens, quauis ille claudendi duntaxat meatus gratia extiterit, hic autem priori quidem ratione, vt contractus vndique depellat quicquid in ipso meatu continetur, constructus est, posteriore autem vt ipsum claudat, eodem Galeni auctore praecitato libro 5. de vfu part. cap. 16. quo loco concludit triplicem praedicti musculi vsum, quorum primus est, vt nihil in meatu urinario relinquatur, secundus, vt ori vesicae claudendo opituletur, & tertius, vt excernendorum celeritate acceleret. Quapropter mirari non oportet quomodo per bonam valetudinem, volentibus nobis, urina excernatur, cum videlicet musculus iam dictus ceruicem vesicae circundans voluntatis nostrae imperio obtemperans ab actione quiescit, fungente autem tum vesica suo munere, in excernendo naturaliter agens: & proinde Galenus 6. capite 3. de locis affectis tum eos condemnat, qui urinarum, ac cibi excrementorum deiectionem totam ab deiectione procedere existimarunt, tum eos qui huius diuerso totum hoc corpus naturale putarunt, tanquam à veritate deviantes. Nam alui deiectione, & urinae redditio vtroque instrumento propriis suis facultatibus agente perficiuntur, rectum intestinum, atque vesica naturali quidem vtriusque cultate, musculi verò ea quae & animalis, & volun-

i. de locis affect. cap. 1. 6. de locis affectis cap. 3.

Loco cit.

cap. 14.

Musculi vesicae ceruicem ambiens vtriusque non vultus est.

Quod urinae redditio non sit opus naturale, nec animalis, sed duntaxat, seu mixtum ex vtriusque.

taria nominantur. Tunc verò quiescunt ab opere musculi hi, qui fluores cohibere solent, cum abdominis musculi munere suo funguntur, maxime verò medij, opus autem horum est, ut adeò exactè extremam recti intestini partem, atque vesicæ cervicem stringant ipsas partes ambientes, ut nihil humoris ex vesica in meatum ingredi possit, neq; per alium sterces excerni, licet hic secundus sit musculi cervicem vesicæ ambiens vñs, ut dictum est. Quiescimus itaque voluntariè ab horum actione, cum urinam, vel sterces excernere propositum est. At si præter voluntatem excernatur urina, nam de hoc affectu tractare intendimus, vesica ipsam retinere nequeunt, Symptoma oritur, quo affectus *involuntarius* Paulus appellat, à Galeno verò 6 de loc. affect. *ἀκούσας ἐν νεύροις τὴν ὕπαινον* nuncupatur affectus hic. Sed à Latinis vñng incontinentia, seu præter voluntatem excretio. In quo affectu vesica urinam retinere non potest, sed præter voluntatem paucis omnino intervallis excernitur, ut liquet ex eodem Galeno ibidem. Quod verò in prædicto affectu vesica ipsa afficiatur non secundum propriam eius essentiam, seu corpus, sed secundum iam dictum musculum eius cervicem stringentem citato loco ab eodem Galeno scriptum est, cum dixit, quòd si nervi musculi cervicem vesicæ ambientis resoluantur: proprium indicium, quòd musculus hic resolutus sit, est urina præter voluntatem excretio. Verum cum hæc affectio voluntaria musculi læditur, nò perpetuò ipso per essentiam affecto læso excitatur, sed quandoque per consensum nervi scilicet, per quos animalis facultas ad ipsum fertur, oblaesit. Nam cum vñca duntaxat perit actio voluntaria, solum musculus, qui ipsam efficere solet, aut nervum ipsius affectum esse putandum est, eodem Galeno auctore 4. de locis affect. cap. 4. Verum nūquid musculus, aut nervus, qui ad ipsum pervenit, vel ambo simul affecti sint, haud facile percipi poterit, nisi quispiam copulata symptomata attentè deprehendat, & ea quæ præcesserunt, optimè inuestiget. Nanque musculo affecto circa cervicem vesicæ, eius affectionis signa aderunt. Et si intemperie duntaxat laboret, frigida videlicet ex aliqua tali procatartica causa, quæ fortè præcessit, ac reliquis signis percipi poterit, veluti & Gale. percepit in piscatore quodam, cum in fluviò pisces venaretur: adeò enim hic circa sedem, & vesicam infrigidatus erat, ut in ipso invito effluerent & alui excrementa, & urina, hunc curavit per calida remedia affectus musculis adhibita, & celeriter sanus evasit, ut ipse inquit eodem 4. de loc. affect. cap. 4. Quòd si nequaquam symptoma aliquod apparuerit eo loco, quo prædictus musculus positus est, neque talis aliqua externa causa infrigidans præcesserit, prius nervos eiusdem musculi affectos esse à quapiā interna causa coniiciendum erit circa os sacrum ortos, quem etiam affectum multo tempore per multa præsidia vix idem Galenus sanavit, quamquam ipsis etiam nervis primariò affectis, adeò vt facultas animalis per eos ad musculum pervenire non valeat. Musculum quoque per consensum affici dicimus, cum privetur eo, quo præsentem suum munus perficiebat. Id verò est animalis facultas propterea hunc musculum perpetuò in urina involuntaria excretionem per essentiam, aut per consensum affici dicimus, idque proprium esse signum quòd ipse læsus sit. Sed mox obiciet quispiam asserens falsum esse quòd perpetuò resoluta vesica inuitis nobis vri-

Dubium.

na excernatur, nam cætesoluta (ut inquit Paulus) capite decimo octavo tertij libri, & Aëcius capite 34. libri 6. interim involuntariè urina excernitur, quandoque verò omnino detinetur, nisi esset quòd fecus hi quàm Galenus de vesicæ resolutione verba faciunt, nam ipsi commune caput scripserunt de vesicæ resolutione, tam si fiat eius essentia, seu corpore, aut propriis nervis ad eam distributis oblaesit, quàm si musculus eius cervicem ambiens, aut nervi ad ipsum devenientes resoluti fuerint. Galenus verò particulatim utramque pertractat, cum vna improprie (vt ita dixerim) resolutio dici possit, quando videlicet vesicæ substantia, aut eius proprii nervi affecti fuerint, quoniam tunc non motus, sed sensus duntaxat ipsius auferitur. Quapropter rectius obtusus, seu ablati eius sensus diceretur, quàm resolutio. Quo casu ischuria generatur, vt præcedenti cap. ostendimus. At si nervi qui ad musculum distribuuntur, aut ipsemet musculus, adeò afficiantur, vt eius actio omnino auferatur, tunc proprie resolutio dicitur, & proprium indicium (vt ipse inquit) quòd musculus hic resolutus sit, est urina præter voluntatem excretio. Et propterea affectio hæc cum symptoma sit in genere excretorum immodicè, perpetuò noxam functionis consequitur, non siquidem naturalis facultatis ipsius vesicæ, sed animalis prædicti musculi, quæ neque malè sit, diminutè, aut depravatè oblaesa, sed nullo modo sit, & ablata est: nihil etenim in retinendo vesicæ opitulatur, animali facultate motrice voluntaria omnino privatus, ac destitutus. Indicium autem eius est, quòd vesica haudquaquam urinam retinere potest, sed inuitis, & præter voluntatem paucis omnino intervallis ipsa excernitur. Huius affectionis causæ plures esse possunt, cunctæ videlicet, quæ prohibere possunt animalis facultatis transitum ad prædictum musculum, quas omnes cap. de resolutione conscripsimus, & propterea non est, cur hic iterum eas repetamus, cum exinde studiosi petere possint. Quòd verò pueris maxima ex parte solet affectio hæc accidere, 45. cap. 3. libri, Paulus scriptum reliquit. At quòd si ex aliqua externa causa generetur iam dictus affectus, musculo infrigidato celerius curatur, quàm si citra manifestam causam proveniat, læsis eiusdem musculi propriis nervis circa os sacrum, 4. de locis affectis cap. 4. à Galen. scriptum est. Eos item, qui urinam sine voluntate emittunt ob cervicis vesicæ vulnus, aut casum, aut vertebræ luxationem superuenientibus, quæ mortem patentibus notis, nulla medicina periculo subtrahit, vt idem Paulus testatur cap. 18. libri 3. Ceterum quoniam sæpius ex frigida prædicti musculi aut nervorum ad ipsum devenientium intemperie affectio hæc originem ducit, interim per se, quandoque verò cum frigidorum succorum redundantia, propterea curandi rationem eius cum ex hac causa excitetur, conscribere institimus. Qua de re aer ad calidum vergens eligatur, somnūque modicus, nam similiter moderate vigilæ conferunt. Ocium, ac desidiosa vita vitentur, moderatum exercitium cōfert alui deicctio singulis diebus procuranda erit, si non natura, saltem arte, clysteribus, seu glandibus. Cuncti animi affectus vitandi præter iram, quæ interim confert. Cibifacilis coctionis, ac boni nutrimenti eligantur, ad calidum etiam vergentes. Propterea pullorum, gallinarum, perdicum

Solutio.

Lib. 3. c.

Lib. 11.

24.

Medic.

mentoru

ratio.

Lib. 3. c.

Qui aff.

fuit per

naturam

vñng

continua

Causa

Prognosi

ca.

Curatio

Lib. 11.

24.

Medic.

mentoru

ratio.

CAP. CI.



V E M A D M O D U M in renibus

ita quoque in vesica, affectus quidam, qui a Græcis λιδίασις, à Latinis lapidatio, seu calculosus affectus appellatur, gigni solet, velut à Galeno scriptum est, primo de locis affectis capite primo & ab Alexandro libro nono cap. septimo. Quod verò vesica hoc morbo laboret, hisce notis deprehenditur, nam vrinae cruda, & colore subalbida conspiciuntur, sedimentum est arenosum, & scabiei simile, præterea agri pudendum scalpere aut id violentes, & sæpe distendere solent, atque tunc magis cum ad vrinarum excretionem virgentur, ut inquit Alexander. Continuè quoque in vrinam propelluntur, ac succidit vexantur, Paulo teste capite 45. libri tertij. Interim quoque vrina derepente eis supprimitur, præsertim ubi lapis in vesica ceruicem incidit, ut liquet ex Galeno eodem primo de locis affectis, capite primo. Quamvis Hippocrat. aphorism. 79. libro quarto vno duntaxat signo hunc affectum dignosci scriptum reliquit, cum dixit, In quorum vrinis, velut arenulae subsistunt, his vesica laborat calculo. Verum cum hoc indicium commune sit, tam vesica, quam renibus calculo laborantibus, ut liquet ex Galeno eodem loco, propterea addendam esse alteram apho. partem præcepit, pro apho. veritate. Prædictis itaque notis tum partem affectam, quæ vesica est, cum etiam & qualitatem affectus, qui calculus seu lapis dicitur, dignoscere poterimus. Quod verò morbus sit in numero, ac in excessu, cap. de renum calculo dictum est, toto etiam genere præter naturam, ut liquet 14. metho. meden. cap. 13. Cæterum quod prima, potissimæque causa sit vrinarum crassitudo 6. de morbis vulgaribus à Galeno scriptum est, huiusmodi namque crassitudo multa in vesica collecta, & in vnum coeans, cum semel aliquando non apto tempore excreta intus diutius remanserit, concresecendi, coaugmentandique initium capit, eo verò principio facto, facile quod iam superest quicquid iterum crassi in vesicam delabitur, priori adglutinetur, maiorque inde tophosus calculus redditur, quemadmodum extra, & in calidis aquis sponte nascentibus, & in natis, ubi calescit aqua, quotidie lapis coalescere cernitur. Opitulatur autem non parum in hoc vesica ipsa, ut quæ frigida sit, nervosa, ac pauci sanguinis, necnon amplissima interius concavitate inanis. Vbi etenim in ipsam fuerit crassitudo transmissa, ibi cogitur, & conspissatur, initium huius conspissationis (ut diximus) accipiens, quando in eadem vesica diutius commoratur. Præcipua itaque, ac potissima causa generationis calculorum in vesica est ipsa qualitas materiae, crassitudo inquam vrinarum, ex Galeni testimonio. Id quod confirmavit Alexand. citato loco, cum dixit, Veruntamen vesicae calculi pueris magis, quam viris generantur, neque à tanta caliditate, sed materia potius crassiore, & ad generandos calculos promptèque ab insita caliditate concresecendos idonea. Atqui caliditas ad coaugmentandum lapidem etiam non parum operatur, licet non ipsa præcipue, sed materiae qualitas ipsius compactionis causa existat, ut diximus, ex Galeni sententia citato libro sexto de morbis vulgaribus. Et propterea quivis calor etiam mediocris, ut in pueris reperitur, ad huiusmodi materiam spissandam satis est, nedum asciticus, ac igneus, nanque

Vesica calculo laborantis signa

Qui affectus præter naturam sit.

6. de morbis vulgaribus commentario 1. commentum 15. Materialis causa generationis lapidis in vesica.

Efficiens causa.

perdicum, phasianorum, ac aliarum parvarum avium carnes eligenda sunt, quæ perpetuo cum aromatibus condenda erunt, similiter in earum iure hyssopi parum, sampuchii, salviae, laureia, seu serpilli, fœniculi, seu orefelini incoquantur. Interim eisdem carnibus affatis utantur, nam sicci cibi eisdem competunt, ut inquit Paulus. Pro potu aqua mulsæ exhibetur, vel vinum subrubrum, adstringens, potissimum eis, qui ab eo se abstinere non possunt, & (ut summam dicam) vniuersa victus ratio calidior, & siccior sit, ut inquit Aëtius, nisi acriores, & mordaciores appareant vrinae. Quod verò ad medicamentorum rationem attinet, quoniam communia habet auxilia hoc vitium cum ischuria orta ex torpore vesicae sensu, seu eius resolutione, eodem Aëtio teste cap. 34. libr. 6. idcirco eisdem commodè utare. Et si resolutionis causa frigidi, & crassi succi redundantes fuerint, eis quoque utendum erit medicamentis, cum alterantibus, tum purgantibus, quæ cap. de resolutione probauimus. Vitanda itaque sunt medicamenta, quæ refrigerant, potissimum ea in quibus valida est hæc vis, & calidis fouendi sunt agri, ac roborantibus potissimum (Paulo auctore) exempli gratia cœleæ calido, & similibus. Naturaliter autem huic vitio opitulatur (eodem auctore) gallinæ guttur combustum, si ieiunio bibendum in aqua tepida præbeatur. Similiter leucanthei flores, vel leporis testiculus tostus, ex vino odorato: potio item calamintæ, & myrrhæ ante cenam salutaris est, ut idem inquit Paulus, præsertim si cum vino odorato præbeatur, Aëtio auctore. Cæterum ex Aëtij sententia eos, qui præter voluntatem vrinam emittunt, per mordacia cataplasmata, & malagmata, & per rubefaciencia ex sinapi apparatus curare conuenit, similiter ex arenæ iniectione à sole feruefactæ, aquisque naturalibus, & maxime sulphurentis, & bituminosis, primum quidem calidis, postea etiam frigidis curandi sunt. Necnon & partes exercendæ, ac perficandæ. Vrinam autem ducentia nequaquam exhibeantur, eodem auctore. Ad eos vero, qui se in somno permittunt, conuenit ex sententia eiusdem Aëtij pulmo hædi moderatè affatus, & citra panem largè ad triduum in cibo acceptus. Similiter leporis cerebellum siccum potatum ex vino, aut testiculum leporis siccum in vinum indito, & bibendum dato, ut ipse refert. Vesica quoque porcina per se vsta, & in potu exhibita iuuat. Simili modo & ouilla vesica facit, cinerem itaque eius ex posca præbeto. Item confert si castorei drachm. 1. in vino odorato in potu exhibebis. Eandem vesicam ouillam seu caprillam vstam ex posca Galen. 9. de compositione medicamentorum secundum loca præbet bibendam. Necnon & leporis testiculum in vino odorato feruefactum, oblinereque iubet pudendum cimolia terra cum perdicij succo. Cum verò diurnum, & inueteratum fiat hoc malum, velut eos qui præter voluntatem ob resolutionem vesicae vrinam emittunt, hos curato; differunt etenim ij ab illis, in eo quod iis per somnum saltem hæc accessio contingit, illis verò quibus ob musculi colli vesicae resolutionem hoc accidit, etiam dum vigilat eodem modo afficiuntur, ex sententia eiusdem Aëtij cap. vigesimi quinti libri II.

Περί λιδίασις τῆς νήσως.

Id est, De lapide vesicae seu calculo.

Commen. 3
commen. 15
Causas
calculi non
generatur.

Cur in pueris
magis
quàm in adultis
vesica lapide
generetur.

Commen. 3
commen. 15
Lib. 11. c. 9

6. de mor-
bis vulg. lo-
co citato.

opus est, vt & ipse aliquid faciat ad coaugmentandum lapidem, etenim tenes humorem crudum non parum acervant, quanquam non propter edacitatem, vt pueri, sed propter potentia concoquentis imbecillitatem: quia tamen calorem adeo fortem non habent, vt ex materia crassa vaporem resoluens, lapidem generet, propterea in eis calculi non generantur, eodem Galeno auctore comment. aphorism. 23. tertij libri. Requiritur ergo & caliditas etiam pro calculis in vesica generandis, etiam si mediocriter fuerit, velut in pueris, quinimò in eis, magis quam in adultis, omnium medicorum consensu pro confesso habetur, lapides in vesica generari, propterea quod crassissima vrinæ à pueris redduntur, tum propter ipsorum edacitatem, tum quod à cibo ludentes, profluentissime que mouentur, lactentibus verò & materia ipsa occasionem præbet, lac enim natura crassum est, & ad calculos creando aptissimum, vt liquet ex eodem Galeno libro citato 6. de morbis vulgaribus, etiam cibis utcumque oblati, & nociui, vtuntur (vt inquit Aëtius) & neque horam cibum capiendi seruant ordinatam; quin etiam priusquam prior sumptus cibus concoquatur, alium ingerunt, & cum vehementius à cibo moueantur, crudus, & incoctus in venas distribuitur: cuius etiam euentus causa à Galeno primo de crisi bus cap. 12. talis assignatur. Nam cum vna ventriculi operatio non possit duobus similiter sufficere, augendo scilicet, & alendo, propterea antequam in ipso sufficienter alimentum sit coctum, ipsum ad se corpus trahit, atque hinc fit, vt plurimum crudi humoris coaceruet. Neque hoc satis esset pro calculorum in vesica generatione pueris ipsis, nisi omnes naturales actiones in eis validæ essent, ita vt humorum crassitudo funderetur, atque dissolueretur: contrario modo in declinantis ætatis hominibus, in quibus cogitur, atque inspissatur. Qua de re cum multus initus calor sit in pueris, & actiones firmæ: materia crassitudo attenuata in renes fertur, atque ideo facile in vesicam percolatur, haud parum (vt inquit Galenus) & actionum vi ad egressus celeritatem conducente, ac eorum corporum mollicie, vt testatur Aëtius. Exemplo sunt & exteriora quæcunque natura crassa per aliqua angusta transfundere volumus: nam quasdam eorum partes calore eliquatas facile peruadere conspicimus, quasdam non suas, neque eliquatas transire non posse cernimus, veluti pix, resina, seuum, cera, & mel: adde quod eadem materia crassa cum ab infuso calido in pueris magis elaborata sit, rationi consentaneum, vt tenacior euadat, nam quæcunque à calore in concoquendo mutantur, temporis processu lentorem quandam acquirunt, & si ab initio nullum habuerint, quo circa planè magis in vnum coeunt, densantur, atque coaugmentantur, nam inter æquæ crassa quod tenacius est, ad vniorem, spissitatem, & concretionem aptius habetur. Hinc non ab re cuilibet facile patere poterit quam ob causam, & si quibusdam adultis corporibus magna coaceruetur copia crassorum humorum, adsitque ascititius calor eorundem validus, in eisdem minus, ac perrarissime calculi in vesica generentur, sed in renibus potius, cum eadem materia non admodum elaborata dissoluta, ac fusa ad renes perueniat: & propterea non facile in vesicam percoletur, quinimò in eisdem magis cogitur, atque

inspissatur, ea etiam non ita celeriter distributa. Similiter cur pueris in vesica post mictum, adultis vero in renibus ante mictum calculi generentur. Ex his quoque patet eorum error, qui propterea in pueris calculos gigni in vesica asseriebant, quod itinera ob vasculorum exiguitatem angusta sunt, nam si ita esset, oporteret in renibus potius, quam in vesica calculos pueris creare: angusti enim per illos transitus sunt, vesicæ autem ceruix lata adeo in pueris est, vt cuiusque materia crassitudo per eam facile transmitti possit. Præterea neque in illis fortè, qui iam progressa ætate sunt (vt inquit Galenus) meatuum per renes angustia gignendis lapillis in causa est, sed & actionum infirmitas & crassorum succorum cruditas, vt ipse refert, At si obiciet quispiam asserens Hipp. aliud sentire de calculi in vesica pueri generatione 2. de natu. hum. cum ait. Nascentur etiam pueri calculi ob loci huius calorem, ac totius corporis, viris calculi ob corporis algorem non innascuntur. Dicimus nos Hippocr. non secus sentire, ac Gale. Nam quod efficiens causa generationis calculi in vesica sit puerorum calor, ambo consentiunt, nec idem Galen. abnegat etiam in ipsa vesica pro calculi generatione calorem esse necessarium, quinimò illud scriptum reliquit præcitato comment. aphorism. 26. 3. lib. licet 6. de morb. vulgar. dixerit opitulari in calculi generatione vesicam, vt pote quæ frigida, neruosa, & pauci sanguinis sit, & amplissima interius concavitate inanis. Nam relatione facta ad alias corporis partes, per quas humorum crassitudo peruadit, in pueris ipsa vesica frigidior existit, licet etiam sapte natura talis sit, cum hoc tamè nihil obstat, quod in ea pueris tantus consistat calor, quantus satis sit ex materia crassa vaporem resolueret, ac lapidem generare, quauis minor sit, quàm is, qui in iocinore, aut renibus consistit. In viris autem ac declinantis ætatis hominibus, quàm optimè Hippo. ob corporis algorem in vesica calculos haud quaquam oriri fatebatur. Nam quis veretur eos puerorum relatione natui calore frigidiores esse? licet ascititio calidiores: frigidiora namque hoc modo redduntur corpora cum primum eis incrementum consistit, nihilque corpus augetur, non ingenuus autem calor, qui in eis copiosior reperitur, causa est, vt materia crassitudo cogatur, atque inspissetur, & ita ad renes feratur, & propterea non facile in vesicam percoletur. Iure itaque propter ingenui caloris paucitatem virorum corpora relatione ad ea quæ puerorū frigida appellari poterunt, quæ iterum causa est, vt in eorundem vesicis calculi non generentur, vt dictum est. In vesica igitur pueris magis, quàm in ætate prouectis calculus concrefcere solet, ex communi sententia Græcorum ferè omnium auctorum, quinimò hunc proprium esse puerorum morbum Hippocrat. simul cum Galeno aphorismi 26. tertij libri, & secundo de natura humana, testati sunt. Si autem accidat quod genitus calculus in vesica per chirurgiam curari debeat, pueri vsque ad decimum quartum annum propter corporum mollitudinem facile curationem recipiunt, senes quod corpus ipsorum contumax sit, vix confanescunt; media vero horum ætates etiam in hoc medio quodammodo habent; Paulo auctore cap. 60. libri 6. & rursus (vt ipse inquit) facile sanantur, qui maiores calculos habent, propterea quod inflammationibus affuerunt, qui minores difficulter sanantur contrarias ob causas. Quo-

Curati
in
Locus
bis.

Med
mento
ratio.

Locus citatus
Dubium de
calculi generatione
in vesica
puerorum.
Tex. 11.
Resolutum.

Lib. 11
10.

6. de mor-
bis vulg. lo-
co citato.

Lib. 9

Tex. 11
Propositi-
ca.

Curatio. Quoniam verò communem habet hac affectio curandi rationem cum calculo renum, propterea eadem victus ratione utendum erit, quam ibi institui-
 Vilis ra-
 tio. mus; potissimum autem cauendum est à lacte ex Galeni decreto 6. de morbis vulg. necnon ab aquis impuris, & multo limo refertis, ac vehementer frigidis, ut inquit Aetius. Similiter & eisdem auxiliis uti conuenit, nisi quod validioribus ibi conscri-
 Medica-
 mentorum ratio. ptis uti oportet, indicatione sumpta à parte affe-
 Lib. 11. cap. 10. cta, & praesertim ab eius positu. Nanque crassitie, quæ potissima causa generationis calculi in vesica existit, per extenuantia occurrendum est, ne multa materia crassa congregetur. Quapropter validis, atque efficacioribus medicamentis præcitato cap. conscriptis utare; priuatim autem ubi ea non suffe-
 Lib. 9. cap. 7. cerint, ex Aëtij auctoritate, tanquam lapides vesicæ atterentia, & urinam ducentia, pharmaca hæc com-
 petunt, feniculi siluestris radix, graminis radix, artemisia, chamæmelum, amaracus, althææ radix, & semen fion, quod circa aquas nascitur, adiantum, finyrnij semen, rumicis radix, lapis spongiæ, lapis iudaicus recolithon dictum, asplenon herba, lithospermion, lapis qui ab ægris per locum eiectus est tritus, ac potatus, vermes terreni recentes co-
 cti, triti cum vino, vitis lachryma. Horum vnum-
 quodque (ut ipse inquit) cum vino albo datur decoctum, aut siccum inspersum, aut cum melle, seu cum quopiam ex vino, & melle potum. Danda etiam in potu ea quæ urinam cient, velut cucumeris semen, apij, petroselinum ac violæ albæ semen: & corporibus, quæ frigidiores habent temperiem, meon, plu, acornum, ac reliqua calidiora præbeto. Poterunt quoque ex eisdem varia medicamenta componi, aut prout vsus exigit, exhiberi cum vino albo, aut aqua mulsa, seu decocto asplenij, & radice graminis, aut etiam oxymelite. Ab extra A-
 Lib. 9. cap. 7. lexand. tanquam efficax auxilium longo tempore, & experientia prius inuentum, & comprobatum, caprillum seu hircinum sanguinem calidum extrinsecus illinitum commendauit, super vesicam impositum. Verum longè optimum esse fatetur, si in ca-
 lido balnei aëre ipsum illinas, atque ita deliges, id verò non modò semel, sed sæpe, & per intervalla. Quod si neque per hæc adhibita pharmaca lapis in vesica atteri possit, ubi meatum obturans urinæ suppressionem inducat, eo modo curari debet, quem præcepimus ex Galeni auctoritate cap. de ischuria orta ex calculo: & ubi ex multifaria concus-
 sione curari non valeat, catheterem immittere oportet. Sed si neque hæc suffecerint, ad sectionem transeundum erit, modo quo à Paulo præcipitur præcitato cap. 60. libri 6. Exacto autem lapide, & cicatrice vlceri obducta, ea victus ratio constituenda erit, ne eos renasci contingat, quam Aëtius in-
 stituit cap. 15. eiusdem libri vndecimi.

Περί φλεγμονῆς τῆς κύστεως.

Id est, De inflam-

matione vesicæ.

CAP. CII.

VESICÆ quoque interim vitia quædam superueniunt quæ cæteris corporis partibus communia sunt, veluti id est, quod Græci φλεγμονήν, Latini inflammationem nuncupant. Verum quid sit; in quo morborum genere reponatur, & à qua causa generetur, ac quis sit eius generationis modus, in præcedentibus locupletissimè dictum

est: neque enim quantum ad hæc spectat à cæteris inflammationibus vesicæ inflammatio differt. Reliquum est igitur ut ad eius indicia deueniamus in-
 Vesicæ in-
 flammatio signa. mul conscribentes quæ affectum ipsum, ac partem affectam indicant: testantur itaque eam communia inflammationis signa, & quædā propria: nā ardor dolorque cum grauitate circa pubem, ac inguina sentiuntur, febris aderit, mentis alienatio, vomitio bilis syncera, & urinæ reddendæ impotentia, ut inquit Paulus. Vigilant quoque, & delirantes aliena loquuntur, ac durus fit eis pecten & pubes vna cum vehementi dolore, & egerendi appetentia, velut in tinesmo fieri solet: quod verò egeritur, tenue est, & subsidentiā non habet: aliquando & inflationes sequuntur, & alius adstricta est, intestino recto ob inflammationem vesicæ compresso (Aëtio teste.) Inter omnes autem morbos, qui circa vesicā oboriuntur, grauissimus & maxime mortiferus inflammatio existit (eodē Aëtio auctore.) Hic sequitur quod, ut quibusdā visum est, inter omnes inflammationes in vesica ortas, ea letalior sit, in qua vehementior excitatur dolor, febris acuta magis, ac cum urinæ, tum alui deiectionis omnimoda suppressio: & e contra minùs letalis erit ea, in qua prædictorum signorum contraria apparebunt, etenim febris ex inflammatione vesicæ non absque ratione fit: & quantò illa maior est, & grauior, tantum augeri febrem contingit ex Gal. auctoritate com. aphor. 44. 6. lib. Quantum verò ad eius curationem spectat, paucò cibo, ac potu assuerandi sunt ægri. Potus autem sit aqua hordei, vel aqua in qua cinnamomi parum fuerit decoctum. Reliqua victus ratio è capi. de inflammatione renum petenda est. Cæterum quantum ad medicamentorum rationem attinet, primùm omnium alius leni infuso clystere subluatur, & post stercorum eductionem oleum chamæmelinum, anethinum, aut in quo semen lini, vel althææ, fuerint incocta in intestinum solatij, & leniendi doloris gratia, iniiciatur. Et si nihil aliud prohibeat, confestim in morbi principio sanguis detrahendus est, ex Aëtij, & Pauli decreto. Verum quæ vena secari debeat, ambo subticuerunt. Circa quod id exequendum esse censebam, quod ubi multa sanguinis copia redundarint, & vires copiosam venæ sectionem haudquaquam ferre possent, potissimum in morbi principio, internam cubiti venam secare tutius erit, reuulsione duntaxat gratia, postquam eodem die, aut saltem sequenti poplitis, aut tali vena, perpetuò rectitudinem seruando tutius secari poterit euacuationis gratia cum deriuatione. Nec obstat Gale. documentum lib. de cur. ratione per venæ sectionem, & 13. met. ubi in inflammata vesica poplitis, aut tali venam incidendam esse præcipit, nanque vbique locorum supposit vires adeo esse robustas, ut per vnica venæ sectionem ferre valeant, tum auersionem, tum euacuationem, vel (ut rectius dicam) euacuationem cum auersione simul, quo casu neque nos aliter exequendum esse fate-
 Lib. 3. cap. 45. mur: sed ubi vires (ut diximus) ferre tantam non valeant sanguinis euacuationem, tunc tutius esse audacter assuerimus prius cubiti venam è directo sitam internam secare, & denum eam, quæ poplitis, aut tali. A venæ sectione in decoctum seminis lini, fenugræci, in hydrelæo paucò addito aniso, aut dauci semine insidere ægrum facito, admoneaturque æger, quo in dicto decocto desidens mingat: & si imbecilla fuerit vesica ad expellendam urinam

Curatio.
Locis citatis.
Vena se-
ctio.Lib. de cur.
rat. per ve-
næ sect. ca.
18.
13. meth. ca.
11.

Topica.

Loco citato

ægrum ipsum, aut aliquem ex astantibus scitè, ac placide pectinem premere oportet, neque id ultra modum, ne dolor inde intendatur, ut inquit Aëtius. Deinceps vesicæ locos irrigato ex oleo chamæmelino, anethino, seminis lini, aut eo in quo althæa fuerit incocta. Item fomenta adhibeantur per aquam & oleū in vesicis semiplenis admota, aut spōgius: & ubi hæc nō suffecerint, cucurbitā circa pectinem, aut pubem vnā cum scarificatione affigimus. Quod si neque sic medicamentis malum cedat, præstabit papaueris calicem, simul cum oleo incoquere, & adipei anserini, & gallinacei in ipso oleo eliquatum simul infundere, ut eadem Aëtio visum est, qui etiam Rufi auctoritate, vehementioribus existentibus doloribus, opiatīs medicamentis utitur ex opio, modica myrrha & croco composito medicamento, lanquē illito, ac in podicem indito. Similiter cataplasmatibus utendum esse censet ex cruda hordeacea farina, capitibus papaueris, hyoscyami foliis, ac modico mandragoræ succo adiectis. Si verò vrinæ suppressæ periculum urgeat, necessarium ad catheteris vltimū confugimus, non quod affectiōis molestiam tollat, sed ut virgentem vrinæ suppressionem corrigat, & à præcipiti periculo liberet, ut liquet ex eodem Aëtio, quanquam periculo non careat catheteris immisio: in viris dolorem siquidem exacuit, & inflammationem auget: mulieribus verò ipsum adhibere nihil absurdum. Brevis enim in ipsis vrinæ meatu existit, & recta situs ut citra dolorem hoc molimen admittant. At post vrinæ profectionem, rursus ad eadem mitigatiua auxilia accedendū, vsquequo inflammatio soluat, aut suppuretur, ut eadem Aëtio visum est. Verum ubi ad suppurationem vergat, eadem iuuanda erit cū his, quæ in aliarum partium inflammationibus ad suppurationem vergentibus conscripsimus. Et posturationem, si nō disrumpatur abscessus, eisdem quoque naturæ opitulandum erit pro eius disrptione, quo disrumpo, quam præcipimus in sequenti cap. vlcis curationem conuenientem esse in confesso est.

Eodem citato

Ibidem.

Περὶ ἐκλάσεως τῆς κύστεως. *Id est, De exulceratione vesicæ.*

CAP. CIII.



On raro etiam contingit vesicam ipsam exulcerari, quod quidem significari poterit ex his, quæ Hip. conscripsit aph. 81. lib. 4. cum dixit. Si sanguinem, aut pus minxerit, ac squamulas, & grauis odor adfit, vesicæ exulcerationem significat. Verum Paulus ex dolore vehementi in pube, & imo ventre, vrinæque difficultate, & ex pure, quod ubi redditum est, subsidet, squamulisque foedi odoris, vel laminis similibus, vesicam exulceratam indicari scriptum reliquit, eodem cap. 45. lib. 3. & si eadē scabie laborat, furfuracea subsidencia significabit, quemadmodum idem Hippoc. aphor. 77. 4. lib. de cretum reliquit, cum dixit, Quibus cum vrina crassa furfuracea quædam simul exeunt, his vesica scabie laborat. Quo loco Galenus animaduertebat verbū illud, crassa, nanque cū vrina tenui furfuracea quædam ferri possent ex venis ipsis earum tunica affecta, vel sanguine, qui in ipsis continetur à febre ardenti perusto. Dignoscitur itaque vesica exulcerata ex ea excrementorū qualitate, quæ partibus adhærentia essentia proprietatem obtinent. Cuius generis est id

Signa vesicæ exulceratæ.

quod Græcè ἐκλάσεως, Latine crusta seu ramentum dicitur, lamarum speciem referens. Gale. auctore 1. de locis affectis, cap. 1. Similiter à dolore cum positus, nam vehemens tormentum in pube, imoque ventre sentiunt ægrotañtes, ac etiam ex actione laesa, quoniam vrgebit vrinæ difficultas, ex Pauli testimonio. Sed quoniam non satis est ad affectus sedis inuentiōnem ea duntaxat symptomata, quæ in præsentia insellant, intueri, ut idem Galenus fatetur 6. de locis affectis, cap. 3. sed ex his, quæ præcesserunt, subinde definimus, ea de re id quoque inuestigare debet, ut certior dignotio fiat, num videlicet æger circa vesicæ positus simul cum horrore, ac febre dolores præfenserit, interrogando. Cum quibus etiam indicis nonnihil confert, si id quod excernitur, sit cum ipsis vrinis confusum, an contrā. Nam id aliquando quidem exacte commixtum videtur, aliquando mediocriter, interdum vel nullam habet mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solū excernitur. Quapropter Galen. non ab re eodem 6. de locis affectis, cap. 3. de vesicæ affectibus verba faciens, dicebat, quod vesica suppurata solum pus sine vrina excernitur, licet citato libro, cum de colicis affectibus locibus, deprehendi manifestè, atque secerni vlcus penis ab eo quod in vesica ortū est, præceperit, quoniam in primo protinus exitu signum vlcis apparet, vrinā præueniens, si in pene sit ortū, quod verò à vesica egreditur, vrinæ admixtū videbitur. Non etiam de compos. med. secundum loc. cap. 8. discerni dicebat corpuscula, quæ excernuntur ex exulcerato pudendo, ab eis quæ ex vesica feruntur, quoniam illa statim circa primum exitum apparent, verum quæ ex vesica delata ipsis vrinis admixta sunt: quanquam si interea ramentum, seu pus vrinæ admixtum excernatur in vesicæ vlcibus, confestim tamen, ut inquit Paulus ubi redditū est, subsidet, licet interim eueniat ut solum pus sine vrina etiam excernatur, vel nullam habēs commixtionē cum ea, quemadmodum sæpenumero accidit in penis vlcibus: & propterea idem Galenus addidit, ut facilius vnum ab altero discernatur, quin etiam assidue inter meandum mordicus dolent pudendorum vlcera, præcipue cum vel crustula, vel fordibus solutis pura fuerint: id quod in vesicæ vlcibus haudquaquā fit, nisi iuxta collum eiusdem vlcera consistant, ut inquit Aëtius. Tunc etenim mictionis tēpore duntaxat, & maxime ubi mingere cœperint aut cessauerint, dolor sentitur, atque id amplius contingit, si vrinæ sint aciores, ut ipse inquit cap. 29. libri 11. Quare licet in vlcibus, quæ in pene sunt, etiam sine vrinis, & pus, & sanguis exeat, ut plurimum (eodem Galeno teste comment. aphorif. 75. 4. lib.) nihilominus & simul cum eisdem vrinis statim circa primum exitum, quandoque pus emittitur, & si cum eis nullam habeat mixtionem, quemadmodum de vesicæ vlcibus diximus. Sic etiam in vesicæ vlcibus euenit, interdum quod vrinæ admixtum videatur id excrementum, quod vlcera comitari solet, confestim tamen subsidet, ut inquit Paulus, idque sæpius accidit, interdum etiam, vel nullam habet mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum sine vrina excernitur, ut idem inquit Galenus. Attamen vtra potius istarum partium fuerit exulcerata, dolor, qui in differentibus accidit locis, & proprietates eorum, quæ cum vrinis excernuntur, indicabunt, quemadmodum idem Galenus scriptum reliquit comment. præciati aphorif. 75. 4. lib. cap. 3. pro

Quibus in- Pro discernenda exulceratione renum, aut vesicæ, quod quidem indifferenter Hipp. in eodē apho. conscripserat, sic dicens, si sanguinem, aut pus mingat, aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat, aut saltem ex dolore cum positu, illud discerni poterit, vel dicas aliud esse, si pus ex vesicæ excernatur, eadem suppurata, & aliud si ramentum ex ipsius vlcere: nam primum relatione ad alias superiores partes suppuratas, quæ per vrinam expurgari possunt, solum sine vrina excernitur, ut inquit Galen. licet non semper, quod in aliis superioribus partibus haudquaquam euenit. At ramentum, si ex eiusdem vesicæ exulceratione seceratur, collatione facta ad penis vlcera vrinæ admixtum videbitur, præuenire autem consuevit vrinam in penis vlceribus, ac protinus in primo exitu apparere, quamuis etiam idem ramentum in vesicæ vlceribus, relatione ad alias exulceratas partes seipsa superiores, interdum vel nullam habeat cum vrinis mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum excernitur (eodē Galen. teste.) Itaque relatione ad penis vlcera, ut plurimum vrinæ admixtum videbitur ramentum ex vesicæ vlceribus desidens, quia non protinus in primo exitu apparebit, aut vrinam præueniet, ut in penis vlceribus contingit. Verum collatione ad alias superiores partes facta, vel nullam habebit mixtionem, vel quodammodo superfertur, vel solum excernitur, ut diximus, quia neque exacte, neque mediocriter cum vrina permixtum videbitur, sed vel nullam, vel exiguam cum vrina mixtionem habebit. Ceterum cum vesicæ vlceris morbus sit in soluta continuitate, tum ex iam dictis, & etiam ex his, quæ dicemus, dignosci poterit. Propterea omni tempore dolor acutus comitatur agros, maxime verò mictionis tempore, & excretionis puris: assidue etiam decumbunt, & neque erecti stare possunt, neque reclinati quiescunt acri, siquidem dolores acuti sunt, & vlcera iniucunda, partim quod vrina assidue ea contingat, partim quod ea natura acris existat, neque quamuis plurima excernatur, vniuersa vesicæ vacuari potest, sed semper ex vrina quidpiam in ipsa relinquitur, quod continue vlcera contingit, ut ait Aëtius, & si quidem sordida fuerint vlcera, faculentia, ut idem fatetur, simul excernuntur, & mucosa, & quæ crassam subsidentiam ad modum farinæ habent, aliquando autem & pelliculæ tenues ad modum foliorum, & lamarum, cum vrina excernuntur. Si verò serpendo depascant vlcera, subcruentur excernuntur, & saniosa, & foetentia: adhuc accedunt vrinæ emittendæ difficultas & pudendi arretio, & perulantia, & dolor non solum cum vrinæ meatu fuerit affectus, sed etiam cum tale quidpiam in profundo existat. Atqui cognosces num in profundo, siue iuxta vrinæ meatum sit affectus, ex eo, quod si in amplitudine sua vesica sit affecta, dolor circa pubem sequitur. Si verò iuxta collum vesicæ vlcera consistant, tempore mictionis tantum, & maxime ubi mingere cœperint, ac cessauerint, dolor sentitur, atque id amplius contingit si vrinæ sint aciores, ut superius dictum est, ex eiusdem Aëtij testimonio. Contingit autem ipsam exulcerari, aut propter præcedentem abcessum, aut ob tuberculum, quod præcessit, aut ex ruptura, seu ob fluxionis rosionem, aut alia simili quapiam causa, ex eodem auctore. Quomodo autem diuersæ iam dictæ causæ discernantur, ex propriis earundem indiciiis promptè percipies. Omnes autem ferè qui

vesicæ vlcere laborant, ab indefinente dolore, febribus, vigiliis, & colliquatione perimuntur, alij quidem citius, alij tardius: & propter hoc ipsum, & quoniam nervosa est vesica ipsa, insanabilia ut plurimum eius vlcera existunt: periculiosiora autem sunt, quæ ex erosione sunt orta & modica spes est ea restaurandi, ut eidem Aëtio visum est. Verum vlceribus existentibus in eius ceruice, quoniam non nervosa carnis, & exanguis est, veluti eius cavitates, sed carnosa, haud ita periculosa sunt, neque ad curationem difficilima, quemadmodum de eius discissione com. aphor. 18. 6. lib. Gal. sentiebat. Qua de re tum propter hæc vlcera, tum etiam quoniam sæpe præter expectationem quædam eueniant cura aggredienda erit, per quam si nihil aliud, certè accessorij dolores minuentur, ut etiam apud Aëtium legitur. Primum igitur æger ut decumbat persuadendus est, & in lecto qui etiam toleret, idque maxime si febres simul adsint: deinde remedia intermittentibus febribus adhibenda sunt, maximum verò id fuerit lactis potus: neque scio, an post vllum aliud remedium secundo loco id sit habendum, nam & asperitates lenit, & exulcerationes eluit, aliaque affectiones extergit, ut ex eodem Aëtio liquet. Eligatur autē lac asininum præsertim, aut caprillum pauco adiecto melle rosaceo. Reliqua victus ratio seruanda erit, prout capite de vlcere renum instituiimus, adeo ut ex ea vrina aeris non fiat, & propterea mordeat, ac irriter vlcera. Quod ad medicamentorum aliorum rationem attinet, illud primò animaduertendum erit, quod ubi ob humorum acrimiam fluxionem exulceratio fiat, iidem primò præparandi, ac purgandi sunt, deinde ad vlceris curationem deuenire. Similiter si cum inflammatione, aut vehemēti dolore vlceris complicitur, primò nanque eisdem affectibus obuandū erit, deinceps vlceris curationem aggredi. In quem usum in vesicam multa dilutissima infundenda est, vel lac cum pauculo mellis, aut cum cucumeris semine, seu candido oui liquore, cum pompholyge, vel similibus medicaminum aliquo, ex Pauli sententia. Sit autem lac asininum præcipue, aut caprillum, cum quo mellis rosacei pauculum adiacere poteris, vel decoctum paretur ex hordeo non decorticato, plataginis folijs, ac radice glycyrrhizæ, cui paululum mellis, aut mellis rosacei admisceto: & si acrimonia consequatur, optimum amyllum addendum erit, aut seminis althææ, maluarum, cucumeris, vel fœnugræci cremor: interim etiam, & seminis papaueris. Et ubi eadem vlcera sordida fuerint, magis quæ repurgandi vim habent pharmaca infundenda sunt, augendæque mellis, aut mellis rosacei quantitas, mordacitatis etiam tempore instante. In intestinū quoque per sedem prisane succus infundendus est, & seminis lini succus, & cucumeris semen decortatum tritum cum lacte, rosaceo oleo ad singula instillato. At si exulceratio pascendo serpar, subadstringentibus medicamentis ab extra adhibitis vtendum est, atque his quidem calidis actū, ut ob calorem quidem partes circum dolitantes leniendo iuuent: ob potestatem autem ipsorum vicinos locos exulcerationem depascere prohibeant, sunt autem hæc vicia passæ, palmæ, gallæ, malicorium, alumen, acacia, hypocistis, & similia. Singula autem ex his aut palmis excipiantur, aut cataplasmatibus ex loliacea farina, decoctio autē fiat in posca, ut præcipit idem Aëtius. Similiter etiā in vesicam infundatur lac recens multum, per se, aut cum amylo, rosaceū optimū recens, tepefactum,

Cum verò repurgata fuerint vlcera, adiuuare oportet, quò ad cicatricem perducantur, atque id per infellus adstringentes, & eiusdem facultatis epithemat: in quem vsum emplastrum ex ouis, hordeo vsto, & cadmia, tripla eorum parte cum cerato myrteo, aut rosaceo temperata commodè superponitur. Nec minùs confert si medicamentum ex amylo, sarcocolla, & cerusa, pauxillo oleo rosaceo, & cera additis, & cum lacte dissolutum iniiciatur in vesicam, generosiusque euadet, si vltum plumbum, ac thuris corticem adicias. Ceterum si ad multum tempus exulceratio perseueret, quemadmodum in plerisque fieri consuevit, tunc sanè exacerbationes, & interualla, siue remissiones agros apprehendunt, quare in exacerbationibus quidè cataplasmata, & fomenta & irrigamenta leniendi vim habentia adhibeantur. Remissionis verò tempore, ductu ad destruendum malum apto vtendum erit, quemadmodum ab eodè Aetio decretum est; neque alia ratione vesicæ scabies curabitur, quàm simili victus ratione, ac medicamentis detergentibus, atque exsiccantibus citra mortu.

Περὶ γονορροίας.

Id est, De seminis profluvio.

CAP. CIIII.



QUEMADMODVM omnia corporis nostri excrementa duobus modis vacuantur, interdum enim à continentibus ipsa corporibus excernuntur, interdum sponte profluunt, eò quòd ob imbecillitatem ab ipsis corporibus contineri non possunt, ita quoque de semine dicendum est, Galeno auctore sexto de loc. affe. cap. 2. quanquam semen ipsum à reliquis differat excrementis, vt quæ inutilia sint, ipsum verò vtile, ex omnium philosophorum, ac medicorum consensu. In omnibusigitur excrementis vt excernere tempestiuè, ita continere cum oportet, naturæ officium est. Fit autem secretio aperto fluxionis meatu, ac reliquo conceptu spatio, & contracto, & ad apertum iam meatum quicquid in continente spatio continetur, impellente. Retentio verò fit cum clausus permanet meatus, & contentum à continente haudquaquam impellitur, sed contra comprehenditur, atque retinetur. Hoc modo in his, qui integra valetudine degunt, contenti humores in canis instrumentis naturaliter, & excernuntur, & retinentur. At in illis, qui præter naturam se habent, retentio ob excreticis facultatis imbecillitatem, excretio verò ob retentricis infirmitatem euenit, aut ob aliquam dispositionem, quæ haud secus quàm naturalis ipsa excretoria vis partes mouere possit. Hoc itaque vitium circa seminis excretionem sæpè numero contingit, quod à Græcis γονορροία, à Latinis seminis profluvium appellatur, nomen siquidem compositum ex γόνυ, quod semen genitale, & ῥέω, quod fluere significat, quasi genitales seminis profluvium dixeris: semen autem modò γόνυ, modò ῥέω, à Græcis nominari solet, vt liquet ex Galeno citato lib. sexto de locis affectis, cap. vlt. Est autem (vt ipse inquit) affectus hic seminis excretio inuita, quam etiam inuoluntariam nominare licet, sed manifestius dixeris seminis esse assiduam excretionem, cole haudquaquam extento, quam descriptionem confirmavit Aetius cap. 33. libro II. cum dixit, profluvium seminis excretio est eius præter voluntatem citra pendendi tensionem: & Paulus cap. 55. libro tertio, asserens, quòd seminis profluvium est inuita, ac præter

voluntatem excretio, quæ continuè naturalibus nõ intentis ex retentricis naturæ facultatis imbecillitate provenit, quòd sine venere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, vt interposito spatio tabe hominè cõsumat, Celso auctore cap. 21. lib. 4. Cum autè in spermaticis vasis succus hic spermaticus coëgeratur, & propterea flexus multos instar capreolorum quorundam variè implexorum retinuerant, vt diutissimè, qui ad testes feruntur, sanguis, & spiritus destineantur, ac concoquantur, idque clarè certas cum inspiciens, qui in primis flexibus habetur humorem adhuc sanguinem esse, in sequentibus deinceps magis, magisque albescere, quoad in omnium postremis totus albus omnino fuerit redditus, qui flexus postremi in testes terminantur, quique iterum cum laxi sint, & cavernosi, humorem, qui in vasis coëptus erat concoqui, excipientes, & ipsi rursus percoquantur, vt liquet ex Galeno 14. de usu partium cap. 10. Propterea non ab re in hac affectione sola vasa spermatica affici manifestum est, vt citato loco legitur, & sexto etiam de locis affectis, cum dixit, Igitur gonorrhœa instrumentorum seminis affectio est, non pudendorum, quæ seminis genitalis via sunt qua excernatur. Id etiam confirmavit Aetius paulò ante citato loco: in ipsis nanque & generatur, & continetur naturaliter genitale semen. Quòd vero symptoma sit in genere excretorum immodicè, tertio de cau. symptom. cap. 4. à Galeno scriptum est. At qui dignoscitur ex eo, quòd semen profluens aquosum, ac tenue existit: excernitur etiam citra appetentiam coëundi, & vt plurimum citra sensum, quandoque verò cum voluptate quadam promanat, corrumpitur etiam sensum vniuersum corpus, ac gracilescit, præsertim circa lumbos, Aetio teste. Os quoque ventris quibusdam resoluitur, & toto corpore non solum relaxantur, imbecillique fiunt, sed etiam sicci, graciles, pallidi, causique oculis cernuntur, vt colligitur ex Galeno sexto de sanitate tuenda. Consequitur autem seminis profluvium ad retentricis in vasis seminariis facultatis imbecillitatem, vt inquit Aetius, seu potius resolutionem eiusdem facultatis, ex Galeni testimonio, quam facultatem imbecillam reddere possunt excedentes omnes intemperaturæ, præsertim humida, aut calida, seu quæ ex his conflatur. Id verò ex propriis eorundem intemperierum signis distinguere poteris, simul cum totius corporis natura, ac præcedete victus ratione. Interim autem contingit quòd à copia ipsius seminis eandem retentricem facultatem vasorum seminariorum grauant, vt semen ipsum retineri haudquaquam possit, & sic inuoluntariè excernatur. Coarcesatur autè talis seminis copia eis, qui venerem exercere consueuerunt, & crebriore vti concubitu, denum verò continentius, & purius, innocentiusque degant, vt refert Alexander cap. 9. lib. 9. Interdum autem ex seminis acrimonia, ac tenuitate, adeò vt eam continere non possit eadem contentrix facultas, etiam excitatur seminis profluvium: id quod ex seminis colore, ac substantia, quoniam biliosius, atque tenuius apparebit, iudicabis. Ad hæc prægressæ causæ, tum victus, tum superior vita illud manifestabunt, necnon mordax, atque præcalidum inter emittendū semen sentiunt. Vtrū magna ex parte ob retentricis facultatis imbecillitatem eorundem vasorum seminariorum propter aliquam intemperiem gonorrhœa excitatur, eodem Alexand. auctore. At quoniam euenit interdum quòd inuitis

Quomodo expulsio, & retentio naturaliter fiant coru, que in canis instrumentis continentur. Quomodo in his, qui præter naturam se habent.

Semini profluvium quid sit.

inuitis quoque semen excernatur non ob retentricis facultatis infirmitatem, sed ob aliquam dispositionem, ut diximus, quæ haud secus quam naturalis ipsa excretoria vis partes mouere potest, propterea id quoque dignoscendum erit: quanquam alia quædam differentia gonorrhææ existat hæc, contrario modo eueniens, quam ante dicta. Nam illa cole haudquaquam extento (ut diximus) prouenit, quando videlicet ad retentricis facultatis imbecillitatem refertur, hæc verò rigido, seu tento quodammodo pudendo fit, & velut conuulsio quædam est Galeni teste secundo, de causis symptomatum, cap. 2. Excitatur verò cum quasi conuulsioni quid simile instrumenta patiuntur, ut ipsemet testatur tertio de causis sympto. cap. 4. Euenit autem ubi aliquis vel comitali morbo, vel conuulsione violenter irruente fuerit correptus: quamuis haudquaquam absurdum fuerit in feminariis vasis, & quidem solis aliquando eiusmodi dispositionem excitari, quando videlicet conuulsioni aliquid simile patiuntur, quod idem Galenus confessus est præcitato libro sexto de loc. affe. cap. vlt. quemadmodum alias quoque partes aliquando videmus ut manus, aut pedes, aut digitos conuelli, modò simul eum vniuersi corporis conuulsione, modò ipsis solis affectis. Percipies autem hanc differentiam gonorrhææ, licet ferè improprie gonorrhæa dicatur (ea proprie, & verè existet, in qua cole haudquaquam extento semen præter voluntatem emittitur, ut diximus) quoniam rigido, seu extento pene, licet inuoluntariè semen emittitur, & ubi citra morbum comitalem, aut aliam vniuersalem conuulsionem id fiat, nullum dictarum aderit affectionum indicium, sed ipsa vasa seminis duntaxat conuulsioni similem dispositionem patiuntur, quæ dispositio non alio modo generari poterit, quam conuulsio quæuis alia particularis, potissimum autem à flatuoso spiritu ortum habet. Ceterum seminis profluuii licet in omnibus ætatibus oriri possit, maxime tamen contingit pubertatem transgressis circa decimum quartum annum, ut inquit Aëtius: quod item non solum viris, sed & mulierculis accidit, licet in feminis ægre tollatur affectio, ut ipse refert. At quòd mulieribus tale vitium excitetur, lib. secundo de femine, cap. i. testatur Galen. exemplo mulieris, quæ vteralibus morbis vexabatur, cui in vuluâ prius, deinde ex ea foras, & copiosissimum, & crassissimum semen effluere visum est, tale autem collectum erat, propterea quia diu vidua permanerat, tempore autem, quo ipsum emittebat, lumborum, manuum, & pedum distentiones quædam eandem inuaserant, adeò ut conuulsa esse videretur, ut ipse inquit. In vniuersum autem pro seminis profluuii curatione refrigerantibus, atque exsiccantibus, cum cibis, tum medicamentis vtendū est, & potissimum in quibus & seminis copia, & facultas retentrix infirma est, ut testatur Alex. quoniam cura huius affectionis communis est cum ea, quæ in omni fluxione adhibetur, Aëtio auctore: & propterea (ut ipse inquit) vniuersam vietus rationem reficacioria, & adstringentè cōstruere oportet, & similibus quoque medicamentis uti. Aer itaque eligatur ad siccum, atque ad frigidum vergens; somnus sit moderatus in cubili frigido, non valde molli: decubitus ut plurimum fiat in latus dextrum, vel sinistrum, vitata forma supina, ne lumborum arteriæ inde supercalfiant, quibusdam etiam herbis arefactis substratis, quales sunt portulaca, nymphaea, solanum, ymbilicus veneris, lactuca, roseæ, ac viticis folia,

& reliqua huiusmodi. In quiete quoque circa initia taliter affectos assuerare oportet, nam post prima morbi tempora exercitiis ægros committere conuenit: quibus totum corpus, partisque affectæ cōfirmatur, ut Paulus testatur. Alii excrementa quotidie excernatur natura, vel arte lenibus videlicet clysteribus. Abstineant quoque à spectaculis, & lectionibus, quæ veneræ rei vsum in memoriam reuocare possunt, quinimò omnem de rebus veneris cogitationem excludere oportet, Aëtio teste. Quod ad cibos attinet, paucis vtendum est, atque eis, qui ægre corrumpuntur, & difficulter permurantur, ac resiccandi vim habeant, ut idem Aëtius testatur. Vitandi autem sunt flatuosi, ac etiam valde calidi, nam velut semen generant cibi, qui bene nutriunt, & flatuosi sunt, ac totis substantiis familiares, & medicamenta flatuosa, & calida, ita extinguunt ipsum deficcantia, & refrigerantia omnia, quæve totis substantiis sunt contraria: etenim quæ refrigerare sunt nata, tum edulia, medicamenta semen cogentia, incrassantia, & stabile reddentia, vim habet ipsum supprimentem, non autem corrumpentem, velut est lactuca, blitum, atriplex, eueurbita, mora, cucumeres: quæ verò resiccant, prorsum ne esse quidem semen permittunt, ut nymphaea: & etiam si calida sunt natura, vel ruta, quemadmodum Gal. lib. quinto de simpli. med. facul. cap. 21. scriptum reliquit. Quæ de re ubi tenue, acre, ac biliosum semen, quod emittitur, fuerit infrigidantibus, magis quam resiccantibus tum cibis, tum medicamentis vtendum erit: nam hi contemptantia, refrigerantiaque exigunt, ut genitura seminis erasior, & teporata reddita non amplius effluat, cum prædictis autem cibis viticis, ac canabis semen præsertim tostum, ruta item semen, ac folia lactucæ semis, & cauliculi, nymphaeæque radix, ac semis præbenda sunt. Potus sit aqua frigida, præsertim pluvialis, vel pro communi aqua, ea in qua ferrum sæpe extinctum fuerit, præbeatur, auctore Aëtio. A vini potu, potissimum multo, ac acrim rerum vsum abstinendū est. Mox quoque quod ad medicamentorum rationem attinet citra lumbos, & pubis medicamentum ex rosaceo, maxime ex omphacino apparato, ac paucò vino cum linteis lincis sæpius applicari debet. Similiter si in melino, aut cenanthino oleo, paucò vino addito madesiant: neque ineptæ erunt, si spongiæ posca imbutæ adhibeantur, dein cataplasmate vitare ex palmulis, malis, acacia, hypocistide, cenanthe, rhoë, & similibus: necnon in fœsibus vtendum erit ex lentisci, rubi, myrti, & id genus aliorum in vino austero, siue diluto, aut etiam ipsa aqua decoctis ex communi consensu Pauli, & Aëtij. Quanquam ubi ob seminis tenuitatem, atque acrimoniam fiat tale profluuium, etiam temperatis balneis uti conuenit, ut Alexand. visum est: quinimò ad frigida lauationem confugere non inconuenit, maxime si medicamentaria qualitate aqua prædita sit, velut sunt in albulis aquæ sapore subaslo, & tactu lactei teporis, ex Aëtij testimonio: in quæ vsum magno pere cōmendo naturale balneum puteolorum, quod vulgus balneolum appellat, modo eius actualis caliditas fuerit tepida, aut infrigidetur. Per interualla etiam vnguenta adhibenda sunt, eaque componenda ex cera, & rosaceo, succo aliquo adstringente, aut refrigerante adiecto. Succus verò apti sunt, succus semperuiui, solani, ymbilici veneris, sanguinarie, nymphaeæ, portulacæ, lactucæ, & alij huiusmodi. Verum ab assiduo eorum, quæ vehementer refrigerant, vsum in

Lib. 3. c. 55.

Citato loco

Loco citato
Medicamentorum
rationeLoco citato
lib. 3.
Citato loco

his quæ forinsecus apponuntur, tum etiam in his, quæ per hos exhibentur, cauere oportet. Intus quoque fumenda sunt quæ semen extingunt, veluti viticis semen torridum, aut folia, seu flores; similiter canabis quoque semen, aut lactuca seu nymphae semen, & radix, quæ cum vino nigro austero in potu exhiberi debent, ex Tralliani sententia. Vel ex aqua bibenda præbantur, præsertim in qua ferrum sæpè fuerit extinctum, aut in qua fuerit decocta portulacæ, seu sanguinariæ folia, iis potissimum, in quibus semen biliosum, ac radice reperitur: quibus etiam confert corticem radicis alicacabi cum eadem aqua bibendum exhibere. Valet quoque peculiariter ad hoc non solum temperamentum, sed tota ipsius substantia, licet calida sit ruta, (vt idem Alexander inquit) nanque ea comesta semen coagulat, & corrumpit, vt refert Aëtius. Optimum quoque censetur, vt liquet ex eodem auctore) laminam plumbeam lumbis supponere tum eorum, qui in somno, tum qui aliàs semen profundunt, multum enim refrigerare consuevit. In his verò, qui plumbi duritiei ferre non possunt, ex prædictis herbis refrigerantibus quædam arefacta subternantur: quibus etiam viticis folia, ruta, ac calaminthæ commisceantur, maximè verò & rosæ, profunt enim hæc citra renum læsionem, nam vehementer refrigerationes eorum, quæ lumbis subduntur, renes iniuria afficiunt, vt ipse inquit: quanquam ante eum Galenismus non modo hæc, sed nonnulla alia, quæ conscripsimus medicamenta sexto de sanitate tuenda, cap. 14. scripta reliquerit: quo loco etiam aspidum vsum feminis viticis, ac etiam rutæ pro cibo commendauit, idque magnopere conferre cuiusdam experientia comprobauit. Nos verò tanquam experientia comprobata, quibus vti consueuimus, medicamenta quædam conscribemus, inter quæ syrupus est qui recipit sanguinariæ, acetosellæ, plantaginis, cuiuslibet P. j. portulacæ, capreolorum vitis, vmbilici veneris, & rubi ana manip. j. smyrtiliorum, seminum coriandrorum preparatorum, ac seminum papaueris albi, singulorum vnc. s. foliorum lactucæ, florum nenupharis, boraginis, & violarum ana manip. s. foliorum rutæ, viticis, menthæ, ac calaminthæ scorum ana drac. 4. bulliant secundum artem in aqua pluuiali quantum satis sit, de qua recipe lib. iiii. deinde succi rosarum rubeorum, granatorum, & pomorum acidorum ana lib. s. adiciito, & cum saccharo, exiguoque aceto fiat syrupus, quo vtatur æger, sæpius singulis diebus vnc. 2. vel 3. absorbens. Item pastilli hoc modo confici poterunt. Recipe feminis rutæ, agni casti & viticæ ana scrup. s. feminis lactucæ, portulacæ, plantaginis, & papaueris albi, singulorum scrup. j. seminum coriandrorum preparatorum, & canabis torrefactorum ana grana iiij. diacalaminthæ drac. 2. cornu cerui ysti, feminis rosarum, santalorum, & corallorum rubeorum ana grana vij. seminum melonum drac. 3. sacchari dissoluti in aqua rosarum, quantum satis sit, formentur pastilli, quorum vnum cum paucis vino rubeo adstringenti, aut pauca aqua, in qua sæpius ferrum fuerit extinctum, aut etiam eisdem simul permixtis, assumat pro qualibet vice. Vnguentum etiam, quo vti consuevit, tale est. Recipe olei rosacei, omphacini, cytoniorum, de nenuphare, & myrtini ana vnc. j. cre moris feminis lini, & semini cytoniorum extracti cum aqua rosacæ ana vnc. s. foliorum rutæ, agni casti, & menthæ siccorum ana drac. s. succi polygoni

portulacæ, & semperuiui ana vnc. j. s. pulueris coral-
lorum, & santalorum rubeorum, sanguinis draco-
nis, & boli armeniz. ana drac. j. ceræ quantū fatis sit,
& acetū parum, misceantur, & fiat vnguentū. Verū
vbi rigido, seu intus pene finis profluuiū fiat,
si propterea quòd modo comitiali, aut alia vhe-
menti conuulsione ager laboret, eueniat, his opitu-
landum est cum his medicamentis quæ prædictas af-
fectiones curare valēt, quorum copiam propriis ca-
pitibus studiosi reperient. Neque tamē prætereun-
dum circa lumbos, & pubem prædicta medicamen-
ta adhibere. At si particularem quampiam disposi-
tionem conuulsioni similem seminaria vasa patia-
tur, & propterea finis profluuiū accidat, his, quæ
sequenti cap. de priapismo dicemus, vtendum erit,
potissimum si ex flatuoso spiritu eadem in eis exci-
tetur affectio, quanquam lētum decoctum in potu
sumptum, præter id, quod semen extinguit, mēbri
etiam tēgimentum remittere, ac sedare valeat, vt
quidam aiunt, ex Aëtij testimonio.

Πεὶ πριαπισμῶ, καὶ σατυριάσεως.
Id est, De priapismo, & satyriasi.

CAP. CV.

NTER multa adeo, atque admiranda instrumenta, quæ ad generis propagationem à natura sunt comparata, nihil minus admirabile constructionem inspicias ipsius pudendi, seu collicus: corpus siquidè neruosum, caui, seu cauernosum & durum, ex osse quidem emergens, nõ aliter quàm reliqua alia ligamenta, eo duntaxat ab eis discrepans, quòd cauum, atque cauernosum fit, & propterea quòd eius utilitas ita flagitabat vt 15. de vsu part. cap. 12. & 13. à Gal. scriptum est, cum nanque libidinis impetu quispiam stimulatur volentibus nobis pudendum ipsum intendi debebat exactè, nedum coitus causa, sed vt semen quam longissimè ab eodem iaculetur; propterea eius essentia talis est, qualis in nulla alia nostri corporis parte est videre: neruosum siquidem corpus existens (vt diximus) ac omni quaque fistulosum & durum, excepta ea parte, quam glandem vocant: diffenditur autem protinus vbi ad coitum animal insurgit à naturali facultate, quæ illum attollere potest, nam eas actiones, quarum gratia à natura partes institutæ sunt, protinus ab initio citra doctrinam aggrediuntur, cum vsus requirit, eodem Gal. auctore sexto de loc. affect. c. 5. Verum cum sic extensus fuerit à vaporoso spiritu ab arteriis influente, in tumorem attollitur, atque à spiritu in tumore ipsum attolli manifestè patet, iis qui celeritatè eius, & cum intumescit, & cum iterum residet, pendunt, spiritu eodè modo eius extensionem sequente, quemadmodum pulmo thoracem, ob eam quam habet ad motum ipsius sequetur. Et ob hanc rem repletis fistulosis neruum spiritus vim, cum ad coitum irrumpit animal, non ad arterias propriè referre debemus, sed ad eiusdem nerui propriam actionem, quæ ex propria eiusdem partis essentia proficiscitur, vt liquet eodem sexto de locis affectis, cap. vltim. etenim probabile est vniversi corporis arterias eandem habere actionem, quippe cum eodem tempore totius animalis omnes inter sese similiter producatur. Itaque haudquaquã par esse videtur, vt arteriæ pudendis insertæ aliã quampiã habeant facultatem præter eam, quã antea in toto corpore habebant, nisi quòd ampliora sint ipsis quàm cæteris arteriis ora, & quidè

iure optimo ad celeritatem sequela, ad id quod euacuatur, sic preparata: semper enim natura quod vnicuique actioni vtile est, vndiqueque explorare videtur. At quoniam quandoque euenit vt nullo precedente ad libidinem stimulo, atque desiderio, talis fiat pudendi, seu colis extensio in longitudinem, atque circulo quoque totus augeatur, propterea affectus quidam excitatur, qui à Græcis πριαπισμός, Latine quoque priapismus dicitur, deducta denominatione à priapo, quem ita finxerunt, atque pictura descriperunt homines, quasi ei suapte natura huiusmodi coles esset, eodem Galeno auctore citato libro sexto de locis affectis, quem sectatus est Aëtius cap. 32. lib. II. Est autem affectus hic (vt eidem Aëtio visum est) tentigo pudendi, atque auctio in longum & spissum, citra rei venereæ appetentiam, ex caliditate quadam acquisititia cum inflammatione quadam, & dolore locorum consistens. Paulus quoque cap. 57. libri tertij, priapismus esse firmum genitalis incrementum, quod in longum, latumque intumescit citra veneris appetentiam, fatetur. Galenus autem citato loco priapismum esse dixit, cum coles & in longitudine, & circulo totus augeatur nullo stimulante ad libidinem aut desiderio, aut acquisitione calore, vt quibusdam accidere consuevit, qui supini decumbunt. Verum breviori compendio (vt ipse inquit) dicere poteris, priapismum esse pernam mentem colis, aut auctiorem, aut tumorem: & nono de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 9. ait, Priapismus est auctio pudendi stabilis in longitudinem, ac orbem tumefacti citra rei venereæ appetentiam: consulto autem ab eo addita sunt verba illa, aut acquisitione calore, nam vbi ob supinum decubitus calfacti sunt lumbi, adeo vt coles extendatur, etiam nullo stimulante ad libidinem desiderio, haudquaquam priapismus dicitur, sed par est (vt idem Galenus inquit) vt calfactis lumbis, & arteriæ calidiores reddantur, & propterea magis pateant earum ora, quam obrem non exiguum tunc spiritus essentiam in fistulosum nervum effundant, qui paulatim impletus colem extendit stimulat ad libidinem ipso calore ob supinum decubitus acquisito: attamen neque firmum, neque stabile tale incrementum erit. Quod si cum eodem colis tumore, seu augmento eiusdem colis palpitatio contingat, affectum non amplius priapismum, sed satyriasmum appellare consueuerunt, vt liquet ex Paulo cap. 56. lib. 3. Quod verò priapismum colis, seu pudendi affectus sit, ex Galeno patet sexto de locis affectis. Ipse namque siue præcipuo, & proprio affectu, siue secundario, & per consensum afficiatur, prout diuersimode affectio hæc generatione habet, vt dicemus: illudque confirmari poterit ex eiusdem functione læsæ: erat autem eius functio, vt protinus stimulo ad libidinem animali, distenderetur naturaliter ab eius naturali facultate, cum verò nullo precedente desiderio, aut libidinis impetu, neque supino decubitu ipse inuitus distenditur, eius distinctio præter naturam existit. At ipse affectus morbus est in magnitudine, seu quantitate, nam ex inflationum genere existit, vt liquet ex eodem Galeno 14. meth. med. Præter autem inuitam erectionem ipsius pudendi priapismo laborantibus dolores contingunt, quales testifici habent, & ij qui reliquis membris distenduntur, etenim inflatum, & distentum pudendum ipsum conuulsioni modo afficitur, vt testatur Aëtius. At qui velut princeps causa auctiōis eius, aut ere-

ctionis naturalis plenitudo existit, vel nervi ipsius fistulosi, vel arteriarum, aut etiam vtriusque cum ex priorē conditione mutantur (vt eodem sexto de locis affectis, scriptum est) ita quoque vel ob arteriarum ora immodicē patentia, vel vaporosum spiritum in fistuloso nervo ortum, hic affectus excitatur. Vtrum autem potius pro causa sit habendum inquirere oportet, præsertim ex iis quæ præcesserunt, & ex modo curationis, inquit Galenus, & quanquam ab vtriusque ipsum fieri posse existimauit, crebrius tamen ob arteriarum ora patentia sequi dixit: quippe cum facilius sit ea distendi, quam statuosum spiritum in nervo generari, experientia item, nedum ratione illud comprobauit, cum sæpenumero fatetur se vidisse hunc affectum excitatum ob arteriarum iam dictam dispositionem, semen autem ob ipsius nervi præcipuum ac proprium affectum; perpetuò tamen halituosi spiritus impletio affectum hunc excitat vt decimo quarto methodi medendi, tertio de causis symptomatum, cap. quarto & nono de compositione medicamentorum secundum locos scriptum est, ex humoribus viscosis, ac crassis per moderatam caliditatem; interim genito eodem halituoso spiritu. Verum vbi in eodem fistuloso nervo statuosus spiritus fuerit genitus, ex continua eiusdem, quæ præcessit, palpitatio- ne dignoscitur; quemadmodum è diuerso, vbi suæ pramodum arteriarum ora, quæ ad pudendum deueniunt, fuerint patefacta, atque propterea assatim spiritus multitudo ad ipsum colem affluat, nullum tale symptoma præcedere solet. Incidunt autem quidam in talem affectionem cum longo tempore præter consuetudinem à concubitu abstinerint; si multo semine abundant, præsertim cum non student, vt multa exercitatione sanguinis abundantia dissipetur: alij etiam, qui mali succi alimentis, ac acribus vti sunt, atque etiam quidam vbi ante nequaquam cingi consueuisset, in hanc affectionem incidit cum duobus mensibus præcinctus peregrè proficisceretur, ex Galeni testimonio. Coniiciendum itaque est iam dictis arteriarum ora nimis patefacta fuisse. Aliis, ob humorum copiam, seu vitium, & acrimoniam: aliis verò ob statuosum spiritum, & sine ordine, & violenter vacuatum. Ceterum ex quacunque causa arteriarum ora patefiant, adeo vt affectus hic generetur, colem secundario, & per consensum, non autem proprio, ac præcipuo affectu laborare consonum est, quemadmodum si spiritus statuosus in eo fuerit genitus, ipsum propriæ, ac præcipuæ affectus infestat. Incidit autem hoc vitium non sanè multis, sed iuuenibus magis, quam aliis ætatibus, vt inquit Galenus 14. methodi med. cap. 7. Neque ipsum despiciendum erit, nam ex præcipiti perire solent, nisi confestim eis auxilium feratur, Aëtio teste, cum verò moriuntur, ventre inflantur, & frigidum exudant, id quod & eis euenit, qui aliis conuulsioni modis perimuntur. Qua de re pro eius curatione, & victus, & pharma exhibeatur attenuatorie facultatis citra manifestam calfactionem, vt testatur Galenus nono de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 9. Exhibendus itaque est victus, qui & statui aduersetur, & siccet, ex auctoritate eiusdem, 14. meth. med. cap. 7. abstinendumque à cibis calidioribus, qui materiam in spiritum resoluunt, aperiuntque arterias tendentes in pudendum, nec duntaxat ab eis abstinendum, verum etiam ab his, qui viscosum humorem pa-

Lib. II. ca. 32.
Causa.
cap. citato.

Immediata
priapismi
causa.

cap. 7.
9. de comp.
medic. sec.
loc. cap. 9.

6. de loc. af.
in fine.

Prognosis
ca.

Loco citato

Ratio
victus.

Lib. 9. c. 10

Eodem lib. 9. c. 10. Paulus lib. 3. cap. 57.

In fine. Medicamentorum ratio.

Vena se-ctio.

Comm. 24

Purgatio.

Clysteres.

riunt, aut multum semen efficiunt, ut Alexandro visum est: quinimò in primis morbi diebus usque ad dies tres in inedia eos asseruare oportet: dein cibum paucum generis frumentacei, qui leniter attenuare valeat, citra manifestam calfactionem, atque omnino nihil instantem exhibere conuenit, ut liquet ex Aëtio, eosque in aqua potu continere, seu ea, in qua coriandri semina preparata fuerint incocta. Motu quoque, & exercitio aegri utantur, potissimum parua pilula, ac frictione partium superiorum. In latus item decumbant, subternendaque in strato sunt ea, quae ad feminis profluuium dicta sunt. Similiter à spectaculis, narrationibus, turpi consuetudine, imaginatione, ac commemoratione eorum, quae ad venerem excitare queunt penitus sunt arcendi: nam qui preter victum calidum, ac humidum, quo semen rursus gignebatur, etiam à turpibus desideriis non cessarunt, hi quoque post mortem rectum, intentumque habere pudendum deprehensi sunt, ut idem Alexander refert. Nulli etiam venus prodest, nisi quibus ex huius abstinentia semen abundare coniciamus, ut inquit Paulus, quemadmodum cuidam amico Galenus consuluit, modò post seminis excretionem, postea à narrationibus, spectaculis, ac meditationibus libidinem suscitare potentibus summo perè cauere, ut ab eodem sexto de locis affectis scriptum est. Quod verò ad medicamentorum rationem attinet, priusquam ad iam dicta medicamenta deuenias, totum corpus vacuare oportet, modo id capax vacationis sit, ea tamen vtens vacatione, quam cubans aptissime sustinere possit. Et quoniam iuuenibus magis quam aliis aetatibus hoc excitatur vitium, ut diximus ex Galeni auctoritate, ea propter his sanguinis missio praecipue est salutaris, seu nec aetate eorum eam recusante, ut idem Galenus fatetur citato libro 14. meth. med. cap. 7. A principio itaque statim propter dolores, & inflammationes ab hac affectione prehenso venam secare conuenit, potissimum si multo semine abundant, ac praeter consuetudinem à venere se abstinerint: secetur autem interna dextri cubiti vena, utpote quae celerrime, & plurimum ex iis, quae principes sunt, partibus vena haec corpus vacuat, ut quarto de ratione victus in morbis acutis, à Galeno decretum est: necnon & ab inferioribus eadem promptissime reuellit. Verum ubi vitiosi magis succi in toto corpore redundarint, purgatione vtendum erit, quamuis in prius primo vomitoriis medicamentis potius, quam subducentibus aluum sit vtendum, ex eiusdem Galeni sententia praecitato libro 14. method. medend. cap. 8. & nono de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 9. Eandem quoque sententiam sectati sunt Paulus, & Aëtius, atqui licet ab efficacioribus purgantibus pharmacis in totum abstinendum sit, ut eidem Aëtio visum est, & potius vomitoriis medicamentis vtendum, auerfionis in contrarium gratia, attamen ubi insuetus ad vomitionem fuerit aeger, aut medicamentis vomitoriis uti recusat, leuioribus quibusdam medicamentis aluum subducentibus, quae vicinas partes fluxione haudquaquam infestent, uti poteris, cum neque id etiam Galenus negauit. Ea sunt nostro aeo, quae leniendo purgati, veluti mel acreum, saccharum violaceum, syrup. ex pluribus infusionibus rosarum, vel violarum, & reliqua huiusmodi. Vel lenibus clysteribus aluum submolles per betam, & malum decoctum paucum mercurialis succo admixto, ut refert Aëtius. A ni-

mium autem acribus, atque efficacioribus, ne inflammationes exacerbentur, cauere oportet, tam clysteribus, quam purgantibus medicamentis. Nec minus cauenda sunt, quae vrinae cienda facultatem habent, ex auctoritate eiusdem Aëtij. A sanguinis missione, seu purgatione ceratum ex simplici rosaceo factum, ac cum aqua frigida subactum pudendo, & lumbis imponatur. Sic nanque quendam Galenus percurauit à venae sectione praedictis partibus ipsum imponens: quemadmodum & alium, qui post missum sanguinem humido medicamento, quod ex chamemelo conficitur, fuit usus, ut liquet eodem 14. meth. meden. cap. 7. Haec eadem medicamenta super easdem partes imposita, nono de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 9. comprobauit. Alexander verò idem ceratum rosaceum cum aqua frigida, & pauco aceto subactum commendauit. Lumbis autem, quae euidenter refrigerant, imponenda, veluti est solanum, portulaca, hyoscyamus, & semperuiuum, & necessario etiam coles, & intercapedo inter anum, & pudendum ex aliquo leniter refrigerante illinitur, velut est argenti spuma, cimolia, & cerusa, si aceto, aut posca, vel aqua sint diluta, ex Pauli & Aëtij sententia. Verum ipsi laboranti particulae medicamentum, si ea calidior sit effecta, quoad portionem caloris abundantis refrigeret, imponendum, sin aliter inter initia quidè omnino, quod modicè refrigeret, postea verò id necessum non est. Pari modo & quae circa lumbos sunt particulae omnes eiusdem medicamenti sunt comprehendendae, ex eiusdem Galeni sententia eodem 14. methodi medend. cap. 7. Valde nanque frigida, praesertim quae adstringunt, & torporem inducunt, cauere oportet, ne affectus difficilis ad discutiendum reddatur, ut idem inquit Alexander, praesertim ubi hoc vitium ex flatuoso spiritu in cauernoso neruo orto fuerit excitatum, nam quae siccant, ac flatum discutiunt absque valido calore hoc modo affectis adhibenda sunt. Optimum quoque erit tum coli, tum lumbis, & intercapedini inter anum & pudendum huiusmodi medicamentum reliquis imponere, quod recipit olei rosacei vnc. j. s. chamamelini vnc. j. succi solani, aut semperuiui, seu portulacae vnc. s. argenti spumae, & cerusae ana drac. 2. ceram, & aceti parum, fiat vnguentum, & rursus ea praebenda sunt, quae naturali efficacia praedita per experientiam sunt inuenta, veluti est nymphae semen, ac radix, viticisque semen, ac etiam ruta: ea nanque potius exhibenda sunt, & ruta etiam viridis obsonis admisceatur, ac ipsum ruta semen copiose comedatur: non tamen è principio hoc fiat, nanque multum calfacit sed posterius post aliorum extenuantium usum, nymphae autem semen, ac radix à principio praebere poterit, ex sententia eiusdem Galeni praecitatis locis. Est nanque illud commune praceptum omnium ferme, quos vitiosus succus creat, morborum, quod in fine calfacientibus, & siccantibus sit vtendum: quippe haec quod reliquum humoris est, prorsus absument, ut ipse inquit. Amplius ea in potu exhibenda sunt, ubi haec non suffecerint, quae praecedenti cap. de feminis profluuii descripsimus, potissimum quae genituram infirmare possunt, ac extinguere. At si prorogatur vitium, cucurbitulae cute ferro incisa defigenda sunt, praesertim si sanguinis multitudo adesse adhuc videatur, & hirudines adhibendae etià eo casu, ut eiusdem Paulo, & Aëtio visum est. Mulieribus quoque haec affectio satyriasis, & tentygo dicta accidit, ad quam

Topica

Quid sit

Quae p. in a. causat.

Quid sit natur.

Quae sit substantia

14. meth. cap. 7. c. 9.

de compo. medic. lib. 9. cap. 9.

Cera melis

Satyriasis etiam mulieribus accidit.

ad quam consequitur ingens pudendorum pruritus cum dolore, ita ut mulier locis assidue manus admoveat, atque ideo intolerabili veneris desiderio contabescat, & falsi humoris effluentis acrimonia, ac mordacitatem percipiat, ut liquet ex Aëtio cap. 82. lib. 16. quamquam eis raro hoc malum accidat, ut inquit Paulus cap. 56. lib. 3. Qua de re ipsis etiam à principio vena secanda est, alimentum contrahendum, & pubi, ac lumbis illinenda quæ leniter refrigerant, ac contrahunt, ut eidem auctori visum est: reliqua vero ab eodem præcitato loco petenda sunt.

Περὶ ἀπρηκτων μοχλων.
Id est, De ignavis partibus genitalibus.
CAP. CVI.



On minus saui, quam impij dicemur, si pauperculus, qui nuper vxorē duxerunt, eisque potissimum, quibus magistratus, aut regni anisio imminet, necnon & moestis male nuptis eorum vxoris auxilia non præberemus, cum inefficaces ipsi in veneris congressibus deprehenduntur contrario vitio laborantes, quam ij qui præcedenti affectu conflictati sunt. Quapropter pauca etiam de hoc vitio verba faciemus estque affectus hic impotentia quædam ad rem venerem exercendam, quamvis ea uti cupiant, ut ex Aëtio colligitur cap. 35. lib. vndecimo, propterea quod ignava, & impotentia genitalia membra habent. Afficitur autem in hoc vitio pudendum, cuius proprium munus est, ubi ad coitum insurgit animal, media eius naturali facultate, quæ ipsum attollere potest, ut protinus distendatur, velut præcedenti cap. iuxta Galeni sententiam annotauimus. Affectio autem symptoma est in genere noxæ functionum naturalium, ac eiusdē pudendi propriæ ablata; nā neque hi in venerem ruunt, & propterea ignaui fiunt, ut inquit Paulus cap. 58. libri tertij. Excitatur autē ut plurimum, vel ex pudendorum resolutione, quæ ob frigida aliquam intemperiem in eis exortam, efficiuntur, vel ob seminis inopiam. Quamquæ etiam ob reliquas causas quandoque excitari contingat, renum præsertim occasione, aut reliquarum partium principium. Atqui nos relictis huiuscemodi causis, quibus oportet conuenientem quoque curationē accomodare cum affuerit, si affectus hic ob particularum resolutionem, vel seminis inopiam duntaxat fuerit ortus, remedia conscribemus. Cæterum facile quispiam percipiat, nunquid ex seminis inopia fuerit genita affectio, an propter colis resolutionem, cum ex præsentibus, tum etiam ex his quæ præcesserunt, indicis, corporis naturam, temperamentum, ætatem, ac præcedentem victus rationem rimatus. Nec minus quoque & curandi rationem inueniet. Nanque tam alimenta, quam medicamenta, quæ ipsis conueniunt, calefacientia, & infantia, necnon & seminis gignendi potentia prædita esse debent, ex Aëtij testimonio. etenim semen generant, cibi quidem, qui bene nutriunt, & flatuosi sunt, totisque substantiis familiares. Medicamenta verò calida, & flatuosa. Ipsum etiam prouocant, quæcunque calida sunt & flatuosa absque desiccatione, quoniam cum seminis substantia ex bonâ superfluitate generationem fortitur, sitque etiam flatuosa, bene nutriat & flatuosa sint necesse est, quæcunque semen, aut procreare, aut prouocare possunt, ex Galeni sententia quinto de simplicium medicamentorum facultati-

bus, cap. 22. Carnes itaque pro cibo eligantur galinarum, caponum, perdicum, phasianorum, starnarum, iuuenum columbarum, turdorum, merularum, necnon reliquarum paruorum auium montanarum; magnoperè autem perdis ova, ac gallorum testiculi ad coitum excitant, ut inquit Aëtius, & quoniam non solum quod bene nutriant cibi necesse est, sed etiam flatuosi sint oportet, propterea cum eisdem, aut per se soli bulbi conueniunt, cicer, fabæ, nux pinea, ut ex Galeno liquet citato loco. Similiter competit pastinacæ radix, ac etiam rapa, & porri, erucæ tum folia, tum semen maximè agrestis, orminum, anisum, fœniculum, amygdalæ dulces, polypodes, & concharum genera, ex Aëtij testimonio: vna quoque dulcis, ac recens, & erucæ semen tritum cum vitello oui in puluerem redactum, ac assumptum commendatur. Vinum bibant odoratum, rubeum, aut subrubeum, videntque omnino aquæ potum. Infernas autem corporis partes eos exercere conuenit, in mollibus lectis dormiant, ac legant, quæ ad coitum cohortantur. Lectionibus item, ac spectaculis huiusmodi assideant, ex eiusdem Aëtij sententia. Quod verò ad medicamentorum rationem attinet, multi seminis esse dicuntur scincus, & satyrion, quemadmodum simul cibi, & medicamenta sunt lini semen, & eruca, ut eodem quinto de simplicium medicamentorum facultatib. cap. 22. liquet testes vulpis sicci, triti cochlearij mensura potati, membri tēiginem faciunt: partes etiam renes scinci amplectentes ad tēiginem pudendorum excitandam bibantur. Similiter & maior bulbus orchis herbæ, quæ etiam testiculi appellationem habet, cum lacte potatus tēiginem ciet, pudendum item cerui aridum vnius drachmæ pondere cum vino meraciore præbeto, ut inquit Aëtius. Compositis item medicamentis in hunc usum uti poteris, ut mithridato, diamoscho dulci, diambra, ac diasatyrion, cuiuslibet drachm. vna cum paucis vino odorato præbens. Vel in hunc modum medicamentum conficito, Recipe seminis erucæ, vrticæ, anisi, ac fœniculi, & pastinacæ, singulorum drac. s. nucis pineæ, amygdalarum dulcium ana drac. 2. piperis, cinnamomi, cuiuslibet vnc. s. ramenti genitalis ceruini, ac satyrj ana vnc. j. diambra, seu diamoschi, vel diasatyrj drac. j. s. sacchari dissoluti in aqua mellissophylli, & rosarum quantum satis sit, fiant in morsulis ponderis vnc. j. & cum odorato vino fuluo, seu subrubeo præbeatur ante cœnam, vel etiam manè ante prandium. Naturalia quoque continuè oleo vngantur, cui adiectum sit radicis narcissi momentum, cocci gnidij, seminis vrticæ, pyrethri, aut viticis, ut liquet ex Paulo, cap. 26. libri 1. Priuatim autem stellio concrematus, in pollinemque redactus magno dextri pedis digito oleo adiecto illinitur, & venus exercetur. Vbi cessare voles, digitus abluatur, ut liquet ex eodem auctore cap. 58. libri 3. Leporis quoque coagulum, aut leonis adipem pudendo illinito, deinde tria piperis genera cum tragacanthi succo testiculis, interapedini inter anum & pudendum, ac lumbis illinito, ex Orisasio. Vel olei liliacei recipe, ma stichini, de castoreo ana vnc. j. adipis leonis vnc. s. pyrethri, piperis, cyperi, myrrhæ, ac sulphuris viui ana drac. j. moschi grana 4. miscantur, & cum cera quantum satis sit, fiat vnguentum, quo pudendum, testes, locus inter anum, & pudendum, ac lumbi illinantur.

ἡ δὲ τῶν τῆς μήτρας καὶ τῶν καὶ πρὸς τὸν μήτρα
ἐκ τῆς ἐκείνης.

*Id est, De uteri affectibus, & primò de
mensium suppressione.*

CAP. CVII.



Nonstruendis animalis partibus, eis inquam, quæ ad generis instaurationem fuerunt fabricata, natura non colem duntaxat, & testes, verum etiam tanquam maximè necessarium uterum machinata est, quæ Græci modò μήτραν, cō quod ex ipsa omnia animantia, velut à matre oriantur, quandoque ὕστερον, quod posterior situ sit, omnibus visceribus appellarunt, Aëtio teste; cap. j. lib. 16. Cum itaque uterus tanquā concipiendi instrumentū à natura esset productus, non ab re ventri ipsum subiecit, qui locus est (tum ad vsum venereorum, tum ad semen recipiendum, & præterea ad foetus incrementum; atque perfecti enixum) opportunissimus: nam ad coitum locum nullum accommodatiorem in toto animalis corpore inuenias, quoniam longè ab instrumentis, quæ faciei insunt, sit disitis: ad foetus etiam augmentum opportunissimus, quod eo loco possit sine dolore distendi plurimū, ad partū vtilissimus, quod ad inferiora, & ad crura exitus foetui sit futurus facilius, Galen. auctore, 14. de vfu partium. nec mirum, si omnes partes, quæ sunt in viris, in mulieribus etiam reperias, tamen eo duntaxat discrepent, quod in mulieribus hæ partes, quæ ad generis instaurationem sunt fabricata, intus sunt conditæ, in viris autem sunt extra, nam quamuis homo animal sit omnium perfectissimum, nihilominus eo ipso rursus vir muliere est perfectior, cuius perfectionis causa calori exuperantia exiit, hic enim primum est naturæ instrumentum. Quapropter in quibus parciore inuenitur, in his opificiū sit imperfectius est necesse, quo sit ut admirari non liceat si foemina mare tanto est imperfectior, quanto frigidior, ut eodem 14. de vfu partium, à Galeno scriptum est; qua etiam ratione mulier partibus genitalibus, velut & reliquis viro est imperfectior: & præterea partes eadem, quæ intus formatae fuerunt, dum ipsa vtero adhuc gestaretur, cum extare, & foras emicare præ caloris imbecillitate non potuissent, animal, quod conformabatur imperfectius, eod quod vndique est absolutum, reddiderunt: nam quemadmodum talpæ oculi exprimi intus incepti foras à natura propelli non potuerunt, ita membra genitalia foeminae intus formata in exteriorem partem nequiverunt emergere, ob imbecillitatem videlicet, ac imperfectiorem foeminae naturam, in eo tamen talpis perfectior foeminae natura euasit, quod talpæ nullam ex cecitate vilitatem consequuntur, foeminae verò non parum hac membrorum suorum imperfecta fabrica ad generis successionem conferunt, ut ex eodem Galeno liquet, lib. secundo de semine. Neque credendum est opificem partem totius generis nostri dimidiam sua sponte imperfectam, ac velut mancā fuisse facturum, nisi imperfectionem hanc magna quædam vtilitas fuisset sequutura: etenim præterea quod intus sunt conditæ partes hæ, uterus ad semen recipiendū foetūque generationem, ad retentionem hac ratione fuit appositus: foetus item non modo ad primam sui constitutionem, sed ad omne etiam deinceps incrementum materiam postulabat copiosam, & proinde

duorum alterum ipsi accedisse opus fuisset, aut ut ipsius vtero gerentis alimentum raperet, aut ut superfluum acciperet, verum rapere non erat melius, superfluum verò assumere non poterat, si foemina fuisset calidissima, discuteret enim ipsum sic, & facile exsiccaret: frigidior igitur eam eoque fieri facius fuit, quoad alimentum quod confecisset, totum discutere non posset: quod enim est frigidius ne concoquere quidem potest, quod verò calidius ut concoquere ita discutere valide potest, quod verò non ita multum à calidissimo relinquitur, & coquere satis, ut quod non amplius est frigidum, & relinquere aliquid superfluum, ceu quod non vehementer adeo sit calidum, potest. Hæc denique est frigiditatis foeminae vtilitas, quam mox sequutura erat partium imperfectio (ut diximus) cum ipsæ præ caloris imbecillitate foras prorumpere non possent, quod quidem commodum maximum, ac secundum est ad generis instaurationem. Hinc fit ut uterus instrumentum semini recipiendo, ac retinendo, foetui præterea alendo, ac perficiendo sit aptum, quanquam non in omni ætate: quoniam neque in imperfectis, neque in eis quæ consueverunt tantam habere magnitudinem, quod ad concipiendum sit aptus, sed in solis ætate florentibus proportionata talis magnitudo reperitur, quemadmodum etiam & ipsum excrementum, seu foetus alimentum in solis florentibus animalibus abundare potest, nam in declinantibus, cum vires sint imbecillæ, alimentum non rite concoquitur, quo fit ut cum illis bene agatur, si ad suum proprium vsum alimentum, quod satis sit, possint comparare. In eis autem quæ augentur, licet valentes sint vires, & ob eam causam alimentum benignum concoquant plurimum, tamen cum duabus actionibus nutritioni scilicet, & auctiori sufficere oporteat, superfluum nihil relinquitur. In solis igitur ætate florentibus, seu augeri iam desinentibus, & viribus adhuc valentibus, magna huius benigni alimentum est affluentia: & quoniam quicquid ex alimento siue bono, siue malo superuacaneum est, id à validioribus membris ad infirmiora depelli solet, propterea effectum est, ut cum in ipsis (utpote extremis in formatione) partibus natura defecerit, atque infirmissima omnium euaserint, ea excrementa quæ in ipsis mulieribus redundant, seu redundans sanguis ad omnium infirmissimas partes (quæ genitales sunt) feratur. Mittuntur namque in venas quæ vtero committuntur, menses, & non attrahuntur: nimiam cum uterus ad delationem eorum nihil conferat, ut quinto de simplicium medicamentorum facultatibus, testatur Galenus, qui quidem sanguis menstruus foeminae ipsis antequam concipiant singulis mensibus sit purgatio salubris. Vbi verò concepere, alimentum foetibus accommodatum euadit. Fluere autem incipiunt mulierum plurimæ menses circa decimumquartum annum, iuxta Aëtij, & Pauli sententiam: paucis verò ante decimumtertium, aut duodecimum; plerisque autem post decimumquartum erumpunt, ex eiusdem Pauli testimonio: quo etiam tempore & pubescant mulieres, & mammae ipsas intumescunt. Non tamen cunctis eodem tempore, eademque mensura, & per totidem dies prodeunt. Nam multis ad duos, tresve dies, non paucis usque ad quintum profuunt, aliis etiam usque ad septimum, raræ verò duodecimum purgatae sunt: plerisque etiam minus duarum he-

minarum

minarum mensuram quatuor dierum spatio, interpositis viginti duobus diebus, aut summum triginta, singulis mensibus deferuntur. Porro desinunt etiam menses aliis anno quinquagesimo, paucis vero usque ad sexagesimum durant, nonnullis, praesertim obliatis, à trigesimo quinto anno menses cessare incipiunt, ut eisdem auctoribus visum est. Ceterum sanguinis, qui profluit copia paulatim usque ad aetatis vigorem augetur, deinde aliquandiu aequalitatem seruans, paululum penitus crescit, aut minuitur. At ubi ad finem tendit, paulatim rursus minuitur, donec in totum desinat, eo dem Aetio teste.

Cum itaque mulieres menstrua purgatione omnino careant: vel naturale est, vel praeter naturam. Naturale siquidem, quantum ad aetatem attinet (ut diximus) vel infra decimum quartum, vel ultra quinquagesimum annum. Prægnantibus quoque secundum naturam menses supprimuntur. Similiter & cantrices, & saltatrices, quoniam quicquid in eis superfluum est, nimia exercitij vehementia consumit, non purgantur: & in summa (ut inquit Aetius) mulieres calidioris temperaturæ, & fortibus exercitiis vten-tes, & agrestes parum purgantur. Dignosces autem si secundum naturam menses supprimantur, quoniam mulier nulla inde molestia, vel totius corporis, vel vteri afficitur, ut inquit Aetius. Atqui non de hac, sed de ea mensium suppressione nos proprie loqui intendimus, quæ praeter naturam existit ex quapiam præternaturali causa orta, vel totius corporis vicio, vel vteri, & partium eius proprio, ut dicemus: quamquam semper ipsi vtero tribuenda affectio sit, eo vel primariè, vel secundariè, & per consensum affecto: namque à toto corpore (ut diximus) tanquam superfluum (veluti infirmis simam partem) ad vterum cum valet mulier, eo dem nihil ad eorum translationem conferente transmittitur: ut ex inde ab eo naturaliter modo, & tempore, quo diximus, expurgetur, ubi concipiendi tempus non aderit: nam conceptionis tempore ipsæ purgationes tanquam necessariæ in eo detinentur, & propterea non concipiunt quæ non purgantur. Rectè itaque dicimus etiam vterum ipsum affici, cum non perueniant ad eum ea quæ antea, cum secundum naturam se haberet, venire solebant. Quod verò hoc vitium symptomata sit in genere retentorum immodicè, liquet apud Gale. lib. de differentiis sympto. cap. vlt. & 3. de causis sympto. cap. 4. Sed quod praeter naturam menses detenti sint, ex pluribus indiciis dignoscere valebis: quorum primum, ac maximum est Hippoc. 39. aphor. 5. lib. cum dixit, Si mulier quæ neque grævida est, neque peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt. At nullo apparente in mammis lacte, ut refert Gale. 6. de locis affectis, cap. 4. hæc indicia ad-derunt: grauitas totum corpus molestat, fastidia cibi incidunt, horror inæqualis cum febre quandoque, & si vteri os claudatur, cum quadam aderit duritie, propter quod differunt ab his, quæ conceperunt: quibusdam dolor cum grauitate in vteri regione accidit, modo in vna, quandoque in altera parte: quin etiam in coxam dolor transit, ac erus ipsum, quod è regione est, per incessum claudicat: præterea lumborum, colli, & synypitis dolor, qui etiam oculorum fundamenta infestat, sequi solet: item febres ac dentes, & vrinx nigricantes cum rubra quadam sanie, perinde ac si aqua, ex qua nuper mactatæ carnes ablutæ fuerunt, fuliginem quis miscuisset: quemadmodum in illustrissima Domina Maria San-

seuerina Comitissa Nolæ sæpius talem vrinam inspexi: quibusdam etiam vrina, aut difficulter redditur, aut omnino supprimitur. Quod si longiori tempore menses supprimantur, nullamque medicus mulieri vacationem promoueat, tumor aliquis præter naturam in ilibus interdum exoritur, ostendens nimirum ex internis partibus quampiam esse inflammatam, nonnullis etiam in extrema ilium parte pa-

*Suppressio-
nis mensium
causa.*

nus excitatur, ut liquet ex eodem Galeno præcitato libr. 6. de locis affectis, cap. 4. Quoniam verò mensium suppressio nonnullos consequitur præter naturam affectus, tum ipsius vteri proprios in quacunque eius parte ortos, siue circa eius cornua, siue ceruicem, siue totam eius cavitatem, cum etiam totius corporis communes, ut ex Galeno liquet 3. de causis sympto. cap. 4. propterea eos narrabimus, primò affectus præter naturam, qui ad vterum pertinent, & deinceps eos, qui toti corpori communes sunt. Vnus autem, & præcipuus vteri affectus retentionis mensium causa, eius densitas, atque duritia existit, siue à natura corpus eius tale conditum fuerit, siue certo tempore vterum occupauerit, angustia item venarum vteri statim à principio congenita, ubi scilicet hac parte foemina male est formata, aut eorundem vasorum compressio, quæ ex his quæ circumiacent fit, cum videlicet corpus immodicè pinguescit: necnon & eiusdem vteri intemperies quædam tum natura, tum sub quibusdam affectibus orta, suppressio- nis mensium causa existunt. Interim quoque

*Cause ex
parte vteri.*

mens retinetur ipsius sanguinis occasione quatiens quod vacuatur vel crassum est, vel glutinosum, quin etiam si ipse sanguis menstruus sine vitio sit, ceterum in vasis, quæ ad vterum pertinent, obstructio quædam, vel obseratio prius facta, sic quoque menstruum retinebitur, ut idem Galenus testatur citato loco 3. de causis sympto. cap. 4. & com. apho. 28. 5. libri. Vitio itaque vel propriæ substantiæ ipsius vteri, vel vasorum, quæ ad ipsum pertinent, aut eiusdem sanguinis, qui ad ipsum deuenit, contingit sæpenumero menses supprimi. Nos autem cunctas has causas vteri vitio prouenire fatemur; quæadmodum etiam si ob robur vasorum eiusdem vteri sanguine ipso ad alias particulas delato, contingat menstruum detineri, eidem vtero vitium tribuimus. Sic si ob inflammationes, seu eius cernicis distorsiones, aut peruerfiones, seu callos, aut carnis excre- scencias istic exortas, aut pinguedinis copiam men- sium purgatio prohibeatur, ad vteri vitium referendum erit: nec minus si aut pellicula circa collum, aut osculum vteri fuerit adnata: quemadmodum his accidit, quæ imperforatæ appellantur: siue etiam vlcera cicatrices, quæ vasorum oscula in vtero excæcarunt: aut cicatrix obducta post abortum, ob quem vteri os fuerit exulceratum menses detine- bunt, etiam vteri occasione id fiet. Totius etiam corporis culpa aliquando prorsus non purgabitur foemina, tum propter plura exercitia, tum propter tenuem victus rationem, tum propter succorum ad alias particulas inclinationem, & cum hæc ipsa me- diocritia sunt, minus quam pro naturæ debito pur- gabitur, ut eodem 3. de cau. symp. à Galen. scriptum est. Nos verò cunctas tum externas, tum internas suppressio- nis mensium causas totius corporis culpa dinumerabimus, ab externis exordientes. Nam assiduæ curæ, immodicus timor, ac interor ingens, menses supprimunt (Aetio teste) item alimenta vel in- fra, vel supra modum ingesta: nam modicum ali-

*Ex vitio
sanguinis.*

*Causa
causa.*

*Ex parte
totius corp-
oris causa.*

Cap. citato.

*Externe
causa.
Li 16. c. 51.*

Eodem citato

Li 16. c. 51.

Li 16. c. 51.

*Que pars
afficitur
in mensium
suppressione.*

*Quis affe-
ctus præter
naturam sit
in mensium
suppressione.*

Li 16. c. 51.

*Li 16. c. 51.
c. 60.*

mentum statim transpirat, multum verò meatus ob-
turat, & excretionem intercipit: nimia quoque ex-
ercitij vehementia (quoniam quicquid superfluum
est consumit) menses supprimere valet. Internæ verò
causæ sunt calidiores, aut frigidiores totius cor-
poris temperaturæ, calidiores liquidem hoc excre-
mentum discutunt, ac consumunt, frigidiores verò
quoniam crassiores, ac tenaciorem sanguinem gi-
gnunt, vasa vteri obstruunt: habitus quoque graciles,
aut obesi nimium: graciles inquam, quoniam
nihil penitus superflui sanguinis habent, obesi verò,
seu pingues, propterea quòd reliquis magis exan-
gues sunt, minimasque venulas habent, nam san-
guis, qui in ipsis est paucissimus, ferè in pinguedi-
nem transit, & propterea tales minimè omnium
conciunt, ut inquit Aetius. Ob diuturnum etiam
aliquem morbum scemina extenuata non purgan-
tur, vel propter præcedentem per nares, aut sedem,
aut quampiam aliam partem sanguinis euacuati-
onem, etiam per venæ sectionem immodicè factam,
potissimum ex cubiti venis, nam hæc sanguinem ad
superiores corporis partes retrahens, menstruas pur-
gationes comprimit (Galeno auctore libro de cu-
randi ratione per venæ sectionem, cap. 18.) nec mi-
nus & reliqua excretionum genera, velut est mul-
tus sudor, assiduus vomitus, alui profluvia, & pustu-
larum omne genus per cutem erumpens, morbiq;
acuti, & magni, menses supprimere possunt, ut li-
quet ex eodem Aetio. Quædam etiam (ut ipse in-
quit) ob plenitudinem non purgantur. Has omnes
suppressionis mensium causas, tum totius cor-
poris communes, tum ipsius vteri proprias, ex pro-
priis earundem indiciis, ægrotantium sermonibus,
corporum habitibus, ac ex præcedenti victus ratio-
ne, haud ægrè dignoscere queas. Et si accidat quòd
non omnino menses fuerint detenti, eorum quo-
que substantia, ac calor considerandi sunt. Quòd
verò mulieribus, quæ non purgantur consueti more,
sanguinis reiectionis, ac syderationis periculum
immineat, testatur Aetius cap. 52. lib. 16. Et quædam
in melancholicum atræ bilis morbum, aut insaniam
delabuntur. Quapropter proroganda euacuatio eis
non est, quippe cum menstruum suppressio of-
fendat, maxime si à partu supprimantur, nam non
abundantiam modo, sed insignem etiam humorum
pariunt paruitatem, ut 3. de morbis vulg. testatur Ga-
lenus. Quibus autem ulcerum cicatrices oscula va-
forum in vtero excæcarunt, & propterea menses
fuerint detenti, pœnitius incurabiles sunt, quemad-
modum curari quoque non possunt, vbi pellicula
quædam circa collum statim à principio, aut oscu-
lum vteri fuerit adnata, nisi illa perforetur, aut re-
secetur, ut liquet ex eodem Aetio cap. 51. Cæterum
cum suppressorum mensium causæ tot sint, pro ea-
rum diuersitate, curationem quoque variari cōtin-
git: & cum plures earum facillè curari possint, ut si
ex externis causis menses detineantur, nonnullæ e-
tiam ad vterum pertineant, cum aliquo proprio af-
fectu laborat, quam curationem infra docebimus.
Propterea si ex plenitudine, seu propter frigidorum
humorum redundantiam, vel calidorum, aut nimiam
caliditatem, seu frigidam corporis intemperiem
suppressi fuerint menses, curationem duntaxat in-
stituemus, insimul quæ menses prouocare possunt
medicamenta conscribentes. Si itaque ob plenu-
dinem mulieres non purgantur, aliis consentientibus,
venam secare conuenit. Nam copiosa sanguinis

missio sanatur, propterea (ut inquit Aetius) tum
cubiti, tum tali venam secare oportet, neque eisdem
proroganda euacuatio est, ut Galenus inquit libro
de curandi ratione per venæ sectionem, cap. 15. Ve-
rùm nequaquam in cubito venas secandas esse ad-
mittit, namque secta in cubito venæ reuellere pur-
gationem assolent, sed in malleolis, aut poplitibus
secari venam iussit, etenim ex cruribus euacuati-
ones tantum abest ut retrahant, ut etiam menses pro-
moueant, ut ipse inquit. Conciliari autem possunt,
nam Aetius magnam supposuit plenitudinem, quæ
cum copiosa euacuatione indigeret, vires, aut reli-
qua haudquaquam permetteret, quapropter cubiti
venas primò, deinceps, eas quæ in talo secari iussit,
ut ex utrisque simul tata possit sanguinis copia eua-
cuari, quantam vnica sectione plenitudo require-
bat: Galenus verò non adeo magnam plenitudinem
inspiciens, & ex diuerso vires robustas in mulieribus
plenitudine laborantibus supponens, eandem in
poplitibus, seu tali venis venæ sectionem fieri de-
cretum reliquit. Et cum dixit quòd secta in cubito
venæ mulierum reuellere purgationem assolent, ac
purgationes menstruas comprimunt ad superiores
corporis partes sanguinem retrahentes tanquam ve-
rum admittendum, vbi post eas poplitis, seu tali ve-
næ non incidantur. Neque perpetuo cunctis mulie-
ribus venam scindere necesse est, sed quibusdā mal-
leolorum scarificationes satis esse queunt euacuan-
dæ superfluitati, ut mulieribus albidioribus, ac car-
nosis, quibus parua sunt venæ, & quæ sanguine quo-
que tenuem acerrare solent, ut dicemus. Tempus
autem secandi venam non erit multo ante statum
mensium tempus, sed vbi iam accesserit, tribus, qua-
tuorve diebus consuetis mulieri circuitus antea-
tens, ut idem inquit Galenus. Quantitatem autem,
nec plenitudinis quæritas, sed virium robur me-
tietur: & vbi quidpiam non virget eandem sectio-
nem venæ iterare tutius erit quam semel vniuersum
vacuare, aut in eodem crure, vel in altero, ut vide-
bitur. Conducit etiam nedum istis diebus, in quibus
sanguinem vacuas, verum & ante eos quatuor,
aut quinque, ut extenuantem victum procures (eo-
dem Gal. teste) & tenuis victus eisdem exhibeatur,
veluti est ptisanæ succus cum aceto præparatus, &
olera ad hunc etiam usum idonea. Sanguine verò
vacuato, medicamenta, quæ menses prouocare pos-
sunt, adhiberi debent, quorum infra mentio fiet, &
cucurbitæ pubi, & inguinibus affigenda sunt, siquid-
em menses euocant, ut liquet 13. metho. med. cap.
19. Si verò ob nimiam caliditatem citra calidorum
humorum redundantiam mulieres non purgantur,
licet victus rationem adeo instituere valeremus, ut
menstrua purgatione non haberent opus, tamè quia
conceptioni penitus aduersaretur, propterea con-
ceptus gratia purgationes sunt necessariæ. Ea pro-
pter eas quàm maxime humectare oportet quacun-
que ratione calidiores fuerint, siue ex naturali tem-
peramento, siue ob exercitiorum excessum. Aer i-
taque eligendus est ad humidum, ac paulò ad frigi-
dum vergens, somno longiori vtantur, quies eliga-
tur, exercitium autem vitetur, ac caueant immodi-
cos animi affectus, iram, mestitiam, timorem, vber-
iore, humidiorèque cibo, ac potu vtantur, ut ptisa-
næ, ac eius cremore, & amylo ex lacte parato, ex o-
leribus, lactuca, cucurbita, è carnibus, caro gallina-
rum, caponum, & pullorum, & aliarum auium, quæ
teneriores sunt, similiter agni, hædi, ac recentis
porcelli

Internæ.

Loco citato

Loco citato

Prognosti-
ca.Commen. 3
Cōment. 73

Lib. 16

Si ob plenitudinem
menses
primario
curatio.
Lib. 16.
cap. 57.
Venæ
sectio.Cōcilium
Aetii
Gal. de
ne
Lib. cit.
cap. 18.

Topi

Tempus
ne
Lib. de
ra. rat.
venæ
cap. 18.

Loco citato.

Si ob
dam
in
periem
in
sup
tur, cumVidetur
Lib. 16.

Propriæ

porcelli competit. Præfana quoque in prædictarum
carnium iure parari poterit interim autem ex lacte.
Pisces item qui teneras carnes habent, gustari pote-
runt, & ex fructibus, ficus recentes, vix maturæ, pe-
pones, ac cucumeres, vt inquit Aetius. Nec erit ab-
solum quandoque recentibus ouis gallinarum for-
bilibus, aut etiam tremulis vti. Potus autem sit vi-
num tenue, album, dilutum, non vetus, vt idem Ae-
tius testatur. Ac balneis aquarum dulcium vtantur,
& (vt summatim dicam) reuolutoria victus ratio-
ne, nam ex multo calore huiusmodi corpora sicca
equadunt. At si simul cum corporis calida intempe-
rie biliosus redundarit humor, congruis medicamē-
tis ipsum purgare conuenit, melle aëreo videlicet,
cassia fistula, rhabarbaro, syrupo pluribus infuso-
nibus rosarum, vel violarum, & reliquis huiusmodi,
idque præstantius fiet, si prius syr. violaceus, aut ro-
saceus, ex succo cichorii, vel boraginis, aut aliquis
talis similis pluries fuerit exhibitus; quo expurga-
to, pubi, & inguinibus cucurbitulæ affigantur; nec
non frictions, & vincula infernis partibus, cruribus
inquam, ac tibiis fieri præcipias, & reliqua, quæ san-
guinem, ac vterum aliterare possunt, medicamenta
tum intus suscepta, tum foris imposita adhibeantur,
præsertim aquæ dulcis balneum, infusus ex malua-
rum, ac althææ foliis & violarum, hordeo, & cha-
memeli floribus decocto parentur. Item circa pu-
bem, & inguina tale vnguentum imponatur, Reci-
pe olei amygdalarum dulcium, & amararum, & o-
lei de cucurbita ana vnc. i. adipis anseris, & butyri
recentis ana drach. 3. ladani drach. 2. fiat vnguentum. In-
super pefsi fiant ex contusis maluarum, & althææ ra-
dicibus, hordeo decocto, saccharo rubeo, adipe an-
seris, vel gallinæ omnibus contusis, ac simul permi-
xtis, & serico linteo veteri inuolutis, prius tamen
quàm immittantur in oleo amygdalarum dulcium,
vel de cucurbita intingantur. Hoc item tempore
cremor seminum melonum, vel cucumeris cum a-
qua hordei cum corticibus paretur, aut aqua capil-
lorum veneris, vel in qua radix glycyrrizæ fuerit
decocta, & exhibeatur. Insuper patilli parentur ex
prædictis, ac reliquis seminibus communibus: qui
à balneo, seu infusu cum prædicta aqua hordei, vel
capillorum veneris præbeantur, & vbi hæc non suf-
fecerint, ad eas quæ menses prouocant, medicamen-
ta in fine huius capituli cōscripta confugas, ea tamē
eligendo quæ minus calida sunt, & cum prædicto-
rum aliquo permisceas, ac vtare. At vbi frigida
corporis intemperies menses profluere impediat
oppositam curationem esse oportet, quam ad cali-
diores temperaturas retulimus; nam calidioribus
tum cibis, tum medicamentis vtendum est, fortio-
raque exercitia, ac plurimos labores imperabimus.
Vinum item fuluum, odoratum, vetus, ac minimē
dulce exhibeatur. Inter medicamenta verò ea eli-
genda sunt, vt inquit Aetius, quæ calore suo sangui-
nem dissoluant, veluti est thymum, pulegium, cala-
mintha, dictamnū, abrotonum, & alia huiusmodi,
quorum in fine mentio fiet. At si cum frigida cor-
poris intemperie crassiorum, ac frigidiorum adfit re-
dundantia succorum, qui sanguini admixti men-
sium purgationem impediunt, ipsos prius decenti
medicamento purgare conuenit, vbi concocti, ac
præparati fuerint, & deinde quæ menses prouocare
possunt, adhibenda sunt. Præparentur autem tum
extenuanti victus ratione, cibisque semper, ac po-
tibus aliquid odoratum admiscens, cum etiam ex

tenuantibus, ac incidentibus medicamentis, vt ro-
saceo melle, interim etiam & oxymelite, modò vte-
rus affectus non sit, aut quæpiam alia neruosa pars.
In quem etiam vsum syrupus de tribus radicibus gē-
tilis, de duabus radicibus Mesues, aut de hyssopo,
vel eiusdem hyssopi, pulegij, calaminthæ, origani,
feu abrotoni decoctum ex aqua multa præbeto.
Concoctis autem, ac præparatis iam dictis frigidis,
ac crasis, ac succis medicamentum purgans exhi-
beto ex Galeni hiera, & agarico compositum, vt
Recipe agarici trochiscati syrupo. 4. pulueris hieræ
drach. i. formentur cataportia cum melle rosaceo, aut
oxymellite, vel ex cassia fistula, agarico, & hiera bo-
lum conficias, adiectis interim scrup. 2. vel 3. diaphi-
niconis. Et vbi validioribus indigeas, pillulis fœ-
tidis, de sagapeno, aggregatiuis, ac de agarico, & re-
liquis huiusmodi vtare. A purgatione autem san-
guinem ex malleolis mittere conuenit, non tamen
in multa copia vena incisa, vel adhibitis malleolo-
rum scarificationibus, potissimum si mulieres albi-
diores, ac carnosiores fuerint, quæ quidē paruas in
cruribus venas habent, & sanguinē acruare tenuē
solet, iuxta Gal. decret. lib. de curan. ratio. per venæ
sectionem. Tempus autem mittendi sanguinem sit
(vt superius demonstrauimus.) Verum si redundans
humor atra bilis fuerit, syrupus de pomis, de succo
boraginis, aut fumarizæ, aut etiam de epithymo plu-
ries exhibeatur, & demum epithymi, ac senæ deco-
cto, in quo vnc. i. cassiæ fistulæ fuerit dissoluta, &
drach. 7. diacatho. aut drach. 3. confectionis hamech
purgetur. Nec etiam inconuenit drach. i. agarici in
prædicto decocto adicere, quo expurgato, in mal-
leolis vena incidatur congruo tēpore, vt docuimus,
potissimū vbi graciliores, ac nigriores fuerint mu-
lieres, ac magis si magnas habere venas appareant.
Hæ etenim crassiorē sanguinē, ac magis melanco-
licum colligunt, vt liquet eodē libro de curandi ra-
tione per venæ sectionem cap. 11. Post hæc medica-
menta, quæ detentos menses euocant, conscribenda
sunt, quibus prædictæ omnes à purgatione vti de-
bent. Huiusmodi autem sunt quæ exalfaciunt, non
tamen valenter deficcant, vt testatur Galenus quin-
to de simplicium medicamentorum facultatibus
cap. 21. Cuius farinae sunt (vt ipse inquit) pulegium,
calamintha, fauina, meium, dictamnū, asarum, co-
stus, cassia, cinnamomum, amomū, aristolochia, tris,
bunium, & eius generis reliqua. Hæc enim (vt refert)
absolutas vteri purgationum retentiones sanant. At
eodem libro de curandi ratione per venæ sectionem,
cap. 18. menses abundē prouocare aserit, ne-
pitam, & pulegium, si in melicrato coctæ exhibean-
tur, aut contusa, arida, cribrōque subtili discreta, ac
rursum trita vsque dum pollinem tenuitate referat,
& inde in melicrato inspersa. Conuenientissimum
autem tempus sumendi est à balneo inuolutis ad-
huc linteo. Verum hæc medicamenta, eiusdem au-
toritate, mitia sunt. His autem valentiora exi-
stunt, fauina, & dictamnū, quorum vsus sit antedi-
ctis similis: quo etiam tempore medicamentum da-
tur, quod propriè amarum appellatur, confert nan-
que mulieribus, quæ non probè purgantur singul.
drachm. i. exhibeatur cum aquæ calidæ cyathis tri-
bus, vt eidem Galeno visum est secundo de compo-
sitione medicamentorum secundum locos, cap. 1. &
citato lib. de curandi ratione per venæ sectionem.
Duo autem tempora commoda sunt ad alia me-
dicamenta accipienda (vt refert Aetius.) Alterum

Purgatio.

Vena sectio

cap. 11.
Si atra bi-
lis redundans
rit, curatio.Medica-
menta que
menses euo-
cant.Lib. de cur.
rat. per ve-
næ sect. ca.
18.
Aet. lib. 3.
cap. 45.

appropinquante iam purgationis tempore. Alterum ut postunctionem fomentaque, ac balneum statim bibant, comedantque cuncta supra à nobis commemorata. Ac insuper thymi, radicem asphodeli, corticum radices mori, mercurialis, carpesia, floris iunci odorati, spica nardi, ac celtica, similiter acori decoctum in vino albo veteri, quod excolatum calidum exhibeatur, ut supra, his praesertim quae frigidam temperaturam habent. Probat item facit opopanacis, sagapeni, myrrhae, aut castorei drac. i. si exhibeatur. Idem quoque possunt cumini, fœniculi, oreofelini, dauci, amij & cicerum decocta, ut idem auctor refert. Paulus praeter hæc helenij radices decoctum, artemisia, saluiaz, absynthij, seminis apij, ac fœseli approbat, quæ omnia nedum vino (ut inquit Aetius) aut aqua mulsa, ex Galeni auctoritate, verum etiam in aqua decoqui possunt, prout magis, vel minus mulieres fuerint natura frigidiores: quæ etiam ratione habita magis, vel minus calfacientia medicamenta eligi possunt, nedum eorum, quæ hic conscripsimus, sed aliorum quæ ab aliis commemorantur, quorum copia magna est, adeo ut si quis omnia auxilia in hunc usum commoda recensere velit, ei multo ocio opus fuerit, ut Aetius inquit. Pastillos tamen, quibus in hunc usum uti consuevi, hic conscribam, potissimum cum semper ingentem ex eis utilitatem perspexerim, recipiunt autem seminis fœniculi, dauci, & fœseli, singulorum scrup. i. cinnamomi cassia, cuius licet scrup. s. seminum melonum, aut cucumeris vnc. s. faccari dissoluti in aqua melystophylli, aut capillorum veneris quantum satis sit, formantur pastilli, quibus temporibus ante dictis utantur cum aqua mulsa, aut aqua capillorum veneris. Consuevi interim semen apij, amij, oreofelini, interim quoque maiorem vel cinnamomi, & cassia, vel seminum communium frigidorum quantitatem adiacere, habita ratione diuersi habitus temperaturæ, ac ætatis ipsarum mulierum, similiter & temperaturæ anni, ac reliquorum. Mirticæ quoque conducunt pastilli & myrrha, si drac. i. exhibeatur cum aqua mulsa, aut aqua capillorum veneris. Item infusus, fomentationes, & balnea adhibeantur, balnea quidem mineralia si haberi poterunt, inter se summo pere præstat id quod Puteolis reperitur, Syluanæ balneum appellatum. At si naturale balneum haberi nequit, infusus fiant in aqua, in qua artemisia, chamæmelum, pulegium, calamintha, sauiua, maiorana, ac ruta fuerint decocta, aut quedam alia ex his, quæ supra meminimus. Ex quibus quoque faccelli parari poterunt, qui calfacti in latere irrorato ex paucio vino albo applicentur: sæpius iterentur, ac foveantur partes circa vterum. Insuper suffitus ex aromatis muliebria ducit. Hippoc. auctore aphorism. 28. 5. libri: quoniam vasorum ora obserata aperit, extenuat humorum crassitudinem, & obstructions incidendo liberat, ut in communi inquit Galenus. Fiat quoque inunctio in imo ventre, pube, & inguinibus ex hoc vnguento, quod recipit olei liliacei, & irini ana vnc. i. olei amygdalarum amararum, & de capparibus, cuiuslibet vnc. s. succi rutæ, aut sauiæ, & artemisia, vtriusque drachm. 4. ladani drac. 6. cum fera quod satis sit, fiat vnguentum. Pessis etiam ubi opus fuerit, vendum, primò mitiores, dein de etiam validioribus. Atqui mitiores pessis sunt ex anserino, seu gallinaceo adipe, saccharo rubeo, & paucio croco, quibus interim mercurialis herbæ confusæ parum adiacere poteris, aut tantum-

Gal. lib. de
tur. rat. per
vene fœli.
cap. 18

Topica me
dicamenta

dem artemisia, vel maiorana, seu ruta, aut sauerina, & pulegij quandoque. At si validioribus opus erit, myrrham, bdellium, galbanum, styracem, aristolochiam, rubeam tinctorum, abrotonum, calaminthæ, resinam terebinthinam, ac reliqua huiusmodi adicienda sunt, eisdem prius confusis, ac linteo serico, aut lineo tenui ad formam digiti humani inuolutis, oleoq; irino, aut liliaceo prius infusis, mulieris pudendo immittantur, adeo ut os vteri attingant, ligentur tamen cruribus, ut promptius ubi opus fuerit, auferri valeant.

Περί υπερκαθάρσεως, καὶ ἀμφοτέρων ὁρίεται.
Id est, de immodica purgatione vteri, &

sanguinis profusio,
CAP. CVIII.

MODERATI sunt menses prodeuntes in omni muliere si sana sit, ut duarum heminarum atticarum mensura secedant, aut paulò plures, vel pauciores, atque hoc ad duos, aut tres dies, Hippoc. auctore lib. de morbo muliebri. longius autem tempus, vel breuius morbosum, & sterile est. Etenim si pauciores, aut plures dies quam solent, prodeant, aut ipsi etiam pauciores, aut plures fuerint, morbo si sunt, ut ipse inquit, siquidem menses iuxta sanitatem corporis, & vterorum exitum inueniunt, itemque iuxta naturalem, ac iustum modum, & à calore & humiditate mensuum, & stomacho scilicet vteri non valde laeso, ut idem Hippoc. testatur libro de sterilibus. Solet autem menstrua purgatio quibusdam mulieribus cum albæ, & molles fuerint, propterea quod multus, tenuisque sanguis in eis colligatur, diutius permanere, tum de ipsarum ætate intelligendo, tum etiam de diebus, quibus lunisimodum mulieres purgantur, quemadmodum contrario modo affectis, nigris inquam, duris, ac gracilibus contrarium euenit, ex Galeni sententia, 6. de morbis vulga. Cum itaque menses plures, ac copiosiores fuerint, quam solent, nimiam eorum purgationem appellamus, Græci υπερκαθάρσιν καὶ ἀμφοτέρων dicunt. Idque trifariam fieri contingit, vel collatione habita ad priores circuitus, ita ut sanguis copiosior quam consueuerit, & per plures dies prodeat, vel à partu, vel etiam ab abortu, ad quos plurimus sanguis insequatur: quanquam in hoc veluti & in reliquis naturalibus excretionibus, non quantitas duntaxat pro scopo proponenda est, vel qualitas, aut genus substantiæ, ut libro de differen. symptom. cap. vlti. scriptum est, sed si tempestiue, vel intempestiue fiant, ad animalis commodum, vel incommodum. Quopropter tunc nimiam vel immodicam dicimus propriè mensium purgationem, cum ea amplius non tempestiue, neque ad animalis commodum fiat, sed potius intempestiue, & noxa, ac nocumentum ex ea mulieribus consequatur, nam quandoque plus iusto purgabantur absque earum læsione propter longam desidiam, & victum liberaliorem. Quòd verò in hac affectione vterus oblatus sit, nemini in dubium venit, nam mittuntur in venas, quæ vtero committuntur menses, ut præcedenti cap. dictum est, tanquam ad omnium infimissimas partes, qui eisdem mulieribus valentibus existentibus antequam concipiant, salubres sunt purgationes. Quæ de re si immodicè profliuant, ipsam vterum affectum esse indicabunt, aut per se solum, vel simul cum toto corpore, vel aliquibus partibus

Que ani
modum
da sint p
casarum
erution
Lib. 6. r. 4
Casse d
mpe.

In pri
pio.

commu
commu
Exo cita
prognost
ca.

Quid po
nim ad
men
purgat
intellig
dum p
puri qu
affluunt.

Qui aff
tui p
natur
mensium
profusio.

Quia

partibus eius. Affectus verò symptoma est in genere excretorum immodicè, non tamen toto genere præter naturam, veluti & reliqua sanguinis profluvia. Nam præter eam, quæ mulieribus, per vterum erumpit, cæteræ sanguinis plussculæ vacationes toto genere præter naturam sunt. Illæ verò sola multitudine, seu quantitate, vt liquet ex Gal. 3. de cau. sym.

Signa. pro. cap. 4. Cum autem immodicè menses vacuantur, sequitur calor fœdus, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prosternitur, vitiatur ciborum, tum concoctio, tum cupiditas, atque in totum omnia, quotquot immoderatam sanguinis vacationem, siue ex hæmorrhoidæ, siue alio quopiam sanguinis fluore euenientem sequi consueverunt accidentia, huiusmodi fœminas infestant, ex eiusdem Gale. testimonio lib. 6. de loc. affe. cap. 4. Vt autem ritè diuersæ causæ huius immodicæ excretionis inuestigantur primum cõsideranda est erumpentis sanguinis multitudo, & delationis modus: ex his namque perdisces, num ex vasorum ruptura, reseratione, aut erosione fiat, nam amplioribus valis ruptis, aut apertis, magna sanguinis copia conferitur profluat, à minoribus verò vice versa (vt inquit Aetius.) At si ea quæ præcesserunt consideres nunquid ex ruptura, vel apertione vasorum sanguis profluat, promptè perdisces, nam eis disrupis, aut vehemens frigus, aut vehemens motus, vel sanguinis abundantia præcessit, aderitque interim aliquis dolor. Apertionem autem eorum non frigidæ, sed è contrario calidæ dispositiones præcedunt, veluti si multis, eisdemque calidis balneis mulier vsa fuerit, atque terram inhabitet calidam, fueritque antecedens tempus eiusmodi, similiter quoque alimenta, & potiones, nullusque dolor aderit. Ab erosione verò, si sanguinis profluuium prodeat, dignosces, quoniam non conferitur, sed modicus ac paulatim, & cum maximo dolore defertur, eodem Aetio teste cap. 64. lib. 16. Quod si erosiones causa redundantes in toto corpore vitiosi succi fuerint, biliosi inquam, aut pituitosi falsi, tum ex reliquis eorundem humorum propriis indicis, tum etiam ex colore eiusdem, qui profluat, sanguinis mensuri, percipies, iuxta Hipp. sententiam lib. de morbis muliebribus. Eiusdem autem menstruæ purgationis immodica vacuatio haudquaquam spernenda est, nam nonnullæ, cum vteri nimio sanguinis profluuiio laborant, hydropem accersuerunt, Galeno auctore 2. de natur. facu. cap. 8. Id quod etiam timendū est in omnimoda menstruæ purgationis cessatione, vt ipse inquit, cum vtrunque ad extremam frigiditatem mulierem ducat. Quæ verò mensium profluvia grandiores partus consequuntur, haud ita periculum minantur, quinimò etiam plerumque sua sponte cessant, vt inquit Paulus cap. 62. libri 3. Quemadmodum si abortiuus foetus causa fiant, repentinum quandoque periculum inducunt, vt liquet ex eisdem Aetio, & Paulo. Verum ex quacunque tantundem causa fiat mensium profluuium, vbi fuerit immodicum animi deliquium minatur, & syncopem, vt patet primo de arte cur. ad Glau. cap. 14. Interim etiam & mortem, quamuis naturalem partum consequatur, velut in reliquis accidit immoderatis sanguinis profusionibus. Pro curatione itaque profluuij mensium, aer eligatur temperatus, aut parum ad siccum, frigidumque vergens, somno etiam temperato vtantur, caueant à motu, atque exercitio, sed quies iniungatur, animi affectus immodicos vitent,

præsertim iram. Cibus eligatur quantitate moderatus, qualitate adstringens, bonique succi, similisque potus. Quapropter circa initia micas panis è posca exhibebis, vbi præsertim ieiunium tolerare nequeant, aut oryzam ex posca, aut ouum forbile, molle, frigidum (vt inquit Aetius) in quem vsū etiam similagine, amylo tum posca vti poteris. Carnibus vbi opus fuerit vtantur, syluestribus potius, quam domesticis, ac eisdem assis, magis, quam elixis, vt phasianorum, starnarum, perdicum, merularum, turdorum, aliarumque paruarum auium montanarum, & inter quadrupedes leporum, cuniculorum, seu capreolorum carnes eligantur. Quod si eisdem etiam elixis vti velint, in eorum iure polygoni, plantaginis, aut oxalidis folia decoquantur, aut etiam fructus adstringentes, vt citonia strutia, seu pyra. Vinum omnino pro potu vitandum, ex Pauli testimonio, sed aqua pluuiali vtendum, in qua etiam ignitum ferrum fuerit extinctum, aut aqua, in qua oxalidis, polygoni, seu plantaginis folia fuerint decocta, aut myrti fructus, seu cydonia, atque ipsa item posca pro potu vti conuenit, non siquidè frigida, sed tepida, vt Aetio visum est. Confestim quoque artus, & extremas partes, præsertim superiores, cõstringere oportet, quanquam & inguina vinculis excipi possent, Paulo, & Aetio testibus, & iuxta Hippocr. sententiam cucurbitulæ magnæ sub mammis apponendæ, vt aphor. 50. 5. lib. scriptum reliquit, in quem etiam vsū, potissimum vbi sanguinis fuerit redundantia ac reliqua non prohibuerint, venæ sectio reuulsione gratia in cubito facta confert, præsertim internæ venæ, exiguaque sanguinis quantitas auferatur, & si opus fuerit, iteretur. Deinceps verò si ob vasorum apertionem sanguis profluat per ea, quæ obturant, curare oportet, quemadmodum si ex eorundem vasorum ruptura contingat, quæ conglutinant adhibenda sunt. Atqui obturatur osculum dilatatum per adstringentia, conglutinatur autem ruptum per eadem, & quæcunque ipsis in compositione miscentur citra mordacitatem resiccantia, & glutinosum quoddam habetia, veluti est terra lemnia, sphragis appellata, & famius aster (Galeno auctore 7. de compos. medicamen. secundum locos, cap. 4.) quæ veluti ad sanguinis spuitiones vnde decunque natas conferunt, eademque vi sanguinis ex vtero profluvia, & vocatum fluxum muliebrem iuuant, vt liquet ex eodem auctore, nono de simplicium medicamentor. facult. Dabimus item in potu balaustrum ex posca, aut hypocistidis, vel acaciæ succum, siue lycium, vel etiam vix acerbæ succum siccum, ex sententia eiusdem Pauli, & Aetij. Prodest etiam sefamum posca macerare, atque in molle factum edendum præbere, aut loti ramenta, & eorundem decoctum, similiter & corallorum drac. 2. exhibere (vt idem refert Aetius.) In quem etiam vsū succus polygoni, aut plantaginis ex posca potus non parum confert, vel drach. 1. cornu cerui vsi, & tantundem corallorum rubeorum, lapidisque hæmatite scrup. 1. cum posca exhibeantur. Nec minùs conducit, si drach. 1. vel drac. 2. radices symphyti cum eadem posca, quæ semper tepida sit, exhibeatur, & vbi hæc non suffecerint, drach. 1. pastillorum è spodio, è fuscino, vel è terra lemnia cum eadem posca præbeas. Extrinsecus autem vteri loca perfundantur, seu foueantur ex eadem tepida posca, aut oleo rosaceo, melino, seu myrteo paucò vino admixto. Item cataplasmata ex hordei, fabarumque farina, symphyti

Visum ratio.

Loco citato

Medicamentorum ratio. Venæ sectio.

Cap. de terra famia. Quæ in potu præbenda sunt.

Topica.

radice, polygoni, ac plantaginis foliis, acacia, alumine, & hypocistide ex posca composita adhiberi poterunt, aut ex palmulis, malis cydoniis, malicorio, balauftiis, alumine, gallis, acacia, & hypocistide, teneris rubi, seu lentisci virgultis cum eadem posca cataplasma fiat. Vel vnguentum, quod vulgus medicorum Comitissa appellat, paucis aceto addito adhibeatur. Efficaciter quoque prodest taurocolla aceto macerata, donec dissoluatur, deinde valido linteolo inducta, lumbis agglutinetur, decreto eiusdem Pauli, & Aetij. Insuper infusus fiant ex foliorum myrti, rosarum, plantaginis, polygoni, symphyti, virgultorum rubi, ac lentisci decocto, pessulorum quoque; vsus haudquaquam contemnendus erit, qui ex foliis plantaginis, polygoni, aut myrtillorum, symphyti, & radice contulis, pauca addita manna thuris, hypocistide, ac balaustio cum eiusdem plantaginis, seu polygoni succo conficiantur. Interim gallarum pulvis, ac aluminis scissi, necnon acaciae succus cum ouorum testorum luteis adici poterunt, & quandoque cupressi folia, aut rubi, pariterque & cytini. Cum vero vsus exigit linteo serico, aut linteo tenui excipiantur, & ad formam humani digiti redacti in rosaceum intingantur, ac subdantur. Suntque pessuli penitus vsque ad os vteri immittendi. Infundatur quoque per instrumenta ad hunc usum parata in vterum, quae *μντρεχυστας* Graeci vocant, plantaginis, polygoni, seu solani succus. Similiter acaciae, vel hypocistidis. Vel decoctum in aqua pluuiali, malicorij, gallarum, balaustium, hypocistidis, ac foliorum lentisci cum polygonij, seu plantaginis succo, aut etiam acacia. Galen. vero ex vtero sanguinis profluvium quaternis iam diebus profluens, cum nullo alio potuisset sisti remedio, plantaginis succo vtens, prorsus sanauit. Quanquam id medicamentum & ad ea quae ex erosione excitantur, sanguinis profluvia, sit vtilissimum, vt patet 5. meth. med. Erosio vero magna ex parte in ceruice potius vteri quam alibi contingere solet, decerniturque per excretam saniem, si fuerit profunda. Si vero circa os ceruicis constitit, non solum per hanc, sed per tractum quoque cognosci potest (eodem Galen. teste 6. de loc. affect. cap. 4.) At quod ea per renutritionem erosorum, quae fit per cibos boni succi, & medicamenta sarcotica dicta, hoc est, carnem gignentia curetur, patet eodem libro 7. de composit. medicament. secundum locos cap. 4. Quapropter nedum injectus plantaginis succus (vt diximus) huiusmodi profluvium suppressere valet, si cyathi mensura iniicitur, vt inquit Aetius, verum etiam aliquando fortius aliquod admiscendum erit, alias aliud pro affectionis respectu, nam si vas, vnde profluit sanguis, magnum, & amplum fuerit, austeris medicamentis opus erit, balaustio inquam, acacia, hypocistide, gallis, malicorio, & similibus. Si vero paruum, conferent aloë, manna thuris, cortex pinus, terra lemnia, lapis hematites, & reliqua huiusmodi, quae nedum cum succo plantaginis, verum etiam vino austero nigro, aut fenecionis succo subdita, & injecta conferunt, ex sententia eiusdem Aetij. Et (vt summam dicam) quae mediocriter, & sine morfu detergant, atque exsiccant, commoda sunt, vt quae carnem generent, vt liquet tum 3. method. medend. cap. 3. tum 2. de compositione medicament. per genera, cap. 1. Vbi vero exulceratio, seu erosio adhuc fiat, vel augeatur propter redundantes (vt diximus) in toto corpore vitiosos succos, nulli in dubium venit eos

prius purgandos esse, & deinceps modò dicta medicamenta adhibere. Quae de re si biliosi fuerint, adhibitis prius (si detur occasio) syrui. quibusdam, vt ex infusione rosarum, vel succo myrtino, vel è succo oxalidis, seu acetoso simplici, vel oxyfaccaro cum aquis plantaginis, polygoni, vel oxalidis, hoc purgans medicamentum exhibeatur, quod recipit, tamarindorum vnc. s. corticum myrobalanorum citrinarum drachm. 3. in aqua oxalidis, & plantaginis fiat decoctum, in quo dissolue syrup. de nouem infusionibus rosarum rubearum vnc. 4. rhabar. sine spica drachm. 1. vel syrup. 4. misceantur, & fiat potio. At si falsa pituita erosionis causa fuerit, syrui è corticibus citri, vel mel rosaceum cum syr. myrtino, vel ex absinthio aliquibus vicibus praebeto, deinceps vero medicamentum purgans tale exhibebis, Recipe corticum myrobalanorum chebularum drach. 4. agarici trochiscati drachm. 1. vel scrup. 4. fiat decoctum in aqua plantaginis, in quo vnc. 3. syrup. ex tribus infusionibus rosarum perficarum, vel vnc. 4. syrup. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum dissoluas, & potui exhibeatur.

Περί γυναικείας πύ. Id est, De muliebri profluvio.
CAP. CIX.

Quemadmodum totius corporis culpa aliquando prorsus non purgabitur foemina, aliquando parcius, aut liberalius, ita quoque interdum malum quidpiam per vterum vacuabit, vt liquet ex Gale. 3. de causis symp. Vocatur autem haec affectio à Graecis *πύς γυναικείας* vt patet ex Galen. citato loco, & lib. de differ. symp. ac 6. de locis affect. cap. 4. quem sectati sunt Paulus cap. 63. libri 3. & Aetius cap. 65. lib. 16. A Latinis vero muliebris fluxio, seu profluvium muliebre appellatur. Est vero totius corporis recrementi destillatio, vt inquit Paulus, vel vteri destillatio diuturna, vt Aetio visum est, vel vniuersi corporis per vterum expurgatio, ipso haudquaquam affecto, vt ex Gale. colligitur citatis libris 3. de symp. caus. & 6. de locis affect. cap. 4. In hac autem affectione (licet eius multiplex habeatur ortus, vt paulò post dicemus) vterus ipse haudquaquam affectus est, licet per ipsum vniuersum corpus expurgetur, quemadmodum interdum per renes quoque euacuatur, ex eiusdem Galeni auctoritate praecitato libro 6. de locis affect. cap. 4. nec alicuius determinatae corporis partis affectio haec dici poterit, quamquam & ipsa symptoma sit in genere excretorum immodicè, praesertim in qualitate, nam vitiosum est, quod expurgatur, vt eodem libro de differ. & 3. de causis symp. scriptum est. Deprehenditur vero muliebris fluxio ipse, notis, à menstrui sanguinis eruptione differens, eò quod in illa syncerus sanguis prodit, hic vero fluxus corruptus apparet, diuersorum tamen calorum, pro diuersitate redundantis succi, vt dicemus, qui etiam citra dolorem prodit. Quapropter loci (vt inquit Paulus) continuè madent humoribus colore variantibus, laborans decolor est, cibum non sentit, eumque fastidit, in obambulatione difficulter spirat, oculos habet prætumidos, nunc cum dolore, nunc citra illum, aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida, aut pura. Inferre quoque solet hic fluxio inenarrabilem tristitiam, & pedum tumorem, & in aliquibus perpetua destillatio perseverat; in aliquibus vero per intervalla quaedam redit, ex Aetij testimonio. Atqui

cap. 5.
Si ex erosio-
ne prouo-
niat mensis
profluvium,
curatio.

Curandi
methodus.

Atqui si purus sanguis, qualis ex dissecta vena profluit, & cum dolore promanabit, vteri erosionem indicabit, de qua præcedenti cap. sermonem fecimus, nec tale profluuium muliebri appellari debet: nam in eo vterus haudquam affectus est, in hoc proprio morbo laborat, qui erosio, seu exulceratio existit. Hic vero corruptus fluxus, qui in muliebri profluuiio fit, aliquando ruber est, veluti tenuis sanguinis sanies, aliquando albus, veluti pituitæ succus, a pituitoso videlicet sanguine ortum habens, interdum pallidus, ubi bilis amara redundat, interdum aquosus a seroforum humorum superfluitate. Nam perpetuo id quod euacuatur, tale specie est, quale est quod in animali redundat, ut liquet eodem tertio de causis symptomatum, potissimum autem id fit, si mulier laxis sit carnis, & pituitosa, ex eiusdem Galeni sententia citato lib. 6. de locis affectis. Qui itaque exquisitè colorem præ se fert aliquem, is redundantem humorem facit indicat. Si vero obscurum colorem habeat, causam eius ita perferretabatur, linteum eo inquinatum arefactum simplici aqua eluimus, & inde à maculæ colore redundans humoris notionem capimus, ut inquit Aetius. Generatur autem talis fluxus muliebris, vel ex complicitate functione imbecilla, vel expultrice immo dicè concitata, vel ambabus simul laxis, aut quòd totus sanguis tenuis, serosusque est redditus, ut libro de different. sym. cap. ult. à Gal. scriptum est. Atqui sanguis talis fieri potest, vel ex sanguificæ facultatis operis frustratione, vel eius, quæ tenuis, & serosum separat, seu idem excernit. Incidere etiam aliquando potest ex retentrice ipsa immodicè opus suum virgente, & cute inspissata, & renibus oclusis, ex eiusdem Galeni auctoritate citato libro de different. sympto. Præter has itaque causas vniuersus sanguis tenuis, serosusque reddi potest, ac per vteri vasa expurgari, retentrice eorundem vasorum facultate interitum imbecilla, interdum verò expultrice (ut diximus) immodicè concitata, aut etiam ambabus simul laxis ob copiam, & sanguinis qualitatem. Si autem num sanguificæ virtutis vitio, vel eius, quæ tenuis, & serosum separat, seu excernit, symptoma hoc fiat, discernere velis ea consulas, quæ capite de hepatica affectione, aut de renum affectibus conscripsimus. Inspissatam autem cutem probe ex ipso percipies, neque magno labore retentricis, aut expultricis facultatis læsionem, seu vtrarumque reperies. Ceterum ætate vigentes mulieres rubra ferè fluxio infestat, declinante verò ætate, alba, & vtraque fluxio, si suæ ætati acciderit, facillè curatur, si alienæ, difficulter, ex Aetij testimonio. In omni verò muliebri de fluxu vteri os aperitur, & velut relaxatur, quibusdam etiam vterus ipse procidit, ut vsque ad muliebri pendendum progrediatur. Qua de re magna cum diligentia curanda est affectio hæc, neque localibus auxiliis fluxus confestim reprimendus erit, nam aliquæ in hydropem, aliquæ in neruorum affectiones, aut oris ventris, aut capitis vexatione collapsæ sunt, ut liquet ex eodem Aetio. Vniuerso itaque corpori pro eius curatione, quæ citra immodicum calorem exsiccant, auxiliantur, cum affectus sit humidus atq; aquosus (Gale. auctore lib. de præsignatione ad Posthumum) quem etiam sectatus est Paulus præcitato loco. Et propterea vniuersa victus ratio ad duo inclinare debet, ut idem Gale. asserit, potus videlicet paucitatem, & totius corporis frictionem ex melle solo multum cocto (tantum tamen refrigerato, ut

hac in refectanæ aquæ similis æstiuo tempore sit) post frictionem corpore peruncto: simili itaque victus ratione adstrictoria, ac ad siccum vergente, aliquatenus crassesciente quandoque, quam præcedenti cap. etiam institimus, vitendum est (ut summatim dicam) si quod interim magis aut minus exsiccantibus, ac adstringentibus cibis uti oportet pro diuerso humore redundante, quemadmodum etiam & eadem vterus ratio ad frigidum, vel calidum magis, vel minus vergere debet. Quod vero ad medicamentorum rationem attinet, similis quoque ratio habenda erit. Verum si mulier rubro fluore muliebri vexabitur, primum ei sanguinem per venæ sectionem vacuabimus, ubi nihil obstitit, pariter autem sanguinis detractio, veluti in his, qui sanguinem reiciunt, quo paulatim reuulsio fiat, ut inquit Aetius. Secunda autem est cubiti venæ, nam hæc non solum materiam ad vterum confluentem diuertit, sed muliebris fluxus detentionem, ac constrictionem tutam efficit. A venæ sectione, humis ac inguinibus detrita, & mollia lintea imponenda sunt frigidis succis imbuta, quorum præcedenti cap. meminimus. Locetur autem mulier coctis aculeis, erurique extendat, ac inter se compliceat ad vteri partes contrahendas. At si copiose sanguis feratur, coxæ, pectus, & lumbi spongiis posca madefactis integantur. Si verò modicè defluat, lana succida vino, & rosaceo imbuta adhibeatur, & extremæ partes deligentur, atque hæc non solum in principio fiant, sed etiam post circuitus, ante exacerbationem, & in ipsa exacerbatione, ex eiusdem Aetij decreto, & reliquis etiam vitatur medicamentis extra adhibitis, quæ præcedenti cap. adnotauimus. Cômòde quoque sunt quæcunque potiones sanguinè reiectatibus competunt, ex eiusdem Aetij sententia. Ceterum ubi vitiosi redundarint succi, biliosi inquam, pituitosi, aut serosi, quamprimum quoque iidem expurgandi, ac ab vtero deriuandi, & diuertendi sunt, & propterea Galenus eodem libro de præcognitione ad Posthumum, in Boethi vxore quæ hac affectione laborabat, primum medicamento per aluum educente vsus est, secundo eis quæ per urinam ipsum educere valent, & tertio his quæ per cutem euacare possunt, quibus remediis quindecim diebus cum fuisset vsus, prorsus prædictam mulierem à morbo vindicauit, & proinde Boethus quadringentos aureos ad eum misit. Seroso itaque humore existente, qui redundat, ex hiera, & agarico formatis catapotis, & potione ex decocto myrobalanorum chebularum cum syrup. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum, vel persicarum agram purgabis. Quod si neque vna purgatio satis sit, iteranda quoque eadem erit, in minori tamen quantitate, quemadmodum & Galenus in modo dicta agra rursus medicamentum purgans exhibuit. At si pituitosus fuerit sanguis, nedum hiera, agarico, & myrobalanis purgare conuenit, verum etiam & reliquis insignioribus medicamentis pituitam per aluum ducentibus, ut catapotis scetidis, ex sagapeno, aut agarico compositis, item & nostris, quæ cap. de aqua inter cutem conscripsimus, prius tamen ea exhibeantur medicamenta, quæ iam dictam pituitam concoquere ac præparare valeant. Bile autem flaua redundante eadem hiera, cum rhabbarbo myrobalanorum citrinarum decocto, ac syrup. ex pluribus infusionibus rosarum purgabis. A purgatione vero ea medicamenta exhibeantur, quæ propriè *επιτρεχά* id est, urinæ cictæ

Medicamē
toris ratio.

Aetius lib.
16. cap. 45
Vena se-
ctio.
T. pica me-
dicamenta.

Lib. 19. c.
66.

Potiones.
Loco citato.

cap. 8.
Quibus me-
dicamentis
fuerit vsus
Gal.

Purgatio
ubi serosus
redundat
succus.

Si pituita
redundat,
purgatio.


Bile reducta
dant.

M m

dicuntur, quorum sylua à Galen. scripta est lib. 5. de simplic. medic. facult. cap. 12. calida inquam, ac sicca existentia. A quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur, ac secernitur, non secus atque lac, quod coagulatur, seroso videlicet, & tenui seorsum segregato, crasso verò in se se coeunte, siquidem quo facillime ad se attrahant renes quod in sanguine aequum, tenuisque, ac serosum est, utraque hæc conferunt, nempe totius sanguinis primum suffio, deinde segregatio, quorum neutrum absque valido calore peragi queat. Hæc itaque peculiariter ab eodem Gal. ibidem vretica, siue vrinam mouentia appellantur, non quia solum moueant vrinas, sed quia solas absque vltieriam menses, aut lac inter quæ apium, atque asarum eligens, prædictæ mulieri eorundem decoctum in aqua adhibuit: hæc namque per vrinam humorem, qui per vterum expurgabatur, deriuando etiam euacuant, ut ipse testatur, cum hoc quod neque menses ciunt, ut quibusdam Arabicis falso visum est, & renes oclusos liberant, si id quoque talis muliebris profluij causa fuerit; nec minus & pro totius corporis frictione humor quoque euocandus est. Et si ex cute spissata adhuc talis affectio fuerit orta, iisdem frictionibus rarebit, quæ primò mollibus linteis, & demum asperis faciendæ sunt, iuxta eiusdem Gal. doctrinam præcitato lib. de præcognitione ad Posthumum, cap. 8. his quippe medicamentis vniuerso corpori adhibitis, intacto quidem vtero huiusmodi muliebres fluores Galen. sanauit, ut eodem 6. de loc. affect. cap. 4. scriptum est. Subsequatur autem totius corporis frictionem inunctio ex melle solum, multum quidem cocto, ut diximus. Verum vbi hæc non suffecerint, perseveraueritque muliebre profluum, ea exhibenda sunt, quæ præcedenti cap. de mensium profluo dicta sunt, potissimum autem ea eligantur, quæ non admodum efficacia existunt, item portulaca commanducata, succusque ipsius potius præsidio est, balauftium, rubi fructus, & flos, ut inquit Paulus: nec minus, & equisetum sistit rubrum fluorem potum ex aqua, aut vino, vel hypocistidis, aut lentisci fructus torrefactus cum vino sumptum, ut idem Paulus refert, similiter samius aster, terra lemnia, sphragis appellata, item coagulum leporis, aut hædi, aut ouis, aut vituli, aut cerui confert, vna etiam immatura sicca, piceæ cortex, & myrti (ut liquet ex eodem) faciunt quoque & prœonia grana pallida quindecim assidue pota, aut corallorum drach. 1. in vino nigro, aut vinacia trita cum vino, aut corticis loti arboris decoctum, ut inquit Aetius, præsertim vbi fluor albus, aut serosus fuerit, proditum quoque est, ut inquit Gale. 10. de simpl. medic. facult. leporis coagulum si cum aceto ebibatur, sanare profluum muliebre. Quod si cum dolore fluxus deferatur, asinum lac, præsertim asinæ per pacseua pratorum nutritæ, quiuis fuerit succus, præstat. Confert etiam & stercore eiusdem asinæ succus, similiter & alicæ, aut prisanæ succus, & rosaceum quoque, vel per se, vel cum lacte infusum. Ne verò ab humore transeunte vlcus excitetur, sanies profluens assidue calida aqua eluatur, & ipsis locis moderatè adstringentia adhibeantur, quæ simul abstergendi vires habeant, deinceps rosaceum, aut myrteum, aut melinum oleum illinatur, & aqua etiam pura nihil adstringens habens admixtum in principio præsertim adhibeatur, ob influentis humoris acrimoniam, necnon & ob eandem causam & alicæ, & ori-

za succus infundantur, ex eiusdem Aetij decreto. Lib. 16. 67. Caterum vbi fluxus cessauerit, à veloci ambulatione, à multis pectinis, ac lumborum frictionibus, ab acrium esu, à calefacientibus, à flatuosis, & ab his, quæ vrinam prolestant, diu abstinentum est, & balneis raro vtendum, neque venter mouendus est, neque spiritus retinendus. Hæc enim omnia malum reuocant, ut idem inquit Aetius, quæ fortè præcepta Boethi vxori Galen. instituit, postquam ab eodem affectu ipsam vindicauit, ne in posterum amplius e morbo agrotaret, ab eodè Boetho rogatus prohibens ne illi simile quod vacauerat, in futurum aliud gigneretur.

Περὶ ὁστρίων πύσης. Id est, De vteri strangulatione, seu suffocatione. CAP. CX.

 Vanquam ea pars, quæ mulieribus ad pariendum à natura data est, à Græcis μήτρα, seu ὄστρον, à Latinis matrix, seu vterus appellata (ut superius annotauimus) in infernis corporis partibus posita sit (quoniam supernis, eisque principibus communicat, cordi siquidem per arterias, cerebro per spinæ membranas, ac nervos, & iocinori per venas) propterea non mirum, si interim in eo affectus quidam oritur, qui omnes, vel quædam prædictarum partium consentiunt, qui affectus à Græcis interim ὄστρον καὶ ὄστρον πύσης, à quibusdam ἀπὸ τοῦ ὄστρον dicitur, Latini autem vteri strangulationem, seu vterinam suffocationem, vel spirationis ob vterum priuationem vocant, volentibus tamen ipsis utraq; appellatione vnum quendam affectum explicare, nomen assumens tum à parte ipsa affecta, tum à superueniente symptomate. Est autem affectus hic (Paulo auctore cap. 71. lib. 3.) vteri recursus ad superiora: in hac affectione modo sursum, modo in laeum vterus retrahi videtur, Gale. teste 6. de locis affect. cap. 4. quamuis Aet. quoque fateatur, quod in hac affectione vterus velut ad supernas partes ascendisse videtur, semper etenim, siue sursum retractus fuerit totus vterus æqualiter, siue ad laeum inæqualiter trahatur, velut supernas partes ascendisse videtur, cum eiusdem suffocatio oritur: quo motu non creandæ prolis gratia mouetur, si priuatur his, quæ concupiscit veluti animal, ut quibusdam visum est, & propterea vniuerso corpori nocere fatendum est: nec ob id quod posteaquam ita per corpus vterus errauerit ad septum transversum perueniens respiracionem impedit, veluti quidam prædictæ opinioni addiderunt, idcirco strangulatio fit; sicut etiam falsa quoque eorum opinio est, qui asserunt vterum exsiccari vbi suppressi sint menses, deinde humectari cupientem, ad viscera vsque ascendere, cum verò ascendendo nonnunquam septum transversum contingat, idcirco animal spiratione priuari, etenim tãquam erroneæ prædictæ opiniones à Galeno eodem sexto de loc. affect. cap. 4. impugnantur, & refelluntur, alia propterea causa huius retractionis, seu recursus inuestiganda erit, si prius partem ipsam affectam, ac affectu ipsam demonstrabimus. Quod verò vterus primò, ac præcipue in hoc vicio afficiatur omnium medicorum consensu liquet, & Galenus citato loco per hæc verba confirmat, cū dixit, Quod autè à priscis iam inde seculis optimo iure creditū fuerit hysterica dicta symptomata ad vterū tanquā ad radicē pertinere, vel maximo argumento esse potest, quod & solis viduis, & iis quibus menses supprimantur, huiusmodi affectus euenire consueverunt, quāquam si quis-

Que medicamenta à purgatione competant.

Aetius lib. 16. cap. 71. Gal. 10. de simpl. medic. facult. cap. de coagulo.

quispiam dixerit, quod ubi in hac affectione vterus retrahitur, vteri corpus non est affectu, sed peruersione laborat, cum aliis aliorum trahatur. hic haud absurda dicere videbitur, vt idem Galenus inquit. At quisnam affectus sit vteri suffocatio, seu stranguatio, non admodum liquet, nam interim cu eius retractione, seu peruersione fit, interim autem citra peruersionem, sed quando cum vteri peruersione affectio iam dicta generatur, nulli in dubium venit morbum esse in situ, seu figura ipsius vteri, prout ab Hippocrate, & Galeno tertio de articulis, scriptum est, quanquam non propterea quod peruersus, seu retractus est vterus, symptomata quae in animalis corpore apparent, oriuntur, sed propter aliam causam (vt dicemus). In hac etiam vteri strangulatione, quae cum eius peruersione fit, idem vterus intemperie, eademque frigida immodice laborat, quae dumtaxat eum laborare asserimus cum citra eiusdem peruersionem affectus hic excitatur, licet ori non haudquam possit quomodo libet generationem habeat, nisi intemperies haec principibus partibus imperitatur, cordi inquam, aut cerebro, seu vtrisque primum, & deinceps ab eis vniuerso corpori praesertim in prima, ac praecipua eius specie, seu differentia. Perpetuo itaque intemperie, eaque nimium frigida in hac affectione vterus laborabit. Quae de morbum hunc non inflammationem, sed flatuosam perfrigerationem esse Soranus dicebat, interim autem simul cu ea male situatus, seu figuratus erit, p diuersitate, seu magnitudine causarum, ex quibus originem duxerit, vt dicemus. Comitatur autem taliter affectus cum accessio propria est, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, ac tristis quidam aspectus: instante vero strangulatione, sopor grauis, ac profundus, mentis, ac sensuum apprehensio cum vocis interceptione, pulsus autem parui, ac debiles fiunt, & aliquando penitus intercipiuntur, quibusdam autem neque respiratio sensibilis permanet, aliquando vero aliis actionibus integris manentibus, magnam respirationem ex hac affectione habent, stomachi etiam dolore vexantur, & saliuam vomunt, si in stomacho, aut in capite humiditas sita est. Interdum etiam sic exanimat, vt tamquam comitiali morbo prostratus distat tamen hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spuma profluunt, nec nervi distendantur, sopor tantum est, idque quibusdam faeminis crebro reuertens, perpetuo est (Celfo auctore, ca. 20. lib. 4.) Inclinate vero accessione, corpus firmari incipit, & malae rubescunt, ac oculi post multam grauitatem attolluntur, & ubi iam malum agram relictum est, humiditas quaedam ex locis muliebribus excurrentes tactu percipitur, & intestina murmurant, ac ipse vterus paulatim laxatur, atque sic exurgens agra intellectum, & sensum recipit, vt liquet ex Aetio, & Paulo. Obstetrices quoque, seu medicae quae ipsas exquisitae teterunt, fatentur circa vterum notas quasdam apparere, nam ceruix eius inclinata videtur, interdum quidem veluti sursum retractus sit totus vterus, interdum vero veluti ad larus trahatur, nam simul cum vtero, ceruicem quoque ipsius retrahi necesse est (Galeno auctore, eod. 6. de loc. affect. cap. 4.) Ceterum cu vteri strangulationis differentiae plures esse possunt, pro efficientis causae magnitudine, vel pro specierum quarundam varietate inter se differentes, quia in earum aliqua omnino spiratio perditur, non ab re quaereret quispiam quomodo viuere tales possent.

quae nihil omnino spirant? Cum in confesso sit spirationem a vita, & vitam a spiratione separari non posse, adeo vt viuentem non spirare, & spirantem non viuere sit impossibile, quinimo ubi correspiratione priuetur, illico hominem perire necesse est, vt liquet quinto, & 6. de locis affect. cap. 4. & libro de vtilitate respirationis; quae de re quidam Heraclide posteriores credentes seruari aliquid spirationis, quauis ipsa non appareat, carptae latae hoc enlos coram naribus suspendi iubent, vt exacte deprehendatur num spiritus aliquis inter spirandum tum intro, tum foras rursus deferatur: aliqui poculum aqua plenum ori ventriculi imponere praecipiant, & considerant an aliquo motu aqua agitur, quippe immotum omnino seruari humorem aiunt, si tota perierit spiratio; & profecto vtrique ignorant aliquando lubrata penitus, oris, ac narium respiratione animal viuere posse, modo ea superfit, quae in toto corpore ab arteriis, & corde perficitur: id quod in latetibus animalibus manifestum apparet, nulla apparete in ipsis spirationis nota: haec etenim p tota hyeme mortuis similibus in cauernis latitant per arterias tantum totius corporis transpirantia: pari item ratione in vteri strangulatione fieri potest, vt toto corpore refrigerato (vt diximus) id enim manifeste videtur, nulla profus prodeat ab ore spiratio, superfit autem ea quae a corde, & arteriis fit, est etenim maximus, & praecipuus respirationis vltus (vt sexceteris in locis a Galeno decretum est) vt intimus calor, & refrigeratione, & ventilatione seruetur. Quae de re exiguus ille calor in hysteris mulieribus derelictus arteriarum, cordisque officio conseruari poterit, quae actio a quibusdam medicis transpiratio dicitur, quamuis (vt diximus) quae sit ab ore, & naribus respiratio omnino fuerit abolita, licet etiam adeo parua esse possit, vt sensum lateat nedum respiratio, sed etiam transpiratio ipsa: illudque clare constat non solum in Galeni, sed etiam Aristotelis doctrina, qui libro primo de natura animalium, cap. 11. talia protulit verba. Sed datur viuendi facultas etiam si desit spiratio, quamquam itaq; perfecta animalia, quae temperate calida sunt, praesertim dum sanitate fruuntur, citra spirationem haudquaquam viuere possint, vt liquet ex modo citatis Galeni locis, attamen quae frigida suapte natura sunt, vt latentia, aut ex accidenti vniuersum eorum corpus tale redditum est, vt in hysteris conspicimus citra respirationem non inconuenit, vt in vita seruentur, modo arteriarum, cordisque officium eis conseruetur; nec propterea his, quae cap. de apoplexia, scripta sunt, contradicimus. Adhuc vt nihil ad affectum hunc pertinens maneat indiscussum, iterum quaeret quispiam quam ob causam corpus hysteriarum mulierum refrigeretur? Ea vero haud difficile dissolui potest, si causas, quae praecesserunt, diligenter intueamur. Nam conuenit inter omnes medicos, vt idem Galenus asserit citato libro sexto de locis affectis, hic affectum magna ex parte viduis euenire, usq; maxime, quae cu antea probe purgarentur, ac parerent atque virorum concubitu gauderent, iis omnibus priuantur; ex quibus conicere possumus, quod ob retenta menstrua, vel ob semen cohibitum mulieres vteri suffocatione, seu strangulatione cruciantur, idque fortasse magis (vt idem Galenus inquit) a semine retento contingere potest, vt pote magnam vim obtineri te, vt est enim in mulieribus humidius, ita etiam & frigidius, semen etenim in vtero paulatim co-

Lib. de viti-
lit. respir. 6.

Cur isteri-
carum cor-
pus refrigeretur.
Loco citato.
Causa.

veruatum, aut etiam sanguis menstruus, vitiosi red-
dūtur, ac perfrigerantur, quibus perfrigeratis vterus
quoque taliter afficitur, à quo demum ad cerebrū,
ac cor frigiditas transmittitur paulatim tractu tem-
poris, à quibus deinceps vniuersum corpus celeriter
alteratur, ac refrigeratur, & relata inferunt sympto-
mata, vel tenui quadam substantia, veluti aura ab
eisdem excrementis ad iam dictas partes principes
ascendente, vel continuitate partium traducta alte-
ratione per quandam veluti qualitatis diffusionem
mediis corporibus, cum quibus vterus ipse prædictis
principibus partibus communicat. Neque mirū vi-
deri debet, si vel ex minima humorū mole tāta cōse-
quantur symptomata, etenim à phalagij quoq; ictu
totum corpus affici videtur exiguo veneno per mi-
nimum foramen iniecto, & longè maiori admira-
tione est scorpionis ictus, quod breui admodum tē-
pore grauissima infert symptomata, quanquam exi-
guum sit id, quod iniicitur, aut nihil omnino, nullo
apparente foramine in ipsius aculeo; necnon quod
canis rabie capti, solum spurum si humanum corpus
tetigerit, rabiem excitare possit, ex eiusdem spuri
qualitate aucta quadam corporis dispositione, ita vt
post sex menses quando ad magnitudinem notatu
dignam peruenerit, discerni possit: item similibus
quoq; affectibus infestari possumus iis, qui perni-
cioso epoto veneno eueniunt corruptis, in nobis
ipsis adeo humoribus, vt veneni tum qualitates, tum
vires æquent. Vitiatum itaque semen, aut menstruum
cūm retinentur, corporibus potissimum vt affician-
tur idoneis, paulatim tractu temporis principalium
partium aliqua cōsentiente, à qua deinceps vniuersum
corpus celeriter alteratur, cūm totū corpus refrige-
rare valeat, prædicta grauius symptomata inferre pos-
sunt, & aliās aliā quoq; accidentium species oriri so-
lent pro multitudinis, qualitatis vt ratione tum mē-
struorum, tum feminis. Nam vbi crassa, vel acris fue-
rit eorum natura, conuulsiones, si verò atra bilis na-
turam habuerint, mœstitiā inducere possunt, quē
admodum animi quoq; defectiones, & ad fortes ex-
tensiones, & refrigerationes, & stomachi actum se-
qui consueverunt. Et propterea contingit etiā qui-
busdam sensus, ac motus priuatio, & pulsus obscu-
rus, ac paruus, & penitus interceptus, in aliquibus
verò tum sensus, tum motus adest, itēq; ratio, ve-
rūm vix respirant, aliquibus etiam vox intercipitur,
aliis contrahuntur artus, vt liquet nono de compo-
sitione medicamen. secundum locos, cap. 10. At si ex
mensuum suppressione vteri strangulatio excitetur
perueniente quidem ad vterum ipso sanguine men-
struo, sed ad interna ipsius ingredi non potente, aut
quia crassior est quā vt per ora vasorum possit pe-
netrare, aut quia clausa sunt ora, propter quod mul-
tiplicatus in venis eas extēdit, atque vicina ipsis vin-
cula madefacit, citra eius peruerfionē non erit, quo-
niam plenitudo repletorum, corpora & in latum, &
in profundum extendit, sed longitudinē abbreviat,
continuo propterea vterum retrahi necesse est: ob
quam causam vel sursum, vel ad latus retrahatur o-
portet. Quo fit, vt si æqualiter vndique trahatur, re-
cta erit, & sine inclinatione ipsius transmutatio, si
verò inæqualiter ad partem vehementius trahentē.
Vasorum itaque ad ipsum vterum peruenientium &
plenitudo, & suspensio causa est, ob quā vterus in e-
ius strangulatione vel sursum, vel ad latus trahatur:
id quod semper euenit quando eadem affectio ex
menstruorum retentione originem habet, & præter

Si ex men-
suum suppres-
sione fiat
vteri suffo-
catio, signa.

id quod purgationes eisdem supprimuntur, spirā-
tione tamen non priuantur, neque animi defectus,
aut aliis modò dictis symptomatibus valdè labora-
re videntur. Nam vitiatò semini maior quidem
quā menstruus vis adest ad noxam vniuerso cor-
pori inferendam, ex eiusdem Galeni sententia, &
proinde magis spirationis, ac pulsus abolitiones eo
redundante apparebunt, conuulsiones, animi defe-
ctiones, ac alia paulò ante dicta symptomata, & sæ-
pius viduis, atque aliis monialibus ex tali causa pro-
ueniet vteri strangulatio, etiam si optimè purgen-
tur, præsertim si naturaliter multo semine abunda-
uerint, aut affatim à concubitu, quo antea ereberrime
fuerant vsæ, abstinerint: sæpenumerò citra v-
teri peruulsionem tales sunt strangulationes, cūm
videlicet tenue, ac non multum fuerit semen reten-
tum; quandoque etiam cum eiusdem peruerfione,
seu retractione, cūm videlicet semen ipsum pluri-
mum fuerit, ac crassum, eodem modo quo sanguis
menstruus tum vasa, tum vincula implens, exten-
dens, ac madefaciens, quemadmodū accidit in mu-
liere vidua longo iam tempore, quæ præter cætera
mala, nervorum quoque distentione vexabatur, cui
cūm manibus tractarentur partes muliebres, adhi-
bitisque calidis medicamentis oborta titillatione
cum labore, ac voluptate, veluti per coitum vsu ve-
nire solet, crassum, plurimumque semen excreuit,
atque ita molestia sua liberata est, vt idem Gale. te-
statur citato lib. 6. de loc. affect. Huic etenim vterus
retractus erat sic obstetrice dicente. Quandoque e-
tiam (vt inquit Aetius) oritur affectio hæc, vel vtero
perfrigerato dum menses prodeunt, vel propter a-
bortum, vel sanguinis eruptione ab vtero ab aliquo
repente suppressa: id quod promptè ex altantium
loquela percipies. At q̄ mulieri, quæ vterinis mole-
statur, aut difficulter parit superueniens stertutatio
bonum sit, liquet ab Hippocrate aphorif. 35. quinti
libri, quo loco per vterina, suffocationes vteri in-
tellexit Galenus, & bonum tum signum, tū causam
esse stertutationem fatetur. Quòd verò grauior, ac
molestior sit vteri suffocatio ex detento semine or-
ta, quā ex suppressis mensibus, maiorem noxam, ac
maiora symptomata inferens, ex eodem Galeno li-
quet, eodem sexto de locis affectis. Quemadmodū
etiam quod satis periculosior sit ea, in qua tum spi-
ratio, tum pulsus abolerentur (quam primam eius spe-
ciem, siue differentiam nominauimus) etenim non-
nullæ ex talibus pereunt, licet quædam etiam serua-
tæ videntur. Accidit hæc affectio omni quidem tem-
pore, sed hyeme præcipuè, ac autumnò, iunioribus
præsertim salacibus, ac sterilibus, maximè si per me-
dicamenta steriles fuerint. Cæterum affectus hic v-
bi inuadere assueuerit, comitialis modo diuturnus,
& per circuitum repetens efficitur, & tutus quidem
apparet, singulis tamen accessionibus præceps pe-
riculum affert, vt non eadem solum die, sed intra
pauca horas interimat, vt patet ex Aetio, & Paulo.
Quoniam verò hæc affectio duplicem curationis
modum requirit, vnum accessions tempore, reli-
quum verò eadem non vrgente, propterea quæ ac-
cessions tempore adhibenda sunt, primò conscri-
bemus, victus ratione derelicta. Nā accessions tem-
pore, ac etiam vbi eadem conquieuerit, cibū nul-
lum, aut paucū præbere oportet, vt liquet ex Paulo.
Aegra itaque ceruice, ac scapulis accliuibus colloce-
tur, femoribus, ac inguinibus decliuibus, extremæ
partes deligentur, ac fricentur, crura præsertim, &
pedes.

Signa
fiat ex
statio
ne.

Quæ na-
lū adm-
nula si

Libro

6. de lib.
Loro

Progre-
da

Vtero e-
immitte-
da sunt.
Loco cit.

Citatio

Quæ pe-
da sunt.

Causa
cessionis
pore

Infirmitas

pēdes, & quemadmodum in multo effluxu cucurbitas mammillis imponimus, sic quibus sursum, aut in latus tractus est vterus, inguinibus, & coxis adhibebimus: & naribus quidem ea quæ foetidissimum odorem habent, vteris autem odorata, & ea etiam, quæ laxare, ac calefacere possint, medicamenta afferemus, Galeni decreto primo de arte cura. ad Glau. cap. 14. qua de re naribus admoveere oportet castoreum, sagapenum, galbanum, singula ex aceto trita, ac naribus illita, aut acerū acerrimum calfactum naribus adhibeatur, in quo calamintha, thymus, & alia huiusmodi acria fuerint decocta: hæc etenim crassos cerebri vapores incidere, ac attenuare possunt, ac simul frigiditatem depellere, & inspirata thoracem, ac pulmonem expurgant, & stomachum corroborant, vt inquit Aetius. Item nares suffiantur castoreo, galbano, aut sulphure, aut funiculo lucernario recens extincto, aut pennis vstis, seu soleis antiquis, aut caparum, aut alliorum corticibus, aut capillis ipsius propriis exustis: quidam etiam matulam urinariam inueteratam, & pannos sulphureos incensos naribus admovent, sinapi item tritum cum aceto naribus adhibeatur, aut rutam viridem manibus contritam suffito, aut eadem cum melle lana excepta in anum indatur, ex Galeni auctoritate, 9. de compositione medicamentis. secundū locos, cap. 10. qui etiam excitare strangulatas asserit: bitumen, castoreum, galbanum, picem liquidam, & cedriam, pilos vstos, rutam, allium, capam, & cornu cerui, si odorētur. Sternutationes etiam exciētur castoreo, aut pipere naribus per specillum admoto. Os item ægrè aperiat, ac medius digitus ad vomitum proliciens in intro mittatur, & super hæc omnia mulier magnis vociferationibus excietur, aut vocetur. Vterum verò infernè per pudendū odoratis suffias styrace, cinnamomo, casia, costō, amomo, ligno aloes, ac similibus: illiniantur etiam intra pudendum ea quæ laxandi, calcificandi, ac flatūs dissoluendi vires habent, veluti est oleum irinum, nardinum, rutaceum, aut in quo cūminum, vel anisum fuerit decoctum, & reliqua huiusmodi, quæ digitis excepta obsteritrix vsque ad vteri os immittat, ac lenitèr, & diu confricet, vt hinc irritatus crassus humor, qui in vtero hæret prouocetur, ac calfactus excernatur, vt idē Aetius inquit. Pesi item parentur ex his, quæ eandem vim habent calcificandi, laxandi, & flatūs dissoluenti, quorum formulas cap. de mensium suppressione, inuenies, nisi quod odorata quadam iniicere poteris, lignū aloes videlicet, casiam, cinnamomū, costū, moschum, & interim ea quæ à vulgo ambra canis, & zibet appellantur: testudinis item terrestris hepar tritum in pestlo subdito drac. nanque ad vteri strangulatus, ac ad dolores confert: hoc etiam tempore in sedem glandes indantur ex ruta, cumino, agarico, sale gemma, hiera, ac melle preparata: aut ex cumino, ruta, & caricis eadem parentur. Proderit quoque vbi hæc non suffecerint clysteribus sterces subducere, vt inquit Paulus, quorum copiam cap. de coli dolore reperias. Præcordia item fasciis vinciantur, & distentis manibus os vteri comprimatur, illinaturque; imus venter, ac inguina, & saccelli in eisdem locis adhibeantur, prout eodem cap. de mensium suppressione, docuimus, & vbi facultas detur, infisiones quoque parentur in decoctis baccarum, & foliorum lauri, pulegij, calaminthæ, marrubij, artemisiæ, conizæ, laurinz, centaurij, dictamni, samopuechi, scenugræci, althææ, chamæmeli, aristo-

lochiz, iridis, & serpilli, ex eiusdem Aetij sententia: Verum infisionum tempore cerebri cura non relinquitur, sed rosaceo, & aceto caput irrigetur, & interdum castoreum decoquatur, ac naribus quoque prædicta odoramenta assidue adhibeantur, præsertim castoreum cum aceto, vt ipse inquit. Posthæc ad castorei portionem transibimus, quod assidue potū sæpè penitus ab hoc morbo liberat, dandumque est quotidie drachm. 1. pondere; aliquando cum aqua multa, aliquando cum artemisiæ decocto, Aetio, & Paulo testibus. At vbi accessio conqueuerit, ac ab eadem præseruari velit ægra, aut diuturnus factus fuerit affectus, plerumque a venæ sectione initium facimus, præsertim si menstrua purgationes fuerint detentæ, deinde ad alui euacuationem progrediemur. Secetur autem tali vena. Purgatio autem fiat ex hiera, vt prædictis auctoribus visum est. Verum si cum mensium suppressione crassi etiam, ac frigidi succi redundabunt, idem prius concoqui, ac præparari debent, & deinde purgari ex eadem hiera cum agarico, seu pillulis foetidis, aut de sagapeno cū eadem hiera, & agarico, & (vt summam dicam) eisdem medicamentis vtare, quæ cap. de mensibus suppressione, conscripsimus. A quibus diaphoretico pharmaco assidue vti debent, & eo quod ex tribus piperis generibus constat, ac etiam eo quod ex calamintha appellationem habet. Verum singulis admiscenda sunt quæ semen minuunt, ac abolent: qualia sunt viticis, rutæ, cannabis semina, nymphaeæ radix, ac reliqua huiusmodi, quæ cap. de fluxu genituræ, notauimus, præsertim si ex detento semine vteri strangulatus hat: castorei quoque drac. 1. assidue potent, modico aniso adiecto, vt Aetius asserit ex Philagrij auctoritate. Interim quoque diambra, diamoscho, ac antidoto mitridatica vti poteris. Celsus castoreum, vel git, vel anethum potui dandum esse præcipit. Adhibeantur quoque supra relatæ infisiones, ac pessis, postremò verò ad naturalia balnea, eaq; calida cōfugiendum, post quæ vnctiones quoque approximentur peccini, inguinibus, ac lumbis ex oleo liliaceo, irino, ac rutaceo, & nardino, viticis, ac rutæ semine, costō, ac casia, exiguaq; cera parata: interim quoque saluiz, aut calaminthæ cōtusa, seu seminis cannabis quidpiam admisceto: multum etiam conferunt deambulationes matutinae, gestationes, quæ in curru, vel naui, vel iumento fiunt. A motu verò gestationis prodest vociferatio, & lectio clara, modulata, ac concinna: item vnctio, frictio, & exercitatio per congrua interualla repetita, vt inquit Aetius. Et in vniuersum vbi ex redundante potissimum semine generatur hæc affectio, tum victus, tum medicamenta conferunt, quæ resiccandi vim habeant, siue calida, siue frigida fuerint: similiter & his vtendum, quæ totis substantiis semen extinguunt. Ad vteri strangulatus conuenire inquit Galenus 9. de compositione medicamentis. secundū locos, cap. 10. agarici drac. 1. in potu acceptam ex vino item plantaginis semen, & succū cum vino: nec minus cōfert onyx ex conchylio potatus, & acetum scilliticum absorptum, vt ipse inquit.

Id est, De vteri prolapsu seu procidentia. CAP. CXI.



ONTINGIT etiam, licet rarò, vt quemadmodum sursum, aut ad latus vterus peruertitur, ita quoque deorsum prolabor: atqui ipsum prolabi dicimus, cum ita deorsum

Mm 3

Vbi accessio non conqueat, cura.

Vena sectionis.

Purgatio.

A purgatione qua tribuenda sunt.

Li. 16. c. 78. Topica.

Li. 16. c. 88.

De agarico nota.

Vteri procidentia quid sit.

*Aet. loco citato.
Paul. lib. 3.
cap. 72.
Prolapsi vteri signa.*

*Causa.
Externa.*

Interna.

Prognostica.

*Curandi
via.*

euerit, ut foras promineat, ex Aetij auctoritate, cap. 76. lib. 16. Non tamen velut quidam imperiti putant à suis appendicibus exolutus torus excidit, nam si ita procederet, restitui haudquaquam posset, ex eiusdem Aetij, ac Pauli sententia. Quod verò vterus hoc vitio laboret, morbo scilicet in situ, seu positione hæc signa manifestabunt. Nam id quod procidit struthiochameli ovo similis est iuxta maioris, ac minoris differentiam, prout violenta eversio contingit, & in principio plurimus sanguis erumpit, deinde consequitur dolor præcordiorum, lumborum, imi ventris, ac pudendorum, & periculum est ne perfrigeratis locis conuulsio inferatur, quâvis progressu temporis ubi affectio inualescit, & loci callosi facti sunt, neque conuulsionis periculum imminet, neque dolor infestatur, eodem Aetio teste. Sunt autem eiusdem prolapsus causæ multæ, quarum quædã externæ sunt, quædã internæ: externæ quidẽ, ut si ab alto delapsa sit mulier, & in coxas delata disrumpis pelliculis, ac ligamentis, quæ vterum cõtinẽt, ac vicinis partibus connectunt: ob violentiam etiam secundæ extractionis, quod præcipue in abortibus contingit, ac ob inartificiofam foetus extractionem, item nimia spiritus detensio, immensa oneris eleuatio, aut plaga vteri prolapsum inducit: quin & ob vehementiores animi affectus, velut si liberorum amissio, aut hostium incurfus nuntietur, aut ob periculosam navigationem, aut eiusmodi quandam causam mulieres toto corpore solui solent, ita ut vterus simul prolabatur. Internæ autem causæ esse possunt humoris plurimæ, ac lenti defluxus, ac partuum frequentia, ob quæ appendices, ex quibus vterus dependet, laxantur, ac soluuntur: aliquando etiam ob membranarum, ac musculorum vterum sustentantium resolutionem, hæc affectio contingit, quod inclinata ætate maximè fieri solet, ut inquit Aetius, & Paulus, quarum causarum dignotio haud ægrè haberi poterit, partim ex teipso, partim ex ægræ, seu adfæctum sermone. Verum ex quacunque causa fiat, cum adhuc recens est affectio, conari oportet, ut vterus ipse contrahatur, in principio enim facile dirigitur, & rectè locatus permanet, præcipue in vigoris ætate, nam in ætate prouectioribus contrahitur quidem, sed ex leui occasione rursus prolabitur, ex eiusdem Aetij testimonio. Cum verò in hac affectione vterus ex sua sede diuicatus sit, ut iterum reponatur in proprium locum oportet. Conuenit igitur (facibus clystere prius euacuatis, yrinæque excreta, si in vesica lotium collectum fuerit, quo vterus vndeque sit liber, nam inter vtrumque, rectum inquam intestinum, ac vesicam situs est) laborantem figurare supinam coxis altioribus reflexis poplitibus, ac cruribus disparatis, deinde prolapsam vteri partem oleo tepido, ac butyro, vel betæ, maluæ, althææ, sœnugreci, seminis lini, aut similibus decocto fouere, post hæc lanam conuolutam figura, ac crassitudine muliebri pudendo correspondentem accipimus, tenuisque linteo circundabimus, ac inuoluemus, & acaciæ, aut hypocistidis succo vino diluto intingemus, ac vtero apponemus, & citra violentiam totum, quod prolapsum est, sursum reprimemus, quoad tota moles intra sinum recipiatur, & vterus in proprium locum reponatur, deinceps alium lanæ lapsum vino adstringente imbutum superponemus, atque totum pectinem spongiis ex posca expressis intingemus, & mulierem reclinabimus cura extensa, ac co-

ptata habentem, ita ut alterum alteri incumbat, inde cucurbitulæ agglutinabuntur cum flamma copiosiore vmbilico, & vtrisque inanibus partibus (quas ilia nominant) naribus odorata admouebimus olfaciendæ: infernè autem quæ grauem odorem habent applicabimus, quorum omnium præcedenti cap. copiam reperies. Tertia verò die lana adhuc intra pudendi sinum existente, mulier in vino nigro austero aliquatenus tepescato, aut in myrti, lentisci, rubi, aut malicorij decocto insideat, & post sessionem rursus supina coxis altioribus locetur, & sublata ex pudendo priore lana, alia rursus eodem medicamento imbuta subdatur. Cataplasmata verò deforis imponantur, ac inum ventrem ex palmulis, polenta, lenticula, ac malicorio cum oxymelite, atque hæc tribus diebus interpositis rursus fient, quoad perfectè vitium discusseris, & ubi vteri crebro prolabuntur, posca abluantur, in eademque mulier diutius insideat, & deinceps omnia relata fiant. Vbi verò prolapsus vterus temporis progressu intumuerit, plurimoque humore refertus fuerit, ut præ tumore reduci non possit, betarum decocto ipsum rigamus, deinde acetum affundimus, & salem tenuissimum inspergimus, & postea sedato tumore eodè decocto persusum detrudimus, ut inquit Aetius, & deinceps cucurbitas ut supra affigamus, & odorata assidue naribus admouebimus, ægræque vndequeque circumsecta rebus foetidis suffuratur infernè. At si processu tēporis, id quod prolapsum est computruerit, id ipsum auferetur nullius metu periculi. Etenim vniuerso vtero ablato ubi putrefactus fuisset, mulierem nihilominus superuixisse, narrant Aetius, & Paulus quorundam auctoritate. Oportet autem ut à vociferationibus, sternutationem mouentibus, ac tussim, aliisque immodicis moribus abstineant, ita ut quietè, & tranquillè viuant, vtanturque cibis boni succi, & odorato vino, ac tenui.

Meel μύλων. Id est, De mola.

CAP. CXII.

Mter propria quoque vteri vitia connumeratur id, quod à Græcis μύλη, à Latinis mola nuncupatur, nomen sumens à motus tum difficultate, tum grauitate, ut Aetius refert cap. 80. lib. 16. Nam velut mola ipsa grauis est, ac difficulter mouetur, ita & affectus hic mola appellatus, ad eius similitudinem & grauat, & difficulter mouetur, licet non nisi per accidens, ut dicemus, quemadmodum & ipsa mola. Hanc molam induratum esse vteri tumorem, qui modò in vuluæ ostiolo, interim in tota ipsa prominet. Aetius citato loco, & Paulus cap. 69. lib. 3. feretur, etsi idem Paulus in fine citati cap. aliorum quorundam auctoritate asserat, molam carnem esse informem ipsis vuluæ tunicis adhærescentem, ac foetus modo in lucem edi. Verum quicquid præcitati auctores asserat, nos Gal. sectantes dicimus, cum eo molam esse carnem informem, quæ in mulieribus vtero gestatur, ut 14. metho. medend. cap. 13. ab eo scriptum est. Vel molam esse carnem quandam inutilem, atque informem, ex eiusdem Galen. sententia, 14. de vsu part. cap. 7. Quapropter non omnem induratum vteri tumorem molam esse fateamur, ut Paulus, & Aetius sentire videntur, sed inutile illud conceptum carnosum, atque informem, qui etiã vtero gestatur. Inutilis namque est, cum sit à natura aliena

aliena caro illa, nec vilis mulieris, cum & ipsam grauet, ac laborem inferat, impediaturque mensium purgationes, ut dicimus. Nec etiam vilis pro generis propagatione, veluti & naturalis conceptus est: item informis caro hæc cum artificiosa forma, & humana careat, licet quandam figuram contineat, quinimò diuersasfigurationes suscipit pro diuersitate materiæ, ex qua generatur, similiter & agentis, à quofigurationem recipit. Quod verò subconceptu mola contineatur, licet idem imperfectus, atque incoctus sit, confirmatur ab Aristotele quarto de gener. animalium, cap. 7. dum dicit, Cum igitur ex humore concoctu difficili conceptus constitit, tunc gignitur quod mola vocatur, afficitur enim conceptus eo modo, quo ea quæ inquinari dicimus, cum elixantur, portatur etiam, seu gestatur vtero conceptus hic, qui mola appellatur, & non est vteri tumor induratus in eius substantia ortus, quoniam interdum foetus modo in lucem editur. Pariunt enim quandoque mulieres carnem hanc, quam molam vocamus, ut testatur idem Aristoteles eodem loco, & Aëtius illud quorundam auctoritate confirmauit citato loco, cum dicit. Quidam verò tradunt in quibusdam mulieribus carunculas ad inglandis magnitudinem per pudendum excretas esse, aliquando singulis mensibus, aliquando bimestres, aut trimestres. Præterea Galenus eodem 14. de usu partium, cap. 7. scriptum reliquit molæ conceptum ouo proportionem respondere, quamuis non perfectum, sed subuentaneo: at oua animalium partes non sunt, nec eorundem tumores præter naturam, sed proportionem respondent iis, quæ adnascuntur, ut liquet ex eodem Galeno, vnde decimo de simplicium medicamentorum facultatibus. Quare & mola in numero eorum, quæ adnascuntur, existit, non tamen familiarium, & vtero gestatur, ac non ipsius in duratus tumor est. Hinc quoque patet error eorum, qui volunt molam esse in multiplici differentia, nã præter hanc, quæ carnosa existit, quandã aquosam, & quampiam etiam flatuosam esse fatentur, quoniam nisi caro sit inutilis, atque informis, quæ in mulieribus vtero gestatur, haudquãquam mola appellari debet, iuxta Aristotelis, & Galeni sententiam. Quod verò vterus afficiatur in hoc vitio, ex mensium suppressione, præter naturam, tumore, ac ipsiusmet vteri dolore percipitur. Affectus verò morbus est in compositione, speciatim in numero, ac inter eos, qui toto genere præter naturam existunt, velut est lapis in vesica, iuxta Galeni sententiam, eodem decimoquarto methodi medendi, cap. 13. Quamquam Aristoteles velit, quod nec perfectam, nec alienam omnino habeat naturam mola ipsa. Atqui Galenus propterea toto genere præter naturam eam esse fatetur veluti in vesica calculus, hypochyma, & myrmecia, quoniam omnia talia tanquam molesta, & inutilia in totum submouere properamus, & non quòd in eius generatione, seu substantia nihil sit eorum, quæ secundum naturam sunt, quia de re ab Aristotele non discrepat. Dignoscitur autem affectus hic ex tumore duro circa vteri partes, detractione, seu contractione partium superiacentium, ac gracilitate corporis, appetitus prostratione, & coloris vitio, mensesque supprimuntur, & mamma intumescunt, stomachus subuertitur, lumbi grauantur, ventérque attollitur, adeo ut primum conceptus veri suspensionem de se præbeat, verum temporis progressu discernitur,

Nam molam dolor punctionis sensum inferens subsequitur, nec in ea motus ullus, velut in vteri conceptu percipitur, nisi quòd per compressionem dextra & sinistra mouetur, cum manibus mola comprimitur, & ex accidenti quoque cum mulier de vno latere in alterum vertitur. Cæterum postea toto corpore imminuto ac ventre ampliato hydropis imagine præ se fert. Discernitur tamè ab illo per tumoris duritiæ, & quòd tumor hic ad digitorum compressionem, ac pullationem non cedit, neque tympani sonu veluti in hydropede, & quòd neque ad manus contactum vlla fluctuatio percipitur, quamquam temporis progressu quandoque hepate perfrigerato hydrops ei superueniat, ut liquet ex eodem Paulo, & Aetio. Cum itaque talem vteri molam esse fateamur, reliquum est eius causas inuestigare, quoniam hæc non (ut Aëtius asserit) aliquando prægressa inflammatione succedit: aliquando post locale vlcus, cui caro super excreuit, velut ea, quam ipse tumorem vteri induratum appellat: nec ex feminis muliebris, & plurimi sanguinis menstrui affluxu, ac in vtero retentione, quæ cogit calor immodicus, ac in carnis formam transmutat, generationem suscipit, ut quibusdam falsò visum est, sed aliam tum materialem, tum efficientem quoque causam habet, ut ex Hippocratis, Aristotelis, & Galeni auctoritatibus demonstrabimus, ait enim Hippocrates libro de morbis muliebribus, & libro de sterilibus. Molæ porro conceptus causa hæc est, cum multi menses modicum, & morbosum semen conceperint, neque conceptus rectus sit, & venter plenus est, velut prægnatis. Quibus verbis clarè ostendit materialem causam ipsius molæ esse menses multos cum modico, & morbofo semine comixtos, semine inquam maris, & non foeminae. Nam si de foemineo semine intellexisset, frustra modicum, & morbosum adiecisset, cum quantulumcunque, & qualecunque tale esset semine frigidius, & humidius existeret, atque imperfectius viri semine, molæ conceptus sequeretur, addidit etiã, neque foetus rectus sit, quasi imperfectus conceptus sit in molæ ex paucitate, & vitio feminis ortus, nãque ex eius mediocri multitudine, ac salubritate foetus rectus generatur, si cum moderatis mensibus fuerit permixtum. Quod verò idem sentiat Aristoteles, præcitato libro quarto de generatione animalium, clarè patet. Nam quærens cur cæteris animalibus mola non generetur, nisi quid admodum lateat, sed mulieribus duntaxat, Respondet eam inter animalia affectionibus vteri obnoxiam esse, & mensibus abundare, quibus verbis menstruum copiam necessariam esse pro mole generatione fatetur Aristoteles. Quod verò necessarium quoque sit viri semen, eodè loco ostendit, cum dicit, Iam accidit cuidam mulieri, ut cum concubuiisset, & se concepisse putasset, primum vteris moles augetur, & reliqua ex ratione venient, quæ demum difficultate intestinorum implicata, eoque modo periclitata peperit carnem, quam molam vocant. Quid clariùs, quòd semen viri simul cum sanguine menstruo concurrat in molæ generatione? Galenus autè libro decimoquarto de usu partium, aduersus eos qui volebant foeminæ semen conferre ad foetus generationem tanquam motus principium quoddam, hæc protulit verba, Si igitur eorūque volunt semen foeminae progredi, primum quidè, quòd partum artificiosam actionem ei tribuunt, quæ utique vel soli menstruo fortè affuerit, nemo est, qui ignoret:

Causa.

i. de morbis muliebribus. longè post medium. De sterilibus post medium. Materialis causa molæ.

cap. 7.

Loco citato.

cap. 7.

cap. de ouis.

Error quorundam de mola.

Quod vterus afficiatur in hoc vitio.

Quæ afficiatur præter naturam sit mola.

Mola sit.

Mola sit.

Secundo autem quod mentiuntur etiam in his, quæ accidunt explorandis, non enim sicut gallinæ sine maribus ova pariunt, ita mulierem aliquando viderunt sine viro, vel molam, vel huiusmodi quippiam aliud concepisse. Cum igitur in femineo semine nullum adsit motus principium, neque perfectum, neque imperfectum, licet ad animalis generationem aliquid conferat, aut saltem si illud haberet, non nisi cum maris semine habere putandum est, ut in eiusdem Gale. doctrina sæpius legitur, absque controuersia censendum erit, neque perfectum factum, neque etiam molam (ut ex his, quæ diximus clare patet) citra viri semen posse generari, ut quidam ad pauca respicientes falso putarunt. Ceterum, quod efficiens molæ causa non sit immodicus calor, sed potius eiusdem caloris imbecillitas, ab eodem Aristotele citato loco scriptum est, loquens enim de molæ generatione, sic ait. Afficitur enim conceptus eodem modo, quo ea quæ inquinari dicimus, cum elixantur, nec per calorem, ut quidam volunt, sed potius propter caloris debilitatem. Natura enim de vita certare videtur, nec posse perficere, finemque apponere generationi, & demum subdit. Causa nanque duritiæ cruditas quædam sit. Idem quoque sentire videtur Galenus citato libro decimoquarto de vsu partium. Nam loquens de ouis, quæ subuentanea nuncupantur, quibus proportionem molæ respondent, asserit ea propterea esse imperfecta, & ex ipsis animal gigni non posse, veluti ex aliis ouis, quoniam ut perficiantur à masculo solam desiderant caliditatem. Ergo veluti ex diminuto calore subuentanea sunt ova, ita & mola, quæ eisdem proportionem responderet ex imbecillo, & non immodico calore ortum ducit. Erit autem eius generationis modus talis, quod cum in concubitu multa copia sanguinis menstrui in vteri cavitatē contineatur, proiecto à mare modico, eoque morbofo semine, ac eidem sanguini menstruo commixto ex imbecillitate caloris, præcipue ipsius seminis, & secundario fortè ipsius sanguinis menstrui, utroque tamen in vnum motum tanquam vno principio conspirante non potente eandem materiam perficere, ac concoquere, cum sit humor concoctus difficilis, ut inquit Aristoteles, neque finem generationi apponere, carnem hanc inuilem, atque informem, idem imbecillus calor (quam molam vocant) procreat, quæ interim per annos tres, aut quatuor perseverat, quandoque tota vita perdurat, adeo ut & confescat, & commoriatur, ut inquit Aristoteles. Cum autem intenditur hic affectus in aquam subtercutem degenerat, nonnunquam etiam insanabilis magna ex parte redditur, quibusdam & sanguis erumpit, Paulo auctore. Hanc affectionem alij velut incurabilem penitus reliquerunt: alij incipientem tantum curari posse confidunt: negligenda tamen eius curatio non est, sed omnia, quæ conuenire videbuntur, facienda, ut asserit Aëtius. Quamquam Hippocrat. libro eodem de morbis muliebribus, sic de ea scripserit. Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut certè cum prædictione. Qua de re pro eius curatione ægra decumbat in domuncula angustiore, minus luci exposita, modicè perflata, cubili immobili, sed ita ut pedes habeat elatiores, quietosve, nam motus quamlibet fluxionem coniecit, ut testatur Paulus. Itaque aer tempe-

ratus in actiuus, aut modicè ad calidum vergens, & siccum eligatur, somno moderato vtantur, exercitium potissimum partium infernarum fagiant, quandoque verò moderata deambulatio confert. Sit alius lenis quotidie, & immodici animi affectus omnino vitentur: cibi tribuantur quantitate moderati, ac boni succi. Sitque vini odorati optime diluti potus, cum quibus interim ea quæ laxandi viribus prædita sunt, permisceas, & ea etiam quandoque quæ extenuandi vim habent: & ubi totum corpus plenum fuerit, si quid non prohibeat, interna cubiti vena secanda erit, haud tamen multa sanguinis copia extrahenda est, quin potius ubi opus fuerit, eadem iteretur; interim quoque præsertim circa initia huius affectus malleolorum venam secare conuenit multo sanguine redundante post sectionem venæ cubiti. Nam si frigidorum, crassiorumque humorum copia adsit, iidem potius præparandi, ac purgandi sunt, quemadmodum cap. de suppressis mentibus, docuimus: deinceps ad particularem molæ curationem deueniendum, eisque vtendum est medicamentis siue intus, siue extra adhibeantur, quæ laxandi, ac molliendi, & mitigandi vim habeant, veluti infusus, & decocta maluarum, althææ, chamæmeli, seminum lini, scenugræci, fertulæ campanæ, & anethi: fiat autem decoctum aut in aqua, aut in hydrelæo: & processu temporis lauri folia, pulegium, thymum, hyssopum, saluia, artemisia, polium, ac centaurium permisceri poterunt. Ex eorundem quoque decocto exiguo vino albo addito fotus cum spongiis fiant, post quos imus venter, pecten, & inguina infra scripto vnguento perungantur. Recipe olei irini, liliorum alborum, anethini, & chamæmelini, ana drach. j. butyri recentis, adipis anseris ana drach. iij. ladani vnc. j. s. ceræ, & vini odorati parum, fiat vnguentum. Interim adiaci poterit cremor seminis lini, althææ, aut scenugræci, ammoniacique, aut bdellij in vino dissoluti pauxillum. Item cataplasmata hoc modo parentur, Recipe radicem, & foliorum althææ, & maluarum ana manipulum j. s. farinæ scenugræci, seminis lini, & hordei ana manipulum j. s. olei vtriusque amygdalæ, & liliorum alborum, singulorum vnc. j. misceantur & cum aqua mullâ, & paucio vino odorato, fiant cataplasmata. Pesi rem subdantur ex cespio, butyro, adipe anserino, medulla, aut cerebro cerui, melle, caricis pinguibus, & visis pallsis cum oleo irino, sampuchino, aut amarino, ut inquit Aëtius, aut ex adipe anseris, radice althææ, caricis pinguibus, butyro, ac saccharo iidem figurentur: quibus interim rutæ, saluiæ, artemisiæ, aut maioranæ folia confusa miscebis. Perseuerante verò malo, acrium eduliorum vsus assumatur, & innationes aquarum calidarum, & aquæ marinæ, ut refert Aëtius. Rutam, & anethum in vino veteri fuluo odorato decoque, & abiectis herbis, idem vinum calidum bibendum dato, & fermè aquæ loco exhibito. Nam hoc medicamento mulier quædam excreta sanguinis copia salutem adepta est, ut ipse refert. Hippocrates verò citato libro de morbis muliebribus, dictamnum creticum, aut castoreum in vino bibitum commendat. Tu verò eisdem etiam medicamentis uti poteris, quæ cap. de mensium suppressione, conscripsimus, tam intus, quam extra adhibitis: similiter quoque & eis, quorum cap. de aqua inter cutem meminimus, potissimum ubi affectus proteletur.

Efficiens
mola causa

Exo citato

Concludi-
tur modus
generatio-
nis mola.

Prognosti-
ca.

Libro pri-
mo loco ci-
tato.
Curatio.

Viculus va-
tio.

Pent
cio.

Puls

Serilis
quid sit.

Per affe-
ctu.

Quin affe-
ctu præ-
naturam
peristat.
Causa
candida
noluit.

Ex H
pe et
monan
penia

Libro
mo loco
citato.

Itaq

Περὶ τῶν μὴ κυσσομένων.
Id est, De non concipientibus, siue de sterilibus.

CAP. CXIII.



Vod natura, si fieri potuisset; maxime optasset suum opificium esse immortale nemini in dubium venit, verum cum per materiam non liceret, nam quod ex arteriis, venis nervis, & ossibus, ac præterea carne est compositum, incorruptibile id esse non potest, subsidium quod paruit ipsi ad immortalitatem est fabricata. Propterea mirabilem quandam rationem inuenit, quomodo in demortui animalis locum nouum aliud sufficiat, ut nullum animalis genus pereat, sed inolumè semper sit, atque immortale. Qua de re omnibus animalibus concipiendi instrumenta natura instituit, ad generis inquam instaurationem, quæ cum communia sint cum viris tum mulieribus, eapropter eisdem quandoque oblectis contingit aut viri, aut mulieris, aut vtriusque ratione conceptionis impedimentum, quod quidè sterilitas appellatur. Nam nihil aliud est sterilitas, quam priuatio conceptionis, tempore potissimum quo eadè perfici deberet. De hac itaque conceptionis priuatione, quæ ipsarum mulierum ratione prouenit, & non quæ virorum, aut vtriusque verba facimus, quanquam eadem ad viros transferri possit. In qua quod vterus afficiatur tanquam concipiendi instrumentum nemo vereri debet, ex eiusdem vteri propriæ actionis, seu vsus læsione id dignoscet. Quod verò sterilitas symptoma sit in genere noxæ functionum ablaturum patet. Nam omnino abolita est propria ipsius vteri tanquam instrumenti actio, concipiendi inquam. Atqui cum sterilis est, non concipit tempore quo concipere deberet. Huius autem affectionis causæ plures esse possunt, ut inquit Aristoteles, secundo de gener. animalium, cap. 5. Nam & à primo ortu naturæ locis ad coitum commodis oblectis steriles, & mulieres, & viri redduntur, ut alteræ non pubescant: alteri non barbescant, alii in processu ætatis idè accidit affectus, aut propter corporis nutritionem pleniorè, aut ex morbo, viris humidum, frigidumque emittitur semen, mulieribus purgationes vitiantur: experimento autem in aqua probatur fecunditas feminis num per summa inpatet, aut descendat, suffitu verò mulierum probatio fit per odores subeuntes vterum; multis etiam tum viris, tum mulieribus hoc idem accidit malum oblectis partibus, & locis accommodatis ad venerem; quæ vitia (ut ipse refert) partim curabilia, partim incurabilia sunt, sed maxime, steriles tunc perseverant cum primo naturæ ortu tales constituerint. Verum enim verò in ipsis mulieribus nonnullæ ipsius vteri præter naturam dispositiones possunt esse causæ, & præsertim eiusdem intemperature, quemadmodum ab Hippocrate, & Galeno aphorif. 62. quinti libri, scriptum est. Nanque bene temperati vteri ad conceptiones sunt idonei, malè autem temperati si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt, si verò nimium, mulieres steriles fiunt, & proinde mulieres esse fecundas sine ambabus bonis temperaturis, est impossibile, ut inquit Galenus in commento, appello ambas bonas quæ temperaturæ mediocres, scilicet tum ex calidi, & frigidi, tum etiam ex humidi & siccis commixtione, cum fieri possit, ut secundum vnam oppositionem

bene temperatus sit vterus, secundum alteram verò malè; propterea Hippocrates dicebat, quæcunque verò ex vtriusque mediocrem habent temperaturam, eæ fecundæ sunt. Nam ne mulier concipiat, potest altera efficere intemperatura, ut inquit Galenus, modo nimium à bonitate recedat: hæc ubi frigida fuerit immodicè, adeo quod ex ea vterus spissior efficiatur sterilitatè efficit. Nam angusta quidè erunt supra modum ora vasorum, quæ ad ipsum pertingunt vterum, adeo vt neque secunda possint adnasci ad iam dicta ora vasorum, neque si hoc fiat aliquando potest bene nutriri conceptus, cum vel nullo modo fiant hiæc mulieribus purgationes, vel omnino paucæ, & eæ ipsæ vitiolæ, solo tenuiore, ac aquosiore sanguine perlambente. Hæc item eadem ora facillè obstruuntur, & propter naturam angustiam, & quoniam magna ex parte hæc mulieres humorem aggregant pituitosum, siquidem corpus totum ferè est vtero simile. Ad hæc in talibus vteris contingit etiam maris semen refrigerari, nisi natura sit calidissimum. His itaque de causis vteri nimia frigiditas conceptionem omnino impedit, ac mulieres steriles facit. Coniectamus autem vterorum frigiditatem ex suppressis mensibus, neque enim præ nimia crassitudine commode feruntur, sed & stupidus sensus; circa pectus, lumbos, ac crura percipitur, aliqua etiam crurum impotentes sunt, victus quoque præcessit frigidior, ac crassi succi. At si prorsus perfrigerata fuerint, ne venerem quidem appetunt, & vteri osculum contractum habent, ut ex Aëtio cap. 27. libro 16. & Paulo cap. 74. libri 3. liquet. Ob nimiam quoque vteri humiditatem mulieres non concipiunt, extinguitur enim in talibus genitura, quemadmodum in terra palustri cerealia semina, ex Galeni testimonio, præcitato aphorismo. Hanc indicant in coitu humor distillans, tenuius, & copiosum menstruum, ut inquit Paulus. In habentibus autem immodicam vteri caliditatem sterilitas contingit modo, quo ubi valde calidæ terræ semina committuntur, veluti in aestibus sub cane, eodem Gale. auctore. Coniectatur autem vteri caliditas ex reliqui corporis caliditate, & ex mensium paucitate cum dolore pudentium: ita ut pudenda mulieris exulcerent, sed & quæ prodeunt, nigriora sunt, & ob nimiam puncturam nullum ordinem seruant. Sequitur etiam ad hanc temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas, ut inquit Aëtius. Propter defectum quoque alimenti sicciores vteri non concipiunt. Nam in ipsis tale quid accidit, quale ubi aut arenæ, aut argilolæ terræ, aut petrosæ mandantur semina, eodem Galeno teste. Humor verò in coitu ex eisdem haudquaquam distillat: exiguum quoque ac crassum erit menstruum, aderitque totius corporis exsiccatio. Si quando verò prædictæ simplices intemperaturæ inuicem misceantur, ex earundem indiciis manifesta erit earum commixtio. Atqui cognitionem omnium immodicarum vteri intemperierum aphorif. 59. quinti libri, scripsit Hippocrates, cum dixit, si mulier non concipit, scire autem velis si conceptura sit, pannis circumtectam infemè suffies, & si odor videatur per corpus ire ad nares, & os, scito quod ipsa non ex se ipsa sterilis est; frigiditas nanque spissitudinis ratione non permittit usque ad os, & nares ferri aromatum exhalationem: eodem modo & siccitas. Humiditas verò, sicuti ab ipso Hippocrate dicta est, extinguit genit-

Frigidi vteri signa.

Humidi vteri signa.

Calidi vteri signa.

lib. 16. c. 13

Sicci vteri signa.

turam, sic & aromatum qualitatem. At vehemens caliditas ea ratione, qua vincit aromatum facultatem alterat, atque corrumpit, ac propterea non permittit ipsa seruantia suam naturam syncera ad os, & nares ferri. Quod si in hisce naturis ex suffitu aromatum cognitio sufficienter haberi non possit, ex aliis indicis nobis erit talis natura inuestiganda, hoc ipsum cognoscentibus, quod rara admodum est huiusmodi calida temperatura in mulieribus, siquidem femina est mare frigidior. Vtilissima est itaque in sterilibus mulieribus ex aromatu suffitu dignotio, ut inquit Hippoc., vel quia omnis immodica intemperata isti subiicitur, vel quia rarissime una ipsam subterfugit in mulieribus illis, quæ tenues apparent, & nigra, & hirta, ita quod ex his signis percipitur earum immodica intemperatura sine suffitu aromatum, ut Galenus asserit citato commento aphorismi sexagesimi secundi, quinti libri. Idcirco idem Hippocrat. aphorism. 44. eiusdem quinti libri dicebat, quæcunque præter naturam tenues existentes vtero gerunt, abortiunt priusquam crassescant. Quapropter prius eas reficere oportet: quæ admodum etiam quæcunque præter naturam crassæ non concipiunt vtero, ut idem Hippocrates asserit aphorism. 46. eiusdem lib. iis omentum os vteri comprimit, & priusquam extenuentur, non concipiunt. Præterea eisdem menses pauci feruntur, cum maxima alimenti pars in pinguedinem transeat, ut Aëtius refert. Cum verò hi duo habitus præter naturam sterilitatem efficiunt, ex teipso eos dignoscere valebis, de quibus Paulus sic scriptum reliquit: neque enim pingues liberis procreandis sunt idonei: eo quod genitalibus mutuo se contingere commodè haud possunt, tum quod momentum feminis emittant; neque etiam nimis extenuati liberis operam dare feliciter queunt: sermo autem Pauli communis est tum viris, tum mulieribus. Accidit quoque interim ex vitiosorum humorum redundantia quod mulier non concipiat: qualis autem vitiosus sit redundans humor, ex his quæ diximus capite de menses suppressione inuestigabis. Item ob cicatricem ductam si vasa fuerint excæcata, id quod dignoscas ex præcedenti vlcere, & ab eodem etiam vlcere sterilitas interim fit, quod ex signis vlceris patebit, quemadmodum si ob membranam osculū vteri oburantem, aut ob nimiam eiusdem osculi angustiam, vel amplitudinem, siue quod ceruix vteri obliqua fuerit, consequatur sterilitas, ex obstetricum relatione percipies. Si etiam mulieri menses non omnino prodeant, aut pauciores quàm debeant, aut plures profluant quàm profluere deberent, adhuc non concipiunt, ex Hippocr. auctoritate lib. de sterilibus. Flatus quoque in vtero existentes conceptionem impediunt, quos insequitur peccinis, & imi ventris tumor, extensio, & quandoque cum dolore pungitiuo sæpe ad alterum, sæpe verò ad vtrumque inguen se extendente: quandoque etiam flatus per muliebrem pudendum erumpit, ita ut mulieres ipsum percipiant: interim quoque strepitum, ac sonitum circa vterum eadem sentiunt. At si per aliquod assumptum pharmacum mulier non concipiat, ex eiusdem mulieris loquela, aut adstantium percipies. Sed & inuiti quoque coitus, inanes ac steriles sunt, amor enim genituram conciliat, & propterea feminae amantes crebro pariunt. Etas etiā vel iunior, vel prouectior conceptionem impedit, & inepta mulieris

forma sterilitatis occasio est, ut liquet ex Aëtio eodem cap. 26. lib. 16. Intempestius etiam congressus causa sterilitatis est, cum conceptionis tempus sit, vel incipientibus, vel cessantibus menstruis. Reliquo autem alio toto expurgationis tempore licet aperta fuerint vteri venarum ora, non tamen tunc concipere mulier vlllo modo potest, cum semen nequeat in vulua remanere, sed ab influentis sanguinis copia eluatur. Cessantibus autem, vel incipientibus mensibus, & ora aperta sunt, & menstruum non multum, neque vniuersum, sed paucum & paulatim effluit, unde efficitur, ut ob asperitatem vuluæ semen adhæreat, satisque alimenti ex sanguinis confluentis paucitate habeat. Ante etiam quàm menses veniant conceptus fieri propterea non valet, quia & alimento caret semen, & adhaerentiam nullam inuenit, cum eo tempore oclusis vasculis laevis vulua relinquantur: defluit itaque semen, neque vniri cum tunica eius potest, siquidem aspera magis idonea sunt, quàm laeua ad coalescendum, ex Galeni sententia lib. de dissectione vteri, cap. 16. Nam si laeues fuerint vteri, mulier in ventre non concipit, quoniam licet genituram suscipiant, foras tamen emittunt, ut testatur Hippoc. eodem libro, de sterilibus. Cæterum si medicamenta sterilitatem inducentia vasa vteri excæcent, incurabilem plerūque affectionem faciunt, licet quædā potiones cæcitatem curabilem inducant, cui si protinus subuenias mederi possis, ex Aëtij testimonio. Quod verò quæcunque præter naturam crassæ sunt, priusquam extenuentur non concipiunt, superius dictum est, ex Hippocratis auctoritate aphorism. 46. libri 5. Similiter ex Galeno liquet, quod male temperati vteri si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt, si verò nimium, mulieres steriles fiunt. Si vlcera in vteris fuerint etiam oborta, & si menses sano modo prodeant, plerumque incurabilia sunt; & propterea in ventre tales non concipiunt quādiu vlcera habuerint, ex sententia eiusdem Hip. citato lib. de sterilibus. Verum ubi ob frigiditatem mulier non concipit, vniuersa victus ratio eligatur ad calidum vergēs. Cibi boni succi exhibeantur, attenuantēque, ac omni- bus alimentis admisceantur quæ purgationes irritare possunt, veluti sunt olera odorata, & acris, scā- dix inquam, crythmō, sceniculum, gingidium, apiū, smyrnium, asparagus palustris, & similia. Speciatim autem, accommodatum victum cap. de mensū suppressione ex frigidis succis reperies. Conuenit namque nedum victus ratione, sed aliis remediis omnibus eisdem calorem reuocare. At ubi frigidi etiā, & crassi succi cum frigida vteri intemperie redundarint, post eorum coctionem, ac preparationem purgante medicamento vacuandi sunt, quorum copiam, ac formulam citato capite requiras. Quod si purgatio per inferna non suffecerit, vomitus quoque prouocetur origani, aut thymi decocto ante, & post cibum omni studio adhibito, ut pituita euacuetur, ex Aëtij auctoritate. A purgatione autem, vel vomitu haudquaquam incommodum fuerit castoreum, cum minum, anisum, pulegium, seu iuniperi fructum, & alia huiusmodi bibere, & singulis piper admiscere, ex eiusdem Aëtij, ac Pauli sententia, quæ omnia absorberi poterūt vino albo odorato, aut aqua mulsa: item confert mercurialis cum castoreo, aut absinthium tribus, aut quatuor diebus consueto mensium tempore, si in potu exhibeatur: est etenim hæc potio

Lib. 16.
ca. 26.

In princip.

potio ad conceptum efficax, ut idemmet Aetius inquit. Inquent etiam usum conferunt si drach. j. elegmatis diambrae, aut diamoschu dulcis, seu de xyloaloē exhibeatur cum vino albo, aut aqua florum citrangelorum: nec minus & antidoti mithridati, aut theriacae si tantumdem exhibeas. Vteris verò fomenta fiant per suffitus, & vapores, arundine ollae opertulo perforato inserta, aut igni adeo adhibita: ut suffitus, aut vapor intra pudendum excipitur, sit etiam mulier pannis circumtecta: suffitus inquam fiant ex calidis odoratis, ut casia, cinnamomo, costo, amomo, thure, myrrha, styrace, & aliis huiusmodi, quae calidam habent temperaturam, & odorata sunt valde, vapor autem fieri potest ex aqua calida, in qua prius fuerit decoctio artemisiae, salvia, ruta, cuminum, pulegium, cyperus, acorum, iuncus odoratus, & reliqua femina odorifera, ut praedictis Paulo, & Aetio visum est: possunt quoque & haec singulatim cataplasmatibus modo pubi imponi, & idem decoctum per pudendum vtero injectum confert: item pubis, coxarumque frictiones nihilominus conducunt: nec minus si oleo perficerentur irino, aut amaracino. Pelsi quoque subdantur ex myrrha, ruta, galbano, & castoreo, chia mastiche, & cypero parati, & ne mordeant, ac exulcerationem faciant, adipe anseris, aut gallinae, & saccharo rubeo excipiantur, & serico linteo inuoluti, ac oleo irino, seu liliaceo intincti immittantur, sit autem eorum quantitas exigua, adips autem, & sacchari maior. Nam neque difficile est eorum quantitatem artificiosa metri coniectura pro affectionum magnitudine, aut diuturnitate, & reliquis. Sunt quoque & pelsi alij ad conceptionem idonei, ut si coaguli leporis partes duas, aluminis scissi partem vnam melle excipias, ac pello formato vitore, vtero tamen prius per praedicta purgato. Item seminis satyri, & mellis singulorum sexunciam in pessum affirmato, & vtere, ex Aetij auctoritate: nec minus & reliquis medicamentis, capite de suppressis mensibus ob frigiditate conscriptis uti poteris. Vbi verò calida fuerit vteri intemperies, victus ratio conuenit ad frigidum, ac humidum vergens, talis item eligatur aer, somno utantur longiori, & quiete: ac infrigidantibus cibis, quales sunt, ex oleribus lactuca, malua, blitum, cucumis, cucurbita, pepo, attriplex, & portulaca, alique cibi consimiles. Vinum eligatur tenue, album, & aquosum optime dilutum. Competunt item aquarum dulcium balnea. Ad lumbos verò, pubem, & inum ventrem infrigidantia quoque adhibenda sunt, velut est solani, aut vmbilici veneris succus, semperuiui, aut lactuca, rosaceo admixto: aut foliorum atriplicis, portulacae, seu lactuca excipe pugillos duos, olei rosacei, violacei, & cytoniorum, singulorum vnc. j. farinae hordei pugillum j. cum succo solani, aut vmbilici veneris, & pauca aqua rosacea fiat cataplasma, & praedictis locis applicetur: item in pudendum commode subditur idem solani, aut vmbilici veneris succus rosaceo admixto, qui inuoluto linteo lineo, ad digiti formam excipiantur: mercurialis item lumbis, ac pectini imposita vtero calidiori prodest, ut inquit Aetius, & argenti spuma, ac cerula cum aqua trita: recte autem metienda erit horum omnium quantitas, ita ut perpetuo caueas perfrigerationis excessum. Conferunt item non minus si ea, quae infrigerandi vim habent, potu exhibeantur, siue syrups fuerit, siue

decocta: quorum magna copia habetur, & propterea nos breuitati indulgentes praetermittimus, illud animaduertentes quod si cum calida vteri intemperie calidi, ac vitiosi redundarint succi, iidem etiam prius purgandi sunt, cōcoctis ipsis, ac praeparatis, seu à natura euictis, & deinceps, quae modo scriplimus medicamenta adhibere oportet. Nam quoad menses morboosi fuerint, siue biliosi, siue pituitosi extiterint, mulier non concipit, ut liquet ex Hippocrate eodem libro de sterilibus. At mulieres, quae ob vteri humiditatem non concipiunt, si cōiore diata uti conuenit, multumque exerceri, ac fricari per superiores potissimum partes: cibis vtantur leuibus, & mediocribus, ita ut carnes assatas potius, & vigentium aetate animalium edant, & vinum potens meracum, sed parcius bibant, ut Aetius faceret: auerfionis autem gratia aliquando post cibum, aliquando ieiunae vomant: sicca etiam fomēta crebro, balnea verò raro adhibenda sunt: & ubi totum corpus purgatum fuerit, resciccatia ac adstringentia medicamenta vtero adhibeantur, quae si ante purgationē propinentur, non parum leuēt, cohibita enim materia (ut inquit Aetius) ad principales partes decurrit: huiusmodi sunt lentisci decoctum, myrti, rosarum, & rubi teneorum virgultorum, rhus coriarij, mali punici florum, & gallarum, & pillularum compressi: ex quibus infusis, irrigationes, fotus, cataplasmata, infusiones, & pelsi formari poterunt, hoc item epythemate uti poteris, ex eiusdem Aetij auctoritate, quod recipit psyllium tufum, & palmularum carnem cum aqua multa, aut etiam mala cotonea similiter palmulis excepta adhibeto, ut ipse inquit, ad nimiam quoque vteri humiditatem huiusmodi potiones conueniunt, myrti baccas, aut malicorium punici dulcis cum vino terito, & exhibeto, aut auellanas nuces vltas, cum vino tritas propinato, ex eodem auctore. Mulieri verò, quae ob vteri siccitatem non concipit, humidiora alimenta exhibenda sunt, & reliqua victus ratio humidior instituenda, mediocri quoque vino, & non nimis veteri utatur, balneis quoque inunctionibus, cataplasmatibus, ac infusionibus humectandi vim habentibus uti conueniet, quoniam ubi totum corpus fuerit humectatum, vterus quoque eadem qualitate participabit. At si ex flauoso spiritu in vtero existente conceptio impediatur, primum quidem parciore cibis exhibendus est, mox danda quae status expellunt, velut est ruta, cuminum, anethum, apij semen, anisum, & pleraque alia familiaria semina, ac aromata, quae partim potanda, partim applicanda sunt ipsi vtero, atque subdenda. Possunt & ex eisdem fomenta parari, cataplasmata, ac cerata, & ad pubem imponi, ut liquet ex eisdem Aetio, & Paulo. Si vero ob oris vteri angustiam propterea quod ipsum conuiens, aut conclusum fuerit, sterilitas fiat, infusionibus, fomentis, ac perfusionibus, & pelsis odoratis, atque mollientibus aperiendum erit. A mollioribus tamen incipiendum, ut ex decocto maluarum, seminis lini, althaeae, fenugraeci in oleo, aut hydrelao, quo decocto, nedum pro infusionibus, sed etiam perfusionibus, seu iniectionibus uti conuenit: deinceps casiam, cyperum, aut nardum adiacere poteris interim etiam ad validiora transfundendum: qua de re artemisiam, chamamelum, conizam, calaminthā, pulegium & amaracum apponere licebit, ex quibus quoque pelsi hunc in modum parari poterunt, Recipe radicū, & foliorū maluarum,

Loco citato
Si ob humiditatem fiat sterilitas, curatio.

lib. 16. c. 29

Loco citato

Loco citato

Si propter siccitatem vteri non concipiat, curatio.

Si ex flauoso spiritu sterilitas fiat, curatio.

Aetius li. 16. cap. 31
Ex angustia oris vteri.
Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

Paul. loco citato.

& althææ, contusarum ana drac. 3. farinæ seminis lini, & sœnugraci ana vnc. j. adipis anseris drach. iij. croci parum, & moschi parum misceatur, & in serico linteo inuoluta pelsi fiat: qui in oleo irino, aut liliaceo, aut nardino intincti subdantur. Procedente vero tempore caricæ, calsiæ, resina terebinthina adici

Si os vteri nimium hiat, curatio. Paul. loco citato.

Act lib. 16 cap. 31.

Si distortum, aut peruersum fuerit vteri os, curatio. Loco citato. Ex deuorato pharmaco.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

Medicamentum propria.

poterit: interim quoque artemisiæ, amaracus, calamintha, pulegium, & myrrha. At si propterea quod vteri os nimium hiat, non concipiant, victus, fomenta, ac reliqua omnia medicamenta sicciora, & adstringentia conueniunt, talia sunt gallarum decoctum, cytini, lentiscus, rubi radix, myrtus, & alia huiusmodi, que humidiori vtero congrua sunt, ex eisdem Pauli, & Actij sententia. Vbi verò distortum fuerit, seu peruersum eiusdem vteri os, mollioribus quoque fomentis dirigere, ac corrigere oportet, etenim fomenta ad hoc maximè faciunt. Conducit quoque & pessos mollioribus subdere, specillo quoque, & digito correctio facienda est eisdem mollioribus medicamentis prius intinctis. Insuper maximè conferunt pulegij, & artemisiæ decoctum, ac castoreum è posca potum, vt refert Aetius. Si verò ex deuorato pharmaco quopiam sterilitas consequuta fuerit, pharmaci viribus indagatis contraria medicamenta adhibere conueniunt. Reliquæ sterilitatis causæ, quæ etiam particulares requirunt curationes, suis propriis capitibus petendæ sunt, & nos breuitati indulgentes consulto prætermisimus, veluti est habitus gracilis, vel obesus, vicus, cicatrix, membrana os vteri obturans, mensium suppressio, seu eorundem immo dicus fluxus, & intempestiuus, seu inuitus congressus, ac reliquæ huiusmodi. Reliquum est, vt ea conscribam medicamenta, quibus pro remouenda sterilitate vt consueui, potissimum vbi orta sterilitas non fuerit ex immo dico vteri calore, id quod perrarissimè accidit; quorum primum est, Recipe testiculi apri syluestris exsiccati in vmbra, & scobis eboris, singulorum drach. j. testiculorum vulpis drach. j. s. matricis, & coagululi leporis ana scrupul. ij. seminum melonum drach. 4. cum saccharo dissoluto in aqua rosacea, & mellystophylli fiant morsuli. Vel recipe seminis seseleos, scobis eboris, & matricis leporis in vmbra exsiccatæ ana dra. j. diambræ, seu eclegmatis de xyloaloë drach. j. s. cum saccharo in aqua rosacea dissoluto figurentur morsuli, quibus vtatur mulier cum paucio vino albo, aut aqua mellystophylli, seu florum citrangularum per plures dies ante viri congressum: quo etiam tempore pelsi adhibeantur ex coagulo, matrice, & stercore leporis, caricis pinguibus, adipe anseris, paucio croco, ac mosco figuratis, qui etiam in linteo serico inuoluti, & oleo irino, seu liliaceo intincti subdantur. Interim vngula aromatica, spica, aut cyperus eisdem permisceri poterit: à quibus desinentibus iam mensibus (quod tempus optimè est) medio mutuo amore (nam amor genituram conciliat, vt inquit Aetius) Venus ineunda est, quæ etiam à tergo exercita ad concipiendum videtur conducere, vt inquit Paulus, sed & virum strenuam operam nauare oportet, interimque à venere abstinuisse, & boni cibi succis nutritum esse, ex Actij decreto. Si verò velis cognoscere an mulier concipiet, vel non, butyrû, & lac mulieris masculum alentis bibendum dato, & si eructauerit, concipiet: sin minus, non: vel caput allij integrum depurgatum, ac derafum ad vterum apponatur, & postmodum videat an per os oleat, & si oluerit concipiet, sin minus, non: ite anisum in aqua tenuissimè

tritum bibat, ac dormiat, & siquidè pruritus ipsam circa umbilicum corripuerit, concipiet: sin minus, non, vt liquet ex Hipp. in lib. de stendibus. At si velis dignoscere num prægnans sit, mel, & anisum tenuissimè terito, deinde in aqua diluito, ac exhibeto, & dormire sinito, & si quidem tormen ipsi fiat circa umbilicum, prægnans est, sin minus, non est, vt liquet ex eodem citato loco: item cum dormitura est, aquam multam potendam, & si alui tormina parietur, concipiet: sin minus, non concipiet, vt liquet aphor. 41. quinti libri.

Neel d'usoulas. Id est, De difficultate partus. CAP. CXIIII.

PArum admodum ad generis propagationem machinata est natura in fabricandis concipiendi instrumentis, potissimum mulieribus, nec notatum dignè opem medicus pro eodè scopo præstitisset in profligandis sterilitatis causis, nisi eadem natura, que in foetus generatione, ac conseruatione adeo fuit sollicita, in eius quoque ortu, ac editione in lucem miranda quadam commenta esset, & medicus vbi opus est, in hac actione eidem naturæ ferret auxilium. Propterea ab eadem natura factum est, cum mulieri partus appropinquat eo videlicet tempore, quo sufficiens foetui alimentum præstare non valet, vt inquit Hippocrates lib. de natura pueri, aut vbi per os nutiri potest, nam tunc propriè foetus perfectus est, & partus naturalis fit, Galeno teste 15. de vsu part. cap. 7. vt idem puer vberius præsumat alimentum quarens, calcitrando membranas disrumpat mouens se manibus, ac pedibus: quo fit vt rumpatur membrana quadam interna, qua disrupa contingit etiam alias debiliorem vim habere: & rumpuntur etiam primum quidem illi contiguæ, & coherentes, postea extremæ: quæ cum ruptæ fuerint, tunc foetus à vinculo exoluitur, & agitatus foras procedit, neque amplius vteri ipsi continere possunt abrupsit membranis, sed & ipsi quoque vteri in hoc præstant auxilium, haud enim sufficiens esset foetus ex seipso duntaxat perfectus in lucem edi (nisi quod vteri inhiibentes, & cessare facientes ab opere retentricem eorum facultatem, quæ id quod vtero gestabatur vsquequo ad debitam perueniret magnitudinem retinuerat, ac amplexata erat, altera, quæ hæcenus quieuerat loco eius assumpta propultrice videlicet, ac eorum os, quod toto impregnationis tempore adeo conuiebat, vt ne specilli quidem culpidem admisset, ex Herophili auctoritate, paulatim adaperientes eo vsque vt possit foetui facilem præbere exitum ipsum propellentes) non parum pueri ortui auxiliantur. A seipsis quoque & ipsæ parturientes in hoc non exiguan opem præstent mediis abdominis musculis, vt 3. de naturalib. facultat. cap. 13. scriptum est. Non ab re igitur comment. aphor. 55. 5. libri dicebat idem Galen. quod ad bonum partum duorum corporum vigore est opus, & grauidæ mulieris, & infantis. Tot itaque, ac talia admiranda in animalis partu natura machinata est, prouidens vt foetus iam absolutus, ac consummatus tuto emittatur. Partus autem nominatur quando ex natura commo fit, quando verò non naturæ sponte, sed violenter incidit abortus prouocatur, vt liquet eodem 3. de naturalibus facultaribus, cap. 12. Appello autem abortum imperfectè factum emissum sine m

*de morbis
vagina con
men. i.
Loco cit.
Quomodo
fit partus
naturalis.*
 fionem utcumque factam, cum Galeno 6. de morbis
 vulgaribus, è diuerso autem naturali partum nun
 cupamus eorundem foetuum consummatorum, ac
 perfectorum naturalem emissionem, qui (vt inquit
 Hippocr. eodem lib. de natura pueri) hoc modo fit.
 Vbi enim adeo auctus infans est, vt alimentu, & au
 gmentum, quod à matre descendit, non amplius ei
 sufficiens sit; copiosius alimentum appetens calci
 trat, & membranas disrumpens initium partus ma
 tri affert. Foetus itaque vehemensis motibus suc
 cedunt partus, ex Hippocratis sententia. Hoc etiam
 tempore & vter, qui amplius foetus grauitatem, ac
 eorum distentionem ferre nequeunt; Galeno teste
 eodem 3. de naturalibus facultatibus, nec minus &
 sentientes interim se morderi à qualitate humoris
 in seipso effusi, quod eos molestat facultate propul
 trice media abicere properant, necnon & à seip
 s parientes in hoc præstant opus non mediis vteris,
 sed musculis (vt diximus) qui in abdomine existunt,
 qui ad deiectionem etiam tum ad reddendam vrinā
 nobis sunt auxilio. Fit itaque partus hoc modo. Ve
 ritum quo tempore fiat, non admodum liquet. Nam
 Hippocrates eodem libro de natura pueri asserere
 videtur foetus perfectionem, ac naturalem partum
 decimo imprægnationis mense fieri, ait enim, ali
 mentum, & augmentu, quod à matre descendit non
 amplius sufficiens est puero, vbi decem menses præ
 terierint, & foetus auctus fuerit: & post pauca iterū
 ait, atque hæc, vt longissimè in decem mensibus fiunt.
 Aristoteles verò quarto de generatione animalium
 cap. 4. & 7. de historia animalium capite quarto, sic
 de pariendi tempore scriptū reliquit: Sed cum cete
 ra animalia omnia singulari, ac simplici modo par
 tum suum perficiant, vnum enim pariendi tempus
 statutum omnibus est, homini vni multiplex datum
 est. Nam & septimo mense, & octauo, & nono pa
 rere potest, & quod plurimum decimo, nonnulla
 etiam vndecimum tangunt. Foetus verò qui matu
 rius quam septimo mense prodeat, nullo pacto vita
 lis est, qui septimo vitalis quidē, hic primus exit, sed
 magna ex parte infirmior. Idem conscripserat Hip
 pocrat. lib. de septimestri partu, dum dixit, sunt au
 tem ex his septimestribus qui & superstitēs manent
 ex multis pauci. Galen. autem quod nouem mensi
 bus perficiatur in vtero foetus 3. de nat. facult. cap. 3.
 his verbis demonstrauit, asserens quippe nouem mē
 sibus plerisque mulieribus perficitur in vtero foetus
 & 2. de caus. sympt. cap. 3. illud confirmauit, cum di
 xit, sanè eadem virtus, quæ sic de foetu est sollicita,
 vt nouem mensium spatio eius sustineat pondus, at
 que vt absolutus tutò emittatur, prouideat, & cete
 ra: & paulò suprà dicebat, quippe qui (de vteris lo
 quens) tum foetus grauitatem, tum sui distentionem
 nouē mensibus protulerunt, ij absoluto in ipsis fœ
 tu ad eius expulsionē se comparant, sic itaque diuer
 simodè sentire videntur de pariendi tempore præci
 tati magni viri. Verū si quispiam eorum sententiā
 & non verba percipere velit, absque nimio labore
 conciliari poterūt, ea primò sumpta hypothesi, quæ
 ab eisdem tāquam manifesta admittitur, quod cum
 adeo perfectus, ac consummatus foetus exiit, vt per
 os nutrirī valeat, deficiatque ei alimentum, ac aug
 mentum, quod à matre suppeditatur, tunc partus na
 turalis fit, ac naturaliter in lucem editur foetus, huic
 aliam & secundam hypothesim addas, quod hoc ali
 mentum diuersimodè in diuersis vtero gerentibus
 se habet, si maiorem, vel minorem sufficientiam,

aut paucitatem eius considerabis, prout sufficientes
 vel paucos menses demittere consueuerunt, simili
 ter & inter se non parum disident foetus, qui maio
 res, vel minores cum existant, aut robustiores, vel
 imbecilliores plurimo, aut pauciori alimento indi
 geant etiam dum perfecti, ac consummati fuerint.
 Propterea Hippocrates horū haud ignarus eodem
 libro de natura pueri, talia verba protulit, quin et si
 alimentum à matre prius puero defecerit, etiam sic
 partus matri prius aduenit, & ante decimum men
 sem puer prodit, & hoc perpetiuntur magis mulie
 res primiparæ; deficit enim pueris alimentum, vt ad
 decimum vsque mensem sufficere non possit, & de
 mum: quæ verò menses paucos demittunt, eæ etiam
 pueris postremo tempore vbi iam maturi fuerint
 alimentum rariùs exhibētes ipsos calcitrare faciunt,
 vt & ante decimum prodire festinent, modicus e
 nim sanguis à iuenculis, ac nouellis matribus pro
 cedit longissimum: itaque terminum naturalis par
 tus conscripsit Hippocrates esse decimum mensem
 per hæc verba, atque hæc vt longissimè in decem mē
 sibus fiunt, non negans illum posse citius contin
 gere propter iam traditas causas, vt idem per eodē
 lib. in citatis verbis scriptum reliquit: nec Aristot.
 Hippocr. sententiæ aduersatur: quinimò ipsam con
 firmavit, dum asseruit, & septimo, & octauo, &
 nono mense mulieres parere posse, & quod pluri
 mum decimo (vt ipse inquit) nonnullæ etiam vn
 decimum tangunt. Plurimum itaque naturalem
 partum decimo mense contingere falsus est Aristot.
 quemadmodum Hippoc. scriptum reliquit, non ne
 gavit autem, id quod nec Hippocr. negare videtur,
 posse contingere, ac festinare ante decimum men
 sem, & quandoque vndecimum attingere, pro iam
 dicta tum foetus, tum alimenti diuersitate, post
 quam à septimo mense foetus vitalis est, antea verò
 nequaquam: quamvis quædam, quæ longius, quam
 decem mensium tempus vterum gestare sibi visæ
 sunt, decepta fuerint, modo quo idē Hippoc. citato lo
 co scriptum reliquit. De reliquis verò mensibus li
 bro. de carnibus hunc in modum scripsit, Puer se
 ptimestri partu natus pro ratione natus est, & viu
 it, & demum octimestris autem natus nullus vnquam
 vixit, nouem verò mensium, & decem dierum par
 tus fit, & viu
 it. In eadem quoque sententiam deue
 nit Galenus. Nam licet nouem mensibus pariendi
 tempus præscripserit, illud plerisque mulieribus
 contingere asseruit, fortè qui sic sepe numero ob
 seruauerit haudquaquam negans in decimo posse
 euenire, quinimò admittere illud videtur, ex eius
 dem Hippocratis auctoritate commen. aphor. 37.
 quinti libri, ac aliis quoque mensibus pro predicto
 rum varietate. Consummato itaque, ac perfecto
 foetu, deficientēque eidem alimento, ac augmento
 partus naturalis fit siue nono, siue decimo mense id
 contingat, quod plurimum obseruatur, vt præci
 tatis auctoribus visum est, rarò autem in aliis tempo
 ribus. Cæterum cum adeo miranda pro eius emis
 sione requirantur, euenit (idque non rarò) vt dif
 ficulter edatur in lucem foetus, & sic difficilis fiat
 parientibus partus. Huic difficultati quomodo &
 quibus opitulari, valemus conscribere intendi
 mus, prius tamen eius causas indagatis. Est au
 tem partus difficultas symptoma sub genere con
 tentorum immodicè conetntum; sunt etenim
 foetus non vtero gerentium partes, sed propor
 tione respondent iis, quæ adnascuntur, familia

Loco citat.
 to.

In princip.

Galen.

Conciliari
 tur hi tres
 auctores.

Quis affe
 ctus par
 tus diffi
 cultas.

N n

rium inquam, quemadmodum, & oua, & fructus, nimirum ut diximus ad generis propagationem à natura creati, ex Galeni testimonio II. de simplic. medicam. facul. cap. de ouis & propterea ubi detineantur tempore quo edī in lucem debent, præter naturam detinentur. Cōsequitur autem hæc eorum præter naturam detentio, aut ad noxam alterius facultatis naturalis, retentricis inquam, ac expultricis siue ipsius pueri, siue prægnantis: interim verò citra noxam earundem facultatum ad alias consequitur causas, seu præter naturam dispositiones. Vniuersæ autem aut externæ sunt, aut internæ. Externæ siquidē quæ partus difficultatem inferunt, sunt aut immodicum frigus, quod vterum densauerit, aut immodicus calor, qui vires dissoluerit, aut quoddam aliud fortitudo eueniens, ut liquet ex Paulo, & Aetio. Internæ verò causæ aut vitio parientis, aut foetus, aut membrarum esse possunt, parientis siquidē, ut si crassa obesaque sit, vterus exiguus, dolorum imperita, aut timidiuscula, aut natura imbecillis, ut foetum ne queat propellere, aut etiam si ante tempus pariat, vel inflammationē in locis genitalibus, aliæve particula fuerit experta, aut alio quodammodo laborans: ob ceruicis etiam vteri obliquitatem, & ob carnem eidem ceruici, vel osculo eius adnatam, abscissum, vel duritiem. Potest & difficultas pariendi contingere, si etiam ossa pubis nimium conferta fuerint, quoniam in partu dilatari non possunt parienti difficultatem faciunt: similiter si puerpera vesicæ calculo laboret, vel excrementorum copia in intestino recto, aut vesica fuerit detenta, siue proeclatæ ætatis fuerit, aut puella nondum viridis, nec vires vigoris adepta: nec minùs ob nimiam lumborum cauitatem vterum comprimētē difficulter pariat. Foetus quoque vitio hoc idem quandoque contingit, ut si inuitatæ magnitudinis fuerit, vel exiguus, & modicæ grauitatis, seu magni capitis, vel monstruosus, vel mortuus, aut viuus quidem, sed adeò imbecillis, ut foras non possit procedere; similiter si plures foetus fuerint: nam Herophilus quinque edidisse mulierem memoriæ prodidit. Confirmauit idem Gellij auctoritas, qui diuo Augusto imperante ancillam in agro Laurente quinque pueros peperisse testatur. Figura etiam ipsius foetus naturæ contraria difficilem efficit partum, ut si obliquus, aut in pedes procedat, ex Hippocr. auctoritate eodem lib. de natura pueri: naturalis siquidem figura prodeuntis foetus est, ut rectè in caput manibus ad vtrūque femur extentis prodeat: proxima huic ubi in pedes conuersus est: præcipuè si manibus super vtroque extentis prodeat. Reliquæ verò omnes præter naturam sunt, Aetio, & Paulo testibus, ut si caput in dextram, vel sinistram vteri partem declinet, aut altera, aut vtrique manus exeritur; & crura intus inter se diducuntur: aut etiam altero pede intus detento, altero prodeant, aut duplicati vteris innitantur, aut etiam obliqui prodeant, licet hi minùs improbandi sint, ut liquet ex eodem Aetio. Quapropter diligenter natura prouidit quo pacto foetus qua conueniebat figura ad collum vteri proueniret, caput etenim eius primùm collo matricis indidit, tum per id aliis ipsius partibus viam muniuit, ut liquet decimo quinto de vfu partium, procedit autem in caput si secundum naturam prodierit, ut inquit Hippocr. quoniam grauiissimæ sunt ipsi supernæ partes, si ex vmbilico perpendantur. Atqui si foetus obliquus, aut

transuersus paret egredi, aut si secundum longitudinem quidem, sed non ut nunc scilicet caput non infereret, quod nonnunquam etiam, sed raro accidit, vel eius ante caput, vel manum exerens, difficilem aliis membris exitum efficere, ut eodem 15. de vfu part. à Galen. scriptum est. Difficilis quoque fit partus si secunda, aut propter crassitudinem non abrupatur, aut propter tenuitatem antequam oportet, diuellatur simul cum aliis membranis foetum ambientibus, siquidem humore euacuato, infans præ siccitate ægrè mouetur, ac per os, & collum vteri difficulter elabitur, humor enim iste qui in pueri membranis, continetur nedum eisdem lubricandis confert, sed vteri ceruicem ad maximā dilatationē reddit faciliem: prædicto namque humore collum humectatū mollius redditur, dilataturque facilius, eodem Gal. teste citato libro 15. de vfu partium. cap. 5. At licet tot sint parienti difficultatis causæ, haud tamen ægrè à medico percipi poterunt. Externæ siquidem ex adiutium seu puerperæ sermonibus. Internas verò tum ex seipsis medici inuestigabunt, tum etiam ex earundem parientium, seu obstetricum loquela. Iure igitur particularem earundem causarum dignotionis modum omisimus. Ceterum ex parientibus, ac puerperis maximè laborat primiparæ propter inexperience dolorum: & dolent quidem totum corpus, maximè verò lumbos, ac coxendices, nam coxendices ipsarum disparantur, verum expertæ iam partus minùs primiparis dolent, quæ verò multoties pepererunt multo minùs dolent, ut inquit Hippo. eodem libro de natura pueri. & ubi obliquus, aut in pedes foetus procedet, nedum mulier difficulter pariet, sed multæ, vel ipsæ perierunt, vel puer, aut simul matres vnā cum foetibus, ut citato libro scriptum est. Quod verò mulier, quæ difficulter parit sternutatio superueniens bonum sit, decretum reliquit idem Hippocr. aphorism. 35. 5. libri, quoniam vehementiori concussu, atque seruore partim quidem naturam excitat, partim verò excernit, quæ partibus corporis firmiter infixæ adhærent, ut inquit Galenus in comment. Quod autem ad curandi rationem pertinet, variatur quidem iuxta causarum diuersitatem, si speciatim eas curare velis. Quoniam quædam sint animaduertenda tanquam omnibus causis communia, quæ primo conscribemus, simul etiam & memoriam facientes quorundam medicamentorum, quæ indifferenter omnibus puerperis difficulter parientibus ex quauis causa adhiberi poterunt. Primùm animaduertendum est quod puerperæ eo tempore, quo partus instat, non sunt multa alimentorum copia grauandæ, neque varia alimenta, & crebro exhibenda sunt, veluti Neapoli abuti consueuerunt nedum mulieres, & vetulæ, verum etiam vulgares quidam medici, ut eisdem obsequantur, & quidam quoque non vulgares: distrahitur enim calor pro conficiendis multis, ac diuersis alimentis, & quo etiam tempore coctioni, ac retentioni alimentorum vacat, viriliter expellere nequit, qua facultate, ac functione valida eo tempore parientes indigent. Pauca itaque, ac moderata alimentorum copia tribuatur, sintque concoctu faciles, bonique nutrimenti cibi, ut oua recentia, ac forbilia, seu tremula, ius pullorum, gallinarum, phasianorum, aut starnarum, quod ex conuis carnibus fit, & vulgus consummatum appellat, vel etiam forundem animalium confusa caro, quam idem vulgus tortilium nominat, aut buccellæ panis

Causa.

Externa.

Paulus lib.
3. cap. 76.
Aetius li-
bro 16. cap.
22.
Internæ cau-
sæ trifariæ.
Parientis
vitiocausæ.

Ex parte
foetus cau-
sæ.

De Hero-
philo vide
Paul. lib. 2.
cap. 76.
Gel. lib. 10.
cap. 2.
In fine.

Locus cita-
tus.

cap. 7.

panis in vino græco, seu altero odorato vino macerata simul cum eodem vino tribuantur. Ad hæc permittendum haudquaquam est, vt obstetrices difficile parientium vterum diutius dilanient, sed leniter, & placide vteri partes contrectent, dulci interrim oleo, aut alio quopiam eisdem locos perfundentes, item non illico parturientes in sella collocanda sunt, sed obstetrices prius os vteri tangere debent, & cum non paulo apertum inueniunt, sed adeo dehiscentis eius modum auctum, quod ad foetus transitum satis pateat, tunc vt fergat mulier iungere debet, eandemque in subfello collocare, adhortarique, vt ad expellendū foetum strenue se paret, quemadmodum 3. de natural. facult. cap. 3. à Galeno scriptum est: spiritum quidem detinentes, verum nō velut imperitæ faciunt, ipsum in gutture congregare debent, sed ad inferiores partes propulsare ex decreto Aetij cap. 14. lib. 16. quo tempore vbi partus difficilis sit, corallum, aut lapidem aquile, aut styracem, coriandrum viride, seu polygoni radicem in dextro crure alligare conuenit, insuper & accipitris, seu falconis stercoreis drachm. 1. cum vino albo, aut aqua capillorum veneris præbe, vel tantundem cinnamomi, seu cassiæ. Aut hunc in modum puluerem conficias, quo vti consueui, Recipe fini accipitris drach. 1. cinnamomi, cassiæ ana grana 7. croci grana 3. misceantur, & cum paucis vino albo odorato aqua capillorum veneris, aut florum citrangelorum exhibeatur. Interim quoque myrrha aut castorei drach. s. aut scrup. 2. cum granis 4. cinnamomi propinabis. Sunt qui trochiscorum de myrrha etiam drach. 1. exhibent, insuper & phaseolorum, seu cicerum rubeorum, ac fenugraci decoctum cum oleo amygdalarum dulcium: quod si parum cinnamomi, croci, aut cassiæ, seu alterius prædictorum permisceas, magis confert. Excitare quoque hoc tempore sterutamenta conducit, modo non admodum imbecilli capitis parturientes sint. Suffitus etiam resinae, aut cumini, aut pinus corticis confert, Hippoerat. auctore libro de morbis muliebribus. Speciatim autem vbi ex immodico frigore vterum densante, ac coarctante fiat pariendi difficultas, in aere mediocriter calido locanda erit, & in eo gestatione eam mouere conuenit, modo febris, aut aliud quidpiam non impederit. Nonnulli etiam conuassationes validas, sterutamentisque ciendis idonea adhibuerunt, Paulo, & Actio testibus: quibus etiam opem ferre oportet laxationi per infusus calidos, & suffusiones, ac per infusiones oleorum tum actu tum potentia calidorum: itemque per illusiones, ac cataplasmata eiusdem generis. Qua de re infundere oportet largiter oleum dulce, & calidum: item decoctum fenugraci, aut maluarum, vel feminis lini, deinde & pubem etiam cum abdomine, & lumbis eisdem medicamentis illinire, aut aliquo alio relaxante medicamento, vt hydreleo, & aliis huiusmodi: eadem quoque laxamenta adhibenda sunt à balneis si non febris, aut aliud quidpiam prohibuerit, ex eorundem auctorum testimonio. Si vero ob calorem immodicum vires exoluentem pariendi difficultas exciteretur, condensantibus, ac maxime adstringentibus, & firmitate inducentibus eam roburare oportet: qualia sunt insperiones, ac infusiones ex myrto, pampinis vitis, malis punicis, aut rosis: nec minus odoramenta sicut ex aqua rosacea, myrtillorum, & nymphaeæ cum aceto, addendo si lubet parui fantalorum, & corallorum rubeorum. Con-

uenit quoque vnguentum ex vino, & oleo rosaceo frigidis, vt inquit Aetius: nec minus cibus, & potio- nibus refocillanda erit facilis coctionis, multi nutrimenti, ac modice quantitatis permixtis semper quibusdam adstringentibus, vt cydoniis, malis punicis, ac reliquis huiusmodi. Insuper buccellæ panis vino imbutæ ad arcendum animi deliquium eisdem offerantur, in aerēque parum frigidiori degant: timidis autem ac puellis mentis robur admoendum, quemadmodum eis, quæ inexpertes dolorum sunt, vt validissime spiritum comprimant, & ad inguina depellant, admonendum est. At si imbecillæ sint mulieres parturientes ex morbo, temperamento, vel ætate pronecæ, eisdem cibis boni nutrimenti, ac potibus reficiendæ sunt: Quod si ob lumborum cauitatem, aut propter nimiam pinguedinem patiendi difficultas contigerit, puerpera in sella prona flexis genibus collocetur, seu in lectulo, vt vterus delatens ceruicem rectam extendat, atque idem è directo ostioli habeatur, quod quidem ceratis, oleis, ac pinguedine delinire digito oportet, & sensum apperire: idem quoque vteri osculum, vbi clauum permanserit, pinguibus medicamentis enollitur, ac relaxetur. Si vesicæ calculus affuerit, eum primo propellere oportet, & si eadem lotio plena fuerit, idem educendum: Similiter si intestinum rectum excrementis plenum fuerit, per clysterem mollem, & leniendi vim habentem eluimus. At si ob inflammationem, abscessum, vlcus, tumorem laxum, aut durum, seu ob carnem collo vteri adnatam, aut aliquam aliam tunicam, vel ob quempiam alium morbum parturiedi difficultas eueniat, singulis pro affectionum ratione succurrendum est. Et si eiusdem vteri paruitas in causa fuerit, loca pinguedine aliqua inungantur, ac foueantur, & os vteri digitis dilatetur. Quæ verò non vtero gerentis vitio, sed ipsius foetus difficultatis pariendi causa sunt, hoc modo corrigendæ erunt. Nam si propter foetus imbecillitatem aut paruitatem id contingat, hortandæ sunt mulieres, vt strenue mediis abdominis musculis eundem foetum conentur expellere. At si propter ipsius foetus figuram præter naturam, partus difficultas adsit, à naturalem situm reducendus est, quantum eius fieri potest, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, & partim in rectum agendo, vt inquit Paulus. Et si manum, vel pedem præmiserit, ne attrahatur per membrum, nam magis impingitur, aut luxatur, aut etiam abrupitur, verum digitis humero foetus, vel coxæ affixis rursus in conuenientem locum introducatur, id quod iam præmissum est. Si verò vnà cum foetus figura mala, os vteri compressum, seu coarctatum fuerit, prius ab osculo vteri in sublime eleuetur foetus, & postea rursus ad osculum rectè dirigatur, fiantque omnia placide, leniter, ac citra compressionem, oleo assidue locis affuso: hoc etenim ex salute tum foetus, tum parientis fuerit, & vterus ita quoque illæsus manet. Vbi verò infans præmagnus fuerit, aut totus, aut ob capitis, seu thoracis, aut ventris magnitudinem, ea adhibenda sunt, tum intus, tum extra quæ laxare, ac dilatare os vteri possunt. Verum vbi nec sic procedat, aut etiam infans mortuus fuerit, modo spes sit salutis vtero gerentis, omnino necessarium est foetum secare, ex communi sententia tum Aetij, tum Pauli, modum autem sectionis reperies apud Paulum libro sexto cap. 74. & ab Aetio conscriptum cap. 23. libri 16.

Si ob aliam causam ex parte parientis fiat partus difficultas, curatio.

Si ex parte foetus fiat curatio.

velut

Ex parte
membrana-
rum, si fiat
difficilis
partus cu-
ratio.

At si gemini foetus fuerint, aut terni, aut collum vteri obfoderint, aut etiam plures, reliqui ad fundū vteri repellantur, & is qui magis paratus videbitur, prius educatur: sensum autem, & citra contusionem omnia fiat, oleo locis perunctis, ut idem Paulus refert. Si verò ex parte membranarum contingat pariendi difficultas, ubi secunda solidior, ac crassior fuerit, quam ut rumpi possit, discindatur, ut inquit Aëtius. Verum si propter tunicarum tenuitatem, in quibus humor continetur, difficilis fiat partus, propterea quod humor in membranis contentus ante debitum tempus effluerit, ita ut vteri sint refecati, eis albumina ouorum cum malua, aut fenugræci decocto excolato, aut cum ptisanâ cremore tepido infundantur, decreto eiusdem Aëtij.

Περὶ χυμῶν καὶ τοῦ ὕδατος. Id est, De secunda derelicta.
CAPVT. CXV.



VM foetus vtero adhuc geritur, ipsū natura conformans, machinata quoque est loca, per quæ alimentum, ac spiritum posset à matre suscipere, & reliqua quoque eiusdem foetus excrementis idonea comparauit: etenim toti ipsi membrana tenuis vndique est circuniecta, quam ἀμνιον, i. amiculum appellat, foetus velut sudorē excipiens: huic extrinsecus tenuior alia incumbit, quam ἀλ-
λὰ τοῦ ἀμνίου ἢ, id est intestinale nūcupant, in ipsius vesica perforata, quā & hæc in se ipsa colligit vsque ad partum ipsum velut foetus lotiū. His autem extrinsecus in orbem altera membrana circuniecta est: totum vterum intrinsecus subiungens, qua media foetus vtero connectitur. Nam in singulis orificiis vasorum, quæ intrinsecus in vterum pertinent, per quæ etiā sanguis menstruus in ipsum ferebatur (quo tempore vtero geritur) aliud vas gignitur, arteria quidem in arteriis, vena verò in venarū orificio, ut sunt ea, quæ generantur numero æqualia iis orificiis, quæ intrò in vterum desinunt; colligat autem ea membrana hæc, tenuis quidem, sed fortis, ita ut simul & munimentum, & ligamentum eorum sit tum inter sese, tum cum vtero, & quoniam exiguum est vasorum quodque cum primum ab vtero exoritur, cuiusmodi sunt arboris radices extremæ in terram defixæ, ea tamen paululum progressæ per coniugationem coalescunt, ita ut ex duobus vnum procreetur, rursusque illorum singula cum singulis eiusdem generis coalescunt, sitque id perpetuò quoad parua omnia in duo magna coeāt, quæ velut stirpites quidam foetus per locum vmbilici inferuntur: quatuor itaque omnino hæc vasa sunt, duæ scilicet arteriæ, & totidem venæ nullis diuersi generis inter se commixtis, sed venis quidem semper cum venis, arteriis cum arteriis in idem coeuntibus: per quæ vasa, velut per truncos quosdam foetus ex vtero sanguinem, ac spiritum trahit. Verum inter hæc omnia, & vasa exigua quæ dicta sunt, media est iam dicta membrana, quæ velut truncorum radicatio existit, quæ radicatio à Græcis χυμῶν nūcupatur, quod nihil aliud est, quam vasorum multitudo membrana tenui connexorum, quæ haud facillè numerare queas, Galeno auctore decimoquinto de vsu partium, capite quinto. Interim ὕ-
σπερον, seu δ' ὑστερίον appellant, ut liquet comment. aphorif. 49. 5. lib. à Galeno. & cap. 75. lib. 6. à Paulo, Latini secundam, & secundas nominare solent:

χυμῶν
seu secunda
quid sit.

sic quidem appellata, quod velut secundum domicilium, ac receptaculum sit ab vtero, & velut foetus indumentum, ut inquit Aëtius. cap. 24. lib. 16. Hæc secunda quoniam ex vmbilico pueri hæret, & vmbilicus postremus ex vteris exit, nanque si prior exiret, non accederet per ipsum puero nutrimentum, quoniam ex ipso dependet, Hippocr. auctore libro primo de morbis muliebribus, propterea foetu exculso foras prodire debet in naturali partu, sed quoniam contingit interdum, ut foetu in lucem edito ipsa præter naturam detineatur, quo modo huic retentioni succurrere oporteat hoc cap. institui in tendimus. Porro quod in eius detentione vterus quodammodo afficiatur, & quod eadem detenta morbus sit in numero, atque in excessu, nemini in dubium venit. Detinetur autē aut propterea quod fundo vteri adhuc connexa est, aut licet seiuncta fuerit, tamen circa aliquam vteri partem instar pilæ conuoluta est, vel propterea quod os vteri clausum sit, ita ut foras prodire non valeat. Quomodo cumque tandem ipsa detineatur, non statim, ac violenter extrahenda est, neque eius eductio paruifacienda, seu negligenda erit. Nam cum diu detinetur cerebro, cordi, ac stomacho, nocumenta haud exigua communicat prauis vaporibus ex ea eleuatis, & ad iam dictas partes traductis. Confestim itaque sternutatio excitetur, & spiritus detineatur, ac os, & nares obturentur, Hippocr. præcepto aphor. 49. 5. lib. præsertim si imbecilla mulieres non fuerint, quod si nec exciderit, sed adhuc remanserit ubi vteri os clausum non sit, si eadem secunda instar pilæ circa aliquam vteri partem constitit, sinistram manum calidam, oleoque inunctam, seu pinguedine quadam pinguefactam in vteri profundum immittere oportet, & arreptam secundam leniter extrahere, quemadmodum Aëtio, & Paulo præcatis locis visum est. Verum si vteri fundo connexa fuerit, similiter quidem manus obstetricis immittenda est, at apprehensam secundam non statim rectâ trahere conuenit propter vteri prolapsus timorem, neque violenter admodum, sed sensum primum nulla violentia adhibita in obliquum placidè ducenda erit, huc illud eam circum agens, deinde paulò valentiùs, etenim sic obediet & à connexu dissoluetur. Quod si vteri os conuiuere fuerit deprehensum, remediis ad hoc commemoratis præcedenti cap. vtendum est; & ubi vires non fuerint inualidæ, etiam quæ sternutamenta prouocant, adhibenda sunt. Quare perfusionibus pinguibus vtetur, & per sinistram manus digitos os vteri clausum leniter aperire, ac paulatim dilatare conabimur. Quod si neque sic successerit, rursus vteri perfundendi sunt, ac pingua fomenta eisdem adhibere conuenit: necnon superiorem vterem ex cruda hordeacea farina aqua calida, ac oleo subacta integrè, ex sententia Aëtij. Similiter & potionibus mentes cietibus, de quibus supra egimus, vtare. Suffusius insuper adhibeantur per aromata, qualia sunt cassia, nardus, flos iunci odorati, artemisia, sabina, dictamnium, pulegium, & huiusmodi, cui mulier insideat vndique vestimentis contexta. Postea verò si vteri osculum apertum inuentum sit, iterum manus immittenda erit, & sicut dictum est, educere conabitur. Si verò neque sic educta fuerit, eadem dilaceranda non erit, neque perturbari oportet, intra paucos enim dies putrefacta & in saniem dissoluta excidet. Quia verò hoc tempore grauitate odo-

te odoris; & caput opplet; & stomachum peruerit; suffitus convenientes excitabuntur: inter quos preu-
alent cardamomum, & ficus arida; ex Pauli testi-
monio: Ad hunc etiam usum probata sunt bdellium,
sabina, thus, styrax, lapis gagates, vnguis odoratus, la-
danum, & reliqua; quæ cum hoc quod odorata sunt
ac prædictis malis aduersantur, secundum subducunt:
quibus etiam castorei, ac pulegij, singulorum drac-
i. ex aqua mulsa bibenda detur, ex eiusdem Aetij de-
creto. Insuper & omnia conueniunt menses du-
centia, veluti artemisia decoctum, & reliqua: pelsi-
ctiam subditi ad hoc faciunt, præsertim ex myrrha;
& cyclamino, adipè anferis, saccharo, oleoque irino
confecti.

Περὶ φλεγμονῆς ὅσῃς. Id est de vteri inflammatione.
CAPVT CXVI.



ELVT & reliqua corporis partes;
ita quoque vterus interdum inflam-
matione laborat, de qua (quonia sex-
centies verba fecimus) non opus erit
hic fimbrias dilatando eadem sæpius
repetere, sed ad partis affectæ dignotionem acce-
dentes, dicimus vterum inflammatione affectum de-
prehendi ex ardenti dolore muliebrium locorum,
pubis, imi ventris, ac lumborum, vt liquet ex Aetio
cap. 83. lib. 16. Et si digitus (vt ipse inquit) in os vteri
submittatur, occurrit ad contactum durum, clausum,
feruens, ac retractus, præsertim si in ipso, aut in col-
lo fuerit inflammatio. Nam licet oris compressio
communè sit signum conceptionis, & tumoris
præter naturam, id tamen ex duritie distinguitur, vt
patet ab Hippocrate & Galeno aphorism. 51. & 54.
5. lib. molle, siquidem est grauidis; & secundum
naturam, durum verò in quibus tumor præter natu-
ram adest. At si nõ vniversus vterus, sed pars eius-
dem aliqua inflammatione fuerit obfessa, in ea ma-
gis dolor intenditur, & sentitur. Nam si posteriora
eius inflammatione laborant, dolor lumbos affligit,
ac spinam magis, & stercus recto intestino com-
presso eo retinebitur. Anteriore autem parte in-
flammatæ, dolor pubem occupabit; & stillicidium;
aut vrine difficultas (pressa vesica) excitabitur. La-
teribus verò vteri inflammationem expertis, ingui-
na tenduntur, & crura grauantur, ac ægrè mouen-
tur, & quibusdam crus ipsum, quod è regione est,
per incessum claudicat: quinetiam in coxam dolor
transit; eiusdem quoque partis dolor cum gravita-
te non nihil significare potest, Galeno teste sexto
de locis affectis, cap. 4. Et vbi cavitæ, seu fundum
vteri fuerit inflammatum, in vmbilico potissimum
dolor cum timore infestabit, vt ne contactum qui-
dem foris admittat, cum autem os vteri inflamma-
tio affligit, in abdomine dolor est, digitoque im-
misso, os occurrit durum, ac rigidum, vt diximus:
plerumque etiam vterus in eam partem declinat, ac
retrahitur, qua inflammatæ est, & ob eam causam
os, & collum eius aueritur. Comitantur autem v-
teri inflammationem, præter iam dicta, tumor, ac
dolor eiusdem haud validus, si languida fuerit in-
flammatio, vehemens verò vbi valida fuerit, erit;
que is dolor, quem percipiunt ægrotantes pullati-
lis, Paulo teste, secundum vniuersum vterum, vbi
totus fuerit inflammatæ, aut secundum partem, si
pars ipsius fuerit affecta: febris item acuta conse-
quitur, dolor capitis, tendinum, basis oculorum,
brachialis, digitorum, & colli conuulsio, inclina-

tio in aduersum, stomachi etiam ex consortio do-
lor, pulsus exigui, & crebri, ex eiusdem Pauli testi-
monio, eadem præsertim inualecente, ac auge-
cente, & vbi magis augeatur, consequuntur animi
deliquium, exolutio, singultus, pedum torpor, ge-
nium perfrigeratio, & extremarum partium exuda-
tio, vrinaque, ac stercoreum recrementa supprimun-
tur, delirant, & dentibus frendent ægrotantes, fe-
bres magis augentur, & capitis dolores, præsertim
syncipitis, vt ab Hippocrate & Galeno 6. de mor-
bis vulgaribus scriptum est. Nam cum inter omnes
corporis partes plurimas, grandissimæque venas v-
teri habeant, phlegmone vtunque ipsis orta, cali-
das, vehementesque febres accendi opus est, adeo
vt inter synochorum species connumerandæ sint,
cum ex putrido sanguine excitentur, ex quibus ca-
lentium vaporum copia ad caput subuolat, quo di-
ctorum vaporum pleno grauitates, & maxime in
syncipite hominem vexant, tum quoniam recta in
synciput per infundibulum arteriæ deducuntur, per
quas calidi illi vapores ascendunt, tum quod etiam
sanitatis tempore tenuia, & halitiosa excrementa
cerebri maxime per synciput distillari solent, cum in
ipso futuræ laxissimæ sint, caluaria subtilissima, plu-
rimisque meatibus peruiæ: adhæc & multa sensibilia
corporea per futuras euadunt, tum membranulæ, quæ
cranium inuolucrum pericranio connectunt, tum et-
iam multitudo tenuium conceptaculorum per fu-
turas exiliunt, & propterea cum sensibilibus sit locus
hic, ab inferioribus dolorum causis magis crucia-
tur. His itaque de causis in syncipite magis dolores
fiunt, ex Galeni sententia eodem sexto de morbis
vulgaribus. Inflammatione verò in abscessum trans-
eunte, dictæ quidem notæ intensiores crunt, dolo-
res etiam circa puris generationem ipsis augentur,
ac febres, quæ cum humore plerumque ad vespertam
ingruunt, ac inordinatæ accessiones ipsis obue-
niunt, primis quidem temporibus intensæ cum do-
loribus, ad vltimum; vbi suppurauerit, aliquantulum
remittunt, vt inquit Paulus cap. 65. lib. 3. Tu-
mor attollitur, dolor punctorius adest, aliquando
vrina, aliquando stercoreis recrementa supprimun-
tur, aut vtraque simul, Aetio teste, aliàs tumor in
pube eminet, & veluti exundationis sensus cum ab-
scessus maior fuerit, vt liquet ex eodem Paulo. Cum
verò neq; ipsa inflammatio soluta est, neque in ab-
scessum transmutata, adhuc perseverans in seipso
naturam permutabitur, idque percipies, nam fe-
bris, ac dolor; & reliqua leuora symptomata re-
mittuntur tumore tamen, & renitentia permanen-
tibus cum gravitate, & ægro motu non solum cru-
rum, sed totius corporis, ac segnitie ad omnes vitæ
functiones, vt liquet ex eiusdem Aetio, & Paulo.
Cæterum huius inflammationis causæ nonnullæ ef-
se poterunt externæ, simulatque internæ. Externæ
quidem velut ictus, siue percussio; multitudo coi-
tus, abortus, atq; sinistra editus fetus, durioris sellæ
infectus, longa, intentaque ambulatio: status etiam,
atque frigiditas vterum astringentes adeo vt trans-
pirationem prohibeant, inflammationis auctores
esse poterunt. Internæ verò, vt mensium suppressio,
& totius corporis plenitudo, ac eiusdem vteri exul-
ceratio, quas omnes haud magno negotio partim
ex teipso, partim etiam ex ægræ, aut adfatiū loque-
la percipere poteris. Deterior autem inflammatio ea
est, quæ plures vteri partes occupat, quàm quæ pau-
ciores, similiter quæ os, aut ceruicem fatigat, minùs

*Augecentis
in inflam-
mationis si-
gna.*

*Comment. 1.
Cur in his
dolor capiti-
is in syn-
cipite senti-
atur.*

*Loco citato.
Signa in-
dem inflam-
mationis in
abscessum
transcensum.*

*Si in seip-
sum per-
mutetur, si-
gna.*

*Externæ
causæ.*

Internæ.

*Prognosis
fica.*

periculosa existit, quàm ea, quæ fundum, seu cavitatem, quoniâ promptius curatione admittit. Si verò vtero gerenti erysipelas vtero fiat, lethale est, inquit Hippocrates, aphor. 43. quinti lib. quanquam de vera inflammatione propriè dicta dubitet Galenus. num fetus possit aliquando vivere, id quod negari haudquaquam debet eadem exigua existente, ex qua nedum maligna, verumetiam nec acuta febris gignitur necessariò, etiam si in iocinore, ventriculo, aut septo transverso orta sit, vt liquet ex Galeno secundo prorrheticorum. Ex erysipelate autem semper acuta febris generatur, & sæpenuerò maligna. In principio itaq; curationem aggressi ægram in domicilio obscuro, & moderatè tepido collocabimus: somnus moderatus præcipiatur, nam & vigiliæ etiâ conferunt in principio magis quàm somnus, prohibent enim phlegmonem augeri cum in visceribus generatur, vt patet sexto de morbis vulgaribus, & commento aphorismi primi, 2. lib. quietem quoque imperabimus, omnem crurum morum interdicens: alui excrementa si non natura, molli infuso clystere euacuabimus: immodicos animi affectus vitent. A cibo per triduum abstineant, vt inquit Paulus; deinde aut pane loto, aut pisanâ, seu eius cremore ægra alatur, aut etiam alternis diebus cuius sorbilibus vtatur. In potum verò aquam hordei aut seminum coriandrorum præparatorum decoctum, seu ipsammet aquam modicè calidam dabimus. A vino autem abstinendum est, deinde artus, seu extremas corporis partes, manuum præsertim, auersionis gratia perficabimus. At si vehementior inflammatio fuerit, & neque vires, aut ætas, aut habitus, seu anni tempus obstiterint, neque inflammatio post abortum, aut nimiam sanguinis euacuationem superuenerit, confestim circa initia cubiti vena secetur, ex Aetij, & Pauli decreto, & sanguis pro viri ratione detrahatur. Licebit autè, vt inquit Aetius, in secunda die venam incidere, in tertia verò detractionem repetere. Atqui mox obiiciet quispiam asserens Galenum aliter sentire de sectione venæ pro curatione inflammationis vteri, nã lib. de curandi ratione per venæ sectionem, postquã nonnullas partes enarrauerat, quæ ex sectione venæ cubiti iuuabatur, hæc protulit verba, sic quæ his inferiores sunt illis, quæ per poplites, & maleolos decurrunt, sunt autem dictis inferiores coxendix, vterus, vesica, & paulò post. porrò vteri inflammationes magis, quàm renes à venis in crure sectis iuuantur. Idem confirmauit 13. meth. med. cap. 11. cum dixit, Renibus verò, & vesica, pudendo, & vtero sic habetibus eas, quæ in cruribus sunt sitæ, ac potissimum quæ circa poplitè sunt, sin minus eas, quæ iuxta malleolum, ac perpetuò quidem in omnibus eam, quæ è directo est. Verum si quis prædicta loca optimè perlegerit, luce clariùs percipiet Galenum præcitatæ locis venæ sectionem præcipere pro euacuatione, indicatione sumpta à parte affecta, aut pro euacuatione cum deriuatione eius, quod in parte inflammata continetur, & nō pro auersione eius, quod influit, quod quidem in inflammatione, quæ adhuc in generatione existit, prius exequendum est per contrarias, atque longinquissimas partes, vt eodem 13. meth. med. cap. 11. ab eo decretum est. Quapropter si reuulsione duntaxat gratia venam secemus, nemini in dubium venit secandam esse cubiti venam, eamque internam, & è directo, vt Aetius, & Paulus præcipiunt. At si euacuationem simul cum deriuatione

requirimus, crurum venæ secandæ erunt. Id quod decretum reliquit idem Galenus secundo de arte curatiua, ad Glaucanem, cap. 2. his verbis, Veluti in locis muliebribus in contrarium trahes, si eas, quæ in cubito sunt secaueris venas, aut mamillis cucurbitas apposueris, vel manus concalificeris, & fricueris, atque alligaueris: deriuabis autem, si eas, quæ poplitibus, aut tali venas diuiseris, & cucurbitas coxis applicaueris, & crura calefeceris, atque perfricueris, & alligaueris: & siquidem in parte dextra locorum passio fuerit, à dextra manu, aut crure sanguinem detrahes, si verò in sinistra à membris, quæ illi è directo sunt. Circa initia itaque cum vteri inflammatione adhuc sit, magna eadem existente, viribùsque non admodum valentibus, ita vt exquisitam venæ sectionem ferre non possint, reuulsione duntaxat gratia, interna cubiti vena secanda erit, & demum si opus fuerit, quæ in tali existit incidatur pro deriuatione simul cum euacuatione. Exigua verò existente inflammatione, valentibus viribus, potissimum vbi corpus totum plenum non fuerit, & inflammatio iam facta sit, tali vena incidatur, & si opus est, eadem iteretur, rectitudinem perpetuò seruantes. Quod si Galenus fateatur magis vteri inflammationes à venis in crure sectis iuari, illud haudquaquam negandum, cum per eam venæ sectionem nedum deriuatio, sed euacuatio sanguinis in parte inflammata existentis perficiatur: secta verò in cubito vena, reuulsio duntaxat eius quod influit ad inflammatam partem fit, efficiturque confluentis sanguinis inhibitiō, quod in phlegmone generatione primò exequendum esse censet Galenus eodem 13. methodi medendi. cap. 6. quamuis eius curationi minus conferat, cum nihil ex parte inflammata detrahatur, & menstruas purgationes comprimat. A venæ sectione si eadem inflammatio erysipelate præsertim participet, vbi quodammodo mitior fuerit reddita (non autem circa initia) leni quadam purgatione vt conuenit, etiam pro deriuatione perficienda, vt calsia fistula, melle aëreo, saccharo violaceo, & reliquis huiusmodi, quibus etiam parum diacath. adicere poteris, dein imo ventri, ac pubi, & lumbis foras, irrigationes, seu epithemata ex vino & oleo, aut vino & oleo rosaceo, seu aceto & rosaceo cum linteis lineis adhibeantur tepida. Similiter palmulæ, aut mala citonia, in vino, aut in posca cocta, oleo citoniorum, aut rosaceo admixto imponantur, & vbi hæc non suffecerint, cataplasmata applicentur ex farina hordei, seminum lini, & scenugræci, vitellis ouorum affatis cum rosaceo, & decocto capitum papaueris, & meliloti, ac exiguo vino, seu aceto compositis, aut etiam ex palmulis vino diluto decoctis, cum farina hordei, & oleo rosaceo, seu cydoniorum cataplasma fiat. At si erysipelatis naturam participauerit, quod ex igneo calore percipies, intubum, & vmbilicum veneris, sedum, polygonum, portulacam, plantaginem, ac vitis pampinos cataplasmati apponito. Quod si cataplasmatum onus loci non tolerant, aqua rosacea admixta ex modicis interuallis affundatur. Hoc etiam tempore in pudendum subdatur aliquis prædictarum herbarum succus. Pessi item figurentur ex prædictarum herbarum foliis contusis, aut succis rosaceo, melino, aut lentiscino ouorum vitellis crudis, siue affatis, anseris pinguedine, & exiguo croco. Admodum tamen viles ad sedandos inflammationis dolores vteri pessi tales sunt,

Comment.
20.

Curatio.
Vt si us ra-
tio.

6. de mor-
bis vulga-
ribus, com-
mentario 4.

Comment.
17.

Vene se-
ctio.

Dubium
de vene se-
ctione. cap.
18.

Resolutio.

Si infla-
matio
supra
ne ver-
uatio.

Pessi
vires

sunt, fœnugræcum madefacito, & prima, ac secunda aqua diffusa, cum tertia pura ac dulci coquito, & excolato, ad decoctum autem, adipem anserinum, vel gallinaceum recentem addito, & ad prunas liquari finito, & vbi frige facta fuerint, concretum adipem tollito, ac seruato, & vsus tempore pessô excipito, ac subdito, vt inquit Aetius. At vbi dolor multus exerceat, lachrymæ papaueris exiguum cū lacte muliebri, & succo fœnugræci apponendum exhibeto, & per totum etiam morbi decursum, ex Pauli sententia. Etiam infusus viles sunt ex decocto fœnugræci, seminum lini, maluarum artemisiz, & olei, præcipue post principium. In iis autem, quæ calorem non sustinent, & maxime circa initia ex aqua modice calida rosaceo superfusos infusus fiant. Postquam autem inflammatio declinare incæperit, ad ea deueniendum est, quæ laxare, ac discutere possunt, proinde in fœnugræci, althææ, seminum lini, interdum etiam pulegii, marrubij, saluæ, & artemisiz decocto agra infideat, & ad imum ventrem, ac pubem, vt inquit Aetius, farinam hordeaceam cum fœnugræco, & lini semine in aqua multa coctâ imponat, aut caricarum decoctum adhibeat, ac pessi etiam subdatur, si calorem ferre possint ex æssipo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, oleo anchino, chamamelino, seu irino, & cera compositi. Cæterum, butyrum, medullam, & adipem omnia recentia ad pessos deligas, etenim antiqua dum liquantur, nidorosa fiunt, ac calidiora euadunt, & inflammationes exacut, vt liquet ex eodem Aetio. Illud item animaduertendum ex præcepto eiusdem, quod nec in distentionibus, neque in inflammationibus vteri menses prouocandi sunt, etenim loci magis distenduntur, & cum ob inflammationem conclusi sint, sanguinis transitum impediunt. Vbi verò curatio processerit, tenuis victus, & ciborum parcimonia tollatur, & manifesta iam facta declinatione, balneum, ac vinum concedi possunt, & cibi rescientes exhiberi, quemadmodum ab eodem Aetio scriptum est. Si verò inflammatio discuti non potest, sed ad suppurationem vergat, suppurationi auxilium ferendum est. Itaque inoventriæ, ac lumbis cataplasmata imponantur ex lini semine, fœnugræco, farina hordei, caricis decoctis, althææ radice, ac terebinthina: quo etiam tempore pudendi sinus per spongiam assidue foueatur, & vapores per arundinem operculo ollæ perforato insertam intra pudendum recipiantur. Denique infusiones frequenter fiant decoctis in aqua his, quæ vim attractoriam habent, velut est pulegium, marrubiū, laurus, saluia, artemisia, dictamnium, cætaurium. Item pessili indantur ex terebinthina, myrra, cæssipo, anseris pinguedine, & butyro compositi, aliquando etiam columbinum stercus cum oleo, & melle pro cataplasmate adhibebimus. Disrupto autem abcessu, quibus medicamentis vtendum sit, sequenti cap. docebimus. At si non in abcessum, ac suppurationem inflammatio transeat, sed ad duritiem vergat, emollientibus purgandum est medicamentis, tum intus, tum extra adhibitis, quorum sylum reperies cap. de scirrho, cum lenis, tum iocinoris.



NON raro etiam contingit vterum exulcerari, dignosces autem ipsum esse exulceratum, quoniam agra in affectu parte dolorem punctoriū perci-

piunt, & ex interuallis fœtidi, ac saniosi humores ab vlcere sordido prodeunt, & consequuntur etiam alia vtero affecto peculiaria symptomata, velut est capitis, ac præsertim syncipitis dolor, vt præcedenti cap. adnotauimus. Item dolor ligamentorum, & radicis oculorum, qui ad manus vsque, ac digitos se extendit, & reliqua supra de inflammatione relata, ex Aetij testimonio cap. 88. lib. 16. Quod si prompta in conspectum exulceratio venerit, specillo oriculario deprehenditur, in profundo verò reconditos humores qui excernuntur, indicant: nanque diuersus pro vlceris diuersitate excernitur humor, quoniam eo inflammato paucus, cruentus, ac fæculentus cum magno dolore euacuabitur. At si fœtidum extiterit, copiosior humor, & sanies cum minori cruciatu profluit, Depascens verò si fuerit, fœtidus, niger cum doloribus vehementibus, ac aliis inflammationis signis aderit. Præterea quæ laxant medicamenta hoc irritant, contraria leniunt. Cum autem purum fuerit vlcus, humor paucus, & qualis, crassus, candidus, minimè fœtidus excernetur, vt testatur Paulus cap. 66. libri tertij. Cæterum non vnam duntaxat habet suæ originis causam, Nā quandoque vteri exulceratio ab acris medicamentis, interim ob partus difficultatem fœtu excusso, aut corrupto ortum habet; non raro autem ex disrupto abcessu, aut fluxione erodentium succorum generationem habet, velut idem Paulus, & Aetius testantur: singulas autem iam dictas causas ex loquela, vel earundem ægotantium, vel assistentium percipies, partim etiam ex teipso, ea quæ præcesserunt, & quæ comitantur considerans. Nullum vero vteri vlcus contemnendum est, sed quamprimùm fieri potest curandum. Nam cum totius corporis recremēta excipiat, atque neruosa substantiæ sit vterus, haud facile curationem admittunt eius vlcera, præsertim cum diuturna fiunt: quāquam ex eis quæ in conspectum veniunt promptius, quā quæ in profundo sunt recondita, & quæ pura, aut etiam sordida existunt facilius, quā depascentia medicamentis cedant. Si itaque ex redundantibus vitiosis, ac erodentibus succis exulceratio vteri fuerit orta, purgantibus medicamentis prius vtendum erit præsertim cum alterati, concocti, ac præparati fuerint qui redundant humores. Et deinceps ad vlceris curationem confugiendum. Ea autem victus ratio instituitur, ac eadem exhibentur medicamenta, quæ in reliquis exulcerationibus renum potissimùm, & vesicæ à nobis fuere conscripta. Quantum verò ad topica medicamenta spectat, si purum fuerit vlcus, leuiter adstringentibus, atque exsiccantibus medicamentis vtendum erit: quod vbi conspicuum fuerit, eisdem illinatur vlcus. Si verò profundum existat, infundere ea oportet per instrumentum ad hoc appositum. Quare rosaceum, aut tetrapharmacum cum butyro recenti, ac rosaceo infundatur. Eluantur item loci rosarum, aut lentium decocto, aut ptisanæ, seu plantaginis succo: præstabit etiam portulacæ, aut poligoni decoctum cū rosaceo. Si verò cum inflammatione vlcus cōpositum sit, iis primò vtendum est, quæ ad illam præcedenti cap. cōscripsimus, & deinceps ea adhibeantur, quæ modo annotauimus. Verum vbi fœtidum fuerit vteri vlcus, detergentibus medicamentis vtendum erit, veluti est ptisanæ cremor cum melle, vel mulla, in qua fœnugræcum sit decoctum, aut malua, aut fursures, aut lentio, cui cortex sit detractus, ex Pauli testimonio.

Depascentis
ulceris
curatio.

leo rosaceo, & cera fiat unguentum, cui etiam ad-
si fi validioribus detergentibus indigebis, etiam
marrubium, aut eruum, vel melli adiuncta erui fari-
na, vel iris, aut alumen rotundum, vel aliquid simile
iniiciatur, quæ etiam extrinsecus ex mulla macerata
illinuntur, ut liquet ex eodem Paulo. Utendum est
etiam ad sordida vteri vlcera eo medicamento, quod
ex melle, terebinthina, rosaceo, & butyro conitat,
quibus aliqui etiam parum croci addunt. Ad eadem
quoque repurganda efficax est & iris illyrica cum
melle imposita, & aristolochiæ decoctum per se, vel
cum melle infusum, ut inquit Aetius. Ulcere verò
depascente robustiora, adstringentiæque medica-
menta adhibenda sunt, veluti est baccarum myrti,
palmularum, lentium, & malicorij decoctum, si in-
fundatur. Fomenta quoque & incesiones ex aqua
mulla fiant, in qua absinthium, marrubium, eruum,
cætaurium, aut lentes sint decoctæ. Locis item pti-
sæ succo eluatur addito melle, & rosaceo, ut ex eo-
dem Aetio liquet. Paulus verò præter hæc decoctum
rosarum, cupressi, summitatis oleæ, malorum coto-
neorum, rubi, lentisci fruticis, rhus coriarij ex vino
adstringente commendat, & posthæc aluminis quo-
que, acaciæ, licij, & hypocistidis, ex quibus etiam de-
coctis infellus parari poterunt, eodem auctore. Ve-
rùm ubi nedum depascentia, sed efferata quodam-
modo vlcera fuerint, equino, aut asinino lacte re-
cens multo eluantur, & in vtrisque penuria quod-
cunque haberi potest recēs coctum accipiantur: dua-
bus autem lactis heminis, mellis hemina dimidia
addenda est, & iij. iridis drac. inspergenda, & tale
infusum calidum sæpe singulis diebus infundendum
erit. Idem facit aqua mulla, in qua absinthium, aut
calamus aromaticus, aut leucanthemum, vel chamæ-
melum, seu bupthalamum decoctum sit: & ubi quod
infusum est, fuerit excretum, loci protinus malux
decocto eluantur, deinde pessus sub datur ex farinæ
erui, & iridis, singulorum drac. ij. cum melle subactis,
aut etiam farinam lentium cum melle subdes, seu o-
leæ folia cum vino trita, & thelle admixto: nec mi-
nus & vuarum passerum carnes tritas cum melle sub-
dito, ex sententia eiusdem Aetij. Vbi verò depasce-
ntia, ac efferatas fuerint cohibita, ea adhibeantur, quæ
paulo ante ad vlcera repurgata relata sunt. Cibis
quoque dādus boni succi, modicus: balneorum, ci-
borumque varietate ægrotans sollicitari, vinoque
refici debet, quod caro statim procreetur, ex Pauli
sententia: deinceps his, quæ ad cicatricem perducunt,
primò mitioribus, deinde efficacioribus utendum
est, etiam deforis adhibitis, abdomini videlicet, ac
coxis. Nam quemadmodum cataplasmatum, ita et-
tiam emplastrorum facultas per latentes meatus tra-
ducitur, ut idem inquit Paulus. Inter quæ magnope-
rè ab Aetio commendatur ceratum hoc, quod reci-
pit ceræ albæ quadrantem, rosacei optimi dodran-
tem, ad prunas liquefacito, & quadrantem refrige-
rato, deinde in mortarium conicio, ac lacte mulie-
ris, aut asinino, aut caprino recēs multo affuso cum
pistillo subigito, donec totum inalbescat, deinde
diffuso priore lacte, novum infundito, ac rursus sub-
igito, & croci circiter drach. j. admisceto. Quod si
magis mitigatorium scire volueris, rosacei septi-
cem adipis anserini, & medullæ eiusdem singulorū
unc. j. accipito. Potes etiam & pro rosaceo melinum
admiscere. Hoc etiam unguento ad hunc etiam vi-
sum vitare. Recipe tutiæ ablutæ partes ij. lichargij,
cerusæ, & sarcocollæ, singulorum partem j. cum o-

pis anseris, & croci parum admiscere poteris. Inte-
rim etiam & plumbum vltum, & pro rosaceo meli-
num, aut myrteum admisceto.

Neel *ισχιάδωρ*. Id est, De ischiade seu
coxendicum dolore.

CAP. CXVIII.

CONSEQVENS est postquam de in-
ternarum partium affectibus sermo-
nem abfoluimus, de quibusdam qui
extremas, seu externas partes occu-
pant, verba faciamus, quanquam in
eis pars, quæ afficitur (cum sensui subiciatur) haud
agrè percipi possit, præsertim si articulos obfede-
rint. Nam de his pertractare intendimus, quoniam
extremæ partes corporis articulis inter se cōferun-
tur, ut inquit Celsus cap. 22. lib. 4. per articulum in-
teligentes nos, quod à Græcis *ἀρθρον* dicitur: est au-
tem articulus Galeno auctore libro de ossibus, na-
turalis ossium compositio (veluti & naturalis eo-
rundem vnio *σύνϋψος* appellatur) tam si dearticu-
lationem, quàm si coarticulationem articulus signi-
ficet. Hæc nanque pro motus quantitate dissident,
cū dearticulatio sit ossium structura, quorum mo-
tus euident est, coarticulatio verò ossium compo-
sitio est, quæ neque validum, neque manifestum,
sed obscurum, difficilēque habet motum. Om-
nem igitur naturalem ossium structuram, compo-
sitionem, siue coherentiam articulum nūcupamus.
De quorum affectibus sermonem facturi ab eo ex-
ordiemur, qui *ισχίον* nūcupatum articulum cru-
ciare solet, à Græcis *ισχία* velut & qui eo affectu la-
borant *ισχιάδωρ* nūcupantur, barbaram sectantes
medicinam, sciaticam, & sciaticos vocant. Latine
verò etiam ischias, & qui eo affliguntur ischia dici
& nūcupari possunt, poterit etiam & coxendicum
dolor, seu morbus dici. Nam Plinius articulum hūc
coxendicum nominavit, in quo ossis femoris caput
cum coxæ dīce osse appellato, alligatur, atque dear-
ticulatur. Inditum si quidem nomen huic affectio-
ni est à parte oblesæ, ex Galeni testimonio, secundo
meth. med. cap. 2. quemadmodum etiam si pedem
articulis vitium adsit, *ποδάγρα* & si cunctis, aut plu-
rimis corporis articulis *ἀρθρίτις*, nūcupatur: sunt et-
enim tum ischias, tum podagra ex artritidis genere,
ut decimo de composit. medicamentorum secun-
dum locos, cap. 2. à Galeno scriptum est, affectis lo-
cis duntaxat differentes. Habet autem communem
hi tres affectus humoris redundantia, quæ affectam
occupat coarticulationem, quæ expleta in omnem
partem circumsitam nervosæ particulæ tenduntur,
& ex his dolor oritur, neque enim nervos, per quos
motus dispensatur volūtarius primario affectu flu-
xio infestat, quoniam artuum prius internodia ob-
sidere ea necesse est. Afficiuntur tamen iidem nervi
lege confortij, quod cum articulis ineunt, seu per
consensum, ut liquet ex Paulo cap. 78. lib. 3. quare si
ad inferiores partes facta fluxio pedum articulos
repleat, podagra vitium nūcupabitur, si cæteros
corporis artus, arthritidis, seu articularis affectio nū-
cupabitur, ut diximus. Id verò bisariam contringit.
Nam vel multi corporis articuli afficiuntur, vel sin-
guli, quādo propriè arthritidis, seu articularis affectio
nominatur. Cæterum incipit plerunque podagræ
generatio ex vno articulo, & paulatim ad genua
procedit, progrediturque in omnes malum tempo-
ris diu-

ris diuturnitate accedente, quanquam aliquando repente irruat æqualiter per omnes articulos dispersum. At quod in omnibus articulis arthritis est, hoc in uno, iuxta coxendicum ischiada, & coxendicum vitiū appellat, quod dolor est haudquaquam exiguus circa eum articulum, quem Græci *ischion* vocat, ab aliqua fluxione ortum, symptoma existens, vt cap. de dolore capitis, determinauimus, & non morbus, neque inflammatio. Nam licet fluxione ischij articulationi impleatur, propter quod, & quæ ipsis circumiacent ligamenta extendi est necessarium, non tamen verisimile est nervos, & chordas inflammari, sed solum dolere, quoniam simul cum articulatione extenduntur, argumentum est, quoniam nunquam visus est podagricus (vt Galenus inquit, commento aphor. 49. sexti libri) pati consensionem, quæ frequenter solet in nervorum, & chordarum inflammationibus aduenire. Pari quoque ratione neque in coxendicum dolore easdem partes inflammari fatendum erit, neque etiam articulum, qui primam suscipit fluxionem, nam ipse (& non spatia vacua, quæ inter prima sunt corpora) fluxionem suscipit, quanquam intentio sanationis huius affectus communis sit cum omnibus inflammatione laborantibus, vt liquet ab eodem Galeno ibidem. Verum si quis velit fluxionem hanc in articulum decumbentem inflammationem nominare, & sic fateri morbum esse, non reclamabimus. Sequitur autem dolor hic tum ad inæqualem intemperiem ipsius articulationis, & partium circumiacentium, tum etiam & precipue ad earundem extensionem, seu continui solutionem, qui dolor à natibus, in quibusque ad genua vsque, in plurimis autem ad summum vsque pedem pertinet, vt refert Paulus cap. 77. lib. 3. Acrius verò Archigenis auctoritate cap. 1. lib. 12. inquit, quod antecedit, & quasi auspiciat hoc malum, aliquando quidem vicinorum musculorum dolor, & maxime lumborum, aliquando verò ab ipsa iunctura initium fit affectionis. Iam verò quandoque contingit, vt articuli dolore ferè sublato circa poplitem afflictio hereat, aliis autem iuxta talum, quibusdam verò totum crus æqualiter dolore affligitur: multis itè circa inguina dolor figitur, quo fit vt vrinæ difficultatè inducat, & tunc maxime totum crus à coxendicibus vsque ad calcaneum dolorem perfert. Non parum autem adiuvant huius affectionis generationem assidue cruditates, immo diuici rei venereæ vsus, aliquando etiam deambulationes concitantes, hæmorrhoides suppressæ, & vomendi consuetudo intermissa, exercitiorum contemptus, & purgationes menstruæ, aut etiam aliæ familiares excretiones impeditæ, ex eiusdem Aëtij auctoritate, quæ omnia humorum redundantia efficiunt diuersam in diuersis corporibus. Et propterea quandoque irruens ad coxendicem humor sanguineus est, vt plurimum verò pituitosus, aut ex pituitoso, & bilioso mixtus, interim etiam sanguine cum ipsis permixtus, quanquam id sit commune podagræ etiam, & arthritis, vt eodem loco de Compositione medicamentorum secundum loc. à Galeno scriptum est, vt plurimum autem diuicius pituitosum humorem prædominari in hisce affectionibus, eum propriè, qui crudus appellatur, crassius existens ad similitudinem puris crassioris, & vbi in ipsis articulis diutius moram traxerit, non solum crassior, sed & viscosior redditur, & qui topi, seu calli appellatur, eorum generatio ex huiusmodi humoribus fit. Cognitio verò ipsorum humo-

rum redundantium, ex coloribus tum symptomatis coincidentibus, itemque per experientiam pharmacorum, quæ adhibentur, haberi facile poterit, vt liquet à Galeno ibidem. Ad cuius etiam humoris noxiæ cognitionem non parum conferet tibi prægressa victus ratio, siue per exercitia, siue per otium transmissa, & per balneum post & ante cibum acceptum, conferet etiam & gymnasiorum, & eduliorum tum quantitas, tum qualitas, item anni tempus, & regionis, ac aeris constitutio, insuperque & ætas, & habitus corporis, & reliqua huiusmodi, insuper & doloris species, siue feruens, & pungens, siue stupidus fuerit. Nam vbi biliosus sanguis in causa fuerit, caliditatis sensum ægroto exhibet, color corporis flauus, rufus, seu pallidus, & calfacientibus impositis exacerbatur dolor, quemadmodum rursus à frigidis relaxatur, & quæ præcessit victus ratio, ac cuncta, quæ dinumerauimus ad generandam bilem apta fuere. Pari etiam ratione si sanguineus humor, aut pituitosus redundarit, prompte percipi poterit, si cuncta, quæ supra meminimus rite considerabis. Illud tamen animaduertendum ex Galeni decreto, eodem decimo de Compositione medicamentorum secundum locos, quod vbi topi, seu calli ex humoribus crassis, ac viscidis, qui in articulis diutius moram traxerint, fuerint producti, haudquaquam sperandum est ad pristinam constitutionem exactè redire articulum posse. Ceterum, quod quibuscunque à longo coxendicum dolore molestatus cautitate sua excidit coxa, & rursus recidit, iis mucosiores superueniant, & quod eisdem crus tabescat, & claudicent si non vrantur, ab Hippocrate aphorismo quinquagesimo nono & sexagesimo sexti libri, scriptum est. Quod verò raro fiat coxendicum dolor ex sanguinis multitudine, & si fiat, citissime curetur, à Galeno decretum est, eodem decimo de Compositione medicamentorum secundum loc. quod autem coxarum ingens dolor esse consuevit, sique hominem sæpe debilitat, & quosdam non dimittit, eodem loco à Celso scriptum est. Pro ischiadis itaque curatione aer eligatur ad sicum vergens, in calido, & frigido temperatus, vel parum etiam ad calidum declinans, pro diuersitate redundantis succi, somno moderato vrantur, aut consueto parciore. Circa initia corpore non euacuato quies eligatur, temporis autem processu deambulationibus, assiduis flexibus, & moderato cursu vti conuenit. Alium autem quotidie probè solutam habere præstat, si non natura, arte saltè premuntur eteum, & aggrauantur articuli coxendicum maxime vbi ipsa sit adstricta. Vitanda Venus est, & ab animi affectibus immodicis cauendi sunt. Cibus sit mediocriter tenuis, modicus, ac concoctu facilis, haudquaquam humidior, potissimum in primis morbi debus, deinceps verò solidior sit, & reparandis viribus magis accommodatus, habeatque interim acrium eduliorum comestiones quasdam adiunctas, quorum sylvam sæpe conscripimus. Perpetuè tamen bonæ coctioni consulendum, ita vt cibi nihil viscosum, aut crassi succi, aut ægrè concoctile, seu quod difficulter digeratur, in seipsis complectantur, & si caro exhibeatur, sit paucarum superfluitatum, vt montanarum acium, & syluestrium quadrupedum. Potus sit aqua multa, aut aqua in qua cinnamomi parum fuerit decoctum, à vino penitus abstineant, affectus ratione. Quod ad medicamentorum autem rationem attingit, iurium curationis fiat ab assilgentis humoris euacuatione,

Prognostica.
Cap. citato

Loco citato

Curatio.

Ratio visus.

Medicamentorum ratio

*Vena se-
ctio signi-
ficante.*

*Que vena
secunda sit.
cap. 18.*

*Lib. de cu-
ran. rat. per
venae sectio-
nem.
cap. 18.*

Purgatio.

si humoribus ex æquo redundarit corpus, venæ sectio primū omnium assumatur, deinde purgatio, quibus accedat pharmacorum dicendorum conueniens (& tēpore, & ordine) vsus, ut præcitatatis locis liquet à Galenō, & Aëtio. Verū quam à sanguinis multitudine coxendicum dolorem obortum venæ sectio euret, ex qua tamen vena sanguis minuendus sit, in dubium venit. Nam libro de Curandi ratione per venæ sectio, Galenus coxendicum iuari secta vena poplitis, aut malleolorum confessus est, & eodem libro dicebat. memini me ischiadas, siue coxendicum dolorem vno die, facta ex crure euacuatione curasse, huiusmodi vbi non ex frigore, sed impletis sanguine, quæ in coxa sunt venis, prouenissent, quare secta in poplite vena commodior ita affectis est, quam in malleolo. Idem confirmavit decimo de Compositione medicamento- rum secundum loc. cap. secundo, quamquam eodem libro post pauca scripserit, Tanquam igitur maximam vim ad affectionis curationem habeat totius corporis euacuatio, ab ipsa exordium est, non solum à cruribus, sed etiam à cubito primum sanguinis detractione facta. Hanc sententiam sectatus Aëtius, hunc in modum scriptum reliquit, A multitudine itaque sanguinis coxendicum dolorem obortum venæ sectio curat, si primum cubiti venam secemus, deinde etiam eam quæ iuxta talos est, aut poplitem, & causam reddens, statim subdit, In principio enim omnium inflammationum diuisoriam venæ sectionem facere oportet. In affectionibus verò iam inueteratis maximè quidem ex ipsis locis affectis extrahemus, aut si id fieri non possit, ex vicinis: quamquam hæc eadem verba à Galenō transcripserit, libro de Curandi ratione per venæ sectio, cap. decimonono. Et propterea Paulus id etiam perpendens eodem cap. septuagesimo septimo tertij libri. per initia igitur dicebat agro nobis oblato, facibus clystere euacuatis, vena in cubito secanda, si autem vetustas vitium occupauerit ex malleolo partis affecta immutationem sanguinis molimur. Facta itaque ex crure venæ sectione, inueteratas quidem ischiadas, seu coxendicum dolores, robustisque corporibus, quibus non multa admodum sanguinis copia redundabat in toto corpore, sed impletis sanguine, quæ in coxa sunt, venis duntaxat, vno die curauit Galenus. Quare & nos eundem sectantes easdem venas incidere debemus, vbi dolor fuerit inueteratus quodammodo, & vires ferant sanguinis missionem copiosam, & corpus totum haudquaquam fuerit multo sanguine refertum, sed quæ in coxa sunt venæ sanguine impleta fuerint. Nam per hanc venæ sectionem fit euacuatio sanguinis in venis coxendicum contenti cum deriuatione: quod fit ut necessariò citissimè per eam coxendicum dolor curetur. Verū in recenti dolore, viribus haudquaquam robustis, adeo ut exquisitam venæ sectionem ferre non possint, refertumque sit totum corpus multo sanguine, in cubito primum vena secanda erit, reuulsionis duntaxat gratia, & deinceps à crurum venis sanguis mittendus, iuxta Galeni sententiam, eodem decimo de Compositione medicamentorum secundum locos, cap. secundo, quam sententiam omnino sectatus est Aëtius, & Paulus quodammodo, ut diximus. Supposuit etenim Galenus hoc loco vniuersum corpus humoribus ex æquo redundare, quemadmodum etiam & Aëtius. Missio sanguine, vbi adhuc dolor perseverauerit purgatio-

ne vtare, ex eiusdem Gale. auctoritate. Verū (ut ipse inquit) auxiliantur ipsis ischiadicis vomitus magis, quam euacuationes infernæ per ventrem, ut qui reuellant deorsum repentem humorem. Faciendi itaque sunt vomitus in principio ab accepto cibo, postea verò etiam per vomitoria medicamenta initio à mediocribus facto. At si neque per vomitum coxendicum dolor auferatur, aut corpora ad eum inepta fuerint, amplius non confluentibus humoribus, aut parum, purgatione per inferiorem ventrem uti non inconuenit, præsertim si cum sanguine biliosus etiam succus redundarit, neque id negauit Galenus, quamquam vomitum tanquam magis commodum commendauit, propterea quod reuellat. Fiat autem ea per familiaria medicamenta purgantia, veluti est hiera, agaricum, diacath. syrup. ex pluribus infusionibus rosarum, myrobalani, & reliqua huiusmodi. Conferat quoque hoc tempore clysteribus uti paulò efficacioribus, fiat decoctum ex folijs maluarum, betæ, mercurialis ana manip. j. fursuris, & florum chamæmeli ana pugil. s. caricarum numer. vj. salis communis drach. ij. cui adiciantur olei communis, anethini, vel chamæmeli, vnc. iij. mellis rosacei, seu mellis despumati vnc. ij. s. diacath. & hieræ picræ simplicis ana vnc. s. fiat clyster, interim drach. j. vel scrup. iij. agarici etiam permiscebis. deinceps ad topica medicamenta confugiendum est, id primò animaduertens, quod licet manibus, & pedibus pharmacis fluxionem repellentibus uti possimus, ut sequenti cap. docebimus, circa coxendicum tamen iuncturam id facere omnino vitandū est, nam cum in profundo ea sita sit, sanguis ex vicinis, & ambientibus vasis, ac musculis ad illam compellitur, ut liquet ex eodem Gale. citato libro 10. de compositione medic. secundum locos. Item ex præcepto eiusdem eodem loco, euacuum est, ne quispiam ante totius corporis euacuationem (præsertim si coxendicum dolor ex humorum copia fuerit exortus) acerbis pharmacis circa partem affectam vtatur, nam agere curabilem reddet affectionem copia nimirum indissolubili ibidem condensata, præter alia enim & crassa, & viscosa sit ob calorem, & siccitatem acerbiorum pharmacorum, non dissimile quidpiam affectioni perpetiens, quare mitigatoriis in principio medicamentis opus est in dolore circa coxendicum hærente, quæ neque refrigeret multum, neque fortiter calfaciant, qualibus sanè postea opus habet: exacerbantur enim per ipsam fluxiones, caliditate nimirum plus attrahente ipsas, quam impediende (eodem Gale. teste ibidem.) Irrigandi itaque loci sunt ex oleo chamæmelino, anethino, liliaceo, irino, seu etiam nardino, & rutaceo, vel rutam, chamæpityn, saluiam, chamæmeli flores, ac althææ folia, ac radices decoque in oleo communi, demum exiguo adiecto vino, vel aceto albo cum spongis, seu lineis, vel laneis linteis sapius loci foueantur, & deinde aliquo prædictorum oleorum irrigentur, aut ex cōtulis folijs, & radicibus althææ, sambuci, ac rutæ, farina fenugræci, & seminis lini, adipe anserino, ac butyro, & oleo chamæmelino, seu anethino cum posca cataplasma fiat, & adhibeatur. Poterunt quoque foci fieri ex decocto foliorum, & fructuum iuniperi, radicum althææ, meliloti, & chamæmeli in vino albo, quibus sapius iteratis loci abstergantur, & aliquo dictorum oleorum, seu aliquibus simul mixtis iidem irrigentur, perpetuò tamen primum mitioribus, & demum efficacioribus vtare. Sacculi

Sacculi item ex fricto milio, sale, & fursure, præter id, quod dolorem mitigant, leuiter doloris causam discutiunt calfacti in calido latere, paucio vino irrorato, & sæpius adhibiti, & ubi vehemens fuerit dolor, papaueris calyces in aqua mulla decoquito, ipsique proiectis farinam hordeaceam aqua mulla imponito, ac coquito. Si autem coxædicus dolor ex irruente pituitoso humore generetur (velut plurimum contingit) aut ex eodem cum bilioso permixto, circa initia quoque reuulsionis gratia in cubito secta vena confert, seruata rectitudine, potissimum si cum eo etiam sanguis fuerit permixtus. Procedente verò tempore, vel ubi idè pituitosus humor crassior, ac viscosior fuerit citra sanguinis misionem, per vomitum purgatione prius vtare, nedum ab accepto cibo, verum etiam per vomitoria sumpta medicamenta à mediocribus semper initio facta, veluti est acetū, syrup. acetosus, postea oxymel simplex, aut scillinum cum aqua tepida. At quibus infusus, ac valde molestus vomitus fuerit, aut etiam ubi vomitus non suffecerit, purgantia per inferiorem ventrem medicamenta exhibenda sunt, primò tamen per clysteres, & deinceps per ea quæ per os exhibentur; fiant autem clysteres hoc modo, Recipe foliorum maluarum, mercurialis, & betæ ana manipulum j. centaurij minoris, florum chamæmeli, singul. manipul. s. caricarum nume. 6. fursuris pugillum j. s. fiat decoctum cum paucio sale communi, cui adde olei communis, vel chamæmelini, anethini, rutacei, liliacei, aut irini vnc. iij. mellis rosacei, aut mellis despumati vnc. ij. s. confectionis de dactylis, hieræ picræ simplicis, aut diacathol. drac. 4. fiat clyster, & si efficaciori indigebis, chamæpityn, rutam, centaurium maius, saluam; ac stæchadem in decocto adice, & demum agaricum, hieram picram compositam, compositionem indi, ac quam benedictam appellant, permisceto: sunt qui etiam efficacioribus clysteribus vtuntur: potissimum ubi vehementer humores densati fuerint, decocto vtentes lupinorum amarorum, colocynthidis, radicis cucumeris syluestris, salforum piscium, & oliuarum colymbadum muria, & reliquis huiusmodi, à quibus abstinendum esse quoad fieri potest conferem, nobilioribus præsertim corporibus: consuuerunt enim maximo cum dolore periculofam dysenteriam efficere, sed potius, ac tutius purgantia per os assumenda medicamenta præbeantur, prius tamen humoribus ipsis concoctis, ac præparatis ex melle rosaceo seu oxymelite simplici, vel scyllino syr. è stæcade, & reliquis huiusmodi. Commendantur etenim purgantia medicamenta ad hunc vsum à Paulo, & Aetio. Paretur autem medicamentum purgans hunc in modum, Recipe corticum myrobalanorum chebularum drac. 2. polypodii, & agarici singul. drag. 1. fiat arte decoctum, cui per colum trāsūso, adde electuarii rosati, aut confectionis de dactylis drac. 2. s. vel 3. syr. ex pluribus infusionibus rosarum vnc. 2. fiat potio. Et ubi crassior, ac tenacior fuerit redundans humor pituitosus, cataportis vtare foetidis, aut de sagapeno, eorundem accipiens drac. 1. cum altera trochiscati agarici, & cum melle rosaceo, aut oxymelite cataportia formentur, seu pulueris hieræ simplicis drac. 1. & scrup. 4. agarici trochiscati excipe oxymelite & similiter cataportia formato, à quorum assumptione per aliquod tempus decoctum drach. 3. seu 4. myrobalanorum chebularum in quo vnc. 2. vel vnc. 3. syrup. ex pluribus infusionibus rosarū

beaurum fuerint dissoluta, assumant; & ubi opus fuerit tam vomitus, quam ea, quæ hic conscripsimus, medicamenta purgantia, ac clysteres bis, ac ter, & sæpius iterari poterūt. Deinceps verò irrigadi sunt affecti loci oleo rutaceo, costino, nardino, vulpino, de castoreo, ac etiam de piperibus, & pyrethro, ubi adeo efficacioribus indigebis, & vt penitus eorum facultas traducatur, aceti, seu vini albi parum permisceto. Vel hoc vnguento vtare, quod recipit cremoris seminum maluarum, & althææ, cuiuslibet drac. 3. farinæ scænuigræci, seminis lini, vtriusq; vnc. s. adipis anseris, & suilli, singul. drac. 4. olei rutacei, & chamæmelini ana vnc. 1. s. ceræ, & aceti parum, fiat vnguentum. Vel scænuigræcum in vas fictile coniecit, & ad ipsum poscam sufficientem affundito, & prunis impositum donec dissoluatur, coquito, ad dissolutum verò mellis, quod satis est iniice, ac rursum coque, deinde exempta diligenter tere, & in linteolum infarcta locis affectis impone, hoc autem fiat ad biduum, & triduum. Symphyti quoque lib. 1. s. rasam, & minutim concisam, ac in mortarium coniectam diligenter terito, ac attritam mannæ thuris quadrantem, & ouorum recentium crudorum candida vnà cum luteis trita adiecit, & rursum terito, & ubi vnita fuerint adipis suilli veteris lib. 1. adiecit, & conuassata diligenter, atque in linteolum infarcta imponito, ex Galeni sententia, Aesclepiadis auctoritate, eodem to. de compos. medicament. secundum locos, cap. 2. qui etiam ex Andromachi monumentis hoc medicamentum commendauit, quod recipit picis partes 2. sulphuris viui partem 1. vtraque trita mixta dolenti loco imponito, & sinere eum oportet donec sua sponte dilabatur, poterit quoque picis pars vna recipi, modo sciamus efficacius esse medicamentum, si pari mensura misceantur, debilius verò, in quo duplum picis ad simplum sulphuris coniicitur. Valebis etiam cataplasma componere ex foliis althææ, saluæ, rutæ, ac sambuci leuiter decoctis, ac contusis, sing. P. s. capiens, quibus olei irini, de castoreo, ac anethini ana vnc. 1. adieciatur, cremoris seminis lini, & scænuigræci ana vnc. 2. farinæ liliaceæ, & lupinorum, cuiuslibet vnc. 1. & cum posca quantum satis sit, fiat cataplasma, quibus vt efficacius reddatur, adieci poterunt ebulli radix, lauri folia, pulegium, sauiua, oleum de piperibus, de castoreo, costinum, aut nardinum, galbani quoque, aut ammoniaci parum. Vel in formam emplastri, redigito in hunc modum, Recipe succi foliorum rutæ, sambuci, & calaminthæ ana vnc. 1. b. dellij, opopanacis, ammoniaci dissoluti in aceto, cuiuslibet vnc. s. mirrhæ, & resinæ terebinthinæ ana drach. 4. cremoris seminis althææ, seminis lini, & scænuigræci ana vnc. 1. s. farinæ hordei, fabarum, & lupinorum ana drac. 7. picis, & ceræ quantum satis sit, fiat emplastrum. Poterunt insuper ex eisdem fomenta parari, vt, Recipe radicum, & foliorum ebulli, & althææ manip. 1. foliorum rutæ, sauiuæ, sambuci, & pulegij, singul. manip. s. florum chamæmeli, scænuigræci, & meliloti, cuiuslibet pugil. 1. s. decoquantur arte in tribus partibus olei, & vna vini albi, & cum spongia in eodem decocto madefacta dolentibus locis iterum, atque iterum applicetur, post quæ iidem loci aliquo ex iam dictis vnguento irrigentur. Paulus verò lupinorum amarorum farinam cum oxymelite, aut calaminthæ folia ex oxymelite, vel aqua mulla admouenda commendat. At si ne hæc quidem profecerint, adeo vt morbus infestare desierit, con-

Tonica.

Vnguenta.

Cataplasma.

Emplastrum.

Fomenta.

Sinapismus, ac alia vnguenta medicamenta.

gruum erit ad sinapismos, atque vrentium medicamentorum vsum deuenire, & ex Pauli sententia sinapi cum caricis, vel etiam per se illitum confert. Vel hunc in modum sinapismum conficito: Recipe seminis sinapis in aceto fortissimo macerati vnc. 2. caricarum vnc. 4. stercoris columbini in vino albo decocti vnc. 3. mellis anacardini vnc. 1. misceantur, & fiat sinapismus, vel accipe cantharidum aliis subiectis drac. 2. staphidis agræ drac. 3. cum fermento, & aceto fiat medicamentum, & vtare. Postremo autem tam Paulus, quam Aëtius iberidis herbæ vsum

Paul. libro
3. cap. 77.
Aëtius lib.
12. cap. 2.
Iberidis v-
sus.

extollunt, tanquā in totum ischiadicis sanitati restituentem, cuius radicem assumptā diligenter tundito, & suilla axungia veteri modica excipito, adeo vt emplastri speciem repræsentet, & exinde linteo- lo densiori illitum locis maximè dolentibus imponatur, ac incumbere finito, mulieribus quidem non infra duas horas, viris autem per quatuor horarum spatium, si possibile sit id perficere, excitat enim tumores cum ardore, & rubore, veluti sinapismus facere solet, post verò ægrum in balneum inducito, atque reliqua exequaris prout iidem præcipiunt. Nanque consuevit hoc præsidium nullo alio auxilio opus habere. Quod si tamen aliquando vestigium affectionis relinquatur, viginti diebus interpositis, rursus eodem præsidio vtare. ex Democratis tamen auctoritate Gale. huius iberidis vsum, ac modum vsum, eodem 10. de composit. medicament. secundum locos, cap. 2. ante Aëtium, & Paulum scriptum reliquit, nec tacuit ea, quæ Archigenes 2. lib. pharmacorum secundum genera, de ea conscripsit. Porro si igne sub genu externa in parte inusio fiat, diuturnis coxendicium doloribus valde confertur.

Cauterium
cum igne.

Περὶ τοῦ ἀρθρακ, καὶ ἀρθριτικῆς. Id est, De podagra & arthritide, seu morbo articulari.

CAP. CXIX.

Voniam podagra non toto genere (vt dictum est) sed affectis duntaxat locis differt ab arthritide, nanque in ambobus affectibus imbecillitas adest articularum diuturna cum fluxione, vt Aëtio vsum est cap. 6. lib. 12. eundemque requirunt curationis modum, propterea vno capite de ambabus affectionibus pertractare proposuimus. Cæterum vterque affectus ab oblata parte denominatus est, vt liquet ex Galeno 2. methodi meden. cap. 2. Nam si ad inferiores partes facta fuerit fluxio, & pedum articulos repleuerit, podagra vitium nuncupabitur: si verò in multis corporis articulis innititur, aut per omnes æqualiter articulos fluxio dispergatur ἀρθριτικῆ. Græci, nos articulare morbum appellare consueuimus, ex eiusdem Aëtij testimonio: neque enim quemlibet articularum difficilem motum, seu dolorem arthritida, seu articulare morbum modò nominamus, sed eum duntaxat, qui ex eorundem articularum imbecillitate, ac humorum influxu ortum habet, cum autem excitatus fuerit articularum dolor ex aliqua immodica intemperantia, potissimum sicca, vt liquet ab Hippocrate aphorismo 16. libri tertij, affectum hunc haudquaquam arthritida nuncupabimus, nisi improprie, eodem Galeno teste, commento citati aphorismi.

Loco cita-
to.

Quæ neces-
sario requi-
rantur, pro
arthritida.



Cap. præce-
denti.
Podagra
& arthriti-
dis conueni-
tia, & dif-
ferentia.

ischiade humoris redundantiā, quæ affectam occupat articulationem, quemadmodum ex eodem Galeno liquet commento aphorism. 28. sexti libri, & 10. de compositione medicamento. secundum locos, cap. 2. quare si podagra fieri nequit ex imbecillitate articularum sola, sed humorum influxum etiam requirit, neque etiam & articularis morbus. Non sola itaque particularum corporis imbecillitas articularios, podagricosque eruciat excitat, sic etenim accessiones sine vilo temporis intervallo vrgerent, cum natua imbecillitas cōtinuò existeret: atqui datur podagricis tempus accessionum intermedium. Item ne humor quidē solus hos dolores creat, quandoquidem non solum vitium hoc articulis insidet, verum ambo, & humor à natura alienus, & particularum imbecillitas morbum affecerunt articulare, ac podagram, Paulo teste cap. 78. libri tertij, id quod decretum erat à Galeno citato commento aphorism. 28. sexti libri. Liqueat igitur ex his podagram nihil aliud esse, quàm articularum pedum dolorem à fluxione quapiam ortum. Articularis morbus nonnullorum articularum, aut omnium æqualiter dolor existit ab eadem etiam fluxione ortus. Denique excipiantur dolores ij, qui in quibusvis articulis fuerint orti citra fluxionem, nam neque podagra, si pedum articuli fuerint affecti, neque articularis morbus, si ceteri totius corporis articuli fuerint oblasi, proprie appellari poterunt, vt supra demonstrauimus, neque etiam generari poterunt, si humor quispiam non influxerit, ex sententia eiusdem Galeni citato commento aphorismi 28. sexti lib. Quapropter neq; de eis verba faciemus. Hos affectus si tanquam dolores considerabis, symptomata esse haudquaquam formidabis, veluti & reliquos dolores omnes. At si fluxionem inspicias, ob quam articulationes implentur, ac ea, quæ ipsis circuniacent, extenduntur, hos affectus morbos appellare non inconuenit, inflammationes inquam, quemadmodum Hippocrates nominauit, aphorism. 49. sexti libri, licet improprie, & non verè articularum dolores, quicumque fuerint etiam ex fluxione orti, inflammationes appellari possint, vt cuiuslibet (quem non præterit inflammationis generationis modus, & qui Galeni verba commento citati aphorism. 49. 6. lib. optimè perlegerit) patere potest. At quicquid sit de horum affectuum qualitate, postea quàm gigni non possunt, nisi articularum imbecillitas adsit, & humores superabundauerint, ac ad eos defluerint, decens est annuere, ac fateri cuncta, quæ imbecillos reddere articulos valent, ac superfluitates in corpore generare, esse tum podagræ, tum articularis morbi causas. Sūt autem hæc aut extrinsecus occurrentes, aut internæ. Euidentes quidem, externæ, seu manifestæ, vt nimium ocium, seu desidiosa vita, multorum alimenterum esus, seu crapulæ, porus multorum, ac fortium vinorum, præcipue cum aliquis ea ieiunus potauerit, & in summa cruditates, atque ebrietates, ac venteris vsum immoderatus. Incidunt autem & plerique in eisdem affectus, propterea quòd patres, & auos habuere podagricos, aut arthriticos, in quibus semen erat vitiatum, atque ideo posteris vehementiorem fecerunt partium imbecillitatem, vt eodem comment. aphorism. 28. 6. lib. à Galen. scriptum est: excernitur nanque, Hippoc. auctore, lib. de aëre, regione, & aquis, semen genitale ab omnibus corporis membris, à sanis quidem sanum, & à morbidis morbo-

morbosum; magnam tamen vim habet ad podagræ generationem visus venerorum, vt ex eodem Gale. liquet comment. aphor. 30. eiusdem 6. lib. Caterum hæc vitia (vt inquit Paulus) frequenter antecedit improbus labor, vehemens ambulatio, creber equitatus, intempestiuus visus veneris, insueta frigida potio, frigidorum, vel multorum, ac noxiarum ciborum usus, morores, curæ, vigilie, & reliquæ animi affectiones: iam aliqui (vt ipse facetur) prolapsu, deturbatione, vel propulsi, luxatione, vel id genus aliis originem huius affectionis traxerunt. Acrius deambulationes concitatiores quam pro more & familiaris excretionis suppressas, ac consuetorum exercitiorum intermissiones inter vniuersales causas harum affectionum connumeravit, licet suppressæ confusæ excretionis inter internas causas dinumerentur, redduntq; corpus superfluitatibus plenum. Interna autem causa esse potest quævis humoris redundantia, quoniam & hoc sæpius diximus commune existit cuius articulorum dolori. At externas, euidentesque causas ex agrotationum, aut absidentium sermone facile percipies. Internæ verò ex earundem propriis indicibus facile deprehenduntur, nam affligentium humorum differentia: tum ex coloribus, tum symptomatis coincidentibus, itemque per experientiam pharvacorum, quæ adhibentur, deprehendi poterunt: ad quarum etiam exactam cognitionem non parum conseruit, si pregressa victus ratio intelligatur, & reliqua quæ præcedenti cap. adnotauimus. Ad vberiore verò doctrinam hinc quoque particulariter conscribemus signa cuiuslibet redundantis humoris podagram, seu articuli morbum efficientis. Nam si sanguineus humor redundet, plenitudinem efficit, & tumorem ingentem non venarum modo, sed totius membri affecti circa cutem, cumque ealidum quidem moderatè, sed vehementer rubentem, pulsusque adest in alto inflammationis mediocri, qui hoc modo affecti sunt neque refrigerantia, neque calactoria valde præsidia adhiberi sustinent, & assidue, ac continue exacerbantur, quanquam & per circuitum quidam irritatione vexentur, vrine verò eorum fuluæ sunt, & mediocri crassitudine præditæ: aliquando etiam subsidentiam albam, aut nubem, aut tale quiddam in medio pendens quasi suspensum habentes: ætas ad multi sanguinis generationem apta magis est, ab adolescentia vsque ad ætatem vigoris: edulia item boni succi, & quæ maximè alunt, ac exercitia moderata præcesserunt, tempus verò anni ver, & regio temperata. Biliolam verò fluxionem, color cutis inflammatis loci subpallidus, & subrubeus testatur, item caloris sensus, dolorisque lancinantis modo acris gaudet verò caliditas hæc, quæ vehementissima & feruentissima est, amplius refrigerantibus pharvacis, qui enim illa habent, vehementer à refrigerantibus inuuantur medicamentis siue acti, siue potientia talia existant, læduntur autem à calidis, humor in euentu subito sine euidenti tumore erumpet, exacerbatione his mouentur per tertium quæque diem, subinde febris in ipso accessionum statu accedit, ac valida sitis, eorum lora sublaua erunt, & subfulua, quandoque etiam acria: curæ item ingentes, iræ, vigilie, fatigationes, & vt summatim dicam, vniuersa victus ratio bilem gignens, & attenuatoria ex acibus, & falsis edulis huius humoris influxum præcessit: ætas verò, & corporis temperies calida & sicca, anni tempus æstiuum,

itemque consimilis regio. At si pituitosa fuerit fluxio, color exalbidus, & aquæ subter cutem similis apparebit, ac ad digitorum appressionem cauis fiet tumor subluxus exiens, & moderatus: dolores autem aliquando quidem fortes, aliquando mediocres, & exacerbationes quotidie paulatim irruunt, & augentur, & per plures horas durant, & breuiem intercapedinem habent, imò neque vnquam integre remittunt, tardius etiam in tumorem materia sese attollit, aderitque ætas senilis, temperamentum frigidum, & humidum, similis ambientis non aëris status, & tempus hybernum, aliquando etiam & frigoris sensum in alto locorum affectorum ægri perceptant, vita præcelsa ociosa, ac seors: hæc nanque plurimum conferunt ad pituitosi humoris generationem, edulia etiam refrigerantis, humectantis, ac inspissantis facultatis: & balnea à cibo, vrinæ crassissimæ ab eis prodeunt, & sæpe conturbata reperiuntur. At si falsa fuerit pituita, color, & tumor affecti membri eodem modo se habent, pruritibus autem maximis, & mordacitas locos infestabit: vrinæ verò tum his, tum prædictis aliquando quidem tenues, & aquosæ, aliquando verò crassum in eis est quod subsidet, suntque conturbata, vt diximus. Quod si ex atra bile fit fluxus (quanquam raro id contingat) colore tumorum nigriores erunt frigoris sensus quandoque affectus aderit, & corpora in profundo velut arderantur, aut scalpantur, asticiuntur, circuitus exacerbationum per quartum quæque diem redeunt, suntque ex tum magnitudine, tum impetu mediocres: ætas verò, quæ magis hunc fluxum generat, est vigore inclinato, & vergente, temperies frigida, & sicca, quæ quidem superfluitates natura etiam pituitosas generat. Præcedit hunc fluxum ratio victus ex edulis bilem atram gignentibus, & lassitudines immodicæ, regio frigida, & sicca, tempus autumnii, & consimilis aëris status, vrinæ vt plurimum in principio eis tenues sunt, & aquosæ, post ea verò, quam secundum naturam, atiores, & modicè crassæ, & quod subsidet in eis aliquando fuscum, aliquando verò mixtum, suberuentum videlicet, & fuscum reperiuntur, vt liquet ex Aetio, & Paulo. Interdum autem ex prædictorum humorum complexu flores fiunt, nam fluxus fluxui commiscetur, vt calidus frigidus, aut frigidus calidus, & secundum eorundem qualitatem tum dolores, tum colores, ac calores & exacerbationes erunt permixti. Verum, vbi sic vitium hoc contrahatur æge dignosci, & difficultè medicamentis elidi potest, vel etiam pene nullo remedio sanescit, vt inquit Paulus, & de hac re podagricus morbus molestus, tristis quoque de se opinionem acquisiuit (nempe, quod nequaquam arte medica vnquam curari possit) propter generationis, inquam varietatem, propter quam neque internosci probè, neque absolutam curationem consequi potuit. Verum si hæc differentia, seu species ipsius quot, & quales existant, internoscantur, faciles curati medicis erunt. Tralliano auctore cap. primo libro. ii. quanquam vbi topi, seu calli appellati fuerint producti, ne speraueris ad pristinam constitutionem exactè articulum redire posse, ex Galeni sententia 10. de compositione medicamentorum secundum locos, cap. 2. Hippocr. eunuchos podagra non laborare, neque mulieres nisi menses defecerint, neque pueros ante veneris congressum, 6. aph. scriptum reliquit apho. 28. 29. & 30. & eodem lib. aph. 49. Quibusunque morbi po-

Signa pituitose fluxionis

Si ex atra bile fit fluxio

Act. c. 14. & 15. 16. & 17. Pau. lib. 3. cap. 78. Prognostica. Loco citato.

dagrici fiunt (dicebat) si sedata in quadraginta diebus inflammatione, finiunt, modo (vt inquit Gale. in com.) medicus in suo opere non aberrauerit, & æger illi in omnibus obedierit, & apho. 55. sic scriptum ab eo est. Dolores podagrici verè, & autumno magna ex parte mouètur. Quoniam verò præcipua causæ tam podagræ, quam articularis morbi sunt (vt prius dictum est ex Gal. sententia) & articularum imbecillitas, & redundantium humorum copia, propterea duplex etiam sanationis scopus nobis præfigitur, euacuatio inquam redundantis humoris, & corroboratio debilitarum partium. Verum quoniam tam euacuatio redundantis succi, quam partium imbecillium roboratio varia exiit pro ratione diuersi humoris redundantis, ea de re nos particulatim eadem conscribamus, ab eius podagræ, seu articularis morbi curatione exordientes, quæ ob sanguinis copiam ortum ducit. Eligatur igitur aer ad siccum vergens, ac etiam parum ad frigidum, seu in caliditate temperatum, somno, & vigilia vtantur moderatis, vitentque somnos longiores, alium eos oportet facile solubilem habere, & si sua sponte talis non sit, lenibus clysteribus vtantur, fluxione incipiente, ac vigente quiescant. Cum verò inclinauerit, & reliquis temporibus exercitiis vtendum est plusquam mediocribus: mœiores, & curas, ac reliquas immoderatas animi perturbationes vitent, cibos modicos, ac parum nutrientes, & leuiter quoque infrigidantes adhibere oportet: abstineant autem ab his, qui multum nutriunt, ac copiosum sanguinem gignunt, eumque magis adaugent. Quapropter a carne prorsus abstinere oportet, aut si id fieri nō possit, propter virium imbecillitatem, volucrum, potissimum montanarum caro exhibeatur: vinum etiam penitus circumscribendum est, nisi corporum intemperantia, aut consuetudo illud requirat, quo etiam vsu moderatiore vtantur. Nam multos noui (vt inquit Alex.) ex iis, qui cum vino tantum abstinerent, nō amplius morbos fuisse expertos, copiosum namque vinum multo sanguine præditis inimicum est, in vicem vini aqua vtendum, in qua præparatorum coriandrorum semina fuerint decocta, aut etiam cinnamomi parum. A venere abstinendum, præsertim immoderata, nam venus omnes podagricos extremè lædit, & præsertim si assidue, & intempestiue ea vtatur, Aëtio teste cap. 20. lib. 12. quinimo nedum si quis venereis vtatur immoderatis incidet in podagram, sed crapula etiam, eruditates, ac ebrietates, desidiosæque vita cuiuslibet podagræ auctores sunt, & morbi etiam articularis, vt liquet ex Gal. com. citati apho. 28. 6. lib. Quæ de re ab eisdem cauendum erit, & bonæ coctioni, ac sobrietati vacandum, & mediocri exercitio. Vti oportet eum qui à podagra, ac morbo articulari cupit esse immunis. Nanque salubris victus caput est (vt inquit Hip. 6. de morb. vul.) non satiari cibis, & impigrum esse ad labores. Cæterum in quibus sanguineus humor redundat, necessarii protinus sanguis mitti debet vbi quidem nihil prohibeat, Pauli, Aëtij, ac Alexand. sententia. Verum statim cum quis morbum experiri cœperit, sanguinis missio erit tentanda, id enim inter initia statim factum sæpe annuum, nonnunquam perpetuam valetudinem præstat, Celso auctore cap. ultimo lib. 4. Qui verò iam sæpius huiusmodi fluxionibus sunt consiliati plus noxæ, quam auxilij ex sanguinis detractioe sentiunt, vt inquit Pau-

lus, præsertim si corpore sint imbecillo, & frigidulo, hac enim ratione (vt Alex. testatur) multos nouit, aut in totum morbo liberatos, aut raro fluxionibus correptos, eod quod non neglexerint, sed veris statim initio sanguinem sibi detrahi curarint non solum vacuandi, sed etiam præseruationis gratia id facientes. Neque semel duntaxat, sed iterum, atque iterum pluries vena secanda erit detractioe sanguinis paulatim repetita, secanda est autem vena, ex Aëtij decreto, ex directo cruris fluxione infestati in brachio interna. Si verò hæc non appareat, media. Quod si manus dextra dolore infestetur, venam in dextro crure secabis, adeo etenim magnam habet vim venæ sectio in his, qui multo sanguine redundant, vt nedum cum inceperit podagra, seu articularis morbus ægros à morbo vindicet, sed eisdem nondum ea laborantibus, sed obnoxii, ac paratis incidere, etiam si tribus, quatuorve annis per intervalla laborassent, ineunte vere secta vena ab eadem fuerunt liberati, Gale. auctore lib. de curan. rat. per venæ sectionem, & com apho. 47. 6. lib. modo deinceps in omni victu, vitæque ratione agerent moderati. Porro à venæ sectione adhuc sanguineo influente humore, quemadmodum etiam & reliquis influentibus, scopum afferendorum auxiliorum communi rationi influentium humorum subiicere oportet, ita vt repellamus, ac restringamus, nam manibus, & pedibus pharmacis fluxionem repellentibus vti debemus, vt liquet ex eodem Gal. 10. de compositione medic. secundum locos, quam eadem adhibenda non sint nisi à venæ sectione, corpore prius præuacuato, aliàs magni mali auctor eris. Nam quod articulis influit, ne ad principales partes recurrens suffocationis causa fiat ægro, periculumque mortis afferat, metuendum est, & sic pro morbo mortem inducit, Alexand. & Aëtio testibus, quinimo post sanguinem detractum (nisi solus ille superauerit) momento temporis interposito purgationem etiam molliorem, ex Pauli testimonio. Diuersa autem purgatione vtendum erit pro differentia redundantis cum sanguine humoris, harum purgationum infra mentio fiet. Post sanguinis missionem, ac etiam purgationem vbi opus fuerit, particulis fluxione tentatis, ea adhibeantur medicamenta, quæ vim habeant id quod influit repellere, eisdem partibus robur adicere, ac quod in eis continetur exsiccare. Vbi verò amplius non influat, discutientia approximare oportet. Quapropter circa initia aceto veteri tenuium partium cum rosaceo eas rigare oportet, & præsertim si in alto hære dolorum causa videatur, etenim acetum propria sua tenuitate vsque in altum progressum expeditat rosaceo viam exhibet, quod natura sua dolores lenire potest. At si in superficie dolor consistat per vini, & iam dicti olei vsu magnopere iuueris, æstate quidem tepidorum, hyeme verò calidorum (vt Aëtio visum est.) Ex mali punici corticibus, rhu, & semperuiuo, vino probè decoctis, accuratèque lauigatis, ac cum farina mixtis medicamentum commendat Alexan. sit autem farina hordei, vel fabarum, poteritq; adici rosaceum, ac prædicta in posca decoqui, præsertim si dolor magis in alto hæret, & calor ad sit immodicus. Conducit etiam (vt eisdem visum est) malum punicum ipsum mediocriter decoctum, vt supra, leuigatumque affectis particulis imponere æstate frigidum, hyeme autem tepidum. Aliis quoque cataplasmatibus vtendum

Curandi
methodus.
6. apho. cō-
mem. 18.

Si ex san-
guinis co-
pia excitetur
curatio.

Vitæ ratio.

Lib. 11. ubi
agit de po-
dagra san-
guinea.
De vino no-
ta.

Coment. 4.
text. 22.
Vena se-
ctio.
Pau. lib. 3.
cap. 78. po-
dagra san-
guinea.
Aet. lib. 12.
cap. 23.
Alexan.
lib. 11. ubi
agit de po-
dagra san-
guinea.

utendum, quæ inflammationes lenire possunt citra hoc quod fluxiones prouocent, talia sunt (vt inquit Aetius) farina hordei, fabarum, fænugraci, ac cicerum trite vino coctæ, modica etiam aqua affusa: quibus quoque oleum rosaceum adici poterit: necnon & eadē farine in posca, & oleo rosaceo decoctæ dolorem mitigare consueuerunt, etiam qualibet de per se. Permutentur autem assidue cataplasmata, ac etiam foris contegantur ne infrigidentur. Item ex caprillo lacte, seu bubulo, farina hordei, vel fabarum, seu panis medulla, vitellis ouorum, rosaceo, pauco croco adiecto, & aceto, medicamentum fiat, etenim non parum conferet, debet autem assidue permutari. Ad hæc ex malis cotoneis vino maceratis pane permixtis, ac rosaceo cataplasma imponatur. Ipsi verò affectis partibus neque aqua, neque aliud oleum adhibeatur, sed si eas ablueri oporteat, posca medio riter tepefacta, aut alterius plantæ austera decocto abluantur, ex Actij præcepto. At si dolor adhuc remanet, præsertim si in alto fuerit, hoc cataplasmate vtare (ex Alexand. sententia), foliis brassicæ coctis, læuigatisque diligenter faciem acciti, ouorum crudorum lutea duo, & rosacei paulum adiecto, ac mixta omnia simul, læuigataque inducito continuè immutans medicamentum, & vehementes dolores multum lenies, vt ipse inquit. Si verò articularis, seu podagricus dolor ob biliosi humoris influxum prorietur, victus ratio refrigerans, humidaque præcipiatur, & vitanda sunt omnia calfacientia, & quæ pallidam, seu flauam bilem generare valent, ex Pauli, & Alexand. monumentis. Talis itaque qualitas aer eligatur, paulò tamen ad humidum vergat, ne fluxiones proritet: quies, & somnus eligantur, labor, & veneris vsus interdicantur, pariter & vigilie immodicæ, aliis quotidiæ suo munere fungatur, aliàs leui clystere eluatur, ab ira, & furore, ac inedia arceantur: cibis autem vtantur prisana, & eius cremores, ex oleribus, lactuca, intubo, malua, interim quoque blito, & soncho, ex auibus gallinis, perdicibus, merulis, turdis, aliisque montanis passerulis, ex piscibus faxatiles, & erinacei conueniunt, ex fructibus parum adstringentes gustare conuenit, vt mala, forba, pyra, mala punicæ, & reliquos huiusmodi, ex bellariis castaneas commendat Alexander. Crapulæ (vt dictum est) & nimie ciborum repletiones vitentur. Potus sit aqua hordei, aut in qua semina coriandrorum præparatorum fuerint decocta: vitandumque omnino vinum est, præsertim vetus, suluum, aut nigrum. Cæterum circa initia conselium tentandum est noxium humorem vacuare tum per vomitum, tum etiam per inferiorem ventrem, vt Actio visum est. Vomitus per aquam tepidam assumptam fiat exiguo aceto, aut syrup. acetoso permixto. Purgatio autem non prius exhibeatur (ex Alexandri decreto) quam acrimoniam humoris, ac rosionem humectaris. ac contemperaueris. In quem vsum syr. è succo cichorii, ex succo, seu infusione rosarum, & reliqui sexcenties in præcedentibus conscripti præbeantur, à quibus eos confidenter purgabis nedum semel, sed sæpius si res postulat, ita nanque (vt refert Alexander) à recrementis, & fluxionibus tutos seruire poteris, si materiam superantem non vniuersam, sed per vices subtrahere semper coneris. Sit autem medicamentum simplicius, ac familiarius quoad fieri possit, quod non multum calidum existat bilem ducens cum facilitate, veluti est cassia

fistula, mel acereum, saccharum violaceum, syrup. ex pluribus infusionibus rosarum, & reliqua huiusmodi. Poteris autem hunc in modum purgans medicamentum componere, Recipe mellis acerei vnc. ij. seu pulpæ cassiæ fistulæ vnc. j. s. siue sacchari violacei vnc. ij. s. aut syrup. ex pluribus infusionibus rosarum vnc. 4. diacath. vnc. s. cum aqua cichorii fiat potio, & vbi hoc non suffecerit, sed iterata purgatione indigebis, paretur decoctum, seu infusio ex drach. 3. mirrobalanorum citrinorum in aqua cichorii, aut endiuia, seu aqua lactis, cui drach. j. rhabbari, vnc. 2. mellis acerei, aut iij. syr. ex pluribus infusionibus rosarum adiciantur, & vnc. s. diacath. aut drac. 2. eclegmatis rosacei, & fiat potio. Quod si adhuc vltiori purgatione ægri indigeant, eandē, aut similem portionem repetas post aliquot dies, aut ex 3. j. rhabbari, & drac. s. agarici, & scrup. ij. corticū mirrobalanorū citrinorū, seu trochiscorū eorundē catapotia formato, post quæ vnc. ij. mellis acerei, aut iij. syr. ex pluribus infusionibus rosarū rubearū absorbent ægotantes. Clysteribus item leniētibus hoc tempore sæpius vtare, & vbi bilis defluens sanguini permixta fuerit, non erit absolum reuulsionis gratia in principio ante purgationem venam secare ser uata rectitudine, vt diximus, aliis consentientibus pauca sanguinis copia emissa, à qua eadem bile preparata, contemperata, & concocta tutius purgans medicamentum exhibebis, deinceps ad topica medicamenta te conuertas, expedit enim affectas partes à principio vsque ad vigorem refrigerare, & corroborare, ac mitigare, ne propter immodicum ardorem, ac dolorem magis fluxionibus tentetur, vt liquet ex Actio, & Alex. Ad hoc autem præstantissimum est rosaceum, si ouorum lutea præsertim ei admisceas, vini etiam, aut aceti momento addito, ex eiusdem Alexandri, & Pauli testimonio. Herbae etiam admoveantur, quæ infrigidandi, & adstringendi vim habent per se læuigatæ præsertim virides, veluti sunt semperuium, lactuca, solanum, portulaca, lenticula palustris, feris, polygonum, rosarum folia, rumex acutus, atriplex, plātago, blitum, vmbilicus veneris, violarum flores, & reliqua huiusmodi. Hæc etenim dolores, qui in accessionibus fiunt abundè lenire possunt, adhuc etiam magis si pauca farina hordeacea, vel vnum ex prædictis, vel duo admisceas, & ne siccescat medicamentum, vtile est etiam rosaceum cataplasmati adicere. Frigida autem cataplasmata admoveantur, mutanturque crebrius, & nunc hæc, nunc micæ panis posca imbutæ adhibeantur, vel hordeacea farina cum rosaceo accommodetur, vt Paulo visum est. At si semen psyllij in aqua feruenti maceretur, & diligenter subigatur, viscosumque fiat, & hordeacea farina permisceatur, mirabiliter dolores mitigabit, feruorem, & ardorem doloris extinguet, & affecta loca ad temperiem bonam reducet, vt liquet ex Alexand. Actio, & Paulo. Optimum autem pharmacum dicebat esse idem Aetius ex rosaceo, & betæ succo compositum, vidit etiam (vt ipse testatur) quendam hac affectione occupatum, qui immisiss in frigidam aquam pedibus, & aliquandiu in ea detentis præclaram opem tulit, Vbi verò adeo magnus dolor vigeat, vt laboras eū ferre nequeat, eis quæ torporem inducunt, medicamentis vtendum est, ex dictorum auctorum monumentis, quanquam eorum liberalior vsus cauendus sit, neque diutius eisdem insistendum, quam vt doloris vehementiam duntaxat lenierint, & deinceps

ceps prorsus auferre, vbi feruor doloris finierit, aliàs magis offendent, quàm iuuabunt, constringere etenim insertum humorem sic vt in trophaceam duritiem occalescat, & languidum sensum, diurnalque motus difficultates parient. Verùm vbi sedatus fuerit dolor, confestim partes refouendæ erunt per ea quæ calefaciunt medicamenta. In hunc itaque vsum cicuta, papaueris, hyoscyami, seu mandragoræ folia adhibeantur, vel eadem folia contusa, ac lauigata cum ouorum luteis, ac rosaceo permixta accommodentur. Similis quoque efficaciæ erit hoc medicamentum Pauli, Recipe micam panis aqua macerata, vel posca imbutam cum succo semperuini vel portulacæ, vel solani, vel palmularum carne, & papaueris semine pari portione, adicias ouorum tostorum lutea, ac rosaceum, & affectas partes de-

cap. 3. linias. Galenus 10. de compositione medicamentorum secundum locos, hoc medicamentum ex Asclepiade cõmendauit, Recipe succi papaueris drach. 4. poteris drach. 2. assumere, croci drach. j. cum lacte bubulo, aut caprillo terito, ac adiecto pane interno diligenter lauigato, vt molle cataplasma fiat, & rosaceo admoto mollito, ac vitior, forinsecus betæ, ac lactucæ foliis custodiendi eius gratia impositis. Item opium, & crocū cum lacte cerato rosaceo excipiebatur, & linteolo infarcta imponebat. Post anodynorū vsum thymi, origani, calaminthæ, satyreia, saluie, & similibus decocto in aqua, aut vino, vt videbitur, loci calefaciendi sunt. Adiuvare etiam oportet sudorum exclusione corpus calfaciendo, & fricando, ita tamen ne affectos locos contingamus, vt Aetius refert, & præbenda quoque sunt ea, quæ vrinam

Lib. 12. ca. 32. cient, talia etenim bilem per lotium euacuare consueverunt, vt ipse asserit. Doloribus quoque valde instantibus, ea quæ somnum conciliant, exhibeantur, veluti est lactuca, & papaueris semen tum in cibo, tum in potu, similiter & syr. de papauere post cibum, hæc autem post corporis euacuationem exhibeantur, ex sententia eiusdem Aetij. At si is qui insuit humor pituitosus fuerit, eligatur aer calidus, & siccus, somnus moderatus, nam & moderata etiam vigilia conferunt circa fluxionis initia quies, postea exercitium valde conducit, alui excrementa quotidie natura, vel arte excernantur, adhibitis nedum lenibus, sed efficacioribus quoque clysteribus. Inedia quoque, & fame vtendum est ad plures dies, nam pituitosa natura eam bene tolerare potest, vt inquit Aetius, libro duodecimo, cap. trigessimotertio, corporibus etenim carnes humiditas habentibus famem adbibere conuenit: fames namque corpora exsiccat, Hippocr. auctore aphor. 59. 7. libri. Deinceps aut vt in ediam ferre non valeant cibi tribuantur qui parum nutriant, extenuent, ac siccant, ex eiusdem Aetij, & Pauli testimonio, veluti est orizæ succus, pascerculi montani assati, nuces, iuglandes, pistachia, vuar passæ, & cappares ex aceto mulso: quandoque etiam vti poterūt paruis pisciculis in petrosis aquis coalitis, asis, aut elixatis adiectis quibusdam herbis extenuantibus, vt fœniculo, hyssopo, satyreia, fampsucho, pulegio, serpillio, & reliquis huiusmodi. Ab aliis carnibus, & leguminibus, fugacibus fructibus, reliquisq; refrigerantibus, ac copiosiore vino, præsertim nigro abstinendum, verum quàm minimum vinum interualli tempore tenue, fuluum, & vetus præbeatur, vt refert Aetius, lib. duodecimo, cap. trigessimotertio, quanquam si fieri possit etiam ex toto vinum circueidendū sit. Plurimos siquidē noui

(inquit Paulus) qui prorsus abstemij omnes sanitatē consequuti sunt, alij siquidem per morbi initia omnino liberati sunt, alij in posterum rariùs, & minori dolore accessiones perceperunt. Quapropter nisi quid obftet, aut futuri inde aliquid metuant mali, perpetuam vitā agent abstemiam. Inuicem verò vini decocto, anisi, aut alicuius consimilis feminis vtatur, si Paulo credendum est. Poterunt item cinnamomi, aut caryophyllorum decocto, seu aqua mulsa uti. Cateram si qui defluit humor, non modò pituitosus fuerit, sed simul cum sanguine redundans appareat, vena secāda erit prius, deinde viribus recreatis ad medicamentum purgans veniendum est, ex Alex. testimonio, saltem reuulsioni gratia aliis consentientibus: neque Paulus hoc negauit, quoniā magis pituitosis ipsam prohibere noluit, neq; magis etiam melancholicis, verum ea statim tentanda erit, cum quis morbum experiri cœperit, nec multa sanguinis copia extrahenda, ne plus noxæ, quàm auxilij ex sanguinis detractione consequatur. A venæ sectione, aut vbi pituitosus succus citra sanguinis permutationem redundarit, ac fluxit, à pituitæ vacatione principium curationis sumere oportet, vt inquit Aetius, lib. duodecimo, cap. 33. Euacuatur autē humor pituitosus per vomitus quidem nihilominus & infernè per ventrem. Vtilis est autem in hac affectione per infernā purgatio siue iuxta manus, siue iuxta pedes hæreat morbus, & multo adhuc magis, si iuxta omnes corporis articulos fluxus fuerit dispersus: familiarior etenim pituitæ via, & minùs periculosa per intestina existit. Si enim in superiorem ventrem violenter attracta non euacuetur, periculū inducit, vt testatur idem Aetius. Tutius itaque est vt ad infernā excretionem pituita ducatur, paulatim tamen, & per vices, nā neq; crassiora recrementa vniuerfa, & vice vna extrahi possunt, vt inquit Alex. Verum ante purgantium medicamentorū exhibitio-

Lib. 12. ca. 32. nem ea tribuenda sunt, quæ vim habeant extenuandi, ac incidendi, namq; sic præparati pituitosi succi ad purgationē magis idonei redduntur, præparentur autē melle rosaceo, syr. ex stœchade, oxymelite simplicis, aut etiā scillino pauco adiecto syr. ex succo boraginis, aut de infusionibus rosarū: quibus iam præparatis purgans medicamentū præbeatur tale, Recipe myrobalanorū chebularum 3. agarici 3. j. s. fiat decoctū, in quo per colum transfuso dissolue syr. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum, vel persicarū vnc. 3. confectionis de dactylis drach. 2. aut diacath. vnc. s. fiat potus, vel drach. i. pilularum è sagapeno, seu fœtidarum recipe, & alteram agarici trochiscati, & cum syr. de stœchade, aut oxymelite catapotia formato, post quorum assumptionem decoctum drach. 2. corticum myrobalanorum chebularū absorbeat, in quo vnc. 2. vel 3. syr. ex pluribus infusionibus rosarum rubearum sint dissolutæ. Hæc nō semel duntaxat, sed bis, & sæpius, vt diximus (vbi vsum vrgeat) repetenda sunt. Nostis temporibus vniuersus ferè medicorum cœtus ex quadam praua consuetudine, seu abusu ductus, nedum in articulorum doloribus, seu podagra ex pituita ortis, sed in omnibus ex quacunque causa fuerint geniti, hermodactylis aluum purgatione sollicitant: quandoque etiam catapotis de hermodactylis à Mesue, seu Rase compositis vtuntur, verum ipse penitus abstinendum esse consulo ab hermodactylorum vsum. Nam quo seplasiarij hodie pro hermodactylo vtuntur, non est hermodactylus, sed bulbos quidam à Græcis

Loco citato.
Si pituitosus humor influat curatio.
Vicius ratio.

Loco citato.

Loco citato.

Lib. 12. ca. 32. ubi dicitur de purgatione per infernā.

Lib. 12. ca. 32. ubi dicitur de purgatione per infernā.

De hermodactylo vbi dicitur quod non est hermodactylus sed bulbos quidam à Græcis.

à Græcis καλόν appellatur, huic enim omnibus numeris aridet, vt liquet ex Dioscoride cap. proprio, quod quidem in cibo sumptum (vt ipse inquit) fungorum modo enecat: Si contingat ipsum exhibitum non enecare, eius exiguae quantitati, quæ offertur, ascribendum erit: nec propterea negandum est quod suapte natura enecat, & si nō suffocat propter eius exiguam quantitatem, saltem magnum infert corporibus detrimentum, quemadmodum sæpius experientia etiam obseruatum est. At esto quod sit hermodactylus (quod negatur) adhuc ab eo abstinentiū erit, nisi valde robustis corporibus tribueretur. Nam etiam verus hermodactylus stomacho faciesit negotium, cibi fastidium ex repletionē, & ventriculi redundantia mouens, cum eisdem sit inimicus, & nimis aduersetur, Paulo auctore cap. de podagra, & cap. de hermodactylo. Quapropter reliquis vtendum est purgantibus medicamentis tantum tutioribus existentibus, hermodactylos, seu eorum catapota omnino vitantes. Atqui si euacuatio per purgationes ob aliquam causam fieri nō possit, tum inedia, & fame vtendum est ad plures dies, tum etiam frictionibus discussorij, efficacioribus clysteribus, & pharmacis vrinam cientibus, Aetio teste. Post purgationes antidota etiam nonnulla exhibere conuenit, præsertim his, qui natura pituitosi sunt, veluti theriacam, mithridatam, ac diacorallium dictum, quod omnium securissimum, longoque vsu probatissimum est, ex Alex. & Pauli testimonio, cuius descriptionem apud eosdem perlegas. Paribus verò affectis medicamina imponenda sunt, quæ vim habeant leniendi, discutendi, atque adstringendi, præsertim circa initia. Nam deinceps omnis adstringentibus discutientibus magis, ac exsiccantibus vtendum. Imponantur itaque terebinthi folia viridia, & tenera cum adipe suillo recentē, & rosaceo modica cera adiecta: apta etiam sunt cupressi folia, & pilulæ vino cocta: necnon & cyperi radices, vt rhamni folia, vt inquit Aetius. Verum cum folijs, aut pilulis cupressi, cyperi que radicibus, aut rhamni folijs, poteris tu adipem, suillum recentem, ac rosaceum, & modicam ceram adlun miscere, & vbi mediocri dolor affuerit, brassicæ folia cõferunt, si concisa obducantur, similiter apij, aut conizæ, ex Alex. & Pauli auctoritate. Sin autem dolor vehemens ortus fuerit, cataplasmatibus mitigantibus vti oportet, qualia sunt quæ ex farina fœnugræci, seminis lini, cicerum, & loliacea constant ex aqua mulsâ, aut vino tenui decoctis, modico oleo nardino adiecto, item cinis crematæ radicis brassicæ, eiusque colicorum cum axungia illitus multis fuit præsidio, vt inquit Paulus, sed finiendis doloribus recens adhibenda est axungia, discutiendo autem humori vetus salsa auxiliatur. Bubulum quoque stercus cum hordeacea farina in aqua mulsâ coctum prodest, vel per se recens, & liquidum, vel ex folijs brassicæ, similiter capillus finus per se, aut cum hordeacea farina coctus in posca, eodem Paulo teste. Mansuetissimum autem remedium est (vt Aetius refert) post principium, etenim leuiter discutit, & exsiccat, si althæe folia cocta trita, tum per se, tum cum polline, seu hordeacea farina imponantur. Eundem tiam præstant vsum radices eius coctæ in aqua mulsâ tritæ, vt idem Aetius fatetur, amaraci item comæ, artemisia, abrotoni folia, pulegium, samplicus, brassica, serpillum, fœniculum, silymbrium, mentha, ac reliqua huiusmodi per se singula cum

panē, seu farina fœnugræci, erui, aut lolij, ac recentē adipe suillo, oleoque irino, seu nardino, pro cataplasmatibus imponuntur. At si nihil hisce cataplasmatibus leniantur, fortibus, seu liquoribus torrentis ritu ab alto proiectis tertandum erit: sunt autem hi chamæmeli, meliloti, fœnugræci, aut centaurij decocto. Nonnullis etiam capparibus decoctum abunde fuit auxiliij. Verum quod infra scribitur omnibus præstat efficacia, vt liquet ex Alexand. & Paulo, Thymum, origanum, satureiam, & calamintham in aceto acerrimo decoquitis, & vbi herbae probè fuerint decoctæ, tunc eodem aceto adhuc calido affectas partes non modò semel, aut iterum, sed sæpius, & frequenter superfundito, seu foueto. Hoc præsidio (vt ipsi fatentur) permulti pristina valitudinem recuperarunt, quibus non pituita solùm, sed etiam flaua bilis fuit infecta. Vbi verò per iam dicta cataplasmata, aut superfusiones, seu totus dolor moderatior euaserit, eis vtendū est medicamentis, quæ non solùm summam eutem instantia, sed etiam in alto fixa calcacere, & discutere queant, Alexandro auctore. Componatur autem hunc in vsum hoc medicamentum. Recipe adipis suilli veteris, & butyri, cuiuslibet vnc. j. olei veteris, vel nardini vnc. ij. cremoris seminis lini, & fœnugræci, singul. drachm. 4. ammoniaci, & galbani in aceto macerati ana drachm. 3. croci drachm. s. ceræ quantum satis sit, fiat ceratum. Item & hoc admirandum est pharmacum, Recipe castorei, thuris ana drach. j. s. medullæ ceruinæ, & adipis anseris ana drachm. 3. olei anethini, & nardini ana vnc. ij. s. bdellij, & galbani in aceto dissoluti ana drach. 4. farinæ seminis lini, & fœnugræci ana drach. 3. s. cum cera quantum satis sit, fiat medicamentum. Hoc etiā vtare tanquam magnoperè conferente. Recipe succi radicis ebulorum drach. 3. resinæ pinus & terebinthine ana drach. 4. olei vulpini, & chamæmelini ana vnc. ij. cremoris seminis althææ, seminis lini, & fœnugræci, cuiuslibet drachm. ij. s. opopanacis, sagapeni, & ammoniaci dissoluti in aceto ana vnc. s. croci drach. j. cum cera quantum satis sit, & adipis suilli vnc. j. fiat ceratum. Admirandum quoque iis pharmacum est, quod ex croco constat ab Aetio descriptum cap. 26. lib. 12. Hoc etiam tempore naturalia balnea discutienti, ac exsiccandi vi prædita conferunt, quemadmodum puteolis est balneum, quod vulgus appellat (Souiene homini) quidam aqua marina, lixiuio, vel vino adstringenti affectos articulos lauant post inflammationum remissionem, nonnullasque in eisdem, aut etiam aqua decoquunt discutientes, ac exsiccentes herbas, & laconicum balneum parat, quo non inutiliter vtuntur. Si verò ex atra bilis influxu laborabunt, quanquam hoc rarò accidat, & ipsi quoque omnino vniuersali vacuatione indigent, protinus quidem venæ sectione, quoniam & in his humor, quemadmodum & in magis pituitosis, quam maxime in venis cõtinetur, quantitate magis quam qualitate peccans, ex Pauli sententia. Verum statim in morbi principio vena secanda erit. Nam si sæpius fuerint à fluxione comprehensi, offenduntur magis à sanguinis vacuatione, quam iuuantur, præsertim quibus natura frigidius, aut imbecillius est corpus, vt ipse inquit. Aetius verò quandoque venæ sectione, interim purgatione, & interdum vtrisque eos indigere fatetur cap. 34. eiusdem lib. 12. Nam quando ad sanguinem declinant atra bile infectum, venæ sectione opus habet: quando

Si ex atra
bile fluxio
fiat, curatio
Vena se-
ctio.

verò ad atram vergunt bilem, euacuatione per ea quæ ipsam repurgant. Si verò hæc ambo simul per totum hominem redundarint, prius venam secare, deinde purgare eos cogimur, ut ipse asserit. At quoniam sæpius in venis continetur totius corporis eū sanguine permixta atra bilis, quibus ex eius fluxione podagra excitatur, seu articularis morbus, propterea saltem reuulsionis gratia in morbi initio venæ secetur, ac deinceps concocto, ac præparato humore purgetur aliquo medicamento purgante eorum, quæ capite de melancholia conscripsimus, & medicamentis vtare in eodem principio super affectas partes repulsorias, & sensim simul calfacientibus, veluti sunt iam dicta terebinthi, ac cupressi folia, cyperi quæ radices, & reliqua huiusmodi. At post principium his, quæ sensim calfacere, & attenuare ac discutere possunt, vtetur ex sententia eiusdem Aetij, cuius farinae sunt lauri folia mollia, pastinacæ, caucallidis, conizæ, brassicæ, uridis, ocymi, nasturtij, & reliquorum innumerorum admiscenda autem sunt hæc panis, aut cuiuspiam ex prædictis iam sæpe farinis, adipi anserino, aut gallinæ, butyro quæ, & æsypo quod leniora reddantur, potissimum in mollibus, ac humectis corporibus, ut patet ex eodem auctore. Reliquis quoque medicamentis supra relatis post huiusmodi pharmacorum impositionem (ubi ea non suffecerint) vt conuenit. At in quibus obscura fuerit podagræ origo, hæc semel experiri abunde fuerit, & modò ad consimilia transgrediendum est, modò contrariis pugnandum, neque tamen eisdem diutius immorari consilium est, si nullum ex eis iuuamentum perceperint. Hæc quotidie in artis operi-

*Purgatio.**Tropica.**Lib. 12. ca. 34.**Si obscura fuerit podagræ origo.*

bus fieri videmus, ut idem medicamentum vni articulo profuerit, alteri in eodem ægrotante inflammationem excitauerit: quin etiam non modo non opituletur, sed confestim (quod maxime mirum est) offenderit: quippe vnus, idemque articulus sæpe ex eodem remedio nunc iuuabitur, paulò post eiusdem appositu inflammationem concipiet, ut liquet ex Paulo. Quoniam verò & tophi etiam in articulis quandoque gigni consueverunt modò ob humoris, qui ad eos decubuit, crassitiem, terrestrem quæ duritiem, modò propter immoderatum discutientium resiccantiumque medicamentorum vsum, sine eorum mixtura, quæ emolliendi virtute pollent, propterea pro eorum curatione (si curari poterunt) ea conuenientiora sunt, quæ emollietem naturam sortiuntur, velut sunt adeps suillus, caprillus, vitulinus, anserinus, & medulla, præsertim ceruina, althæa bis cocta, & reliqua huiusmodi. Interim autem digerentibus, ac discutientibus vtare, quemadmodum cap. de lienis scirrho docuimus. Proprie autem facit vetustissimus, acerrimusque calculus cum suilla carnis præpinguis, ac veteris decocto contritus, & superimpositus, ex omnium ferè medicorum Græcorum consensu. Liquet itaque ex his simplicium fluxionum articulare morbum, seu podagram generantium curatio: Qua de re nulla amplius difficultas aderit etiam mixturam curam inuenire. Satis enim manifestum est quod ad humorum complexionem, consequenter etiam curationes oportet mixtas esse. Cognitiones etiam mixturarum fluxionum ex prædictis simplicibus affectionibus sunt sumenda, & propterea iure eas prætermisimus.

FINIS.

DE MEDENDIS
FEBRIBVS
ARS MEDICA,



DONATO ANTONIO
AB ALTOMARI MEDICO,
AC PHILOSOPHO NEA-
POLITANO, AVCTORE.



Co 4



ILLVSTRISSIMO,
AC REVERENDISSIMO
HIERONYMO CARDINALI
SERIPANDO
DONATVS ANTONIVS
ALTIMARVS S.



U. N. de medendis febribus artem medicam hoc tempore scripsissem, cui eam potissimum mitterem, dum cogitarem, prater te, occurrebat nemo: Tibi enim pluribus de causis me deuinctum esse sentio, tum quod fidem meam, ceteraq; mea officia in valetudine tua, tibi homini gratissimo semper grata fuisse apertissime cognoui, tum quod in fratrem meum magna abs te collata esse beneficia perspexi: & quem in dies maiora, & plura accepturum esse non dubitabam, ni cito eum mors rapuisset. Huc accedit virtutis & ingenij tui ab ineunte aetate specimen, & eximius splendor, & in bonas artes amor ardentissimus. Quibus effectum est vt tui semper studiosissimus fuerim: Nam vt omnes praedicant, cum publice orantem audires Egidium, maxima eius doctrina, summisque laudibus quibus efferebatur, accensus (hoc enim modo Deus Opt. Max. te sollicitauit, vt Themistoclem Milciadis trophaea) Augustini religionem suscipere, eumque audire voluisti: vbi quid, & quam breui in philosophia, ac Theologia, ceterarumque bonarum artium studiis profeceris, Conciones tuae, in amplissimis Italiae urbibus, maximo omnium plausu, atque approbatione habitae, declarant: & praesertim Caroli 5. Imp. studium, qui te vnum Neapoli orantem, & saepe audiuit, & admiratus est. Augustiniana Religioni postea praepositus, totam fere Europam per triennium peragrasti, vt eius ordinis viros in optimum Christi statum confirmares: vbi quantum elaboraris, & quantum tua virtus profecerit, testes sunt qui affuerunt, ac locupletis, testis est Deus Opt. Max. Quare illud omnes asserunt disiectissimas terras non citius cuiusquam passibus circui potuisse, quam tuis, non dicam cursibus, at virtutibus, optimisque institutis illustratae sunt: Quae quidem ita magna esse fateor, vt ea vix cuiusquam mens, aut cogitatio capere posset. Sunt tamen & illa maiora, animum vincere, omni gloriae cupiditate, atque ambitione carere: post enim illa, eam dignitatem omnibus inuitis deposuisti, vt studiis te totum traderes, Aquilensem praefecturam à Carolo delatam, renuisti, vehementer eum rogans ne id munus tibi delegaret, tum ne studia relaxares, tum vel maxime quod temperaturae, etati ac propriae sanitati calum repugnaret. Interim satis longo intervallo ad Carolum missus es, qui cum magnis de rebus ageres, inter tot praclariss. viros, tu vnus ea legatione dignus, ab omnibus tuis ciuib. indicatus es: quod

quod onus libentissime suscepisti, ut patriæ parem gratiam referres, & cui te plurimum debere non ignorabas, ei nulla in re defuisse viderere: qua in legatione, & patriæ omni pietate, & cæteris huius Regni ciuibus omni officio satisfacisti, dum totius legationis rationem redderes, Salerni præsul ab eodem (cum maxime recusares) creatus es, ubi animi tui integritatem, pietatem, ac singularem continentiam, inter cæteras eximias virtutes ostendisti: nunquam enim tanquam bonus pastor gregem tuum dereliquisti: at contra plerique quadam gloria cupiditate adducti facere solent. Quo quidem tempore, cum tuam cæterarum rerum incredibilem sapientiam, vitamque honestissime antea actam Pius III. Pont. Max. audiret, non modò te in Cardinalium numerum asciscere voluit, sed cum falsa religio totum fere orbem vana superstitione repleretur, tua integritate, & doctrina confusus, (nouerat enim te Fidei, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ acerrimum defensorem) ad Tridentinum Concilium, maximis de rebus acturum, unà cum cæteris tui ordinis præclarissimis viris, sanctissimisque Apostolis delegauit. Quapropter effectum est Sacratiss. Antistes, ut lucubrationes meas tibi potissimum munciparem. At quid medicæ artis regulæ cum viro sacre Theologiæ studijs dedito? Non ignorabam te virum doctissimum omnium bonarum artium studijs delectari, illisque præsertim, quæ & animæ & corporis curam gerunt: existimaui præterea, præter te fore neminem, qui hoc munusculum animo susciperet alacriori: quod qualecunque sit, tibi gratissimum fore arbitror, tum ob singularem tuam in me beneuolentiam, tum ob incredibilem humanitatem, quæ literis, quamuis hac ætate spretis, vicissim & delectetur, & afficiatur, harumque cultores & plurimi faciat, & quod potest benignè adiuuet atque euehat. Quamobrem præclare mecum actum esse arbitror, quod hoc facultatis nostræ documentum, nominis tui velamine quodam, quasi amuleto ab omni, aut carie vetustatis, aut etiam liuore, aut obrectatione tutum posteritatis memoriæ commendaretur. Nam quo illud splendidiore titulo, aut qua grauiori nominis auctoritate inscribi potuit, quàm eius, qui tanquam fulgentiss. Solus inter nostræ imbecillitatis tenebras elucescit? Nunus igitur tuæ pietati inscriptum ea benignitate prosequere, qua tui studiosorum munera soles, donantis semper attendens animum. Quod si tibi, ut spero, & opto, gratum esse accepero, non tam præclare cum eo actum esse, quàm aliqua ex parte satis meo officio factum esse putabo. Vale.





DE MEDENDIS FEBRIBVS ARS MEDICA.

P R O O E M I U M.

Duo in arte
necessaria,
methodus
vniuersalium,
& exercita-
tio in parti-
cularibus.



Utrum non liceat vllius artis scientiam nancisci, nisi & quandam methodum habueris, per vniuersalia vocata theoremata, & in particularibus te exemplis exercueris: ob id nos artem medendi febres volentes instituire, duobus his, veluti cruribus, seu instrumentis tanquam omnino necessarijs ad eiusdem artis scientiam adipiscendam vti proposuimus. Verum cum in vniuersalibus methodus, in particularibus exercitatio consistat, Galeno auctore 9. method. medendi, ab vniuersalibus initium sumens, methodum primo condere decreui: ad particularia deinceps progrediens, quomodo exercitatio in earum singulis curandis probe procedere debeat, scribere non recusabo. Nam neque vniuersalis methodus sine exercitatione multa in singularibus, artificem bonum efficere potest: vt liquet 9. de Hippocratis & Platonis decretis. At cum ab vniuersali methodo ad omnium particularium exercitationem transire non liceat, nisi & particularis ratio habeatur earum, quæ particulares sunt febrium differentiarum, ob id visum est vniuersum hoc opus in tres partes dissecare. In quarum prima, vniuersalis continetur methodus dignoscendi, accurandi omnes primas ac vniuersales febrium differentias. Secunda docebit modum inueniendi, ac curandi febrium particulares omnium differentias, vtiles primis illis vniuersalibus subdiuisis: speciatimque in ea omnium, quæ ex putredine excitantur febrium, particulares differentias, ac generationis modum, tam intermittentium, quàm continuarum, explicabimus. In tertia ad exercitationem particularium accedemus. Nec non pro totius operis complemento, breuem de pestilenti febre tractatum absoluemus.

Summa to-
tius operis
diuisio.



DONA-

DONATI ANTONII

AB ALTOMARI, ARTIS

MEDICÆ DE MEDENDIS

FEBRIBVS,

PARS PRIMA.

Qua via utendum hac in methodo constituenda.

Caput I.



ED quoniam ipsius medendi methodi finis est inuenire cuiusque morbi remedia, quodnam viâ, quâ huc perducit, statuum dum primò erit principium? Id verò morbi ipsius cognitio, qualis scilicet naturâ is sit, à Galeno con-

stituitur, secundo methodi meden. cap. 7. Hoc similiter est illud principium, quod primò à nobis inuestigare ac constitui debet in hac nostra methodo. Etenim eo inuento, haud difficile erit finem quoque assequi, hoc est remedia inuenire pro eisdem febribus medendis. Nam in adagio est, quòd principium, dimidium est totius: Plato autem cuiusque operis maximum esse retulit; quidam verò amplius etiam, quàm dimidium esse dixerunt. Alij vel totum ipsum esse, potestate videlicet, asseruerunt. Erit itaque nostrâ viâ principium, cognitio ipsius febris, qualis inquam naturâ ea sit. Inuatur etenim rationalis inuentionem, sed futurorum etiam præsentationem, vt primo de differentiis febrium, cap. 3. à Galeno scriptum est. Hoc item est illud, quod idem Galen. docuit sexcentis, & præsertim secundo methodi meden. cap. 6. ex ipsa rei naturâ ordiri; cognita enim ipsius febris natura, ac constituta ratione essentia eiusdem febris, confestim ad ipsam diuidendam accedentes, hac viâ omnes eius differentias faciliè inuestigabimus. Etenim principium diuisionis morborum est, vt essentia ratio rei diuidendæ constituitur: qui verò omnem morborum numerum hac methodo non inuenit, hunc maxime in ipsis method. medend. foribus lapsurum esse Galen. censuit, eodem secundo metho. medendi, cap. 6. cum constet totidem esse medendi modos, quot sunt morborum idem. Funditus nanque rationabilem sectam subuerterent, si ignorato affectu, curationis tantam facultatē abundē sibi supereffe dicant. Nam si ab ipsius rei naturâ indicationem non sumant, ab vltu ipso omnes quomodo curandum sit intelligēt,

vt eodem 2. meth. cap. 5. scriptum est.

Quid non sit methodus.

Caput II.

ETERVM ne per ignota progrediamur, prius quid per Methodū intelligendum, ac quid, quotuplexque ea sit, cum eodem Gal. exponere censui; præsertim cum nonnullos viderim in hac re inter se digladiari. Græci ferè omnes Aristotelis interpretes, crediderūt methodum habitum quendam esse. Simplicius namque, Alexandri auctoritate, voluit omnem habitum spectatiuū, contemplatiuūve, eorum quæ ad ipsum attinent cum ratione, id est, cum causâ, esse methodum. Philoponus verò quòd methodus sit quidam habitus fatetur, qui viam præstat cum ratione cuique ad aliquas artes, scientiasque capeendas, animum adhibenti. Sed pace tantorum virorum dixerim: licet in omni theoria, seu contemplandi genere, omnique tum nobiliori, tum ignobiliore methodo, duo sint habitus, vt Aristoteli visum est. primo de part. anim. cap. 1. quorum alterum scientiam rei, alterum peritiam quandam nuncupat: neutrum tamen eorum methodum esse fatemur: quinimò neque ipsam habitum alium quendam esse quispiam cum Aristotele asserere audebit: cum neque tanquam actio sit quædam habetis & habiti, neque dispositio, secundum quam bene vel malè disponitur dispositū, aut secundum se, aut ad aliud; neque pars talis dispositionis, præter quos nullus alius datur modus sumendi habitum, vt ab eodem Aristotele quinto meth. cap. 19. scriptum est. Non igitur erit methodus habitus. Illud idem confirmari poterit ex eodem Aristotele, qui sexto ethicorum, cap. 4. quinque in vniuersum enumerauit habitus, quibus quispiam vbi nihil impediât, agere potest quando voluerit. Sunt etenim qualitates quædâ, quæ à subiecto haud faciliè auferri possunt, scientiam inquam, sapiētiam, intellectum, artem, ac prudentiam. Quorum tres speculatiui, sciētia, sapiētia, & intellectus; duo verò practici sunt, ars & prudentia. Horum neque vllum methodū esse quispiâ fateri poterit. Etenim nō scientia quia methodus, habitus demonstratiuus nō est. Neque intellectus, cum ille sit duntaxat principiorū. Neque sapiētia, quoniam neque virtus alicuius artis existit methodus, quæ tribuitur illis qui excellētissimi sunt in arte, quæadmodū Phidiâ, & Polycleto sapiētes fuisse

*Simplicius
& Alex.
malè defini-
erunt metho-
dum.*

*Methodus
non est ha-
bitus.*

*Habitus
quinque, ex
quorum tri-
mero nō est
methodus.*

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

Methodus

fatemur. Neque etiam sit scientia, & intellectus pretiosissimarum natura. Nō itaque erit aliquis eorum habituum, qui speculativi appellantur, methodus. Multominus eorum qui practici, cum prudentia dici nō poterit, nam habitus quidā verus est prudentia cum vera ratione, qui in his agendis versatur, quę sunt hominibus bona vel mala, vtilia vel non vtilia, non speciatim siquidem, puta qualia ad sanitatē, vel robur, sed generatim ad totius vitę statū bene dirigendum. Huiusmodi autē methodus nō est, quem admodum neq; etiam ars dici poterit, quia non est habitus quidam cum vera ratione factiū, veluti ars ipsa; neq; inertia nuncupari poterit, quia non habitus est factiū, falsa ratione, circa id quod aliter se habere potest. Insuper quod nō sit ars, ex Gal. confirmatur 9. meth. cap. 17. qui Platonis auctoritate, de methodo loquens, dicebat. [Hanc etenim cuiuslibet constituendę artis methodum, Plato nos docuit.] Si ergo artes omnes methodo constituuntur, non erit ipsa methodus, ars; aliās ars constitueretur per artē, & illa per aliā artē, adeo vt ad infinita daretur procedēdi venia: quod apud philosophos magnopere est absurdum. Non itaque verē ars, methodus dici potest, licet improprie, & per abusione, quandoque artē appellari posse non negamus, cum sit via quędam ad eas, vt dicemus. Quia etiam ratione philosophi interim generationem, naturam appellare consueverunt, quia via est ad eam naturam, quę forma nuncupatur. Similiter etiam admittimus cum Aristotele, quod in omni methodo, vt diximus, duo sint habitus, quorum vnus scientia rei, alter peritia appellatur, nunquam tamen methodum ipsam habitum quempiam esse fatemur. Quod verō neque ratio sit methodus ipsa, tum ex Aristotele, tum etiam ex Galeno poterit demonstrari: ex Aristotele, quoniam, vt ipse inquit primo de anima, ratio omnis est definitio, aut demonstratio, quorum neutrum est methodus: ex Galeno, quoniam 3. meth. cap. 1. dicebat: [cui facultas datur illa inueniendi, ex quibus perfici possit quod à prima indicatione suggeritur, is merito morborum est curator,] & subdit, [qui si per experientiam inuenit, obseruator & Empiricus est nominandus: si ratione & methodo, logicus & methodicus, & dogmaticus.] Frustra itaque dixisset ratione & methodo, si methodus esset ratio. & primo eiusdem dicebat: [cuius quod queritur inueniendi potestas datur ab ipsis methodis rationalibus:] & eodem loco cauendum esse retulit ne simul de ambobus agamus. dico methodo quę ratione innititur, seu experientia quę ratione non vitur. Ex quibus liquet methodum inniti ratione, non autem rationem esse. Illud item clara luce confirmauit eodem primo meth. cap. 3. aduersus Thesalium, iis verbis, [Porro simplici verbo dicere omnes in victu morbos esse duos, nō methodo, non demonstrationē, nec ratione vlla probabili, aut lenimento aliquo, neque aliā re profus adhibita, præterquam cuiusmodi in veteres blasphemiani, id facere imperantis hominis est, nō docentis.] Neq; etiam ordo est ipsa methodus, licet ordine quodam procedat, vt in sequentibus patebit. Quoniam neque illa relatio, seu respectus est prioris ad posterius, aut posterioris ad prius: quamuis in methodo ipsa constituenda quidam seruetur ordo, ita vt in disquisitione aliquid primum sit, aliquid secundum, & tertium, & quartum; & sic de reliquis omnibus, quoad demum ad ipsum, quod

Methodus ratio nō est. Cōment. 48

I. meth. c. 4.

Methodus nō est ordo.

ab initio est propositum, perueniatur. Neque propterea quod in methodo ordo seruetur, ac seruari debet, ipse ordo erit methodus, quemadmodum falsum est etiam opinari, vt inquit Galenus 4. meth. cap. 4. aduersus Thesalium, quicquid omnino in his habetur, qui methodo aliquid faciunt, esse methodum ipsam: nam notitiam certē habeat oportet, tum similis, tum dissimilis, qui methodo quiduis molitur, non tamē ipsi hoc methodus est, similis scilicet, dissimilisquę notitia, nec Aristoteles hoc, Platōve affirmat.

Quid sit methodus. Caput III.

VM itaque nec habitus, nec ratio, nec ordo sit methodus, vt abunde demonstrauimus, non absque ratione cum Galeno quarto meth. cap. 4. claudimus methodum esse vnam quādam vniuersalem viam, quę omnium particularium est communis. dico particularium, quę sub ea continentur. Verum inueniēro quānam sit hæc via, ibidem non definiuit, promittit tamen citato loco se ostensurum, cum vnum esse in omnibus curationibus principium, tū viam, quę ab eo principio ad finem vsque ducit in omnibus particularibus simile esse. Hęc inquit est illa via recta, de qua verba fecit Hippocrates, sexto de morbis vulgaribus, in omni scilicet artis constitutione, vt inquit Galenus in cōmento. Appellauerunt autem hæc viam posteriores Hippocrate, non viam, sed methodum, vt ipse Galenus asserit; ex qua rectē inuētorum & factorū in artibus approbatio est, non rectē autem redargutio: methodam, non absque forti ratione existimare oportet eam esse, quam ipse Galenus asserit, tanquam necessariam Platone auctore, pro constituendis singulis artibus: de qua idemmet Plato in Philebo & Phædro fusissimē verba fecit, rationabilēquę methodum eam nūcupauit: vt distinguere ab ea, quę ex diuturna obseruatione ex singulorum peritia in vnam collecta, conficitur. Hanc etiam fieri nō posse sine exercitatione diuisionis & compositionis, nedam in eisdē locis Plato, verum etiam & Galenus 9. de plac. Hippoc. & Plat. cap. 2. tanquam manifestum arbitratu est: asserēs cum eodem Platone ad artium constitutionē, diuidendi & componendi methodum esse. quam maximē necessariam: duobusque modis nobis præcipit in ea esse exercēdū. Vno, vt à primo, maximēquę generali, ad ea quę nullam amplius sectionem admittunt, descendamus, per medias differētiās, quibus definitiones specierum constare, in Sophista, & Ciuili idē Plato ostendat. Altero, vt à specialissimis quę multa sunt, ad primum genus, componendo ascendamus. Vna siquidem vtrorūque via est, iter verō duplex, ab altero extremo, ad alterum vicissim trāsire. Hęc est illa logica, seu rationalis methodus, quę facultatem præstat inueniēdi eius quod queritur. Hęc item est illa methodus, quę ratione nititur, hac demū quippiam inquirere, ac inuenire ex aduerso opponitur, ei quod est fortuito temerēquę reperire. est namq; id cū via quadam & ordine, ita vt in disquisitione aliquid, vt diximus, primum sit, aliquid secundū, & tertium, & quartū; & sic de reliquis omnibus, quoad ipsi, quod ab initio propositū fuerat, sit perueniēti, quippe id methodi (id est, sicut veteres interpretātur) vię & rationis est maximē propriū, vt ex paruo elementari prim-

principio, ad singula membratim peruenire possis; tum quicquid perperam est dictum, scientiis id theorematis, veluti regula quapiam examinans, iudices: ut liquet secundo de sanitate tuen. cap. 4. Qui hac methodo vtuntur, ij sunt, qui inuentionis suae auctorem, rationem statuerunt ac ordinem, vnamque viam, quae ad finem ducat, proposuerunt: ex aduerso oppositi Empiricis ipsis, qui latentur nec inueniendi, nec docendi apud ipsos esse necessarium ordinem. Nam nec arte vlla, rationeue experientiam niti, imò vnus fortunae fauorem; ad ea quae quaerit inuenienda, requirit: quemadmodum à Galeno primo method. scriptum est. cap. 4. Ex quibus omnibus Galeni verbis non absque ratione colligi poterit methodum nil aliud esse, quam vniuersalem quandam viam rationabilem, ac ordinatam, ad inquit tendendum, seu inueniendum id quod quaeritur. Insuper quòd medendi methodus, via quaedam sit vniuersalis, ac ordinata; & rationabilis, ad omnium morborum curationis inuentionem, quae quidem omnium particularium communis est, facile ostendi potest. Nam rationabilis non ab re esse dicitur, propterea quòd ab ipsius quæsitæ rei natura, seu essentia, exordium sumeret: enim non ad diuidendum modo quidvis quodam in loco, inquit Plato, ab ipsa quæsitæ rei essentia, nobis esse inchoandum, sed etiam in omni disquirenda re, eiusmodi semper principio vtendum. Et quid aliud est quæsitæ rei essentia; nisi vt eiusdem quæsitæ rei essentia ratio constituatur? id quod diximus principium esse methodi medendi, cum Galeno. Per hanc itaque differentiam (rationabilis inquam) differt hæc via, ab ea, qua vtuntur Empirici, quæ ex diuturna obseruatione conficitur; vt diximus, nec satis est si rationabilem dixeris hanc methodum, nisi & ordinatam, ita vt in hac disquisitione, aliquid primum sit, aliquid secundum, & tertium; & ita de reliquis omnibus, nisi enim is seruetur ordo, non erit methodo inuenire, nam id præterquam quòd cum ratione fiat, opus est, vt Galenus inquit, primo method. quòd fit etiam cum via quadam, & ordine. Id quòd clara luce confirmauit eodem loco his verbis. [Qui verò rationem inuentionis suæ auctorem statuunt, ac ordinem, vnamque viam; & cætera:] cuius ordinis tanquam primum auctorem fuisse iactat sese Galenus 9. meth. cap. 8. asserens nullum alium ante eum ea omnia, quæ hac via ab Hippocrate inuenta sunt, ordine definiuisse. Etenim tanquam primus inuentor idem Hippocrates debetum ordinem omnibus non dedit. Hanc eandem viam, seu methodum tanquam rationabilem, ac ordinatam, sub quibusdam paucissimis verbis figurauit idem Galenus citato primo libro methodi medendi, cap. 5. asserens; [Quoniam omnis morbi curationem inuenire propositum est, necesse est morborum numerum prius sciri.] Et quoniam fieri nequit, vt aut differentias generis vllius, aut species inuenias, ipso quòd diuiditur non planè explorato, oportet profecto nunc etiam quid morbus sit, narremus: quòd sic diuisionem eius ritè adæquamus. Si itaque hæc vniuersa s medendi methodus, omnium particularium communis existit, vnamque est principium eius in omnibus curationibus, tum via, quæ ab hoc principio ad finem vsque ducit, in omnibus particularibus similis est; vt liquet quarto methodi cap. 4. & propterea, vt ipse inquit, quamuis in singulis morbis priuata quædam methodus sanandi videtur,

commune tamen in omnibus genus bonum est: ob id & hæc methodus, quam nos instituere paramus, via quædam erit vniuersalis, rationabilis, ac ordinata inueniendi curationem earundem febrium: quam quidem inuenire impossibile est, nisi dictarum febrium numerus prius sciatur.

Quo inuentionis instrumento febrium auxilia inuestiganda sint. Caput IIII.

QUONIAM fieri nequit vt hic numerus sciatur, siue differentias, siue species febrium appellaueris, si prius ipsa febris, quæ diuidenda est, non explorètur; propterea quid febris sit primo declarare oportet, cum hoc sit à natura rei exordiri, vt diximus, quòd sic demum diuisionem eius ritè aggrediamur; & deinceps omnium curationem inueniamus: quòd quidem & nostrum propositum existit, ac finis huius nostræ methodi. Verum animaduersione dignum est, quòd quamuis inuenire remedia pro omnium febrium curatione sit noster scopus, non tamen qualibet inuentione vtetur, nam cum duo sint in vniuersum cuiuslibet inuentionis instrumenta, nempe ratio, & experientia, nullumque præter hæc duo reperitur inuentionis organum tertium, Galeno auctore, tertio, & quinto meth. fidemque item faciant istæ, quæ rectè inuenta sunt apud omnes homines, hæc eadem duo instrumenta; vt primo eiusdem meth. liquet; neque etiam experientia inuenire omnia queat, neque sola ratio; sed partim experientia, partim ratione inueniri, non propterea mixtam, confusamque tradendam esse doctrinam censemus, sed seorsum Empiricam, & seorsum rationalem. Nunc verò de ea, quæ ratione paritur inuentione; tractare statuimus, etenim Galenus illud primo cauendum esse censuit, ne simul de ambobus cum methodo; quæ ratione nititur, tum experientia, quæ ratione non vitur agamus. Atque vti inquit, rationales omnes medici propositum ita premerent, nec experientiam, & rationem miscerent, atque in vnum confunderet, sed quam vtraque vim habeat, quantumque ad propositum artis finem conducatur, seorsum tractarent, atque perpendere. Nam licet eadem in eisdem affectibus medela; & ab his, qui rationem profitentur, & ab Empiricis medicis trahantur, de ratione tamen inueniendi, inter eos dissensio est, vt liquet libro de sectis, etenim methodo quippiam inuenire, ex aduerso opponitur ei, quòd est fortuito, temerèque reperire, vt diximus ex Galeni auctoritate: & quemadmodum sensus Empiricos ad experientiam, ita ratio Methodicos duxit ad indicationem; vt Galenus inquit libro de subfig. empirica: simul atque rationales, nam in hoc cum methodicis conuenire videtur: vt patet libro de opt. sect. Quantum itaque sensus à ratione differt, tantum altera ab altera inuentione distat. quòd verò à sensu ortum ducat inuentione per experientiam, liquet ex eodem Galeno, tum libro de subfig. empirica, tum lib. de optima sect. ex intuitu enim empirici inueniunt, qui aut fortuitus, aut consultus existit: & si fortuitus, aut casu, aut natura. Quocumque tandem modo empirici inueniant medicamenta, eorum inuentione semper est sine arte & ratione: imò ex aduerso pugnant eis, quæ fit cum methodo; seu via quadam; ratione, ac ordine. Merito igitur Galenus experientiam appellabat *ἀναγνον καὶ ἀλογον*. Erit itaque nostrum

Duo omnia inuentionis instrumenta. 3. meth. ca. 2. & 5. meth. ca. 10. 1. meth. ca. 3.

Se in finem de illi, quæ ratione & experientia nituntur, agendum.

cap. 1.

Sensus Empiricos, ratio Methodicos duxit ad indicationem. & rationales re-

git. De subfig. Emp. ca. 9. De opt. sect. cap. 8.

propositum, quod primò intendimus pro medendis febribus remedia inuenire, non experientia, sed ratione. Verùm cum id fieri non possit sine exercitatione compositionis, & diuisionis, vt diximus, duobusque modis pro artium constitutione, in ea exercendum esse præcipiat Galenus, Platonis auctoritate, licet eadem sit via, contrarium tamen est iter vnius ad alterum, quo vtroque itinere ipsemet Galenus se exercuit, libro suo de medend. meth. vt liquet potissimum libro nono eiusdem. Nos verò eo præcipue exercebimur itinere, quod à primo, maximèque generali, de quo inter omnes homines conuenit, procedere debet ad ea quæ nullam aliam sectionem admittunt descendentes, medijs differentiis, vtpote quod minus sit laboriosum, minusque difficile tyronibus artis medicæ: & quod tanquam præcipuum perpetuò ab eodem Platone, & Galeno præponatur, ac extollatur pro artibus cõstituendis. Atqui non parum nobis laboris affert hanc viam, hanc methodum, hoc itinere constituere; vt qui post Hippocratem, & Galenum, neminem eorum, quos viderim, etiam eorundem doctrinæ amulatores, qui hanc rem nedum conscribere conatus sit, sed nec prorsus eius limina attigisse inspexerim. Quamuis nonnulli commentaria de medendis febribus compilauerint, id quod quidem non parum admirari oportet, cum nullo alio rationalis medicus in curandis morbis ab empirico differat, quàm hac rationabili methodo inuenire remedia. Etenim inuenta ferè semper eadem sunt. Verùm hic obseruatione duntaxat, nullaque arte, via, ac ratione vtens: ille verò quadam via, ratione, ac ordine inuenit, vt prius dictum est, remedia. Auget insuper non minus difficultatem nobis, quoniam licet Hippocrates primus omnium hanc medendi viam, & methodum nobis aperuisse videatur, vt inquit Galenus 9. de meth. medend. cap. 8. ceu primus inuenitor, tamè nec debitum ordinem omnibus dedit, nec cuiusque indicationis dignitatem ad vnguem finiuir: & quasdam in ipsis discretionones omisit; obscurèque plurima pro antiqua dicendi breuitate est interpretatus. Præterea de complicatis affectibus paucissima omnino præcepit; & vt breuiter dicam, ait idem Galenus [omnem ad medicationem viam, aperuisse mihi videtur; sed ita tamen, vt ea curam, diligentiamque ad abolitionem desideret.] Cæterum quid dicam de eodem Galeno, qui quanquam eodem loco fateatur nullum ante eum omnia ea ordine definiuisse, quæ necessaria sunt ad curationem, quæ per methodum efficiatur; seque primum fuisse, qui omnibus ad methodum necessariis, debitum ordinem dedit; apud eundem tamen non reperi, vt vno eodemque loco dilucidè hanc methodum commentatus esset. Et quamuis commentarium vnum confecisset de methodo medendi, in multos libros diuisum; nihilominus adeò sparsim, & quandoque obscurè in diuersis eiusdem commentarij libris, quæ in dicta methodo continentur, ac necessariò sunt perpendenda, conscripsit, vt agrè ex eius dictis, hæc methodus excerpì possit. Quinimò ex iunioribus quidam hac ratione freti præuè eiusdem Galeni dicta intelligentes, vt qui diuersis in locis ferè diuersa de eadem re sentire videatur, ausi sunt asserere sibi Galen. non constare, nec statâ principia seruare; qui quantum à veritate aberrarint, quantumque toto hallucinati sint cœlo, in sequentibus conabimur ostendere. Nunc verò satis sit intel-

ligere quàm perdifficile sit & laboriosum hoc, quod suscepimus nostrum opus perficere, cum neque inter iuniores quispiam reperiatur, qui hanc methodum scribere tentasset, dico ad Hippocratis, & Galeni mentem: neque etiam ab Hippocrate, & Galeno, qui soli, vt mea fert opinio, hanc nobis scriptam reliquerunt, dilucidè, exactè, distinctèque omnia, quæ ad eam requiruntur, scripta reperiuntur. Non itaque posteritas dedignetur ingentes nobis gratias agere; postquam primus inter omnes ab Hippocrate, & Galeno eiusmodi artem peruiam effecerim, & glaciem hanc effregerim, potius quàm dicta nostra tanto labore conscripta calumniari, & nos leonino dente dilacerare. Et si qui sint, qui agrediantur hoc opus post nos conscribere, sciant se non inuenisse noua, sed forè his, quæ nos breuiter conscripsimus, pluribus verbis aliqua addere. Nam facilè, vt inquit, est inuentis addere. Sed iam tempus est, rursus ad propositum redeamus, ad tradendam inquam, omnium febrium medendi methodum: cuius, vt sæpius dictum est, finis exilit remedia pro eis curandis inuenire. At fieri nequit, vt ea inueniantur, nisi earundem numerus, species, seu differentie prius sciantur, eas igitur prius non ignorare necesse est. Verùm species atque differentias alicuius generis inuenire, ipso quod diuiditur non planè explorato, impossibile est, vt liquet primo meth. quoniam principium diuisionis morborum est, vt ait Galenus libro secundo eiusdem, vt essentia, ratio rei diuidendæ constituatur. Quapropter oportet quid febris sit narremus, quò sic diuisionem eius ritè adeamus. Primum autem de notione ipsa dicere conuenit, cum sine hac propositæ rei substantiam inuenire non liceat: vt citato lib. primo meth. scriptum est, cap. 5. Ipsa verò notio, quæ ab omnibus in confesso sit, sumenda erit, vt quæ aliàs principium iure non diceretur. Nam cum duo sint definitiõnũ prima genera, vt liquet 4. de differentiis puls. cap. 2. alterum quod planè rei notionem explicat, quam qui ponunt, nominis tantum notitiam habent: alterum est, quod docet essentiam, virtus est sua cuique definitioni, illi quæ notionem explicat, vt omnibus sit testata, qui eadem vtuntur lingua, & ad rei essentiam non aspiat: huic quæ essentiam docet, vt ei quæ notionem subiicit, consentiat, non sit tamen cum ea, eadem.

Quid febris significet, & quid calor sit.

Caput V.



ONSVEVERUNT Græci omnes, Hippocrates præsertim, & Galenus, quæ Latini febrem nominant, interim πυρετὸν, interim πυρεξίαν, nūcupare. Primum quidem πύρ τοῦ πυρὸς, verbo Græco, quod Latine significat febricitò, seu febre corripior: secundum autem est πύρ τοῦ πυρὸς, xῆς, Latine autem habitus, seu dispositio ignea. Atqui Hippocrates quandoque ardentissimam, seu vehementissimam febrem πυρὸς nominare solitus est, vt liquet primo de morbis vulgaribus, quod Latine ignem significat: quasi non aliam habeat naturam, præterquam ignis substantiam; vt testatur Galenus primo de ratione victus in morbis acutis. Verùm licet vehementissima febris, eandem ferè naturam habeat, quam ignis, & propterea πυρὸς dici possit, non tamè ipsa est ignis. Neque enim si verè ignis esset aliqua febris, animal viuere posset, si ea laboraret. Verùm ita appellatur, quoniam magis quàm ceteræ

Febrim curatione methodo nullus profectus est post Gale. & Hippocr.

Hipp. febrium curatione methodum inchoauit dilucidat.

Gale. non vno lib. methodum curandi febres tradidit, sed sparsim, & obscurè.

Gale. a recentioribus reprehensus.

cætera febres, ad ignis naturam accedit. Latini omnes vñ vocabulo febrem nuncupant, à verbo, feruo: est enim veluti feruor quidam, seu feruescentia quædam corporis, quod ab ea corripitur. A Galeno vero lib. de causis morborum. cap. 2. scriptum est, quod si in totum extenditur corpus calor, tunc huicemodi affectus, febris nuncupatur, quæ est veluti quædam totius corporis immoderata caliditas. Et octauo de method. medend. hæc verba protulit: [sic] vnusquisque morborum est, quos intemperies creat, & febris, vtique cum adeo immodicè actus est calor, vt & hominem offendat, & actionem lædat; quando si neutrum adhuc efficiat, quantumvis sit homo nunc quàm ante calidior, nondum tamen febricitate eum monstrauius.] Ex quibus Galeni verbis cuique facile patere poterit error eorum, qui frigidam quandoque esse febrem asseruerunt, nam eodem Galeno teste, sexto de morbis vulgaribus febrium essentia, non secundum Hippocratem modò, atque præclarissimos medicos, sed etiam secundum communem omnium hominum consensum, præter naturam est caliditas; maxime quidem in totum animal effusa, sin minus, at omnino vel in pluribus partibus, vel in nobilissimis accessio. Si quis autem velit per abusioem, & ex accidenti, & improprie aliquam appellare febrem frigidam, non reclamabimus: vt pote quod à causa oriatur frigida, vel quia ex accidenti aliquo partes quædam corporis refrigerentur, intus reuocato calore, vel ab aliqua forti inflammatione, seu erysipellate, vel ob aliquam aliam causam, vt sit in principis accessio. Neque enim opus est perpetuò vt febrilis caliditas sit per totum animal effusa, vt diximus Gale. auctoritate, sexto de morbis vulgaribus. * Verum non propterea censendum est, vt quidam iuniores medici sentiunt, quod * rigor, horrore intermitentium febrium, tamen accessio est initium, febris tamen haudquaquam censeri potest, quod nondum sit calor incensus, nam pace tanti viri dixerim, iis verbis videtur bisariam hallucinatus esse. Primò quia dixit rigorem, horroremque esse accessiois initium, quod quidem in Galen. doctrina non admittimus. Nam, vt ipse inquit, secundo de different. febr. vbi quæque accenditur atque augetur caliditas, illuc ab aliis partibus sanguinem solere confluere: quo verò tempore confluuit, illas quidem refrigerari priuatas sanguine, est necessarium. Quod verò patitur membrum, grauari, ac distendi, ac sanguinem ipsum confluentem alterari, hoc quoque duplici ex causa, & quia aliis, quæ iam putruerunt, superfluitatibus permiscetur, & quoniam intrusum distillari non potest: quò fit vt instar lignorum humorum, quæ paucam superflamam vniuersam proiciuntur, succedatur: atq; hoc tempus, accessiois principium nuncupatur: quibus in verbis, manifestat Gal. extremas partes corporis in accessiois principii refrigerari: quemadmodum etiam contingit rigere, aut horrere, propterea quod ab eisdem partibus sanguis confluere solet ad eas in quibus accenditur, atque augetur caliditas: & propterea symptomata hæc, non sunt accessiois partes, neque initia, sed necessariò ad earundem accessiois principia consequuntur, tanquam symptomata quædam. Est etenim verè accessiois initium, accessio, siue actio caliditatis præter naturam in aliqua parte. Secundò hallucinatus est, cum dixit, quod tamen accessiois est initium, fe-

bris tamen haudquaquam censeri potest, quod nondum sit calor accessio; falsum siquidem est sateri, quod rigor, horrore febrium intermitentium fiant, calore nondum accessio, cum fieri nequaquam possint, ni calor fuerit accessio in quapiam parte, vt ex eisdem Gale, verbis liquet. Est enim tunc accessiois initium, cum calor accenditur, atque augetur in quapiam corporis parte, vt diximus: & propterea horror, & rigor, febris non censentur: quia non sunt accessiois principium, nec pars; & non quia febris non sit adhuc incensa, vt voluit hic vir. Nam licet febrilis caliditas non sit per vniuersum, corpus effusa, satis est si in plurimis, vel in nobilioribus partibus sit accessio: vt ex Galeni auctoritate sexto de morbis vulgaribus, conclusimus: quanquam neque si ita contingat generari febrem aliqua parte determinata affecta, possit aliquod dictorum symptomatum fieri: præsertim vbi febris exquisita fuerit, erit etenim continua, quæ sui quidem ratione cum exquisita fuerit, neque horrorem, neque rigorem habet, vt secundo de different. febr. cap. 10. scriptum est; nisi exiguum quendam & paruum, præsertim si exquisita non sit, vt liquet primo de morb. vulgarib. & primo de arte curat. ad Glauc. cap. 5. At si verè intermitentis febris fuerit, cum ea haudquaquam fieri possit, eodem Gale. auctore, secundo de differ. febr. cap. 3. nisi & humor putrescat, & vehementiori motu moueatur per membra sentientia, quo tempore, vt ipse inquit citato loco, & lib. de rigore, trem. palpit. cap. 7. partes ipsæ refrigerantur, horrent, aut rigent, modo quo infra demonstrabimus, quis asserere audebit eo tempore calorem non esse accessum, cum putrescat oportet humor, quo tempore per membra sentientia mouetur, & talia symptomata fiunt? Erit itaque perpetuò febris, feruor, seu calor quidam, ex omnium hominum consensu. Atqui cum calor in Galeni doctrina, bisariam subintelligatur, tum secundo de temperament. cap. 2. tum lib. aduersus Lycum, primo aphor. 14. & aliis plerisque locis: vno videlicet modo pro corpore calido, alio verò pro qualitate, cum febrem asserimus calorem quendam esse, non de corpore calido intelligi volumus, sed qualitate, cum ea sit dispositio quædam, seu habitus Manifestauit illud idem Galenus commentò citati aphorif. 14. primi libr. 1. cum dicebat, [per] abusionem quandam, quam in sermone vsurpamus, interim morbos magnos aut paruos, febrem magnam, aut paruum nominamus, cum tamè in sola quantitate substantiæ eadem rectè tribuantur, non autem qualitatibus ac morbis ipsis.] & primo de different. febrium, cap. 1. proponens caloris differentias in cuius genere febris continetur, inter alias, ex eo quod magis & minus sit consistere, de eisdem assererebat.] Sunt autem omnino euidenter, quæ in eo quod maius aut minus consistunt, quo in genere differentia, consueuerunt medici magnam ac paruum febrem nominare, non proprie quidem rei quali, nomen quanti accommodantes: hoc tamen facere assueti non in febribus tantum, sed in mille aliis rebus, quæ licet in qualitate consistant, magnæ tamen, ac paræ dicuntur:] & lib. aduersus Lycum, qualitatem qualitate non effici maiorem, sed vehementiorem, dicebat: sicuti nec minorem, sed imbecillioem. Verum is vocabulorum vsus, tam in vniuersa vita, quàm in artibus omnibus frequentissimè vsurpatur: quia in re quid refert alioquin mentionem facere, cum manifestè orationi nostræ testimoniū à febr-

sunt febres, sed symptomata, ut dicitur. Et ideo non sunt febres, quia nondum accessio sit calor: imò fieri non possunt, nisi accessio sit calor in quapiam parte. Comment. 1. sex. 29

Febris calor de qualitate intelligitur. Aduersus Lycum ca. 7.

ipsis sumere possimus? quas nunc maiores, nunc etiam minores factas esse dicentes quotidie audire omnes licet: & alium alio aliquando plus, vel minus febricitare, atque de eodem etiam heri, quam hodie. Quibus in verbis luce clarius ostendit febrem ipsam calorem esse pro qualitate, non autem pro substantia, seu corpore calido sumptum. Qualitatem dico, non synceram, summam, simplicem, atque impermixtam, cum eadem non nisi in elementis reperitur; ut liquet primo de simplicium medicamentorum facultatibus, & propterea caliditatem hoc pacto intellectam, non nisi in igne reperiri fatemur cum eodem Galeno: nil etenim in corporibus nostris syncerum, impermixtum, seu simplex reperiri contingit: quare cum dicimus febris est calor, de ea caloris qualitate intelligimus, quæ syncera non est, sed aliarum etiam qualitatum quodammodo particeps: & propterea quamvis vehementissima, aut ardentissima ea sit, nusquam tamen, ut prius dictum est, verè ignis appellari poterit, tamen si propius ad ignis naturam accedat. Cæterum, si febris calor est, quæreret quispiam, num actu, vel potentia calor dicatur: bisariam etenim à Galeno secundo, & tertio de temperamentis, primo, & secundo de simplicium medicamentorum facultatibus, & aliis plerisque locis, calor ipse perpenditur, actu videlicet, & potestate. Cui responsum sit, quod cum esse in potentia illud sit, quod nondum tale est, sed propinquo est ut sit tale, ita ut facile tale esse possit, ut liquet tertio de temperamentis. febris autem non sit eiusmodi, relinquatur febrem calorem non esse facultate, seu potestate, sed actu, quod sit, ut tactu, non autem ratione, propria ac essentialia eius differentia iudicentur: quemadmodum ab Hippocrate, & Gal. sexto de morbis vulgaribus, decretum est. Quod enim actu calidum est, tactu iudico: si quod autem adhuc calidum non est, sed ut tale fiat est idoneum (quod utique potestate calidum appellamus) id ratione inuestigare conor, inquit Galenus, secundo de temperam.

Febris calor actu est.
Cap. 1. &
ca. 2. & c. 3.

Comment. 1.
tex. 23.

Exco citato

Explicantur varia febris definitiones: ac ostenditur in corporibus nostris duplex esse calidum.

Caput VI.

NON ab re itaque quotquot febris essentiam nobis manifestare tentarunt, omnes per calorem eam definiuerunt, quamvis non vna duntaxat ratione. Nos verò ne nimium sermonem nostrum protelemus, tres earum in medium afferemus, utpote quæ inter se valde distare videntur. Quarum duæ, duorum Arabum principum sunt, Auerrois inquam, & Auicennæ: tertia verò, medicorum principis Galeni. quam explanare ac sectari conabimur: licet conciliare hos inter sese viros hac in re nitentur. Inquit Auicennas, quod febris est calor extaneus, accensus in corde, & procedens ab eo, mediantibus spiritu & sanguine, per arterias & venas in totum corpus: & addit, inflammantur in eo inflammatione, quæ nocet operationibus naturalibus, non sicut caliditas iræ & laboris, cum non ultimatur, vel cum non peruenit ad hoc ut sit accensa, & noceat operationibus. Auerroës tertio colligit, dicebat. [Febris, est calor compositus ex calore naturali, & extraneo putredinali, misso à corde ad totum corpus, & lædit omnes actiones & passionibus.] Galenus verò commento aphorismi 14. & 16. primi

Definitio febris ex
Auerro. Fen.
1 quarti.

Auerro.
Cap. 3.
Galenus.
Tex. 18.

lib. ait, quod febris est conuersio naturæ caliditatis ad igneam. Et primò de ratione victus, inquit, [febris verò ortus est conuersio naturæ caloris ad igneam] & post multa, eodem libro hæc verba, loquens de Hippocrate, asserbat, [utpote qui febrem ex nativo calore exardescere suscitari existimet, atque contraria contrariorum esse remedia,] de aqua frigida verba faciens. Hanc Galeni definitionem, tanquam nostræ methodi principium, exponendam proponimus, quæ exposita, eiusdem Galeni dicta de eadem febre, quæ diuersis in locis, quasi discrepantia videntur, necnon & citatos auctores conciliare nitentur. Quod geminum in animalium corpore calidum agnouit Hippocrates, apud eundem liquet, aphorismo 14. & 15. primi libri. Scriptum quoque reliquit Galenus sexto de morbis vulgaribus, cap. 6. quorum alterum *ἐμφυτον θερμὸν*, alterum *θερμὸν ἐκ τῆς φύσεως* nuncupat. At Latini primum innatum, seu ingentum, alterum sanè acquisitum vocant: libro autem de tremore, rigore, & palpitatu, non modò innatum appellabat Galenus calidum, sed etiam primum, & generis principium, & quod natura, atque anima, nihil præter ipsum est dicebat Hippocratis auctoritate, quemadmodum & acquisitum calidum etiam, animalis generationi, secundum nominabat. Quod item acquisitum calidum, eodem sexto de morbis vulgaribus, interdum non naturalem, nonnunquam & à natura alienum, vocari asseruit. Confirmavit idem tertio de causis pulsuum, his verbis, [Neque enim ille absolute dixit (loquens de Hippocrate) quæ augentur, plurimum habent calidi, sed innati addidit, ut qui alterum sciret calidum acquisitum esse, quod plurimum iuuenibus suppetat, nam temperatus est nativus calor: acquisitius autem intemperatus, & quasi igneus.] & subdit, [sic etiam ventres, inquit hyeme & verè calidissimi natura sunt, imò ne ij quidem calidissimi absolute, sed calore nativo: æstate paucissimum hunc habent; abundant verò aduentitio calore, & squallido: unde marcescit potius, quam nutritur corpus. Præterea functiones tantum abest ut meliores reddat, ut illæ ne æquent quidem illas, quæ in moderato obcurrunt. Hæc si retinuerint (inquit ipse Gal.) lectores, nihil me nec in hac oratione, nec in reliquis dissidere ab Hippocrate vllus arbitrabitur,] & commento citati aphorismi 14. primi libri, sic scriptum reliquit. [Cum igitur magis terrestre efficiatur animalis corpus, (tale autem quotidie efficitur dum augetur) tunc licet valde vehementer calidum existat, & igneum, substantiam tamen innati caloris paucissimam habet: alioquin febricitantes diceremus plurimum habere calorem innatum: cui non modò plus, sed ne priori quidem habent æqualem, bene enim temperata est caloris innati substantia: ignea autem aduentitij. Quin etiam fumosi quidem, fuliginosi, aridi, & acres, per totum corpus nostrum effluxus, calorem acquisitum consequuntur: halitiosi verò, suauēs, ac temperati, nativum.] Et lib. de difficultate respirationis, cap. 12. asserbat, [duplicem semper intelligere, iuxta Galenus: calorem oportet, alterum genuinum, & corpori innatum; alterum verò acquisitum, ac spurium.] His igitur in locis, necnon & aliis plerisque, quos breuitati indulgens, consultò prætermittimus, sole clarius apparet, iuxta Hippocratis, & Galeni doctrinam duplex reperiri in nostris corporibus calidum.

Calidum nativum acquisitum

Com. 1.

Aristot. potentia calido naturæ aduersus

Tex.

cap.

Impu-

Impugnatur Platonis opinio de calido innato.

Caput. VII.

SED ut quilibet percipere possit, quæ ratione hæ duo calores inter se dissideant, ac quo modo febris conuersio sit naturæ caliditatis ad igneam, intelligere prius oportet quid per calidum innatum, quidve per acquiritum apud Hippocratem, & Galenum subintelligendum sit. Sed quoniam nedum Plato, verum & Aristoteles secus de innato calido quam ij sentire videntur, eorum sententiam in medium afferre putauimus, quod facilius veritas cum eodem Hippocrate, & Galeno inuestigetur. Ait Plato in Timæo, omne animal in sanguine & venis, calorem, quasi ignis quendam fontem, habere: & eodem libro, quod igitur ex ignis excessu præcipue agrotat corpus, dicebat, ita ut quod innatum calorem, omniumque naturalium operum auctorem, Hippocrates nuncupat, Plato ignem appellare videtur. Aristoteles secundo de generatione animalis cap. 3. dicebat, [Inest enim in semine omnium quod facit ut fecunda sint semina, videlicet quod calor vocatur, idque non ignis, non talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spumosoque corpore continetur, & natura, quæ in eo spiritu est, proportionem respondens elemento stellarum: quam obrem ignis nullum animal generat.] Et paulo post subdidit, [Cæterum, calorem in animalibus contentum, nec ignem esse, neque ab igne originem ducere, apertum ex his est.] Quibus in verbis, videtur Aristoteles aduersus Platonem concludere nullo pacto calidum in animalibus contentum, & ignem esse, nec ab igne originem ducere: appellatque primo calorem, deinde spiritum, & tertio naturam, quasi cum Hip. coincidens, qui nullam fecit inter innatum calorem, insum spiritum, & naturam, differentiam: quamvis ut mea fert opinio, de ortu huius calidi innati, inter se dissentire videantur. Verum id inuestigare, non est præsentis negotij, sed satis sit monstrasse Aristotelis sententiam de calido innato, ex diametro pugnare cum ea quæ Platonis est. Quam etiam Platonis opinionem Galenus confutare videtur 8. de Placitis Hippocrat. & Plat. cum comparans eiusdem Platonis opinionem cum ea quæ Hippo. est, dicebat, [Melius tamen erat non ignis, sed insum caloris fontem dicere in corporibus nostris esse, ut Hippo. vbiq. appellauit.] Nam si ab igne ciborum concoctio, digestio, sanguificatio & nutritio fieret, melius & citius etiam in febrientibus omnia hæc conspicerentur absolui: sed insitus calor, temperatus cum sit, substantia quidem, in sanguine & pituita subsistit maximè, qualitate est congruè ex caliditate, & frigiditate contemperatus. Hanc eandem Platonis sententiam, idem Galenus impugnare videtur, commento citati aphorismi 14. primi libri inquisiens, [Cum igitur magis terrestre efficiatur animalis corpus (tale autem quoti die efficitur dum augetur) tunc licet vehementer valde calidum existat & igneam, substantiam tamen innati caloris paucissimam habet, alioquin diceremus febricitantes plurimum habere calorem innatum: cui non modo plus, sed ne priori quidem habent æquale.] Non est igitur ignis calor innatus, ut Plato sentire videtur, ad Hippocr. Aristotelis, & Galeni sententiam. An vero Platonis verba quispiam ad bonum sensum reducere valeat, iterum hic consulto prætermittimus.

Quid sit innatum calidum apud Hipp. & Gal.

Caput. VII.

QUOD innati calidi natura, atque essentia inuestigetur, altius exordienda est nostra oratio, cum Hippocrate primo de natu. huma. cap. 1. ac Galeno, tum eodem loco, tum etiam primo de temperamentis, cap. 1. primo de natu. facu. cap. 1. primo de sanit. tuen. cap. 2. & alijs plerisque locis, quod videlicet quatuor sint, nedum nostræ generationis, sed omnium, quæ ortui interituique subdita sunt, primordia, principia, seu elementa ponentes: quæ Hippoc. ab efficacissima eorum qualitate nominat calidum, frigidum, humidum, & siccum: at si mauis, ab essentia sumptis nominibus, magis quam a qualitate nominasse, aquam, terram, ignem, & ætherem appellabis. Qua de re rectè idem Hippoc. non hominis tantum, sed aliorum omnium naturam, ex calido, humido, frigido & siccis constare, primo de natura humana inquit: quatinus nisi calidum frigidum, & siccum humidum, modo, & æqualitate respondeat, sed alteri alterum longè præstabit, & valentius infirmiori, nil generabitur, ut ipse refert. Verum licet cum animalium, tum cæterarum omnium rerum, quæ ortui, ac interitui subiacent, natura, ex his constet, eodem Hippoc. citato libro de natura humana auctore; tamen cum ipsemet demonstrasset hæc esse omnium entium communia elementa: calidum, scilicet frigidum, humidum, & siccum, rursus ad alterum transit elementorum genus, quod neque primum, neque commune existit, sed proprium animalium sanguine prædiorum. Nam sanguis, pituita, flaua, & atra bilis, elementa sunt omnium animalium sanguineorum generationis, & non hominis tantum. Etenim ex sanguine, pituita, & gemitina bile, & primam oriri nostram generationem vult Hippo. & nostræ vitæ totum cursum ex his suppeditare. Denique hæc, vniuersam hominis naturam esse, Gale. teste secundo de elementis, cap. 1. & primo de natura humana, cap. 1. Ait namque Hippo. citato loco, [Corpus autem humanum, continet sanguinem, pituitam, & bilem geminam, flauam, & atram, & hæc illi sunt natura corporis, & propter hæc agrotat, valetque.] valet quidem præcipue, cum ea inter se virtutem, & copiam mediocriter habeant temperatas, & potissimum si permixta sint: contra laborat, cum eorum quicquam fuerit minus, ampliusve, aut in corpore secretum fuerit, neque cum omnibus confusum. Quocirca non ab re Galenus octauo de Hippocrat. & Platonis decretis, cap. 5. accuratius, dicebat, de ipsis elementis, medicòque etiam vtilius scripsisse Hippocratem constare, quam Platonem: quippe qui cum ex quatuor elementis corpus nostrum dicat extitisse, ab effectricibus qualitatibus omnino ea appellat, siccum, humidum, calidum, frigidum. Neque tamen de morbis secundum eandem rationem sermonem facit: potestare siquidem in corporibus, non actu, insunt, actu vero insunt, quæ ex ipsis per media alimenta gignuntur, sanguis, pituita, flaua, & atra bilis. Quapropter melius est, ut ipse inquit, ut de humoribus dicamus, quod de elementis Plato scripsit. Hæc etenim continenter, & proximè corporis membra produciunt; sanguis scilicet, pituita, & gemitina bilis: & propterea valet corpus, cum moderata maximè hæc inter se, tum facultate, tum multitudine, & mixta optimè fuerint: dolet vero cum aliquid

Principia
4. omnium
que oriun-
tur, & in-
tereunt.

Loco citato

Principia
4. propria
animalium
sanguine
prædiorum.

Loco cita-

to.

Humores

communib.

elementis re-

spondentes.

Loco cita-

to.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

Sanguis syn-

cerus nō re-

peritur.

ex his plus, vel minus separatim in corpore, nec bene cum omnibus confusum extiterit, ut prius dictum est ex eiusdem Hippocratis auctoritate citato libro primo de natura humana. Hæc insuper propria animalium sanguineorum elementa, primis illis communissimis correspondent: ut inquit Galenus citato libro 8. de Hippocratis, & Platonis decretis. Igni enim flava, terræ atra bilis, pituita aqua correspondet, atque idcirco calida & sicca flava bilis facultate, sicut ignis, atra frigida & sicca, perinde ac terra, pituita non secus atque aqua, frigida & humida euasit, æquabilis autem ex omnibus quatuor elementis temperatura, exquisitum sanguinem creat. Appello autem exquisitum sanguinem, eum qui vtriusque bilis ac pituitæ particeps est, cum syncerum, omninoque aliorum humorum expertem, in animalium corporibus, reperire non liceat, Galeni auctoritate, libro de multitudine, cap. 10. Solū autem aerem elementum, ut idem Galenus refert, in animalium corporibus, iuxta naturam suam, tum in respirationibus, tum in pulsibus, cernimus perficisse: quin etiam in palpitatoris affectionibus, inflammationibus, tumoribus, atque iis quos flatus dicere consueuimus. Hæc item sanguine præditorum animalium propria elementa, non adeo propria eorum sunt, quin alia quædam proximiora non reperiatur; quæ generationis nostræ primordia sunt. Nam quemadmodum ex primis illis quatuor communissimis elementis nobis immediate corpora constituuntur, sed multis interuenientibus mutationibus; ut liquet eodem 8. de Hippocratis, & Platonis decretis, cap. 5. siquidem ex ipsis plantarum ortus, & fructuum, & seminum existit: quæ omnia postea, ouibus suis, capris, bobus, aliisque animalibus, quæ vel herbis, vel arborum fructibus, vel ramis, vel radicibus vescuntur, alimentum præstant. Demum hominibus hæc ipsa animalia nutrimento sunt. Ex quibus quidem cibis, sanguis in ipsis gignitur, & pituita, & geminæ bilis: sed sanguis plurimus, unde solus ex omnibus in venis apparet, alia pauciora creantur. Atque hic sanguis est nostræ generationis quasi materia, qui ex quatuor quidem humoribus constat: à dominio tamen ita appellatur, ut idem Galenus refert. Ita quoque asserere licebit de eiusdem propriis quatuor elementis, sanguine inquam, vtriusque bile, & pituita, etenim non immediate ex eis nostra constituuntur corpora, sed medio sanguine menstruo, ac semine: quapropter citato loco Galenus dicebat. [Prima igitur nostra generatio est sanguis, qui ex alimento intra corpus sumpto efficitur; est item semen. Sanguinem voco qui ex dominio tale nomen sortitus est, qui in venis continetur.] Et primo de sanitate tuenda, inquit, [sanguis semineque genitale, generationis nostræ primordia sunt: ille seu materia quædam apta, concinnaque, & opifici ad quiduis sequax, hoc opificis rationem obtinens.] Idem confirmauit secundo de naturalibus facultatibus cap. 3. cum dicebat: [semen principium animalis est efficiens, materiale namque, menstruum est sanguis.] Et proinde dicebat semen, Phidia ad portionem respondere, sanguinem verò ceræ rationem habere: quamuis neque semen facultas tantum sit, sed materia etiam quædam: neque menstruum materia solummodo, sed etiam facultas; ut ipsemet Galenus inquit, libro secundo de semine, cap. 2. Constat autem horum vtriusque ex eisdem genere elementis, humido, sicco, calido, &

frigido, dissident verò inter se ipsa, temperamenti mensura. Siquidem in semine plus est ignæ substantiæ atque aeræ: in sanguine, aquæ, ac terrea: quamquam præpollat in hoc quoque, & calidum frigidum, & humidum sicco: eoque fit, ut non sicus sicut ossa, pilulæ, sed humidus merito dicatur. At semen, sanguine siccus quidem est; ceterum ipsam quoque humidam, fluxileque est: atque ita nobis vtriusque ex humida substantia genituræ origo proficiscitur: ut patet eodem primo de sanitate tuenda. Nec propterea, si ipsi pugnat Galenus qui commen. aphor. 14. primi lib. cap. 2. dicebat, quod semen paucam omnino terrenam substantiam participat, plurimum autem aeris, calidi humidique in se continet. Nam facta relatione substantiæ aeræ, ad igneam, plus satis aeræ, quam ignæ participare videtur, licet vtriusque particeps sit, si verò ad sanguinem menstruum semen comparatur, nulli in dubium venit, quod plus ignæ substantiæ participabit, quam ipse sanguis, menstruus, in quo aquæ, terrenæque abundat, etsi in hoc quoque calidum frigidum, & humidum sicco præpollat, ut dictum est. Constat itaque, dictorum vtriusque ex primis illis quatuor communissimis elementis. Nec minus & propria illa sanguine prædicatorum animalium in se continent: quamuis alterum altero magis, & minus quorundam, quam aliorum, particeps esse videatur: ut ex his quæ diximus, liquet. Ceterum quamuis nobis vtriusque, ex humida substantia, genituræ origo proficiscitur, hanc tamen humidam seruari non erat possibile, si modo ex ea nerui, arteriæ, venæ, ossa, cartilagines, membranulæ, & alia id genus fieri deberent. Qua de re statim in generationis nostræ initio, coniectum copiosius oportuit fuisse elementum id quod siccan di vim haberet, est verò id natura quidem maxime ignis. Quinetiam & terra, etenim ea quoque sicca est. Verum huius elementi plus immisceri principiis nostræ generationis non erat, si modo ea humida esse debebat, ut saepius dictum est. Ea propter igni quominus plus sit admixtum, nec obstat quicquam, & sanè admixtum est, tantò planè plus in vtroque principio, sanguine inquam & semine, quantum nec iam torreat, vtræque, & tamen abundè siccet. Tanta itaque ignis portio dictis principiis admixta est. Etenim tantus calor adhibitus, agilitatem præstare ad motiones sat erat. Ab hoc calore primum cogitur, paulūque concreuit quod in vtero conceptum est; mox siccus redditum, veluti lineamenta quædam & rudimenta cuiusque membri obtinet: vterius verò etiam siccescens non lineamenta, rudimentave modo, sed etiam exactam vniuscuiusque speciem, siue figuram ostendit: & cum in lucem editum est, & magnitudine proficit, & tum siccus, tum valentius semper efficitur, donec ad summum incrementum sit peruentum: tunc verò incrementum omne sistitur: at in eo quod sequitur tempore, omnibus iam partibus supra iustum siccescens, non solum cuiusque officium minus probè administratur, sed etiam corpus ipsum macilentius, graciliusque quam ante redditur. Concludamus itaque corpora nostra tum ex primis illis communissimis quatuor elementis, fuisse genita, tum etiam ex propriis sanguine prædictis animantibus, quæ demum in sanguine & semine cōiunguntur: tanquā proximioribus generationis nostræ primordiis, humidis vtriusque existentibus; quia ex humido nostra est genera

generatio, vt patet commento aphorif. 14. 1. lib. Et ex humida fubftantia, nobis genitura origo proficifcitur, vt liquet citato libro 1. de fanitate tuenda, cap. 2. Ex quibus connotum, fide innatum, eorum quæ in nobis funt, primum corpus eft, quod ab efficaiffima, quæ in eo eft qualitate innatum calidum appellatum fuit; vt liquet libro aduerfus Lycum, Græcè vt diximus ἐμφυτον ὄντων, cōfuevit etiam Hippocrati, ἀπὸ τῶν ὄντων vocare; quali primogenitum dixeris: pro eo quod primitus generandis adfit, & ex quo primam fortiantur generationem: idque nō ab re. Nam Gale. teffe citato com. apho. 14. primi libri, fubftantia innati caloris, ærea eft, & aquea: & paulo post dicebat [humida fi quidem eft, maximè innati caloris affinis, quia ex humido noftra eft generatio.] Hoc igitur eft id, quod calidum innatum appellamus: illud videlicet corpus, ex iam dictis primordiis primogenitum; illa prima fubftantia calida; ille primus infitus fpiritus; illa prima natura atque anima, immò natura & anima, nihil præter ipfum eft; ex Hippo. & Gale. fententia: & non immerito primum dicitur, cum primogenitum fit, & ex eo cuncta alia primam fortiantur generationem. Hinc Galenus commento aphor. decimiquinti primi libri dicebat. [Neque enim aliud quicquam animal ab initio afformauit, ficut neque rursus adauxit, aut vfque ad mortem enutrit, præterquam ifte calor innatus, de quo nunc habetur fermo. Hic enim eft omnium operum naturalium caufa.] Et paulo post. [Neque enim aliud quicquam eft natura animalium, afferebat, præter hoc calidum innatum fecundum Hippocratis opinionem.] Cuius fubftantia, relatione facta ad prima communiffima elementa, ærea erit, & aquea: vt patet commento citati aphorif. 14. primi libri, fi verò ad propria fanguine præditorum animalium elementa conferas, eius fubftantia, in fanguine & pituita fubfiftit maximè: qualitate autem, eft congruè ex caliditate & frigiditate contemperatum; vt octauo de Hippocratis & Platonis decretis fcriptum eft. At fi ad proximiora principia collatio fiat, nihil aliud eft, quam fanguis & fermen. Quinimò libro aduerfus Lycum, afferebat Gale. ego certè nil noui, præter hæc, tertium. Eft infuper ex calido, frigidoque commixtum, maximumque vltimum præbet frigiditas adiuncta, quia furfum, & foras peteret, & difpergeretur; vt libro de tremore, rigore & hor. fimul cum Hippoc. à Galeno decretum eft. Non ab re itaque infantes recenter nati, ac pueri, & vt fummatim dicam, qui crefcunt, plurimū habent calidi innati, inquit Hippo. Quoniam fubftantiam aquofam & æream, quæ propria eft ipfius calidi innati plurimam participant; vt citato aphor. 14. primi libri, ab Hippocr. & Galen. patet. Sanguis quoque & pituita, in eis magnopere redundant: eorumque vniuerfa fubftantia ferè nihil aliud eft, quam fanguis & fermen, vt liquet lib. aduerfus Lycum; prima enim eorum conftitutio ex femine & fanguine eft, quæ humidæ & calidæ res funt, vt ait idem Gale. 2. de temp. Intelligimus autem plurimam effe in his corporibus fubftantiam calidi innati, facta, vt citato lib. aduerfum Lycum fcriptum eft, cum non innatis corporibus, comparatione. Eorum enim inter fe infpicere proportionem debemus, non autem abfolutè magnitudinem metiendam effe, fi qua verò de calido innato hîc defiderantur, nofiro libro de alteratione, &c. ftudiofi petant.

Quid fit calidum acquifititium.

Capitulum IX.

SEd iam tempus eft, vt ad alterius calidi, quod acquifititium appellamus, inueftigandam naturam accedamus, quod etiam quandoque animalis generationi fecundum, interim fpiritū appellare confuevit Galen. Et quemadmodum nomine ab innato diftat, fic etiam & fubftantia, qualitateque, ac operatione, ab eodem difsentire demoftrauimus. Acquifititium inquam dictum, quoniam temporis progreflu, ac ætatis mutatione, acquiritur: ex Galen. fententia, fexcenties citato commen. apho. 14. primi libri, cum dicebat. [Cum igitur magis terreftre efficitur animalis corpus (tale autem quotidie efficitur, cum augetur) tunc licet valde vehementer calidum exiftat, & igneum, fubftantiam tamen innati caloris pauciffimam habet.] Et cum dixit fubftantiam innati caloris pauciffimam habet, liquido oftendit huius acquifititij calidi fubftantiæ, diuerfam effe ab ea, quæ innati caloris exiftit: quod fit vt quemadmodum innati caloris fubftantia eft ærea & aquea, vt prius diximus, ita ea quæ acquifititij eft, terrea & ignea exiftat, manifeftauit illud idem Gale. afferens, Bene enim temperata eft caloris innati fubftantia, ignea autem aduentitij: & post pauca, [puerorum verò corpus, inquit, tale exiftit, plus humidæ, & æræ fubftantiæ obtinens, non ficuti iuuenum, & declinantium ac fenum, ficcæ atque terreftris.] Et eodem commen. [cum quatuor fint elementa, ex quibus omnia corpora funt temperata, inquit, puerile quidem corpus, multum in feipfo continet æræ atque aquofæ fubftantiæ, minimum terreftris: contrà verò, eorum qui in ætatis vigore confiftunt, à terreftri ficcitate obtinetur, deficit autem aquofa, atque ærea fubftantia:] Si quis verò memoriæ mandauerit, ea quæ nuper diximus, de noftræ generationis principiis, facile hanc Galen. fententiam percipere poterit. Diximus etenim, quod licet ex humida fubftantia origo genituræ in nobis proficifcatur: quia eadem humida feruari haudquam poterat, ea propter ftatim in generationis initio, quod ficcandi vim haberet elementum, fuit cōiectum: ignis inquam magis, quam terra, licet & ea quoque commixta fit: vt liquet 1. de fanitate tuenda, cap. 2. Hoc igneo elemento, ac calore, primum cogitur, paulumque concrefcit, quod in vtero conceptum eft: mox ficcius redditur, non modò in vtero, verum etiam & in lucem edito: quod fit, vt quemadmodum primo exiguum habebat admixtam terrenam fubftantiam ipfa genitura feu foetus, tractu temporis, ac ætatis mutatione, non exiguum acquirat terrenā fubftantiam atque propterea & igneam, amittatque aquofam & æream. Quinimò quantum de hac perditur, tantum de terrea & ignea acquiritur: hinc acquifititium calidum dicitur, præpollet etenim terrea & ignea fubftantia in eo. Non ab re igitur idem acquifititium calidum diximus cum Galeno effentiam in ficca, ac terrena fubftantia habere: quod fit vt etiam aucta illa ficca & terrea fubftantia, augetur & ignea. Differt itaque hoc calidū ab innato fubftantia. Quoniam in innato plurima eft ærea, & aquea, minima terrea, atque ignea; in acquifititio contrà, minimum eft æræ atque aqueæ fubftantiæ, multum verò terrenæ, atque ignæ. Animalis quoque generationi fecundum appellatur, relatione ad

Calidum
acquifititium
cur dicatur.

Calidi æ-
quifititij
fubftantia
à calidi in-
nati fubftan-
tia diuerfa.

primum, quod *αρχαρον* diximus etiam appellari ab Hippocrate & Galeno, quasi primogenitum: cuius etiam comparatione libro primo de diff. resp. idem Galenus *ὑδρῶν*, id est, spurium, vocavit: ipsum vero innatum, genuinum. Sed non ab re cuiuspiam hereditandi occasio dabitur: nam qui fiet ut hoc calidum acquisitum, spurium, ac animalis generationi secundum nuncupetur, si illud igneum est, quod statim in generationis initio nostrae generatur: fuit coniectum? Respondebimus, quod licet primordiis nostrae generationis, humidis si quidem utriusque existentibus, ob aquae & aëreae substantiae redundantiam, exiguis quidam ignis fuerit admixtus, quemadmodum etiam exigua admodum sicca, & terrea substantia, quia tamen eadem ignis portio, quae quidem, ut diximus, exigua existit, quemadmodum etiam, & terrena, admodum ab aërea & aqua superantur, ac vincuntur; ob id tum eorundem elementorum siccitas, tum etiam ipsius ignis caliditas, veluti evictae & suppeditate ab aërea, & aquosa substantia, quae multa est, fere percipi haudquaquam possunt, cum primum generatur origo proficiscitur, ac etiam in lucem editur foetus. In dies autem magis, ac magis cum siccior reddatur, quod in utro conceptum est, etiamque in lucem editum animal, magis quoque & terrea & ignea siccitas, ac caliditas, manifestatur, ac sentitur. Nimirum itaque cum talis sit adventitij seu acquisitij calidi substantia, ideo acquisitum etiam appellatur calidum; eius namque actio in temporis progressu manifestatur; ut ex dictis liquet: quoniam & eius substantia, quae prius valde exigua erat, augetur, ac maior redditur. Sed adhuc instabis & fortius, si quae augentur corpora, aequalem habent substantiam calidam, atque igneam, cum iis qui in aetate vigore consistunt, ac propterea aequaliter calida corpora eorum esse, ut inquit Galen. comment. citati aphorism. 14. 1. libri, falsum erit asserere, hoc calidum adventitium, seu acquisitum dici, cum aetatis mutatione, ac temporis progressu, maius non reddatur, neque augetur. Huic dubitationi sic satisfacere poteris; quod quamvis aequalis fuerit substantia calida atque ignea, pueris, & iuuenibus, in ceteris paritate servata, tamen in pueris, ut diximus, haec substantia ignea, fere evicta, & veluti suffocata permanet à maiori copia aërea, atque aquae substantiae, quae propria existit ipsius innati calidi, terrea autem minima existit: in iuuenibus contra, nam evicta iam fere, atque superata est substantia calidi innati, ab hac terrea, & ignea, aetatis ratione, quae quidem substantiam magno opere familiaris est ipsius ignei & acquisitij calidi, veluti enim temperata est caloris innati substantia, ita ignea adventitij, inquit Galen. Nam corpus quotidie magis terrestre, ac vehementer calidum, & igneum redditur. Quapropter hi qui in aetate vigore consistunt, paucissimam habent innati caloris substantiam, multam vero adventitij: quoniam eorum corpus à terrestri siccitate obtinetur, deficit autem aquosa atque aërea substantia. Haec etenim quotidie acquiritur, ac superabundat: quae denique ratione merito acquisitum appellatur calidum, & animalis generationi secundum, ac spurium, ut diximus: alterum vero innatum, seu connatum, primum, seu primogenitum, ac genuinum: quocirca nedum nomine, sed re ipsa, ac substantia, ab eodem innato dissentire videtur. Insuper etiam & qualitate, cum satis arida, acris, atque ignea sit e-

ius qualitas: halitiosa vero, suavis, mitis, ac temperata, ipsius innati calidi, quod quidem qualitate est congrue ex qualitate & frigiditate contemperatum, ut octavo de Hipp. & Platonis decretis à Gal. scriptum est. cap. 2. Tu vero haec poteris tactu discernere, namque fumosi, fuliginosi, aridi, & acres, per totum corpus nostrum effluxus, calorem acquisitum consequuntur. Suaves halitiosi, humidi, vaporosi, atque temperati, nativum. Neque hoc mirum videri debet: oportet enim, inquit Galenus, simile esse defluxum subiectae substantiae, ut quando humida & aërea substantia existit, tum quod ab ea defluit, vaporosum est, atque suave: cum vero terrestris atque arida, tunc etiam quod effluit fuliginosum est, ac acre: quod etiam in exterioribus evenit. Nam quae ex aqua dulci & calida evaporant, bona sunt, & vaporosa, sed quae ex aliquo corpore solido exult, fumea sunt & acris. Nec minus & operatio eorum diuersa existit, cum calidum innatum omnium operum naturalium causa sit, neque aliud praeter ipsum quicquam, animal ab initio affirmavit: sicut neque rursus adauxit, & usque ad mortem enutrit, ut superius cum Galeno annotavimus. Neque aliud quicquam est natura animalium praeter hoc calidum, secundum Hippocr. opinionem: quod confirmabat Galenus secundo de naturalibus facultatibus. cap. 2. sub his verbis [quippe natura illa, quae particulas effingit, & sensum adauget, omnino per eas totas est extensa, utque totas eas per totas non tantum extrinsecus effingat, nutriat, atque adauget:] ipsius vero acquisitij calidi, igneique munus tale non est, nam si ab igne ciborum concoctio, digestio, sanguificatio, & nutritio fieret, melius, ut inquit Galenus, & citius etiam in febrientibus, omnia haec conspicerentur absolui. Est etenim, ut dicemus, in hoc genere acquisitij calor, & febris ipsa; ut ex 6. de morbis vulgaribus ab eodem Galeno liquet. Quinimod eius operatio, contraria est operationi calidi innati, cum hoc minuat, destruat, corrumpatque, illud vero perficiat, formet, atque adauget: digerit etiam, apponit, vnit, & assimilat, ut ex libro de marasmo patet. A principio namque ortus, ad finem usque, vltro non tempore, siccior corpus reddere, ignea caliditas definit: quoad ultra siccatum, non macilentius modo, sed etiam rugosum efficiatur, quae affectio, senium appellatur, & deinceps omnino genitum corpus corrumpatur, atque intereat: quam etiam sententiam, scriptam reliquit Aristoteles secundo de anima, cum dicebat, ignis naturam, simpliciter nullo modo causam esse alimenti, & augmenti, ut quibusdam visum est: sed quodammodo concausam, praecipua et enim causa eorum anima existit tanquam forma in his operationibus existens. Pari ratione dicimus nos calidum innatum, naturam, seu animam, quae in Hippoc. & Gale. doctrina confunduntur, ut sapientius diximus, omnium operum naturalium causam esse: & non acquisitum calidum seu igneum: non negantes, ignem, cum & ipse quoque constitutionem innati calidi ingreditur, licet admodum exiguum esse veluti concausam quandam: quamvis eius munus proprium sit toto vitae curriculo corpora sicciora reddere, quod vna est omni genito corpori corruptelae, interitusque connata necessitas, ut inquit Galenus, primo de sanit. tuen. cap. 2. Altera vero est, ut ipse refert, quae etiam in animalibus praecipue cernitur, totius substantiae fluiorem quem insitus calor excitat. At si quispiam dixerit, &

Obiectio.

Dilutio obiectio.

Alia obiectio.

Obiectio dilutio.

Qualitate, quae tactu

hunc quoque calorem exsiccare, corrumpere, & interire, Hippocr. auctoritate fretus, qui vnde gignitur calorem, corpora corrumpere, & nos interire asserit, cum Galeno lib. de marasmo. cap. 3. dicimus, hanc non esse Hippo. genuinam sententiam: & si Hippocratis sit, innatum calidum, semper sua-
 pte natura perficere fatemur. Verum vt. perfecta sint animalia, opus est eorum substantiam duram euadere. Quare si natura, vbi ad summum vigorem animal prouexit, totidem rursus æquis viribus elementa inferere liceret, pariter opificium suum, citra senium, & incorruptibile fecisset. Cum verò inferi nec mutari possint prima fœturæ elementa, vltra vigorem exsiccare corpus est necessum; & demum corrumpi: quare ex accidenti corpora ex innato calido senescunt, & senio confecta corrumpuntur, & non per se. Quod item innatum calidum, cum plurimum habeant qui crescant, plurimum quoque ab ipsis defluere, est necessarium: vt pote qui humidam & calidam habeant substantiam, & ob id plurimo insuper egere nutrimento. Alio qui corpus absumentur, ait Hippocrates: etenim vbi id, quod defluit, plurimum est, quod verò insluit, paucum, hic necesse est substantiam corrumpi substantiam insuper & hoc quoque innato calido, pueri, calidiores etiam dicuntur iis, qui in ætatis vigore consistunt: quemadmodum hos, pueris calidiores acquisitio calido esse fatemur: cuius substantiam aridam, & terream, non aquosam, & ærea esse diximus: quapropter ex eorum substantia, minus diffluit: & propterea minori etiam alimento indigent: quoniam necessarium est alimentum, vt quod effluit ex corpore, suppleatur: ipsaque alimenta semper oportet esse innati caloris multitudini proportionalia: nisi forte aliquando ex æris ambientis caliditate fusio adueniens, cogat subtrahere, Galeno teste commen. aphorism. 15. 1. lib. absolute verò loquenti, neuter eorum, inquit idem Gal. 2. de tempe. cap. 2. simpliciter videtur altero calidior, imò in vtrisque æqualitatem caloris inuenies. [Ita igitur mihi cum pueros, iuuenes, adulescentes milles considerassem, præterea eundem infantem, puerum, adulescentemque factum, nihilo calidior visus est, nec puer quam ætate florens, nec ætate florens quam puer.] hæc ille. Circumcisus namque reliquis omnibus, si eas, quæ ex sola ætate proueniunt, differentias, æstimaueris, comperies paritione, in vtrisque elementum igneum: & propterea æqualiter calida corpora esse: si modo verum sit, quod huius elementi maiori, vel minori participatione corpora magis, vel minus calida esse dicantur: relatione facta ad corpus temperatum: quemadmodum ipsemet Galenus testatur libro de tempera. & aduersus Lycum. Hanc etenim ob causam, calidiora hæc corpora, illa frigidiora, natura facta sunt: quoniam hæc maiorem calidi elementi portionem, hæc minorem, adepta sunt. Nam cum vniuersis nobis calidum insit elementum à prima statim origine, quæ sortiti ex sanguine menstruo, & semine sumus, distamus tamen abinuicem, quod magis minusve, alius alio calidior reperiatur: sunt tamen latitudini huic quidam, tanquam termini præfixi, quos vltra, si temperamentum progrediatur, aut ægrotare nos, aut iam interire necesse est: vt eodem libro aduersus Lycum decretum est, vt enim plus iusto refrigerati, morbos contrahimus frigidos, sic cum extra sanitatis campum exalcati fuerimus, in febrem incidimus: ad quam iterum redire iam tempus est, cum

multò plura quam proposueramus, sermonis affinitate, de gemino calido, innato inquam, & acquisitio verba fecerimus. Quamquam non adeò superflua sunt, quin tanquam necessaria, magnam operam tyronibus, artis medicæ studiosis afferant: cum ad alia multa, tum ad facilius dignoscendam febres naturam, quam nos eisdem dilucidare instituiamus.

Qualis sit febris natura, quæve eius definitio.

Caput X.

SI cum extra sanitatis campum exalcati fuerimus, in febrem incidimus, ex numero earum ægritudinem primarum, quæ primis, ac simplicibus animalis particulis accidunt, erit febris ipsa. Nam cum earundem propria elementa ex quibus sunt sint, calidum, frigidum, humidum & siccum, vbi probè fuerint temperata, peculiare, propriæ, ac primi morbi, ex eorum intemperaturis necessario constituuntur. Cum verò hæc, octo sint numero, quatuor simplices, & totidè cõpositæ; vnus quispiam morborum, quos intemperies creat, erit vtrique febris: vt liquet octauo metho. cap. 1. & primo de differ. febr. cap. 3. Idque perpetuo: cum nusquam febris aliqua reperiatur, quæ intemperies non sit, quocirca morbus semper erit febris; & non quandoque symptoma, vt quidam prauè sentiunt, etenim neque vnquam in aliquo trium symptomatum generum contineri potest, vt cuilibet omnia tria symptomatum genera examinanti, liquidò patebit. Est itaque febris intemperies, calida inquam & sicca: quicquid alij velint, Galeni auctoritate commento aphorism. 16. primi libri: primo de ratione victus, & sexcentis aliis in locis: quoniam, vt inquit ipse, conuersio, seu mutatio est, (nam vtroque modo vocem *τροπή* Latini vertunt) naturæ caliditatis ad igneam. Cum autem ignis, tum calidus, tum siccus sit, atque ob id, etiam febris, ait Galenus in eodem primo, de ratione victus. Verum quemadmodum igni, proprius calor quam siccitas inest, licet sicca sit etiam ignis natura, Aristote. auctore, libro de sensu & sensibili, est insuper ignis magis calidus quam siccus, auctoritate eiusdem secundo de gene. & cor. ita quoque de febre asserendum erit, quod scilicet, licet affectus sit calidus & siccus, proprius ei calor existit, & magis est affectus calidus quam siccus: loquor autem de febre absolute, quatenus febris est, quæ, vt diximus, conuersio est, seu mutatio naturæ caliditatis ad igneam. Definit autem febrem Galenus per motum, seu mutationem, eam esse conuersionem asserens, nam licet proximè ad ignis naturam accedat, nondum tamen est ignis, vt prius dictum est, quantumuis febris vehemens fuerit, si enim eam per terminum motus definiuisset, omnino vtrique esset ignis: quod quidem in Hippocrat. & Galeni doctrina, pro falso habetur. Sed mox instabit quispiam, asserens hoc falsum esse, saltem in febre hectica, in qua, vt dicemus, æqualiter partes solidæ, sunt in calfacto esse, ita vt intemperies calida & sicca, ac febris facta, apud omnes dicatur, qua de re febris hæc haudquam conuersio dici poterit. Cui responsum sit, quod quamuis in febre hectica partes solidæ incaluerint, & propterea febris æqualis intemperies dicatur, tamen adhuc febrilis ille calor, in partibus solidis susceptus, ad igneum vndeque conuersus non est; sed in via vt conuertatur. Etenim si omnino

Febris morbus partium simplicium, in intemperies

Febris natiua quam symptoma

Tex. 18.

Loco citato Tex. 3

Tex. 23

Febris in motu est, non in termino motu.

Dubitatio.

Responsio.

conclusio

conuersus esset ad igneam qualitatem, vtrique homo viuere non valeret. Non itaque inconuenit partes solidas, in febre hectica æqualiter calfactas esse, ipsam verò earum partium innatam caliditatem, adhuc conuerti ad igneam, & non omnino conuersam esse. Conuersio, inquit Galenus, non absque forti ratione, innatæ caliditatis, & non innati calidi, vtens quandoque vocibus *ἐμφύτη θερμότητος*, interrim, *ἐμφύτη θερμότης*; & non *ἐμφύτη θερμότης*. Nam ipsius innati calidi qualitas est, quæ præcipue in febre mutatur, atque conuertitur, & non substantia eiusdem. Verificauit illud Galenus commento saepe citati aphorismi. 14. primi libri asserens. [Nam sanorum calor vaporosus est, atque suauis, & tactu conueniens, nihil triste, nihil asperum, nihil mordax præ se ferens: eorum verò qui febricitant, & præcipue hecticas febres, aut eas quæ ex putredine humorum ortum habent, acris est, & insuauis, ac mordax, & nostrum corrodens tactum:] & ratione quoque firmatur. Nam cum febris ipsa qualitas sit, & nulla qualitas reperitur extra substantiam, vt liquet primo de elementis; suscipitur tãquam accidens quoddam, in calidi innati substantia, quam non aiam, sed alteratam reddere potest; tãquam differentia quædam accidentalitatis ipsius: quocirca cõuersio hæc naturæ caliditatis, ad qualitatem attinet. Alterata tamen eiusdem calidi innati substantia quodammodo, ac mutata, non tamen corrupta. Sed quæret quispiam, vtrum febris, quæ conuersio est naturæ caliditatis ad igneam, idem sit cum acquisitio calido, quo magis eos qui ætatis vigore consistunt, abundare cõcludimus? Huic responsum volo, non alterius generis esse febrem, quàm calidi acquisitij, ex Gal. auctoritate 6. de morb. vulg. quo loco admittens geminũ calidum in animalium corporibus, posito ingenito, ac innato, dicebat. [Alterum verò acre, mordax, & igneum, in quo genere, & febris est.] Cum igitur tale sit acquisitium calidum, relinquitur febrem in eodem genere esse: & propterea idem Gale. citato loco dicebat hoc calidum sapius acquisitum, interdum non naturale, nonnunquam & à natura alienũ vocari. Quò fit vt propterea quicquid hoc incalcet calido, simul atque densata eiusdem cutis fuerit, febre eos vexari contingat; quemadmodum illi qui altero calido vberime affluunt, suppressa distillatione, pleniores quidem fiunt, sed in febrem non incidunt. ita vt per hæc verba innuere videatur Galenus, quòd quamuis sub genere acquisitij caloris, febris sit, distrepat tamen ab eo, quod iuuenes abundare videtur, maioris ratione, insuper & causa. Siquidem secundum naturam in iuuenibus acquisitij caliditatis existit: etenim ætatis ratione acquiritur, febrientibus verò, causa semper præter naturam est. Conueniunt itaque in qualitate, quam communem habent, acrem videlicet, insuauem, mordacem, atque igneam. Differunt autem cum causa, tum maioris, minorisve ratione, cum minus acris, mordax, ac ignea in iuuenibus caliditas adsit, quàm in febrientibus, præsertim febre hectica, aut ea quæ ex putredine ortum habet. Quocirca non absque forti ratione Galenus citato loco asserbat, hoc acquisitium calidum, interdum non naturale, nonnunquam & à natura alienum vocari. Quanto enim magis hoc acquisitium calidum, ad ignis naturam accedit, eo non naturale, aut à natura alienum, vocabitur. Et si quispiam hæsitabit, asserens quò fieri possit, vt febris, tum qualitas, tum forma, eodẽ in subiecto perma-

nere possint cum forma ac qualitate innati calidi? Respondebimus nos nihil referre in Aristotelis & Galeni doctrina, plures tum formas, tum qualitates ac facultates, etiam cõtrarias in mixtis seruari posse, eò magis cum vna se habeat, vt substantia, reliqua vt accidens. Non inconuenit ergo quòd in eadem substantia calidi innati, eodẽque subiecto, forma adsit, ac qualitas ipsius propria, & ea quæ febris est, cum forma, tum qualitas; tanquam accidens, nam idem Galenus tertio & quarto de simplicium medicamentorum facultatibus nonnullas in mixtis inesse, tum facultates, tum qualitates per se, non diuersas duntaxat, sed contrarias, scriptum reliquit. Quemadmodum etiam pro absurdo haudquaquam habemus, geminum semper in animalium corporibus contineri calidum, quorum alterum ab altero nomine, substantia, qualitate, ac operatione, disscindere fatemur: quippe cum aut impossibile, aut perdifficile sit aliquam inuenire substantiam, quæ ad amulsum simularium sit partium, vt liquet eodem quarto de simplicium medicamentorum facultatibus. Ex quibus studiosi faciliè percipere poterunt nihil referre, si Galenus dixerit febrem esse conuersionem naturæ caliditatis ad igneam in præcitatis locis; sexto autem de morbis vulgaribus, primo de differentiis febrium, & aliis plerisque locis asserat eius essentiam, esse præter naturam caliditatem. Mutatur enim in febre, natura caliditas ad igneam, quæ acquisititia saepe, quandoque non naturalis, interim à natura aliena ab eodem appellatur. Qua etiam ratione, neque dammandus est Arabum princeps, qui febrem dixit, esse calorem extraneum, cum febrilis calor, naturali comparatus, sit à natura alienus. Admittenda insuper non minus est Auerois definitio, qui voluit febrem, calorem esse compositum, ex calore naturali, & extraneo putredinali, cum conuersio sit naturalis caliditatis ad igneam, ex Galeni auctoritate: qua in cõuersione, neque omnino naturalis, neque præter naturam in vniuersum calor existit, sed ex vtrisque quodammodo compositus; in via & mutatione existens, & non in termino: & propterea utroque participans.

Quòd febris subiectum sit calidum innatum.

Capit. XI.

Um ergo febris substantia, in eo qui præter naturam ex calore, consistat; quoniam in corde quædam præter naturam caliditas generatur, vt inquit Gale. 1. de diff. feb. cap. 3. quibusdam visum est eiusdem febris subiectum geminum esse: vniuersale siquidem vnum hoc est cor: particulare alterum, scilicet tres diuersæ cordis substantiæ; spiritus, humores, & partes solide. Nos verò aliter cum Galeno tenemus; quanquam re ipsa parum distare videamur, nam cum febris, conuersio sit naturæ caliditatis ad igneam, eius forma, essentia, seu qualitas, tanquam in subiecto, suscipitur primum in substantia calidi innati, quemadmodum superius concludimus, hæc nanque est quæ mutatur, atque alteratur, accidentalem caliditatem, quæ febris est, suscipiens: & propterea dicimus cuiuslibet febris subiectum, calorem esse natium, cuius cum fons, origo, & principium fuerit cor ipsum, ex Galeni 5. de locis affectis, cap. 1. & sexto de Hippocratis, & Platonis decretis, cap. 6. & aliis plerisque locis; propterea in corde quandam præter naturam caliditatem generari dicimus,

Febris conuersio est qualitatis calidi innati, non substantia ipsius.

Cap. 6.

Idem febris sit in genere calidi acquisitij.

Commen. 1. tex. 29

Febris differt à calido acquisitio maiori, & minori ratione, & causa.

6 de morbis vulgaribus.

Dubitatio.

dicimus, eum febris ipsa generatur: & quemadmodum ab eo in totum corpus diffunditur, ac vniuersis partibus suppeditatur innatum ipsum calidum, ita quoque hæc præter naturam caliditas, ab eodem in totum animal effunditur, aut omnino ad plurimas, vel nobilissimas partes. Verum cum in Hippocratis, & Galeni doctrina idem sit calidum innatum, & natura, idem quoque erit asserere calidum cordis innatum, quod naturam eiusdem: quinimò & proprium temperamentum, ac propriam ipsius cordis substantiam, quæ omnia apud eosdem auctores, sæpius confunduntur: id quod manifestauit Galenus non solum commento aphorismi. 15. primi libri, verum etiam primo de vlu partium, cap. 9. sub his verbis, [Insunt autem primum (ipsis videlicet corporibus) & maximè temperamenta, quippe quæ propriam particularem substantiam complent, corpus enim tale natura est, propterea quod caliditate, frigiditate, humiditate, siccitate sic commixtum est, nã carni esse carnem, & nervo nervum, & aliorum vnicuique id esse, quod est ob qualitatem quatuor prædictarum, certam quidam temperaturam, mixtionemque contingit.] Quod calidum innatum, licet ex sanguine menstruo, & semine ortu habeat, ut cum Galeno conclusimus, quia semen ipsum ex serosa humiditate, ac spiritu qui in ea est, constat, ut liquet libro aduersus Lycum, cap. 7. ob id idem Galenus quinto de simplicium medicamentorum facultatibus, cap. 21. dicebat, [Verum nihil prohibet sanguineam substantiam, simulque aqueam, seu seminaleni, vnã cum spiritu calidum inaudire innatum:] & commento citati aphorismi 15. primi libri: [Triã autem hæc erant corpora inquit, quæ primæ nostræ naturæ substantiam compleuerunt, spiritus, sanguis, & seminalis humiditas, ex qua in primo quidem ortu, veluti in libro de semine diximus, fiunt animalis partes solidiores:] & vndecimo methodi, cap. 1. & 3. Naturam ex iis tribus partibus constare dicebat, ex spiritu, & earum, quæ verè dicuntur solidæ, substantia: quas alibi ex semine genitali ortum ducere monstrauimus, & tertia ab his carnosa, quæ cuique particulæ est sua. Quocirca, si quispiam asserat calidi innati essentiam, seu substantiam ex sanguine menstruo & semine constitutam esse, aut in sanguine, seu humoribus, spiritu, & serosa humiditate, seu carnosius partibus, spirituosius, & solidis, eius substantiam contineri, idem sanè asserere videbitur, perpetuò pro hypothesi habens, quòd quicquid de calido innato fatentur, idem quoque de natura verificetur, & è contrà. Hinc Hippo. non immeritò philosophorum, ac medicorum princeps, hominis partes vniuersas, tres esse affirmabat sexto de morbo vulgarib. continentia inquam, contenta, & fluitantia, seu impetentia, continentia appellans solidas partes, cum complectantur, & contegant humida, contenta, humores, qui ab eisdem partibus continentur, fluitantia autem, seu impetentia, spiritus, qui vel momento, facillè partes corporis omnes vsquequaque permeent.

Quot sint prima, & essentielles februm differentia.
Caput XII.



Onstituta essentia ratione rei diuidentur, hoc est febris definitione, tanquam principio diuisionis eiusdè, ac nostræ methodi, consonum est, ut ad inuestigandas earundem februm

differentias, nostra conuertatur oratio, à primis & supremis generibus, seu speciebus, seu differentiis exordietes. Hinc rursus ad alias, donec ad tales peruenerimus, post quas ad vnum numero, & indiuiduum perueniamus: cum neque in primis & supremis persistendum sit, neque vsque ad aliquid perueniendum, non tamen vsque ad finem, neque vitiosis vtendum erit diuisionibus, quod quidem seruandum in omni diuisa methodo esse, decretum reliquit Galenus primo de arte curatiua ad Glauconem, cap. 1. Cum itaque primam, atque præcipuum differentiarum genus, ab ipsius rei diuise substantia, seu essentia sumatur; & febris essentia in eo quod præter naturam est calor, consistat, ut testatur Galenus 1. de differentiis februm, cap. 1. consequens est, ut primæ atque præcipuæ febris differentia, ex ipsius caloris differentiis oriantur: cuius quidem caloris differentia tres existunt, Hippocrate auctore sexto de morbis vulgaribus, & Galeno eodem primo de differentiis februm, cap. 1. Quarum vnã ex eo quod magis & minus, altera ex materia in qua hic præter naturam calor accenditur, & tertia ex modo motus caloris eiusdem accipitur, quas omnes vnã cū dignotionis modo, idem Hippocrates citato loco annotauit. Inter has licet omnino euidentes sint differentia, quæ in eo quòd magis, aut minus consistunt, quia tamen non propriè rei quali nomen quanti accommodati, propterea quæ à materia sumuntur differentia, in qua hic calor præter naturam accenditur: maximè propriæ sunt ipsius febris, & ob id ipsius caliditatis differentia, quæ à materierum differentia sumuntur quæ febrilem caliditatem suscipiunt, vnã cum Gal. citato lib. 1. de differentiis febr. cap. 1. explicandas proponimus, sunt etenim hæ non modò primæ, atque præcipuæ, sed maximè propriæ, ut inquit idem Galenus citato loco: reliquæ verò quæ sumuntur ex modo motus caloris citra iam dictas, dignosci nequeunt. Nam vel non mordaces, apparent primò statim in manus impositu, sed aliquo tempore post insurgunt, vel primo tactu mordaces, acrésque visæ sunt febres, demum per longum tempus iniecta in ægotantem manu, diminui videbuntur. Pari etiam ratione eadem differentia ex modo motus caloris, cum his quæ capiuntur ex eo quòd magis vel minus copulantur, cum primo tactu magnæ, & demum minui interdum apparent, interim contrà: quamuis magis propriæ sint hæ caloris differentia, quàm illæ, quæ ex eo quòd magis vel minus sumuntur. Quocirca Hippo. non sine muro artificio, primò differentias sumptas ex diuersa materia, in qua hic calor accenditur, paret facit demum eas, quæ ex modo motus, & tertio eas, quæ ex eo quòd magis & minus oriuntur, & nos quoque eas sectari proposuimus, quæ ex materia sumuntur, in qua hic præter naturam calor accenditur, tanquam maximè proprias febris differentias, ac præcipuas. Nam vel idem calor ipsius cordis corpus occupauit, aut eos, qui in eius ventriculis continentur humores, vel æream substantiam, seu spiritum eiusdem, quibus in substantiis tribus innatum calidum contineri, paulò ante conclusimus. Quocirca conuertatur oportet caliditas cordis innata, in qualibet febris differentia ad igneam, & cum eadem consistat in spiritibus, humoribus, ac solidis partibus, si præter naturam his calor in spiritibus suscipiatur, genus vnum februm gignitur, seu differentia vnã, quam diariam appellamus, si verò in humoribus alterum

Tres caloris differentia, ex quibus febris diuisio.

Commen. 1. tex. 29

Februm differentia à materia in qua calor accenditur, maximè propriæ de quibus hic agitur.

Februm differentia tres à materia.

Calidi innati substantia, ex partibus carnosius, spirituosius, & solidis.

lib. 8.

Diaria.
Humoralis.

Hellica.

Calor una substantia primum la da reliquis suis inuadit.

Obiectio.

Respons. ad obiectiorem.

genus febrium oritur, quod ex putredine ortum habet, & medicorum vulgus putridas, humoralésque febres appellat. At si in solidis cordis partibus, seu ipsius corpore accendatur, hecicam febrem appellare consueverunt. Non ab re itaque tres sunt vniuersales ac primæ febris differentia, ex eius essentia orta, calore inquam præter naturam, in diuersis ipsius cordis materiis, seu subiectis, accenso: seu vbi caliditas natua ipsius diuersimodè ad igneam conuertitur, secundà vnâ vel alteram eius substantiam, in qua consistit. Animaduersione tamen dignum est, quòd hic præter naturam calor, quem febrem nominamus, alias ex aliis, quas nuper diximus substantiis, incipit, spargitur autem, atque vnâ cum patiente afficit duas reliquas. Cum verò vna earum sufficienter incaluerit, seu fuerit calfacta, secundum illam dicimus febrem oriri, licet reliquæ simul cum eadem caleant. Neque enim parum refert, inquit Galenus, si calefcere, aut calfacta esse dicamus. Est etenim corpus nostrum vndequeque confluxibile, & conspirabile; verum facilima est ab humoribus ad spiritum caliditatis transumptio. Non æquè autem promptè vnâ cum spiritu accenduntur humores, corpus verò solidum humoribus, atque aëreæ, seu spirituosæ substantiæ, facilius calorem impartitur; quàm ipsum ab iisdem suscipiat, siquidem omnis tenuis substantia pròptius alteratur quàm crassa, vt patet præcitato libro 1. de differ. febrium, quamuis febrilis dispositio indifferenter alias ex aliis iam dictis substantiis sumat initium. Verum in genere primum laeso, non sistit, sed duo reliqua genera inuadit; vt ante diximus: ac nisi antea soluator, progressu temporis illa quoque similiter afficit, sed mox ex iis quæ diximus quibusdam dabitur dubitandi occasio. Nam si pro diuersa materia, in qua calor præter naturam accenditur, præcipuæ, ac maximè propriæ differentię sunt ipsius febris, sequeretur quòd vnum tantum genus, seu vna differentia earum esset morbus, reliquæ verò duæ non morbus, sed causa morbi existerent. Etenim vbi spiritus, aut humores, qui in cordis ventriculis continentur, calor hic præter naturam occuparet, non per se primò ipsius cordis functiones obladerentur; si prius ipsius cordis propria substantia, seu proprium corpus non afficeretur. Qua de re media læsione ipsius corporis cordis functiones eiusdem obladerentur ab hisce duabus febrium differentiis; & non per se primò, & ob id causæ morbi, & non morbus essent, neque enim spiritus, neque humores qui in cordis ventriculis consistunt, quampiam habent propriam functionem. His hunc in modum satisfacias, quòd in quacunque materia, seu cordis substantia calor præter naturam, qui febris est, accendatur, perpetuò morbus erit in intemperie, vt antea diximus. Dubitationi respondemus, quod vbi spiritus, aut humores cordis hic præter naturam calor occupauit, necessariò propria cordis substantia, essentia, natura, seu innatum calidum per se primò oblæditur. Etenim duæ iam dictæ substantiæ, spiritus inquam, & humores constituunt simul cum partibus solidis, ipsius cordis temperamentum, naturam, & calidum innatum: adeo vt absque eis cor ipsum proprias obire functiones nequeat: & propterea cor non esse, neque suam propriam essentiam, naturam, temperamentum, atque innatum calidum, neque proprias vires obtinere: requirit etenim nedum vt pars similis proprium temperamentum, sed vt instrumentalis optimam

compositionem, ex similaribus partibus ipsam constituentibus, vt ritè functiones suas exerceat; inter quas humores, & spiritus, qui in ventriculis continentur, teste Gale. connumerantur: quod clara luce scriptum reliquit lib. de foetuum formatione, cap. 3. quando asserbat: [cum verò duo sint cordis ventriculi, in dextrum sanguis è iecore mediocri caliditate præditus, in sinistrum longè calidior ex arteriis ingreditur; quos vtrosque ventriculos cum iam habuerit cor, & vrasque has materias, vt pote perfectæ iam ipsorum substantia, pulsât, secumque eadem agitatione arterias etiam mouet. Vnde tunc foetus non amplius vt planta solummodo, sed vt animal iam administratur.] Non igitur pulsât cor, neque suas proprias operationes exercet, ni prius & humores, & spiritus in ipsius ventriculis contineantur, cum sine his neque proprium obtineat temperamentum, neque optimè, ac perfectè sit constitutum: & propterea cum hæ duæ substantiæ, seu materiæ præter naturâ à calore occupantur, per se primò etiam eius operationes oblæduntur, quoniam ipsum cor secundum has eius partes propriam eius naturâ, ac temperamentum constituentes (simul tamen cū partibus solidis) oblæsum esse, ac febre dicimus: etenim innatum calidum in ipso tanquam fonte, ac principio consistens, ad igneam caliditatem conuertitur, propter spiritus, aut humores, in quibus febrilis calor accenditur, & eius quoque essentia consistit, perinde ac si accensum esset in partibus solidis ipsius cordis: & idem quoque innatum calidum ad igneam mutaretur caliditatem, secundum easdem partes. Constat itaque ex his quæ diximus, singulas iam dictas febrium differentias, morbos esse perpetuò in intemperie, & non quasdam esse morbi causas, vt quibusdam iunioribus parum rectè hæc intelligentibus visum est. De iis igitur primis febrium differentiis, non ab re pertractare intendimus, cum modum generationis, tum etiam dignotionis earum: quibus ritè definitis, & curandi earundem quoque via, seu methodus clarior fiet. Nam neque in aliis quibusdam curandi febres methodus consistit, hoc est vniuersalis quædam via, quam in dignotione ipsarum, ac modi generationis earundem cognitione, quibus habitis à natura rei exordientes, necessariis que indicationibus vtentes, quomodo iam dicta prima febrium genera methodo curari valeant, faciliè percipiemus. Nanque in his curandis præsertim methodus consistit: cum neque alias curare docuerit Galenus in suo libro de method. meden. licet quâdoque sermonis affinitate, quarundam particularium meminerit. Deinceps sub eadem via, seu methodo procedentes ipsis subdiuisis, ad magis particulares febrium differetias deueniemus, vsq; ad eas, quæ amplius secari non valent. Non derelinquentes etiam, & eas fortè, quæ accidentales sunt, tum proprias, tum etiam communes: ac viles, ab inutilibus læcèrantes, imitantes Hippoc. qui sexto de morbis vulgaribus, hoc ordine eas definiuit, ac enumerauit eas febrium differentias, quæ à medicis dignoscuntur, non ex iis quæ laborantes referunt, sed ex iis quæ ex ipso tactu visûque euidenter percipiunt, vt inquit Galenus in commento.

Quòd nulla febris generari possit, quin cor afficiatur.
Caput XIIII.

SI in corde quædam præter naturam caliditas generatur, cum febris sit, neq; fieri potest, quin cor ipsum afficiatur in quouis fe-

uis febrium genere: quoniam citra eius affectionē.
nec hectica, nec reliquarum vlla febris consistere
potest, Galeno teste, decimo meth. med. iure quisi-
piani quæret, num perpetuo, per se primò cor ip-
sum in his quæ sunt febribus, quæcunque fuerint, af-
ficiatur? Cui respondendū, verum esse, nedū in Hip-
pocratis, & Gale. doctrina, sed apud cunctos artis
medicæ auctores, opus esse cor ipsum calida affici
interperie, vt febri generetur, qua spiritus, aut hu-
tores, seu partes solidae eiusdem ponantur in calfa-
cto esse, licet reliqua semper propter viciniam in ca-
lescant. Verum sempiternæ veritatis haudquaquam
est, quod dicta cordis materia seu substantia, pri-
mò afficiatur, patet hoc inductiue in omni febriū
genere, in hectica quidem apud Galenum, eodem
decimo metho. quam incipere quandoque ex non-
nullis corporis partibus, in iocinore, ventriculo, &
aliis plerisque. Interim verò primū quod afficitur
esse ipsum cor, affirmat. De diaria item verifica-
uit Galenus, tum primo de differ. feb. cap. 3. tum et-
iam primo de arte curat. ad Glauc. cap. 3. & octauo
metho. med. docens quandoque in ea primò spiri-
tus, qui in ventriculis cordis continentur, accedē, vt
si ex ira fiat, interdum ex quibusdam aliis partibus
oriri, vt si ex aestu, frigore, cruditate, inguinum in-
flammatione, & aliis huiusmodi. Quid dicam de eo
febriū genere, quod ex putredine ortum habet? si-
mili etenim ratione generari potest, & putrescenti-
bus primò iis, qui in dextro cordis ventriculo con-
tinentur humoribus, & interim aliis, qui aut in om-
nibus vasīs, aut in quibusdam putrescunt, aut etiam
extra vasa. liquet hoc apud eundem Galenum, pri-
mò de differ. feb. ii. metho. tertio de prælag. ex
puls. cap. 7. Citra igitur ipsius cordis calidam intem-
periem, ita quod natua eius caliditas ad igneam co-
uertatur, secundum spiritus, aut humores, qui in ven-
triculis continentur, aut secundum partes solidas,
quæ naturam, & innatum calidum ipsius cordis con-
stituunt, nulla vnquam febris igitur poterit: quam-
uis vniuersum corpus supercalfactum fuerit, nam &
calor præter naturam, hoc ipsum, nondum tamen
febris existit, nisi cor vna calfactum sit: licet quan-
doque primò, & per se, seu per essentiam, interim
verò secundario, & per consensum, eadem materię,
seu substantię, afficiatur.

Quorū quibusve modis febres omnes generari cōtingat.

Capitulum XIII.

Quod verò à nonnullis causis, cum in-
ternis, tum externis, febres generari
possint, omnes (vt ita dixerim) nedū
medici, sed homines norunt. Verū
quis ab eisdem causis nostris corpo-
ribus alienat affectus, in quo febricitauimus, hoc
sanè multos latet: & a plerisque etiam, qui semedi-
cos profitentur, ignoratur, vt inquit Galenus, & eo-
dem primo de differ. feb. cap. 2. quocirca tanquā
magno opere necessarium, dixi simul cum eodem
Galeno vestigare, quā dispositionem in corpore fa-
ciant singulæ causæ, quæ febrem accendunt, hoc nā-
que dilucidato, facile patebit per quē affectum, in
quāmpiam febrem incidimus à quacunque causā or-
tum habuerit, etenim nisi quis ad vniuersam memo-
ria teneat, inquit Galenus, octauo metho. cap. i. &
quæ causæ febres generant, & in quo cuiusque cor-
poris affectus nūquā metho. febri prospiciat. At
quemadmodum non vnum videmus modum gene-

rationis, aut augmentationis caliditatis in aliis cor-
poribus omnibus, neque etiam ipsius ignis, sed vel
propter motum, vel propter putrefactionem, vel
propter adhæsum alterius caloris, aut propter de-
tentū calidi effluxus, aut propter admixtionem cali-
dæ substantiæ, eadem caliditas & generatur, & au-
getur, similiter quoque in nostris corporibus, non
vnus erit, neque generationis, neque augmentatio-
nis ipsius caliditatis, acque ipsius febris: quinimò
necesse est omnino modos generationis omnium fe-
brium, ad eos, quos proxime diximus, reduci, ex Ga-
leni auctoritate, lib. de caus. morbor. cap. 2. & primò
de differ. feb. cap. 3. à quacunque causa ortum ha-
buerint. Propter motum quidem, est vnus modus
generationis febris: nam cum quispiam immoderata
exercitatione vsus fuerit, in lassitudinem inci-
dit, caliditatem immodicam in musculis atque ar-
ticulis habens: etenim hi sunt qui primò motum ex-
cipiunt. Verum si non vltra progrediatur calor, at-
que cum solui contigerit, antequam totum animalis
corpus inuaserit, nil vltra lassitudinem consequitur.
At si in totum extenditur corpus, & hinc continua-
tim calor ad cor ascenderit, necessario in febrem
homo incidet. Ita quoque euenit in ira, quæ veluti
quidam feruor est, ac vehemens motus caloris, ac
potentia irascibilis in ipso corde existens: quia
ob immoderatum motum eiusdem caloris, nonnum-
quam per totum diffunditur corpus, simulque cum
hoc feruore, aliquando spiritus, interim vero & san-
guinis substantia calit. Atque ita febrem accendit
immodicam propter immodicum motum, ac feruo-
rem ipsius innati calidi cordis, in sanguinis seu spi-
ritus substantia existens: quamuis & ea quoque na-
tua humiditas, quæ in partibus solidis ipsius cordis
consistit, adeo feruere ex immodica ira poterit, vt e-
tiam ex ea febris hectica generetur, Gale. teste, pri-
mò de differ. feb. cap. 8. & tertio de prælag. ex puls.
cap. 7. quæ verò febris ex tristitia fit, ex solo motu,
nō autē ex feruore generatur. Ex adhæsu insuper rei
calidæ, siue sol, siue ignis, siue medicamentum cali-
dum contingat extrinsecus, aut proximum fiat, aut
adhæreat, calor præter naturam in nostris corpori-
bus generatur, modū tamē febris existit, nisi cor vna
calfactum fuerit. Nec est quispiā qui ambigat, quin
calidorum corporum vicinia, inquit Galenus citato
lib. de caus. morbor. cap. 2. alia concalescant, si modo
ad memoriā reuocet & balneas, & solem æstiuū, &
omnem flammam. Propter detentū quoque calidi ef-
fluxus, ex cutis densitate, qualis maxime frigefactis,
atque adstrictis corporibus, solet accidere, alius &
tertius modus generationis febris contingit, mor-
daci effluxu in corpore acerrato, atque detento, sem-
per enim animalia corpora distillant, idque duplici
modo, effusus ad exteriora vaporosis atque fuliginō-
sis superfluitatibus, ac rursus attracta refrigeratē, ac
ventilante natium calorem aërea substantia. Qua
propter si quis vehementer riguerit, aut in aqua na-
tauerit, quæ aut alumen, aut aliquā talē naturā acce-
perit, hinc adstringit cutim, atque densari contingit,
vt quæ distillari consueuerant, intus cohibeantur. Vbi
vero, fuliginosa fuerint, aëria seu mordacia, quæ in-
tus colliguntur, febris inde generatur: etenim non
attracto eo qui refrigerandi vim habet, ac re, neque
effusus ad exteriora eisdem fuliginosis excrementis,
calor augetur, quo cordi comunicato, fit febris, ob
mixtionē calidæ substantiæ. Rursus & quarto gene-
ratur, & augetur præter modū caliditas, & promde

1. Ex motu

Ex motu,
qui in ira,
ex tristitia
fit febr.

2. Ex ad-
hæsu calidi

3. Ex reten-
tione calidi
effluxus.

4. Ex admixtione calidae substantia.

etiam febris ex esculentorum assumptione, acris, & calidae qualitatibus, veluti aliorum, porrorum, caprarum, & aliorum huiusmodi. Nam quemadmodum aridi calami vehementius flammam attollunt, ita & haec esculenta calida, & acris calorem nostrum adaugent, ac immoderatum adeo efficiunt, ut cordis calori communicato, febrem generent. Calidae insuper potiones immodicae veluti vini veteris, & acris, cum corpus imbecille offenderint, & medicamenta acris, siue remedia morborum fuerint, siue venena, causam attulerunt, ut etiam homines febricitarent quandoque. Nam non semper ob harum causarum quamlibet febricitant, ut inquit Galenus eodem lib. de causis morborum, tum quia iis causae efficientis quantitas par non existit, tum quia dispositio, quae est eiusdem affectus magnam in eo quod plus, vel minus varietatem admittit. Adde quod & animantium corpora plurimum alterum ab altero differunt in hoc, ut aut facile, aut aegre à naturali recedant habitu. Quintus modus generationis caloris praeter naturam, & febris in nostris corporibus, est ob putredinem. Nam quemadmodum in externis corporibus, ex putredine praesertim seminum, & stercoris, tum generari, tum augeri caliditatem inspicimus, pari ratione quae putrescunt in animantis corpore, calorem quandam immodicum in his partibus in quibus putrescunt efficere possunt, & demum uniuersum corpus concalescentia, simulque & cor ipsum, febrem excitant. Consequenter humores multi aut crassi & lenti, ex multis, aut glutinosis & crassis cibis orti, hoc modo febres generare, cum ex eis, & obstructions fiant, & corpus male diffletur, quibus de causis necessario, ut in sequentibus patebit, putrescere oportet, & febres propter ea accendant. Hisce denique quinque modis, & non pluribus neque paucioribus, uniuersae causae tam externae, quam internae febres generare possunt. Quod

5. Ex putredine.

si quispiam quaereret, febres quae ad inflammationes consequuntur, quo illorum quinque modorum generentur? Cum Galeno primo de differ. febr. c. 3. dicimus, quod partes quae inflammatione afficiuntur, ratione putredinis febres accendunt; intrusus enim in ipsis influens humor, cum non bene diffletur, putrescit: & illud decimo metho. confirmavit his verbis. [Monstratum vero nobis est in iis, quae de febribus scripsimus, phlegmonas, seu inflammationes quoque propter putredinem humorum, qui in ipsis habentur, febres subsequi.] Sed mox instabis, non daretur itaque diaria febris ex aliqua inflammatione orta, si perpetuo propter putredinem humorum ad inflammationem febres consequuntur: etenim cunctae essent ex putredine ortae: quod quidem Hippocr. sententia aduersatur, aphor. 55. quarti libri, cum dicebat ex inguinum tumoribus febres omnes male, praeter diarias: sibi quemet Galenus pugnaret; qui eodem primo de differ. febr. cap. 7. eandem Hippocratis sententiam confirmavit, inquit, [Sunt tamen quaedam febres in inguinum tumoribus ex genere ephemerarum: qui tumores sunt ex genere inflammationum.] At dicimus nos, perpetuo febres subsequi inflammationes propter putredinem humorum, qui in ipsis habentur, attamen non semper eandem febrem dicimus esse ex genere earum, quae ex putredine ortum habent. Nam non

Questio.

Responsio ad questionem.

alia ratione, nec alio modo, quam ratione putredinis febrem accendunt inflammationes ipsae. Verum non semper putredo haec peruenit ad cor, sed interim

Obiectio.

Cur cum febris perpetuo consequatur inflammationem?

Responsio ad obiectionem.

Cur cum febris perpetuo consequatur inflammationem?

in loco inflammationis circumscribitur, ita ut fumus, vapor, seu fuligo putrida, ex putrescentibus humoribus, ad cordis ventriculos non perueniat, sed idem permaneat in loco inflammationis circumscriptus, sola alteratione per continuum facta, usque ad cor perueniente calore; omnibus simul humoribus putrescentibus, siue per unum, siue per duos dies continuos, quo tempore diaria febris ex inflammatione generatur; quemadmodum saepe evenit in inguinum inflammationibus, ubi potissimum ex manifesta causa ortum habuerint: quae febris diaria non alio modo generabitur, quam ea, quam propter viciniam generari diximus; seu adhuc, ut ex solis ardore. Nam communicationis ratione febris accenditur, cum semper calefacta parti proxima pars simul inalefcat, donec ad cor communicatio pertingat, & febris generetur. Quocirca quamvis initium generationis huius febris sit ratione putredinis, quia tamen eadem ad cor non peruenit, sed iam dicto modo generatur, quemadmodum diariae quaedam, propterea ex diariarum genere, & non earum quae ex putredine ortum habent, febrem hanc esse fatemur. Verum ubi nedum in inflammata parte humores putrescant, sed ex eisdem putridus vapor, putridaque fuligo usque ad cor attingat, ita ut ex putrescentibus illis humoribus ad cordis ventriculos quidam veluti fumus putridus tendat (quod fieri solet cum putrescens humor est viscere aliquo, seu vasis ipsis potissimum magnis ad inflammatam partem confluat) febrem hanc ex inflammatione ortam, ex earum genere esse asserimus, quae ex putredine ortum habent; neque enim hoc febrium genus alio modo, quam iam dicto generari potest: ut clarum est in Galeni doctrina, & praesertim citato lib. primo de differ. febr. cap. 3. cum omnino necessarium sit, vel putridam fuliginem ad cor attingere, ac humores, qui in dextro continentur ventriculo affici, ac ponit in calfacto esse; vel eosdem humores primo putrescere, ut videre licet in nonnullis pestilentibus febribus, ad hoc ut febres ex putredine generentur, de quibus febribus verba faciebat Galen. eodem decimo meth. cap. 6. cum dicebat, [Quocirca si quando dicam febribus, quae ex putredine accenduntur, tale quippiam conducere, vel non conducere, etiam eas quae a phlegmone excitantur in communi putredinis genere comprehensas intelliges.] Hinc liquet interdum diarias, interim vero, quae ex putredine ortum habent febres ex ipsis inflammationibus generari posse, ex Hippocratis testimonio, aphor. 55. quarti libri, & Galenus primo de differ. febr. potissimum ex inguinum inflammationibus pro diversa ratione, quae ex eisdem praeter naturam calor ad cor peruenit, & febrem accendit. Sed dices, si ex inflammationibus contingit interdum oriri febres diarias, sequitur non esse praecipuum earum indicium, ac inseparabile, quod ab aliqua causa recenti, & manifesta, quae ante praecessit, incipiat; quia omnes iuniores medici, visitato vocabulo, procatartica appellant, quemadmodum idem Galenus scriptum reliquit, citato primo libro de differ. febr. & eodem libro post pauca his verbis confirmavit, inquit, [quoniam Ephemerae omnes à procatarticis, siue praecipientibus causis originem habent,] quae dubitationem bifariam delere poteris: primo, verum esse inquit, quod semper diariae febres ab aliqua incipiant procatartica causa recenti, ac manifesta, ita quod sine iis causis generari non possint diariae febres. Verum

Verum non immediatè, perpetuò ab eisdem febres accenduntur, sed mediata quandoque. Nam satis est quod ab eadem causa procatarctica, recenti tamen & manifesta initium sumat. Fiet autem interdum ab ea non immediatè, sed aliis quibusdam præter naturam affectibus mediis: qua ratione dicamus ad bubones, seu inguinum inflammationes, tunc sequi diarias febres, cum bubo ipse ex aliqua euidenti causa fuerit ortus; Galeni testimonio, non metho. & primo de arte curatiua ad Glauconem, cap. 3. loquens enim de diariis febribus habet hæc verba, [Et quæ ex inguinum inflammationibus febres ortum habent, ex hoc genere sunt, præterquam si absque vlcere fiant manifesto, tunc enim suspicionem afferunt, & nullo modo mitescent,] similiter quoque dicendum erit de cæteris inflammationibus, si ab aliqua manifesta causa ortum habuerint. Cum verò causa hæc euident non præcesserit, febres consequi ex putredine ortas; similiter quoque dicendum erit, si ad stipationem, seu adstrictionem, seu pusillam obstructionem, aut cruditatem febris diaria consequatur. Nam semper recens quadam, ac manifesta externa causa præcessit, vt balneum aquæ frigida, aut aluminosæ, seu quippiam aliud infundans, aut poros cutis adstringens, aut ingestio plurimorum ciborum, seu eorum, qui facile concoqui non possunt, si ad cruditatem febris diaria consequatur. Aut dicas, quod cum multæ appareant esse particulares febrium diarium differentia, vna, quando iam prorsus abiit effectrix ipsarum causa, veluti vltis; altera quando hæc etiam adest, sicut stipatio, vt inquit Galen. decimo method. cap. 2. quod ille, quarum prorsus abiit effectrix causa, cum exquiritæ & propria magis diariæ febres sint, & dicantur, semper à procatarctis, siue præincipientibus causis originem habent. Quarum verò adhuc etiam effectrix causa adest, non perpetuò causa procatarctica existit, sed poterit esse interna. Ad Galeni autoritatem, primo de differentis febr. dicas veritatem habere in veris ac maximè propriis diæ diariis, quæ effectricem causam adhuc non habent. Hæc etenim à causa procatarctica omnes ortum ducunt, ita vt quæ ex meatuum densitate, pusilla obstructione, inguinum inflammatione, cruditate, ac cæteris huiusmodi causis, fiunt febres diariæ, non propriæ & exquisitæ tales sint, ac appellari debent. Sed iam tempus est ad propositarum febrium cognitionem devenire, prius tamen eiusdem febris diariæ, de qua modò erat sermo, indicia explicabimus: quoniam inter alias hæc febres sunt simplicissimæ; vt liquet ex Galeno, primo de arte curatiua ad Glauconem, c. 2. deinceps earum, quæ ex putredine ortum habent, & tandem earum, quas heclicas vocant.

Quid sit febris diaria, & quomodo dignoscatur.

Capit. XV.

Nditum est huic febrium generi diaria nomen; à Græcis *ἡμερησία* nomen, non siquidem de substantia ipsa, sed conuenienti nomine designatum, inquit Galenus, 9. metho. clarioris simul breuiorisque doctrinæ gratia, ab eo quod sæpius eis accidit, nomen indidimus. etenim vt plurimum necesse est eas, vltra vnum diem non porrigi; appello autem xxiij. horarum spatium, diem; adeo vt nox quoque vnà comprehendatur. Quidam à similitudine cuiusdam animalis ephemeris nuncu-

pati, hanc febrem nomen sumpsisse, asserunt, cuius meminit Aristoteles libro quinto de natura animalium, cap. 19. Est enim animal, voluere, ac quadrupes, à quibusdam veluti folliculis erumpens, quod genus animalis, in postmeridianum vsque diem tempus viuere & volare, mox descendente sole marcescit & languet, deinde occidente, moritur, vitam non vltra diem vnum agens. Vnde *ἡμερησία*, id est, diarium appellatum est. Sunt autem hæc febres tantummodo spiritus affectiones absque prauis ac malignis illis symptomatibus, de quibus docuit Hippocrates in prognosticis; vt liquet secundo de crifib. cap. 13. & propterea simplicissimæ ab eodem Galeno nuncupata. Huius generis febrium indicia vestigare intendimus. Neque enim difficile erit per eadem signa confestim in prima die exactè diariam febrem dignoscere, ac à cæteris duobus generibus fecernere; quemadmodum Galenus his verbis octauo metho. cap. 3. ostendit. [Ego verò, inquit, nec in omnibus agrotantibus fateor exactè me scire in primo die affectum, nec vllam diariam me febrem fugere, at verò vt nihil in victus ratione primis salte diebus pecces, hoc satis est, si discernere diariam à reliquis queas.] & primo de diff. feb. cap. 7. per hæc verba id confirmauit. [Eas autem, quæ in putredine humorum febres accenduntur, alias à diariis oportet existimari, neque earum discretio difficilis est: quoniam nonnullis videatur esse impossibilis;] nec obstat si primo de arte curat. ad Glauconem, cap. 2. loquens de diariis febribus, dixerit: [sed cura quidem harum febrium in promptu est; at earum cognitio, maiorem exigit diligentiam, de qua nemo ante nos, quantum oportuerit scriptum reliquit.] Na octauo de meth. med. cap. 3. & primo de diff. feb. cap. 7. haudquaquam difficile esse in prima die hoc febrium genus dignoscere, ac à reliquis fecernere tradidit; primo vero de arte curatiua ad Glauconem, non genus hoc febrium, sed eiusdem generis particulares differentias, à diuersis causis ortas, maiorem requirere diligentiam falsus est; licet earundem curatio in promptu sit. Cum igitur ad ægrum accedes, primum à maximis, quæ circa ipsum sunt indiciis, consideratio exordienda; deinde ab aliis, adeo vt nec minimum aliquod omittas, nam vt magis aut minus ei quæ sit ex maximis indicationi credamus, ex aliorum fit adiunctione; maxima quidem in omnibus febricitantibus signa, in pulsibus, atque vrinis consistunt; vt liquet eodem primo de arte curat. ad Glauconem, cap. 2. idque non ab re. nam citra cordis affectum (vt sæpius dictum est) febres generari nequeunt, cuius propria functio, ac peculiaris, pulsus est. Quocirca signa sumpta ab eo, tanquam à peculiari cordis actione, non immerito maxima erunt. Similiter & quæ ab vrinis signa capiuntur pro dignoscendis febribus, non minus maxima appellantur, cum excrementum sit in venis atque arteriis acervatum, & febres omnes venosi generis affectiones sint, comprehendentes in hoc genere etiam arterias, vt inquit Galenus primo de crifibus. Quapropter dicebat, in febribus omnibus, ad vrinæ præcipue attendere oportere. Vnum itaque maximum appellatur signum, tanquam à propria cordis functione sumptum; reliquum verò, tanquam à proprio excremento venosi generis, cuius febres omnes affectiones sunt. Hic verò addere poterit, vt fatetur Galenus, & quæcunque alia circa faciem. Hippocrates scripsit, accubitus quoque & respirationem. Item ea quæ per superio-

Explicatur
locus Gal.

Loco præ-
claro.

Signa dia-
ria febrium.

Ex pulso-

Vrinæ.

Accubitus,
respiratio-
ne, &c.

ra, vel inferiora excernuntur: & si quid aliud accidere circa aliquam corporis partem, aut operationem consistere videas. Neque ex his aliquod negligenter pretercas, & cum veluti chorus quidam, omnia concinnè loquuntur, tunc etiam fidere oportet. Hæc quidem omnibus febribus communia sunt, itaque in his simplicissimis, de quibus præfens est sermo, nil horum relinquere oportet. Atqui dices, cur

Obiectio.

*Commen. 1
tex. 29*

*Dilutio ob-
iectionis.*

*Commen. 1
tex. 29*

*Ex calidi-
tatis suavi-
tate.*

*Commen. 1
tex. 29*

*Pulsus
qualis in
diariis.*

inter maxima signa febricitantiū, non connumeraverit id quod sumitur ex caloris qualitate, cum & magis essentiale signum fuerit ipsius febris, eodem simul cum Hippocrate auctore, sexto de morbis vulgaribus. & ipsemet nono, & decimo de meth. med. cap. 4. testatur, nedum ex pulsu & vrina, verum etiam ex caloris qualitate evidenter percepisse febrem absque putredine, atque secreuisse ab ea, quæ ex putredine ortum habet: Nos verò asserimus simul eum Hippocrate, & Galeno magis essentiale signū ipsius febris esse id, quod à calore, aut eius qualitate percipitur, quam reliqua duo, quæ ex pulsu & vrina capiuntur. Verum vel propterea à Galeno derelictum, primo de arte curat. ad, Glauconem, cap. 2. tanquā omnibus manifestum, vel ob id quod non perpetuò, quemadmodum ex vrina & pulsu, vnum ab altero febrium genere, per idem signum ex caloris qualitate sumptum, secerni queat: cum non semper per vniuersum corpus talis caliditas effundatur, ita ut tactu sentiat; ut patet sexto de morbis vulgaribus. haud ægrè etenim eandē caloris qualitatem perturbari contingit: in febribus siquidem ex putredine ortis, ut in malignis lipyriis dictis, ac pestilentibus quibusdam, & in ipsis item diariis: quanquam ad reliquas si comparentur, calor mitis appareat; inter easdem tamen sunt, quæ acriorem, ac mordacem magis quam reliquæ, calorem tangentibus inferunt; ut si ex solis ardore, tristitia, immodico labore, vigiliis, & reliquis huiusmodi ortū habeant: quocirca non ab re Galenus eodem decimo de meth. meden. dicebat. [Nam & ex pulsu & vrina, & ipsa nonnunquam quæ in calore est qualitate, evidenter id discernimus quod semper ex pulsu & vrina:] non semper autem, sed nonnunquam ex caloris qualitate, febrium genus percipiebat, si cū putredine, aut absque ea fuisset ortum. Nec etiam indicium hoc à qualitate sumptum libro 1. de differenti. febr. cap. 7. tanquam proprium, essentiale, atque inseparabile prætermisit, cum docuit diarium febrium signa; id autem est caliditatis suauitas: licet interdū perturbari possit adeò ut à medico non percipiatur, Hippocratem sectatus, qui eodem sexto de morbis vulgaribus, mites appellabat has febres, cum dicebat; [Febres quidem, aliæ mordaces sunt manui, aliæ mites:] hoc est minus insuaves, seu mordaces. Est itaque caliditatis suauitas proprium, atque inseparabile huiusmodi febrium indicium, qui etiam calor vaporosus existit, inseparabile quoque, æqualis atque incompressus ascensus in caliditate ac pulsibus simul, non tamen proprium, cum & aliis quibusdam febribus adsit: consistente etiam febre, mediocritas adest maxime eiusdem caliditatis. Hæc nanque mediocritas, in incremento & vigore iis potissimum febribus inest, ac magis, licet quandoque aliis quibusdam adsit. Pulsus verò exquisitè seruat eam quæ secundum naturam æqualitatem, atque molliorem, & ordinem, vel liquet secundo de crisi. cap. 13. mutant autem omnes diariæ, quantum in ipsis est, in magnitudinē, celeritatem, ac crebritatem,

pulsus: ut tertio de præfagitione ex puls. cap. 7. scriptum est. Nam si concurrat alius affectus, mixtam, ut ipse Galenus inquit, oportebit esse mutationem ex illa, & hac, quæ comitatur, febris. Ipsius verò diariæ, quatenus diaria est, pulsus ad magnitudinem, celeritatem, ac crebritatem mutatur. Verum frequentia à proportionē deficit secundum exteriorē quietem. hæc etenim minus est frequens, quam ea quæ quietis est internæ. est nanque in Galeni doctrina exterior quies, quæ contractionem præcedit, consequitur autem pulsus distentionem, interna verò quies, à Galeno appellatur, quæ distentionem præcedit, contractionemque consequitur: mutatur autem quælibet earum ad mutationem ipsius motus pulsus, quem præcedit, & propterea quæ systolen seu contractionem pulsus antecedit, exterior quies appellata, eodem modo, quemadmodum & systole mutabitur, interior verò modo quo diastole, seu distentio, cum ipsam præcedat: qua ratione Galenus dicebat primo de differentiis febr. cap. 7. quod magis inseparabile, & proprium signum diarium erat, quod nullo modo ad celeritatem ea pars pulsus, quæ systole dicitur, tendit: & si aliquādo hoc contingat, minimum, ac vix perceptibile existit, parumque à naturali tenore mutatum, quo fit, ut necessario quoque frequentia secundum exteriorē quietem, à proportionē deficiat eius quæ secundum interiorē, & totum, propterea quod febres diariæ humorum putredine vacant: in quibus verò putredo adest, & contractionis celeritas augetur, & exterioris quietis frequentia, seu crebritas, eò quod citius arteria considere incipiat, quod per systolen, seu contradictionem, fuliginosa excrementa expurget, ut paulo post dicemus: quæ quidem in febribus diariis, aut exigua sunt, aut omnino non fiunt. Accessione verò cessante, artieriarum motus in hoc febrium genere, in totum assimilatur illi, qui in sanis deprehenditur: cum in nulla alia febre ad naturalem habitum reuertatur pulsus, neque si multum temporis inter primæ accessionis finem, & secundæ principium intercidat, quemadmodum in tertianis, & quartanis: in his enim febribus remanet signum: in ephemeris autem in totum aboletur eadem accessione cessante, Galeno auctore, primo de arte curatiua ad Glauconem, cap. 2. ita ut neque putredinis, neque etiam ea vnius motus inequalitas, hoc est in vno pulsu arteriæ, quæ omnibus communis est, percipiatur, ut liquet eodem primo de arte curatiua ad Glauconem. In omnibus itaque diariis quatenus diariæ sunt, pulsus tales sunt. Quod si Galenus secundo de crisi. cap. 13. dixerit ad paruitatem quandoque, & nonnunquam ad magnitudinem pulsus mutari, pro causarum diuersitate, ex quibus ortum ducunt illud asseruit, & non quod tales diuersæ pulsus mutationes in diariis fiant, quatenus diariæ sunt. nam sub hac ratione, diariæ omnes, quantum in ipsis est alio non concurrente affectu in magnitudinem, celeritatem, & crebritatem pulsus mutant, ut citato libro 3. de præfagitione ex puls. cap. 7. à Galeno decretū est. Cum sudore item aut rore, aut omnino cū aliquo optimo vapore sit harum declinatio: ac integra febris cessatio sequitur, & si capitis aut alterius partis dolor simul inuaserit, neque hic amplius persistet. Inter maxima quoque signa connumerantur ea, quæ in vrinis consistunt. Quocirca inseparabile, ac proprium diarium febrium indicium est collectio in vrina, statim in prima die, Galeno auctore, primo

primo de diff. feb. ca. 7. quoniam nonnullæ quidem suspensiones, nonnullæ verò subsidentias bonas habent, quædam autem nebulas, omnes tamen bene coloratæ sunt, vt secundo de crisib. cap. 13. scriptum est: ac in inclinatione multo meliores, quàm circa febris principia videbuntur. Et, vt summam dicam, vrinæ omnino similes, iis quæ secundum naturam se habent, aut non multum à naturali statu recesserunt; vt liquet citato libro primo de arte curatiua ad Glauconem, idque non ab re, cum neque humores, qui in vasis continentur, neque partes solidæ in hoc febrium genere, sed spiritus duntaxat accendantur: ob id neque in colore, aut substantia, neque in contentis, videbitur multum à naturali statu vrina recedere. Vnū verò præcipuum, ac inseparabile talium febrium indicium existit, quòd ab aliqua incipiat causa procacitica, recenti, ac manifesta: quamuis earum proprium non sit, vt patet eodem primo de diff. feb. cap. 7. Nam & aliarum febrium quædā ex causa manifesta sunt, quæ ante præcessit, vt inquit idē Galenus, quod de hæcticis febribus patet, cum in sapē allegato libro primo de differentiis febrium tertio de præfagitione ex puls. cap. 7. De iis verò, quæ ex putredine ortum habent, in dubium venit, num ex tali quapiam causa, quæ ante præcessit, generari possint? Huic videtur Galenus citato loco satisfacere iis verbis, cum inquit: [Illud verò nonnunquam vsu venit, quòd aliqua ex præincipientibus causis sui ratione, febrem accendat ephemeram, subsequitur autē altera ex putredine humorum, quando quod afficit corpus, ad id habile fuerit, hoc est quando imputum extiterit, ac superflua materia redundans, hæc enim cum in ephemeris immoderatum calorem contraxerit, atque hinc putrescendi principium acceperit, alteram speciem febrium succendit, priore desinente.] Quòd verò à præincipientibus causis, seu procacitica, non immediate, sed mediatè, febris aliqua ex putredine humorum accendatur, in his verbis nobis patefecit Galenus, [cum primum diariam efficiant: sequitur deinceps altera ex humorum putredine in iis corporibus, quæ impura sunt, ac excrementis abundant.] Posset item cum eodem Galeno teneri, quòd ex eisdem causis procacitica, febres ex putredine non immediate etiam, sed mediatè gigni queunt. Verum alia ratione quàm mediis febribus diariis, vt pote internis, & antecedentibus causis mediis, in eisdem etiam corporibus impuris, quæ nimium crassas & glutinosas cibis fuerint vsa, longo potissimum tempore; ex quibus deinceps, succi crassi & lenti generati, atque adaucti, febres, media obstructione & putredine generant. Nam ob putredinem, cibi quicunque glutinosi & crassi sunt, febrium sunt causæ, inquit Galenus, eodem primo de differentiis feb. cum facile sit eum humorem, qui ab ipsis generatur, obstrui, atque intendi. Quapropter non solum hæcticæ febres, sed earum quædam, quæ ex putredine ortum ducunt, ex causa manifesta, quæ ante præcessit fieri possunt. Quocirca cum dixit Galenus, nam & aliarum quædam ex causa manifesta fiunt, quæ ante præcessit, nedum hæcticis subintelligere voluit, sed etiam quæ ex putredine oriuntur. Discernes autem eas à diariis, quoniam causa hæc manifesta, quæ ante præcessit in generatione febris ex putredine humorum, saltem non erit recens, sed diutina. Quamobrem Galenus quando hoc asserbat esse præcipuum ac inseparabile signum febrium dia-

riarum, dicebat incipere à causa procacitica manifesta, & recenti, haud ignarus quòd ab ea quæ recens non est, modo quo diximus, queat febris generari ex humorum putredine: licebit propterea si libeat, interrogare, nunquid aliqua manifesta antecesserit causa? Qua etiam ratione interpretanda sunt eiusdem Galeni verba citato libro primo de differentiis feb. vbi indicia describens febrium, quæ ex putredine humorum generantur, dicebat: Primum quidem non inseparabile, sed proprium quòd nulla earum quæ præincipientes causæ dicuntur, eas antecedit, intelligendum siquidem est, de recenti, & immediata. Nam semper hæc febres pro recenti earum causa internam, tanquam immediatam, & non procacitica habent. Etenim si alias exponerentur hæc verba, nedum proprium, sed inseparabile esset tale indicium febrium ex putredine ortarum. Quorum indicia exponere iam tempus est, à maximis quoque exordietis, quæ ex caliditatis qualitate, pulsibus, ac vrinis similiter sumuntur:

Explicatur
locus
Gal. cap. 7

Febres ex putredine ortas, via, & dignoscendi ratio.
Caput XVI.



ALIDITATIS igitur qualitas, harum febrium, quæ ex putredine fiunt, maximum est indicium, vt Gale. inquit. Nihil enim in ea suauis, neque moderatum est, neque vllò pacto caliditas similis ei existit, quæ in ephemeris sentitur, sed mordax quodāmodo potius, tactuq; molesta: & quemadmodū fumus oculos & nares, sic ipsa tactum videtur erodere. Id autem commune est tum febribus ex putredine ortis, tum etiam hæcticis: vt patet ex Hippocrate, sexto de morbis vulgaribus, cum dicebat: [febres aliæ mordaces sunt manui, aliæ mites:] Per mordaces intelligens vniuersum hoc genus febrium, ex aduerso distinctum ipsis ephemeris: quamuis hoc genus, nullum quidem commune nomen sortitum sit, vt liquet eodem primo de differentiis febrium. Verum maior erit, ac mordacior, ex putredine ortarum febrium caliditas, potissimum cum primum manus admouetur, contra verò ipsius hæcticæ, vt dicemus: in principis autem successuum, vt in quibus calor adhuc suffocatur, ac superfluitates intus succenduntur, non statim admota manu discernitur, at per moram prædicta caliditatis species ex penitioribus partibus effertur: prædicta itaque caliditatis species, quæ appositam manum pungit, atque erodit instar medicaminis acris, est putredinis humorum progenies, quæ manifestè quidem sentitur incrementibus, ac consistentibus febribus, non manifestè autem, neque statim, in incipientibus; vt citato libro primo de diff. feb. cap. 7. scriptum est: quamuis in hæcticis quoque caliditas mordax sentitur, alio tamē modo, vt demonstrabimus. Propriū verò atque inseparabile febrium, quæ in humoribus accenduntur, indicium est, summisionis, seu contractionis pulsuum; quam Greci συστολήν appellant, velocitas: quæ manifestius quidē incrementibus febribus, non obscurè autem incipientibus, ac consistentibus fit. Quapropter Galenus tertio de præfagitione ex puls. asserbat hoc esse perpetuum, & præ cæteris proprium inuasioni feb. ex putredine humorum ortæ, vt arteria contractione efficiatur celerior, & si quis in cognoscenda contractione est exercitatus, perpetuum hoc & cōstās, initij accessionis signum habebit; vbi contentio-

Signa febrium ex putredine, à caliditatis qualitate.

Particula prima, scilicet 29.

A pulsus.

ne aliqua, ut frequenter admonuimus, pulsus prædictus sit. Nam in languidis contractionem docuimus cognosci non posse, quamuis hæc febres in vigoribus, ut idem Galenus habet, utrumque possident, motum celerem, & distentionis, & contractionis. Præter ea crebritatem mutant ex æquo, cum externæ quietis, tum internæ. In initio autem accessionis, non perinde, sed magis augment contractionis celeritatem, in incrementis tum hanc, tum etiam externam quietem plurimum concitant. Harum mutationum pulsus, haud facile causa reddi potest: nam cum febrium omnium differentia propria & per se, quæ ex pulsibus capiuntur, sint ratione vsus mutati, & non facultatis, nec instrumentorum; ut patet eodem tertio de præfagitione ex puls. c. 7. sitque distentionis vsus in Galeni doctrina pro refrigerando, ac ventilando calore per attractum aërem, ipsius verò contractionis pro expurgando fumosis, ac fuliginosis excrementis, commune autem utrisque ut calor symmetria seruetur; ob id celerior quodammodo semper in quolibet accessionis tempore, erit ipsius pulsus contractio in febribus ex putredine ortis. Quanquam id manifestius percipiatur in incrementis accessionum, quam in earundem principiiis, ac vigoribus. Nam cum vsus contractionis sit pro expurgando fumoso excremento, cuius copia in huiusmodi febribus generatur, in principiiis tamen accessionum cum calor adhuc suffocetur, ac superfluitates intus succendantur, adeo ut natura adhuc potens non sit easdem vincere, exigua omnino erunt, quæ debent eo tempore expurgari fumosa excrementa: quapropter non tam manifestè percipietur hæc contractionis celeritas. At in incrementis natura ipsa incumbente ad abstergendum fumosum illud excrementum, utpote incipientem iam euincere succensam materiam, nedum manifestior apparebit hæc celeritas contractionis, verum crebrior erit pulsus, secundum externam quietem, adeo ut pulsus in externa quiete creberrimus videatur; quoniam celerius contrahitur, ac citius arteria confidere incipit propter urgentem vsu. In vigore autem utrumque habent pulsus, motum celerem, & distentionis & contractionis, crebritatemque mutant ex æquo, cum internæ, tum externæ quietis. Etenim æqualiter ferè est & distentionis, & contractionis auctus vsus, cum & caliditas ipsa præter naturam, admodum fuerit aucta, ipsumque excrementum fumosum, nihilo diminutum: propterea Galenus citato libro tertio de præfagitione ex puls. cap. 7. dicebat: [vbi propè iam attigerint vigorem succensis humoribus feruescentibusque, ingens incrementum suscipit distentionis celeritas, contractionis verò par permanet celeritas: vbi iam vigeat planè febris, in illa accessione ad summam celeritatem peruenit distentio, & diminuitur celeritas contractionis, ac in remissionibus, eiusdem contractionis celeritas dissoluitur, præsertim cum ad integritatem aut propè eam peruenierint.] Generatur itaque semper contractionis celeritas initio accessionum harum febrium, per incrementum augetur, & in vigore, ac remissione modo quo diximus se habeat, adeo ut vsque ad summum vigorem persistat, in cuius fine minui incipit, & in inclinatione dissoluitur: licet non ita manifestè in eisdem temporibus percipiatur; sed manifestius in incrementis, non ita manifestè incipientibus, ac consistentibus ipsis accessionibus; & quanquam in vigoribus

(ut diximus) utrumque habeant, motum celerem, & distentionis, & contractionis, & crebritatem ex æquo mutare videantur, cum externæ quietis, tum internæ: tamen & eo quoque tempore contractio distentione erit celerior, & externa quiete pulsus crebrior, licet obscure illud percipi possit, cum ambo motus celeres sint, & utraque quietes crebra: qua ratione singula Galeni dicta de pulsibus putridarum febrium, conciliabis, cum diuersa videantur. Sunt itaque omnibus febribus communes pulsus celeres, in eiusmodi autem nedum celeres, sed systole diastole celerior, proprium atque inseparabile earum indicium est. Reliquæ verò differentia pulsus omnes, quæ in his febribus animaduertuntur, alium potius affectum quam febres sequuntur, quorum affectum, ut inquit Galenus, duo sunt genera, aut facultatis, aut instrumentorum vitium, quapropter inæqualitas pulsuum, atque etiam coloris, siue in principiiis, siue in augmento contingat, est huiusmodi generis febrium proprium indicium, non tamen inseparabile. etenim multæ & sine sensibili inæqualitate incipiunt, atque ad consistentiam accedunt. Similiter proprium istarum febrium, non tamen ab eisdem inseparabile, est pulsuum afflictatio: (sic autem nomino, quando incipiente accessione, satis paruos atque inæquales pulsus habent ægrotautes) alicui tamè generi febrium hoc signum commune non est, quemadmodum neque & inæqualitas ipsa, nisi alicuius casus ratione superueniat. Comitatur etiam has febres in initiis accessionum pulsus paruos ac velox, cum verò consistant magnus simul ac velox, & quæ in exteriori quiete existit frequentia, ut antea diximus, in huiusmodi febribus manifestè deprehenditur, cuius similis neque in ephemeris, neque in hecticis apparet, ut patet eodem primo de differentiis febrium, capite septimo. Durus autem pulsus neque proprium, neque inseparabile huiusmodi febrium indicium est, neque alterius generis febrium, utpote neque ephemerarum, neque hecticarum: comitatur verò magna ex parte hecticæ febres; nonnunquam verò duo alia genera aliquo præter naturam affectu interueniente, ephemeræ, vbi ex nimio algore, aut ob nimium solis feruorem, aut lassitudinem, seu reliqua huiusmodi, contingant, adest interim pulsus durus illis febribus, quæ ex humorum putredine oriuntur, quando aliquod viscerum, vel inflammationem, vel durum tumorem pariat, aut quispiam alius casus, veluti neruorum tensio adfuerit, aut siccitas. At quicquid sit de pulsu duro, satis sit nosse in febribus, ea ratione qua febres sunt nunquam fieri, ut citato libro primo de differentiis febrium, à Galeno scriptum est. Etenim tunicis arteriarum, aut ad congelationem, aut tensionem, aut siccitatem, durities aduenit, ut liquet eodem loco. Maximum quoque & harum febrium indicium existit cruditas vrinæ, debilis etiam concoctio proprium est earundem febrium indicium. Etenim neque cruda, neque debiliter concocta, in ephemeris apparet. Cæterum earum quidè alterutra seorsum, est proprium huiusmodi febrium indicium, simul autem utraque dicta, secundum disunctionis proloquium, omnino inseparabile: huic enim febrium generi, vrinæ vel omnino crudæ, vel debiliter coctæ, principio associantur. Neque vnquam magnū aut effatu dignum coctionis indicium, in talibus febribus in primis vrinis apparet, si excipiamus eam,

eam, quæ fit ob permutationem ex ephemeris febribus, de qua paulo post verba faciemus. Appello autem eandem vrinam, cum nullum omnino signum in ea appareat coctionis, neque in substantia, neque in colore, aut etiam contentis. Debiliter autem coctam, in qua nullum tale signum coctionis manifestè, aut perfectè visitur; cum vnum in incrementis, reliquum in vigoribus huiusmodi febrium apparere consueverit, vt liquet primo de crifibus. cap. 3. Proprium quoque & harum febrium signum existit, non tamen inseparabile, initium sumere à rigore, vbi neque ardor solis, neque frige factio valida præeferit, omnibus tamen non inest; quemadmodum neque horrores, ab huiusmodi febribus sunt inseparabiles, licet quandoque in ipsis exordiantur. Proprium quoque & non inseparabile (vt prius diximus) talium febrium indicium est, quod nulla earum, quæ procacitè, sed præincipientes causæ dicuntur, eas antecedit, neutri enim aliorum generum hoc inest. Contingit quoque præter prædicta indicia, eo tempore quo accessio consistit, casum aliquem febbris ardentis apparere, aut quidam alij, qui in febribus epial, s. lipyris, hemitricis, aut paludosis appellatis, aut in quapiam alia tali febre, videri solent. Quare vbi hæc adsint, ex his quoque dignoscere eas licet, non solum earum genus, sed etiam aliquam earundem speciem. Quod si post febres declinationem, integra non successit quies, siue cum sudore, siue quous alio modo declinet, ex duobus alterum, vel permutationis est argumentum, si omnia quæ præeferint, febrium ephemerarum fuerint indicia; aut si nulla ex his fuerint, statim ab initio febrem aliquam ex his, quæ putredinem humorum sequuntur, inuasisse indicatur. Atque proprium simul & inseparabile in omnibus successione indicium est, quod febris diaria, quietem integram subsequenter non habet. Contingit vero aliquando vbi ephemera febris consistit, aliquod permutationis indicium ostendi, vt pote indicia, quibusdam eo tempore apparentibus febribus, ex humorum putredine. Verum multo magis, cum declinare ceperint, eadem permutatio erit manifesta, cum eo tempore ab sit ea tranquillitas, quæ adesse deberet, neque integra succedit quies, & aliquod putredinis signum manifestè in calore, pulsu, vrina, aut eorum pluribus magis patebit. In hisce tamen febribus ex putredine ortis, quæ diarias consequuntur, in primis vrinis effatu dignum coctionis indicium apparere poterit, erit autem id ratione diariæ prius ortæ, & non eius, quæ ob putredinem generatur, & eandem consequitur.

Cur febres hecticae appellantur, & quomodo generantur. Caput XVII.

CONSEQVENS est, vt earum febrium, quas Græci *ἐκ τῆς πυρετῆς* appellant, indicia tradamus, prius tamē quibusdam animaduersionis non minùs vtilibus, quàm necessariis artis medicæ tyronibus, pro curatione, designatione, ac prognostico earundem. Appellatur porro has febres hecticas, vel quoniam firmæ, ac fixæ sunt quemadmodum habitus, quoniam eos affectus, qui ægrè discutuntur in *ἐξ* Græci vocant, seu *κατὰ*, quemadmodum eos, qui faciliè discutuntur in *ἐκ* Græci, seu *κατὰ*, appellantur, vel quoniam ipsum corporis habi-

tum comprehenderunt. (sic enim vocare consueverunt solidas partes humidis ex aduerso distinguentes, vt patet primo de differentiis febrium) cap. 3. quæ igitur febres ægrè discutuntur, ipsumque corporis habitum comprehendunt, hecticae nuncupantur. Intellego autem cum Galeno, corporis habitum eiusdem corporis partes solidas, ex aduerso distinctas humidis, per humiditas intelligendo tum humores, tum spiritus. Hæc namque sunt illa tria, quæ nostra constituunt corpora, vt antea docuimus. Hippocratis auctoritates continentia inquam, contenta, & imperum facientia ab eodem appellata. Quæ etiam ratione simul cum Galeno negauimus, neque pauciora febrium genera prima reperiri posse. Atqui solidæ partes hoc modo intellectæ, ex triplici substantia constituuntur, vna quæ veluti ros quidam existit inspersus in spatiis inanibus dictarum partium, qui etiam natia, seu naturalis humiditas ab eodem Galeno appellari solet, vt liquet libro primo de differentiis febrium cap. 9. interim humor proprius partium similium, ex quo partes ipsæ nutriuntur, ab eo nominatur, vt septimo, & decimo meth. medendi, scriptum est. Hanc humiditatem, seu torem quandam in omnibus sparsum animalis partibus, proprium vnde partes nutriuntur naturalem humorem appellatum, innatum quoque spiritum Galenus appellare consuevit, non vniuersum, sed eiusdem non paruam substantiam, in eo consistere falsus est. Nam hunc innatum spiritum, in omnibus contineri partibus, sed non vndequeque esse sui similem; veluti nec sanguinem. necesse dixit: tum in spatiis manibus, non paruam eius inesse substantiam, imò potius veluti materiam quandam leuiculam etiam mutationem exposcentem, ad innati spiritus qualitatibus suis absoluti generationem. Nihilominus tamen iam tum etiam admodum ad naturalia opera conducentem asseruit, quinto de simplicium medicamentorum facultatibus. cap. 8. Altera est, quæ ab eodem Galeno substantia carnosa, ac adiposa dicitur: quæ substantia ex humore concreto constat. Tertia est, quæ fibrosa & membranosa nuncupatur, citato libro septimo, & decimo de medendi methodo. Harum partium quantitas, par semper manet, sed iis, qui adhuc inaugentur numero duntaxat, qui verò absoluti iam sunt, etiam magnitudine, carnosa verò substantiæ magnitudo variatur, etiam si non augeatur animans. Pari modo & spiritus substantia, inquit Gale. vndecimo meth. c. 3. tantum non quolibet momento, tum minor, tum maior conspicitur, ex quibus tribus partibus, naturam constare, eodem loco fatetur. Has quoque fibrosas & membranosas substantias, quandoque solidas duntaxat appellauit, seu solidiores distinctas à carnosa, seu adiposa, & rorida, vt liquet eodem 7. meth. med. cum dicebat siccitatem insanabilem esse, si prorsus sit consummata. Est autem prorsus consummata, vbi solida similium partium substantia, reddita est siccior, similiter & 10. eiusdem, ipsius verò inquit, solidis siccatis, fieri nequit, vt homo prorsus perfanetur. Nam primum eiusmodi febris propriam partium humiditatem ex qua nutriuntur, depascit, hinc verò ad carnosum genus transit, quod circa tum fibrosas, tum membranosas partes solidorum corporum hæret; ita deinde ipsas solidas populatur: & paulo ante fieri non posse dicebat, vt solidarum partium siccitas consummata fanetur. Quibus in locis per solidas partes, membranosas duntaxat & fibrosas

Habitus corporis quid.

6. de morb. vulg. par. 7

Partium solidarum triplicem substantiam. Ros. 7. cap. 6 & 11. cap. vlt.

Carnosa substantia. Fibrosa.

Per solidas partes aliquid quandoque fibrosæ solæ intelliguntur. Locis supra citatis.

Loco citato

substantias intellexit. Et eiusdem naturam, ut diximus, ex tribus partibus constare fatebatur, ex spiritibus, & earum, quæ dicuntur vere solidæ, substantiæ; & tertia ab iis carnosa, quæ cuique particulæ est sua: vere solidas appellas partes fibrosas & membranofas, acarnosis distinctas, quamvis citato primo libro de differ. febrium, aliter senserit; quemadmodum etiam com. aphorism. 7. 2. lib. quo loco carnosam partem, contineri in solidarum appellatione, ostendit, asserens, quæ enim pauco tempore extenuata sunt corpora, ab humorum & spirituum evacuatione, non ex solidorum colliquatione id perpessa sunt: quæ verò longo tempore extenuantur, iis, carnes contabescunt & reliqua. Quod verò propriæ & veræ partes solidæ, sint iam dictæ fibrosæ & membranofæ substantiæ, quas ex semine genitali conditas esse Galen. fateatur, patet tum libro de semine, tum etiam commen. aphorism. 15. primi libri, & propterea cum pereunt, iterum gigni non posse, cum reliquæ duæ si pereant, regigni possunt, luce clarius Galen. 10. method. medend. manifestavit, iis verbis [illud potius intelliges singularum particularum substantiæ molem ex tali maxime completam esse natura, quæ utique ut in sinuosis viceribus videre licet, & perire, & regigni potest. At verò nec fibrosa, nec nervosa, membranofa, &c. natura eandem generationem habere cernitur.] Caterum quamvis hæ præcipuæ ac propriæ solidæ partes, seu à Galeno quandoque nuncupentur; cum tamen asserimus præter naturam calorem, in huiusmodi febribus, in solidis partibus accendi: per solidas animalis partes, eas vniuersas subintelligimus, quæ humidis ex aduerso distinguuntur, hoc est, prout substantia sunt diuersa, à spiritibus & humoribus, quas duas substantias, cum calor præter naturam occupauerat, duo reliqua iam dicta prima febrium genera oriebantur. In cuius febris hæcticæ generatione, quemadmodum etiam de reliquis demonstrauimus, opus est ut ipsius cordis partes solidæ accendantur, ut ea generetur: quanquam & per essentiam, & primo sæpe; interim verò & per consensum, & secundario eadem solidæ cordis partes affici possint, aliàs haudquaquam febres hæcticæ gigni possent. Quomodoque autem generentur, duplici via ortum habere possunt, nam sæpenumero ex ardentibus febribus, quæ adeo protrahuntur, ut longitudinetemporis, humorem in cordis corpore contentum exsiccent, aut consumant, ortum habent, sæpe etiam in hanc febrem incidunt, qui ex diariis, aut ardentibus, atque acutis febribus, rectè curati non sunt: & præsertim qui cum aqua frigida potu indigerent, præter id quod eam non biberint, nullum aliud refrigerans medicamen thoraci, ac præcordiis medici apposuerunt, aut cataplasmata etiam calida eisdem partibus adhibuerunt: ex iocinoris quoque, aut ventriculi inflammatione, si diu febrem tollerauerint ægri, insequuntur febres hæcticæ; aliquando etiam ex pulmonis, aut thoracis affectibus, oriuntur: & ut simpliciter dicam ex omnibus diuturnis inflammationibus, quæ nobiliores partes occupauerunt, læuitatibus intestinorum, alui profluuiis, ac dysenteris, insequente torius animalis, ac præsertim corporis cordis febrili caliditate, quæ cum difficultate amouetur. Reliqua autem & secunda via, ortum habent febres hæcticæ, cum statim ab initio inuaserint similem primi sui ortum ephemeris facientes, aut ex tristitia, aut ira, aut lassitudine nimia, vna cum solis feruore contracta: quicunque verò natura sunt sicciores, ac præsertim si vna calidam habuerint temperaturam, vitamque elegerint in laboribus, vigiliis, ac curis, victuque paucos, hos statim ab initio solet hæctica febris inuadere, ex ira vel tristitia, ac magis æstate, statimque temporis calido & sicco, ac loco præterea consimili, ut inquit Galenus primo de differentiis febrium, cap. 8. Nam nullus eorum qui habitu corporis præditi sunt humidior, statim ab initio huiusmodi febre correptus fuit: licet Gale. 7. de crisi, in fine, fateatur quod nulla febris hæctica in primis diebus, sed in progressu temporis fiat. Illud tamen intelligere oportet, modò à procatactis causis originem non habeat, nam circa has nunquam ab initio febres hæcticæ inuadere consueverunt; ut ipsemet testis est eodem primo de differentiis febrium, cum ait [quoniam ephemeræ omnes à procatactis, siue præincipientibus causis originem habent, hæcticæ autem quando sine his generantur, nunquam ab initio inuadere consueverunt] id quoque confirmavit Paulus cap. 31. libri secundi, quo etiam loco duplicem iam dictum modum generationis harum febrium conscripsit.

Num omnes partes, quæ solidæ appellantur, in febribus hæcticis accendantur, & num semper cum siccitate copulentur, & quemadmodum cum marasmo conueniant & dissideant.

Caput XV III.

SE D quæres, num omnes solidarum partium substantiæ, quas tres asseruimus esse cum Galeno (ipsas solidas aduersus humidas distinguentes) in huius febris generatione, semper accendantur, seu calefactæ sint, an vna duntaxat, vel duæ ipsarum calefactæ sint, reliquæ, vel reliquæ incallescant? Huic satisfacere videtur Galenus eodem primo de differentiis febrium, & 10. method. medend. cum dicebat febrem hanc primum propriam partium humiditate depascere; hinc ad carnosum genus transire; & ita deinde ipsas solidas verè dictas populari, principiumque febris hæcticæ esse cum primum cordis temperies eueri inceptit; neque natua humiditas protinus aboleretur, neque virtus plurimum laborat, sed primum fit velut quadam effluencia humiditatis, quo in tempore facile est huiusmodi febrem sanare, dicebat tanquam nihil adhuc virtute perpessa: ratione quoque confirmari poterit. Nam cum tres iam dictæ substantiæ, quæ partes solidas constituunt, satis diuersæ sint, atque inter se distet, saltè tenuitate, & crassitudine, nulli in dubium venit, quod quæ tenuior existit, promptius accendatur, cum omnis tenuis substantia, promptius, quam crassa alteretur, ex Galeno, citato primo libro de differentiis febrium. Cum itaque tenuioris substantiæ sit natua illa humiditas seu ros dispersus in spatiis intermediis dictarum partium, quam reliquæ duæ & carnosa seu adiposa adhuc tenuior sit, quam fibrosa & membranosa, consequens est, ut ille natiuus humor primò, carnosa & adiposa substantia, secundò & vltimò membranosa, & fibrosa, accendantur in febre hæctica: neque vnamquam ordo hic perueri contingat, nec inuicem implicari possint, si plures dentur differentiæ, seu species hæcticæ febris; quemadmodum nos cum Galeno tenemus, & in sequentibus declarare conabimur.

Cum sermo habetur de febribus hæcticis, quid per solidas partes intelligimus. In omni febre hæctica cor afficitur. Hæcticarum generandarum duplex ratio.

mur. At qui fiet, interrogabis, quòd ordo hic perueri non valeat, nec febres eadem complicari possint, cum in febribus quæ ex putredine ortum habent, ordo hic quandoque peruertatur? etenim videmus ex pituita putrescente, interim ex atra bile febres à principio generari, non autem ex bile quæ est tenuior. Insuper sæpenumero & hæc febres inter sese complicantur, ut patet secundo de differen. febr. cap. 7. secundo de crisibus, & sexcentis aliis in locis. Huius respondemus, parum rectè tres has substantias partes solidas constituentes, tribus humoribus, seu potius excrementis simillasse. Hi nanque præsertim cum excrementa sunt, ac putrescentia, haud vllam constituunt nostri corporis substantiam, quemadmodum rotida substantia, carnosa, ac membranosa. Quo fit ut illi pro maiori vel minori quàm habent aptitudinem suscipiendi calorem præter naturam, indifferenter possint à principio ab eodem occupari; licet vnus substantia quàm alter fuerit tenuior, quod haudquaquam negauit Galenus, imò illud sæpius contingere affirmavit, præsertim citato libro primo de differentiis febr. cum dicebat. [nam dispositio febris alias ex aliis eorum, quæ ante diximus, sumit initium. Istæ verò tres substantiæ, quæ solidas animalis partes constituunt, propterea quòd tenuitate, & crassitudine inter se distant, sunt copulatæ in vna natura vnòque genere eorum quæ corpus constituunt, quod genus cum à calore præter naturam occupatur, febres heclicas parit, verum cum non ex similari, æquali, atque homogenea substantia constet, sed dissimilari inæquali & diuersa, quæ tenuior earum existit, necesse omnino est, ut primò afficiatur ac calfacta sit, reliquæ verò duæ calfiant.] Quæ etiam ratione cum ordo hic perueri non possit: nam semper in vna substantia quæ dissimilari existit, si accendatur calor præter naturam, pars tenuior promptius & prius accenditur, patere poterit, cur est quòd si plures sint differentiæ seu species febris heclicæ, eadem complicari non possint, sed perpetuò vnā altera consequatur, ac incipiat ea in qua efferuescit seu calfactus est innatus humor, seu roridus qui in spatiis inanibus, præsertim ipsius corporis cordis, continetur: sequatur deinceps carnosarum & adiposarum partium, atque ita demum fibrosarum ac membranosarum accensio. Illæ item febres quæ in humoribus accenduntur, per putredinem habent generationem, quæ verò heclicæ appellatæ vel per motum, vel per adhæsum, quo fit ut in illis ordo haud ægrè perueri possit, ob maiorem, vel minorem quam habent aptitudinem humores ut putrescant, in heclicis verò, semper quod promptius sua natura alterari consuevit, primò accenditur, cum neque in reliquis solidarum partium substantiis, quæ crassiores natura sunt, accensionis promptitudo magis quàm in tenuioribus reperiri possit. Etenim in febribus, quæ per hos affectus ortum habent, nulla alia aptitudo, ut promptius accendatur eorum materia, reperiri potest, quàm tenuitas substantiæ frigiditate non reluctante, ob id ubi spiritus non fuerint, necessarium omnino est, ut humor hic inspersus per spatia inania existat, non autem carnosus, aut membranosa substantia. Num verò heclicæ febres perpetuò cum siccitate coniunctæ sint, vel interim sine siccitate consistere valeant, nondum liquet, quamuis febris ipsa affectio sit semper calida & sicca; ut prius cum Galeno & Hippocrate

conclusum est. Ut verò huius quæsitæ veritas pateat, animaduersione dignum est, quod cum asserimus num febris heclica quæpiam citra siccitatem consistere queat, non de ea siccitate verba facimus, quæ necessario febrem, quæ febris est consequitur, sed intelligimus per siccitatem marasimum seu tabem, quæ quidem corruptio corporis viuientis est ex siccitate, ita ut idem sit, ac si dicas num febris heclica possit quandoque absque marasimo, tabe, seu siccitate alicuius substantiæ solidarum partium consistere. Pro quo iterum animaduertas oportet quatuor in vniuersum nostris corporibus esse siccitates, à Galeno scriptas septimo method. medend. quarum vna est partium quæ verè solidæ appellantur, membranose inquam, ac fibrosæ substantiæ; altera est adiposæ & carnosæ. Tertia cum propria humiditas vnde partes nutriuntur omnino est assumpta diuersa ab iis: & quarta siccitas est quæ in propriis cuiusque particulæ exilibus arteriis venisque consistit, quæ etiam ex sanguinis penuria provenit: nam venæ succo sunt inanitæ; hic verò succus, seu sanguis qui in iam dictis exilibus continetur venis atque arteriis, de propria partium solidarum substantia non est; quocirca et si in febre heclica quandoque exsicceatur, eam tamen siccitati coniunctam esse haudquaquam asserimus, neque idem succus inter secundas (ut aiunt) humiditates, connumerari debet, ut quibusdam falso visum est; cum adhuc sanguis sit, & intra vasa contineatur: & propterea Galen. eodem 7. de method. meden. narratis tribus siccitatibus, volens de hac quarta verba facere, dicebat. [Diuersa ab iis siccitas est, quæ in propriis cuiusque particulæ exilibus arteriis, venisque consistit.] & paulò infra, [facilima verò omnia sanatu, quarta est, asseribat, in qua venæ succo sunt inanitæ.] De reliquis itaque siccitatibus subintelligere oportet, cum dicimus febrem heclicam esse cum siccitate coniunctam, quam iterum consistere citra siccitatem; quandoque posse, cum Galen. fatemur: quoniam sine siccitate, sæpius heclicæ febres consistunt, inquit primo de differen. febr. cap. 8. & paulò ante duplex esse heclicarum febrium genus, definierat: quarum vnum cum tabe, reliquum absque ea esse fatebatur. Etenim primo fit velut quædam efferuescentia natiue humiditatis, cum primò heclica generatur febris, neque eadem protinus aboletur, quo in tempore vsque dum consumptio quædam eiusdem roridæ humiditatis efferuescentiam sequatur, febrem heclicam absque siccitate, seu tabe consistere clarum est, apud eundem Galenum citato lib. 1. de differentiis febrium. Nam donec pars aliqua huius humoris dispersi in spatiis particularum consimilium intermediis, potissimum ipsius cordis referuatur, solum febris heclica existit, ut ipse inquit, nondum etiam tabida, id etiam confirmauit Paulus cap. 31. libri 2. his verbis. Quousque igitur humiditatis aliquid reliquum est, heclica solum febris dicitur, cum verò periclitatur, ne nihil amplius humoris super sit, absolutus iam marcor constituitur. Hinc sequitur, quòd licet in tali efferuescentia, humiditatis pars aliqua exsicceatur, nondum tamen siccitati copulatam febrem heclicam asserimus. Etenim quousque pars aliqua huius humoris referuatur in corpore cordis contenti, & non vniuersa fuerit assumpta, siccitatem haudquaquam esse fatemur, & propterea neque febri heclicæ coniunctam esse; id quod confirmauerat Galen. citato

Sic itae
quadru-
plex.
cap. 5. & 6.

Heclica
quandoque
citra siccitatem.

Loco citato

Cap. 5 & 6.

lib. 7. method. medend. cum de siccitatibus verba faciens dicebat. [etiam tertia videlicet, siccitas est, cum propria humiditas vnde partes nutriuntur, omnino est absumpta :] est enim ipsius tabis (quam *μαρasmus* Græci appellant) principium, cum primum febris hectica propriam partium humiditatem ex qua nutriuntur, depascit, ac præsertim ipsius cordis : sine cuius siccitate, neque marasmus gigni potest, ut liquet, tum eodem primo de differentiis febrium, & 10. method. tum etiam libro de marasmo, qui interim simplex, quandoque compositus existit, simplex, ubi ex siccitate duntaxat corpora corrumpantur, quamvis permanere siccitas ipsa per se non mutata oppositione, quæ consistit ex calido, & frigido, non potest, ut liquet 10. method. medend. compositus, ubi aut caliditas, aut frigiditas immodica, siccitati asserit. Atqui ex inediis, simplicem oriri tabem contingit, ex frigiditate siccitati accedente, marasmus senio confectos habet : isque natura consequitur, ac in decrepita ætate accidere solet, extincto nativo calore, quod nil aliud est quam mors, quæ sine sensu doloris, ac secundum naturam ex siccitate contingit, ut citato libro 1. de differentiis febrium liquet, cap. 8. Consueverunt etiam & præter naturam hoc modo contabescere, quæ affectio à Philippo senium ex morbo vocatur, in quam non solum senes, sed etiam pueros vidimus incidisse quàm plurimos, inquit Galenus citato loco, cap. 5. Qui verò marasmus ex calore fit febribus quibusdam hecticis contingit, non omnibus, de quo præfens est sermo, quamquam & alius quoque reperitur marasmus, qui synopsisus ab eodem Galeno citato libro de marasmo appellatur, distinctus à frigido, & ab hoc quem exurentem nuncupat, & in quibusdam hecticis contingit febribus. Incipit autem hic exurens marasmus, quando nativus humor, qui in vnoquoque dispergitur corpore, in spatiis particularum consumilium intermediis, ac in cordis substantia aboliri periclitatur : cum verò iam res eo periculi peruenierit, ut nihil ex tali humiditate superstit, tunc exquisita tabes existit. Verum si ad carnosum genus transit, quod circa tum fibrosas, tum membranosas partes solidorum corporum hæret, ita ut caro, & adeps sine liquore, tunc non amplius incipere, sed incrementum marasmi dicimus, at deinde cum ipsas solidas verè dictas partes populatur, tunc vigere marasmi, non absque ratione asserimus : quod si mauis, non in tria tempora : sed in tres species marasmi distinguere, pro diuersa natura, seu substantia partium quas depascit, quæ solidas (quas diximus) partes constituunt, haudquaquam reclamabimus : neque illud Hippocratis ac Galeni pugnabit, vnus etenim erit, per tria tempora dissidens, si per solidas partes, eas totas intelligamus, quæ ex aduerso distinguuntur humidis. Tres non ab re etiam dici poterunt, si diuersas substantias quæ iam dictas solidas partes constituunt, tanquam diuersas species naturas habentes seorsum considerauimus. Ceterum siue vnus, siue plures dicantur esse marasmi, satis sit nosse febrem hecticam, interim absque eo consistere posse, ut pote ea incipiente. Incipit autem febris hectica, quacunque generetur causa, eo tempore quo quædam velut effluuiescentia fit ipsius innatæ humiditatis dispersæ in spatiis intermediis consumilium particularum, præcipue tamen ipsius cordis, cum neque vlla hectica febris effici possit, priusquam cor ipsum afficiatur, ut sæpius dictum est : quo tempore, naturalis cordis temperies eueri incipit, licet virtus plurimum non laboret, neque iam dicta humiditas protinus aboleatur. Deinceps cum consumptio quædam effluuiescentiam sequitur, eademque in longum tempus protracta, ipsæ similes particule, quæ sunt veluti cordis elementa, sicciores redduntur, atque etiam alimenti inopiam tenuiores, ac tantum virtus laborat, quantum siccitas atque caliditas in ipsa febre inualuerit, hoc tempus non amplius initium, sed incrementum febris hecticæ appellari potest : habet tamen maioris, minorisque ratione, non paruum latitudinem, ut paulo post dicemus. Vbi verò non tantum humor in corpore cordis contentus, & carnosæ seu adiposæ partes eiusdem consumptæ fuerint, verum etiam ad fibrosas & membranosas, siccitas peruenierit, atque eas populetur febris hectica, tunc exquisitè eam consistere dicimus, atque omnino tabidam esse, ut quæ ab ea passione non differat, quæ verè exquisita tabes appellatur : quamvis febris hæc non tantum sicca, sed etiam calida sit affectio ; ut liquet eodem primo de differentiis febrium. Ex quibus haud agere quispian percipere poterit, quæ ratione marasmi principium, à principio febris hecticæ, differt, nam illud est cum omnino rorida humiditas fuerit consumpta, hectica verò principium erit, cum talis humiditas effluuiescat, perdurat autem quousque eiusdem pars aliqua referuatur ; quo etiam tempore febris hectica duntaxat, nondum autem tabida appellabitur. Incrementum insuper febris hecticæ ab eo, quod marasmi existit, non minus dissentire videtur : etenim in eius incremento, non modo carnosæ & adiposæ partes colliquantur, verum etiam humor hic absumitur, qui prius in eius principio velut quandam effluuiescentiam passus erat. At in incremento marasmi modò dictæ carnosæ & adiposæ substantiæ duntaxat colliquantur, cum in eius principio nativus humor omnino fuerit absumptus. Determino autem principium cum Galeno non dierum, aut horarum numero, sed ipso dispositionis modo, in summo autem vigore, omnino conueniunt febris hectica, & marasmus, cum ambo consistere fateamur, eo tempore, quo fibrosæ & membranossæ substantiæ, cordis præsertim, verè solidæ appellatæ, ab eisdem consumantur : tunc enim tale aliquid cor patitur, quale lucernæ lychnium, seu formes, cum plurimum exustus fuerit, nam qui ita torrefactus est, frangitur atque dissoluitur, & ex ariditate continuatè amittit, adeo ut neque si magnam olei copiam superinfundas flamma abundanti or possit accendi : talis siquidem est febris, quæ est tabida omnino, ut quæ ab ea passione non differat, quæ tabes appellatur, ut prius dictum est.

Quando vnum, duo, & tria dici possint febrium hecticarum genera.

Capitulum XIX.

SED occasione eorum quæ diximus non ab re quæres, num vnum duntaxat sit febrium hecticarum genus, vel duo, aut tria, vel plura esse possint genera, species seu differentias dixeris ? Huic breuiter hunc in modum satisfacere licebit, asserens cum Galeno vnum esse genus febrium hecticarum.

eticarum, si modò taliter dicta sint, quoniã ipsam corporis habitum comprehenderunt, per corporis habitum solidas subintelligentes corporis partes, humidis ex aduerso distinctas, vnum etenim est harum partium genus, continentia ab Hippocrate solidà à Galeno appellata, & propterea cum hoc genus calor præter naturam occupauerit, vnum duntaxat febrium genus etiam orietur, ex aduerso & eis quæ ex humorum putredine oriuntur distinctum, licet genus hoc febrium hecticarum, & id quod ex putredine humorum generatur sub vno genere, quod quidem nullum nomen commune sortitur est (diarriis ex diuerso distinctum) contineri possunt, vt patet eodem primo de differentiis febr. cap. 7. Cæterum quamuis hæc ratione vna duntaxat febris hectica dici possit, tamen pro diuerso ipsius dispositionis modo eam licebit cum Galeno in tria tempora, seu tres gradus subdistingere, in principium videlicet, seu primum gradum, quod quidem existit, cum quædam veluti effluuientia sit natiui humoris dispersi in spatiis intermediis earundem partium solidarum; perdurat autem quousque pars aliqua eiusdem humoris reueratur, & in incrementum seu secundum gradum, quod à consumptione, quæ effluuientiam sequatur, exorditur: protelatur autem hoc tempus, seu secundus gradus febris hecticæ, quoad vniuersus humor, & carnosæ seu adiposæ substantia, cordis præsertim, liquefiat ac consummetur, cum verò fibrosas & membranofas cordis partes febris hæc depopulatur, non amplius incrementum, nec secundum gradum, sed summum vigorem, & tertium gradum ipsius febris hecticæ appellabimus. At si febre hanc consideraueris, pro vt citra marasimum, tabem, seu consumptionem dictarum partium solidarum consistere poterit, vel cum earundem consumptione, cum eodem Galeno primo de differentiis febrium, fatemur duplex esse febrium hecticarum genus; quorum vnum est citra tabem, reliquum verò cum tabe: quapropter, posita hac febrium hecticarum distinctione, dicebat Galenus: [Febrium autem hecticarum quando quidem duplex est, vt nuper definimus, genus earum:] Indicia deinceps exponamus, nec propterea cum eodem Galeno negamus tres posse dici differentias seu species hecticarum febrium, quinimò illud affirmare nõ veremur. Nam si tres diuersæ substantiæ, vt sæpius diximus, partes solidas constituent, nec præter naturam calor cum primum febris hectica generatur, æqualiter eas occupat, sed earundem vna primò sufficienter incaluit, reliquæ verò incallescunt; & deinde passim ad reliquas duas pertransit, non sine forti ratione fateri possumus, hæc ratione partibus solidis definitis, prout in se tres diuersas substantias continent, quæ non æqualiter, sed passim, ac ordine quodam præter naturam calorem admittunt, tres esse hecticarum febrium differentias seu species, cum & dictæ substantiæ specie quoque differant. Quarum vna ac prima erit, cum calfactum esse in natua humiditate susceptum fuerit, eadem veluti effluuientiam quandam perperla erit. & secunda species, cum humiditas hæc natua fuerit abolita cõsumptaque carnosæ ac adiposæ substantia, quibus siccioribus redditis, ac verè solidis partibus exsiccatis, fibrosis, inquam ac membranosis, tertia species febris hectica generabitur. Quod insuper confirmare videtur Galenus citato primo libro de differentiis febrium, cap. 9. nam narratis signis fe-

bris hecticæ, quæ omnino tabida existit; insuper definito principio generationis ipsius febris citra tabem, subdebat hæc verba: [deinde autem consumptio quædam effluuientiam sequitur, hæcque in longum iam protracta, ipsæ similes particule, quæ sunt veluti cordis elementa, sicciores redduntur, atque inopia alimenti, tenuiores: & tantum virtus laborat, quantum siccitas atque caliditas in ipsa febre inualuerit, quando earum altera exuperans, virtutem imbecillior rem reddere potuit, huiusmodi febris iam quodammodo ad vtranque partem declinat, ac medium obtinet locum, inter eam tabidam febre, quæ penitus curam nõ admittit, atque illam de qua paulò ante diximus, quæ facillimè curari potest, sunt verò & in hac latitudines multæ: quoniam & dispositiones ipsius multæ in eo quod magis, & minus diuersitates: quæ igitur æqualiter distat ab vtraque, & ea scilicet quæ exquisitè tabida est, atque illa in qua nihil est adhuc tale, medio quodammodo se habet ad curationem, dubio ad partes ambas inclinans momento: quæ autem proximior tabidæ fuerit, periculo vicinior est: cum quæ alteri primæ magis adheret, non paruum salutis spem possit asferre:] His verbis asserere videtur Galen. tres esse hecticarum febrium species, seu differentias, nam positis duabus extremis, altera citra tabem, altera verò omnino tabida, constituit mediam, eam inquam quodammodo ad vtramque partem declinare, ac medium obtinere locum, inter omnino tabidam, quæ penitus curam non admittebat, & illam quæ facillimè in principio curari poterat. Præterea ipsum cum latitudine magna consistere affirmavit, maioris, minorisque ratione, non ab re, quoniam cum sub ea nedum roridæ humiditatis, verum etiam carnosæ & adiposæ substantiæ siccitas contineatur, prout æqualiter, magis aut minus carundem substantiarum pars esset ablumpta, eo æqualiter, magis, minusve ad vnam vel alteram febre declinare, atque propterea maioris, minorisque periculi existere. Quod verò hæc febres, licet specie differant, inter se complicari nequeant, neque in earum generatione ordo peruerri queat, vt iam dictis patere potest. Vnum itaque esse febrium hecticarum genus, nec minus, & duo, neque à ratione alienum esse tria genera, seu tres species ac differentias, neque plures dari posse, cum Galeno fateri haudquaquam veremur, modò eas diuersa ratione consideraueris, sed tempus est vt earum indicia deinceps exponamus.

Quæ sint febrium hecticarum indicia communia, examinaturque exemplum Galen. de calce aqua conspersa.

Caput XX.

QUOMMUNE est omnibus hecticis febribus quod pusilla, ac semper à principio ad finem vsque sint æquales, inquit Galen. I. de differ. febr. cap. 9. & 3. de prælag. ex pul. cap. 7. febrium hecticarum, duo hæc sunt propria signa, dicebat, si perpetuò sibi illæ similes sint, nec inuasionem vllam accessions, nec incrementum nec vigorem, nec remissionem habeant, nec ferè febricitare se percipiet ægrotus: in quibus etiam febribus, neque multa sed astuta, & c. multumque occurrit tægenti caliditas, quamuis acris, ac mordax (non tamen adeo vt in febribus quæ ex putredine ortu habent) eadè insuper licet primò tactu mitis ac debilis sentiat, processu tamen temporis, cum

Signa hecticarum, æqualitas accessions.

Caliditas non multas, sed astuta, & c. multumque occurrit tægenti caliditas, quamuis acris, ac mordax (non tamen adeo vt in febribus quæ ex putredine ortu habent) eadè insuper licet primò tactu mitis ac debilis sentiat, processu tamen temporis, cum

plus tangendo immoraberis, paulatim acredinem, atque erosionem quandam ostendet, atque etiam arida manui se offeret, id quoque confirmavit Paulus cap. 31. lib. 2. afferens, caliditas autem primo oecursu languida, paulo post acris, & erodens erumpit: cum etiam arterie circumstantibus partibus calidiores sentiuntur, maximum sunt hecticarum febrium indicium, ut liquet citato lib. 1. de diff. feb. cap. 9. si quidem hoc illis nequaquam aliis aduenit in febribus: manifestius autem hic accedit casus, cum loti fuerint agrotantes, aut quouis alio modo calfacti & lassati, ita ut aliqua profuatur humiditas ac caliditas effletum etenim aliis partibus omnibus calor percipitur moderatus, ubi calor ita expirauerit: qui vero in arteriis est, nihilo minor sentitur: est vero eius manifestus sensus, cum se pulsus attollunt, qui neque ipsi in talibus expirationibus permittuntur, sed continue in eodem statu perseverant. Pulsus febris hecticæ, pari modo quantum in eis est, in eadem differentias conuertunt, ampliusque in his mutatur celeritas, inquit Gal. citato lib. 3. de prælag. ex puls. cap. 7. dicit autem in eadem differentias, in quas omnes diarie mutantur: nam de iis prius verba fecerat. Sunt autem hæ differentie, magnitudo, celeritas, & crebritas: quamvis, ut ipse faretur, in febribus hecticis, amplius mutetur celeritas; verum post multa eodem in loco scripsit hæc verba, nec magnus pulsus, nec vehemens cum hecticis febribus vnquam concurrunt, sed si alterutrum habeant horum, non sunt hecticæ. De vehemēti clarum est, cum perpetuo in hecticis febribus imbecilla sit vitalis facultas, quoniam intemperatum cordis corpus existit, utpote cum incaluerit iam, licet in principio plurimum non laboret; comes etenim est intemperiei imbecillitas facultatis, quemadmodum temperiei, robur. De magno autem fateri possumus quod licet febres hecticæ quantum in ipsis est, in magnitudinem quodammodo pulsus mutant, quamvis minus quam catere febres quæ febres sunt, cum minus in eis usus vrgeat; quia tamen perpetuo cum eis facultatis vitalis imbecillitas associatur ob mox ante dictam causam, ob id magnus pulsus esse non poterit, cum vna ex causis magnitudinis deficiat, quæ est virium robur, semper interim & altera quoque quæ est instrumentorum obtemperantia propter duriem ex siccitate contractam, quapropter idem Galenus assererat quod si cum febribus concurrat alius affectus, mixtam oportebit esse mutationem ex illa & hac quæ comitatur febre, quinimodo de hecticis sic scriptum reliquit citato loco, quod nisi alter cum iis affectus casu coeat, ne incipiant quidem vnquam, quamvis hectica febris rarissime à primo die existat: ex quo affectu vitalem facultatem, aut instrumenta variari contingit; & non vnum duntaxat, quemadmodum ab ipsis febribus hecticis quatenus febres sunt: quinimodo collatione facta ad pulsus, qui sunt in febribus synochis dictis, minores, rariores, ac tardiores tanto sunt hecticarum febrium pulsus, quanto etiam earum caliditas minor est: ut patet libro 1. de diff. febrium. Proprium item & inseparabile omnibus hecticis febribus indicium est, ubi allato cibo febre accendi, ita ut caliditatis multitudo sentiat, ac pulsus a magnitudinem & velocitatem augeri percipias; ita ut incompressa annotatio facta videatur eo tempore, quo maxime omnes horas suspectas subterfuisse videtur: statim enim hora vna, vel dua-

bus post assumptum cibum, quæcunque agrotantem tetigerint, alteram febris accessionem adesse putabunt: voco autem annotationem incompressam, in qua neque horror aliquis neque extremarum partium frige factio facta est, neque veluti quedam dormitatio, neque aliqua insignis pigritia, aut omnino inæqualitas aliqua, vel in caliditate, vel in pulsu: adhuc autem magis, neque paruitas, neque debilitas, neque horum aliquid aliud; sed quemadmodum, & cuique alteri ex cibo maior, ac velocior pulsus efficitur. Fit quidem aliquando & in quibusdam febribus aliis, incompressus ascensus, at si vniuersum indiciorum acerrum inspexeris, non parum differt: etenim in omnibus aliis febribus huiusmodi introitus præter cibum assumptum, sunt incompressi, in febribus autem hecticis, contrario modo se habet omnino, neque etiam fit aliqua annotatio in tempore aliquo, sed est vna febris continua, velut ea quæ synochus appellatur. Verum in hac veluti flammam plurimam admouenti manum habet occurrentem, pulsusque sunt frequentissimi ac maximi: In hecticis autem febribus, neque multa occurrit caliditas, pulsusque tanto minores sunt, rariores, ac tardiores iis qui in synochis comprehenduntur, quanto etiam caliditas minor fuerit. Differunt etiam ab aliis febribus, quæ incompressas habent annotationes; hoc maxime febres hecticæ, quod afflictatio aliqua omnino illis adest cum cibum assumpserint in accessionis principio, in hecticis vero post cibum assumptum, vel quandam afflictationis experte annotatione fieri contingit, quæ non est, (ut antea diximus) annotatio, manifestus autem die sequenti hæc febris agnosceretur, si diligentius obseruabimus, quousque post assumptum cibum in caliditate ac pulsibus alteratio facta perdurauerit: eo usque namque manifeste alterata apparebunt, donec ex cibo digesto ac apposito cordis siccitatem humectauerint; deinceps ad pristinum habitum reuenteretur, in quo antea quam cibum assumeretur, conspiciebatur. Quod si alio in tempore cibum receperis, eo qui sequitur die, ac rursus die sequenti in tempore pariter diuerso, similiter videbis caliditatem adactam, & pulsus, ut diximus, alteratos: iure itaque diximus hoc proprium ac inseparabile esse hecticarum febrium indicium, ut allato cibo statim hora vna aut duabus elapsis, febris accendatur aucta caliditate, ac pulsus ad magnitudinem & velocitatem augeatur, ita ut incompressa annotatio facta videatur: si enim eis contingit quod in calee, ac lapidibus, si calefactis, si enim aquam frigidissimam infuderis, multo calidiores sentiuntur, nutriende, ut videtur in ipsis humida substantia aridam caliditatem, si enim quispiam intra manus recipiat caleis glebam, eiusdem parui faciet caliditatem, quam neque sentiet, ac si deponat, aquæ perfundat videbis quamprimum vehementer calfactam, atque ita feruentem, sicuti lebetes quando ingenti adhaerent flammæ, vapor reseriam non paucos ab ea effleri conspicias: quod si etiam tangere ausus fueris, facile de vi contingeret; adeo si ad sensus iudicium referatur, hectica caliditas vires habet non parum sicca euidentiores; ut inquit Galenus citato primo libro de diff. feb. cap. 9. Quam Galeni similitudinem parum (ut mea fert opinio) quidam ex Arabum familia intelligens, ausus fuit asserere, has causas à Galeno traditas accidentales esse, & veluti fabulas cantatorum. Sed pace tanti viri dixerim, non propterea hoc

hoc contingere fasus est Gale. quod velut aqua contraria calci existit, ita cibus virtuti nutritibili sit contrarius, atque adeo elongatus, ut ipse eidem sit contrarius, sicut aqua calci, quemadmodum ipse refert: neque propterea quia contraria calci est aqua, ubi ei perfundatur, multo calidior sentitur, sed ob id quod humida est substantia, ex qua arida caliditas veluti nutriti videtur: & quia non paucos ab ea vapores ferri conspicies, adeo ut si etiam tangere ausus fueris facile ex hoc deuri continget, ut ipse inquit citato 1. de different. febr. quare quemadmodum contingit ipsi calci, quæ debilem obtinet calorem prius quam aqua perfundatur, ita per febres hecticas, (per quas partes corporis solidiores magis ignitæ euadunt, & propterea assidue febris hæc in se ipsa similis manet) calor contingentibus apparet, veluti in calce debilis: cum vero cibum assumunt ac bibunt, simile quiddam accidit quod in calce (ut diximus) aqua perfusa: quo fit ut contingentibus exterius ægrum, multo calidiores sentiant: ut secundo prognosticorū ab eodem Galeno habetur. Continent namque febre hectica laborantes, calorem debilem; quoniam calfactum esse, in partibus solidis consistit, è quibus parum est quod euaporat ob siccitatem earum, cum vero alimentum eis apponitur, utpote humido existente, non ab ea re eorum partium calor augetur, aut per alimentum eiusdem caloris substantia, quia eodem alimento nutriuntur, & adueniente humida substantia, magis etiam euaporat: humida etenim caliditas vires habet sicca euidentiores, ubi ad sensus iudicium referatur; quemadmodum Galen. habet lib. 1. de differen. febr. Perspicue igitur apparet, ob iam dictas causas, febrilem calorem in hecticis febribus, statim hora una, aut duabus adhibito cibo augeri, & quæ maxime vehementer per diductionem illius apparere, & eousque perdurare, donec ex cibo digesto, atque apposito cordis siccitas fuerit humectata. Quæ etiam ratione pulsus maiores, ac velociores sunt toto eo tempore, & non quia cibus calorem extraneum adipiscatur necessarii, ut inquit vir iste; etenim non mutaretur. At quia nutrit, propterea accedit febrilem calorem augeri. Sed qui fieri possit (non ab re quæres) ut tam breui tempore assumpto cibo, possit & ipse distribui ac adici solidioribus partibus, & potissimum cordis, si prius ut concoquatur oportet, deinde digeratur, apponatur, agglutinetur, atque assimiletur? At nos facile cū Gal. huic satisfacere poterimus, illud haudquaquam difficile contingere posse, nam licet deuorato cibo confestim ventriculus circa illū se contrahat, ut eodem fruiatur, nutriaturque: ubi autem eo impletus, satiatusque fuerit, pro onere reliquū habens, statim abiiciat, ac deorsum extrudat, ipse vero ad aliud opus, nepe ut agglutinet, conuertatur, tamen eo etiam tempore, aliquid eiusdem cibi ad iecur ascendere clarum est, ex eodem Gal. lib. 3. de nat. fac. c. 13. quæ ratione ad ventriculum ipsum, non pauca venas portæ dicte progerminationes attingunt, hocque esse primum tempus operis naturæ circa alimentum. In secundo id ad intestina transit, usque ipsis & iocinori ad saturitatem apponi, tum portunculam eius exiguan in omnem corporis partem ferri. Quo in tempore quod in primo est appositum, id ventriculo affigi intellige. In tertia vero temporis portione ventriculus ex affixo alimento nutritur, sibi planè assimilato. Affiguntur autem tam iocinori, quam intestinis, quæ iis fuerant apposita. Præterea

in omnes corporis partes, digestionem, appositionemque fieri constat, ut patet ex citato libro 3. de natura facultat. Non igitur à ratione alienum est, imò veritati quàm maxime consonum, quod tenuior quædam alimenti pars, quæ paratè magis concoctioni existit, citius ab ipso ventriculo euectæ & propterea etiam iecori distributa (quamuis non integrè vniuersum alimentum, in eodem ventriculo fuerit concoctum) possit ex eodem iocinore, post horam vel alteram assumpto cibo, in omnem corporis partem ferri, digeri, atque solidis partibus omnibus, præsertim cordis apponi, quo tempore incipit illa incompressa annotatio. Producitur autem eousque, quo vniuersum concoctum, digestumque alimentum, singulis corporis partibus solidioribus, ipsiusque præcipue cordis, fuerit appositum, & assimilatum. Atque præsertim illud contingere posse putamus hectica febre laborantibus, quibus cum inanitas fuerint, ac supercalfactæ partes solidæ, promptius illud attrahunt. Et quoniam inter ceteras nostri corporis partes cor etiam facultate vehementi trahendi pollet, ut libro de inarismo Galenus testatur, cap. 5. nec minus & huic opitulatur, tenuioris substantiæ, ac concoctu facilis liquorum ciborum assumptio, qui eiusmodi febre laborantibus offerri consueverunt.

Cuiuslibet febris hectica particularia indicia: & quod ab urinis pro earum dignotione nullum sumatur principium indicium. Caput. XX I.

INCIPIENTIS, verò hecticæ febris, seu primi gradus, aut primæ speciei, quæ citra tabem exitus, præter iam dicta signa quæ communia cunctis existunt hecticis febribus, quædam propria reperiuntur, per quæ omnia, ubi sola fuerit haudquaquam cognita est difficilis: alteri verè associata difficilior cognoscitur. Gal. teste citato 1. lib. de diff. feb. c. 10. Et quoniam bifariam oriri possunt, ut superius conclusum est, cum statim ab initio inuadentes, tum etiam quando ad alias nedum diarias, verum etiam ardentes febres, ac reliquos quosdam præter naturam affectus, consequuntur, nos quoque breviores sumus, ab initio incipientis febris hecticæ signa trademus, cum ex eisdemmet, ac etiam communibus mox narratis (paucis quibusdam denotatis) eadem poterit dignosci, quando ad alias febres consequatur. Cum autem ab initio nunquam inuadat febris hectica citra procatacticas causas, quas etiam supra narrauimus, licebit, ut Galenò visum est, etiam ex ægro interrogato, eam addiscere. Vbi autem ex aliqua earum habuisse principium acceperis, cæteris quidem bene se habentibus, appareantque in ipsa prima die omnia generis febrium ephemerarum indicia, febris autem ad diem sequentem extendatur, neque ad quietem declinans, neque magis inualefcens, ariditatemque maiorem in corpore representet, talem hecticam fore suspicandum est. Quod si usque ad tertium diem sine cibo permanserit, dum tertiana accessions suspectas horas præterit, nihilque effatu dignum priori accesserit febrili, aut fuerit imminutum, sed quædam primæ febris exigua, reliquæ tantummodo procedant, atque permaneant, cum ariditate corporis, & caliditate, quæ primo tactu mitis sentitur, processu vero temporis acris, mordax, atque arida manus se offe-

Rr

Hæctica prima spec. ab initio inuadens ex procatartica causa orta indicia.

Hæctica
tertia spe-
ciei signa.

Tex. I. Cō.

1.
Ex facie.

funt omnino, quàm offa & cutis? aded vñ nudato corpore partes ad ventrem attinentes afpicias, neque ex intestinis aut vifericibus aliquid fupereffe cõfueris, ac præcordia vehementer contracta velf thoracem videntur. Quod fi eos tangere libeat, cutis quidem apprimè arida, quàm fi digitis apprehendens extenderis, inftar pellis confiftit. Caliditas autem, cùm primùm manus admoetur, debilis, ac mitis quodammodo fenfitur, paulatim verò acriores, atque crosionem quandam oftendit, ac magis, cùm plus tangendo immoraberis. Pulsus vero tenuis, durus, debilis, & frequens, inquit Galen. licet paulò post afferat, non tenuem, fed parum elfe, quod quidem parum aut nihil differre videtur, eft enim paruus pulfus neceffariò tenuis, licet & breuitatem quoque ac humilitatem in fe contineat: qua de re & tenuis, & paruus dici poterit eadem ratione, quamuis non propterea febris tabida dicenda erit: quoniam paruus aut tenuis pulfus fit, nec propterea quia frequens, nam neceffariò vbi paruus fuerit, hic idem erit etiam frequens. Verùm ob id potius febris erit tabida, quoniam debilis ac durus eft pulfus; debilitas fiquidem vehementem fequitur cordis intemperiem, durities autem ficcitatem: qui affectus, vbi cor occupauerit, neceffe eft, inquit Galen. eodem t. de differentiæ feb. animal. febre tabida laborare. Reliquum eft, vt eius febris hec tica, quæ medium obtinet locum interiam diætæ, figna enarremus, fiue augmentum hec tice febris eam appellaueris, fiue fecundi ordinis, aut fecundæ fpeciei, quæ quidem febris, cùm quodammodo ad veranque partem declinet, eius videlicet, quæ eft citra tabem, & eius quæ omnino tabida eft, latitudinẽque fatis amplam contineat maioris, minorifque ratione, fi æqualiter ab vtraque diftabit; æqualiter quoque vtriusque figna participabit, fi verò vni erit proximior quàm alteri, eius cui magis propinqua exiftit, maxime indicia manifeftabuntur: ficciores etenim in ea, atque inopia alimentis tenuiores cordis carnofæ partes redduntur, ac tantum virtus in ea laborat, quantum ficcitas atque caliditas in ipfa febre inualuerit, quæ ratione etiam fit; vt quantius pulfus paruus, durus, debilis ac frequens addit, non tamen perinde ac in ea, quæ exquisitè tabida eft, magis tamen quàm in ea, quæ fimpliciter hec tica, & citra tabem. Cuiusmodi in dubium venit, cùm figna maxima pro dignoscendis febribus ex calore, pulsu, atque vrinis capiantur, vt paulò ante concludimus, cur eft quidam Hippocrates, & Galenus nullum ex vrinis fumpferunt indicium pro febribus hec ticis dignoscendis: potiffimum cum libro primo de crifibus fateatur Galenus, quòd in febribus omnibus (quoniam venofi generis affectus funt) ad vrinæ præcipuè attendere oportet: Cenfemus autem hoc ita elfe diligendum, quod propterea, quæ ex vrinis indicia fumuntur fubiecerunt, quia nullum, neque inſeparabile, neque proprium & inſeparabile ab illis indicium pro febrium hec ticarum notitia capi exiftimauerint, fiue ex fubſtantia, fiue ex colore, aut contentis capiat, non ex ſubſtantia: nam eiufdem diverſitas, ex diverſa humorum redundantia intra vaſa, qui diverſi modo à natura quippiam funt perpetui, aut penitus non alterati, conſequitur: eſt etenim vrina ipſa ſerum humorum in venis contentorum, vt tertio de morbis vulgaribus, Hippocrati auctoritate, à Galeno ſcriptum eſt. Nec item ex colore eiuf-

eadem, cum is etiam ex diuerso humore intra vasa
 redundante proficiscatur: neque etiam ex conten-
 tis, siue nebulæ, siue suspensæ, siue subfidentia, seu
 sedimenta sint: nam & hæc clarum est in eorundem
 auctorum doctrina, febrientibus, tanquam partes
 putrescentium humorum intra vasa, quodammodo
 à naturâ euictorum, existere. Cum itaque in febribus
 hecticis, quatenus hectica sunt, partes solidæ,
 & non humores ipsi intra vasa contenti afficiantur,
 reliquum est ex vrinis nullum elici posse indicium
 pro earum dignotione. Nec quicquam obest si de
 diariis obiciat, nam in illis cum nec humores, nec
 solidæ animalis partes præter naturam calorem sus-
 ceperint, sed spiritus duntaxat, propterea ab v-
 rinis inseparabile, ac proprium sumitur indicium,
 cum statim à prima die concocta appauerint: in-
 dicabunt etenim haudquaquam humores calorem
 præter naturam occupasse, nec solidas corporis
 partes effectas esse, quales vrinæ in hecticis vide-
 ri minime possunt, nam concoctionem à solidis
 corporibus sanis humores consequuntur, vt liquet
 id morbi vulgaris. Cum verò hæc in febre hecti-
 ca ægrotent, vrinæ haudquaquam concocta vi-
 deri possunt, nec cruda, aut obscure concocta pro-
 pterea erit vrina in febribus hecticis. nam pro-
 prium ac inseparabile est tale indicium febrium ex
 putredine ortam, vt supra ostendimus, neque red-
 undans quispiam in vasis putrescens humor adest,
 ex quo tales vrinæ prouenire queant in eiusmodi
 hecticis febribus, quantum in ipsis est. Ad Galeni
 auctoritatem primo de crisibus dicimus veritatem
 habere in febribus omnibus, de quibus eodem li-
 bro verba facit: & quoniam de hecticis in eo libro,
 vt ipsemet testatur in fine secundæ de crisib. ser-
 monem non fecit, propterea de eis eadem auctori-
 tas non intelligitur. Ad hæc eodem loco de vrinis
 loquebatur relatione ad venosum genus, quemad-
 modum de sputis, & alui excrementis, relatione fa-
 cta ad spirandi instrumenta, ac ventrem: quocirca
 eas præcipue attendere oportere præcipiebat, pro
 cognitione eorum, quæ intra venosum genus con-
 tinentur, & non propriæ substantiæ venarum; at-
 que arteriarum, quæ ratione dicere possumus febres
 hecticas passionem non esse venosi generis: vel di-
 cas quod in eiusmodi etiam febribus, attendere v-
 rinæ oportet, veluti in reliquis morbis, & ferè o-
 mnibus, non tamen tanquam propria, aut insepara-
 bilia harum febrium signa, quemadmodum decre-
 tum reliquit idem Galenus tertio de morbis vulga-
 rum cum dicebat. [Atqui vrinas semper memineris, vt si-
 mul inspicias in ventris affectibus, thoracis, pulmo-
 nis, neruorumque: nam bonæ si appareant, multum
 valent ad salutem; contrà, si prauæ, amplificant simul
 ægri periculum.] sed confestim instabis inquisiens
 Hippocr. secundo prognost. pro harum febrium di-
 gnotione, signum quoddam ex vrina sumpsisse, cum
 dixit: [si pingue desuper natans araneorum speciem
 referat, damnandum est. indicat enim consum-
 ptionem.] Atqui haudquaquam nos negabimus con-
 sumptionem indicare, si quid pingue super vrinam
 natauerit araneorum speciem referens: idque sæ-
 pius contingere in colliquantibus febribus, cum Hip-
 pocrate affirmamus. Quam sententiam Hippoc. con-
 firmavit Galenus comment. aphor. 35. septimi lib.
 cum dicebat: [siue alui excrementum, siue vrina
 pinguis fuerit, ex colliquatione adipis fit, non ma-
 gis in renibus, quam in toto corpore existentis. Jet-

enim commune indicium erit omnis adipis ab ig-
 neo calore colliquati. verum non propterea admit-
 timus illud fieri posse in febribus hecticis, etiam ta-
 bidis: licet vniuersæ hæc febres, quæ marasmodi ap-
 pellantur, ex genere earum sint, quæ colliquant, in
 eo tamen differunt, vt Galenus inquit, decimo me-
 thod. [quod quæ portio carnis in tabidis febribus
 colliquatur ea semper vaporis vice digeritur: in illis
 verò ardentissimis, ac malignis febribus quod li-
 quatur, defluit in ventrem.] Ex quibus Galeni ver-
 bis facile quispiam percipere poterit, quod quam-
 uis consumptionem indicet pingue in vrina super-
 natans, idque fieri contingat in colliquantibus fe-
 bribus calidissimis, atque malignis, nunquam tamen
 hecticam febrem, tabidam demonstrabit, neque ex
 ea similis prouenit consumptio, seu colliquatio:
 paucum est etenim quod in ea colliquatur, propter-
 ea quod solidæ partes sicciore sunt, & carnosæ et-
 iam, & adiposæ paucæ, tum etiam quod febris ipsa
 exigua, nec nimium calida est: quo fit, vt id quod
 colliquatur, semper vaporis vice digeratur, neque
 in ventrem defluat, neque per vrinas excernatur.
 Cernitur hoc etiam, vt citato loco testatur Galen.
 in carnibus dum in craticulis torrentur, euidenter
 fieri: siquidem ab aliquibus pluxima liquatio de-
 fluit, deciditque in prunas largiter; aliquando nihil
 omnino (quod vtique sentias) defluere videtur, e-
 tiam si par sit prunarum subdita copia, quantoque
 magis adipe, vel carne animal abundat, tanto profe-
 ctio quod ab ipsis carnibus, dum in craticulis torré-
 tur, defluit; cernitur copiosius: eodem igitur modo
 in calidissimis febribus atque malignis, si carnes hu-
 midæ ac molles cum adipis copia fuerint, eas sensu
 liquari deprehendas: sin sine adipe, & siccæ sint, in
 marasmodi febres transeunt; siquidem quoad ma-
 teriam vberem habent, hanc colliquant, vbi illis tum
 adeps, tum caro mollis defecit, duras & æquæ liqua-
 biles carnes siccant, à quibus propter siccitatem ni-
 hil defluit, velut nec ab iis quæ sale sunt siccæ: si-
 quis has quoque torrere parans, pari cum aliis igni
 admoueat; nam & sicciore earum carnes reddetur,
 & corij ritu durabuntur, nec defluet ex his vlla sensi-
 bilis liquatio: quocirca licet interdum quædam veluti
 colliquatio totius corporis fiat, aliquando succorum,
 qui in venis sunt duntaxat: quod verò ex colliqua-
 tione proueniat aliàs ad ventrem cõfluit, aliàs ad v-
 rinæ, aliàs per sudores pellatur, Galeno teste, tertio
 de cau. symptomatum, cap. 2. neutrum tamen eorum
 in hecticis febribus, etiam tabidis, prouenire posse
 putamus, cum & pusillæ eadem sint, nec multa car-
 nis humidæ ac mollis, seu adipis copia similibus fe-
 bribus laborantibus adsit. interim tali habitu præ-
 diti haudquaquam parati sunt in tales febres incide-
 re, vt diximus: quapropter nusquam eadem sub-
 stantiæ, nec etiam aliæ verè solidæ dictæ, sensu li-
 quari deprehenduntur, sed semper vaporis vice di-
 gesti, cum Galeno censemus. Sed adhuc fortius in-
 stabis cum Galeno, tertio de præfagatione ex pusilib.
 cap. 4. vbi verba faciens de pestilenti febre hectica,
 fatebatur hæc verba: [Inspicienda porro præ cæ-
 teris vrina est: etenim conturbata quotundam eo-
 rum videtur esse, & aquosior, ac nonnullorum mul-
 to quam pro natura tenuior.] & paulo post subde-
 bat: [præsertim sublimamentis animus est à thiben-
 dus, nam quædam subliuida quodammodo sunt, su-
 giunt & item alia quæ araneorum latas telas refe-
 runt in modum lanæ congestæ.] videtur siquid hæc

*Dilatatio
 obiecti.
 Hæctica in
 quo differ-
 rant à reli-
 quis colli-
 quantibus.
 cap. ult.*

*Alia obie-
 ctio.*

Rr 2

*Dilutio ob-
sectionis.*

in loco Galenus, non modò ex contentis, sed etiam substantia, & fortasse etiam colore ipsius urinae indicia sumere pro dignotione febris pestilentis hec- ticae. Hanc Galeni auctoritatem nos tanquam ve- ram admittimus. Verùm fatemur cuncta, quae ex urina indicia sumit hoc in loco febris pestilenti exi- tiali, quae etiam hectica sit, tribuenda esse: in eis nan- que non humores ac spiritus, sed solidas corporis partes putredo occupat. Quò fit, ut magnoperè in- spiciendas esse urinas, in huiusmodi febribus præ- cipiat, quas ferè pulsu dignoscere non liceat. Verùm non ut dignoscamus febrem hanc esse hecticam, sed pestilentem, atque exitialem primo, quam etiam esse quodammodo hecticam contingit, propterea quòd ad corpus ipsum visceris, non ad humores, qui in eius sinibus continentur, putridus calor vni- uersus defluerit. liquet igitur ex his quàm longis- simè à veritate deuierint iuniores medici vel Gale- ni doctrinam profitentes, qui opinantur ex urinis aliquod sumi posse indicium proprium pro hec- ticarum febrium dignotione; obseruantes præsertim (ut vulgus quoque medicorum vniuersus obser- uat) natantem illam in urina pinguedinem, quae li- cet consumptionem, seu liquefactionem signifi- cet, contingatque (ut modò diximus) in colliquan- tibus calidissimis, ac malignis febribus, in iis tamen quae hecticae sunt etiam & marasmodies, seu tabidae haudquaquam conspici queunt; quemadmodum cum Hippocrate & Galeno abundè determinauimus. Inspiciendae tamen sunt in hecticis febribus urinae semper, non pro earum dignotione, sed quo- niam si bonae appareant, multum valent ad salu- tem; contra, si pravae, amplificanc simul agri pericu- lum, ut in cæteris morbis omnibus, etiam qui affe- ctus venosi generis non sunt.

*Cur in he-
cticis inspi-
cienda uri-
na.*

Quòd hac nostra Methodus per indicationem fiat: & quid sit indicatio.

Caput XXI I.

HABITA febris cognitione, qualis scilicet sit eius natura, diuisa quæ- ratione essentiae eiusdem, ac inuentis insuper diuisua methodo tribus pri- mis differentiis, quod quidem, ut sa- pius diximus, quoddam est principium methodi seu viae nostrae, quae ad propositum nobis finem perducit, id autem est cuiusque febris remedia inuenire: cumque explicauerimus generationis earundem fe- brium, ac dignotionis modum, consonum erit, ut ad ea tractanda deueniamus, quibus finem hunc conse- qui liceat, ac qua via pergendum sit, præsertim in tribus iamdictis differentiis. nam sub eadem me- thodo reliquarum omnium febrium particularium, medendi ratio facillè patebit. At cum omnis me- dendi methodus seiuncta ab experientia procedat, & propterea per indicationem fiat, quoniam quic- quid ab experientia seiunctum est, id totum indi- catio nominatur: ob id quisquis condere meden- di methodum ad vnguem parat (inquit Gale- nus in secundo eius operis libro, cap. 7.) huic à pri- mis est indicationibus auspicandum; atque hinc ad eas, quae deinceps sunt, transeundum: rursusque ab his ad proximas, itaque pergenti non prius persisten- dum, quàm ipsius finis sit còpos. Ergo primum quæ generalis, còmunisque morborum indicatio sit, in- uestigandum erit, ab hac deinde ad alias speciatim descendemus: eadè etenim est methodus in omnib. morbis curandis, ut primas videlicet omniù curatio-

*Indicatione inuenire
opponitur
inuentum
per experientiam.*

nis indicationes consideres: quas vtiq; generalissi- mas appelles licet, tum quæ ex harum sectione nas- cuntur, deinde rursus quæ ex illis oriantur, donec peruenieris ad eas, quæ vltra sectionem non admit- tant, ut nono meth. cap. 15. scriptum est. Nò alia ita- que ratione, hæc nostra methodus à primis indica- tionibus auspicari debet, ac eodem modo procedere diuisua methodo, ad eas vsque quæ sectionem non admittunt, ut nostræ finis compotes simus. qua- propter si id quod curare debemus, febris est, con- sonum profectò erit, ab ipsa quoque indicationes esse incipiendas, atque ab ipsius rei natura exor- diri, & ab ipsa quod sequens est, citra experientiam inuenire, cum id sit indicatione inuestigare, ut diximus. Auspicari nanque perpetuò oportet ab indica- tione, quæ ab affectu cui paramus mederi, accipitur: ut liquet quarto de meth. meden. cap. 3. Non ab re igitur primum quæ generalis, communisque mor- borum omnium indicatio sit, & per consequens fe- bris quatenus morbus est inuestigandum: ab hac deinde ad alias speciatim descendendum, quæ ab ea- dem sumuntur, non absolute ut morbus, sed ut talis morbus, ut pote in intemperie: deinceps verò ut ta- lis intemperie, & sic de reliquis. Nà si indicatio, quæ ab ipsa rei natura primum oritur, quod agendum sit inuenit, necesse est inueniendorum remedium in- itium, ex ipsorum morborum natura sumi. siquidem absurdum est aliud esse quod curadi rationem præ- scribat, aliud quod curatur. Etenim indicare de se quicquam magis potest, quàm de alio, Galeno au- ctore, tertio de meth. med. cap. 1. Verùm quoniam omnibus in confesso est primas indicationes ex af- fectibus esse sumendas, prius quàm definiamus que- nam sit hæc prima indicatio, quid per indicationem intelligere debeamus, quidve ea sit, explanare duxi, ne per ignota nostra procedat oratio: præsertim cum dixerimus omnem medendi methodum per indicationem fieri. Galenus ergo volens secundo me- thodi meden. cap. 7. exponere quid hoc vocabulum indicatio significet, profert hæc verba: [τὴν γὰρ ἐμπειρίαν τῆς ἀπολύτης ἐνδὲ ἐξ ἡλίου φέροντες:] hoc est, dicimus enim indicationem tãquam emphasim, id est, exprefionem, significationem, demonstrationem, seu repræsentationem eius, quod sequitur, per indi- cationem etenim repræsentatur nobis quicquid cò- sequens, faciendumve sit. est etiam emphasis figura quædam, qua latens aliquid ex aliquo dicto eruitur. Huius duo sunt genera, vnum, quod plus significat, quàm dicit, alterum quod etiam id quod non dicit, vel quod maius dicat, sub quo etiam minus volum intelligere: est & schema cum subest in verbis taci- ta quædam (ut aiunt) significatio. Quocirca quem- admodum per figuram emphasim dictam, aliquid latens ex aliquo dicto eruitur, propterea quòd subest in verbis tacita quædam significatio, ita etiam & ipsa indicatio, tanquam emphasis dici poterit: nam per eam etiam aliquid latens eruitur, subest enim & in ea tacita quædam significatio, per quam nobis patefit (cognita tamen prius rei natura) id quod con- sequens, faciendumve sit: statim sese offerente eo quod indicatur: & ob id Galen. 2. method. meden. cap. 7. dicebat: [ergo ex ipsa rei natura ordiri, at- que ab ipsa quod sequens sit, citra experientiam in- uenire, id est, indicationem inuenire. nã inuenitur quidem & ab ipsa experientia, id quod consequens, faciendumve sit: cæterum nò ita, quasi in preceden- ti aliquo designatū: & proinde nemo empiricorum dicit

9.11.

indicatio
est
obserua-
tio
ex
experien-
tia
in
finita.

Galenus
verbis
n
la
a
qual
dam
ver
rin
in
lella.

dicat id isto indicari, quamquam certè hoc sequi illud dicant, & hoc præcedere illud, & consiliter hoc cum illo,] lib. de opt. sect. ad Thrasyl. definiens indicationem, afferebat, [est igitur indicatio, iuuantis comprehensio, simul cum comprehensione nocētis adueniens, sine obseruatione aut ratiocinio.] Seclut itaque his verbis ab indicatione, cum obseruationem, tum etiam ratiocinium: obseruationem inquam, quoniam ab ea constituitur experientia. Dicunt namque Empirici omnem eorum artem, obseruationem; memoriamque esse: intuenire etiam per experientiam, ex aduerso opponitur inuentioni, quæ fit per indicationem & methodum, ut sæpius diximus. non enim obseruatione indigent, quæ per indicationem nobis patefuit: simul etenim cum indicantibus obuia sunt, ut dicemus. Seclut item & ratiocinium: quoniam neque eadem vlla cogitationis ope indigent. Quapropter citato loco inquit Galenus, [quædam igitur proportio indicationis cum sensui, intellectuque manifestis intercedit.] quando enim cum nocentibus iuuantia pariter occurrunt, tunc neque obseruatione, neque analogismo vtendum; quandoquidem ipsa nocentia quid expediat, manifestant: quare quod in apertissimis, & sine controuersia cōcessis reperitur (omnibus enim demonstrationem transcendentibus, mens nostra propter euidētiā assentitur) id nimirum & in perceptis ex indicatione contingit. sunt item per se ipsa sensui euidētia, quæ per indicationem nobis patefunt; quemadmodum album & nigrum, & propterea obseruatione non indigent, quoniam proportionē ad eā respondet obseruatio, quæ non per se sensui cognita fuit, sed per signa quædā, seu quædam notas comprehenduntur. Absque etiam ratiocinio nobis aduenit comprehensio iuuantis simul, cum comprehensione nocētis per ipsam indicationem, quemadmodum quædam, quæ licet sensui obstrusa videantur, intellectui tamen perspicua sunt, eodem Galeno auctore citato loco. Est propterea indicatio sine obseruatione & ratiocinio, ut ipse testis est, efficiturque per comprehendamus simul iuuantia, cum nocentibus, & ab eadem vtilia capiamus: quandoquidem (ut diximus) ipsa nocentia quid expediat nobis manifestant, adeo ut neque obseruatione, neque analogismo, ratiociniove aut alia cogitationis ope indigeant. Et hanc ob causam, inquit Galenus citato libro ad Thrasyl. [animalia ratione carentia, æstum, algorem, simulque omnia nocere valentia quoad eius heri potest, vitare conantur; simul videlicet eo quod iuuat, sese offerente] & addit: [Paxillo enim; aut aliquo alio in membrum defixo nullus cogitatione præmissa reuellit.] Non ab re itaque eum Galeno asserimus indicationē esse comprehensionem iuuantis, simul cum comprehensione nocentis, sine obseruatione, aut ratiocinio adueniente.

Aduersus eos, qui parum recte quid indicatio sit, intellexerunt. Tum quid ex Galeno sit indicans, indicatum, experientia, & analogismus. Caput XXXIII.

SED in hac re nō parū hallucinati sunt Galenici quidam iuniores, perperam hæc Galeni verba intelligentes. Faterentur enim quod eum Galenus inquit [indicationem, iuuantis comprehensionem simul esse cum comprehensione nocentis aduenientem] intelligere velit, quod per indica-

tionem simul nobis patefunt ea quæ iuuant, & quæ nocent; hoc est materiæ medicamentorum nocentes & iuuantes, vtilis & nō vtilis: qua ratione deinceps, cogamur hæc amplecti & moliri, utpote iuuantia & vtilia, illa verò tenuere & vitare, ut quæ nocentia sunt. Sed pace tantorum virorum dixerim; hæc eorum opinio à Galeni doctrina admodum deuiare videtur. Nam quamuis philosophis ac logicis pateat quod vno contrariorum cognito; reliquum etiam cognoscatur, & propterea fateri etiam possumus, quod habita notitia per indicationem eius quod iuuat & vtile est; possumus etiam secundario & ex accidenti, & quæ nocent comprehendere, haudquaquam tamē admittimus quod per indicationem comprehendamus ea medicamenta, quæ nocent; tū per eam non nisi ea, quæ vtilia sunt, ac opem ferunt, comprehendamus. Iuuantia etenim per indicationem patefunt,] inquit Galenus. & paulo post dicebat: [quandoquidem ipsa nocentia quid expediat manifestant.] Ad hæc secundo de meth. med. cap. 7. [indicationem dicebat esse significationem, seu demonstrationem eorum quæ consequuntur, siue agenda sunt; & non eorum quæ non consequuntur, neque agenda sunt.] Rursus nec vnquā in Hippocratis, & Gale. doctrina compertum est aliquod indicare quod sibi nocet, sed perpetuò id quod cōfert, expedit, & vtile est. Adde quod eodem libro ad Thrasyl. cap. 45. omne quod indicat, fateretur Galenus, aut sui conseruationem; aut sui ablationem indicare. Sed verumque horum perficitur ex his, quæ expediunt & iuuant, & non ex eis quæ nocent, ac nō expediunt, igitur admittendum non erit quod per indicationem significetur nobis, seu demonstretur id quod fieri non expedit. Exorditur enim indicatio ex ipsa rei natura, ex qua quæ conferunt duntaxat, necessariò proueniunt, ac per se indicantur, & non quæ nocent: quamuis ex accidenti id, quod indicat ab his, quæ non iuuant, iuuari possit; utpote ipsis à medico non adhibitis, hoc tamen ex indicatione procedere, aut per indicationem significari, nullo pacto admittimus: nec idem Galenus, per comprehensionem nocentis, medicamentorum materias nocentes voluit intelligere, sed id quod præter naturam est, id quod lædit, id quod nocet, quando dixit quod indicatio est iuuantis comprehensio simul cum comprehensione nocentis adueniens; id quod non solum confirmauit ac declarauit in exemplo animalium ratione carentium, sed in paulo ante citatis verbis, cum dicebat: quandoquidem ipsa nocentia quid expediant manifestant, cum si aliās intelligentur eius verba, frustra animantium ratione carentium tradidisset exemplum, ac paxill infixi, nec ex ipsa indicatione vtilia caperemus, nisi simul cum ea comprehenderemus naturam rei nocentis, hoc est indicantis: simul enim, ut ipse Galenus refert, cum indicantibus obuia sunt iuuantia, quæ per indicationem patefunt. Non igitur intelligit Galenus in indicationis definitione per nocentia, medicamentorum materias quæ nocent, sed præter naturam affectus, qui corpori nocentium præstant. Hi etenim sunt, quos simul per indicationem comprehendimus cum iis quæ iuuant, & fieri expedit, simul namque cum indicantibus indicata sese offerunt, eodem Galeno teste, citato lib. de optima secta, cap. 27. Quod verò per nocētia affectus præter naturam intelligat per hæc etiam verba citato loco conscripta, luce clariùs manifestauit;

*In definitio-
ne indica-
tionis, quæ
nocent, sunt
præter natu-
ram affec-
tus.*

loquens aduersus methodicos, quod affectus duntaxat tanquam euidentes, ex quibus indicatio enascitur, & non causas velut abditas dignoscendas esse putabat. Inquit enim, [sed cum nocentium notitia, simul & causarum eocurrit agnitio, quinimò nocentium cognitio causarum est comprehensio. Itemque ipsa nocentia, quæ vtrique causæ sunt non ex se ipsis in notitiam veniunt. quare non solum adstrictio ipsa non est euident, sed neque illa etiam ex quibus adstrictio dignoscitur.] Hanc insuper indicationis descriptionem, parum rectè quidam iuniorum intelligentes, ausi sunt confundere, atque pervertere, quædam verba adiciētes, quod faciliè ad eorum falsum sensum eam traherent, ac Galeni veritatem, simulatque verborum eius luciditatē obtenebrarent.

Cap. citato.

Aiunt namque scribi à Galeno libro de optima secta, [indicationem esse comprehensionem nocentis (cum re indicante) simul aduenientem:] addunt enim illa verba [cum re indicante] quæ Galenus non apposuit, tanquam non necessaria, imò superflua, quæ si addidisset, ut isti querunt, non vtrique indicationis naturam manifestasset, sed potius peruertisset, ac confudisset, quem admodum isti & confuderunt, & peruerterunt. sed cum quodlibet indicans aut sui custodiam, aut sui sublationem indicent, ex Galeni sententia, eodem libro ad Thrasylbul. videtur quod si indicatio hoc modo intelligatur, aut erit imperfecta eius definitio, aut nihil indicabit sui custodiam. Nam quando aliquid sui custodiam indicabit, vtpote virtus, tunc per indicationem non comprehendimus iuuantia simul & nocentia: etenim ea quæ conseruari debent nocentia non sunt. Hanc objectionem hunc in modum soluas, Quod illa indicationis descriptio, propria est eius quæ sumitur ex his, quæ præter naturam sunt, & nocentia: de his enim sermo erat cum empiricis & methodicis, quando probare intendebat diuersum esse modum inueniendi vtilia, hoc est remedia ab eisdem, pro auferendis nocentibus, id est, his quæ præter naturam sunt: & propterea imperfecta non est, neque ob id asserendum, nil sui custodiam indicare, quoniam de hac indicatione nullus adhuc habitus fuerat sermo à Galeno, neque dissensio aliqua inter iam dictas orta, sed de modo inueniendi vtilia, hoc est medicamenta pro auferendis præter naturam affectibus. Quocirca Galenus inspiciebat hanc indicationis descriptionem, esse propriam eorum quæ indicant sui sublationem, confestim alteram subdit descriptionem omnibus indicationibus communem inueniens, aut sic describere potes. Indicatio est quando rebus percipiendis simul & quod confert percipitur, absque ostensione & obseruatione: hæc namque descriptio, communis est cum his quæ indicant sui ablationem, tum his quæ sui custodiam: simul etenim cum indicantibus, quod Galenus subintelligebat, cum dicebat rebus percipiendis, & quod confert percipitur, cum perceptio rei indicantis, quodcunque fuerit indicans, cognita eiusdem naturæ, seu essentia, confestim percipitur id quod confert, tam si confert pro sublatione eius quod præter naturam est, quam pro tutela, seu custodia eius, quod secundum naturam existit. Ex qua insuper descriptione patet eorum error, qui putarunt indicationem quampiam indicare nocentia, hoc est medicamentorum materias quæ nocent. Nam in hac quoque descriptione, quemadmodum in præcedenti demonstrauimus, quod confert af-

Obiectio.
Cap. citato.

Dilutio
obiectionis.

Eod. cap. II

ferit Galenus, quod per indicationem percipitur, & non quod lædit seu nocumentum infert. Quid itaque sit indicatio, satis superque me demonstrasse puto. Ex quibus etiam liquet quid sit indicans, scopus seu propositum, quid etiam indicatum, vtile, seu postulatum. Est enim indicans id, quod vtile seu iuuans expostulat, ac quid fieri expediat, requirit: nunquam tamen ex se quod fieri non expedit, expostulare videtur: quod verò indicatur, est illud vtile, quod confert percipitur, absque ostensione & obseruatione. Experientia verò est eius, quod sapius & eodem modo visum est comprehensio, atque memoria, siue obseruatio & memoria. Idem verò est obseruatio, & experientia, ait Galenus, citato libro ad Thrasylbul. Analogismus autem est comparatio & perceptio causarum iuuantium per similitudines: percipitur autem ex eo iuuans, quando causa quidem delitescit; nullaque obseruatio habetur, sed affectus quàm similis ex casibus est; ut inquit Galenus citato loco: analogismo etenim vtentes, à similibus ad similia transimus, quamuis empirici secus atque nos rationales, huiusmodi transitum vsurpant. Libro autem primo prognostic. Galenus dicebat, quod analogismus est ratio, quæ ab euidenti auspiciatur, rei obfcuræ faciēs cognitionem. Quoniam ergo omnis met. ut prius diximus, per indicationem fit, Galeno auctore, 2. de metho. med. cap. 6. ob id coacti sumus quid sit indicatio, quid indicans, & quid indicatum, demonstrare.

Quomodo indicantibus, & coindicantibus vtendum:
& quod falso per contraindicantia, prohibentia intellexerint quidam, superfluoque correptionis addiderint.

Caput XXIIII.

ETERVM cum recentiores quidam citra hæc, nonnulla alia procuratorum, quæ per methodum efficitur, necessaria fore opinentur, propterea quamuis prolixiores esse videamur, non minus cogimur declarare (ut nostra hæc methodus dilucidior euadat) nunquid ea ad hanc constituendam quicquam conferant. Sunt verò quæ ipsi asserunt, necessaria quod in medendi methodo coindicantia, coindicantia, contraindicantia & contraindicationes, correptiones, & correptiones. Appellant coindicantia, ea quæ non primò & per se, sed alio loco, & per accedens monstrant, id quod ab indicante ostenditur: & per consequens, coindicantia dicunt, commonstrare, seu coinsinuare: confirmantque illud hoc exemplo. Vires, inquit, propriè indicant alimoniam, ea quæ simul cum viribus eadem alimoniam commonstrant, vtpote ætas, consuetudo, anni tempora, & cetera huiusmodi, hæc coindicantia appellantur, ac coindicantia dicunt. Appellant contraindicantia, ea quæ primò fieri impedunt id, quod ab indicante suggeritur: & propterea contraindicare esse repugnare, refragari, atque reluctari. Exemplo illud declarant. Affectus præter naturam vtpote redundantia, hæc, inquit, vacuationem exigit atque demonstrat, vires autem, ubi præ-

imbecillitate eam ferre nō possint, tunc vires contraindicare dicunt: quoniam impediunt primò id quod ab indicante suggeritur. Nominat autem correpugnancia ea, quæ nō primo sed secundo loco indicantibus sese opponunt: & propterea correpugnare, dicunt esse correferari, & correluctari. exempli gratia; ubi redundantia, vt diximus, exigit vacationem, si vires præ imbecillitate eam ferre non valeant, eas dicunt contraindicare, ac si cum ipsis viribus consentiat ætas, habitus secundum naturā, anni tempus, & cetera huiusmodi, hæc correpugnancia appellant, quoniam non primo, sed secundo loco refragantur ei, quod ab indicante suggeritur: hæc eadem non nomine duntaxat, sed re, & natura inter se dissentire fatentur. Atqui nos asserimus primò cum Galeno nono method. meden. cap. 7. minimè vetare quod hi, & alij vniuersi, nominibus quibus libitum sit, vtantur; modò id quod in arte vtile est, non egrediantur, & in logicas disceptationes incendant: est nanque (vt ipse Galenus inquit) artis utilitas auxilia quibus æger sanetur, inuenire, & non de nominibus litigare, ad quæ inuenienda, quicquid conducere quomodolibet videbitur, id fatendum est, ad curationem esse necessariū, siue *ἐνδ' ἐκινύμενα*, siue *συρὺν ἐκινύμενα*, siue *ἀντὶ τῆς ἐκινύμενης*, hoc est indicantia, coindicantia, aut contraindicantia appellantur; aut ex eis *ἐνδ' ἐξέει*, aut *συρὺν ἐξέει*, aut *ἀντὶ τῆς ἐξέει*; id est indicationes, coindicaciones, seu contraindicaciones ab eis capi dixeris. Nam quæ circa ægrum administrantur, omnia fermè eius vnius causa sunt: cuncta itaque quæ ad auxiliorum inuentionem conducunt, necessariò consideranda in ægris à medico sunt; siue magnopere, siue mediocriter, siue exiguè conferre videantur: similem sententiam scriptam reliquit I. eiusdem, cum dicebat, [atque nominibus quidē quisque prout volet, vtatur. (id enim semper monere oportet) sed remedium indicationem, quæ à rebus singulis præstetur, seruet: quando si vel vnam aliquam earum prætereas, ad portionem tum magnitudinis illius, tum facultatis, curatio claudicabit.] Hæc itaque Gale. instituta nos seruare intendimus in hac nostra methodo, indicationem fumentes à singulis rebus, quæ ad remedium inuentionem quomodolibet conducere videtur; siue ea indicare, siue coindicare dixeris: quapropter interdum de coindicantibus, & coindicacionibus etiā verba faciemus, quæ coindicantia Græci *συρὺν ἐκινύμενα* appellat; vt liquet nono, & 13. de meth. med. cap. 16. Nuncupamus autem coindicantia, quæ simul cum ipsis primò indicantibus, iuuantia & vilia significant, atque demonstrant: & ob id coindicacionem dicimus esse sequentis, siue agendi consignificationem, aut cōdemonstrationem: interim verò de nominibus parum solliciti; vt Galeni æmulatores, eadem coindicantia, indicantia appellabimus: rei tamen natura nunquam mutata. quantum verò ad contraindicantia, quæ Græci *ἀντὶ τῆς ἐκινύμενης* vocant, contraindicaciones, quæ à Græcis *ἀντὶ τῆς ἐξέει* dicuntur, spectat; fatemur insuper, quod si eo modo subiintelligantur quo ipsi asserunt, non solum Galeni doctrinæ aduersantur, sed nullam ferè ad mendendi methodum asserunt utilitatem: Quod verò neque in numero eorum, quæ indicant, neque eorum quæ contraindicant, iuxta Galeni sententiam connumerari queant, si taliter intelligantur, hæc prima ratione probari poterit. Inquit enim ipse lib. de opt. sect. cap. 43. [sed quod appetit facultas si ab ali-

quo sumi impediatur, illud contrarij indicatiuum, seu contraindicans haud iure quis appellet.] similiter aduersus eos dicā, si quod appetit affectus præter naturam, vt pote abundantia, impedit facultas, pari ratione, ea contraindicans dici nequit. Insuper quod quæ fieri aliquid impediunt, neque inter indicantia connumerentur, & propterea neque etiam contraindicantia dici possunt (sunt etenim contraindicantia re & genere, vt etiam isti viri admittunt, idem cum indicantibus, cum eadem interim quæ indicant, quandoque contraindicent, & quæ contraindicant, interim indicent, suntque cūcta vel secundum naturam, vel naturæ contraria, vel neutra, vt ipsi fatentur) eiusdem Galeni auctoritate citato loco, sub eis verbis ostenditur, [Quamobrem id quod aliquid postulat, quoniam eius quod postulatur propositum est, quod nos postulatum sumere impedit, propositum non erit.] quod itaque postulatum, hoc est iuuans, & vtile sumere impedit, id equidem propositum, scopus, seu indicans non erit; quare neque cōtraindicans dicendum est. Ad hæc si quæ aliquid fieri impediunt, proposita quodammodo ac indicantia essent, eademque quandoque contraindicantia dicerentur, tunc vtique & morbi tempora, quæ nos interdū postulatum accipere impediunt, essent proposita, ac ab eisde indicatio fumeretur, quod in Galeni doctrina magnopere absurdum est. Rursus sequeretur quod quicquid impedit fieri quod ab indicante suggeritur, propositum diceretur, scopus, indicans, seu contraindicans: qua de re ægroti timiditatem, patrem, & dominum, proposita esse affirmamus, vt pote cum ea interim vacatione facere prohibeant, præ timore ægrotus non permittens, & pater, & frater, aut dominus prohibens, quorum nullū quispiam rectè sentiens, indicans, aut contraindicans vocauerit: Quod verò contraindicans, seu contrarij indicatiuum, nullo modo sit illud quod aliquid vtile fieri impedit, luce clarius patet in Galeni doctrina, præsertim primo de ratione victus, cum dicebat: [rursus & hoc in loco remedium indicationem, ab affectu corporis accepit, simulque virtutem considerauit, neque tanquam remedium vsum aliquando indicantem, sed tanquam contraindicantem, seu contrario indicantem modo, interdum autem & prohibentem.] quid clarius ad probandum quod contraindicare non sit prohibere, quam hæc Galeni sententia? inquit etenim virtutem aliquando contraindicare, interdum autem & prohibere remedium vsum: diuersum itaque est contraindicare ab ipso prohibere. libro quoque de curandi ratione, per venæ sectionem, cap. 13. illud apertissimè declarauit, cum dixit [morbi itaque magnitudo cum virium robore, primi erant mittendi sanguinis scopi, ille tanquam indicans quod fieri oportet, ille verò tanquam haud prohibens.] & subdit, [id quod contraindicare appellant quidam iuniorum medicorum.] quibus ex verbis quibus percipere potest in Galeni doctrina, contraindicare, nullo modo esse impedire, imò contra. nam quod impedit, contraindicare non dicimus, quod verò non impedit, id cōtraindicare, cum Galeno fatemur esse: quemadmodum hoc loco de virtute testatur, quam contraindicare venæ sectionem asserit, ubi eam nō prohibeat, iuniorum medicorum auctoritate; nisi quispiam falsò hæc Galeni verba tentet interpretari, velut quidam eorum, quos meminimus iuniorum medicorum Galeni doctrinam sectantium, interpretari conantur:

Rr 4

non ob aliud, nisi ut suæ opinioni faueant, quam contendunt de contraindicantibus: asserunt enim hoc in loco Galenum per hoc verbum *ἀλλὰ δὲ ἐναντία*, nolle intelligere contraindicare, sed coindicare, nam (ut ipsi aiunt) hæc vox *ἀλλὰ* cum alio copulata, quandoque significat, *sim, cum, & simul*: & sic voluit quod Galenus intelligat hoc in loco: in cuius opinionis confirmatione, eiusdem Galeni auctoritatem adducunt, primo de sanitate tuenda, quo loco hoc verbo utitur *ἀλλὰ δὲ ἐναντία*, ac ut ipsi fatentur voce *ἀλλὰ*, pro simul, seu cum, utitur: quasi dicat condiditur, seu simul diuiditur. Verum isti, ut mea fert opinio, autumantes eorum confirmare opinionem cum hac Galeni verborum expositione, in maiores errores incidunt, nam esto quod vox *ἀλλὰ*, concedatur modo, quandoque in compositione significare simul, aut cum, dicant quæso, quo in loco repererunt unquam Galenum, aut quempiam alium auctorem Græcum pro verbo *ἀλλὰ δὲ ἐναντία*, voluisse significare *cum* perpetuò compertum sit eisdem vocibus, diuersimodè utis ita quod per *ἀλλὰ δὲ ἐναντία*, semper contraindicare, & per *ὅτι δὲ ἐναντία*, coindicare intellexerit: aut quo modo unquam fateri audent Galenum voluisse vires venæ sectionis coindicare, cum semper eadem, aut contraindicabunt, aut prohibebunt venæ sectionem, aut purgationem? Ad hæc verbum *ἀλλὰ δὲ ἐναντία*, quo Galenus citato primo libro de sanitate tuenda, utitur, apud Græcos significat ex aduerso, seu ex opposito diuido, & non simul diuido, seu condidido: præter id quod Galeni verba citato loco conscripta, nil aliud significare queunt, per vocem hanc *ἀλλὰ δὲ ἐναντία*, quam quod ex aduerso diuiditur, ut ex verborum inspectione liquet: & nullo modo verificari posset eius sententia si aliter subintelligeretur vox illa *ἀλλὰ*, videlicet pro *sim, cum, aut simul*, sumptis itaque contraindicantibus & contraindicationibus, ac intellectis eo modo quo isti intelligunt, methodicorum inquam, in hoc opinionem, & non Gal. sententiam sectantes, proculdubio asserimus nullam ad medicum methodum, nec ad eam quam nos cōdere intendimus, pro medicandis febribus asserere opem. Qua etiam ratione profliganda penitus sunt, ac abiicienda correpugnancia, & correpugnationes, tanquam nullam parientes doctrinam, nihilque conferentes ad artis usum, sed potius artis medicæ tyronibus confusionem, ut ita dixerim, ac incertitudinem quandam afferentes: ex quibus facile in logicas atq; sophisticas disceptationes (quas omnino vitare debemus) incidere possunt. Verum ne quispiam audeat nos in hoc impugnare, asserimus cum Galeno, simul ac Hippocrate, quod ea quæ impediunt aliquid fieri, quod ab indicante quopiam postulat, quodammodo etiam conferunt ad dextrum usum remedium, & propterea neque eadem omnino despicienda esse opinamur; atqui non ut scopos quosdam indicantes, seu contraindicantes, aut ut proposita postulancia, sed ut prohibentia duntaxat, ea admittimus esse consideranda: neque omnia, sed quædam, nam neque cuncta prohibentia sunt à medio consideranda, ut liquet libro de optima secta, cap. 40. nunquam tamen quid faciendum sit, edocent; quæcunque fuerint ea, quæ aliquid fieri impediunt, hoc modo si considerentur.

Quid per contradicans & contraindicare in Galeni doctrina intelligendum sit.

Capit. XXV.

OS verò de contraindicationibus & contra indicantibus, aliter cum Galeno sentimus quam ea quæ aliquid fieri impediunt: inuenio siquidem in eius doctrina, bifariam de eiusmodi vocibus, eundem Galenum verba facere, nam quandoque per contraindicans intelligit id, quod contrario modo idem indicat, quod ab indicante fuit indicatum, seu significatum: id verò est propter ea quod non prohibet, qua ratione dicitur proprie contrario modo indicare, & hoc modo usus est contraindicantibus citatis locis, primo videlicet de ratione victus, & libro de curandi ratione per venæ sectionem, illud verò facile hoc exemplo comprobari potest. nam pone, aliquis affectus præter naturam, ut pote humorum redundantia sit, qui suapte natura indicet, ac exigit vacuationem, eamque notatu dignam, siue per sanguinis missionem, siue per purgationem. ponatur insuper vires ægroti adeo robustas esse, quod nullo modo impediatur id, quod requiritur ab indicante, hoc est ab humorum redundantia (intelligo autem eas non impedire) cum ex tali vacuatione non modo nulla eisdem inferatur noxa notatu digna, quinimo iuuentur quodammodo, utpote exoneratæ ab eo, quo veluti sarcina premebantur, hoc casu dicimus vires ipsas inspicientes, eas contrario modo indicare aliquid dictorum auxiliorum, propterea quod non ex seipsis illud indicant, quemadmodum ipsæ redundantia, sed contrario quodammodo, quoniam id non prohibent. Secundo modo possumus intelligere per contraindicantia, & contraindicationes (non quod illud idem ostendant, simul cum ipsis indicantibus, verum contrario modo) sed quoniam contrarium exigant eius quod indicans requirit: & hoc modo idem Galenus intellexit, 9. 11. & 13. de meth. meden. quando dicebat. Interdum contrarias incidere agendorum indicationes, & eodem 9. contraindicationes indicationum, & citato libro 11. iterum dicebat contingere quandoque contrarias indicationes, siue aduersas & pugnantes: & eodem 13. quando simul coeunt contrariæ indicationes, dicebat, [hoc itaque modo dicimus contraindicantia ea esse, quæ indicantibus sunt contraria, aduersæ quoque sunt indicationes, quæ ex eisdem proficiuntur, indicata etiam contraria.] quod etiam hoc exemplo confirmari poterit. sit affectus quispiam præter naturam, qui sui sublationem indicet, sint quoque ægrotantis vires quodammodo imbecillæ, ita quod sui conseruationem postulent, ut puta affectus sit plenitudo, quæ exquisitam vacuationem exigit, vires autem adeo imbecillæ, ut sui conseruationem postulent, & propterea etiam notatu dignam vacuationem ferre non possint; tunc fatemur vires contraindicare ipsi affectui præter naturam: quoniam contraindicans contrarium est indicanti, indicatum indicato, & indicatio indicationi. Quod verò virtus morbo seu præter naturam affectui aduersaria sit, & opposita, patet ex Galeno citato libro 11. de method. meden. ubi loquens de virtute, dicebat: [Nam ea morbo seu aduersatrix est opposita], propositumque medico est huic omni ratione opitulari, ac subuenire. Quod verò indicatio, quæ ab ea sumitur, contraria sit ei, quæ ab ipso morbo proficitur, liquet, nam hæc pro sui custodia, illa verò quæ à præter naturam affectu capitur, pro sui sublatione indicat: modò custodia & sublatio contraria sunt. Rursus & indicatum quo-

Quomodo impediencia fieri aliquid conferunt ad inuentionem remedium.

Primo si pos. seu p. possumus i. medicando.

Exo cit. ta. Commun. f. p. p. t. h. u. med. nes.

que indicatio contrarium existit. nam custodia similia exigit, sublatio verò contraria, quibus illa conseruatur, ille verò curatur, & aboletur. dicuntur ergo hæc propterea rationabiliter contraindiantia, quoniam per se semper contrarium indicant, quàm ipsi primò indicans, ex accidenti verò, quandoque dixeris ea impedire. Alio item exemplo id confirmari poterit Galen. 13. method. meden. Oriatur phlegmone in iocinore, sitque in summo vigore, qua ratione non nisi in halitum digestionem, seu vaporationem exigit. Verum partis ipsius natura, cum ex numero principum partium sit, quæ perpetuò roborantibus indigent, adstringentia requirant etiam eodem tempore, cum contrariæ indicationes coeant, inquit Galenus, propterea medicamentum adhibendum est compositum, quod facultates habeat contrarias: quo casu neque ex accidenti vna indicatio alteram omnino impedit, sed simul ambæ exequi debent; licet contrarium exigant. Istis denique duobus modis percepit in Galeni doctrina subintelligi posse contraindiantia, contraindicationes, & contraindicare, & nos etiam quandoque in hac nostra methodo vtremur. Verum ne in verbis deceptio contingat, quando per contraindiantia significare volumus ea quæ contrario modo indicant, ea contrario modo indicantia appellabimus, quando verò per ea quæ contraindiant subintelligere volumus, hoc est, quæ contrarium indicant, quàm fuerit ab indicante indicatum, tunc contraindiantia nuncupabimus. Hæc de indicantibus, coindicantibus, contraindicationibus, indicationibus, coindicantibus, & contraindicationibus.

Quid sit totius artis medicæ commune propositum: quidve huius nostre methodi proprium: ac quæ sit prima illa vniuersalis indicatio omnium præter naturam affectuum, à qua curandi methodus exorditur.

Capitulum XXVI.

SED iam tempus est, ut rursus ad propositum reuertamur: est autem id methodo, quæ per indicationem sit remedia inuenire pro febrii sublatione, quemadmodum etiam & vniuersæ methodi medendi primum propositum est morborum sublatio, ad proportionem respondens ei, quod in opere de sanitate tuenda proponitur, quod est sanitatis tuitione: ut patet nono de meth. meden. cap. 10. quanquam corporis constitutio, quæ causæ rationem respectu actionis continet, vtriusque facultatis scopus sit, & eius quæ sanitatem tuendam, & eius quæ morbum profligandum proficitur. quippe cum hanc & præsentem seruare, & amissam restituere, propositum nobis sit, eodem Galeno auctore, lib. 1. de sanitate tuenda cap. 1. dirigitur autem omne consilium vtriusque facultatis, ad vnum commune propositum: id verò est vitæ custodia. Nam siue sanitatem tueamur, siue morbos profligemus, non ob aliud vtrumque molimur, quàm vt vitam custodiamus, vt citato lib. 9. de meth. med. scriptum est. qua ratione si quispiam velit cum Galeno non sanitatem, sed vitæ custodiam esse totius artis medicæ commune, ac vltimum propositum tenere, nec eiusdem, nec etiam nostræ pugnabit opinioni: quicquid tamen sit de communi proposito totius artis medicæ in hac nostra methodo primum propositum est febrium sublatio, methodo videlicet, quæ per indicationem sit: pro cuius methodi institutione, propositum à primis ac vniuersalissimis indicationibus

exordiri: deinde ex illis ad alias descendere, donec ad eas, quæ amplius secari nequeunt, perueniatur. Est autem prima, atque vniuersalissima omnium præter naturam affectuum indicatio, quæ eorum sublationem præscribit: etenim & actiones lædunt, & noxam corporibus præstāt. singuli propterea morbi hoc faciendum dicitant, vt videlicet tollantur, atque auferantur; qua etiam ratione & febris prima indicatio, sui quoque sublationem indicabit. Ab hac itaq; prima, & vniuersalissima indicatione exordendum est, quò methodo febrem curemus. Verum licet hæc indicatio præcipua, vniuersalissima ac prima, omniumque morborum communis sit, tamen neque totum est, neque magna pars curationis, velut methodici putāt: inò nulla prorsus ipsius medicinæ artis adhuc portio, aut certe nec magna, nec propria, sed quæ etiam plebi sit communis, & primum tantam (vt sic dicam) suscitabulum, seu excitamentum, vnde medendi ratio promouet, vt ait Galenus libro 3. de meth. medendi: cap. 1. quo loco aduertant studiosi quòd vox illa Græca *ὀρμητικὴ*, parum rectè (vt mea fert opinio) interpretata est Latine à quibusdam [carcer] cum neque id significare possit vox illa; & si id significaret, haud scio quid veller Galen. asserere, quòd hæc prima indicatio sit veluti *carcer*. Longè itaque melius est, vt interpretetur Latine suscitabulum, seu excitamentum: est etenim hæc prima indicatio tanquam suscitabulum quoddam, seu excitamentum, vnde medendi ratio promouet. ex hac nanque rationalis medicus excitatur ad inuestigandas reliquas indicationes, quæ amplius plebi communes non sunt, sed ipsius artificis methodo medentis propriæ. Nam clarum est apud eundem Galenum, lib. 4. methodi medendi, cap. 4. primum scopum quòd medicus tendat, affectum ipsum, qui curari desiderat indicare, ex hoc verò (vt ipse inquit) & reliqua omnia sumi: & citato libro tertio de meth. meden. dicebat, [cui facultas est illa inueniendi, & quibus perfici possit quod à prima indicatione suggeritur, is meritò morborum est curator, qui, si per experientiam inuenit, obseruator, & empiricus est nominandus, sin ratione quadam & methodo, logicus, methodicus, & dogmaticus.] Est itaque febris ex eorum genere quæ molestiam inferunt, atque tristitiam: & quicquid homini molestiam ac tristitiam infert, hoc morbus vocatur, Hippocratis auctoritate, libro de flatibus. Nos verò clarioris doctrinæ gratia, affectum nominabimus præter naturam, meritò igitur ex sui naturæ primam sublationem indicat: sed quoniam hæc indicatio nedum medicis, sed etiam plebi (vt diximus) existit communis, ex hac tamen impellitur, & excitatur rationalis medicus ad inuestiganda ea, quæ ei sunt propria: vt pote quibus auferri debeat, ex communissimo quodā Hippocratis oraculo admonitus, citato libro de flatibus. quòd inquam contrariorum cōtraria sunt medicamina. hoc itaque quòd in dictione tam breue est, inquit Galenus, 11. de meth. meden. cap. 12. potestate deprehenditur maximum: quippe omnem medendi methodum confundet, quisquis hunc neglexerit scopum, cum omnia præter naturam sunt, ab his quæ ipsis sunt cōtraria, curentur, ac profligentur. perit enim quicquid in contrarium, & à contrario, vt tertio de meth. meden. cap. 1. scriptum est: qua item ratione idem Galenus lib. 11. eiusdem dicebat. [prima omnium curationis indicationum, quæ ex ipso, qui curatur mor-

Prima omnium indicatio.

Indicatio prima plebi communis, & sine arte.

Loco citato.

Cap. 1.

Cap. 9.
45.

bo, accipitur, contrarietatem prescripsit, hancque esse
vnum communem omnium morborum curationis
scopum. Quod confirmavit libro nono, cum dice-
bat, [atque ita rursus vnus solus erit curationum ma-
ximè generalis scopus; nempe contrarietas.] & li-
bro artis medicæ. [curatio verò (inquit) vnum præ-
cipuum, ac communissimum habet scopum, ei quod
aufertur debet, contrarium.] & libr. de constitut. artis
medic. fueritque id communissimum & generalissi-
mum, quò medela vniuersa spectat morborum, ait,
nempe contrarium, vti sanè vel ab Hippocrate di-
ctum est, contraria contrariorum remedia: particu-
latim verò contraria particularia. I hic etenim est il-
le primus scopus, qui nobis patefit, ac percipitur ab
vniuersalissima illa prima indicatione, quæ etiam
plebi communis est, à præter naturâ affectibus pri-
mò desumpta, ablationem siquidem sui indicanti-
bus. nam morbus suapte natura sui sublationem in-
dicat, sublatio verò contrarium, ac contrarietatem
docet. Verùm quoniam morborum plura sunt ge-
nera, cuique eorum sua erit contrarietas: quocirca
cum morbus, quem curare intendimus, in intempe-
rie sit positus, igitur per contrariam ipsi intemperie
sanabitur: & quoniam vniuersi febrium generis in-
temperies est calor, nimirum per frigiditatem cura-
bitur, sic omnes indicationes inter sese concordant.
Hac itaque methodo ab ipso affectu ad materias præ-
sidiorum peruenimus inueniendas per particulares
iplas indicationes, quæ oriuntur ex eiusdem affectus
subdiuisione, quando earundem materierum prin-
cipium inuentionis id sit, in quo finita est curandi af-
fectus diuisio vt liquet eodem 11. de methodo me-
den. cap. 7. cum ergo in hoc finiat, febris ipsius di-
uisio, quatenus febris est, quò videlicet intempe-
ries sit calida & sicca, ob id rationabiliter que infrigi-
dant & humectant, exigit, tanquam sua contraria,
vt patet nono, 10. & 11. method. meden. hæc quoque
perpetuò sunt omnis febris qua febris est, remedia,
quæ contraria iterum subdiuidentes, dicimus ali-
quando sanare nos febrem per ea, quæ effectu frigi-
da sunt; aliquando per ea, quæ potestate; aliquando
etiam per ea, quæ ex accidenti refrigerant: aut etiam
ista coniungentes. sic enim largiori vocabulo sub-
intelligere contraria volumus, simul cum Hippo-
crate, ac Platone, & non in qualitate corporum
duntaxat, quemadmodum Aristoteles sentire vi-
detur, parum de nominibus solliciti. si verò tu ma-
ius opposita, & non contrariorum contraria sibi in-
uicem esse remedia dicere, non reclamabimus. Ve-
rùm quouis modo contrarium, siue oppositum in-
telligatur, tollenda è medio sunt in hac nostra me-
thodo, ea quæ à tota substantia febribus aduersan-
tur: nam illa non alia ratione, quàm experientia in-
ueniri queunt, vt clarum est 13. meth. nos verò de iis
remediis ac contrariis verba facimus, quæ metho-
do, quæ per indicationem fit, inuestigantur: sunt
autem hæc, quæ actu, potestate, vel ex accidenti,
vt diximus, refrigerant & humectant, iisque vten-
dum contrariis pro cuiusvis febris sublatione, non
negantes quòd etiam auferri possint iis quæ à tota
substantia eisdem aduersantur, quorum fortè quæ-
dam pro curandis quibusdam febribus recensebi-
mus.

9. cap. 9.
10. cap. 10.
11. cap. 11.
Contraria
que intelli-
gatur con-
trariorum
esse reme-
dia.

Quomodo prima illa omnium curationis indicatio-
num, quæ ex ipso qui curatur affectu desumitur,
contrarietatem, ac contrarium docuit.

Caput XXXVII.



AETERVM quamuis omnia quæ
præter naturam sunt, ab his quæ ipsi
sunt contraria curentur, vt ex Hippo-
crato oraculo liquet, atque ex Gal. 11.
de metho. med. & 22. aph. 2. lib. xamen
non parum conducere videtur pro hac nostra me-
thodo constituenda, ac cæteris omnibus inuestigare,
quomodo illa prima omnium curationis indicatio-
num, quæ ex ipso qui curatur præter naturam affec-
tu, accipitur plebique etiam communis existit; huc
edocuerit scopum; nempe contrarium & contrarie-
tatem. Necnon qua ratione hic scopus vnus sit præ-
cipuus & communissimus curationis morborum o-
mnium à quo & reliqui omnes scopi & particulares
indicationes progrediuntur, eo quæ diuiso duos, aut
etiam tres alios oriri scopos, & ex his alios donec
diuidendo ad vltimas vsque species perueniamus.
Ex ipso nanque sumpto initio, reliqui particulares
scopi inquiruntur, vt citato lib. 9. meth. med. scriptū
est. Porro adeo duo hæc (vt mihi videtur) pro mor-
borum curatione vsum præstant, vt ipsis ignoratis
audacter censeam, per indicationes remedia inue-
niri non posse, nec ordinem & numerum earundem
diuisiua methodo vestigare, ab vniuersalissimis di-
uidendo, vsque ad eas quæ amplius secari nequeunt,
descendentes, vt sæpius diximus. Horum etiam
inscitia quosdam transuersos egit, qui de hac re
scribere tentarunt, vt longissime à veritate reces-
serint, mendososque ediderint libros, quibus ar-
tem ipsam medicam vniuersam destruere conan-
tur: reliquos verò omnes eo perterriti, vt metho-
dum hanc scribere haud aggressi sint: quinimò ne
quidem tantillum eam viti sunt olfecisse. Ipse au-
tem quid cum Galeno sentiam enarrabo. Quòd i-
gitur auferri debeat quilibet præter naturam affec-
tus, quòdque illud ex propria eorum natura om-
nes indicent, cuique nedum medico, sed & plebe,
seu vulgo, patens est. At quòd perfici debeat à con-
trario, & per contrarium, hoc vulgus ignorat. Ratio-
nabili autem medico confestim occurrit, Hippo-
crat. oraculo (vt prius dictum est) admonito, quòd
contrariorum contraria sint remedia, quocirca Gal-
len. libr. de constit. art. med. loco cit. dicebat: [Pri-
mum itaque est curatiue methodi communem sco-
pum omnium, vti dictum est, reperire, nempe con-
trarias esse contrariorum medelas.] I perit enim à
contrario vnumquodque, quemadmodum à simili
conseruatur. Et ob id idem Galenus (vt prius di-
cebamus) libro artis medic. scriptum reliquit, quòd
curatio vnum habet primum, seu præcipuum ac
communissimum scopum, ei quòd debet auferri
contrarium, quo in loco vsus est voce *ἐναντίον*, quæ
Latine significat contrarium: libro autem 9. & 11.
metho. meden. de hoc primo ac communissimo cu-
ratorio scopo verba faciens, sub quo cæteri omnes
continentur scopi; non contrarium dicebat esse,
sed contrarietatem, vsus voce, *ἐναντίον*, vt propter
ea non ab re in dubium veniat, num contrarium
vel contrarietas ipsa sit ille primus ac communissi-
mus scopus nobis prescriptus ab illa prima om-
nium indicationum, quæ etiam plebi communis est.
Cui responsum sit quòd vtrumque. Nam docens
nos contrarium adhiberi debere per quòd morbus
aufertur, simul etiam contrarietatem edocet. Et
enim si per contrarium auferri debet quòd præter
naturam est, opus erit non ignorare quæ, qualisque
contra-

contrarietas sit, inter hunc præter naturam affectum, & eum qui secundum naturam existit, ægrotantis proprium, ut ille aboleri, hic seruari possit, per eadem contraria adhibita, atque ita sanatio fiat. Cuique enim morborum generi sua erit contrarietas, inquit Galenus in metho. med. cap. 2. siquidem morbi sublatio, nil aliud est quam sanatio: ipsa verò sanatio aliud non est, ut inquit Gal. 9. meth. med. cap. 15. quam præsentis in corpore vitiosi affectus in naturalem habitum mutatio. Cum autem contrarii hi affectus sint, necesse est per contraria fiat eorum, alterius in alterum translatio, atque ita unus solus erit curationis maximè generalis scopus, nempe contrarietas: non siquidem ea quæ est inter præsidia & præter naturam affectum, sed quæ inter eundem, & secundum naturam affectum, qua ratione citato lib. de constitut. artis medic. locò cit. hæc verba scripta reliquit, [igitur curandi methodus, à sanorum atque ægrotantium corporum dispositione aufpicatur.] Quibus ex verbis cum eodem Galeno concludimus ab illa prima indicatione quæ ex præter naturam affectibus sumitur, atque ferè nobis præscribi ac doceri, cum contrarium, tum contrarietatem, appello autem contrarietatem nunc, viam illam cum quodam respectu quæ est inter iam dictos contrarios affectus, ambos in se continentem, vñ cum ea distantia, quæ habetur inter verumque affectum, illam verò translationem seu mutationem præsentis in corpore vitiosi affectus in naturalem habitum, quæ ex contrariis adhibitis perficitur, sanationem. Illud verò quod adhibetur medicamentum contrarium affectui præter naturam, nuncupò contrarium, ab eodem præter naturam affectu indicatum. Sed quæres cur lib. artis medic. contrarium dixerit esse primum ac communissimum scopum curationis: lib. verò 9. & 11. method. meden. contrarietatem? Dicas quòd cum libro artis medicæ solùm capita, & quædam veluti conclusiones eorum, quæ alibi latius fuerant demonstrata, ab eodem Galeno dicantur, ut ipse restit est citato libro, neque intendebat cunctas indicationes ac singulos scopos diuisa methodo vestigare, satis fuit contrarium dicere, sub quo etiam necessariò contrarietas subintelligebatur, ut superius demonstrauimus, libris verò method. meden. præsertim citatis, nedum communissimum illam ac primum scopum patet facere intendebat, verum etiam cæteros omnes qui ad inuenienda remedia cōducunt, ac arte quadam demonstrare qualiter in eo continebantur iidem reliqui omnes medicatorij scopi ac indicationes, eadem videlicet contrarietate diuisa, & non contrario, ad eandemque solam omnes reduci scopos: & propterea contrarietatem dixit esse primum, præcipuum, ac communissimum scopum, sub qua etiam contrarium continetur; & non contrarium: quāuis vbi que locorum innuat contrarium semper debere adhiberi pro curatione seu morbi sublatione. Ut verò hoc perficiatur, pendenda est contrarietas, quæ non solum est inter præsidia & præter naturam affectum, verum etiam quæ est inter præter naturam, & naturalem affectum. Nam cum hi affectus contrarii sint, necesse est (ut diximus) alterius in alterum, per contraria translatio fiat. Hac itaque ratione illa prima omnium indicationum, quæ à præter naturam affectu sumitur, & plebi etiam communis existit, atque ferè nobis & contrarium & contrarietatem præcipit. Quòd verò ex hoc vno primo ac communissimo curationis sco-

po, nempe contrarietate ipsa, quæ est inter vitiosum affectum, & eum qui est secundum naturam, reliqui omnes, ipsa eadem diuisa, & deinceps eisdem subdiuisis, ortum ducant, non erit difficile demonstrare, nam eadem contrarietate tanquam primo & communissimo curationis scopo, primum diuisa, duo curationis scopi necessariò emanat. Vnus est præter naturam affectus qui curari desiderat, ex iis quæ sibi contraria sunt, & propterea adhibenda remedia indicat, alter verò laborantis temperies, seu naturalis habitus laborantis, qui vñ cum ipso morbo, contrarietatis mensuram definit, fiat autem hoc modo, quoniam id quod ægrotat, ei quod valet est contrarium, utique per contraria est ab illo in hoc via, nam veluti viam quandam ire, quod præter naturam se habet, dum ad naturam redit oportet, eandem quidem, sed contrario itinere, ac si gradum reuocare debeat, per præsentis dispositioni contraria remeabit, inquit Galen. citato lib. de constitut. artis medic. cap. 12. Necessum est itaque ut in ipsis contrariis modus quidam seu mensura inueniatur. Non enim satis est calido affectui adiuuissse frigida, nisi id debita fiat mensura: cum alioqui metus sit, si intra modum id fiat, ne morbi reliquum quippiam relinquatur, sin modum excedas, contrarium genus morbi inducas, ut citato lib. 9. de method. meden. cap. 12. scriptum est. Qui enim supra quam par est calidum morbum refrigerat, is sanitatis mediocritate transmissa, alium excitabit morbum, qui sit frigidus quòd quò minus accidat, naturam curandi corporis scias oportet, quo quantum morbus ab illius symmetria discesserit intelligens, mensuram refrigeranti præsidio imponas. At fieri non potest ut quantum à se invicem distent inuenias, nisi compertum habeas quale esset corpus, aut humidum, aut frigidum, aut calidum, aut siccum cum valeret, quantum eunque ex his excederit postquam ægrotauit, quippe quòd plurimum à naturali habitu recessit, id vehementius eger contrariis, quòd non plurimum, leuius. Quare ex utrisque iam dictis scopis, hoc modo indicatio curationis præstatur, vitioso inquam affectu, ac naturali habitu, natura seu temperamento ægrotantis, qui duo communes adhuc scopi, à contrarietate ipsa diuisi, modo quo diximus, proficiunt. Contrarij etenim hi affectus, cum sint, ipsius quæ contrarietatis termini, non ab re primò in hos præcipuos ac immediatos scopos, ipsa contrarietas diuiditur, qua ratione si diuiditur, non erit dare tertium vniuersalem scopum, quem ambiens nos ad rem esse, cum Galeno demonstrabimus, nanque eum, vel ægritudinis causis, vel sanitatis, annumerandum esse censemus: nam si contrariam morbo temperiem habeat, è præsidiorum numero vnus est, sin similem, ægritudinalium causarum est vnus, ut patet eodem 9. meth. meden. cap. 14. Potest etiam & ambiens nos aer, tanquam vniuersalis etiam quidam scopus, vñam aliam, & tertiam efficere indicationem, vbi ipsi sunt in sanitatis, vel ægritudinis causis non annumerabis, sed tanquam tertium quoddam à geminis corporis iam dictis affectibus secretum, naturali videlicet, & qui præter naturam est, cum ambiens ipse is sit, sine quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas potest: & propterea causæ sine qua non obtinet rationem, ut eodem 9. de method. meden. scriptum est, qua ratione necessarium consideratu esse fatemur, eo quia fieri non potest, ut res sine eo sit quod causæ sine qua non obrinetur

Ex communi scopo qui est contrarietas, qui alij oriuntur.

1. Vitiosus affectus.
2. Temperamentum ægri.

3. Ex aere ambiens sumitur indicatio.

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

et hinc contrarietas

tionem Aristot. teste 1. de part. animalium cap. 1. ob
 quam rationem ipse alimentum necessitatem ascribit
 & 5. metaphysicæ text. 6. non solum cibo, sed etiam
 respirationi talem tribuit necessitatem, ipsis vide-
 licet animalibus, nam eadem neque esse, neque vi-
 uere possunt sine his. Est itaque hac ratione am-
 biens nos aer tanquam necessarium quoddam pro
 morborum sublatione perpendendus velut tertius
 quidam vniuersalis scopus, a quo tertia quoque vni-
 uersalis indicatio proficiscitur pro auferendis præ-
 ter naturam affectibus. Oritur quoque & tertius
 is scopus quodammodo ex eadem contrarietate di-
 uisa. Nam cum morbus & sanitas in quos primo
 contrarietas diuiditur, corporis sint affectus; & ille
 se tollendum, hæc verò se tuendum indicet; am-
 biens verò nos aeris sit, sine quo (vt diximus) nec
 tolli morbus, nec teneri sanitas possit; sequitur
 quod necessarium cum causæ sine qua non obtineat
 rationem, ab eo indicatio sumenda sit, tãquam ten-
 tia à iam dictis duabus pro morborum sublatione.
 Nam cum reliquis materiis tum diligere, tum fu-
 gere liceat, quam verò aer præstat, fugere non li-
 cet; imò necesse est præsentis calis statu vsq; idcirco
 huic quoque attenti esse cogimur, vt idem Galenus
 citato loco, inquit: est etenim materiæ reliquorum
 præsidiorum omnium electio in nostra potestate
 eius verò quam ambiens præstat, in nostra manu nō
 est. Quare oportet ex hoc quoque propriam quam-
 dam indicationem sumamus, vt ipse Galenus refert,
 vt pote qui sæpe cum iis quæ morbus facienda sua-
 det, concors sit, sæpe discors, & qui contra molia-
 tur. Vbi igitur cum reliquis medendi indicationi-
 bus consonat, pro gratia est habendum; sicubi ad-
 uersatur, inhibenda eius noxa est: quoniam ex ipsa
 rerum substantia concludit, citato libro 9. method.
 meden. cap. 15. non posse plura esse scoporum gene-
 ra, quæ ad medendum pertinent, quam tria quæ mo-
 do diximus, asserens medicatorios scopos ab ipso
 morbo sumi, à corporis temperamento; & tertio ab
 ambiente nos aere: quod si alij quidam positi sunt,
 vel postea non huius modo, verum etiam alij dicen-
 tur: omnes tamen ex iis in partes diductis nati vide-
 buntur; vt nos clariùs infra demonstrabimus. Hac
 itaque ratione, cogimur ambienti nos aeri attenti
 esse, tanquam tertio quodam vniuersali scopo ac
 necessario pro auferendis præter naturam affecti-
 bus, febribusq; ipsis, qui etiam scopus, ex ipsa quo-
 que contrarietate diuisa, non in duos scopos, sed
 in tres, proficiscitur, eodem aere nos ambiente se-
 paratim à duobus corporis affectibus, modo quo
 diximus, perpenso; & sic fatebimur tres esse, & non
 duos, curationis vniuersales scopos; quemadmo-
 dum etiam ex his quæ diximus patere poterit duos
 esse duntaxat, & etiam vnum, nempe contrarieta-
 tem, ex istis enim reliquos omnes particulares, tum
 curatorios scopos, tum etiam indicationes particu-
 lares cunctas ipsis videlicet in partes diductis, ori-
 ginem ducere demonstrabimus. Aduersus quam ad-
 mirabilem Galen. artem, atque doctrinam, non
 defunt quidam iuniores eiusdem Galen. verba, ac
 eorundem verborum sententiam parum recte (vt
 mea fert opinio) intelligentes, pugnare, asserentes
 quod mirari licet Galen. dum se pulchrum & ad-
 mirabile quippiam inuenisse putat, in huiusmodi
 improprietates loquendi incidere, aut etiam aliena
 à suis principiis tradere, quo fit, vt eundem obin-
 telligentes, cuncta destruere tenenti, exordien-

tes ab ipsa contrarietate; quam neque scopum, ne-
 que indicationem curationis esse posse, conantur
 probare; deinceps neque acriem, neque naturalem
 corporis temperiem, eo modo quo Galenus asserit.
 Ipse verò non magis Galen. quam veritati addictus,
 quam puto ab eo, nedum hac in re, sed in ceteris o-
 mnibus, quæ ad artem medicam spectant, fuisse
 prolatam, amicitia inter nos semper seruata ean-
 dem tueri, ac à calumniis liberare conabor, quod
 Galen. mira hac in re ars, atque doctrina pateat, &
 hæc nostra methodus de medendis febribus fir-
 mior euadat, omnibusque calumniis expurgetur.

Soluntur rationes eorum, qui contrarietatem

aduersus Galenum, curationem non

indicare contendunt.

Capit. XXV. Ad 1. l. 1. de morborum

VOD contrarietas nec indicet, nec
 indicatio aliqua sit, pro morborum
 sublatione, hæc prima ratione proba-
 re conantur. Si verum est quod Gale-
 scribit initio 3. lib. de metho. meden.
 absurdum esse aliud constituendum, quod curationem
 indicet, aliud verò quod curetur, nihil profe-
 ctò indicare poterit eorum, quæ ad curationem per-
 tinent ipsa contrarietas, quippe cum morbus non
 sit, & planè ridiculum fuerit si contrarietatem cura-
 ri dicamus, Solue. Gal. sententiam eodem loco non
 esse, quod nihil possit curationem indicare, nisi id
 quod curatur: sed demonstrare quod cum affectus
 præter naturam sit ille, qui curari debet, propterea
 ab eo prima sumenda est indicatio, quæ ab eiusdem
 natura primum oritur, & inueniendorum remedi-
 orum initium quoque ex ipsorum morborum natura
 sumendum, absurdum itaque est primas indica-
 tiones ab aliis esse sumendas quam ab ipsis præter na-
 turam affectibus. Etenim ipsi sunt qui primò eo-
 rum sublationem indicant, à qua indicatione, (vt
 sæpiùs diximus) præscribitur nobis contrarietas,
 quam demum curationem indicare, atque ad ea, quæ
 ad morborum curationem pertinent, conducere
 tanquam communissimum scopum, nemo nega-
 bit, etiam si morbus non sit, & sublationem sui non
 indicet, neque ipsa curetur: est etenim communis-
 simus curationis scopus ipsa contrarietas pro cura-
 tione omnium præter naturam affectuum rationali
 medico præscriptus ab illa communissima & prima
 indicatione primum orta ab ipsorum præter natu-
 ram affectuum natura, quæ nedum medico, sed &
 plebi communis existit: de qua loquitur Galen. in
 principio 3. de metho. meden. omnibus siquidem in
 confesso est, inquit citato loco, primas indicationes
 ex affectibus esse sumendas, nec propterea negauit
 quædam curationem indicare posse, licet morbi nō
 sint. Secundò tantum profecto abest, inquit, vt
 curationem indicet contrarietas, vt nihil aliud quic-
 quam indicare possit, nam si indicare est inuenire,
 quod iuuat aut lædat ea quæ indicant, quid quæso i-
 psa indicare poterit contrarietas? qua enim re, opus
 habet, vt iuuat vel lædat? an similia vel contra-
 ria exigit? an contrarietatem ipsam fouere vel ex-
 pellere volumus? sunt ne oppositionis sue contra-
 rietatis, vel potius status corporis causa inuenta re-
 media victusque ratio? Quibus quidem corporis
 status conseruatur & mutatur. Huic dicimus primò
 falsum esse, vt supra probauimus, quod indicare
 sit inuenire, quod iuuat aut lædat ea, quæ indicant in
 Galeni

*Galeni re-
 prehenses
 taxantur.*

*Exordet
 ratio.*

Refutatio.

*Exordet
 ratio.*

Galenī doctrina. Sed indicare est demonstrare seu significare id quod iuuat, & non quod lædit; tam si conseruationem, quā si sublationem intendimus. hæc autē vtilitā & iuuantia, fatemur non modo indicari ab his quibus opem ferunt, sed etiam à quibuscumque aliis quomodolibet conferentibus ad ea inuenienda pro auferendis præter naturam affectibus, aut seruandis his, quæ secundum naturam sunt, nam quicquid conducere quomodolibet videtur ad auxiliorum inuentiones, id fatendum est ad curationem esse necessarium, inquit Galen. lib. 9. eiusdem method. meden. cap. 7. quæ de re contrarietas, licet iuuantia pro sui sublatione non indicet, nec conseruatione, nec eadem auferri, aut foueri per ea debeat; est tamen primus ac cōmunissimus scopus curationis omnium morborum; non autem indicatio: ridiculum enim esset eam indicationem appellare, licet ab eo communissima quoque & prima nascatur indicatio pro eorundem morborum sublatione, ut diximus, tanquam à cōmunissimo scopo curationem indicante, ac conferente ad remediorum inuentionem, continet enim contrarietas, tanquam primus scopus curationis, affectus contrarios, nempe eum qui secundum naturam, & qui præter naturam existit: & cum sanari non valeat is qui præter naturam est, nisi in naturalem habitum mutetur, contrariique sunt hi affectus inter se, necessarium est ut per contraria fiat alterius in alterum translatio: id verò fieri nequit, nisi compertum habeas quantum inter se distent, ac qualis sit hæc eorum contrarietas, qua ratione contrarietas ipsa curationum omnium vnus solus erit præcipuus, maximæque generalis scopus, nempe omnes alij (ut sæpius dictū est) ex eo oriuntur. Hæc itaque ratione contrarietas curationem indicat, & ad remediorum inuentionem confert pro auferendis quibuscumque præter naturam affectibus. Rursus aiunt, quemadmodum idem auctor causam externam curationem indicare negat, quod illa nullius in digeat, sic eadem ratione contrarietas, nec conseruationem, nec curationem indicabit vnquam, quod scilicet illis opus nō habeat, at si non hæc, nihil profecto aliud: quandoquidem omne quod indicat, aut sui conseruationem, aut ablationem indicare (eo auctore) necessesse est. Dicimus nos conuenire in hoc causam procatacticam cum contrarietate, quod neutra earum alicuius indigeat pro conseruatione aut sublatione earundem, verum in hoc dissentire videntur, quod causa procatactica, nedum quicquam non indicat pro sui conseruatione, aut sublatione eorū qui corporis affectus sunt, contrarietas verò & si sui conseruationem aut sublationem non indicet, indicat tamen tanquam primus, & cōmunissimus scopus, curationis modum, confertque etiam ad inuestiganda ea quæ conferunt pro morborum sublatione, modo quo superius diximus. Et cum dicunt Galen. auctoritate lib. de opt. secta, & 3. meth. med. omne quod indicat aut sui conseruationem aut ablationem indicare, dicimus eundem Gal. fateri hæc esse primas duas indicationum differentias, quæ ex his primis duobus corporis affectibus, tanquam scopis, oriuntur, eo videlicet, qui secundum naturam, & eo qui præter naturam se habet: ille namque sui custodiam, & propterea similia, hic verò sui sublationem, eoque contraria possit. Quapropter asserimus quod quæ primò indicant illi duo sunt

scopi, quorum alter sui conseruationem, alter sui sublationem exoptulat. Verum ab hac prima indicatione, quæ ab ipsis præter naturam affectus natura oritur, confestim contrarietas nobis præscribitur, ex qua primū indicatione sumpta, morborum curatio nobis patet, & auxilia inuestigantur, ut id quod præter naturam est, auferatur suo contrario: quod quidem fieri non posset, eadem contrarietate, quæ est inter præter naturam, & secundum naturam affectum, ignorata. Potest igitur & hoc modo hæc eorundem ratio tolli, quod duo sunt in vniuersum primò indicantia: quodlibet enim indicans aut sui custodiam, aut sublationem indicat, Galeno auctore citato libro de opt. secta, eorum videlicet, quæ pro seipsis quicquam indicant: nam duæ etiam sunt corporis constitutiones, quarum altera seruari, altera auferri debet. Verum quæ non pro seipsis, sed pro aliis quicquam indicant, ut pro seruandis, seu auferendis eisdem constitutionibus possunt multò plura esse quàm duo, inter quæ contrarietas connumeratur, ex numero eorum quæ sunt corporis constitutiones non exstiens, & ob id nec sui conseruationem, nec sublationem indicans, sed morborum duntaxat curationem. Et si dicat vnumquodque de se magis indicare posse quàm de alio, Gal. auctoritate citato libro 3. method. meden. asserimus nos verum esse in his quæ de se ipsis, ac de aliis quicquam indicant: hæc etenim de seipsis magis quàm de aliis indicare possunt, non autem veritatem habere in his quæ pro aliis duntaxat, & non pro seipsis quicquam indicant, quemadmodum est contrarietas: hæc namque de aliis, & non de seipsa quicquam indicat, quoniam curationem morborum omnium, & non sui nec conseruationem, nec sublationem. Inquiunt deinceps, indicatur sane contrarietas, id est, contraria actio & contrarium (si contrarietatis nomine id intelligamus) ab eo quod præter naturam existit, siquidem eo opus habet ad sui sublationem, idem autem indicans, & id quod indicatur esse non potest: Sed (bone Deus) apud quem auctorem compertum, vnquam habent contrarietatem indicari? nam licet Galenus in method. meden. inquit quod prima omnium indicatio curatrix, quæ oritur ex ipso qui curatur morbo contrarietatem docuit, nunquam tamen fallus est ipsam, ab eadem indicatione indicari, vult enim voce *ἡδὲ αὖτε*, à verbo *ἡδὲ αὖτε*, quod Latine significat doceo, præcipio, seu planum facio: docet namque prima illa omnium curationis indicatio, at non indicat contrarietatem, aliud namque est indicare, aliud docere, præcipere, seu planum facere, per quam contrarietatem haudquaquam contrarium intelligendum est in Galeni doctrinā ut putant, & nos superius declarauimus, neque etiam contraria actio: ridiculum enim esset per contrarietatem, contrariam actionem intelligere, illa etenim conetaria actio, mutatio seu translatio in naturalem habitum, sanatio est & non contrarietas, ut 9. meth. meden. scriptum est. Verum eo modo intelligenda est contrarietas, quo nos paulò ante declarauimus. Quod verò contrarium, nedum à prima illa indicatione præcipiatur, verum etiam indicetur, nemini in dubio venit, cum quilibet præter naturam affectus pro sui sublatione contrarium exigit medicamentum, non erit itaque idem indicatum & indicans, nam licet indicet contrarietas pro morborum curatione, à nullo tamen indicatur, sed bene præcipitur, ut

Potest idē indicatam, & deinceps eam indicare. Dicant quāto effe indicat, & indicatū, & indicatū diuersis rationib.

dictum est. At concedatur pro nunc eandem esse quod sequetur incommo- dum: nunquid non poterit, diuersa tamen ratione diuersoque respectu idem esse indicatum & indicans, an putant hoc esse nouum quoddam apud logicos & philosophos? Porro ut morbus auferatur suo contrario, scire opus est contrarietatem, quæ existit inter eundem morbum & naturalem habitum seu statum agrotantis, quæ quanta, qualisue sit, qua ratione posset esse indicata: deinceps ea contrarietas ad remedia eligenda, alia tamen ratione pro eiusdem morbi sublatione confert ac curatione tanquam primus & communissimus curationis scopus & indicans, aliis ea methodo inueniri haudquaquam possent: idem ergo posset indicari & indicare, esse indicans & indicatum, propositum & postulatū, diuersa tamen ratione, asserere nedum in Galeni doctrina, sed philosophorum omnium aucter non veremur. Miror tandem cur redarguere Galen. tentant asserentes aliud colligi ex eius dictis, quàm ratio illius exposulet, sub his verbis: [ac profecto si quis locum cum Galeno legat, inueniet aliud planè colligere quàm ratio illius postulet, nam quod morbus contrariis ebeat, id quidem certissimum est, quemadmodum ipse statuit, ex quo quidem fit, vnum esse quod indicetur à morbo, nempe quod contrarium illi existat, nunquam tamen propterea efficit ut ipsum contrarietas indicet, aut indicatio sit.] Verum si quis non toruis oculis & pugnandi gratia Gal. verba perlegerit, ab eodem conscripta citato libro 9. de method. medend. sed vt ex eis veritatem addiscat, luce clariùs percipiet quod eodem loco Galen. doceat non modò à morbo ipso, seu præter naturam affectu quod contrarium illi existat indicari, verum etiam contrarietatem præcipi à prima illa morborum indicatione, vt supra demonstrauimus. Deinceps altius admirabilem hanc artem exorsus, eandem contrarietatem curationem indicare docuit, tanquam vniuersalissimum quendam ac præcipuum curationis scopum, à quo & reliqui omnes minùs generales scopi oriuntur. Inquies ergo hinc rursus sumpto initio, age particulares scopos disquiramus, concluderat etenim (vt sæpius dictum est) contrarietatem ipsam vnum solum esse ac maximè generalem curationis scopum: postea subdebat: [quoniam id quod agrotat, ei quod valet est contrarium, utique per contraria est ab illo in hoc via: & quomodo inquies, in contrariis inuenietur modus? non enim satis est calido affectui ad mouisse frigida, nisi id debita fiat mensura, cum alioqui metus sit, si intra modum id fiat, ne morbi reliquum quippiam relinquatur, sin modum excedas, contrarium morbi genus inducat.] Dij boni quis negabit Galen. his in verbis, ac eis quæ paulò ante, & post conscripserat, firmissima ratione probasse non solum contrarium morbo adhibendum esse medicamentum, sed tale ac tatum, quo tollatur morbus, seruetur verò naturalis habitus, seu secundum naturam affectus, atque iis omnibus morbum indigere pro sui sublatione, tu verò si contrarietatem ignorabis quæ est inter hos affectus contrarios, quæ qualis, quantave existat, qua via, qua methodo eadem medicamenta contraria inuenias? breuissimis itaque verbis, & contrarium, & contrarietatem insimul nos edocuit, quā itidē solā atque vnā tanquam

S. Ratio qua Galen. reprehenditur.

Refutatio cum Gal. defensione. Loco cit.

primum ac præcipuum scopum, vt sexcetiēs asseruimus, communissimumque curationis esse, eodem loco demonstrauit; cum satis ei non fuisset contrarium duntaxat demonstrasse. Non ergo aliud colligitur ex Galeni citato loco, quàm ratio illius postulet, quinimò quod probare ac concludere proposuit, satis superque suis in verbis demonstrauit. Quod verò contrarietas haudquaquam indicatio sit, aut esse possit, & propterea neque generalis, neque communis à qua alia nascantur, & nos supra alleuimus, & iterum cum Galeno fatemur. Quare non est, cur in hoc nostra proteletur oratio, sed ad alia conuertatur oportet. Arguunt postremo, si contrarietas, vel indicatio est, aut quippiam indicet, cur negat Galen. in libro de optima secta, communitem methodicorum indicare posse: nam vt communitas ad communia, sic contrarietas ad contraria se habet, nec aliqua aduersitatis ratio inueniri potest negat autem communitem indicare, quia non destruitur, atqui eadem ratione nec contrarietas dici potest indicare, quoniam nec ea, sed contraria ipsa pelluntur, itaque concludunt nec ipsam contrarietatem indicare, aut indicationē esse, sed si aliquem locum hac in re sibi vindicare potest, indicatur non solum à morbo, sed etiā ab omni alio corporis statu qui præter naturam existimatur. Vt verò huius rationi pateat responsio; animaduersione dignum est Galen. citato libro de optima secta aduersus methodicos demonstrare eorum communitates etiam si euidentes sint, nihil tamen utile demonstrare. Asserit enim diuersa esse ipsa communia indicare, aut indicare valentia ex communibus deprehendi. Methodici eadem indicare affirmabant, Galen. concludit aduersus eos nihil utile demonstrare communitates seu cōmunia. Verum admittit communium notitiam conducere ad percipienda, quæ particulatim indicare valent: quo circa præcepta quodammodo, vt ipse inquit, communia cum sint particularium cognitionem ostēdunt, quæ demum utilia indicare valent. Vniuersi igitur cognitio particularis utile indicare valentis, notitiam subministrat, tandem ipse concludit: deinceps verò post pauca communia non indicare, hac prima ratione probat, licet alias quoque nonnullas, & hac efficaciores in medium asserat, quibus sublati ægri fane- scunt, ab auxiliis ista delentur, ab his vero vtilium indicatio sumitur, quæ ab auxiliis præcipue destruitur. At particulares causas aut morbos saltem remedia principaliter destrunt; particulares igitur causas aut morbi saltem & non communia, utile indicant. Quod si communia utile indicent, adhibitaque auxilia indicantia destrunt, à particularibus auxiliis communia destruentur: communi autem deletio omnes eo tempore, sub eo communi agrotantes, fane- scunt, nulla penitus re in ipsis sublata: quamobrè si quod indicat, id destruitur, communia verò indicant, iam satis constat destructum iri communia. est etenim, iuxta eorum sententiam, medica- culas euidentem communiatum cognitio. Appellat autem euidentem non quod sensu percipitur, sed quod per se ipsum, licet sensui non subiaceat, comprehendendi possit: quare ferè manifestum, illi euidentem vocant. Ex quibus Gal. verbis facillè hanc eorū rationem soluere possumus, asserentes primo contrarietatem indicationem non esse, sed scopum, qui scopus quippiā indicat, quoniam curationē morborū omnium, vt 9. & 11. meth. med. ab eodē Gal. decre- tum est.

tum est. Cum verò dicunt pari ratione contrarietatem non indicare posse, quemadmodum methodicorum communitas quatenus communitas est, nihil particulatim vtile demonstrare, aut indicare potest, ita etiam & contrarietas quatenus contrarietas existit, nihil vtile particulatim nobis indicare valet, nisi id quod diximus, curationem videlicet morborum omnium, tanquam primus, solus, precipuus, ac generalissimus scopus. Verum ex ipsius contrarietatis notitia, ad ea quæ particulatim indicare valent percipiendæ deuenimus, quemadmodum & communitas, atque in hoc conducere simul cum Galen. fatemur: inuenimus autem vtilia, non per ipsam contrarietatem quatenus contrarietas est, sed per eam deuenimus in notitiam eorum quæ particulatim indicare valent, deprehendentes particulares contrarietates, quæ existunt inter particulares morborum species, seu genera, & eos affectus, qui secundum naturam sunt. Quamobrem Gal. II. meth. med. cap. 2. inquit: [prima nanque indicatio omnium curationis, quæ ex ipso qui curatur morbo accipitur, contrarietatem præcepit.] deinde subdit: [at quoniam morborum plura sunt genera cuique horum sua erit contrarietas.] quibus in verbis nobis planum facere voluit, quod licet primus curationum scopus ipsa sit contrarietas, quoniam sub ea tanquam præcepto vniuersali ac communissimo continetur omnium morborum curatio, cuique tamen morborum generi cum propria fuerit ac particularis contrarietas, eadem discenda erit atque inuenienda pro curatione cuiusvis generis morborum, per eam nanque & non per contrarietatem, quæ contrarietas est, particulatim vtilia inueniuntur pro eorundem morborum sublatione. Quemadmodum etiam ex vniuersalissimo Hippocrat. curationis omnium morborum præcepto, quod contrariorum contraria sint remedia haudquaquam vtilia, & remedia contraria pro sublatione particularium morborum indicantur: & propterea dicimus idem præceptum vtilia non indicare, sed ex eodem tanquam communi existenti comprehendimus, ea quæ particulatim indicare valent, ad quæ percipienda præceptum ipsum conducit, habita nanque generis morbi notitia, confestim tanquam vtile indicatur nobis quod contrarium ei remedium existit, pro eius sublatione esse adhibendum. Ex quibus liquet quod falsum est dicere ut communitas ad communia, sic contrarietas ad contraria se habet; & ratio diuersitatis in hoc consistit, nam methodicorum communitas non diuiditur in alias particulares communitates, nec easdem sub se continet. At contrarietas non vnam duntaxat aut duas, sed plures sub se ac diuersas continet particulares contrarietates, & tot quot sunt morborum species seu genera, cuique enim morborum generi sua adest contrarietas, ut diximus, non autem communitas; quoniam ea pluribus est eodem, ut liquet eodem libro de optima secta. Ad hæc communitas pro se ipsa & non pro alio indicat, ut methodici sentiunt, contrarietas autem pro alio & non pro se ipsa, ut dictum est, curationem indicat: & propterea communitates nunquam vtilia indicare valent, contrarietates autem cum particulares fuerint, eadem particulatim indicant & indicare possunt, ad quæ percipienda conducit & ipsa contrarietas, quatenus contrarietas est, ut primus ac communissimus scopus curationis om-

nium morborum: & cum aiunt communitem non indicare quia non destruitur, eadem ratione nec contrarietatem, quoniam nec eas, sed contraria ipsa pelluntur; dicemus in hoc etiam hallucinatos esse, nam licet per particularia remedia principaliter particulares causæ aut morbi destruantur, fatemur nihilominus, secundo & per accidens eandem particularem contrarietatem, quæ inter eosdem particulares morbos, aut causas, & secundum naturam affectus consistit, simul destrui vno contrariorum destructo, ab ipsis vtilibus indicatis ab eadem etiam particulari contrarietate, licet communissima illa contrarietas nunquam destruat. Methodicorum autem communitas; nunquam à particularibus auxiliis destruetur; nanque (ut ipse Gale. refert) si destrueretur, consequens esset ut omnes eo tempore sub eo communi aegrotantes sanescerent. Pelluntur ergo per se & primo contraria particularia ab ipsis contrariis auxiliis, insimul etiam & eorum contrarietas secundo destruitur. At Methodicorum communitas, ut etiam dictis patet, nunquam, & ob id nec vnquam vtile quippiam eadem indicabit pluribus, vna & eadem existens semper: contrarietas verò haudquaquam pluribus vna & eadem semper est, cum plura sint morborum genera. & cuique (ut sæpe dictum est) suasit contrarietas. At si quispiam voluerit breuiter huic dubitationi satisfacere, dicat hanc Galen. rationem aduersus Methodicos, satis probabilem esse, ita ut ipsæmet eandem pro eis soluat, alias plures statim, & multo efficaciores aduersus eos in medium afferens, ad probandum communitates vtilia non indicare. Liqueat insuper ex his quæ diximus contrarietatem non solum aliquem locum in hac re sibi vindicare posse, sed principium & primum, non modò ut indicatam, ut isti putant, sed ut indicantem: quinimò ut indicans scopus seu propositum magis contrarietas præcipuum ac primum locum sibi vindicauit pro morborum omnium curatione, à quo ceteri omnes minus generales, ac etiam particulares scopi proficiuntur: ut lucidissime Galenus libro nono de methodo medendi, cap. 15. demonstrauit: quo ignorato, vniuersa medendi methodus rueret atque destrueretur.

Rationes, quibus quidam probare conantur aerem curationem non indicare, diluuntur. Caput XXXIX.

QUOD ambiens nos aer eo modo sumptus quo Galen. intelligit, tantum abest ut curationem indicet; ut nec eam coindicare, aut contraindicare, vel correpugnare valeat, hac prima ratione probare nituntur. Aiunt enim quod ubi remedij vim subit, & ea ratione consideratur, quæ morbos tollendi facultatem habet, curationem haudquaquam indicare potest, si modò ea principia quæ 3. lib. meth. de hac re sunt posita, tueri velimus. *1. Ratio.* Etenim eo in loco scribitur, nihil esse posse quod curationem indicet, quod non curetur; absurdumque fore si quis aliter statuatur: quamobrem cum aer non curetur sed solum morbus, quomodo, quæsc, ille rationis indicator fuerit? Utque hæc eorum ratio efficacior videatur, iis verbis eam confirmare putant: [nec est quod putemus morbum præcipue indicare curationem, aerem autem ipsum id facere minori quadà vis ut dicitur, secundo loco & per accidens, quomodo quaestionarij medici vrgent leuè

*Refutatio
continens
verborum
Gal. expli-
cationem,
male à re-
probis scrib-
intellecto-
rum.
Quod præ-
sum omnium
inducit, &
ad quod cu-
ratur, idem
est.*

effugere nituntur, nam si absurdum est aliud esse quod curationem indicet, aliud verò quod curetur, necesse est ut omnia curari dicamus quæ curationem indicant, præcipue autem illorum opinionem, morbum, alio verò modo aërem ipsum, quæ planè sunt ridicula. Sed pace eorū dixerim, aut Gal. quam portant auctoritatem obintelligunt, aut intelligere nolunt, siquidem, ut prius dictum est, eius sententia non est, ut isti putant, quòd nihil esse possit quod curationem indicet, quòd non curetur; sed cum de primis indicationibus sermonem faceret, quemadmodum in calce præcedentis lib. de meth. med. proposuerat, & in principio eiusdem 3. lib. pertractare incipit, dicebat easdem primas indicationes apud omnes in confesso esse ex affectibus fore sumendas, nanque absurdum esset aliud esse quod curationem indicaret (primò videlicet & præcipue) & aliud quod curetur: volens concludere quòd prima illa indicatio quæ omnibus communis existit, etiam plebi, à morbis, seu præter naturam affectibus sumitur, qui curari debent: hi etenim soli sunt, qui indicant eorum sublationem, absurdum siquidem esset aliud esse quod curationem indicaret; primo scilicet, utpote morbus seu affectus ipsos præter naturam, & aliud esse quod curaretur præter eos, non negans quòd aliud esse possit, quòd & si non curetur, curationem tamen indicare etiam valeat, licet non primò, nec pro sui sublatione, quemadmodum ipsi præter naturam affectus: id quod etiam 4. lib. eiusdem meth. meden. cap. 4. confirmavit, cum dicebat curationis indicationem ab ipso affectu initium habere; quæ verò particulatim sunt agenda, hæc tum ab eo quod primum indicatio distat, tum verò ab agræ partis natura, tum ambiens temperie, quæque alia his cognata sunt, inueniri, & paulo post inquit, [Auspiciari nanque perpetuò oportet ab indicatione quæ ab affectu cui mederi paramus, accipitur.] Potest itaque, ut ex iam dictis liquet, acy licet

*Altera e-
iusdem ra-
tionis refuta-
tio.*

non curetur, curationis esse indicator. Insuper & ex eisdem haud agrè huius rationis confirmatio diluitur: nam falsum est fateri omnia curari quæ curationem indicant, sed bene quæ primò & eorum sublationem, & propterea non sequitur, ut ipsi opinantur, ex Galeni auctoritate morbum præcipue curari, alio verò modo, seu secundariò, aërem ipsum, nam hoc ridiculum esset, ut ipsi bene inquirunt. Possunt etenim, ut milles diximus, quædā curationem indicare, quæ tamen haudquaquam curantur, inter quæ ambiens nos aer connumeratur, tanquam causa sine qua non, quemadmodum cum Galeno concludimus, cum quo etiam proculdubio asserimus nihil aliud primò & præcipue curationem indicare posse quàm morbum ipsum, seu præter naturam affectum qui curari desiderat, neque à quopiam alio primam indicationem esse sumendam, ac initium inueniendorum remediorum. Præterea inquirunt, cum aer eo loco sumatur, ut instrumentum, & materia medica qua utimur, tum ad naturales affectus conseruandos, tum ad eos qui præter naturam sunt, propellendos: quomodo quæso, aliquid indicare poterit, siquidem materia est quæ indicatur, non indicat, nimirum cum indicatio comprehensio sit iuuantis & nocentis, quæ ab eo quod iuuari debet, oritur; alioqui si id quod indicatur vquam indicare posset, idem esset morbus & remedium, sanitas & victus; & idem quod iuuat cum eo quod iuuatur, ut ergo nullum aliud remedium indicat, aut coindicat, vel contra-

indicat, aut correpugnat, sic nec aer aliquid eorum efficere potest. Atqui nos cum Galeno fatemur 9. de method. medend. cap. 14. quòd aer tanquam causa sine qua non, instrumentum seu materia medica ab eodem sumitur, quo etiam ut materia utimur, tum ad naturales affectus conseruandos, tum ad eos qui præter naturam sunt, propellendos, & hoc modo eum aliquid indicare posse pro morborum curatione, affirmamus. Cum verò inquirunt, quomodo igitur indicare poterit, si materia est quæ indicatur & non indicat? Dicimus falsum esse aërem tanquam materiam indicari, licet ut materia & causa sine qua non, indicet, verum admittimus eundem aërem tanquam auxilium indicari, & non ut materia, & cum probare tentant ipsum veluti materiam indicari, in medium afferentes indicationis descriptionem, quæ, ut ipsi putant, comprehensio est iuuantis & nocentis, quæ ab eo quod iuuari debet oritur, dicimus hanc fuisse causam propter quam velut cæci in foueam lapsi sunt: putarunt enim ab eo quod indicat, simul & nocentia & iuuantia indicari, & propterea auxiliorum materia, & non auxilia, quod quidem valde alienum à veritate & Galeni doctrina esse censuimus, ut superius demonstrauimus. Quandoquidem per indicationem ipsam non nisi iuuantia comprehendimus, insimul cum comprehensione nocentium, hoc est præter naturam affectum, qui eadem iuuantia ac eis vitia duntaxat indicant: & propterea non medicamentorum materias, quæ in quatuor generibus consistunt, ut in sequentibus patebit, sed easdem materias idoneas tanquam remedia & auxilia, exigunt. Indicatur itaque aer tanquam remedium, auxilium ac iuuans, ab his qui eadem exigunt, indicat verò ipse ut materia seu causa sine qua non: qua ratione, ut tertius scopus curationem morborum indicans, & contrarie ipse diuisa proficiscitur, ut sæpe diximus: propterea diuersa ratione indicatur & indicat, & proinde quòd cōcludere incommo- dum quærunt, non sequitur, quòd videlicet idem esset morbus & remedium, sanitas & victus, & idem quod iuuat, cum eo quod iuuatur, indicatur enim, ut auxilium & iuuans, nam id auxilium appellamus, indicat verò ut materia, cōuenimus propterea cum eisdem, quòd quemadmodum nullum aliud remedium quatenus remedium est, indicat, aut coindicat, vel contraindicat: aut correpugnat, ut ipsi dicunt, sic nec aer tanquam remedium ac auxilium aliquid horum efficere potest, sed bene ratione qua aer nos ambiens ac materia, & causa sine qua non. Insuper aiunt, nec illud quidem aliquid facit quòd scribit Gal. id eo ab aëre indicationem capi, quòd sine eo morbi tolli, & sanitas retineri nequeat, quòd in aliis remediis non contingit, quæ in promptu sunt, quorum vsum euitare vnicuique licet, neque enim omnes morbi egent aëre ut remedio, quales sunt qui partes affligunt instrumentarias, quibus nihil aer confert. Quibus verbis sole clariùs ostendit quàm gratis studeant Gal. cōtra dicere, fatetur nanque propterea propriam quandam indicationem ab aëre sumendam esse pro morborum curatione, cum id sit ambiens nos aer, sine quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas potest, etenim reliquorum præsidiorum materia omnium electio in nostra potestate existit; eius verò quam ambiens præstat, in nostra manu non est: & propterea reliquas materias tum deligere, tum fugere licet: quam autem ambiens præstat

*Antis-
tium mor-
tuorum
causa spe-
cialis.*

Sp.

*Cal-
idum
dum
quæ
non*

4. Rat.

Refuta-

Refuta-

præstat, fugere nō licet, separat enim aëris materiam à materia aliorum remedium, & non ipsum tantum remedium à reliquis remediis ut isti arbitrantur, ipsum nanque ambientem nos aërem tanquam materiam vitare non licet, nam nolentibus etiam nobis per transpirationem saltem, qualiscunque fuerit, ipsum attrahimus, at materias aliorum præsidiorum, in nostra potestate est, tum deligere, tum fugere: peruertunt ergo verborum Galeni sententiam, cum materias auxiliorum seu remedium ad auxilia seu remedia transferant. Sed magis eos mirari contingit, cum inquirunt quod non omnes morbi egent aëre ut remedio, quales sunt qui instrumentarias affligunt partes, quibus nihil aer confert: cum nedum similiarum partium & instrumentarium morbi proprii, aëre ut auxilio pro eorum curatione indigeant, verum etiam & qui communes utrique exsistunt: utpote in soluta continuitate, in similiarum partium propriis, nemo dubitat, in instrumentariis, quis negabit? in inflammatione seu erysipellate aërem ut remedium conferre, qui neque nimium calidus aut frigidus existat, sed egelidus aut mediocriter frigidus, quis in schirrho & cedemate frigidum aërem non vitabit, ac calidum non eligat? Atque simili ratione in aliorum quibuscunque qui in numero, positione aut figura sunt morbi pro eorum curatione contrarium aut morbo, aut causæ, aut utrique præparare non studeat: Vlcera quoque ac reliquas continui solutiones carni euidentibus, ossibus, tendonibus, nervis ac ligamentis, absque aëre tanquam remedio quis curare tentabit? quod adeo manifestum est in Hippo: Galen. ac aliorum artis medicæ bonorum auctorum doctrina, ut alia probatione vel auctoritate non egeat. Est igitur aer nos ambiens tanquam causa sine qua non, perpetuo attendendus pro omnium morborum curatione, velut tertius scopus indicans curationem à contrarietate ipsa diuisa proficiens, quemadmodum supra demonstrauimus, nam ubi cum aliis medendi indicationibus consonat, inter sanitatis causas annumeratur; ubi discordat inter morbosificas semper in omni morbo, licet ut remedium indicetur, & non indicet vnquam. Adhæc arguuntur, ut aëre sic cibo & potu somno & vigilia sanitas conseruatur, & morbi propulsantur, nec minus sanè difficile est illorum noxas quam quæ ab aëre excitantur, euitare, cum ea mala, quæ ab illis nascuntur, nulla re sepius mitigari queant, aëris autem iniuriæ, vel loci mutatione, vel alia ratione promptè corriguntur. Sed cum parum efficax sit hæc ipsorum ratio, facile utrique deleri poterit, admittimus enim nedum aëre duntaxat nos ambiente, sed cibo & potu, somno & vigilia, motu & quiete, ac reliquis huiusmodi, & sanitatem conseruari, & morbos propulsari tanquam necessario corpus nostrum alterantibus. Verum non pari ratione: nam absque aëre neque sanitas vlla seruari, nec morbus quispiam propulsari vnquam potest, ut fa-
pius diximus: at sine cibo aut potu, somno aut vigilia, motu aut quiete, inanitione aut repletionem, & sanitas quædam seruari aliquo tempore, & morbi nonnulli profligari possunt, non enim continuo & semper eis vtimur, ut aëre, nam non semper comedimus, aut semper bibimus, dormimus, aut vigilamus, mouemur, aut quiescimus, siue sani, siue ægrimus: quemadmodum ambientem aërem perpetuo ac continue respiratione, aut saltem transpiratione

attrahimus. Quamobrem Galen. ab aëre tanquam causa sine qua non, & non à reliquis, indicationem præcepit esse sumendam. Cum verò dicunt quod non minus difficile est illorum noxas, quam quæ ab aëre excitantur, euitare, ob eam quam ipsi reddunt, causam asserimus, in hoc bifariam eos hallucinatos esse, primo quod non propterea Gale. aërem indicare, & non aliam modo dicta faretur, quod sit difficilius eius noxas, quam illorum vitare, sed quoniam materia quam aer præstat, in nostra manu non sit: coguntur namque ægrotantes, velint nolintve præsentem aërem uti: at reliquorum præsidiorum materia in nostra utique potestate exsistit: ita ut eligere & vitare valeamus & cibos & potus aliquos, si militer somnum & vigiliam, ac reliqua pro nostro arbitrio, & prout conducere aut lædere videantur. Adhæc quis negabit difficilius vitari posse, quæ ab aëre excitantur, noxas, quam quæ ab illis, si illas omnino vitare est impossibile, has vero facile: aërem nanque non attrahere qualiscunque fuerit impossibile est. Ergo ubi similis morbo fuerit, non poterit non lædere, reliquorum vero noxas, ut diximus, facile euitare valeamus, lædentem cibum aut potum haudquaquam ægro tribuentes: sic somnum aut vigiliam ubi nocuum est inferant, ac reliqua omnia prohibentes: licet quæ à quibusdam istorum nocuenta proueniunt, quandoque ægrius corrigantur, quam quæ ab aëre modicè lædente, ut vigilia in nephritide, somnus in soporosis ac lethargicis affectionibus, & noxæ quæ à venenatis cibis aut potionibus producuntur. Subdunt deinceps. [ac multo minus illud video esse necessarium quod ille statuit: ut scilicet, præsentem cæli conditionem semper vtamur: quandoquidem per sanitatem & leuiiores morbos facile in alium aërem migrare vnicuique liceat, in grauioribus autem malis in quibus non licet id facere, non datur etiam prædictorum vitia fugere, requirimus etenim ad morbos fugandos somnum, vigiliam, quæ aliquando nulla arte conciliare aut arcere conceditur. hæc ipsi, quæ cum reuerentia admodum puerilia esse videntur. Nam licet per sanitatem & leuiiores morbos facile in alium aërem migrare vnicuique liceat, num verebitur quispiam toto eo tempore quo in alium migrabit aërem æger, quod ab eo in quo ægrotauerit semper nō alteretur: cum necessario ipsum attrahere cogatur? Quamobrem Galen. falsus est quod necessario oporteat præsentem cæli statu uti, nam quomodo contrarium fiet, si absque aëris attractione vivere non possumus, qualiscunque is fuerit? Cogitur itaque æger eo cæli statu uti, in quo ægrotauit, velit, nolit, etiam in leuioribus morbis, vsquequo in alium aërem migrauerit, non autem eodem cibo & potu ac reliquis, quæ licet necessario corpus alterent, ut aër, non tamen ita continuo, & semper. [tanta nanque omnibus corporibus spiritus necessitas extat (ut inquit Hippoc. lib. de flatibus) ut siquidem omnibus aliis abstineat homo, neque cibum sumat, neque potum, possit tamē dies duos vel tres, & plures ducere. Si verò spiritus in corpus viæ interceptetur, in breui parte vnus diei intereat.] & subdit: [amplius autem ab omnibus operibus aliquando homines quiescunt immunes, verum ab hoc opere, nulla omnibus mortalibus animantibus requies contingit, ut cessent spiritum adducere, & rursum exhalare.] hæc ille. In grauioribus autem malis, in quibus non datur aërem mutare, non æquè (ut prius dixi-

mus) licebit etiam aeris ac prædictorum vitia fugere, cum aeris noxas haudquaquam vitare valeamus. etenim continuè ab eodem ac maxime corpora alterantur: reliquorum vero noxas, aliquo saltem tempore vitare possumus, ut paulò ante demonstrauimus: quamuis contingat quandoque somnum aut vigiliam, nulla arte conciliari aut arceri posse. non enim quòd difficilius aeris noxæ corrigantur quàm reliquorum iam dictorum, aerem indicare, & non illa deceretum reliquit Galenus, sed propterea quòd reliquas materias tum deligere, tum fugere licet; quam autem ambiens præstat, fugere non licet, ut fœcetes retulimus. Quo etiam errore ducti alia ratione tentant eandem de aere Gal. sententiam peruertere, ac impugnare. Aiunt etenim: [Quin & aqua incommoda difficilius, quàm aeris intemperies emendantur, nimirum cum tota vna regio eadem aut parum differente aqua (quoniam & eadem terra) sæpè utatur, aerè autem diuerso, siquidem in eadem domo eum variari videmus, quando pro diuerso locorum eiusdem domus situ, diuersam naturam & qualitatem assumat; eas præsertim, quas in morbis tollendis eo loco Galenus querit, nempe caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatem.]

6. Ratio.

Refutatio.

Quam rationem iterum eadem ratione tollimus. neque enim Galenus falsus est propterea aerem indicare, & non reliqua commemorata, quoniam eius noxæ difficilius corriguntur, sed propterea quòd ab eodem continuo opus est corpora nostra alterari, siue agri, siue sani simus: neque id, ne momento quidem vitare possumus: id quod ab eisdem haudquaquam contingit. At concedatur id voluisse Galenus nullius valoris, nec ad propositum esse videtur hæc eorum ratio. Nam non propterea difficilius aeris noxas corrigi fatemur, quia pluribus vel paucioribus sunt communes; quemadmodum isti de aqua probare nituntur, verum propterea, quia respectu vnius, & eiusdem agroti difficilius eandem emendari contingat, tanquam magis continuas, atque perpetuas, utpote cum nullo non tempore eadem ab aere ambiente non inferantur, ac augeantur, id quod de aquæ incommodis (eadem etiam vitiosa existente) haudquaquam asserere audendum est: possumus namque quodam saltem tempore agros arceri, ut eadem non utantur aqua. Quapropter si Galenus etiam asseruisset difficilius corrigi noxas, quæ ab aere sunt, quàm quæ à reliquis, & propterea eundem duntaxat indicare, non propterea hæc eorum ratio quicquam concluderet aduersus eundem, etiam si totum id quod in hac ratione fatentur, eis concedatur. Inquiunt postremo: [Quòd si illud concedamus difficilius aeris noxas vitari, quàm aliarum rerum quæ sanis ægrisque corporibus adhibentur, non tamen propterea huiusmodi difficultas indicandi causa esse debet, alioqui inter alia indicarent, quæ difficilius corrigi possunt.] Sed hæc ratio aliud concludit, quàm probare proponit. nam concessio quod aeris noxæ difficilius vitentur, quàm aliarum rerum: & ob id curationem indicet, non propterea sequitur quòd inter alia indicarent, quæ ægrius corrigi possunt, sed ea quorum noxæ difficilius vitantur: aliud etenim est noxas alicuius difficilius vitari, & aliud easdem noxas illatas iam, difficilius corrigi, possunt etenim noxæ quædam ægrius vitari, & tamen facilius quandoque corrigi. Quamobrem indicandi causa esse debet ipsius aeris difficultas hæc vitandi

7. Ratio.

Refutatio.

eius noxas magis quàm aliarum rerum, & nullum propterea sequitur ex hoc incommodum: & non ob id quod ægrius eius noxæ corrigi valeant: nam hoc falsum esse fatemur, nec vnquam Galenus illud somniauit, neque etiam vnquam asseruit quòd propterea aerem indicet, quia eius noxæ difficilius vitari queunt, sed tanquam causa sine qua non materiam præstans, quam vitare omnino non liceat qualiscunque fuerit, quod reliquis materiis præsidiorum omnium haudquaquam conuenit. etenim earum electio in nostra potestate existit, ut ipse testis est, nono de meth. medendi. Reponi itaque debet inter indicantia aerem non sine forti ratione, atque connumerari inter præcipuos scopos, qui curationem indicant, à contrarietate ipsa diuisa pullulantes, quemadmodum à Galeno, nono, & vndecimo meth. med. decretum est: quicquid alij aduersus eum sophisticis, admodum probabilibus, & parum efficacibus rationibus probare nituntur, consentiente ipsa rei natura seu substantia, ac principiis ab eodem Galeno de indicationibus positus, nobis illud sole clarius demonstrantibus.

Soluantur rationes eorum, qui naturalem corporis temperiem pro morborum curatione nihil indicare contendunt. Caput XXX.

Non solum naturalem corporis temperiem quam inter primos & præcipuos scopos curationis morborum simul cum Gal. connumerauimus, verum etiam singula alia quæ secundum naturam sunt, quippiam pro eorundem morborum curatione indicare, euertere tentant, quò penitus vniuersa, ac mira, artificiosaque hæc medendi methodus à Galeno cōscripta, ipsaque ars medica tota ruat, quinimò audent de tanto viro asserere quòd in hoc ipse sui sæpè obliuiscatur, & rarò de eadem re diuersis in locis idè tractat, nec posita principia tueatur. Nos verò ordinem quandam seruantes, eorum singulas rationes diluere conabimur, ut & Galeno veritas pateat, & quam scripsit medendi methodum, & hanc nostram quam de febribus condimus, à calumniis liberemus, exordientes primò ab his quæ in medium afferunt de naturali corporis temperie, quarum prima hæc est. Cum Galen. lib. vndecimo meth. med. cap. 13. & passim alibi scribat vnum semper vnum indicare, quoniam vnaquæque res vnicam habet naturam: pro cuius confirmatione addimus nos illud Galeni scriptum etiā reliquisse, nono metho. med. cap. 12. aiunt ipsi quòd oportebat huius principij eum memorem esse, nec vnum ad plura, diuersique generis indicanda assumere, aut alioqui huiusmodi methodum non aggredi, quæ (ut inquit) huiusmodi principio neglecto, consistere nequit; nam omnia quæ secundum naturam sunt, nobis familiaria & arctica existunt, & propterea sui conseruationem, & tutelam perpetuò indicant, curationem autem aut remedia, vel illarum quantitatem, qualitatem, vel locum, vel modum, aut quempiam alium scopum, quem in illis obseruare oportet, nequaquam, si modo idem sui ablationem & conseruationem simul exposulare nequit. nā quòd secundum naturam est, nunquam non desiderat sui conseruationem. at quomodo curationem quæ morbis debetur indicabit vnquam? quomodo illa eadem quæ nobis sunt familiaria indicabunt remedia? si cōseruationem indicant, quæ victu peragitur?

rem.

remediis autem mutatio prioris status in alium con-
tingit. Hæc ratio licet communis sit omnibus se-
cundum naturam existentibus, eam tamen primò
soluendam duximus, quoniam naturalem temperi-
e inter omnia quæ secundum naturam existunt primò
morborum curationem indicare, simul cum Gale-
no conclusimus. Poterit autem communis esse hæc
responsio singulis aliis, quæ secundum naturam sunt:
quare dicimus verum esse quòd quicquid pro natu-
ra sua indicat, id semper vnum indicabit ceu quòd
vnam habet naturam, vnamque semper dari ex re
quæque indicationem; si præter naturam sit quòd
indiceret, contrarium semper indicare, si secundum
naturam se habeat, non contrarium, sed simile, vt li-
quet nono, & vndecimo meth. med. Et cum aiunt
Gal. vnum ad plura diuersique generis indicanda af-
sumere, hoc falsum esse fatemur: nam quicquid in-
dicant ea quæ secundum naturam sunt, non propter
aliud quam pro eorum conseruatione, & propterea
simile, indicant, etiam si eadem morborum curatio-
nem quandoque indicent, quemadmodum est natu-
rale temperamentum, quod est vna cum ipso mor-
bo contrarietatis mensuram definit, itaque per eum
in contrariis eueniatur modus, ac debita mensura,
illud tamen non alia ratione, quam vt ipsummet per
similia seruetur, indicabit, definit enim contrarie-
tatis mensuram, quam morbus ipse exigit pro sui
sublatione, pro eiusdemmet sui temperamenti con-
seruatione, quam si vtique non definiret, ac per eam
ipsum haudquaquam seruetur, proculdubio mor-
bus ipse per eadem contraria curationem non susci-
peret, eum sanatio nil aliud sit, quam præsentis in
corpore vitiosi affectus in naturalem habitum, seu
naturale temperamentum mutatio, vt sæpius dixi-
mus, definitur itaque contrarietatis mensura quam
morbus exigit pro sui sublatione insimul ab eodem
morbo, & naturali corporis temperie, Galeno au-
tore, citatis locis, verum à morbo pro sui sublatio-
ne, à naturali corporis temperamento pro sui con-
seruatione, primo etenim sublato, & reliquo conser-
uato, & morbi curantur, & sanatio fit. Potest itaque
temperamentum vna eademque indicatione, sui tu-
telam, ac morborum curationem indicare, modo
quo diximus, nec quicquam referre putamus, si di-
xeris indicare sui tutelam, & eadem ratione morbi
curationem contrario modo indicare: nec propter
ea conseruationem simul atque sui sublationem in-
dicabit, vt isti concludere quærunt, sed perpetuò
sui conseruationem, & morborum ablationem. Cum
verò aiunt quomodo illa eadem quæ nobis sunt fa-
miliaria indicabunt remedia, si conseruationem in-
dicat, quæ victu peragitur; remediis autem mutatio
prioris status in alium contingit? non possum non
mirari cur in hæc prorumpant verba. nam etsi con-
seruationem indicent quæ nobis familiaria sunt, ac
secundum naturam, illa necdum victu peragitur, si per
victum cibum & potum subintelligit, sed aliis qui-
busdam nonnullis; vt liquet primo, & quinto de fa-
nitate tuenda, & libro num tuenda sanitas, ad Thra-
syb. at si per victum reliqua subintelligere volunt,
quæ quandoque Galenus subintelligit, cur effertur
remediis mutationem fieri prioris status in alium?
cum remedia appellentur, seu auxilia quando pro-
sunt, ac proficiunt; quinimò omnis materia quæ quo-
modolibet corpus alterat, quo tempore iuuat, au-
xilium dicitur, eodem Galeno auctore, vndecimo
meth. meden. cap. 1. quæ de re & cibis & potus, som-

nus & vigilia, motus & quies, inanitio & repletio, ac
horum reliqua, vbi iuuabunt, remedia, præsidia seu
auxilia nominare licebit, tam si priorum corporis
statum in aliū mutant, quam si eundem conseruent:
& eodè vndecimo meth. med. cap. 15. dicebat, quòd
ars ordinandi victus ex his maximè remediis consti-
tuitur cibo, potione, perfusione, cataplasmatibus & cly-
steribus: non igitur remediis mutatio duntaxat fit
prioris status in alium, sed eisdem quoque prior
status conseruatur, si similia adhibeantur. quæ ratio-
ne proprium temperamentum licet morborum cu-
rationem (vt diximus) tanquam præcipuus scopus
indiceret, conferatque ad auxiliorum inuentionem,
quibus morbi ipsi auferantur, eisdem ipsum seruari
poterit, & non alia ratione eadem indicabit, quam
vt præsens vitiosus affectus auferatur, ipsum verò in
priori statu conseruetur. At quomodo quæso (tur-
sus instant) temperies curatorem indicabit, si vires
nullam indicationem curatorem, vt Galenus no-
no meth. med. scribit, præbere possunt? Sunt etenim
pariter secundum naturam tum vires, tum ipsa natu-
ralis temperies, vt non magis hæc quam illa cura-
tionem indicare queant. Huic responsum volumus
quòd licet pariter secundum naturam sint vires, &
naturalis temperies, hæc de re naturalem temperi-
& non vires per se curationem indicare asserimus;
quoniam tunc morbos cum Gal. curari dicimus, cum
ipsi præter naturam affectus in naturalem habitum
seu naturale temperamentum fuerint mutati, ita vt
ne morbi reliquum quippiam relinquatur, neque
contrarium genus morbi per præsidia fuerit indu-
ctum: quæ ratione opus est vt curadi corporis haud-
quaquam temperamentum fuerit ignotum, vt quæ-
tum à se inuicem distent morbus, & naturale tem-
peramentum compertum habeas, & propterea ip-
sum simul cum morbo contrarietatis mensuram defi-
nit, & præcipuus curationis scopus existit; vires au-
tem, vt in sequentibus fusius patebit, ex numero cu-
ratiuorum scoporum per se non existunt, neque re-
medium aliquod indicant: quoniam neque vt valea-
mus, neque vt à morbis liberemur ab eis quicquam
primùm desumimus, vt ipse Galenus asserit, eodem
nono de meth. med. cap. 13. sed vt viuamus duntaxat:
nam ne per contraria adhibita reliquum morbi quip-
piam relinquatur, aut contrarium morbi genus per
eandem inducatur, aut omnino vt à morbis libere-
mur, haudquaquam vires indicabunt, verum ne al-
terutrum per contraria fieri contingat, sed morbi
ipsi auferantur, & prior sanitas restituatur à proprio
naturali temperamento, indicatio necessario sumen-
da erit, quò quantum morbus ab illius symmetria
discesserit intelligens, mensuram præsidio imponat.
Hæc itaque ratione naturalis temperies, & non vires,
licet ambo secundum naturam sint, curationem in-
dicare valet. Ad hæc à morbis liberatos ægros esse
asserimus, vbi pristinam corporis temperiem recu-
perauerint, vt liquet nono meth. med. cap. 14. non
tamen easdem vires, quas habebat eo tempore quo
laborare cœperunt, nec æquè robustas, vt videre li-
cet in conualescentibus, neque etiam in omnibus
morbis æquè vires seruandæ sunt, sed in quibusdam
vt in acutis, parum debilitatas conseruare oportet:
vt liquet commento aphorismi quarti, primi libri.
etenim in hisce morbis si eas robustas seruare stu-
deremus, ac tales quales accepimus, semper addere-
mus ad morbum; vbi ergo in morbis quærimus vi-
res seruare, id non intēdimus vt à morbis liberemur,

2. Ratio.

Refutatio.

Cur vires
inter cura-
torios sco-
pos nō sint.

sed ut vivamus; servare tamen eandem naturalem temperiem semper oportet, non ut vivamus, nam absque ea vivere possemus, sed ut ab eisdem morbis vindicemur, à quibus haudquaquam liberatos esse fatemur ægros, nisi ad pristinum redeant temperamentum; ut Galenus fatetur, & rei veritas est. A naturali igitur temperie, & non à viribus indicatione pro morborum curatione sumendam esse, eamque & non vires præcipuam esse curationis scopum propterea firmiter cum Galeno tenemus. Cum vero probare nituntur morborum causas externas inter indicantia ex Galeni tractatione statuendas esse, alia ratione tentant quod temperamentum curationem non indicet, persuadere. Inquiunt enim, si quæ abierunt, & amplius non adsunt, nec vlla re opus habent, indicare nequeunt, cur à Galeno non method. scriptum est, corporis temperamentum, quod fuit antequam homo laboraret, curationem indicare, cum à nullo eorum quæ amplius non permanent, neque aliqua re egent indicatio sumi debeat, eodem auctore, quarto method. med. cap. 3. quæ de re aut temperamentum, consuetudinem, & vivendi conditionem haudquaquam curationem indicare fateri debemus, aut si ea admittimus, conuincimur pariter externas morborum causas recipere. At nos quātū ad externas morborum causas, consuetudinē, vivendi conditionem, ac reliqua (quæ ibidem meminimus) spectat, suis locis in sequentibus quid cū Galeno sentiendum sit, demonstrabimus, ne simul omnia ut isti conantur facere, confundamus. Nunc vero ad ea quæ de corporis temperamento aiunt duntaxat respondebimus, asserentes primò eos ab uti Galeni sententia, suisque verbis; ait enim Galenus eam corporis temperiem curationem indicare, quæ illo tempore fuit quo ægrotare cepit, & nō quæ fuit antequam homo laboraret, ut isti aiunt. Satis enim interest dicere, quæ illo tempore fuit quo ægrotare cepit, & quæ fuit antequam homo laboraret, volēs innuere quod ab illo corporis temperamento sumenda est indicatio, quod eo aderat tempore quo primū æger ægrotare cœperit, reliqua excludens temperamenta quæ poterant multò ante tempore fuisse, & deinde aliqua ratione mutata, intelligēsq; per hæc verba præfens, & non præteritum temperamētum; id verò 11. lib. eiusdem, clariū manifestauit, cum dixit: [præstari vero (ut prædictū est) modi auxiliorum indicationem] ex eo temperamento, quod iam præfens sit, ita nimirum sicut ex ætate; non quam æger prius habuerit, sed quā nunc habeat; non ergo ex eo temperamento quod prius fuit antequam homo laboraret (ut isti Gal. tribuūt) sed ex eo quod iam præfens est, quo tempore ægrotare cœpit, sumenda indicatio erit pro morborum curatione: id enim intelligere voluit, nono, & vndecimo method. meden. quam igitur habebunt inter se se similitudinis rationem externa morborum causa, & corporis temperamentum? si eadem postquam fecit, & præter naturam affectum excitauit, iā abiit, & in corpore amplius non permaneat; qua ratione, neque vlla re opus habet cum amplius non adsit; corporis verò temperamētum quod iam præfens est, illo tempore quo ægrotare cœpit æger, adhuc eo ægrotante adest, nec omnino abiit, sed adhuc in corpore permanet, licet quodammodo immutatum seu alteratum ab ipso morbo, seu febre, de qua verba facimus: est etenim febris conuersio quædam naturæ caliditatis ad igneā, & non conuersum

3. Ratio.

Resolutio.

A temperamento quod præfens erat cū morbus cœpit, sumitur indicatio.

Cap. 3.

Loc. citatis. A causa externa nō sumitur indicatio, nec quicquam habet simile cū temperamento ægri immutatio.

esse: quemadmodum etiam & reliqui morbi corporis naturale temperamentum immutant, atque alterant: nō autem omnino corrumpunt, atque destruant vbi curationem admittant: & propterea aliqua re indiget pro sui conseruatione, simul ac morbi sublatione, ut ad idem temperamentum æger redeat: alias neque eosdem morbos sublato esse, ac ab eisdem ægros vindicatos esse fatebimur; quia igitur morbo seu febre genita, adhuc in corpore restat temperamentum, natura, seu naturalis habitus, causa verò morborum externa; nequaquam propterea temperamentum ipsum curationem indicare admittimus, ac ab eodem curatorium indicationem sumi asserimus, eamque præcipuam cū Galeno, externas autem morborum causas haudquaquam indicare posse dicimus; nec ab eisdem indicationem aliquam pro curatione sumendam esse, fateamur.

Proponitur primorum trium scoporum indicantiū diuisio: soluiturque Galeni contradictio de indicatione, quæ à morbo sumitur.

Caput XXXI.

Ite itaque cum Galeno ad tria capitata, primos ac præcipuos omnes curationis morborum scopos, contrarietate ipsa diuisa redeamus, etenim illa tria prima sunt, quæ curationem indicant, neque esse posse plura genera, quæ ad medendum spectent quàm tria: nempe ambientem nos aërem cum geminis corporis affectionibus, siue constitutionibus, altera naturali, altera quæ præter naturam sit, quæ sanè morbus est, ex ipsa rei substantia docti non ab re cum eodem Galeno concludimus, quicquid alij noua dogmata introducentes sentiāt, quorum ratiunculæ quanti momenti sint, & ex his quæ diximus, ac in sequentibus dicemus cuilibet pateere poterit. At quoniam non solum pro morborum curatione ipsarūque febrium, eisdem scopis ac indicationibus ab eisdem ortis vti conuenit, sed aliis quibusdam magis particularibus, qui etiam methodo quadam diuisiua ex prædictis originem ducunt, nam qui & omnia quæ sunt secundum naturam, & quæ præter naturam, hoc diuisionis artificio complectitur, ab omnibusque sufficientes sumit indicationes, hic solum quantum humanis permittitur viribus medendo non errabit, ut primo art. curat. ad Glauconem, cap. 1. scriptum est, capropter ut vniuersum scopi, tum, indicationes, curatorii nobis patefiant, eosdem tres primos, ac præcipuos in partes diducere institui, donec ad insectiles veniamus. Etenim cum vnum sit eorum vtrunque, aër videlicet, & corporis temperies, ex pluribus tamen tale efficitur; ob id cum corporis temperiem, tum ambientem aërem in suas causas diducere oportet, affectū verò præter naturam, non in causas, sed differentias, eiusdem Galeni auctoritate, citato libro nono method. cap. 14. Atqui nos affectum ipsum præter naturam, quem curare intendimus, qui febris est, in particulares differentias iam superius diduximus, utque ad insectiles peruenientes. Reliquum igitur est ut geminos alios scopos, nempe ambientem nos aërem, & corporis naturalem temperiem pro diuersis causis eisdem alterantibus, ac mutantibus, in partes diducamus, secernisq; donec ad eos particulares scopos, particularēque indicationes perueniamus, qui amplius sectionem non admittunt. Prius tamen quàm eorundem scoporum sectione, reliquos omnes

hes particulares scopos inuestigemus, ac ab eisdem quæ particulares curationis morborum indicationes sumantur cum Galeno doceamus, necessarium fore auxi cam quæ in eiusdem Galeni dictis pugnati-
 am esse videtur de indicatione, quæ à morbis seu præter naturæ affectibus sumitur cõciliare, quæ huc-
 usque nonnullos nõ parum fatigauit. Inquit enim libro tertio meth. meden. cap. i. in principio, omni-
 bus in confesso esse primas indicationes ex affectib. esse fumendas, initiumque inueniendorũ remedio-
 rum ex ipsorum morborũ natura sumi, lib. verò de optima secta ad Thrasyb. non morbos, sed causas medelam indicare aduersus methodicos concludit, atque non morbos, sed morborum causas quod cõ-
 ducit, nobis aperire etenim conducibile non à mor-
 bis, sed à causis indicari fatetur. Sed omisis aliorum opinionibus dicam quid sentiam, atque fateor ubi-
 que locorum Gal. eadem sentire; nam tertio meth. meden. licet primas indicationes ex affectibus esse fumendas innuerit, dicebat insuper indicationem hanc, quæ à morbis sumitur, nullam prorsus esse ip-
 sius medicæ artis adhuc portionem, aut sanè nec ma-
 gnam, nec propriam, vt quæ etiam plebi sit commu-
 nis, nil aliud indicans quam eorum ablationem ad-
 uersus methodicos, qui hanc indicationem dicebāt, vel totam curationem indicare, vel magnam partē, ipse verò principium tantum esse, ac veluti excita-
 mentum quoddam, vnde medendi ratio promouet, affirmauit, illud quoque demonstrare proposuerat citato libro de optima secta ad Thrasyb. aduersus eosdem methodicos, qui negabant non modò sym-
 ptomata curationem indicare, verumetiam & mor-
 borum causas, internas maximè; nam eas potius quã
 externas latere, atque ineuidentēs esse asserbant, morbos verò ac communitates, vt pote laxum, & ad-
 strictum, cum euidentēs sint, vtilia atque conduci-
 bilia indicare fatebantur; non etenim ab effectis, vtputa symptomatis, sed ab efficientibus, quemad-
 modum & ipsi profitentur, indicationes accipien-
 dæ sunt: affectus verò causarum loco methodici ha-
 bent, eo quod symptomatum sunt effectiui, sed non
 qua causæ sunt, inquirunt: sed qua cõmunites, quas
 Græci *νοσήτας* vocant, vim habent indicandi, ni-
 hilque vetare idem & pro causa, & pro cõmunitate,
 & pro alio quopiam accipi: ipsos verò affectus in-
 dicare inquirunt, non quatenus effectus, aut aliorum
 effectiui, sed quatenus cõmunites sunt. Cum ve-
 rò Galenus nonnullis rationibus aduersus eos pro-
 basset, quod iuxta eorum decreta, symptomata con-
 ducibilia sint in curatione, post nonnullas rationes
 quas in medium attulerat, iterum probat, aduersus
 eos ipsos affectus, hoc est, latum & adstrictum; neq;
 conferens indicare iisdem rationibus, quibus ipsi
 methodici inutiles esse symptomata probare nite-
 bantur, quas non paucas cum in mediũ attulisset, ta-
 men illud aduersus eos probare voluit, quod non
 quid agendum sit, sed suam ipsorum sublationem,
 destructionemque indicant, quod quidem nec vul-
 gus, nec brutæ animantes ignorant, morbos scilicet
 sublationem, sanitatem verò conseruationem indi-
 care. Atqui artifices, inquit ipse, huiusmodi indica-
 tione non egent, sed illa scire exoptant per quæ lan-
 giores pelluntur, & sanitas conseruatur: propterea
 illis opus habent quæ particulatim remedia indi-
 cant, quibus accersitur sanitas, ac retinetur; per id e-
 nim artifices vulgò præcellunt, quod ea percipiunt,
 quibus particulatim remedia patet: quando qui-

dem si morbi sua ipsorum remedia edocerent, labo-
 rantes ipsi per quæ ad sanitatem redirent intelligen-
 rent; at istud ignorant, quid verò morbus indicet
 certum habent, sublationem scilicet: quare pellendi
 morbi causa medicos acciri iubent. Hac ratione cõ-
 cludit aduersus methodicos Galenus affectus ipsos
 primæ eorum indicatione non quid agendum sit,
 hoc est, conducibile & vtile indicare, sed suam ipso-
 rum sublationem, seu destructionem: id quod qui-
 dem commune existit nedum vulgo, verumetiam
 & brutis, quod sanè aduersus eosdem methodicos
 in principio citati libr. tertij de meth. med. conclu-
 serat. Addit & secundam rationem inquit, quin
 & ex adhibitis auxiliis, non morbos, sed causas me-
 delam indicare agnoscendi facultas dabitur; auxilia
 nanque non effectis, sed facientibus auersantur: cõ-
 probat illud Galen. euacuationis exemplo, quæ mul-
 titudini contraria est, morbo verò nulli, vt phleg-
 mone, aut febris: atqui multitudine inquit, per eu-
 acuationem subtracta, simul & gemitus per eam mor-
 bus tollitur: sed non propterea quod simul cum ef-
 ficiente causa morbus recedit, auxilium morbo a-
 uersari dicendum est. Insuper alia quoque remedia
 causis semper resistere inuenies, morbo verò mini-
 mè, ita vt velit per hanc rationem aduersus methodi-
 cos concludere, quod non ex ipsis morbis (vtputa
 laxo & adstricto) tanquam communibus existenti-
 bus, conducibilium indicatio præstatur, vt ipsi asse-
 rebant, sed eorum causis, cum eisdem sublati, iidē
 morbi destruantur, & eadem remedia atque auxilia
 tanquam contraria causis, & non morbis adhibean-
 tur, ad quarum sublationem ipsi quoque morbi au-
 ferantur: & propterea causas & non morbos cõtra-
 ria & vtilia demonstrare, & confirmas illud iterum
 subdebat: [amplius ex hoc quispiam didicerit, si ne-
 que adstrictio, neque fluxus auxilium aliquod, sed
 potius affectum quandam indicent (& adstrictioni
 contrarius fluxus est) non inanitionem, sed fluxum
 indicabit adstrictio, & fluxus adstrictionem.] quod
 igitur admittimus, non idem morbo indicatur, at la-
 dentes causæ sibi contraria demonstrant, quodque
 ab ipsis indicatur admittimus: quocirca non morbi,
 sed causæ quod conducit, aperiant: itaque non prorsus
 incommoda esse symptomata, neque à morbis
 conducibile, sed à causis indicari satis amplè diluci-
 déque ostensum est; hoc postremò concludit Gale-
 nus aduersus methodicos. Ex quibus omnibus haud
 ægrè quiuis percipere poterit Gale. citato libro de
 opt. sect. voluisse aduersus methodicos nedum iis
 rationibus, quas in medium attulimus, sed aliis ple-
 risque ab eodem prius explicatis, demonstrare mor-
 borum symptomata non prorsus incommoda esse;
 quemadmodum ipsi fatebantur in curatione, neque
 à morbis modo quo ipsi intelligebant, quatenus vi-
 delicet communitates sunt, conducibilia pro eorum
 sublatione, sed ab eorum causis indicari, id quod ip-
 si haudquaquam admittebant: quapropter nulla
 adest pugnancia cum his quæ dixit in principio 3.
 method. meden. neque enim negauit citato lib. ad
 Thrasyb. nec alibi vnquam negabit primam indi-
 cationem ab ipsis morbis seu affectibus esse fumen-
 dam. Verum cum hæc communissima sit, adeo quod
 etiam plebi pateat, & brutis; nam nonnisi eorūdem
 sublationem indicat, id verò quod conducit pro eo-
 rum sublatione, haudquaquam: propterea volebat
 Galen. hanc indicationem non esse ipsius artis me-
 dicæ adhuc portionem, aut sanè nec magnam, nec

propriam, neque ab eadem tanquam vniuersalissima existente quicquam vtile indicari, quemadmodum assererebatur methodici, qui ipsa communia, indicare vtilia affirmabant, utpote laxum, & strictum, ut saepius diximus, ipse vero communium notitiam ad ea percipienda, quae particulatim indicare valent conducere affirmavit, & ob id ab eadem communissima indicatione tanquam prima exordium esse, veluti initio quodam pro inueniendis his, quae particulatim remedia indicat, decretum reliquit tertio meth. med. & citato lib. de opt. sect. communitates nihil vtile demonstrare, sed ex ipsis communibus ea quae indicare valent, comprehendere affirmavit, non negans illam primam indicationem perpetuo ex morbis etiam sumendam esse. Verum ex ipsis tanquam communibus existentibus nihil vtile indicari fateatur, quemadmodum methodici sentiebant: quinimo eo modo intellectis ipsis affectibus aut morbis, nequaquam ab ipsis, sed eorum causis conducibile indicari posse demonstravit, cum laedentes causas sibi contraria demonstrarent, ac quod conducit aperiant, & non morbi ipsi, videlicet laxum, & adstrictum: quamuis simul cum ipsis idem morbi recedant. Si vero quispiam velit vniuersaliter Gal. de omnibus morbis, qui efficientes causas habent, fecisse sermonem, lib. de opt. sect. asserimus hoc quoque nequaquam eius doctrinae repugnare, cum perpetuo verum sit in singulis morbis efficientes causas habentibus, conducibilia, ac auxilia non ab ipsis quae morbi sunt, sed ab eorum causis indicari; etenim morbi ratione quae morbi sunt, nihil particulatim vtile, neque particularia remedia indicant, sed eorum sublationem duntaxat: causa vero quae particulatim agenda sunt, & quae sibi sunt contraria perpetuo demonstrant, ac quod conducit aperiant.

Morbi habentes causas efficientes, quatenus morbi sunt, non indicant vtilia, sed eorum causas.

Aeris nos ambiens, & corporis temperiei particulares scopos indicantes diuisio.

Caput XXXII.

Ed tempus est, ad ea quae de ambiente nos aere, ac corporis naturali temperie declarare proposuimus, redire, ac docere quomodo cum vnum sit eorum vtrunque, ex pluribus tamen tale efficiatur; qua ratione ab eisdem plures quoque particulares scopi curationem indicantes oriuntur. Aer si quidem nos ambiens tum ex praesente caeli statu, tum anni tempore, tum etiam & regionis natura, in calido, humido, siccio & frigido mutationes suscipit, ut 9. & vndecimo method. meden. à Galen. scriptum est: quae de re ex illorum rursus vnoquoque aliae particulares indicationes oriuntur, & quamuis calidi statum Gal. citato lib. nono method. meden. vocat ambiens nos aeris temperiem, sub qua & anni tempus, & regio comprehenditur, tam cum nos dicimus ex caeli statu tanquam ex tertia causa aerem alterari in calido, frigido, humido, & siccio, praesentem, ac peculiarem caeli statum intelligere volumus, secretum ab anni tempore, & regionis natura; est etenim particularis caeli status, idem quod particulare, ac praesens aeris temperamentum, ut primo de morb. vulg. liquet, ac eius praesens constitutio, quemadmodum in austrinis, seu aequiloniis constitutionibus contingit, quocumque anni tempore, ac quavis regione excutitur; pro diuerso itaque peculiari ac praesenti aeris temperamento, seu statu, eidem mutationes accedunt, in iam dictis qualitatibus: simili-

9. cap. 14. & 11. cap. 1. Aeris diuisio in praesentem calidum.

Commen. 1. super tex. 1. & in proo. mio. Anni tempus. Regionis naturam.

ter ex anni tempore diuerso, utpote hyeme, vere, aestate, vel autumno, necnon & variis regionibus: siquidem ex eisdem quoque eundem ambiente aerem variari contingit in caliditate, humiditate, frigiditate, & siccitate, alio namque modo ei mutationes accedunt, ubi regio fuerit sulphurea, alio ubi paludosa, argillosa, petrosa, aut arenosa; tot itaque particulares scopi, à quibus etiam particulares indicationes proficiuntur, ab eodem ambiente nos aere ortum ducunt, ubi idem respectu diuersarum causarum à quibus mutationes suscipit, fuerit diuisus, omnes tamen morborum curationem indicant, medio ipso aere ambiente, & propterea rectius coindicare, quam morborum curationem indicare dicuntur, ac ab eisdem coindicaciones potius, quam morborum indicationes praestari fatendum erit. Corporis vero temperies quae illo tempore fuit, ut diximus, quo aegrotare coepit, quaeque ad inueniendam remedia est utilis, ut ad vnguem dignoscatur, plane difficile est, ut Gal. fateatur, tentandum tamen est, tum ex iis, quae in libro de temperamentis sunt scripta, eam inuenire, ut ipse inquit citato lib. 9. method. med. cap. 15. tum vero ultra haec quod magis scientifica notitia sit, ex aetate, tota antea vita, quae nimirum in vitae exercitio, & victus ratione consistit: praeterea in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc caeli statu, conuersatione, similiter natura, ac consuetudine; etenim ex natura, aetate, consuetudine, & ambiente nos aere, eadem corporis temperies ortum habet, & citato libro nono method. meden. scriptum est: quapropter ex illorum rursus vnoquoque aliae particulares indicationes pro morborum curatione ortum ducunt, eaque particulariter eandem curationem indicare fatebimur, corporis tamen temperie intercedente; illa namque inuenta, administrandorum indicatio suppeditabitur: siquidem omnia haec temperamenti interuentu indicatione praestant, ut patet eod. 9. method. meden. etenim si natura gracilis, & tangenti calidus, & biliosus, & propensus ad iram, & hirtus sit, calidus hic, siccusque natura est, non tamen necesse est nunc quoque cum aegrotare incepit, eundem planè habere affectum: fieri enim potest ut in delidia vixerit, idque cum frigidis humidisque portione & cibis; adhuc etiam cum balneis post cibos, & multo somno; praeterea in regione humida, & frigida, & hyeme in qua frigidus & humidus exuperat caeli status. Rursus fieri potest ut horum praecesserint contraria, id est, calefacientia & exsiccantia, idque per singula dictorum iam generum. Ergo si quae ad temperamentum noscendum deficiunt, id ex praecutibus ipsis supplebimus: ob id non ab re Galeno vndecimo meth. meden. cap. 1. temperiem ipsam corporis. seu naturam bifariam diuidi asserere, in originalem, & ascititiam; & deinceps subdebat: [saepè autem ascita temperies ad efficientes causas reducta illis indicationem concedit.] ad hunc itaque modum ex aetate, vita instituta, & consuetudine indicationem remedium suggeri diximus. Cum igitur ex his praesens corporis temperies ortum habeat, ex eisdem quoque tanquam ex causis ipsius temperiei nobis indicatio praestatur, pro inueniendis, ac administrandis remediis, praeterea ex aetate quidem, nam aliam constituit corporis temperiem puerilis aetas, aliam & omnino diuersam senilis; aliam iuuenem, adolefcentum, seu consistentium; similiter & propriae naturae diuersitas, corporis temperaturae notitiam affert: nam quibus substantia, utpote

constans

constans stabilisque adest, & propterea difficulter dissipatur, ægréque per halitum digeritur, id propter frigiditatem ac corporis siccitatem contingit, quemadmodum etiam & aliis, quæ terra constant, corporibus, auro inquam, argento, ferro, & aliis humis, diis quibus verò laxa admodum ac mollis præterque dissipabilis substantia adest, calida & humida temperatura existit, atque hæc naturæ veluti diametro longoque intervallo à se distant, reliquæ vero omnes mediæ naturæ sunt; interim ad alteram distarum, quandoque ad alteram magis accedentes, qua ratione diuersas quoque corporis temperaturas efficiunt, & demonstrant, si eas seorsum à temperamenti consideraueris; nam sæpius Gal. naturam cum temperamento confundit, ut sexcentis locis liquet, præsertim commento aph. 34. secundi, & secundo tertij lib. & 4. & 6. meth. med. ex tota item vita antea acta, quæ ut diximus, in vitæ exercitio & victus ratione consistit: præterea & cæli status, qui in tempus anni, regionem, ac particularem aeris temperaturam diuiditur corporis ostenditur temperaturæ; ex tempore namque anni calido, & calida regione, ac peculiari aeris calida temperatura, calidum corporis proficitur temperamentum: quemadmodum in eisdem frigidis existentibus, frigidum, & ita de reliquis, & quo rursus modo, ab ambiente nos aëre corporis temperaturam ortum ducere dicimus idem quoque dicendum erit de particulari exercitio, victusque ratione. Atqui si omnes temperamentorum notas in vnum colligas, hæc longissime absunt, ut parem ei quam consuetudo præstat fidem faciant, inquit Gal. citato lib. 9. meth. med. cap. 3. Et propterea maximam esse quæ à consuetudine sumitur indicationem, dicebat. ii. eiusdem quippe, vel temperamentum originale ipsam seruare, vel ascititium inducere potest, tãtâque profecto in omnibus quæ ad medicinam spectant, vim habet consuetudo, ut ea aduentitia natura à maximis medicis fuerit appellata, utpote quæ ascititiam, & acquisitiam in corporibus gignit naturam: quinimodò & ipsa, natura est acquisititia, quemadmodum scripsit Gal. lib. de his quæ in medicatrina fiunt, secundo de temperamenti, & primo de sanitate tuenda, ob id non sicuti alia quædam exigua, leuémque, sed maximam, ac maximè principalem vim habere videtur, ut quæ singulorum corporum naturam ostendat; non est igitur quod parum quiddam, atque ad spectandum leue ad intentionem remedium consuetudinem existimemus: veluti nec ad sanitatem tuendam, adeo quod non modo in conualescentium victus ratione, sed etiam in morbis magna pars ad totius victus, medicamento-rumque inuentionem ex consuetudine indicatio sumitur: ut septimo, & nono meth. med. cap. 10. Galenus scripsit. Verum non modo de consuetudine, sed & de ætate contrarium omnino videtur Gale. sensisse, quinto de sanitate tuenda, cap. 10. Dicebat enim [Verum quoniam affectuum naturam per coniecturam accipimus, idcirco ætatem quoque consideramus, porro eadem vitæ, & consuetudinis noscenda est, præterea extrinsecus incidentiū causarum quas propter rapulmæ græcè vocant: quippe ad certiorē affectuum notitiam, talia omnia nobis conducunt, remedium tamen insinuatione ex his non præstat:] quæ quidē Gal. dicta hoc modo conciliabis. Quod scilicet verum est remedium indicationē, seu insinuationem, neque ex ætate, neque ex consuetudine præstari, quemadmodum neque ex causa præcat-

arica, verum eadem ad certiorē affectuum notitiam nobis conducere, utputa naturalis corporis temperiei, quemadmodum externæ causæ conferunt etiā ad certiorē notitiam ipsius præter naturam affectus cum latuerit, ut sancitum est ab eodem Gale. 4. meth. med. & quandoque etiam affectus secundum naturam, ut de aëre nos ambiente dictum est. At si dixeris quod propterea ætas, & consuetudo ad remedium inuentionem conducere non debeant, dicimus nos, quod verum est per se, ac primaria ratione, quoniam ipsa de numero scoporum primorum indicantium haudquaquam sunt. Verum quoniam maximam habent vim pro notitia corporis temperiei, quæ quidem est de numero primorum indicantium, propterea ad remedium inuentionem ipsa quoque non parum conducere profitemur, media inquam eadem corporis temperatura, tanquam causa eiusdem; eadem enim inuenta, per ætatem, & consuetudinem administrandorum suppeditabitur indicatio, ut inquit Gal. citato 4. meth. med. Conferunt itaque ad remedium inuentionem, atque eorum administrationem indicationes, quæ ex ætate, & consuetudine sumuntur, non immediate & primò, quoniam hac ratione ad certiorē affectuum notitiam conducunt, ut liquet 5. de sani. tuen. Verum cum ab eisdem certior habeatur notitia ipsius corporis temperiei, ut diximus, propterea eiusdem temperiei interuentu, velut causæ dictæ temperiei (ut idem Gale. eo dem 9. meth. med. testatur) ad curationem, ac remedium inuentionem, indicationem præstant, ita quod potius coindicare, quàm indicare ea dixeris, qua de re nulla erit in Galeni dictis pugnantia de indicatione, quæ ex ætate, ac consuetudine præstat. libro vero primo artis curat. ad Glauc. cap. 1. asserit Gal. quod non ex horum duntaxat differentiis, ad propriam laborantis naturam agnoscendam proximè accedimus, verum etiam ex potentiis, coloribus, caloribus, temperaturis, habitudinibus, pulsuum motionibus, ac animi moribus differentiis, similiter si quis adiuxerit maris à femina differentiam; atqui rectè dixit proximè accedimus, ad dignoscendam propriam laborantis naturam: nam cuiusque priuatim naturam explorare, atque ad vnguem scire, plane est difficile, adeo quod idem Gal. 3. meth. med. cap. 7. de seipso dicat: [si cuiusque priuatim naturam explorare ad vnguem scirem, utique qualem fuisse Esculapium mente concipio, talem me esse putarem.] aduertat tamen quod in Gal. doctrina, quandoque natura idem significat quod temperamentum, secundum proprium eius significatum, ut liquet commento aphor. 34. secundi libri & 2. tertij libri, interim quippiam à temperamento diuersum, ut liquet citatis locis, & 9. & 11. meth. med. primo de morbis vulg. ac primo art. curat. ad Glauc. in principio: & propterea quandoque naturam per temperamentum, interim temperamentum per naturam, dignoscendum esse, censet.

Diluntur rationes eorum, qui probare nituntur ætatem, consuetudinem, vitæ institutum, ac aliam quadam curationem non indicare.

Caput XXXIII.



Tqui non desunt & hi quoque quorum studiū non nisi in contradicendo existit, Galenum in his, quæ mox cum eo concludimus calumniari; aut nanq; quod si verū est id quod libro

Metas & consuetudo non immediate conferunt ad inuentionem remedium, sed immediate ad affectuum cognitionem.

Natura pluram significat.

quarto methodi medendi cap. 3. Galenus aduersus methodicos de externa causa probare nititur, quod videlicet propterea ab ea indicatio non sumitur, quia à nullo eorum quæ amplius non permanent, nec aliqua re egent, indicatio sumi debeat, eadem

1. Ratio. ratione nec consuetudo, nec viuendi conditio per morbos aliquid indicare possunt, quippe cum aliis per sanitatem rebus amplius non vtamur, & solita vitæ munia ob vrgentem morbum omnia sint intermissa; quamobrem si hæc ratio facit quod ea quæ iam abierunt, & amplius non adsunt, nec vlla re opus habent, indicare nequeant, temere hæc inter indicantia enumeramus: aut si ea admittimus, conuincimur pariter externas morborum causas recipere, quippe cum non minus illa, quam hæc absint, nec magis rem aliquam desideret quæ huius, quam

Refutatio. quæ illius generis sunt. Huic rationi respondendum est primo eos parum rectè intelligere consuetudinem ac viuendi conditionis significatum; consuetudinem namque Galen. nuncupat, vt prius declarauimus aduentitiam illam seu acquisitam temperiem ac naturam, quæ iam ex assuetis rebus in nostris corporibus genita est, & non assuetas illas res quibus eadem corpora continuè vtiebantur per sanitatem; quare etsi assuetis per sanitatem rebus amplius non vtamur, adhuc tamen in corporibus nostris permanet aduentitia illa natura seu temperies, quæ per eandem res assuetas fuit genita: quomodo autem hæc generetur, Galen. docet libro de assuetudinibus; ab hac itaque tanquam aduentitia natura, præcepit Galen. indicationem sumi & non à consuetis rebus vt ipsi imaginantur. Hanc quoque seruandam esse perpetuò Hippoc. & Gal. præsertim in ægris corporibus iusserunt secundo de ratio. victus: à consuetudine enim semper est indicatio similium, quoad scilicet, ægrotent homines inquit Galenus octauo methodi medendi, & II. eiusdem, etiam eam quæ omnino vitio non caret, in ægris præcipit esse seruandam; pariter dicendum erit de viuendi conditione seu vitæ antea acta, quoniam etsi solitæ vitæ munia ob vrgentem morbum sint intermissa, non propterea viuendi conditio, seu vitæ institutum considerari non debet, pro morborum curatione. Et enim nec exercitia quæ præcesserunt, nec victus rationem, nec cōuersationem in hac regione, hoc anni tempore, & hoc cæli statu, quæ sub antea acta vitæ continentur, Galenus considerari debere iussit, nisi quod per ea magis scientificam habeamus notitiam eius corporis dispositionis, seu temperiei, quæ ab eisdem fuerit genita, & non vt ab eisdem vitæ munis, seu victus ratione, quæ præcesserunt, ac diuersi aëris cōuersatione, pro morborum curatione indicationem sumamus, vt luce clariùs ab eodem scriptum est citato nono methodi medendi. At pone (semper tamen hac firma veritate existente) quod per consuetudinem, & vitam antea actam intelligere voluisset Galenus ea quibus vsi fuimus per sanitatem, qua ratione sibi ipsis persuaferunt quod assuetis per sanitatem rebus amplius non vtamur: cum Hippoc. & Galenus citato libro secundo de rat. victus contrarium sentiant: nam de his, qui consueverunt bis, vel semel, sanis existētibus, cibum assumere, quod idem quoque eisdem ægrotantibus seruare debeamus, præceperunt: adhuc de qualitate victus verba faciens Hippoc. aphor. 16. primi libri seruandam quoque esse in hoc consuetudinem iussit, & aphorismo 50. secundi lib. nonne præcepit, quod

quæ ex longo tempore consuetæ sunt, etsi deteriora sint insuetis, minus moleitare solent, id quod nō solum de exercitationibus, verum etiam de omnibus simpliciter consuetis pronuntiauit, vt Galenus in commento inquit, & libro de assuetudinibus, dicebat, quoniam autem hæc ita habere videntur, primum quidem illius oportet memorari, scilicet terre homines delectabilius aliis alia secundum naturæ familiaritatem, veniēque ad horum esum magis, quemadmodum & bene digestibilibus, itaque & signum est tunc assuetudo proprietatis naturalis. Rursus viuendi conditionem seu vitæ institutum aut antea actam vitam, quo loco didicerunt sub solitis munis duntaxat contineri: cum Galenus 9. methodi medendi. cap. 15. nedum in vitæ exercitio, verum etiam in victus ratione, præterea in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc cæli statu, cōuersatione, consistere dixerit. Quare licet eisdem non vtamur per morbos exercitiis, possumus tamen eodem aëre & quodammodo simili victus ratione vt in qualitate, quantitate, ac modo vsus; etenim à consuetudine nedum indicationem sumimus pro qualitate, & quantitate rationis victus, verum etiam pro modo vsus, vt liquet aphor. & com. 17. primi lib. permanet itaque in corpore ea natura, ac aduentitia temperies, quæ per consuetudinem ac viuendi conditionem præcedentem fuit acquisita & propterea aliqua re eget, sui inquam cōseruatione. Causa verò externa postquam morbos peperit, omnino abiit, & amplius non adest, & ob id nulla re amplius opus habet, nec pro sui cōseruatione, nec ablatione; vimur etiā & assuetis quibusdam per sanitatem rebus, nec omnino antea acta vitæ ægrotantibus interdicitur, quamobrem haudquaquā temere & consuetudinem, & viuendi conditionem inter indicantia enumerauit Gal. media etenim corporis temperie cōducibilia indicare possunt, tanquam efficiētes causæ ascitæ temperiei, atque ad hunc modū ab eisdem remedium indicationem suggeri 9. & II. meth. med. decretum reliquit, causas verò externas haudquaquam recipere conuincimur: quoniam eadem omnino abierunt, nec amplius in corpore permanent aut aliquam rem desiderant, vt prius diximus, & Galen. 4. meth. med. abundè aduersus methodicos de cōseruatione monstrauit. Præterea arguunt, si concedit Gal. externam causam conferre ad effectus excitatos in corpore dignoscendos, concedat etiā oportet ab ea indicationem capi, quomodo ab ætate, sexu, consuetudine, viuendi conditione, corporis habitu, aliisque multis, indicationes ducit, non alia quidem ratione, quam quod ex illis signa petamus, quæ qualis sit corporis status ostendere valent, quod & ipse 9. meth. med. apertè testatur, consuetudinem scilicet, ac ætatem temperamenti interuentu, quod nimirum monstrent qualis sit corporis temperies, suas indicationes præbere; itaque si causa externa non indicat, nec ea igitur quæ prædiximus indicabunt, à quibus tamen ille passim, indicationes sumit. Huic facile ex his quæ diximus responsio patere poterit, nam licet prædicta omnia conferant ad affectus dignoscendos, quemadmodum & causa externa, hæc ratione conueniant, differunt tamen quod hæc citato iā affectu nō amplius permanet, nec amplius quicquam in corpore efficit, aut aliquid confert ad cōseruandum vel augendum id quod factum est, illa verò

Consuetudo quid ex Galeno.

Tex. comment. 26. 8. cap. 3 & 11. cap. 5

Loco citato

Loco citato

illa verò & permanent, & aliquid semper efficiunt etiam affectu ipso genito, ut atas, consuetudo, & reliqua huiusmodi, quam obrem nedum conferunt ad corporis temperiem dignoscendam, sed sepius ipsa adfecta temperies, ad easdem causas reducta ut Gal. inquit II. meth. med. illis indicationem concedit: & ad hunc modum ex atate, vitæ instituto & consuetudine remedium indicationem suggeri fatetur Gal. prout ex his adfecta temperies diuersa fuerit genita: qua etiam ratione 9. eiusdem atatem, & consuetudinem temperamenti interuentu indicatione præstare dixit, ac externa causa cum prorsus abeat, affectu iam genito, nec amplius quicquam efficiat pro dignotione affectus duntaxat quandoque conducit, nec quicquam ad curationem, ac remedium inuentionem confert, etenim nunquam ad eandem causam reducitur corporis affectus, cum sedulo eo genito corrumpatur & ipsum non amplius efficiat: & propterea illi indicationem non concedit, namque à nullo eorum quæ adhuc non permanent, indicatio sumi potest eius, quod ex visu fit. Galen. auctore 4. meth. med. Non itaque indicat causa externa, reliqua verò iam dicta indicationes propterea præbere valent, tanquam causæ corporis status, & non ut signa, ut isti credunt. Rursus & tertio instant dicentes, An non clare II. meth. causam externam, perinde ut consuetudinem & atatem ad affectus dignotionem facere, & ob id ab omnibus illis indicationes accipi scribit, contrarium planè quam fecerit 4. eiusdem operis libr. in quo externam causam ab indicationum numero excludit. Quæ ratione probare nituntur quòd, quemadmodum à consuetudine & atate indicationes sumuntur, ita etiam ab externa causa sumi debent, Gal. verba, ac eorum sententiam peruertentes, & piane intelligentes. Nam Galen. citato loco volens iterum sermonem, quem de vera curatiua methodo febrium continuarum ex putredine ortarum fecerat, repetere, quo medicorum etiam vulgus eam dignoscere valeret, hæc scripsit verba, [Quonia iniqua septem præter naturam posita sunt à quibus indicationes sumuntur, humorum multitudo, crassitudo, lentor, obstructio, transpirationis retentio, putredo, & febris carens intermissione, atque hæc contraria omnino esse adhibenda docebat: præter hæc verò ab iis quæ secundum naturam se habebant posita indicationes sunt ex temperamento, tum ipsius laborantis partis, tum reliquarum omnium, quæ principes sunt ex substantia ipsarum quantitate, & ex spiritus ipsius substantie tum quantitate, tum qualitate: horum verò indicationes, non contrariorum erant, sed similium: ad ista verò sicut diximus dignoscenda, tum ætas, tum consuetudo, tum omnes quæ externæ morbo causæ fuere, contulerunt.] quo finito, ac magno puncto clausa periodo, aliam incipit, (ut in codice Græco cuiuslibet inspicere licebit) inquit: [ortis verò & deinceps, vel hinc aut exinde indicationibus non paucis, in omnes simul medicum inspicere oportet, quòd scilicet intelligat, quonam primum ac magis, quonam minus & secundò, quonam adhuc tertio, atque deinceps quò, post quod præsidio sit vtendum.] quibus in verbis luce clarius patet quòd cum Gal. iterum enumerasset & quæ præter, & quæ secundum naturam sunt, à quibus sumenda erant indicationes pro curatione febrium ex putredine ortarum, præsertim continuarum simul cum eisdem iterum in memoriam reuocauit ea, per quæ

cuncta poterant facilius dignosci, asserens: [ad ista verò dignoscenda, tum ætas, tum consuetudo, tum omnes quæ externæ morbo causæ fuere, contulerunt.] qua finita periodo, aliam exordiens dicebat [ortis verò & hinc indicationibus non paucis, in omnes medicum inspicere oportet.] suum sermonem non ætati, consuetudini, ac causis externis referens, sed prædictis septem præter naturam existentibus, & eis quæ secundum naturam se habebant, ex his nanque ortis non paucis indicationibus, medicus omnes spectare debet, quòd scilicet intelligat quonam primum, ac magis, quonam minus & secundò, quonam adducet tertio atque deinceps, quò, post quod præsidio sit vtendum, & non ab atate, consuetudine, & causis externis; de his nanque hoc loco mentionem fecerat, tanquam conducentibus ad dignoscenda ea quæ secundum, & præter naturam sunt duntaxat, non tanquam curationem indicantibus, nec modum aut ordinem præsidiorum: quamvis libr. 9. eiusdem met. & II. paulò ante dicta verba, quomodo ex atate & consuetudine sumenda sit indicatio pro morborum curat. fusiùs demonstrasset; quæ de re licet citato loco externas causas conducere ad affectus præter naturam dignoscendos admiserit Gal. ac eas cum atate & consuetudine hæc ratione còt. numerauerit, haudquaquam (ut isti volunt) scripsit: [& ob id ab omnibus illis indicationes accipi.] cum neque hæc verba ab eodem conscripta reperiantur, neque illud eodem in loco concludere intendat, ut ex eiusdem loci inspectione, verborumque eiusdem ponderatione, ac eorundem sententia intelligentia, cuius parum etiam in eius doctrina exercitato, patere poterit, habet enim Græcus codex *προσπερ χρονον δὲ καὶ τὸ ἐν τῷ εἶναι ἐξ ὧν ἐκ δόξης, εἰς ἀπάντας τοὺς χρόνους ἀπὸ τῶν ἰατρῶν*: hoc est, [ortis verò & hinc seu deinceps indicationibus non paucis, in omnes oportet inspicere simul medicum.] quamvis ergo externæ causæ ad dignoscendos morbos còferant, nò propterea ab eis indicationes accipi debent pro còrundem curatione, quemadmodum ab atate & consuetudine sumuntur: nec illud hoc in loco aut alibi vnquam falsus est Galenus postquam ab indicantiu numero quarto method. eas exclusit. Quo modo autem eius sententia, quam de eisdem protulit libr. 5. de sanitate tuenda subintelligi debeat, nos in præcedentibus declarauimus: ac qualiter consuetudo, & ætas coindicare possint, causæ verò externæ haudquaquam, abundè cum eodem Galen. demonstrauimus: neque enim eandem vim habent (quemadmodum his visum est) ut prius ostendimus. Nec quicquam obstat quòd interdum indicare, interdum coindicare dixerit atatem & consuetudinem: nà de nominibus parum sollicitus quandoque non solum indicationes & coindicaciones, quinimò & indicationes & contraindicationes pro nominum diuersitate parum, aut nihil conferre fatetur, despiciens eos qui de hominibus litigant, est etenim id planè in arte inutile, & propterea dicebat, minime vetare nominibus quibus libitum sit, uti: ut liquet 9. meth. med. c. 7. modò rei natura nò mutetur, sæpe verò exquisitiùs voces obseruans, coindicaciones, ab indicationibus: & coindicantia ab indicantibus, separat, ut 13. eiusdem operis scripsit, inquit enim: [coindicantia igitur vocò virtutem, naturam, atatem, anni tempus, regionem, & consuetudinem, et si qua sunt id genus alia.] nò modò diuersa nomina perpendens, sed diuersa eorundem significata, ac diuersam quæ habent naturam.

Quapropter toto (vt aiunt) celo errarunt, dum temere asseruerunt, Gal. suis finet principiis repugnare, seque in eisdem errores labi, & eisdemmet telis perfodi, quibus aliorum famam & gloriam labefactare tantopere laborauit, cum stata principia semper seruet, nec vnquam in aliquem errorem lapsus sit, in his quæ de medicina scripsit, aut quæpiam non sine forti ratione prosequutus est, aut reprehendit: idque vt veritatem tueatur duntaxat: & non studio contradicendi, aut vt noua dogmata introducat, quemadmodum isti conantur. Quæ verò in mediū afferunt de tempore aduersus eundem Galen. cuius momenti sint, suo loco patebit.

Num à viribus sumenda sit indicatio pro morborum curatione. Caput XXXI III.



I quis velit exactè scire num à viribus indicatio pro morborum curatione sumatur, haudquaquam ignorare debet quid per vires intelligendum sit: quamobrem id primò declarandum fore censui. Quod ergo tres diuersi inter se generis

Tres facultates animalium gubernantes. cap. 4. & 2.

Naturalis.

Vitalis.

Animalis.

Loco præc.

cap. I
Vna natura & non vna.

facultates, animal gubernant plerisque in locis Galenus demonstrauit, præsertim 5. & 6. de Hippocratis & Platonis decretis, quodque has facultates interim animæ partes, interim species nominauerit, quæ non sedibus tantum corporis, verum etiam substantiis naturisque, item quod facultatibus & functionibus differant, Platonis auctoritate eodem etiam libro fufissimè ostendit: hæ inquam facultates quas Plato animas vocat, animal gubernent toti corpori ex suo veluti fonte quæque distributa, vt sexcentis in locis, & præsertim 9. meth. med. cap. 10. Galenus asseruit, est enim earum quædam ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus communis, quæ iecur veluti pro fonte habet canales verò ab hoc in totum sparsos, ipsas venas: hanc seu appetitricem, seu naturalem, seu alttricem voces, nihil interest, veluti nec si animam, aut facultatem. Altera est quæ non modo vt stirpibus, aut vita præditis, sed etiam vt animalibus anima est insita, hæc sedè in corde habet ipso quoque insiti caloris quodam ceu fonte, à quo canales arteriæ sunt: vocaturque hæc multis sanè nominibus, nam & facultas, siue virtus vitalis, & facultas, siue virtus animosa, & anima animosa dicitur. Tertia anima ratiocinatrix in cerebro domicilium habet, & voluntariis actionibus vnà cum sensibus præsidet, vtur & hæc particulis quibusdam ceu canalibus, nempe ipsis nervis, sensum, motumque per hos in totum animal transmittens. Hæ tres animæ seu facultates, licet diuersa ratione, vt ex iam dictis patet, corpus gubernent, quælibet tamen earum propter vnum & eundem finem est, qui finis est animalium vita: & propterea Galenus citato nono methodi medendi dicebat, [ergo has facultates seruare, nil planè est aliud quam vitam seruare] nec ipsum animal esse vnum, sed triplex, vbi vnum non intenderent hæ tres animæ finem, nec semper vna alterius indigeret ope: nunc verò cum vna facultas reliquis semper indigeat, factum est, & quod vnum sit animal, & quod quælibet earum amissa, necesse sit & reliquis vnà perire, vt quinto de locis affectis, & alibi sæpius Galenus demonstrauit: etenim confluxio vna, conspiratio vna, consentientia omnia, vt diuinus inquit Hippocrat. libro de alimento. Præterea vnam naturam

esse & non esse: & paulò ante, vna natura sunt hæc omnia, & non vna, dixerat: cuius Hippocratis sententiæ haud immemor Galenus commento aplo-risim i. decimifexti, 2. libri, assererat nihil referre si quæ regit animalia vnam dixeris numero singulari esse facultatem, virtutem, seu potentiam, siue plarali facultates, virtutes, seu potentias: siquidem vna est genere facultas, seu virtus, species autem plures habet; ita vna anima genere existit, specie plures. Id itaque per vires intelligere oportet cum dicimus, num à viribus indicatio sumatur: quod sole clarius Galenus manifestauit citato nono methodi medendi cap. 9. & vndecimo eiusdem vires verbis confirmauit. [neque enim pulsus duntaxat vires ad eiusmodi agenda, firmas requirimus, veluti nec eius facultatis quæ voluntarium motum præstat, sed (vt dictum est) ipsius potius concoctricis] quarum substantia seu essentia, tum ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum solidis ipsis earundem partium in quibus resident, completur; in horumque temperamento consistit, vt 11. & 12. methodi medendi, cap. quinto scriptum est. Nihil itaque refert si vires aut virtutem indicare dixerimus, postquam id quod diximus, per vires intelligere oportet. Quod verò sic intellectis viribus, ipsæ indicent, nemini in dubium venit: similiter quod suapte natura semper vnum indicent, nam quicquid pro natura sua indicat, id vnum semper indicabit, ceu quod vnam habeat naturam, vt patet eodem 9. methodi medendi. id verò vnum quod semper habent vires indicare, est earum custodia, v. citatis 9. & 11. methodi medendi liquet. Verum non vna tantum ratione seruantur, nempe potissima ratione, ex eo quod de substantia earum, vel inanimatum, vel alteratum est corrigendo, secundo loco ex prohibendis iis quæ ipsarum substantiam vacuare alterare possunt, ipsas seruamus: comprehensa verò inter ea quæ alterant, breuitatis causa sint, & quæ earum vnitatem distrahunt. Hæc itaque sunt, quæ perpetuò vires indicant vt Galenus eodem 9. methodi. inquit. Si quis autem quæret propter quid vires semper seruandæ sint: aut sui custodiam indicent, dicimus quod non propter aliud quam propter vitam custodiam, nam has facultates seu vires seruare, nil aliud est, quam vitam seruare vt diximus: idque non ab re. nam ipsum viuere nobis, ex harum custodia constat, vt pote cum vitam aut ipsas esse vires, aut earum actiones sit necessarium, vt ibidem scriptum est. Cum itaque perpetuò ex earum natura vires sui custodiam indicent, propterea in dubium venit, num vires curationem indicare valeant? cui dubitationi abundè satisfacere visus est Gale. eodem lib. meth. med. præsertim 9. & 11. ob id cum eodem asserimus vires ipsas non connumerari inter primos curatorios scopos, neque eius indicationem ex numero curatricium indicationum esse, vt pote quod ipsæ curationem primùm non doceant, nam neque vt valeamus, neque vt à morbis liberemur ab eis quicquam primùm desumimus, sed vt viuamus: quapropter virtutis indicatio ex vitalium seu quæ ad vitam custodiam pertinent numero, existit, & non curatricium: additum verò est in sermone [primùm] quoniam ex accidenti aliquando virtutis roboratio, ad affectus curationem conducit, vt citato nono methodi. cap. 13. scriptum est, illudque docuit Gale. lib. 11. cap. 9. eiusdem operis. [nam virtus inquit, morbo seu aduerfatrix est opposita, propositumque medico est huic omni ratione opitulari, ac subuenire.

nire. & deinceps post multa dicebat: sanè seire li-
cet difficile esse, ac iudicij indigens febrem,
putredinem & effectricem causam (vbi scilicet &
ipsa quoque adest) inter se conferre: difficilius ta-
men est si vires quoque cum illis vna conferre ve-
lis, quod vtrique, sicut ante comprehensum est,
propter ipsius vitæ respectum semper est necessa-
rium: aliquando verò & ex accidente sicut ad mor-
borum sanationem hoc verè me ostensurum promisi
(id autem libro nono promiserat declarare) osten-
ditque illud in his quæ in corporibus nostris pu-
trescunt, etenim ea sanare possunt tum quæ alterare,
tum quæ concoquere ac vtile reddere valent: quic-
quid videlicet putrescentium, veluti semiputrescens
& seminalium est, vtrique facultatem eius qua natu-
raliter concoquit excitans, firmansque. [his in ver-
bis clarè docuit ex accidente quandoque virtutis
roborationem conferre ad affectus curationem: ea
namque robora est, quæ concoquere ac vtile red-
dere valet quicquid seminalium, aut semiputrescens
est, & per consequens sanare: id etiā paucis quibus-
dam interpositis eodem loco confirmavit, dicens;
[hoc verò tempore etiam vires roborare, quo putre-
dinem superantes succos concoquant, studerimus.]
Verum non propterea quod curatione primū nō
doceant vires, asserendum erit ad curationē non es-
se necessarias, & nihil planè ad eā conferre, ceu nō
nullis, etiā antè Galen. tempora, visum est: logica
potius ac sophistarum (vt ipse inquit) & non op̄erū
artis propria disceptatione vtrūque: quos etiam se-
ctati sunt quidam iuniores nostri temporis: sed cum
eodem Galen. præculdubio asserimus easdem vires
semper ad curationem esse necessarias, cum & ipsæ
conferant ad auxiliorum inuentiones: & quicquid
confert ad auxiliorum inuentiones, quomodo libet
conducere videatur, id fatendum est ad curationem
esse necessarium, inquit Galen. citato 9. meth. med.
Sed non ab re quispiam interrogabit, si virtus non
est ex numero curatricium scoporum præcipue, ne-
que primò curationem docet, vt sexcētijs citatis lo-
cis apud Gal. liquet, qui fieri possit quod semper sit
ad curationē necessaria, ac quod conferat ad auxi-
liorū inuentiones: Atqui nos sumpta prius pro hy-
pothesi Gal. sententia, quā 12. meth. med. cap. 1. scriptā
tradidit, quæ talis est: crudelis hominis officium fa-
cit, qui vna cum morbo vitam quoque homini au-
ferre: facile respondēbimus: nam neque valere, neque
à morbis liberari quærimus, nisi vt viuamus, & pro-
pterea idem Galen. citato 9. meth. med. cap. 10. vñ
esse cōmune propositum, tum operis de sanit. tuen-
tum etiam eius, quod est de meth. med. asserit, nepe
ipsius vitæ custodiam: quæ nimirū in op̄e de sani-
tate tuen. sanitatis custodia sequebatur: quod enim
secundæ valetudinis tuendæ gratia geritur, idem sta-
tim & vitam tuetur. At in op̄e de mer. med. aliter
se habet, propterea quod quæ affectiones præter na-
turam in nobis discutiunt, non omnino vitam custo-
diant, quippe aliqua eiusmodi prædita sunt faculta-
te, vt si modèerate, aut intempestiue vtrūque, vitam
aſſimant, & eodem lib. illud idem confirmavit, cum
dixit: [in valentibus (vt dictum est) consensus agen-
dorum omnium ad virū perennitatem est, in agro-
tantibus autem non semper:] hæc ob rem audacter
eū eodē Gal. asserimus vires in agris à medico sem-
per considerari necessarias esse, quauis non pari
necessitate, vt dicemus, easque conducere ad auxi-
liorum inuentiones, ac ad morborum curationem,

etenim non semper ab his quæ morbos discutiunt,
ipsas custodiri est necessarium, quauis à quibusdā
earum substantia vacuatur alteraturque, à quibusdā
verò omnino eadem corrumpuntur, vtpote quod
vitam adimant: propterea eis vtendum esse præci-
piunt vires, quibus est morbus tollatur, ipsæ custo-
diantur, quæ vitare medicum docent, quæ simul
cum morbo vitam adimunt, aut valde eorum sub-
stantiam alterant atque dissipant, idque non propter
aliud perpetuò indicabunt, nisi pro earum custodia,
& non pro morborum curatione, etenim nunquam
ad affectum amouendum quicquam indicabunt.
Hac itaque ratione vires indicant, ac ad curationem
sunt necessariae, & conferunt ad auxiliorum inuen-
tiones. Sed dices, igitur vires non semper vñ
indicabunt, vt diximus, sed plura, id quod falsum est:
se, ac contra Galen. videtur, nisi esset quod non alia
ratione ad curationem sunt necessariae, & conducunt
ad auxiliorum inuentiones, quam vt ipsæ custodian-
tur, & propterea quicquid indicant, est pro earum
tutela, seu custodia, non enim vt diximus, vna dun-
taxat ratione seruantur, vtpote quia id quod de sub-
stantia earum vel inanimatum, vel alteratum est corri-
gatur, verum etiam ex prohibendis iis quæ ipsarum
substantiam vacuare, alterare possunt: vt sapius ci-
tato 9. meth. med. cap. 10. à Gal. scriptum est. Cum i-
taque vires ea admittant auxilia pro curandis mor-
bis, quæ earum substantiam haudquaquam euacua-
re, aut alterare valent, prohibeantque ea quæ con-
trarium possunt, propterea ad auxiliorum inuentiones
conferunt, idque vt diximus, non propter aliud
indicabunt, quam pro earum custodia, & non vt à
morbis liberemur, nam vt dictum est, neque vt va-
leamus, neque vt à morbis liberemur, ab eis quic-
quam desumimus, sed vt viuamus: & propterea nō
plures, sed vna semper est, quæ à viribus præstat
conferentis: perpetuò enim quicquid pro natura
earum indicat, est propter ipsarum custodiam, & vt
viuamus: & vñ tantæ est potentia & dignitas,
eæ quæ à viribus sumuntur indicatio, quod licet non
sit ex numero curatricium indicationum, neque pri-
mum curationem doceat, tamen ea omnibus aliis
preferenda est, atque prima omnium indicatio ex-
istit, cunctæque aliæ quæ pro morborum curatione
sumuntur à quouis scopo indicante ei cedunt:
propterea quod vita ipsa nil esse prius in animantis
corpore potest, nam nec sanos esse citra vitam licet:
& ob id virtus omnium prima hominibus est cu-
stodiondas, seruabitur autem in agris præsertim vt
sapius diximus, si nec eius substantia maneat, nec
tata aliter ratione alteretur, vt ea corruptioni sit pro-
pina: atque huius custodiæ pars est, vt idem Gal-
lenus testatur, vbi vel temperiem ipsam præsentem
seruamus, vel absentem inducimus. Quicquid igitur
indicationi, quam vires præbent aduersatur, id
secundū est loci, ac posterioris iis quæ illæ præcipiunt,
quæ verò cum his quæ viribus conducunt in idem
competunt, hæc citra controuersiam sunt faciendæ,
quæ verò aduersantur, aliquando prorsus non sunt
adhibenda: aliquando verò paulatim, seu mo-
dicè, quia propter licet vires pro morborum curatio-
ne sint considerate necessariae, ac conferant ad au-
xiliorum inuentiones modo quo declarauimus (quo-
nam quemadmodum ab affectu ad materias præfi-
diorum pertinemus, eodem modo à singulis pri-
morum generum reliquorum descendendum ad eas
est, vt 12. meth. med. cap. 3. liquet) tamen nō semper

par est earum necessitas, etenim saepe maximè necessariae sunt sic, ut quæ circa ægrum administrantur, iam fermè eius viuis causa fiant, vbi videlicet admodum imbecilla fuerint, aliquando mediocriter necessariae, sic ut aliquid ex his quoque ad ea quæ facienda sunt consilij petatur, non tamen præcipua faciendorum ratio huc omnis referatur vbi scilicet mediocriter imbecilla sint, & morbus magnus vel diutinus, interim verò parum necessariae sunt, ita ut adeo exiguum ad inueniendi remedia conferant, ut propter exilitatem etiam lateant, alias verò præmittantur, quasi prorsus ex vtiliter considerandis non sint, quemadmodum accidit in diariis febribus, in quibus neque vllam egregiam providentiam requirunt, utpote quæ omnino valida sint, veluti eodem lib. meth. med. scriptum est, & 10. eiusdem operis, sic scriptum reliquit. [Quod vero ex viribus consilij petatur, ut in diariis sanè est exiguum, ita in iis quæ pluribus diebus vrgent, satis magni est momenti, eoque maioris, quo hæc sunt longiores.]

Responsio ad obiectiones eorum, qui vires ad morborum curationem nihil indicare, probare conantur.

Capit. XXV.

SUmpsa est occasio inconsideratis quibusdam & temerariis medicis, virtutem in morbis prætermittere, ceu nusquam quicquam indicet, inquit Gal. 9. metho. med. cap. 10. propterea quod saepe ex vacatione eadem nihil lædatur, quam opinionem sectati iuniores quidam medici, hæc prima ratione credunt probare vires ad curationem non esse necessarias. Si una est inquirunt, quæ à viribus semper præstatur indicatio, utpote quod vnam habeant naturam; ergo vnam rem semper indicabunt, quemadmodum reliqua, quæ sunt secundum naturam, id verò est sui custodia, quare nec curationem, aut remedia, vel illorum quantitatem vnamquam indicabunt, si modo idem sui sublationem, & conservationem simul expostulare nequit. Quæ sanè ratio haud ægrè diluitur, si quæ in precedentibus retulimus in memoriam reuocabimus, etenim vires perpetuò sui custodiam indicant, nec quicquam ad affectum amouendum vquam indicabunt; cum ex numero curatricium scoporum non sint, sed alterius cuiusdam rei causa, in morbis semper spectantur, ut prius dictum est: & propterea nec curationem, aut remedia, vel illorum quantitatem per se & primo indicabunt, sed perpetuò quæ ab eis sumitur indicatio, pro earum custodia existit, & ut viuamus duntaxat. Conferunt autem & ipsæ ad remedium inuentiones, & propterea à medico in ægris consideratu sunt necessariae, non pro morborum curatione, sed pro earum conservatione & vitæ custodia, modo quo superius declarauimus; & ob id eadem non sui sublationem, & conservationem simul expostulant, sed conservationem duntaxat, nam quamuis in iis qui valent semper vita comitetur ea quæ sanitatis gratia administrantur, nec est quicquam inuenire quod sanitatem tueatur, quod idem vires corrumpat, in ægrotantibus tamen aliquando succedit, quod veluti in perniciem earum administrantur quæ morbos discutunt, aliquando ab ipsis soluntur, ut Galenus inquit. Nec inconuenit easdem vires eo quod contrario modo indicent, propterea conducere ad remedium inuentiones: nam quomodolibet conducere videantur ad cura-

tionem semper sunt necessariae, licet nec curationem, nec remedia pro seipsis, aut morborum sublatione vquam indicent: & propterea licet contrario modo indicare admittamus, hæcque ratione conferant ad auxiliorum inuentiones, ac necessariae sint ad curationem, non ob id contraindicantur, cum indicantibus confunduntur, cum nunquam compertum sit in Gale. doctrina vires curationem, aut remedia indicare, sed vel contrario modo eadem indicare, vel prohibere: ut liquet primo de ratione victus in morbis acutis, & si quandoque remedium quantitatem metiuntur, pro earum etiam conservatione, & vitæ custodia, & non pro morborum curatione id docere videntur, ut saepius dictum est, tantum remedium quantitatem contrario modo indicantes (hoc est admittentes) quanta easdem vires nec immodicè alterat, aut earundem substantiam vacuare valeat, adeo ut corruptioni sint propinquæ, maiorem vero eadè ratione prohibentes, propter earum scilicet custodiam, pro qua contrarium quodammodo indicant. Ad hæc arguunt, quo pacto quantitatem remedium vires indicabunt, si curationem indicare nequeunt: nihil enim materiam quæ vni actioni seruit insinuare potest, quin ipsam etiam actionem ostendat: siquidem absurdum fuerit quippiam remedium curatum requirere, ipsam autem curationem minime. Logica profectò ac sophistica ratio, quæ ex semetipsa ruit, si eorum quæ diximus non fueris immemor, nam saepius dictum est, vires ipsas, quemadmodum nec curationem, ita quoque nec remedium curatiuum, nec quantitatem remedium requirere, aut indicare vquam, quamuis ad curationem sint necessariae, & conferant ad remedium inuentiones, alterius cuiusdam rei gratia, hoc est propter sui custodiam, aut ut viuamus; quod si interim remedium quantitatem metiantur, utpote quod affectus, quod sanetur, multa vacatione indigeat, resoluuntur autem ex tanta vacatione vires: quoniam hæc vacuatio non modo homini non prodesse, sed maximum illi afferret periculum, propterea dicimus à viribus hæc vacationis quantitatem metiri, non quod ipse exigant, ac indicent talem remedium quantitatem, neque hoc curatiuum remedium, ut isti imaginantur, verum quia tantam remedium quantitatem admittunt, & propterea non eadem exigere, & indicare asserimus, cum id proprium sit affectus præter naturam, sed contrario modo indicare, quod idem est quod non prohibere, ut liquet libro de curatione per venæ sectionem, cap. 13. neque etiam contrario modo remedia, aut eorum quantitatem indicant, pro sublatione affectuum præter naturam, ut toties dictum est, sed perpetuò pro earum tutela, vitæque custodia, etenim cum tanta remedium quantitate potest vita custodiri, virium substantia haudquaquam vacuata, aut immodicè alterata. Interim autem contingit quod vires quemlibet remedium vsum impediunt, etiam si morbus non remedia duntaxat, sed magna exigat, vbi videlicet eadem extremè imbecilla sint, & affectus quod expugnetur, notabilem vacationem desideret, ortis vti que contrariis inter se indicationibus, cum vires refectionem affectus vacationem desideret, quare vires duntaxat reficere oportet, cum omnium prima sit indicatio quæ à viribus sumitur, ut supra concludimus; & toto eo tempore, quo vires reficimus, eorum quæ affectum sanant, nihil planè ægrotati exhibebimus,

1. Ratio afferentium vires ad curationem nihil conferre.

Dilutio.

Viros & si contrario modo indicent, non propterea

ad curationem non conferunt

Supra 45.

Locutur

2. Eadem ratio

Regula

Gale. fal. inueniuntur quod dicitur vires nullam remedium inueniuntur & vacuatur vires & morbus curationem indicant. Cap. 42.

Vires quod curationem non indicant

Quand vires refectionem non impediunt

bimus, quo casu vires non contraindicare, sed prohibere remedia omnino, tãquam contrarium indicantes, quã morbus, seu prater naturam affectus exigit, asserimus: illa siquidem adiectionem seu refectionem indicantes, hic vacuationem desiderans, quæ sibi aduersantur: & propterea in similibus corporibus aduersas inter se esse faciendorum indicationes, dicimus. Habes itaque qualiter nec curationem, nec remedia, neque eorum quantitatem vires indicant, neque remedium aliquod curatiuum requirunt, sed eadem vel contrario modo indicant, aut prohibent, contrarium omnino indicantes, quemadmodum à Galeno primo de rat. victus decretum est, & eodem nono meth. med. circa finem commemorans multos scopos quos medicus in sanguinis detractione spectare debet, dicebat, [sanè erunt in hac quoque detractione multi scopi à medico spectandi, natura ab initio, consuetudo, ætas, locus habitationis, anni tempus, cœli status: adhæc ægitudinalis, quem curamus, affectus, aliæque ratione ante hunc, laboratis vires,] dixit alia ratione, quia non ut curationem indicantes, seu venesectionem, sicut ceteri scopi, quos dinumerauerat, sed modo quo diximus. Inquit etiã ante hunc videlicet affectum prater naturam, quoniam quæ à viribus indicatio sumitur, prior est eâ, quæ accipitur ab effectu prater naturam, quæadmodum ipse eodẽ lib. paulo ante demonstrauerat. Ex quibus etiã facillè sedari poterit ea contradictio, quam hi viri nituntur Galeno imponere: aiunt nanque quod libro de optima secta, contra methodicos idem Galenus conatur probare vires nullum remedium indicare: demum aliis in locis, eas postea vacuationem, & quantitatem aliorum remedium indicare, nusquam non statuit: qui profectò methodici reprehendendi non essent, si indicantium nomine, contraindiciantia complecti potuissent, siquidem omnibus notũ est, vires aut profus remedia impedire, ut venæ sectionem, & purgationem, aut certè illorum quantitatem moderari. Sed dicant quæso, quibus in locis in Galen. doctrina incompertum est, vires vacuationem, & aliorum remedium quantitatem indicare: cum nullibi illud asseruisse videatur, licet ad curationem esse necessarias, conducereque ad remedium inuentiones, eas ubique admittat, quemadmodum nos paulo ante demonstrauimus. Quod verò libro de optima secta demonstrauerit fusissimè ex ipsis nullum remedium indicari cuique satis manifestum esse arbitror, nam si constans vis remedium indicat, in sanis quoque quoniam constat, remedium indicabit; at in sanis remedium non indicat; ergo neque etiam in ægris, modum seruas facultas indicabit remedium, inquit, idem Galenus, & deinde subdit: quamobrem si ubi facultas seu virtus indicare deberet auxilium non admittimus, idè iam in effesso est nihil opem ferẽs à virtute demonstrari; opus est enim propositum demonstrare præsentia, sed quod requiritur prohibere ne accipiat, ut supra posui, virtus valere: remedium verò propositum nequaquam est. Non igitur sibi ipsi contradicit Gal. sed ubique locorum illud idem fateri videtur, quod videlicet vires nec curationem nec remedium indicent: nec indicantium nomine, contraindiciantia complectitur, imò aliud esse quod contrarium indicat, seu id quod contrario modo indicat, ab eo quod verè indicat, semper fatetur, ubi eorundem naturæ, æ vim considerat: & propterea

vires interim contrario modo remedia, aut eorum quantitatem indicare, interim verò prohibere, eò quod contrarium indicent, quã id quod affectus prater naturam exigunt: nusquam autem eadem indicare profitetur, quemadmodum methodici putabant, volebant enim vires esse proposita; & indicantia, & propterea indicare, & requirere remedia, & non contraindicare, ut Galen. sentit. Et cum inquirunt quod nemo ex contraindicantium natura inueniet vnquam id quod agere oporteat, sed quod ab indicantibus iam est inuentum, prohiberi ab illis, vel certè moderari intelliget, nam quis virium natura percepta concipiet vnquam vacuationem aut alio remedio opus esse? Dicimus nos eos parum rectè intelligere contraindicantium naturam, modo quo Galenus subintelligit, & nos prius demonstrauimus, cum eadem non sit prohibere ea quæ ab indicantibus inuenta sunt; verum aut eadem contrario modo indicare (id quod est admittere & non prohibere) aut prohibere eò quod contrarium indicet, & hoc vel omnino, vel quodam modo, quod metiri, seu moderari dicimus. Inuenitur ergo sapius ex contraindicantium natura, id quod agere oportet, ut puta cum morbus magnus fuerit & vires valent, inuenitur venæ sectionem fieri debere, ab ipsa etiam viribus, contrario modo illam indicantibus, etenim ubi robustæ fuerint, eam admittunt, ac minime prohibent, cum ab eadem hauquaquam laedantur; similiter ubi nõ admodum, sed parum imbecillæ fuerint, eadem venæ sectio, ab eisdẽ viribus sumpta indicatione, moderatur: etenim à copiosiore laederentur, quoniam contrarium quodam modo indicant, ubi verò extremè imbecillæ fuerint, eandẽ non admittunt; sed prohibent omnino, propterea quod contrarium omnino indicant vires ipsæ quã prater naturam affectus; hic nanque vacuationem, illa verò adiectionem, & refectionem: Hac itaque ratione virium natura percepta, licet nec curationem nec remedia indicent, dicimus tamen ad curationem eas esse necessarias, cõducereque ad remedium inuentiones, non siquidem pro morborum sublatione, sed pro ipsarum custodia. Nec obstat quod idem Gal. virtutem inter coindicantia, quæ *ouerò ouerò* appellat libro 13. meth. med. cap. 16. connumerauit; nominantur enim talia ab eo, quæ non primo, ut aiunt, & per se, sed secundario & per accidens indicant; concluderat nanque 9. eiusdem operis libri, virtutem per se & primo non contineri inter curatorios scopos, utpote quæ primam curationem doceat, at quicquid indicet ad amouendum prater naturam affectum, verum ex accedente quandoque ad affectus curationem, conducere asseruit, quæ ratione inter coindicantia curationem non ab re citato loco dinumerauit, ab indicantium numero eandem & reliqua ibi commemorata seiungens, tanquam non primo & per se, sed secundo loco & per accidens, curationem coindicantia.

In quos, quibusve generibus praesidorum materia continetur.

Caput XXXVI.



Noniam non solum ab affectu ad materias praesidorum peruenimus, verum etiam à singulis primorum generum ad eas descendendum, ut inquit Gal. 11. meth. med. c. 1. ob id nos, diducta indicatione quæ ab affectu quem curare para-

Tt 3

3 Ratio, quæ r. fellitur ex contraindicantium natura male intellecta ab aduersariis.

Contraindicantia aliquando quid agendum sit indicant, aliquando id moderantur, aliquando contrarium indicant.

Scriptum tollitur.

mus, sumitur, hoc est ab ipsa febre, in particulares indicationes, quæ materias methodo inueniebant. (etenim eius principium est id, in quo finita est curandi affectus diuisio) reliqua quoque prima genera, quæ quomodolibet ad hoc conducere videntur, commemorare oportuit; ac in particulares indicationes diducere, quoad perueniremus ad eas quæ sectionem non admittunt, & quoniam vires ad eandem etiam remediorum inuentiones conducere videntur, & consideratu ad curationem sunt necessaria, licet non semper æqualiter conferant, propter ea eas duximus non esse prætermittendas, ac quomodo ad curationem necessaria sunt cum Gale. demonstrabimus, eundemque à iuniorum quorundam medicorum calumniis liberare non piguit, ut simul pateat quanta sit tanti viri auctoritas, & doctrina, & quam parui momenti sint ac sophistica eorundem rationes, quibus hanc miram ac artificiosam Gale. methodum euertere tentant, in iuniorum, ac proborum medicorum perpetuam calamitatem. Reliquum est postquam ex tot vniuersalibus ac particularibus scopis & indicationibus, descendimus ad auxiliorum materias, vestigare in quot, ac quibus generib. talia vestiganda sint. Nam si cuiuslibet febris, quæ febris est, humectatio, refrigeratioque, remedia sunt, ut concludimus, ac si sola sit, ad refrigerandum humectandumque, omne medentis consilium veluti ad finem dirigitur, ita ut nihil sit quod præter ea ad curationem desideretur, ut Galenus inquit 9. metho. medendi, nisi ut materię inueniantur, quæ huic proposito sunt idoneæ, materia verò inuenta, ut oportunitum tempus ex quatuor febris temporibus captes, quantitatem verò, ex conferendo cum naturali habitu morbum, quippe quantum is à naturali habitu recessit, tantum opus est ægrum refrigeres & humectes, hanc ob rem in quot, quibusve generibus iam dictæ præsidiorum materię primò inueniantur, deinceps de temporis opportunitate disferendum esse censui; de quantitate etenim cum de temperamento loqueremur, satis abundè verba fecimus. Quantum ergo spectat ad id quod primò proposuimus, cum Gal. lib. constitu. artis medicæ, cap. 14. asserimus auxiliorum materię genus vniuersum, in iis quæ per os sumuntur, quæ sunt, quæ vacuantur, & quæ de foris incidunt, positum esse, per quæ omnia ubi decurrerit, qui artem constituit, ac particularis materię vniuersæ scientiam non solum facultatis, sed vsus etiam obtinet, sic utique salubres causas compleuerit vniuersas, ut nihil ad curatricis artis constitutionem desideret, omnibus nimirum iis, in duo sese capita redigētib. in corporum quibus remedia adhibentur notitiam, & ipsam remediorum naturam. Lib. verò 1. & 5. de san. tuen. & lib. num. tuenda. sanitas ad Thrasib. nō modo auxiliorum materias pro curandis morbis, verum etiam pro sanitatis custodia in quatuor iam dictis generibus complecti affirmavit, auctoritate iuniorum probatissimorum, inquit eodem 1. de san. tuen. in admoendis videlicet, educēdis, faciēdis, & extrinsecus incidentibus, & deinceps quid intelligendum sit admoendorum nomine, ac reliquorum præfacit, tum eodē loco, tum etiam citato lib. ad Thrasib. inquit admoendorum quidē nō nime cib. potio, & si qui medicamentorum introsumitur, etiam aer attractus intelligitur, faciendū verò frictio, ambulatio, vectio, equitatio, omnisque deniq. motus; quod si non quiniis motus exerci-

tatio est, sed solū qui est valentior, adiciatur motui exercitatio, ut sint faciēda tum motus, tum exercitatio: referuntur item ad hoc causæ genus somnus, vigilia, & Venus, & hæc studia, ira, cura, & lavatio ex hoc genere sunt, ut patet eodem libro ad Thrasib. Ex foris incidentibus primus est circumdatus nobis aer, denique quæcunque lauantium, vngentiumve cuti propinquat, etiam si quod medicamentum sanitatis tuendæ fines non excessit, veluti sal, myrrha, nitrū, aphronitrum, & aquarum aliqua sponte natarum, & calentium; quod vero balneum diuersa ratione inter faciēda, & ea quæ foris incidunt connumerari possit nemo ambigat: nam sumptum pro lauatione ipsa inter ea quæ sunt continentur, si vero capiatur pro ipsa aqua qua lauantur, ex numero foris incidentium exilit: quo etiam in genere continentur epithemata, cataplasmata, perfusiones, & id genus alia, quæ ad morborum curationem conducunt. In his verò quæ educuntur, sudores, deiectiones, vrinæ, in vniuersumque omnia quæ corpus nostrum excernere debēt, spectanda sunt. Atqui licet Galen. citatis locis hanc diuisionem, in quatuor genera iuniorum probatissimorum auctoritate admiſerit, dubitat tamen eodem primo de san. tuend. num rectè fuerit facta, cum melius fortasse fuerit in tria, secludens educēdorum genus, tanquam in illis tribus contentum, & non a quæ primū existens velut reliqua tria genera, & breuib. licet difficilib. admodum verbis illud confirmauit, inquit: [ex admoendis, faciēdis, & extrinsecus incidentibus, alterari mutarique corpus nostrum, mutationem verò aut in qualitate fieri, aut in quantitate: in qualitate, dum aut incalcescit, aut refrigeratur aut siccificatur, aut humectum redditur: in quantitate, dum alitur, aut inanitur, iam inanitionem ipsam duplicem quoque esse, subdit, alteram excrementorum de quibus mox diximus, alteram naturalis substantiæ nostræ assidue defluentis, quæ nutritioni ex aduerso opponitur.] quibus in verbis liquet educēda (qua in excrementis consistunt) in illis tribus generibus ex quibus corpus (tāquam primis generibus) alteratur, & immutatur, contineri, & non esse quartum genus: id quod etiam confirmare videtur in præmio lib. de morb. vulg. asserens [cum igitur tres sint causæ à quibus morbi aspicantur, una quidem in iis quæ offeruntur, altera vero in operibus, quæ obimus, & tertia in iis quæ extrinsecus occurrunt nobis & cætera.] nulla facta de excrementis mentione, ita ut Gale. rectius visum sit dictarum causarum salubrium diuisionem fieri in tria, quā in quatuor genera, licet eandem citatis locis admiſerit, eorundem videlicet iuniorum probatissimorum auctoritate. Libro verò ar. cap. 8. tit. medicæ, inuenio eorum numero quæ ex necessitate corpus alterant, in sex generibus ibi declaratis, dicebat proprium in singulis eorum, causarum salubrium genus inueniamus, ita ut sex admittat & non quatuor, seu tria causarum salubrium genera: sed ubique locorum easdem complectitur materias, quas lib. de san. tuen. & lib. ad Thrasib. particulariter dinumerauit, siue eas ad quatuor, siue ad tria, aut ad sex redegeris genera parum curans, modo nulla præsidiorum seu salubrium causarum materia prætermittatur, & cuiuslibet vires comper- tas habeas. Nec desunt qui velint Galenum quādoque fateri duo esse genera in quibus præsidiorum materię reperiuntur ut 10. method. med. cap. 7. Sed

Materia
omnis præ-
sidiorum 4.
generibus
continetur.

Cap. ult.
& cap. 10.
Admonē-
da.
Faciēda.

Lo. cit.

Lo. cit.

Materia
præsidiorum
continetur
4. generibus
& occasi

Quomodo
excrementa
considerentur.

Cap. 8.

Loc. cit.

In duo
genera
dividit
Galenus
a. lib. 10.

Sed ij non aduerterunt quod citato loco intende-
bat materias praesidiarum inuestigare, pro meden-
dis hecicis duntaxat febribus, & non ceteris mor-
bis, quae in duobus planè generibus continentur,
foris videlicet incidentibus, & in adiuuendis. Sed
quicquid sit de eiusmodi diuisionibus (nam simul
cum Gale. citato libr. 1. de sanit. tu. dicimus quod de
talibus diuisionibus statuere pro arbitrio cuius li-
ceat) cōcludimus in talibus generibus vestigari de-
bere materias praesidiarum, pro curandis febribus,
atque singula quae in eis continētur, spectare oportet,
nec minùs vires compertas habere, vt diximus,
cuiuslibet materiæ, quoniam hinc demum oritur dex-
ter earum vsus, vbi videlicet oportuum etiam tem-
pus ac modum, seu mēsuram inuenieris: quapropter
citato libr. ad Thrasyl. idem Galen. enumeratis om-
nibus quae in dictis quatuor generibus continētur,
hæc protulit verba [atque singulorum enumerato-
rum salubrum, quātitas, qualitas, & occasio digno-
scenda est] libro vero 9. meth. med. cap. 3. (licet sub
aliis verbis) illud idem confirmauit asserens [atque
membratim medicatio agitur ex his duobus confic-
tur, nempe materiæ copia, & huius congruo vsu.]
per congruū vsū nil aliud intelligens quā quan-
titate, qualitate & occasione: hæc etenim ex-
plent materiarum congruum vsū, ita vt praesidia
fiant. Quam Gale. auctoritatem, malè intelligentes
iuniores isti, quorum studium assidue in contradi-
cendo Galeno versatur, opinantur aliis suadere, in
hoc etiam Gale. sibi pugnare, cum clarum sit idem,
licet sub diuersis verbis, vtrobiq; præcipere. Siue
itaque quatuor, siue tria sint prima genera materiæ
praesidiarum in his inuestigandæ sunt materiæ
idoneæ, ad refrigerandum, humectandumque
pro febrium curatione, quæ febres sunt, tam si effe-
ctu, quā potestate, vel ex accidenti refrigerent,
quibus inuentis, occasio seu opportunum tempus
adhibendi spectare oportet, de quo discere repe-
titiuum est, vbi prius dubitationem quandam solu-
imus, quæ de ipsis excernendis fieri solet, vt cun-
que sint, siue quartum genus, siue in tribus contineātur.
Est autem ea, num in ipsis excrementis, sudoribus,
inquam, deiectionibus, vrinis, ac reliquis tam hu-
manis, quā reliquorum animalium, inuestigandæ
sint praesidiarum materiæ, velut in reliquis generi-
bus dictum est, ita quod eisdem vtendum sit pro
morborum sublatione, tanquam praesidiarum ma-
teriis, vel hæc considerare debeat medicus in ægro-
tantibus ipsis tanquam alteratiā, eorūque corpus
immutantia, vbi immodicè detineantur, aut excer-
nantur, & propterea eadem vel propulsare, vel arce-
re oporteat, velut etiam conferentia ad morborum
curationem. Huic responsum sit, quod licet de fa-
cultatibus excrementorū post Xenocratem, & Dio-
scoridem Galen. quoque conscripserit, vt completa
fuisse tractatio de simplicium medic. facultatibus,
tamē idem Gal. 10. lib. eiusdem operis dicebat, non
ita se habere in tali materia quemadmodum in reli-
quis, cum in illis operam dedisset, vt per experien-
tiam eorum omnium facultatem cognouisset, aliās
nequaquam de aliquo quicquam cōscripisset, cen-
sens aliis haudquaquam esse credendum: verum in
tali excrementorum, ac reliquarum partium anima-
lium materia, non ita res habet, inquit ipse, ingenuè
siquidem fateor complura esse tum partium, tum
reliquorum in animalium corporibus contento-

rum, quorum nullius eiusmodi feci periculum, cu-
iusmodi quidam scriptum reliquerunt, & reddens
causam asserens: siquidem quædam eorum abomi-
nanda, detestandaque sunt, quædam etiam legibus
vetita: at demū de relictis iis quæ cōtra leges erant,
ad excrementa deueniens dicebat: [At potio sudo-
ris, aut vrinæ, aut mensium mulieris, abominanda,
detestandaque est, atque horum in primis sterco-
ris, quod tamen scribit Xenocrates si oris ac gutturis
partibus inungatur, & in vētre deuoretur, quid præ-
stare valeat: scripsit etiam de aurium foridibus deuo-
randis: at ego has quidem vnquam deuorare susti-
neam: ne si in totum quidem morbo deinceps liber
degerem, atque his etiam magis abominandum pu-
to sterco-] videtur itaque Gal. his verbis detestari,
atque odio habere talem auxiliorū materiam: quā-
quam eodem libr. fateatur quod optimus medicus
facultates eiusmodi excrementorum ignorare non
debeat: ceterum potiora eligere, potissimum ad vr-
banos, & honoratos, alicuiusque existimationis vi-
ros, in quibus testatur nunquam vsū fuisse medi-
camine tali, cum multo meliorum suppeteret copia.
Verum non negat quod talium vsus, & præsertim a-
liorum animalium admittendus non sit, aut in iti-
nere, aut in venatione, aut rusticatione, cum scilicet
meliorum nihil adfuerit, aut homo rusticus perindè
fuerit carnis duræ ac asinus, & post pauca, de sterco-
re bubulo verba faciens, subdebat: [Scire tamen o-
portet omnia id genus medicamenta duris agre-
stium hominum corporibus aptari, nempe fossori-
bus aut messoribus, & qui opus tam validum obeunt,
&c.] cum igitur potiora habeamus remedia quā
ea quæ ex excrementis capiuntur, sintque ea vilia,
detestabilia, ac abominabilia, quamvis eorum fa-
cultates medicus ignorare non debeat, vt in quibus-
dam iam dictis corporibus, ac locis, vbi contingat,
vti valeat, in defectu aliorum medicamentorum,
iure asserendum est Galen. noluisse per educenda,
hæc intelligere: sed per educendorum materiam,
quam medicus considerare debet, intelligit sudo-
res, vrinas, deiectiones, & in vniuersum omnia quæ
corpus nostrum excernere debet: vt ipsemet fateatur
citato libro ad Thrasyl. tam in sanitatis conserua-
tione, quā in morborum curatione, ac febrium
de quibus loquimur, ait enim educendorum, seu
quæ educuntur, seu quæ euacuantur, & non quæ e-
ducta seu vacuata sunt, ita vt velit medicum specta-
re debere hæc omnia, quomodo scilicet educantur,
seu euacuantur, aut præter naturam detineantur,
non modò in sanis corporibus, sed ipsis ægrotan-
tibus: & non postquam excreta sunt in eis inuesti-
gare praesidiarum materiam: refrigerant namque se-
pius sudores, ac febribus medentur: quemadmodum
& alui deiectiones, & vrinæ vbi tempestiuè vacuen-
tur pariter & vomitus, saltem ex accidente, id quod
apertissimè ostendit libr. ad Thrasyl. his verbis: [Quæ
verò in his quæ vacuantur, sudores, deiectiones,
vrinas, in vniuersumque omnia quæ corpus no-
strum excernere debent, considerat,] & lib. 1. de sa-
nitate tuen. cum dicebat: [educendorum verò ma-
teria prædicta paulò supra est.] quo loco docuerat,
quomodo euocari debebant, vbi detenta essent sin-
gula excrementa, quæ in nostris corporibus gene-
rantur: in his itaque quantitate, qualitate, ac oc-
casionem obseruamus, cum pro sanitatis culto dia-
tum pro morborum curatione.

De temporis occasione: & unde capiendum sit opportunum auxiliorum tempus. Caput XXXVII.

INVENTIS auxiliorum materiis in iam dictis generibus pro febrium curatione; definitaque earum qualitate ex natura earundem febrium (nam omnium febris, quæ febris est, refrigerantia & humectantia expostulat.) determinata insuper quantitate dictorum auxiliorum quæ refrigerant ac humectant, modo, seu mensura, à naturali corporis temperie unà cum ipso morbo, nam quantum æger à naturali habitu recesserit, tantum opus est eum refrigeres, & humectes tanquā necessarium; opus est opportunum quoque tempus nō ignorare: cum satis non sit præsidiorum materias, eorumque qualitatem, & quantitatem inuenisse, nisi & opportunum tempus inuenias, vt 9. method. med. cap. 14. liquet: idemque confirmat lib. num. tuenda sanitas ad

Sub qualit.
& quanti-
tate & tem-
pus comple-
tus est. Ga-
len.
Loco præ-
cit.

Alibi mo-
dus & tem-
pus adiut.
Lib. ad Gla.

Conciliatio
locorum Ga-
leni.

Loco præ-
cit.
Modus
quid.
Cap. 15.

Thrasylb. cap. 40. cum dixit: [atque singulorum enumeratorum salubrium quantitas, qualitas, & occasio dignoscenda est.] De hoc itaque tempore, non vno eodemque modo scripsisse Gal. reperio. nam præter ea quæ scripta reliquit 9. & 11. meth. med. lib. artis medicinalis, asserbat. [Neque enim est rationi consentaneum, etiam temporis occasionem, quæ in his quæ dicta sunt, continetur, veluti tertium aliquod ab eis diuersum, introducere. si enim tali & tanta re allata egeat corpus, nemini dubium quin etiam in tempore opportuno auferatur.] Inoluit itaque Galenus, hoc in loco temporis occasionem tanquam tertium quoddam, à qualitate, & quantitate spectandam esse, sed in eisdem contineri. Libro verò primo de sanitate tuen. præter opportunum tempus, modum quoque esse inueniendum statuit, vti turque voce *μέτρον*: & primo de arte curatiua ad Glaucon. ca. 15. præter temporis occasionem, vsum modum esse necessarium pro medendi methodo asseruit, sub his verbis *καὶ τὸ πρότερον τῆς φρονέσεως*. hoc est vtendi modi. at commento aphor. 17. primi libri, restat temporis occasione, dicebat præter qualitatem & quantitatem eorum quæ offeruntur, dignoscendum esse modum eorundem, cum non satis esset nouisse qualitatem & quantitatem, vocem *μέτρον* vtiens. Verum si quis verba Galeni perpendit, quæ citato lib. artis medic. post ea quæ modo citauimus, conscripsit, haud ægrè cuncta quæ diuersis in locis asseruit, licet diuersa videantur, conciliabit, nam subdebat occasio, siquidem temporis inde ortum habet, quoniam fluxile, ac facile mutabile est mortale corpus, ac pro transmutationis modo aliis alio tempore eger auxiliis. quare non est tertium aliquod præter ea quæ dicta sunt, tempus: sapius autem eo tanquam tertio quodam, ob eam quam diximus causam, ad docendum, vti consueuimus. ex quibus Galeni verbis liquido constat tempus, seu temporis occasionem, quam per vocem *καί*, significare voluit, semper re ipsa non esse quoddam tertium diuersum à quantitate, & qualitate, sed in eisdem contineri: sapius autem ipso tanquam tertio quodam vti ad docendum, profaciliori videlicet doctrina: propterea quod mortale corpus fluxile & facile mutabile est, & pro transmutationis modo aliis alio tempore eger auxiliis. Nō ab re itaque 9. & 11. meth. med. ipsum tempus, tanquam tertium quoddam spectandum esse præcipit, vt facilius medendi methodum doceret, primo verò de sanitate tuen. per *μέτρον* non intellexit modum vsum, sed mensuram, per eam intelligens

quantitatem. nam postea quàm præceperat vires omnium materia: quæ ad salubrem victus rationem pertinet debere medicum non ignorare. (nam inde oriebatur dexter eius vsum) subdebat, adhuc pro congruo vsum, opportunum quoque tempus, ac mensuram inueniendam esse. hoc est, quod præter vsum dignotionem quæ ex qualitate oriuntur, & opportunum tempus, & mensuram, hoc est quantitatem, medicus spectare debet, præter qualitatem verò, singulorum medicaminum quantitatem, & temporis occasionem, modo vsum eorum, addit primo artis curat. ad Glauconem, quod medendi methodus perficiatur, vt particulatim dinumeraret omnia ad vniuersalem medendi methodum necessaria, haud ignorans quod sub qualitate & quantitate reliqua duo continebantur, & vt Glauconi etiam causam traderet, cur non propria vniuique ægotanti, sed communia scribere fuerit coactus, asserens quod cum ad recte medendum plurimum conferat & temporis occasio, & auxiliorum quantitas, & hæc vniuique ægotanti sint propria, nihilque proprium possit sermone explicari, propterea quod commune est, coactus fuit scribere: quod planè scribere nō cogere medicaminum qualitas, & modus vsum; cū nō vniuique ægotanti hæc propria existat, & scribi possint. posset autem modus vsum diuersus à tempore sic considerari, vt esto quod eger pro opportuno tempore cibo æger: qualibet die, vel nocte, hoc erit tempus opportunum offerendi: si eadem nocte vel die semel, bis, vel sæpius eo indigeat, hic erit modus vsum, quanquam sub modo vsum, reuera & opportunum quoque tempus continetur. quam obrem commento aphor. 17. primi lib. idem Galenus temporis occasionem subicit, meminitque solum modum vsum, præter qualitatem, & quantitatem eorum quæ offeruntur, per *μέτρον*, modum, scilicet vsum, intelligens: quod eodem commen. manifestauit, cum dixit: [neque enim sufficit hoc ipsum solum cognoscere, quod huic plus, vel minus sit offerendum, vel quod victu exsiccante vel humectante vtendum sit, sed nunquid semel, aut sæpius, qualibet nocte, vel die cibum offerre oporteat, necessarium est considerare] per modum itaque complexus est temporis opportunitatem, & vsum, quæ de re licet sub modo vsum contineri possit temporis occasio, & sub temporis occasione modus vsum, subintelligi possit, & vtrumque sub quantitate, & qualitate re ipsa continetur, & interim Gal. sub congruo vsum, omnia contineri voluerit, quantitatem scilicet, qualitatem, tempus, & modum vsum, vt liquet septimo meth. med. cap. 3. cum dixit: [at, quæ membratim medicatio agitur, ex his duobus conficitur nempe materia: copia, & huius congruo vsum.] nos tamen clarioris doctrinæ gratia de hac temporis opportunitate, simul cum Galeno in hac nostra methodo, separatim à quantitate, & qualitate, verba faciemus: sub ea etiam modum vsum subintelligentes, ac vestigabimus à quibusnam sumenda sit hæc temporis occasio pro medendis febribus. Huic ergo licet breuiter satisfacere videatur Galenus 9. meth. med. cap. 14. cum inquit. opportunum tempus capiendum esse ex quatuor febrium temporibus, non tamen sic facile eius verba interpretantur: quinimò eisdemmet iunioribus, ob prauam eorum intelligentiam, ansam præbuerunt, in hoc quoque ipsum calumniam diasserunt enim pugnantia sibi ipsi de tempore conscripsisse, cum quarto de meth. med. cap. 5. tempora non nisi dierum numerum nos posse

capit. de
per. occ.
suum es
quatur
sibi temp.
rius.

Loco præ-
cit.

Loco citat.
Temporis
differenti-
æ à mi-
nus speci-
Tempora
auxiliorum

Tempora
auxiliorum

Temporis
ocasio
febr. temp.
ribus sum-
tur.

Refellunt
qui repa-
rarent
Gal. quod

capit temp-
purs occa-
sionem ex
quatuor
est tempo-
rum.

nos posse docere, nec quicquam aliud indicare pos-
se scriptum reliquerit, & lib. de opt. secta longa ora-
tione eos refellat, qui tempora indicare asserbant.
cur itaque citato nono de meth. med. cap. 35. oppor-
tunum tempus auxiliorum ex quatuor febris tem-
poribus indicari fatetur? & alibi cibandi tempus per
morbos ex accessionis, & intermissionis tempore
monstrari scribit? Sed quod toto celo aberrant,
parumque recte Gale. sententiam circa hoc, veluti
in aliis, perceperint, ex his quæ dicemus luce clari-
us patebit. Est etenim eius sententia perpetuæ verita-
tis, quod morbi tempora vtile indicare non valent,
aduersus methodicos. quarto meth. med. & libro de
opt. secta. crediderunt, nanque methodici morbo-
rum tempora indicare, hac ratione impulsit, quod
tempora non omnia ad cibi, medicinæve assump-
tionem apta cernebant, cūque temporibus
nonnullis hæc vtiliter exhiberi, nonnullis verò no-
xiè spectarent, id ob temporum discrimina incidere
arbitrabantur. quare ex eodem fonte, & cibi pro-
posita, & remediorum tempora manare putarunt.
Galenus vero priusquam aggrediat citato lib. de
opt. secta. declarare, tempora nihil vnquam cōferens
indicare, quædam de temporum differentiis tractan-
da proponit, inquit quod due temporum diffe-
rentiæ apud medicos celebrantur: aliqua enim mor-
borum, aliqua auxiliorum tempora dicuntur, atque
hinc iam manifesta curatio fiet, causarum autem mo-
tiones, morbi tempora esse dicuntur, motionis au-
tem differentiæ quatuor sunt, initium, crementum,
summus vigor & declinatio, nam si motio quæ prius
non erat, nobis inesse incipit, atque ita diuexat, hu-
iusmodi motum, initium morbi appellamus: si vlti-
mus motus procedat, crementum, si crementum cō-
sistit, summus morbi vigor, seu impetus dicitur, cū
motus imbecillior redditur, atque decrescit, remis-
sio, seu declinatio nominatur. Hæc itaque eadem
sunt & temporum nomina. At auxiliorum tempora
ea quæ ad ipsorum adhibitionem idonea sunt, ap-
pellant. Sunt autē ea idonea, quādo remedium po-
stulandi ad motum, initium morbi verò nullum, neque eo-
rum tempora nomina propria habent, quemadmo-
dum dicta morborum tempora, & quoniam plerū-
que auxiliorum morborumque tempora non re-
pugnant, sed cogitatione tantum differre crediderunt,
aiunt enim auxilij morbiq; tempus simul incidere,
ita vt vtrique tempora simul sint, neque auxilij tem-
pus absque morbi tempore possit deprehendi: pro-
pterea Gal. nonnullis efficacissimis rationibus con-
tra eos pugnavit, ac Hippo. etiam auctoritatibus, ita
vt eodem loco fusissimè demonstrauerit, non sola
cogitatione, sed re ipsa etiam huiusmodi tempora
differre, & quamquam tam morborum, quàm auxi-
liorum tempora, & vniuersalia, & particularia sint,
tamen ea quæ morborum sunt, tam vniuersalia,
quàm particularia, describi possunt, etenim vno eo-
demque instrumento iudicantur, quod sanè instru-
mentum scribi potest, nam vtrique ex quali quadam
causa ratione censentur, eademque habent nomi-
na, cū sint certæ cuiusdam motionis nomina, vt
diximus, ambo tempora tam vniuersalia, quàm par-
ticularia, quare eadem quoque erunt iudicandi in-
strumenta, at auxiliorum tempora nec vllum ha-
bent peculiare nomen, neque eodem instrumento
iudicantur, neque particularium temporum iudica-
toria instrumenta scribi queunt: & propterea eo-
rundem tempora vniuersalia seu generalia scribi

possunt, particularia verò nequaquam, cū non ex
ipsis modo, ex quibus vniuersalia opportuna tēpo-
ra deprehenduntur, sed ex aliis quæ minimè scribi
possunt, reperiantur: ex quorum consideratione
medicus singularium opitulandi temporum conie-
cturam capiet, quemadmodum validissimis ratio-
nibus idem Gal. citato lib. demonstrauit. Sunt ita-
que auxiliorum tempora generalia, quando adfunt
& præsentia sunt, quæ remedia postulant, absuntq;
ea quæ impedire possunt. His sic iactis tanquā qui-
busdam fundamentis, facile quispiam intelliget nū
Galen. sibi pugnantia in hac re conscripserit, vel isti
qui talia effutunt, propter verborum ac eiusdem
Gale. sententiæ obintelligentiam, tanquam cæci in
foveam lapsi sint, nam cū auxiliorum tempora ea
sint idonea, quando adfunt, quæ vtilia, seu conduci-
bilia postulant, absunt verò ea quæ eadem impedi-
re valent, nusquam morborum tempora conduci-
bilia indicabant, cū neque eadem exposculent,
aut exigant. Verū quandoque eisdem conduci-
bilibus vti impediunt, quod verò postulatum sumere
impedit, propositum non erit, inquit Gal. & idcirco
morbi tempora nos interdum postulatum accipere
impedientia, proposita haudquaquam sunt, neque
etiam contraindicare ea quispiam dixerit, cū quæ
impediunt, contraindicare non dicantur, vt superi-
us demonstrauimus: pariter nec coincidare ea di-
cendum erit: nam non sunt veluti causæ, sed signa, &
effectus, ac nomina solum certæ cuiusdam diuersæ
motionis, vel causæ, vel ipsiusmet morbofi affectus,
quapropter & toto celo aberrant, & falso Gale. im-
ponunt, qui credunt eundem fateri morbi tempora
contraindicare, aut coincidare occasionem, seu op-
portunum tempus auxiliorum: quinimò vbique lo-
corum rōtum contrarium sentit, & aduersus metho-
dicos citato lib. de opt. sect. ex diuersis Hippoc. sen-
tentiis, aliisque rationibus illud confirmauit, nedū
de auxiliis ipsis vt quibusdam falso visum est, verū
etiam de victu, probans tempora, neque ciborum
qualitatem, neque quantitatem demonstrare posses,
& propterea nec eorundem temporis occasionem:
de auxiliis quidem Hippocr. dixit: [cū morbi in-
choant, si quid videtur mouendum moue, in summo
verò vigore, quietem agere præstat.] apho. 22.2. lib. 1.
de victu apho. 8.1. lib. dicebat: [vbi morbus in sum-
mo vigore consistit, tum & tenuissimo victu neces-
sario vtendum est.] non enim in hisce sententiis,
quemadmodum Thessalus suspicatus est, à morbi
tēpore auxilia, aut alimenti qualitatem præscripsit,
aut eadē interdixit, sed quia nouerat in morborum
initijs facultatem valentem esse, & propterea reme-
diorum applicationi non obstare, in eorum verò
vigore quodammodo flaccescens remediorum agi-
tationem non sustinere, itaque non ratione tem-
poris, sed virium auxiliorum adhibitionem in vno
tempore admittit, in altero verò denegat Hipp. ita
quoque eundem Thessalum fecellit, cū de victu
verba fecit, non enim tempus propositum faciens
Hipp. hanc victus rationem in summo vigore insti-
tuit citato apho. 8.1. lib. Verū, vt inquit Gale. an
tempore facultatem mensus est, à facultatis mensu-
ra, cibi qualitatem accepit, id verò ex iis quæ subiun-
xit, declarauit, coniectandum enim (inquit) an æger
duraturus sit, &c. & cōmento citati apho. Gal. in-
quit, [non enim distrahere oportet naturam ad al-
teram nouam coctionem, cū eo tempore vniuersa
morborum noxiorum coctioni fortiter vacet, & haudm

Tempora
morborum
nunquam
inducant.

Neque con-
traindicant.
Nec coin-
dicant.

Tempora
morborum
nunquam
inducant.

Tempora
morborum
nunquam
inducant.

ita multo post, ipsos sit euctura. Plerumque itaque tempora, quod a facultate requiruntur, interuertunt, & ne accipiantur, impediunt, nunquam autem quid faciendum sit, edocent. Perpetua igitur veritatis est in Hippo. & Gal. doctrina morborum tempora nunquam indicare aut postulare conducibilia, neque edocere quid faciendum sit; neque etiam coindicare eadem, aut contraindicare, sed quandoque interuerrere ac impedire, adhuc neque etiam quatenus tempora sunt, eadem admittere quandoque

Neque quatenus tempora sunt, utilia admissum.

dicuntur, aut non impedire: quemadmodum quibusdam visum est; impulsus à modo citata Hippocr. sententia aphor. 29.2. lib. non enim morbi initium propositum sibi faciens Hippocr. citato loco, tunc admoventia remedia præcepit, sed ab initio nondum vires infirmas esse significatur, coniuncturque posse eas inanitionem citra noxam ferre, at morbi summus impetus facultatis imbecillitatem manifestat tunc enim causæ valentes sunt, facultas vero lauida, atque ideo quiescere iubet, quæ de re facultatem quoque mensus est Hippocr. ab his duobus temporibus diuersis, principio inquam, & summo vigore: & ob id diuersimodè se habentem inspiciens, in morborum principiis, atque eorumdem vigoribus in principiis vtendum, esse remediis præcepit, in summis verò vigoribus haudquaquam. Non igitur indicant, aut coindicant, neque contraindicant vtile quicquam, nec exigunt conducibilia morbi tempora: quemadmodum neque eadem admittere censens ratione qua tempora sunt cum Hippo. atque Galen. neque quod faciendum sit edocent, licet ne accipiantur quandoque id quod requiritur impediunt, vt ex modo dictis patet, verum requisitis vi-

cap. 14. Gal. falso adhibetur velle cum remediis tempus à 4 morbi temporibus indicari.

aut impediunt, aut permittunt, prout magis aut minus in ipsis facultas mutata est. Cum vero dicuntur lib. 9. meth. idem planè sentit quod illi, quos longa oratione refellit libro de opt. sect. remedium scilicet licet tempus à quatuor morbi temporibus indicari, asserimus falsum esse id quod Galeno imponunt, etenim Gale. non indicari, sed capere remedium occasione seu opportunum tempus ex quatuor febris temporibus falsus est, vtens verbo *καὶ πότε*, quod est accipere, & non *ἐν ποτὶ*, quod est indicare: & propterea morbi tempora haudquaquam indicare admittit: quemadmodum ipsi Galeno ascribunt, neque sibi pugnare videtur, velut falso imaginantur, etsi diuersa quodammodo quibusdam conscribere videatur hoc loco de auxiliorum temporibus, quàm ea quæ scripserat citato lib. de opt. sect.

Loco præcitato.

siquis tamen velit rectè interpretari ea quæ vtrobique scripta reliquit, eadem & non diuersa de auxiliorum temporibus præcepisse intelliget, nam opportuna & vniuersalia auxiliorum tempora, & remedia postulantium præsentia, & potentis impedire absentia deprehenduntur: ita vt ea sint idonea auxiliorum tempora, quando remedium postulantia ad sunt, prohibens verò nullum, quemadmodum citato lib. de optima sect. decretum reliquit, libro verò nono metho. med. cum iam ex febris natura inuestigasset, humectantia ac refrigerantia eiusdem esse remedia, & propterea materias inueniendas esse, quæ huic proposito essent idoneæ: subdebat quod materia inuenta opportunum quoque tempus inuestigare debebat, ipsumque capiendum esse ex quatuor febris temporibus, quæ quidem vt dictum est, nedum in febribus, sed in omnibus morbis ex certa quodam morione causæ morbum efficientis proueniunt, vel

Locus citatus.

si causam non habuerint eadem quatuor tempora, nomina sunt certæ cuiusdam motionis ipsiusmet affectus præter naturam seu morbi. Cum itaque ex quadam diuersa motione causæ faciens febrem, aut ipsiusmet febris, vbi causam non habuerit, vniuersalia eiusdem febris tempora proueniant, non ab re Gal. ex quatuor ipsius febris temporibus capiendâ esse opportunitatē auxiliorum præcepit, nam spectans medicus hæc quatuor febris tempora, tanquam effectus quosdam diuersos à diuersa motione causæ, vel ipsiusmet febris prouenientes, facile percipere poterit quodnam opportunum sit tempus adhibendorum remedium, quæ quidem non ipsa tempora, neque eorum nomina exigunt, sed aut ipsa febris, aut eiusdem causæ, quanquam citato loco de meth. med. de ipsa febre quatenus febris est, verba faciat, quam eodem loco curare intendebat, & non eam quæ causam efficientem adhuc habet; & quid aliud innuere vult, nisi quod habita notitia per ipsa quatuor febris tempora, tanquam per signa, & non causas diuersæ motionis eiusdem, facile medicus percipiet, num ad sint quæ remedia postulant, & ab sint quæ impedire valent, ex quibus idonea auxiliorum tempora deprehendi concluderat, citato lib. de opt. sect. pro diuersa etenim ipsius febris motione vtriusque percipiet medicus: & ea videlicet quæ remedia postulant, quæ est febris ipsa, & ea quæ ipsa non prohibent, vtputa vires ipsas, seu aliud quippiam (meminit autem Gale. solas vires, citato lib. de opt. sect. tanquam præcipuas, quemadmodum mos est Hippocr. vt liquet apud eundem primo de rat. vict. & propterea non sic temerè dammandus de insufficientia, veluti idem iniunioris ausi sunt) ex his denique præfens medicus promouet, & ex consideratione remedium quæ sumi debent, singulariumque optulandi temporum coniecturam capiet, hoc itaque est illud quod intelligere voluit Gal. citato 9. meth. meden. quando dixit, opportunum tempus auxiliorum sumendum esse, ex quatuor febris temporibus, & non quod ipsa quatuor febris tempora indicent opportunum remedium tempus, cum eadem (vt sæpius dictum est) nunquam quid faciendum sit, edocent, sed interuertunt ac impediunt quandoque ea, quæ administanda sunt: quæ etiam ratione adnitimur ex eisdem capi posse opportunum auxiliorum tempus cum non solum capiatur, vt diximus, ex præsentia eius quod postulat, sed etiam ex absentia eius quod prohibere valet: poterunt enim ab vno febris tempore auxilia impediri, ab altero verò nequaquam. Sed dices non erit itaque perpetua veritatis Hippocr. oraculum, contraria contrariorum esse remedia, falsoque asseruisse Gale. 9. & 11. meth. & alibi sæpius, quod ipsius febris, quæ febris est, semper quæ refrigerant & humectant remedia sunt, si eadem quandoque in quibusdam eius temporibus exhiberi nequeant. Atqui asserimus nos semper veritatis esse Hippocr. oraculum, & Galen. sententiam: præsentibus enim remedia postulantibus, hoc est morbis, aut causis, absentibusque eis, à quibus prohiberi possent, semper contraria quæ exigunt adhibenda sunt, definita tamen eorum mensura, seu quantitate, neque erit aliquod tempus importunum eisdem sic seruatis, & ob id Galen. rectè determinauit lib. art. med. tempus, seu temporis occasionem non esse quippiam tertium à qualitate, & quantitate distinctum, nam si quod corpus requirit tale, ac tantum remedium, nihilque impediatur, quocumque tempore

tempore illud adhibueris, erit opportunum, sunt itaque perpetuo contraria contrariorum remedia: exigitque quolibet tempore febris quæ refrigerant, & humectant, ubi absint quæ impedire valent. Sed iterum, quæres, cur ergo Galen. voluit temporis occasionem sumendam esse ex quatuor febris temporibus, ac si voluisset fateri non omnia quatuor februm tempora esse opportuna, pro adhibendis his quæ refrigerant & humectant, sed dicimus primo quod non ob aliud, quàm in vno febris tempore adesse possunt impedimenta, in alio verò nequaquam: vel quod non omnino cuncta quæ refrigerandi & humectandi vim habent in aliquo febris tempore interdiciantur, sed quædam in vno, & quædam in alio tempore exhiberi debeant: nam pro mutationis modo aliis alio tempore eget auxiliis, perpetuo tamen eis vtendum quocunque tempore, verum diuersis in vno, quàm in alio vtendum est auxiliorum materiis, propterea quod quædam, & non omnia impediuntur. Sunt etenim febris, quæ febris est, contraria nedum quæ actu refrigerant, velut est aqua frigida, sed alia plura, quæ partim potestate (vt dictum est) partim ex accidente refrigerant, quorum aliis propter concursum pugnantium inter se indicationum aliàs vtimur, vt inquit Galen. II. method. Quapropter ex eis, quod conducit ante alia semper eligendum. Omni itaque tempore febris, quæ febris est, refrigerantia, & quæ humectant exposulat. Verum non quolibet tempore aqua frigida exhiberi debet: non enim in principio, cum adsint eo tempore quæ eam impediunt, sed reliquis vtendū quæ vel potestate, vel ex accidente, vt lactuca, seu cichorio, clysteri, vel venæ sectione, & ita de aliis temporibus est sentiendū. Sumenda igitur est temporis occasio pro adhibendis auxiliis, à quatuor febris temporibus, non quod in singulis non indigeat eis, quæ refrigerant & humectant, sed quia in vno quædam, in alio verò alia desideret, & opportuna sint, ob eorum præsentiam, vel absentiam, quæ talia impedire, aut non impedire valent. Sunt etenim idonea auxiliorum tempora (vt sæpius dictum est) cum adsunt postulantia, absintque impedire valentia. Quapropter non minis decipiuntur, cum credunt Galen. cibandi tempus per morbos scripsisse ex accessione, & intermissione temporis monstrari, & propterea tempora morborum indicare: nam ea nunquam aliquid vtile, & quippiam esse faciendum edocent, vt paulò ante demonstrauimus, possunt tamen quandoque impedire ea, quæ indicantia desiderant, quæ ratione eadem tempora quandoque spectamus, tanquam impedire valentia, vel tanquam non impediuntia, seu minis impediuntia, & non tanquàm indicantia: ea etenim quæ impediunt nunquam indicantia, coindicantia, aut contraindicantia quispiam esse affirmauerit, vt à Galen. citato lib. de opt. sect. cap. 35. decretum est, & nos sæpius declarauimus: & ob id si quandoque Hipp. & Galen. cibandi tempus ex accessione, & declinationis, seu intermissione tempore capiendum esse iusserint, vt lib. primo aphor. & primo de rat. vict. liquet, & aliis plerisque locis, vt in sequentibus fusius patebit, non tamen vt scopos aliquid vtile indicantes, eadem tempora spectanda esse censuerunt, sed vt prohibentia, vel non prohibentia, cum vnus duntaxat sit tam sanis quàm ægris alimentis scopus, nempe virtutis custodia, vt citato primo de rat. vict. scriptum est. Verum necessariò, vt in-

quit idem Galen. simul & morbi affectio contemplanda est, ita vt cibi offerendi tempus ex morbo etiam non prohibente inueniatur. Si enim morbosam affectionem nullo pacto offenderet alimonia, nos virtuti soli attendentes, ægros vt sanos aleremus, sed quoniam sæpius noxam affert, ob id morbi affectionem, non tanquam cibi indicatricem, sed tanquam prohibetricem contemplamur: ubi ergo non prohibuerit, facultasque præceperit, tunc nutrimus, hæc ille, quæ omnia seriosius in sequentibus nos explicabimus, cum scilicet de victus ratione loquemur. Non igitur indicant opportunum cibandi tempus accessione, seu intermissione temporis, neque eadem indicare vnquam fassus est Galen. licet spectanda sint tanquam prohibentia, vel non prohibentia, pro opportuno tempore adhibendi cibi, quemadmodum etiam in exhibendis auxiliis demonstrauimus.

Methodi medendi febres, quæ febres sunt, compendiosa repetitio.
Capitulum XXXVIIII.



METHODUM quod nedum excellentes ac eruditi, verum etiam vulgares quoque medici methodum hanc condiscant, grauari non debemus iterum atque iterum quem de ea sermonem fecimus breuibus repetere, & veluti sub compendio quodam vniuersam perstringere, vt facile quouis ordinem, ac numerum indicationum omnium, quas asseruimus, ac demonstrauimus necessarias esse pro remediorum inuentione, & curatione februm, quæ febres sunt, memoria teneat. Cum ergo febris ex numero sit eorum quæ præter naturam sunt, atque morborum, propterea prima omnis febris indicatio, veluti à morbo est, oblationem sui præscribens, vt liquet 8. meth. med. cap. I. quicquid enim præter naturam est, eius sublationem suapte natura indicat, quemadmodum quod est secundum naturam: sui conseruationem desiderat. Verum cum hoc priuatorum cuique patere possit, propterea quibus rationibus id fiat, hoc porro est, quod addisci à medico debet, ob id rationalis medicus haudquaquam ignorans quod contrariorum contraria sint remedia, & quod quidque perit à contrario & in contrariū confestim per contraria auferri debere censebit, quapropter febrem ipsam non amplius vt morbum, sed vt talem morbum spectas, quæ ratione non sublationem absolute, sed certam quandam sublationem indicabit, eiusdem certa contraria inueniet. Nam cum febricitantes ex intemperie laborant (est enim febris morbus in intemperie) necesse est sanationem quoque eorum intemperantia depulsionem esse: etenim omnis excessus per contrarium excessum sanatur, vt patet eodem 8. method. med. quare febrilis quoque intemperantia excessus, per contrarium excessum sanabitur, est autem febrilis intemperantia excessus, in caloris abundantia; huic ergo ad temperamentum via erit, per id quod refrigerat, prima nanque omnium curationis indicationū, quæ ex ipso qui curatur morbo accipitur, contrarietatem præcipit: & quoniam morborum plura sunt genera, cuique eorum sua erit contrarietas, inquit Galenus II. meth. med. cap. 7. in tot itaque numero particulares indicationes inducta est indicatio, quæ ab ipsa febre tanquam præter naturam affectu sumitur, ita vt in spe-

1. Indicatio à morbo, quæ in pluribus particulares diducitur.

Loco præter naturam.

ciales magis deduci nequeat. Hæc deinceps particu-
lares morbi indicationes, materias inueniunt, quan-
do illarum principium est id, in quo finita est curan-
di affectus diuifio. Atqui in febre finita est diuifio,
cum eam dixerimus esse calidam intemperiem, si-
mul tamen cum ficitate copulatum, quare nimi-
um per ea quæ refrigerant, & humectant, tanquam
per propria contraria sanabitur. Hæc itaque in di-
ctis quatuor materierum generibus vestigare debet,
tam si effectu, aut potestate, quam etiam si ex acci-
denti refrigerent: indifferentes enim ex his febris
sanatur, suntque ei contraria, tam si separatim
eis, quam coniunctim, vtare: vt eodem II. method.
medic. cap. 5. scriptum est; perpetuoque ea tanquam
contraria febris ipsa pro eius curatione desiderat:
huc ergo tantum eius sanandæ consilium dirigitur,
nempe vt eam refrigeres, & humectes: nam omnis
febris, quæ febris est, humectatio, refrigeratioque
remedia sunt, Galen. auctore 9. metho. med. cap. 4.
At quoniam nos febre, quæ febris est, non in com-
muni homine sanare intendimus, sed in quolibet
particulari, vt Petro, Ioanne, Francisco, & reliquis,
& sanatio aliud non est, quam præsentis in corpore
vitioli affectus in naturalem habitum, seu temperiem
mutatio, propterea ipsa quoque naturalis corporis
temperies, quoad fieri potest, haudquaquam igno-
randa erit, ex hac nanque indicatione sumpta, con-
trarietatis modus seu mensura simul cum eadem fe-
bre definitur, ita vt per ea febris auferatur, seruetur
tamen naturalis corporis temperies, quoniam id
quod ægrotat, ei quod valet est contrarium, vtique
per contraria est ab illo in hoc via. Atqui non satis
est febre tamquam calido affectui admouisse frigida,
nisi id debita mensura fiat, alioqui metus est si intra
modum id fiat, ne morbi reliquum quippiam relin-
quatur, sin modum excedas, contrarium morbi ge-
nus inducas, quod quo minus accidat, naturam, seu
naturalem curandi corporis temperiem scias oportet,
quo tantum febris ab illius symmetria discesse-
rit intelligens, mensuram refrigeranti auxilio im-
pones, id verò fieri non poterit, nisi compertum
habeas quam effectus corpus aut calidum, aut frigi-
dum, aut humidum, aut siccum cum valeret, quan-
tumque ex his accesserit postquam ægrotauit, nam
quod plurimum à naturali habitu, seu temperie re-
cessit, id vehementibus eget contrariis, quod non
plurimum, lenibus; vt itaque certa ac determinata
contraria pro febris curatione adhibeantur, ab ipsa
naturalis corporis temperie necessario sumenda est
indicatio: per hanc enim in contrariis quæ febris
requirit, inuenitur modus seu mensura, ita vt per ea
nec morbi reliquum quippiam relinquatur, nec cō-
trarium morbi genus inducatur, sed ipse vitiolus af-
fectus qui febris est, in naturalem habitum, natura-
lemque temperiem mutetur: id enim eius sanatio
est, & non aliud. Porro cum id quod ægrotat alte-
ramus, nisi constet quousque sit mutandum, vtique
quando sit ab alterando desistendum, non intelli-
gemus, quapropter ad vnguem nosse corporum tē-
peramenta oportet, alias nec febris, nec alterius cu-
iusvis morbi, ritè curatio fiet, id verò planè difficile
est, tentandum tamen erit, ea inuenire tum ex pro-
priis signis, quæ libro de temperamentis, scripta
sunt, tum verò vltra hæc quod magis scientifica no-
titia sit (inquit Galenus nono metho. cap. 15.) ex æ-
tate, & tota antea vita, quæ nimirum in vitæ e-
xercitio, & victus ratione consiluit, præterea in hac

2. Indicatio
ab hominis
temperie,
ex qua plu-
res alie na-
suntur.

regione, & hoc anni tempore, & hoc statu calis, con-
uersione, qua ratione diducto corporis tempera-
mento, in partes plures orientur particulares scopi,
febris curationem indicantes, prout ex pluribus
particularibus tanquam ex causis ortum habere po-
telt, ac tale efficitur; & ob id ætatem, consuetudi-
nem, totamque antea vitam, temperamentum
interueniens, curationis rationem indicare diximus,
atque ex eisdem particulares indicationes sumere,
pro febris curatione oportet, siue maius eas coindi-
cationes appellare. Cum verò morbus, & sanitas
corporis sint affectus, illæ se tollendum, hæc se tuen-
dam indicans, & aer ambiens is sit, quo nec tolli
morbus, nec teneri sanitas potelt, igitur causæ sine
qua non obtinet rationem, & propterea ab eo quo-
que necessario sumenda erit indicatio, tanquam ter-
tio, ac præcipuo scopo pro febrium curatione, nam
absque eo ipsæ tolli nequeunt: reliquis enim ma-
terias tum deligere, tum fugere licet, quam autem
aer ambiens præstat, fugere non licet, imò necesse
est præsentis calis statu vtis; idcirco huic, & non aliis
præsidiorum materiis attentis esse cogimur, ab eoq;
& nō aliis indicatione sumere debemus, nā sapē cū
his quæ febris facienda suadet, est concors, sæpē di-
scors, & qui contra molitur, habebit itaque ambi-
ens nos aer rationem, modò materiæ sanantis, mo-
dò causæ morbum facientis, quippe cum humecta-
ri, refrigerarique febris postulet, si hæc ambiens
præstat, sanantis materiæ rationem obtinebit, ac
pro gratia habendus, sin calefaciat, & siccet, morbi-
ficis causis est annumerandus, ac propterea inhi-
benda eius noxa erit, reliquorum scilicet præsidiorum
humiditate, ac frigiditate intensis, adauctisque: i-
psum verò sedulo agendum est, vt quoad fieri po-
telt, qualem esse expedit, præpares, humidiores vi-
delicet frigidioresque domos tum deligens, tum
præparans. Est itaque hac ratione necessario su-
menda indicatio ab ambiente nos aere, pro febriū
curatione qui cum eiusmodi reddatur, calidus vide-
licet, frigidus, humidus, & siccus, tum propter re-
gionem ipsam, tum anni tempus, tum peculiarem
& præsentem calis statum, propterea & ipse quo-
que in has particulares causas diductus, tot parit
particulares scopos, ex quibus etiam particulares
indicationes capiuntur à quot causis ipse immuta-
tur, ac eiusmodi redditur, ob id ab anni tempore,
regione, & calis statu sumendas esse indicationes
diximus: indicant enim & hæc morborum, ac fe-
brium curationem, seu coindicant, medio aere nos
ambiente, tot igitur sunt tum vniuersales, tum par-
ticulares scopi, à quibus indicationes profisciscun-
tur pro febris curatione, quatenus febris est: quos
omnes, si velis, poteris à Galeno instructus ad tres
iam dictos communes, ac vniuersales scopos, aut
duos, & deinde ad vnum duntaxat communissimum
deducere, vt puta ad contrarietatem, etenim omnes
quos enumerauimus, sub ea continentur ipsaque
est primus, ac communissimus scopus curationis o-
mnium morborum nobis patefacta, ac demonstra-
ta à prima illa omnium curationis indicationum
quæ ex ipso, qui curatur morbo, accipitur:
& plebi etiam communis existit, quæ sanè nul-
la prorsus ipsius artis medicæ adhuc portio est,
aut certè nec magna nec propria. Licebit itaque
hac ratione dicere vnum esse omnium morborum
communem curationis scopum, atque ipsarum fe-
brium, nempe contrarietate ipsam: quæ rursus, diuisa
duos

3. in
dici-
bent
plures
partes

cap. 35. b

vt in
morbis
con-
sideranda
est quomo-
do

Locis ei-
bus

Postquam
dicere
esse scopum
vel duos
aut tres

duos existeret, morbum, scilicet febrem, ex iis, quæ ubi contraria sunt adhibenda remedia indicantem & laborantis temperiem vnâ cum ipso morbo, seu febre (vt diximus contrarietatis mensuram definiti- tem, quæ prima sectione contrarietatis in duo tan- tum facta, in febrem inquam, & laborantis tempe- riem, ambientem ipsum, vel ægritudinis causis, vel sanitatis annumerandum esse fatemur, prout con- cors fuerit, aut discors cum his quæ morbus facien- da suadet. Poterit etiam & aer seorsum ab his duo- bus affectibus spectari, & ita tertius esse præcipuus communisque curationis scopus, tanquam causa si- ne qua non: etenim is est sine quo nec tolli morbus, seu febris, nec teneri sanitas potest. Qua ratione nō in duo tantum capita, sed in tria diuidetur contra- rietas ipsa; in duos videlicet iam dictos affectus contrarios, & in ambientem, sine quo nec vnus tolli, nec alius seruari potest. Hac igitur diuersa ratio- ne, curationis præcipuos scopos, ac communes spe- ctantes, & vnum, duos, & etiam tres, esse fatebi- mur; nec plura scoporum genera esse posse, quæ ad medendum pertineant, quam tria, cum Galeno cen- semus, neque etiam ipsius febris, quæ febris est. Qui- bus rursus in partes diductis, ipsa inquam febre tan- quam morbo, seu præter naturam affectu, in parti- culares eius differentias, vt supra demonstrauimus; corporis verò temperatura, ac ambiēte nos aere, in causas ex quibus tales efficiuntur, tot numero parti- culares scopi sub vnoquoque eorum continetur, par- ticularēsque indicationes, quot narrauimus, conducē- tes omnes ad auxiliorum inuentiones, pro febrium curatione, partim qualitatē partim etiā quantitātē eorum definiētes, aut tanquam causā, sine qua non, curationi deferuientes, quibus inuentis opportu- num quoque tempus inuestigare oportet, quod quidem ex quatuor febris temporibus capiendum esse præcipit Galenus nono methodi medendi, ca- 14. & nos supra demonstrauimus quo modo hanc Galeni sententiam intelligere oporteat, & quod ab ea nō differat, quam de opportuno auxiliorum tem- pore, scriptam reliquit lib. de optima secta, quod videlicet opportuna præsidiorum tempora vniuer- salia, & ex remedia postulantiibus præsentia, & ex potentibus impedire absentia deprehendantur, ad quas etiam auxiliorum inuentiones, videntur vires quoquo modo conducere; licet non semper eodem modo, nec vt à febre liberemur, sed vt viuamus, et- enim & ipsæ nihil vnquam ex earum natura indi- care videntur, præterquam vitæ custodiam: sunt ta- men perpetuo consideratu necessaria in curandis febribus, morbisque aliis, sub eadem ratione, hoc est pro virium custodia, vt propterea eis vtendum sit præsidii pro febrium curatione, ex quibus vires ipsæ, seu ipsarum substantia, nec inaniatur, nec im- modicè alteretur, ita vt corruptioni fiat propinqua, quamuis pro febrium curatione, quatenus febres sunt, hoc est, ubi solæ sint, nec causam habeant, quæ eas vel gignat, vel augeat, vt in veris diariis, vires nul- lam egregiam prouidentiam requirant, vt pote quæ validæ sint, & propterea exiguum est quod à viribus consilij petitur, vt citato nono, & vndecimo de method. medend. scriptum est, oportet tamen eam quæ à viribus sumitur indicationem, tum in reli- quis morbis omnibus, tum in diariis febribus sem- per adhiberi, vt patet in calce octauæ method. me- dend. de quibus satis visum est primum sermonē facere, vt pote simplicem primam curationis indi-

cationem habentibus, nam quæ causa eas accendit, iam abiit, si quæ verò earum sit, cuius causa adhuc adsit, quamuis verè diaria non sit, vt quæ ex stipa- tione oritur, de hac sermo in sequentibus fiet. Nūc verò satis sit nouisse numerum & ordinem scoporū, ac indicationum vniuersalium, & particularium fe- bris, quæ febris est, curationem indicantium, & qua ratione pauci & plures esse possint, ac etiam vnus.

Febrium hecticarum medendi methodus.

Caput XXXIX.



VAMVIS dissideant inter se he- cticæ febres, & diariæ, quoniam diariæ in leui ac facili (vt sic dicam) affectu ca- lorem habent, eos enim affectus qui facile discutiuntur in *σφοδρὰς* Græcè vo- cant, hecticæ verò in habitu quæ agrè soluantur in *εἰς* Græci dicunt, & propterea quæ facile discutiuntur febres scheticas, quæ agrè, hecticas vocant, diluci- dioris doctrinæ gratia; vt liquet octauo in eth. med. cap. 1. differant in super quæ diariæ, potissimum exqui- sitæ nunquam ad tertium vsque diem protelantur, nisi quid delictum circa laborantem sit, at hecticæ sæpius pluribus diebus vrgent, præsertim ubi fue- rint marasmodi, illud tamen commune cum dia- riis habent hecticæ febres, quod videlicet non am- plius fiant, nec vllam intus habent causam, quæ eas accendat, aut excite: & propterea harum febrium, diariarum videlicet & hecticarum vera & propria curatio est, Gale. auctore, 11. de method. med. cap. 2. Conueniunt ergo in hac febrium differentia, quod vtraque excitata, earum causam desit, nec amplius adest eas generans, aut augens: ob id hecticarum fe- brium medendi methodum tradere institui, prius- quàm de eis, quæ ex putredine ortum habent, ser- monem faciam. Est etenim in eis, perinde ac in dia- riis, simplex quidam præter naturam in corpore af- fectus, simplicem quoque curationis indicationem propterea habens, cum amplius hecticæ febres non fiant, sed factæ iam sint. Quamobrem totius cura- tionis earum caput, in iis mediis, quæ refrigerent, & humectent, statuere oportet, Galeno auctore. 10. de met. med. ca. 10. Verum quoniā refrigeratio per efficacissimam qualitatem inducitur, & parui tem- poris est, & periculosa, contrā siccitatis per ea quæ humectant curatio, vt longi temporis est opus, ita minus est quàm refrigeratio periculo exposita, vt ci- tato loco Galenus ait, hanc ob causam audaciores minus esse debemus, in refrigerando, quàm in hu- mectando febres istas, præsertim cum pusillæ, & æ- quales sint, vt declarauimus; ita vt periculum immi- neat, si animosè infrigides, aut vt contrarium genus morbi inducas, aut vt ipsemet corporis calor, aut etiā determinatæ partis extingatur, id quod suspi- candum haudquaquam erit, si quodammodo im- modicè humectes, quamuis vtriusque moderatè vt- tendum sit, adeo vt febris curetur, seruetur autem corporis, aut partis naturalis temperies. Ideoque Gale. nono meth. ca. 5. dicebat, quod minus tuta iis qui exiguum sanguinem, carnemque obtinent, frigida potio est, eo etiam fit, vt hecticæ febres nec perin- de eam, quæ prorsus sit frigida, nec multam deside- rant: ceu quæ extenuatis omnino, exiguique san- guinis corporibus incidunt, minus itaque refrige- rantibus, quàm his quæ humectant, vtendum est, pro harum febrium curatione, licet, vt diximus, v- traque desideret, quatenus febres sunt, & propterea maximū huius feb. remediū est victus humect. vt in-

Diaria & hectica quo modo disse- runt.

Quid com- mune ha- bent.

Hectica curatur re- frigeranti- bus, & hu- meclanti- bus.

*Materia
refrigerans
& humectans
duplex.*

quit Paulus cap. 32. secundi libri. Quamuis prima materia idonea harum rerum quæ refrigerant & humectant, pro hæcticarum febrium curatione duplex genere sit, ut inquit Galenus, citato 10. metho. med. cap. 7. Vna eorum quæ foris admoventur, seu extrinsecus incidunt, altera eorum quæ intro in corpus sumuntur, prætermittit autem reliqua duo genera materierum præfidiarum, tanquam minus necessaria, etenim in faciendorum, & educendorum genere pauca omnino præfidia, & non adeo prima, atque non admodum conducentia pro hæcticarum febrium curatione reperiuntur; ut satius est videre in iis, quæ sub ipsis generibus continentur, & hac ratione dicebat Galenus, quod prima materia idonea, & præcipua continebatur in duplici iam dicto genere, & non omnis, non negans quod in reliquis duobus materierum generibus, possit quoque quædam præfidiarum materia idonea, pro harum febrium curatione reperi, attamen non adeo idonea, conducibilis, & præcipua, quemadmodum sunt quæ in duobus generibus ab eodem nominatis materiæ continentur. Particulatim autem sunt in his quæ extrinsecus occurrunt, tum aer qui nos ambit, tum pharmaca quæcunque humectandi, & refrigerandi vim obtinent, intelligas tu, quæ de foris applicantur, & tertium est præter hæc dulcis aquæ balneum. In genere verò eorum quæ intro in corpus sumuntur, seu adhibentur, sunt quæ eduntur, bibuntur, & inspiratus aer. Ab his itaque tentandum est propositis hoc loco febribus tum humiditatem, tum frigiditatem comparare: quamuis eorum quædam magis in quibusdam febribus hæcticis conferant, quædam verò minus, præterea nec æqualem semper frigiditatem habere debent, sed interim magis, quandoque verò minus frigida admittenda sunt, quædam autem communiter omnibus conferunt.

*Aeris frigiditas pro
diuersa parte,
quæ in
hæctica pri-
mum affli-
gitur.*

Etenim ambiens, ubi temperatus sit, hoc est, nec admodum calidus, nec admodum frigidus, qualem se exhibet, utiq; tali nobis est vtendum, nihil amplius de eo sollicitus, in his videlicet hæcticis, quibus primum, quod afficitur, non est ipsum cor, sed aut ventriculus, aut iecur, ob quæ quidem viscera, magna ex parte hæcticas, marasmodiq; febres accidere contemplati sumus, inquit Galenus, eodem 10. meth. med. ca. 8. licet etiam quandoque aliis affectis visceribus superueniant, ut liquet ibidem, & nos supra declarauimus. Nam ex inspirato aëre, iocinori nulla certè utilitas accedit, minima etiam & ventriculo. At ubi primum quod afficitur, sit ipsum cor, nedum modicè frigidus, sed & frigidissimus admittendus erit, quatenus præsertim respirando attrahitur, ut qui calorem qui in corde existit, admodum refrigeret, siquidem per pulmonem quod rarum viscus est, difficile non est, ut tum qualitas ipsius, tum etiam substantia ad cor facile perueniat: quamuis quatenus extrinsecus ægrum contingit, quodammodo lædat, quippe cum cogat, densetq; cutim, ac putredinosorum humorum effluxum transpirare prohibeat, fieri etiam nequit, ut transpirati per cutem aeris vel qualitas, vel substantia ad cor perueniat, atq; nosse licet maius fore ex frigida inspiratione commodum, quam ex cute densanda incommodum, præsertim cum hanc operimètis cal facere liceat. Ab ipso corde, pulmones ubi ij sunt, qui primò afficiuntur, plus cæteris omnibus refrigerantem aërem requirunt, eodem Gal. auctore citato loco, ubi verò ventriculus primum fuerit affli-

ctus, ipsi magis per comesta & ebibita esset succutendum: huic enim illa cum integris adhuc viribus occurrunt, sicut cordi inspiratus aer. At iocinori, ut dictum est, ex inspirato aëre, nulla certè utilitas accedit, à comestis verò & ebibitis, minor planè quam ventriculo, cæterum aliqua non obscurè aduenit. Confert itaque magis alteratus aer, ac præcipuè utilis est cordi primum affecto, quæadmodum ubi ventriculus aut iecur primum afficiatur, cibis & potus magis viles sint: quamuis & in his quoque febribus hæcticis, ac reliquis omnibus, non parum etiam cōferat aer: quandoquidem in his quoque necessum est cor similem suscipere intemperiem, citra quam, nec marasmus, nec hæctica, nec reliquarum febrium vlla consistere potest, ut ibidem patet. Communis autem omnium hæcticarum febrium sanatio, per ea est quæ forinsecus applicata, refrigerant & humectant: quanquam horum quoq; ea deligenda sunt, quæ citra vehementem adfrictionem refrigerant: talia etenim præterquam quod non humectant, etiam dimittere frigiditatem suam alè nno valent, propterea quod curim cogunt & coarctant: & ob id optima sunt quæ non modo citra adfrictionem refrigerant, sed etiam tenui sunt corporis substantia, ut citato loco scriptum est. Porro vtendum iis quoq; est, non sicut vulgus medicorum facit toti impositis thoraci, aut toti ventri, imò illi maxime quod primò est affectum: neq; enim necessum est (inquit Galenus) ut aut cum eo quod refrigerari valenter desiderat, etiam id refrigeres, quod protus non desiderat, aut ante iustum tempus refrigerare desistas, timens vicinam aliquam particulam lædi. Semper autem studendum ne strenuè refrigerantibus, sed his quæ modicè id efficiant, vtare: præsertim ubi cordi ea adhibueris, eo potissimum non primò affecto, requirit namq; hoc viscus semper in omni hæctica febre præter inspiratum aërem, ea quæ refrigerant & humectant, cum perpetuò ipsum in qualibet earum afficiatur, non tamen immodicè frigida desiderat, cum sit fons & principium calidi innati, præcipuè ubi ipsum, ut diximus, non fuerit primò affectum. Sunt verò quædam remedia, quæ non vnam duntaxat facultatem habent, vpote q actu aut potestate refrigerant, seu ex accidenti, sed complicatam quodammodo, duplicemq; ita ut & prima ratione, & ex accidenti proficiant, in quo genere & balneum est aquæ dulcis temperatum, ut liquet citato 10. meth. med. cap. 10. eo itaque in qualibet febre hæctica tuto vtare. Insuper & reliquas omnes indicationes, quas paulò ante meminimus, inspicere oportet, quò oportuè eisdem vtaris medicamentis, ac mensuram non excedas, ubi verò sic citati coniuncta fuerit febris hæctica, hoc est marasmus effecta, quæcunque fuerit substantia solidarum partium exsiccata, singulas quoque similarum partium propria humiditate, humectantis nutrimenti ope repleas oportet. Eadem enim victus ratio genere est, in singulis nedum tribus siccitatibus partium solidarum, sed etiam in quarta, quæ in propriis cuiusque particulæ exilibus arteriis, venisque consistit, ac ex sanguinis penuria provenit, licet ea omnium sanatu facilima sit, ut pater septimo de met. med. frigiditatis tamen respectus in hac siccitate exuperat, siccitas verò secundum locum obtinet, ut ibidem liquet.

*Continuum absque putredine febri in dignationis,
& generationis modus, ac curationis via.*

Capit

Caput XL.

QUOD Vnde prae diarium febrium genus, duo, veluti ostendimus, reliqua sunt febrium genera, alterum quod iam solidas animalis particulas occupat, & heciticum nominant; alterum quod ex humorum putredine nascitur, ac transeant sapē in vtrunque genus eadem diariae febres, nisi quis eas commode tractet; veluti in ceteris rebus omnibus quaecunque vno genere comprehensa, societatem in naturis habent, ac propterea mutuo in se transire valent, tertia quaedam formula in transitu ipsarum existit, quae neutrius extremitatum formam planē exhibet, ita nimirum & in diarium febrium transitu imaginis oportet, alterum quoddam genus in transitu exoriri, quod neutri extremitatum sit idem, de quo prius differendum esse mihi videtur, quam de iis febribus, quae ex humorum putredine oriuntur, nam licet medium quodammodo esse videatur hoc febrium genus, maiorem tamen, ut dicemus, cum diariis, quam cum his, quae ex putredine nascuntur, cognationem habet; quamvis cum ambobus generibus communia quaedam habere videatur, ut in sequentibus patebit, opus nanque est sicut reliqua febrium genera, etiam ipsum, tum prorsus noscatur cum incidit, tum sic inhibeatur in primo ortu, ne aut agere sanabile, aut insanabile postquam auctum est, euadat: & ne nostra methodus imperfecta quoque reddatur. Appellamus autem has febres *contingentes*, id est continentes, non illi quidem graeco nomine vsi, sed solae cismum committendum potius rati, quam formam ipsam sine nomine linquendum: siquidem in his febribus vna accessio ab initio ad finem perpetuo manens, in multis dies porrigitur. Sed dices, aliud ergo praeter tria iam dicta genus esse in prima febrium diuisione dicendum erit, nisi esset quod appellatione pro nihilo habita, diarias ipsas nominare etiam oportebit, ut Gal. inquit, nono de meth. med. cap. 1. neque enim profecto de substantia ipsa saluum febrium est diariae vocabulum, verum conuenienti nomine destituti clarioris simul, breuiorisque doctrinae gratia, ab eo quod saepius eis accidit, nomen inditum est: saepius autem diarias accidit, ut non vltra vnum diem porrigantur, quae de re licet continentium febrium accessio, vltra vnum diem porrigatur, & vsque ad tertium vel quartum, & quantum quandoque extendatur, non propterea diaria non erit nuncupanda, cum eadem sit earum natura quae & diarium; licet nomen sit diuersum, neque enim in eis humor putrescens subest, neque corpus ipsum febrilem calorem ut habitum suscepit, quare ab his duobus generibus diuersum erit: continebitur autem sub diarium genere hoc genus febrium, cum eadem vtrisque sit natura, habent enim vnam à principio ad finem vsque accessiōem, & citra putredinem, quae admodum diariae ipsae, licet ad plures dies porrigantur, & propterea ab eis quodammodo dissentire videantur, ita ut non exquisitē hac ratione, & verē diariae dici possint, quae etiam ratione, & quod earum effectrix causa adhuc adsit, cum his quae ex putredine oriuntur, quodammodo conuenire videntur: & ob id nos post heciticās febres, de iis differendum esse censuimus, & priusquam de febribus ex putredine ortis sermo fiat, sunt tamen diariae, licet effectrix earum causa adsit: est nanque vna particularis diarium differentia, quando causa etiam adest, ut liquet 10. method. med. end. cap. 1. licet non verē, & exquisitē

si diariae dici possint. Verum quoniam non sicuti idonea vna eiusmodi febrium est, à qua Synochos eas nominant, ita & natura simplex vnaque est, nam quaedam earum manifestam habent putredinis notam, quaedam prorsus non habent, propterea eas duntaxat ex diarium febrium genere esse diximus, atque de eis modò differere intendimus, quae nullam prorsus putredinis habent notam: reliquas vero nunc praetermittimus, cum vnum duntaxat commune cum diariis habeant; duo vero, cum iis quae ex putredine sunt ortae: & propterea sub earum & non diarium genere continetur, substantia etenim earum totaq; natura ex eo genere febrium est, quae ex putredine nascuntur, ut liquet 11. meth. med. cap. 4. Quapropter simul cum eisdem earum curationem tractabimus. Porro quae putredine vacantes continent febres, & in diarium febrium transitu generantur, ut dictum est, non ex quavis diaria ex quacunque causa orta generari eas contingit, neque in omnibus corporibus, sed vbi diarium febrium occasio stipatio duntaxat fuerit; haec autem vel obstructis exilibus meatibus, vel conuenientibus, vel & corpore ipso immoderatus densato accidit, Galeni auctoritate, citato nono meth. med. cap. 1. verum si propter ipsorum corporum densationem, aut exiguum meatuum conuenientiam diariae febres oriuntur, has & desistere post primam accessiōem (si quis recte eas tractet) & verē diarias tum esse, tum appellari, inquit Galenus citato loco. Vbi verò ex obstructione creantur, si haec pusilla sit, solui ipsas quoque ut alias diarias, si quis eas legitime sanet, sin vero valenter impacti humores sint, sic ut valentius aliquid, quod eos eximat, desiderent, eas febres porrigi vltra vnum diem necesse est, & diarium febrium genus videri egressas, ex quibus liquet non ad quaecunque diarias febres ex stipatione ortas continentem febrem sine putredine insequi, quia ex conuenientia meatuum, aut corporum densatione ab externis causis, si stipatio fiat, eadem generari non consuevit, praeterum si non adsit abundantia, sed ad eas quarum stipulationis causa obstructio exilit, eademque magna consequitur, aut exilis, sed non recte curata est, nanque eiusmodi febribus quae ex obstructione gignitur (quantum ex ipsa est) earum quae plures dies infestat, & quae diariae sunt, communis est. Ceterum propter causae paruitatem, vnius diei efficitur, sicut etiam propter magnitudinem, multorum interim dierum. Verum accessio eius ab initio ad exitum vsque vna est, modò ne ipsam excipiat ea, quae ex putredine humorum nascitur, ut lib. 10. eiusdem operis à Galeno scriptum est. Quod verò neque eiusmodi febris indifferenter in omnibus corporibus consistere soleat, ab eodem Gal. citato 9. meth. med. cap. 3. scriptum est: ait enim quod in gracili & frigido corpore eadem fieri non consuevit, quemadmodum nec ea quae cum putredine existit, sed plurimum in iis qui sanguine abundant, & corpulentis gignitur, quando nec obstructio citra putredinem excitare febrem valet, nisi id quod transpirat, hoc est transpirare solet, vel quod attollitur ut transpiraret, copiosum sit, & calidum: ita enim Gale. verba interpretanda sunt, alias paucis in verbis sibi ipsi pugnaret: dixerat enim paulo ante, quod à feruētibus humoribus vapor attollitur plurimus; effluit autē foras exiguus, tunc febris haec generatur; eoque fit ut nec in frigida aetate, nec in frigido corporis temperamento, siue id ab initio constitit, siue, modo

Que notam
putred. nul
lam habet.

Continen
tes sine pu
tredine nō
ex quavis
diaria oriū
tur.

Continen
tes sine pu
tredine nō
quavis cor
pora inua
dis.

frigidum sit factum, cōtinens excitetur febris, neq; etiam in gracilibus, vel qui raro sunt corporis habitus; imò tū aetate, tum natura, tum acquisitio temperamento quæ calida sint, & præcipue si & carnosus, & bono, ac multo sanguine affluens, & denso corpore æger sit, aut etiam calidis excrementis repletus. Proinde fit vt qui ita febricitant, iis & pulsus maximus sit, æqualis, & vehemens, quibus etiam arteriarum consilientia nec durior quàm pro natura est, nec mollior, celeritatis tamen frequentia quæ eo peruenit, quo febris ipsa magnitudinis: caloris autem qualitas, vt quæ minimè tactum mordeat existit, vrinæ verò tum crassitudine, tum colore à naturali habitu non multum alienæ, ita vt nec in pulsu, nec in calore, nec lorio putredinis aliqua adhuc animaduertatur nota: vbi etenim cum iam dictis signis putredinis aliqua nota aduerteretur, alteram indicarent continem febre, quæ cum putredine existit.

Diagnos continens feb. ex pulsu, caloris qualitate, vrinæ.

Causa feb. continens.

putredinem ob calidi sanguinis copiam nondum putrefacti, & eo quod non transpirat feruore solum caliditate excitantis, quæ admodum noui vini solet in dolliis, Aet. teste cap. 70. 5. lib. multorumque dierum sit vna earum accessio ad finem vsque; nā cum accessiois remissio ex feruentium humorum transpiratu contingere soleat, non transpirant autem in vehemēti stipatione quæ per obstructionem fit in hac febre, nullaque in ea subest occasio, quæ alterius accessiois initium excitet. Cæterum non adeo vehementer stipata corpora sunt in hoc febrili genere, vt nullum ex eis humoribus qui tenuati admodum sint, effluere foras sinat, cum nec, si de ossibus ita dixeris, id verum sit, nedum de carne & cute, verum cū a feruentibus humoribus vapor attollatur plurimus, effluat autem foras exiguus, vt dictum est, hunc qui relictus est, febrem seruare oportet, neque id modo propterea quod ipse manet, sed etiam propterea quod quæ proxima sunt adurit. Cum verò ex duobus his seruari possit febris, & quod totus vapor non transpiret, & quod idem vapor ea quæ cōtingit etiam excalfaciat, aduraturque, necesse est (inquit Gale. citato loco) tres esse in synochis febribus differentias, nempe vel pari permanente ea magnitudine, quam in principio accessiois summam habuit; vel semper aliquid exigui adiciēte, vel diminūte, atque hæc vel æqualiter, vel inæqualiter faciente, si enim quod accenditur, ei quod transpirat par fuerit, nec augeri, nec minui febrilis calor videtur, sed perinde sibi similis permanebit, ac si nihil illi adiceretur, aut demeretur: quippe cū ad æqualitatis custodiā nihil intersit, ferueturne eadē assidue substantia, an ei quæ vacuatur, par sit ea quæ adicitur. Verū si altera earum vicerit, vtiq; si ea quæ euacuatur, minui febrem necesse est, sin quæ adicitur, omnino incrementum. Appellant autem Græci primas illas *ακυσινιάς* vel *ἰσχυράς*, alias *παρὰ πύμας* *ινιάς*, reliquas verò *ἰσχυράς* *ινιάς*. Tres igitur sunt continentiū absque putredine febrium differentia, quæ ex stipatis per obstructionem meatibus oriuntur, ac ex diarium genere existunt, ac cum obstructio incidat, vel propter crassos, vel glutinosos, vel copiosos succos (vt liquet 8.9. & xi. meth. med.) quando corpus inhabile ad transpirationem redditur, ex succorum abundantia, tales consueverunt febres generari, ac in iis qui sanguine abundant, & corpulentis plurimum, vt modo diximus, ac cum eodem Gale. conclusimus; & non vbi ex humorum crassitie seu te-

Cap. 2. & cap. 1. & cap. 4.

Continens feb. citra

nacitate obstructio fiat, ac in corporibus gracilibus & frigidis, aetate, natura & temperamento, quando vt idem Gal. inquit, neque ipsa obstructio citra putredinem exsiccare febrem valet, nisi id quod transpirat, & copiosum sit, & calidum: neque etiam ex quauis succorum; seu sanguinis redundantia tales procreantur febres, eodem Gal. teste citato 9. meth. med. quoniam non ex ea quæ ad virtutem comparatur, sed ex ea quæ contineri à vasis vltra non valet, quæq; ob id ipsum tum perumpere eadem vasa, tum recludere solet; inducitq; obstructionem, distentionem, tuborem, ac tumorem: siquidem copia hæc dum bonitatem suam seruat, vt pariter augeri cum robore virium est nata, ita si quando has grauat, nec de cætero augebitur, & bonitatem naturæ amittet, ea verò quæ ad virtutem comparatur abundantia, nec sic obstruit ora venarum, vt refrigerationem prohibeat, nec earum tunicas distendit, nec ruborem, nec tumorem inuehit, multoque minus vel carnis, vel cutis transpirationem moratur, vt citato loco scriptum est. Fit itaque continens febris absque putredine exsiliatis per obstructionem meatibus à succorum abundantia, ad vasa, & non ad vires comparata, vt abundè demonstrauimus, quamuis interdum crassitudo etiam cum abundantia copulari possit, vt sentit Aetius citato loco, qua de re eis vtendum erit auxiliis pro eius curatione, quibus abundantia vacuetur, obstructio eximatur, & febris feruor deferueat, ac cōfestim, priusquam humores putrescant, ex eiusdem Gal. præcepto citato 9. meth. cap. 5. non enim simplicem omnino curationis indicationem habent, velut reliquæ exquisitæ febres diariæ, cum earum effectrix causa adhuc addit: quamuis x. eiusdem operis libro cap. 2. aliter sentire videatur: ait enim quod quæ febris ex sola obstructione citra putredinem ortum habet, vtiq; ipsius obstructionis solutio, eius est sanatio, & loquitur Galenus de hac febre, nisi esset quod post pauca subdidit. Iam verò ipsarum obstructionum, alia est quæ ex abundantia, alia quæ ex qualitate succorum, scilicet qui aut lentius aut crassius sunt, incidit: præferetur autem inter remedia in ea quam copia facit, sanguinis missio, hæc nanque sanguinis missio infimul ambos curat affectus, abundantiam scilicet, cui potissimum opponitur, ac obstructionem ex ea ortam. Quapropter idem erit dicere, quod vti debeamus auxiliis quibus abundantia vacuetur, & obstructio eximatur, ac fateri quod obstructio quam copia gignit, auferri debeat: at non alio aufertur auxilio, quàm venæ sectione, quia etiam necessario abundantia exhaurietur, insuper & febris feruor remittitur, cum ex accidenti infrigidet, vt dictum est. Cum itaque omnibus quæ requirit hoc genus febrili pro eius curatione abundè satisfaciatur vnum præsidium, quod est venæ sectio: licet cum hac febre plures complacentur affectus, vt pote abundantia, & obstructio quæ pariter eandem desiderant, iure ad detrahendum sanguinem festinare oportet: siquidem, vt Gal. inquit, eorum qui ex sola obstructione febricitant, nemo in putredinis febrem incidit, cui prius sanguis missus fuerit, quem vbi valida virtus fuerit, & ætas permiserit, vsque ad animi defectum mittere expedit, vbi horum alterū non satis respondeat, tutius est quantū satis visum fuerit, tantū principio detrahere, quod defuit, iteratione supplere, quando quibus corpus ex succorum abundantia inhabile ad transpirationem iam redditum, tantū caloris congestis, vt inde

*putredinis
redundantia
Loco citato*

*ut in
genu mis
sione
tempor
ad a
m deli
quod edu
cit.*

Ter. 50.

*Continens
duplex
febr. continens
nisi missio
curatur*

*potius
poteat
condit
bus ej
dne.*

inde iam febricitet, iis, tantum sanguinis est detrahendum, quantum vires tolerant, hanc ille: & libro de curan. ratio. cap. 12. per venæ sect. inquit: ceterum ubi feruescentis inest sanguinis plenitudo, acutissimam accendens febrem; subito ac simul euacuare expedit, eamque inanire tentandum vel ad animi deliquium vsque; virium modo inspecto robore. Atqui nos totius esse censemus tantum principio sanguinem detrahere, quantum satis visum fuerit, nec vsq; ad animi defectum ipsum mittere, & quod defuit in prima sectione, iteratione quam primum poterit, supplere, etenim satis admodum periculosam esse talem venæ sectionem fateamur, tum quoniam sæpius contingit, quod alterum non satis respondeat, utpote virtus aut ætas, tum etiam quod ex tali & tanta venæ sectione non tantum merito sequetur incommodi, nisi opportuno tempore, aut debita mensura fieret, ut ipsemet Galen. testatur eodem lib. duos nanque ipse vidit in medicorum manibus perisse, multi autem, licet non protinus, at postea propter virtutis imbecillitatem perire, aliosque non paucos inscepit, in graues ac longos, exitiales morbos incidisse ex tali vacuatione, ut ipse refert, quia igitur valde periculosa est talis venæ sectio vsque ad animi defectum, (licet ubi ritè administretur; tot sequantur commoda, quot Galen. narrat, sitque maximum continentis febris remedium, ubi valentes vires sint) ab ea tamen abstinendum esse consulo, ac quantum in prima detractione defuit, pro abundantia vacuatione, confestim repetitione suppleatur: id enim tutius est, & ab eodem præcipitur Galei: ubi alterum non satis respondeat, quod quidem sæpius contingit, at in hoc te exercetio (inquit Hippoc. 1. de morbis vulg.) morbis ut profus, aut saltem nequid lædas; adhibenda est itaque hac ratione his corporibus quæ ita laborant, venæ sectio, nam si id non adhibeatur præsidium, timor est ne suffocentur, vel certè syncope præhendantur, & omnino periclitentur, nisi eos vel virium robur, vel plurimus sudor, vel largum sanguinis profluvium à morte vindicet, eodem Galen. auctore, atque à principio statim, aut quam primum poteris, non numero dierum, sed vni virium robori attentus, in huius generis febrilibus, venam secabis. Attendenda vero cum venæ secanda scopis nonnulla sunt, tum quæ præcedunt, tum etiam quæ consequuntur, ut si præcedat ciborum cruditas, aut necessario vacuatio quædam sequetur: nam in illa tantum differre venæ sectionem oportet, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendant, videbitur, in reliqua tantum illi de eo quod superfluum est relinquendum, quantum est per eam vacuandum, nec minus & alia quædam attendenda sunt, ut natura, seu naturalis habitus ægrotantis, ætas, & cæli status, sub quo regio, & anni tempus comprehenditur, nam quædam eorum sanguinem interdum detrahere coincidunt, quædam vero quandoque refragantur, quando eadem venæ sectio pro vacuatione omnino suscipitur, ut patet eodem 9. meth. med. cap. 5. quæ etiam fusiùs in sequentibus recensuimus. Quod si curare infirmum aliquando cogis, cui non solum antea secanda venæ remedium prætermisum est, sed nunc quoque vel per medicorum ignorantiam, vel ipsius laborantis, propinquorumve eius timiditatem procedente tempore mittere sanguinem prohiberis, ad frigidam exhibendam accedes, inquit Galen. citato

loco, prius tamen diligenter discernens, quantum ex ea nocuementum contingere possit, nam si id aut exiguum, aut nullum sit, offerenda potui est, quæ prorsus sit gelida, quantum bibere ægro liber, magisque id audebis si frigida potioni infuerit, hanc verò quantitatem determinavit idem Gal. 1. de ratio. victus, licet quibusdam variis in hoc esse videatur, dicebat enim; [potio autem frigida tanta sit, quantum frigida aqua æger inspirando haurire possit.] id enim est quod dixerat in libris meth. meden. inquit ipse, valida existente febre, ac constante virtute: quantum igitur ægro bibere libeat vna tamè inspiratione, tanta potio aquæ est offerenda, quæ prorsus sit gelida, ita quod non plus, minus autem quantum libeat ægro, at si magnum timetur incommodum, ab hac quidem abstinentum, atq; aliis auxiliis quibus obstructio eximatur, & abundantia vacuetur, & febris feruor deferueat, utendum, eiusdem Gal. auctoritate. Cum ergo concoctionis humorum in eiusmodi febricitantibus notas inspexeris, audacter frigidam dabis, quod si etiam frigidam affuerit æger sit, magna cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa scilicet experientia iam doctus, omnia viscera eius occursum familiariter tolerare: ex hac nanque tempestiue exhibitâ, solidarum animalis partium natura roborata, præparatos iam humores aggreditur, ita ut qui viles sint atque ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat: inutiles verò, vel per ventrem, vel per cutim eiiciat, accedit ad hæc ipsa caloris copia, hic nanque cum in vasorum sinibus plurimus contineatur, utpote tum aërea in his corporibus substantia, tum etiam succis omnibus inflammatis, quantum ab frigido patitur refrigeratus, tantum rursum calefaciendo in ipsum agit, sunt tamen incommoda quæ frigidam potionem intempestiue, immo dicque exhibitam sequuntur, non pauca, nec contemnenda, quæ magnopere animaduertere oportet, nam ubi eadem timerentur, ab hac omnino abstinere necessum esset, ac ad alia, ut diximus, conuertere remedia: viscosos etenim ac crassos humores attenuari, ac transpirari frigida impedit. Quare ubi obstructiones; aut quemuis præter naturam tumorem in visceribus creauerint, eam exhibere non conuenit, neque etiam eis quibus debile aliquid viscus fuerit ex quavis causa, ut stomachus, seu gula, ventriculus, aut eius os, aut iecur, aut pilmo, septum transversum, colon, renes, viscera, aut tale quippiam aliud fuerit inflammatum. Quidam ex eius intempestiua immodicâq; potione non multo interposito tempore, sed illico in aquam intercutem, aut spiradi difficultatem, aut conuulsionem, aut tremorem inciderunt, aut etiam alto sopore lethargo, aut aurium abcessu correpti fuere, & ut summatim dicam omne nervorum genus, ac caput etiâ offendit, præsertim quibus non consuevit. Quare cauenda quoque est frigida potio, ubi hæc eadè fuerint imbecilla, ubi autem hæc non affuerint, tutè ea vtare seruatis tamen prius quæ diximus: etenim maxima continentium febrim remedia, hæc duo sunt, inquit Galen. eodem 9. method. venæ inquam sectio, & potio frigida: verum illa nullo nō tempore modo vires subsistant, hæc cum & in pulsu, & in vrinis concoctionis evidentes cernuntur notæ, febris autem est maxima; & ne quippiam desit pro harum febrim curatione; placuit alia quædam particulatim addere; ne iterum cogar de eius curatione verba facere: sunt autem hæc: cōfideret eos tertio aut quarto die lauabis

Super text.
43.

Frigida in
tempestiua
potum quæ
sequuntur
incommoda

incommoda
super text.

Balneum
dulcis a-
qua, & pi-
sana succus

Cibi modus in dulcis aqua balneo, pitisanæque succo, ac eo modo cibo cibabis usque ad tertium vel quartum diem, robustis existentibus viribus, quo tempore finiri morbum expectatur; uti itaque tenuissimo victu propterea oportet. At ubi vires ægræ sunt, non licebit tenui hoc victu uti citra magnum detrimentum, sed alimentis tantum apponendum est, quantum roboris viribus detractum est, ut inquit Aetius cap. 37. 5. lib. tempus verò, ut ipse refert eodem loco, & Gal. præcipit 11. meth. exhibendi cibi in febribus continentibus omnibus est, bona ægri tolerantia, & consuetudo, quando cibus eo tempore est offerendus, quò facilius quam in cæteris morbum tolerant ægri, eoque potissimum diei tempore, quo prius in sanitate cibari erant sueti, etenim facillime cibum ferent, si ex his considerationibus assument; de hoc verò fufius in sequentibus pertractabimus.

Febrim ex putredine ortarum curatio methodus.

Caput XLII.

RAT vna febrim differentia pro earum curatione, spectanda, in qua causa adhuc adest febrem creans, aut febre excitata iam desit, Gal. auctore 8. meth. cap. 1. cum itaque modum, ac viam docuerimus quo illæ febres, quæ amplius causam non habent ex qua fiant, sed eis excitatis, iam desit, curari debeant, de eis consequenter differendum esse putavi, quæ non amplius factæ sunt, ut diariæ, & heclicæ, quarum diximus veram & propriam curationem esse, sed adhuc sunt, quarumque causa adhuc adest, eas creans, ac adaugens, & propterea earundem non propria, & vera curatio dicitur, nam vocata curatio, prophylactica, quoque admixtam habet, cuius officium est causam, quæ morbum creat, adimere, nominatur tamen & hæc ipsa quoque artis pars curatrix, ut quæ ab ea quæ putredine, sincerèque prophylactice dicitur, in eo distincta est, quòd sub hac iam sensibiliter ex ipsa causa morbus est genus in vera prophylactice est futurus, ut liquet 11. meth. med. cap. 2. sunt verò hæc febres quæ ex putrescentibus excitantur humoribus, ac propterea multos dies continuant, nam quamvis continens absque putredine febris, quam prius curare docuimus, causam quodammodo adhuc habeat, nec prorsus abierit, atque ob id multorum etiam dierum sit, ostendimus tamen, ac cum Gale. conclusimus, eam esse ex diariarum genere, sunt etenim diariarum (ut idem Gale. testatur 10. meth. cap. 1.) particulares differentia multæ, quarum vna est quando iam prorsus abiit effectrix ipsarum causa, veluti exustio; altera quando hæc etiam adest, ut stipatio. Licet igitur eius effectrix causa prorsus non abierit, non tamen ægrè tolli potest, simul cum his quæ febrem curant, quæ in generatione adhuc est, quemadmodum & ipsa causa sublata, ipsa quoque febris vna interit, modo eam putredo non excipiat, & idcirco diaria est, & dici debet, quamvis paulò plus proteletur quam consueverint exquisitæ diariæ, cum quartum, aut quintum diem non transcendat, quare earum etiā relatione, & non illarum, quæ ex putredine ortum habent, dicuntur quodammodo esse multorum dierum febres. Iure igitur cum Gale. concludamus febrim, quæ multos dies continuant, manente adhuc in corpore causa, quæ eas excitauit, talem causam esse putredinem, quapropter in eiusmodi febribus, nec affectus simplex, nec sanatio est, veluti in

diariis: siquidem quod febris iam receptum in corpore est, id ex propria ipsius curandi indicatione ut scutere oportet, quod adhuc est futurum, propulsare, ac ne fiat, vitare, vitabitur autem si quæ id excitat causa, prorsus summotæ. Itaque si febrim quæ multos dies continuant, rectè ostendimus putredinem esse causam, prima indicatio, ab ipsa tanquam à causa sumetur, eaq; nimirum prima, est sananda: sed nec interim extinguendæ febris, quæ per eam iam accensa est ratio non habenda: ac siquidem in idem consentiant, & quæ febrem extinguunt, & quæ causam oppugnant, in quod utraque conspirant, cum vnum sit, sine cunctatione agendum est, ut citato libr. 10. de med. meth. scriptum est. Libro autem 8. eiusdem operis, loquens de febribus, quarum causa quæ eas excitauit, adhuc adest, dicebat, [& si in generatione adhuc febris est, causa quæ eam accendit summotæda est, sin pars eius iam genita est, gignendo adhuc est, utriusque consulendum est, primum quidem summotæda quæ eam accendit causam, deinde extinguendo quæ ab hac accensa est febris:] quo loco, (mea quidem sententia) per febrem, quæ in generatione adhuc est, intellexit continentem, ac reliquas, quæ ex stipatione oriuntur, ac eas omnes, quæ causam intus habent absq; putredine: in his enim dum aufertur causa, ipsæ quoque vna intereunt, siquidem sanamus id febris, quod iam inuasit, etiam si exiguum est, prospicimus ne quid amplius proueniat, adimētes causam: ut ipse inquit eodem libr. & 10. cap. 2. c. iusdem ait, quòd quæ ex sola obstructione, citra putredinem, orta est febris, ipsa obstructionis solutio est eius sanatio, ut prius diximus, indifferenter enim eodem libr. octauo de omnibus febribus quæ adhuc causam intus habent, & non de his duntaxat, quæ ex putredine oriuntur, sermonem faciebat, libr. autem decimo de his quæ ex putredine duntaxat nascuntur, in citatis verbis loquebatur. Sed intelligas quascunque velis febres, per eas quæ in generatione adhuc sunt, satis est, quòd in eis sublata earum causa, propterea febris vna interit, quòd eadem adhuc adeo in generatione est, quòd exiguum ac pusillum est, id quod factum est, idque non permanens, nec difficulter solubile, quemadmodum in modo dictis febribus semper contingit, per quam rarissimè autè, in his quæ ex putredine ortum habent: & propterea in eiusmodi febribus primò summotæda est earum causa, ac prima indicatio ab ea sumenda erit, deinde quæ ab hac causa, accensa febris est, extinguenda, de iis etiam febribus, ac morbis fientibus, in quibus non exiguum est id, quod iam factum est, verba fecit lib. artis med. cum dixit: [oportet prius vnamquamque causam, quæ efficit, abscindere, deinde ita venire ad eam, quæ ab eadem causa facta est, ægritudinem.] nam quando pusillum est, id quod per causam factum iam est, sublata causa, simul quoque & ipsum aboleri non ignorabat: quapropter veniendum esse ad eam quæ facta est ægritudinem præcipit, ubi sublata causa eadem permaneat. Hoc idem dilucidius à Galeno 1. de loc. affect. cap. 89. scriptum est, cum dicebat: [quippe nonnunquam à causa quapiam oritur affectus, sed ita oritur, ut separata causa haudquaquam permanentem habeat dispositionem: interdum autem partim iam factus est, partim etiam dum fit, sæpenumero quanquam fieri definit ablata causa, perseverans tamen remanet dispositio.] probatque illud exemplo dyfenteria, licet quibusdam visum

Curatio præcautio mixta.

Febres putridæ, quæ.

Dubita

Ca

Febres

Si mori causa a

fit hanc Galeni sententiam diuersam esse ab ea quæ
8. method. medend. conscripta est: est tamen, vt
mihi videtur eadem, nisi quod hoc in loco specia-
tim magis suam explicat sententiam, morbi etenim
qui sunt, aut sunt in generatione, vt inquit, eodem
octauo, & sunt illi de quibus hoc in loco asserit: qui
ita oriuntur & fiunt, vt separata causa haudquaquam
permanentem habent dispositionem, simul enim
cum ea intereunt, propter eius exiguitatem, aut ita
fiunt, quod eorum pars iam genita est non tamen
exigua: & hoc bifariam contingere potest, quem-
admodum in hoc primo de locis affectibus, cap. 3. fa-
tetur, id quod non subdiuisit citato lib. 8. de metho.
med. cap. 1. quoniam aut id quod factum est maxi-
mum existit, quo casu quancumque fieri desinat, abla-
ta causa, tamen perseverans est & difficulter solubi-
le, aut nõ adeo maximum, sed medium inter hoc, &
pusillum, quod quidem abscessa causa licet præsidia
exigat, haudquaquam tamen difficulter discutitur.
Sed de his qui fiunt morbis, satis dicta sunt: ad febres
verò quæ ex putredine oriuntur, sermonem rursus
conuertamus, asserentes iterum quod cum earum
causa putredo sit, ab eadem sumenda prima indica-
tio erit pro earum curatione, vt liquet citato libro
10. metho. meden. cap. 1. cuius occasione mox dubi-
tabit quispiam, qui fieri possit, inquit, vt prima
indicatio in eiusmodi febribus curandis, à putredine
tanquam earum causa sumatur, si tertio de method.
medend. cap. 1. ab eodem scriptum est, omnibus in
confesso esse primas indicationes ex præter natura
affectibus, hoc est morbis, esse sumendas, ac initium
inueniendorum remediorum ex ipsorum morbo-

rum natura sumi, & 11. eiusdem, in principio, asse-
rebat hæc verba: [febrium quas putrescens accen-
dit humor primi remediorum scopi dicti prius sunt.]
quo loco eos quemadmodum & duos, & tres effi-
cias, ac etiam, si velis, vnum, docuit citans librum no-
num, vbi ex proposito communissimos, ac primos
scopos curationis febrium, vnum esse dicebat, vt po-
te contrarietate, interim duos, vt pote febrem ipsam
& naturalem corporis temperiem, interim tres, di-
ctis duobus aërem nos ambientem adiiciens. Huic
dubitationi responsum dabimus, quod vbique lo-
corum veritatem Gal. conscripserit, nempe aliud est
fateri quod prima indicatio pro inueniendis præsi-
diis ab aliquo sumatur, & aliud quod prima indica-
tio capiatur ab aliquo pro eo auferendo: quapropter
cum Galeno decernimus perpetuò principium in-
ueniendorum remediorum ab ipsa morbi natura
auspicari: siue adhuc causam habeat, siue ea iam de-
fuerit, id quod promulgauit tanquam perpetuæ ve-
ritatis, idem Galenus citato libro tertio meth. med.
verum ipsis inuentis, asserimus cum eodem, non
semper ipsi morbo primum remedia esse adhiben-
da, nisi is causam non habeat; nam vbi causam, aut
plures causas intus habeat, eiusdem morbi causa pri-
mò auferenda erit, ac pro eius sublatione præsidia
prius sunt adhibenda, quemadmodum idem Gale-
nus instituit citato libro 10. metho. meden. nec ob-
stat eius auctoritas paulò ante citato libro 11. eiusdè
operis, in principio, nam cum eodem admittimus
primos scopos curationis febrium, etià earum, quas
putrescens accendit humor, quatenus febres sunt,
eos esse quos diximus, pro inuentione videlicet re-
mediorum, ab eiusdemque methodum esse exordien-
dam, quamvis eis inuentis, in eorundem adhibitio-
nis ordine, aliud seruari oporteat in his, quas putre-

scens accendit humor, nam causa prius, (vt sapius di-
ctum est) per inuenta remedia auferenda erit, & de-
inceps febris ipsa extinguenda, quæ omnia idem Ga-
lenus paucis quibusdam verbis citato lib. 11. eiusdè
metho. cap. 10. absoluit, eo loco quo febrium ex pu-
tredine ortarum resolutiua methodo causas inue-
stigans, ordinem curationis earum docebat; dice-
bat enim in vltimis verbis: [quod verò febris ip-
sius iam accensum est, id refrigerabimus.] in auxi-
liorum enim ordine vltima est, quæ ab hac sumitur
indicatio, quamuis alia ratione sit prima, quippe
cum à febre inceperit inueniendorum præsidiorum
methodus, id quod in sequentibus fusiùs patebit.
Cum itaque in curandis febribus ex putredine or-
tis, prima indicatio sumenda sit ab ipsa putredine
tanquam à causa, ita quod ea prius est abolenda, vt
demonstrauimus, inuestiganda primò à nobis erit
pro hac methodo constituenda eiusdem putredinis
natura, vt sciamus quæ ab ea, ac eiusdem propria sub-
stantia, seu essentia prima, ac communis sumatur
indicatio pro ea auferenda, deinceps eadem in par-
ticulares differentias diducta, quousque ad eas per-
uenerimus quæ amplius sectionem non admittunt,
quot qualisve ab eisdem quoque particulares dif-
ferentiæ sumendæ sint, ostendemus, ac quæ sit sin-
gularim cuiusque propria indicatio. Par est enim
profectò, & quod omnium earum commune est,
communem habeat indicationem, & quod in singu-
lis est proprium, quantum à reliquis eiusdè generis est
diuersum, in tantum & diuersam ab illis sortiatur in-
dicationem: sunt autem naturarum ex humoris pu-
tredine eiusmodi differentia, vt inquit Galenus li-
bro 11. de metho. meden. c. 4. vna ex eo quod causa
ipsum putredinis adsunt, vel non adsunt, secunda ex
eo quod per totum animal, aut eius partem aliquam
diffusa sit putredo, tertia quatenus cum phlegmo-
ne est, aut citra hanc, igitur considerandum nobis
est, quidnam commune habeat indicatio, quæ à cau-
sa sumitur adhuc manente; quidnam ea quam putre-
do ipsa præstat; ab his deinde quid indicatio putre-
dinis, quæ per totum diffunditur animal, aut certe
maximè principalia in eo vasa, quid eius quæ in v-
na consistit parte; mox deinde earum quæ in vna
quodam parte sunt æstimabimus differentias, quip-
pe aliam esse iadicationem eius, quæ cum phlegmo-
ne coniungitur ratio est, aliam eius quæ sine hac cõ-
sistit: rursus in his etiam ipsis, aliam esse adhuc præ-
sente effectrice causa, aliam verò hac summotà, po-
stremò cuiusque causam adhuc manentis differen-
tias, per omnia quæ in specierum diuisione sunt
inuenta, spectabimus, siquidem hic iam desinanti,
necesse est indicationes, quæ ex curandis affectibus
sumuntur, post has eas nimirum, quæ ab ipsis curan-
dis suggeruntur pro particulis, pro iam dicta metho-
do, sumemus, quibus, si eas quæ à viribus præbentur,
adiicerimus, absoluta nobis methodus, de febribus
omnibus à putredine incensis, sanandis, erit.

Methodus medendi humorum putredinem vbi esse
causa non adsint, sed iam abierint.

Capit. XLII.

Vbi itaque humorum putredo tan-
quam immediata causa febrium, quæ
ex ea ortum habent, fuerit id, à quo
vt diximus, prima sumitur indicatio,
ac quod primò indicet, ex ea igitur e-
xordiamur oportet, ac cõsideremus quibus maxime

scopis, quibusque indicationibus vsi, curatione eius inuenire valeamus, principium inuentionis facientes ab ipsa de qua agitur rei natura; quemadmodum etiam in præcedentibus docuimus. Est autem putredinis natura Gal. auctore ii. metho. med. c. 8. mutatio totius putrescentis corporis substantia ad corruptelam à calido externo, inquit autem Gal. à calido externo, vt qui non ignorauerit duplex calidum, id quod Arist. etiam confirmauit 4. meteororū tex. 3. & idemmet Gal. eiusdem Aristote. auctoritate 2. de differentiis febrium cap. 9. vnum videlicet proprium, ac naturale, reliquum verò alienum, & præter naturam, non enim profecto à proprio calore corrumpitur quidque, imò cōtra prorsus quicquid in rebus subsistit, id gliscit, roboratur, sanum est, ac viuit dum proprio calore regitur, veluti nimirum ipsa animantium corpora, tametsi plurimam substantiæ suæ portionem, calidam & humidā sortita sunt, magnum tamen annorum numerum, sine putredine, ac sana, viuāque exigunt, si seruetur eorum proprius calor, in cordis quidem corpore per respirationem, in reliquis omnibus partibus, tum per communitatem quam habent cum corde, mediis scilicet arteriis, quibus participant, tum per aliam quandam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutim, mediis etiam arteriis quæ ad eam terminantur, & transpiratio, seu perspiratio dicitur: quibus quidem læsis, vnā etiam naturalis calor læditur. Alter verò calor qui alienus, & præter naturam dicitur, quādo in corporibus excitatur (excitatur autem ex tot causis quot in præcedentibus enarrauimus, cum de febris generatione disseruimus) primum quidem ipsos succos propter eorum humiditatem, & putrefacit, & corrumpit, spatio verò, tum adipem inuadit, tum carnem eodem Galeno auctore citato libro ii. metho. medend. cap. 4. Excitatur itaque humorum putredo tanquam efficiente causa, ab alieno, & præter naturam calore: id verò quod ab eodem mutatur, est substantia putrescentis corporis ad corruptelam: non enim in qualitate duntaxat id quod putrescit mutatur, sed in propria substantia, atque essentia, exigua tamen, & non magna mutatione. nam vbi magna foret, corruptio potius quam putredo nominanda esset, quemadmodum à Gale. sancitum est aphor. 17. 2. lib. quam obrem Gal. mutationem dixit, & non mutatum esse, in fieri generatione, ac in motu, & non in facto esse, aut termino motus, putredinis naturam spectans, atque definiens; cuius etiam mutationis terminus præscribitur assensens, mutationem esse totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelam, putredinem ipsam: quamuis Aristoteles citato libr. 4. meteororū, aliter sentire videatur, ait enim putrefactionē esse corruptionem &c. quam etiam ob rem, idem Gal. tanquam optimus logicus, putredinem ipsam considerans, tanquam id quod essentiam habet in fieri, per omnia quatuor genera causarum ipsam definire voluit, vt cuilibet patet eius definitionem recte inspicienti. Cognita igitur ipsa putredinis natura, necessariū inuestigandum est quid sit illud, quod ex sua natura nobis indicet ipsa putredo, ac quot, quæve indicationes ab ea oriuntur, pro eius sublatione. Et cum eodē Gal. citato loco asserimus, quod quemadmodum in his corporibus quæ non viuunt, cum putrescunt, primum quantum eorum iam corruptum separant, dein ei quod reliquum est in frigidum aërem sublato, perspirationem refrigerantem

moliantur, ita vtique & putredinem quæ in viuus est orta, sanabimus, id scilicet, quod iam corruptum est omni ratione vacuantes, quod reliquum est moderatis motibus, & refrigeratē perspiratu ad exactam symmetriam reducetes. Duo itaque sunt quæ ab ipsa putredine suapte natura indicantur, pro eius sublatione, prout dū etiam in ea consideratur partes, vna quæ iam corrupta est, & hanc omni ratione vacuare debemus, reliqua quæ seminalia, ac semiputrescens, & hæc indicat, vt ad exactam symmetriam reducatur, sed quoniam, vt diximus, putredo hæc quam sanare intendimus, in viuente corpore cōcipitur, propterea, vt inquit Gale. citato libro ii. de method. medend. cap. 9. quicquid humorum putrescentium, veluti semiputrescens, seminaliumque est, per ea quæ tum alterare ea possunt, tum cōcoquere, tum vtile reddere, sanabis facultatem eius qua naturaliter concoquit, excitans, firmansque, & paulo post cap. 10. vires roborandas esse præcipiebat, quod putredinem superantes, succos concoquerent; hac etenim ratione, prius diximus cum de viribus loqueremur, quod ex accidenti quandoque virium roboratio ad effectus curationem conducit, quod quidem ipse Galenus promiserat lib. 9. eiusdē operis cap. 19. in frequentibus scilicet, velle declarare. Denique quicquid putrescentium humorum iam computruit, omni ratione vacuare debemus, quicquid verò semiputrescens, seminaliumque est, ad exactam symmetriam reducere, cum his quæ alterant, refrigerando videlicet, & ventilando, ac etiam concoquunt, & vtile reddunt, firmando, & excitando eam corporis facultatem, qua naturaliter concoquit; ita enim quæ putrescentia sunt sanabis; etenim in humorum putredine, & excretio, & refrigeratio, & ventilatio & semiputridorum cōcoctio, ex aduerso respondent, inquit Gale. citato loco. Tentabimus autem non vna ratione id quod iam corruptum est vacuare, sed per deiectionem, vomitum, sudores, & vrinas quandoque; id autem quod semiputrescens est, cum his quæ alterant, frigidis inquam & siccis, substantiæque tenui adhibitis, atque refrigerante perspiratu, ambientis videlicet bona temperie adhibita, simulatque vires roborantes ac firmantes, quod succos concoquant & viles reddant, ad exactam symmetriam reducemus. Quomodo verò horum vnumquodque recte administrandum sit, paulo post demonstrabimus; nunc autem summam ea, quibus hæc omnia moliamur, recensere oportet sub quibusdam exemplis, nam eorum quæ iam dictas vacuationes promouent, non parua materiæ copia est, quamuis maior eorum portio cum calida siccaque facultate sit, febrem augens ita que deligenda medico sunt ea, quæ citra calfactionem siccationemque vehementem supra dictas vacuationes præsent, cuiusmodi sunt, vt Gale. inquit, cremor prisanæ, & aqua mulsa, & oxymeli, & apomeli, & apij radix in aqua, quæ potui datur incocta. hæc autem ipsa, ventri quoque sunt idonea, qui si nihil reddat, iniicienda per clysterem aqua mulsa cum oleo est; nostris verò temporibus, & aliis nonnullis clysteribus vitur, quos tanquam vulgo etiam notissimos, bona fronte prætermittimus: necnon & vitur non paucis etiam deuoratis medicamentis pro vacuatione humoris, qui computruit, per alium, vt melle aëreo, filiqua ægyptia, saccharo violacco, tamarindis, rhubarbarum etiam, & agarico potissimum, si cum iam dictis hæc miscantur, alisque nonnul-

Putredo
quid.

Calidum
duplex.

Calor nati-
uus quomo-
do conser-
uetur.

Caloris a-
lieni vis, et
quibus de
causis in
corpore ex-
citetur.

Putredo
per motum
definita est.

nonnullis compositis medicamentis, quæ per alium
vacuationem promouent citra valentem calfaci-
tionem & siccitatem, quemadmodum etiam ubi ad os
ventriculi impetum sua sponte faciat, qui iam com-
putruit humor, eum per vomitiones vacuare tenta-
bimus, ex multa aquæ tepida potione cum pauco a-
ceto, aut syrupo acetoso, seu oxymelite permixto,
potissimum ubi assuetus vomitioni fuerit ager, &
sua sponte ad os ventriculi putridi succi impetum ca-
pian, aliter non est quod eos præter naturam irri-
tes, vrinas autem ciunt quatuor semina communia
frigida, caucalis, gingidium, radicis apij, feniculi-
que decoctum in aqua, sudores promouent, vinum
aquo sum si bibatur, & temperatum dulcis aquæ bal-
neum. Quod verò semiputrescens est, alteramus, ex-
hibendo citri acidum, aut syrupum ex eo paratum,
oxysaccharum, & acetosum syrupum, ac reliquos
alios syropos similes, refrigerantemq; perspiratum
parantes: opitulamur etiam eius concoctioni cum
his quæ naturalem fouent calorem, aut eius substan-
tiam augent, de quibus suffus disseruimus in nostro
libello, quem de alteratione & concoctione con-
scripsimus. Rectè autem horum quodque admini-
strabitur, si præter id quod valenter non calfaciet
nec siccet, prius vniuersum corpus per alium va-
cuabis, adhibendo ea, quæ hanc moluntur vacua-
tionem, ubi nihil impedit, deinde eis quæ vrinas,
& sudores ciunt, vtare: etiam rarefacientibus me-
dicamentis, vino aquoso, ac balneo, ubi febris ma-
gnitudo non obstat, & concoctionis humorum no-
tæ planè fuerint euidenter, in remissione enim fe-
bris, si balneum adhibeatur, corpore iam mediocri-
ter transpirante, non exiguum affert commodum,
omnia ex eo tum fuliginosa excrementa, tum fumi-
da educens. tribus tamen in balneo quod in quacū-
que febre adhibebis, intentus sis oportet. Vni quod
citra horrorem sit administratum. Secundò quod
nullum primæ notæ viscus sit imbecillum. Tertiò,
quod multitudo crudi humoris in primis venis non
contineatur, vt eodem lib. meth. meden. scriptum est.
Si verò febris ardentissima fuerit, & vires cunctæ
validæ, ac concoctionis notæ euidenter, frigidam
homini dare audacter debebis, vt liquet ex Gale-
ni citato loco: cap. 20. hoc verò tempore quod semi-
putrescens, semique malum est iam dictis, aut reli-
quis similibus alterabis, ac vires roborabis, quò pu-
tredinem superantes, succos concoquant, quod ve-
rò febris iam accensum est, deinceps refrigerabis.

*Curatio methodus putredinis humorum, manentibus
adhuc quæ eam excitant causis.*

Caput XLIII.

NUNC ad alteram putredinis diffe-
rentiam accedamus, doceamusq; quæ-
admodum quis, causis quæ putredinē
excitant adhuc manentibus, reme-
dia facillimè inueniat: est autem neque
in hoc difficultas vlla, quippe cum per contraria tol-
lantur. nam licet ex usu non sit semper omnibus quæ
præter naturā sunt mederi, sed cum sola per se sub-
sistant, cum eis quæ in ipso (vt sic dicam) fieri essen-
tiam suam habent, ac vmbra ritu affectus comitan-
tur, sanatio quidem affectuum, ipsorum est sublatio.
hanc etenim symptomatum amotio sequitur; iis ta-
men quanquam nihil prima ratione adhibetur per-
petuum manet communissimum Hippocr. præce-
ptum, quod contrariorum contraria sunt remedia;
quippe cum affectus, quos symptomata sequuntur,

sanamus symptomata nimirum ipsa in contrarium
statum reducimus. quod si ipsi quoque symptomati
quandoque symptomatum genus aliud, contra aliū
opponere velis, ne sic quidem desit quod dixeris in
symptomatis ipsis, hac ratione veritatem habere,
quod contrariorum contraria sunt remedia: quam-
uis in his quæ verè & primū curantur, hoc est af-
fectibus, qui verè sunt subsistentes, præcipue verifi-
cetur, contraria esse remedia. siue itaque symptoma-
ta, siue alij præter naturam affectus per se subsisten-
tes, causa fuerint ipsius putredinis, siue quædam ex
earum generibus, perpetuo suis contrariis tolli de-
bent, cum omnia quæ præter naturam sunt, suis con-
trariis auferantur. quare si verum est, quod Gal. scri-
psit citato lib. II. de meth. med. cap. 4. quod si quid in
nostris corporib. manifestè putrescere debeat, ne-
cessariò oportet per spirationem seu transpiratio-
nē impediri, vel prohibitam esse, quoniam illa tan-
tum putrescunt, quæ cum calida humidaque natura
sint neque perflata, neque ventilata in calido hu-
midoque loco manent; vt citato loco, & 9. etiam e-
iusdem operis lib. cap. 3. & 1. de differ. febr. cap. 3. ab
eodem decretum est, necesse erit immediatam pu-
tredinis humorum causam, esse transpirationē pro-
hibitam, seu impeditam. hac enim oblata, diximus
vni etiam & naturalem calorem lædi, atque alienū,
& præter naturam excitari, à quo succi ipsi propter
eorum humiditatem putrescunt, ac corrumpuntur.
neq; enim ipse alienus, & præter naturam calor ex-
citaretur, ac succi putrescerent, nisi prius perspiratio
fuisset impedita. erit igitur ipsa putredinis humo-
rum causa propinquissima adeo quod absque ea fie-
ri ipsa putredo nequeat; & si quispiam dixerit eam
quandoque oriri posse ab aliis causis, quàm ex pro-
hibita transpiratione, impulsus eiusdem Galen. au-
thoritate lib. de causis morborum cum dicebat, [pu-
trefcunt autem nonnulla quidem à medicaminibus,
quæ vim habent putrefaciendi, aut ab iis quæ in ipsis
animalibus oriuntur superfluitates, nonnulla verò
ob id quod minimè evaporant:] dicemus Galenum
alio modo loquutum fuisse de putredine hoc loco,
quàm lib. de meth. meden. & aliis modò citatis locis.
nam per ea quæ putrescunt, subintellexit omnia
quæ quouis modo in corporibus nostris destruun-
tur, ac corrumpuntur. erat etenim ei sermo de mor-
bis in numero contingentibus, & propriè in defe-
ctu, cum videlicet aliqua ex partibus naturalib. de-
fuerit; quorum voluit vniuersas tradere causas, quod
videlicet non solum sectione, & valida frigefactio-
ne præcedente poterant oriri, sed vniuersaliter à
quavis corruptione à quacunque causa orta, adeo
vt per putrefactionem, corruptionem intellexerit,
& non eam duntaxat, cuius naturam exposuit libro
II. de method. meden. de qua nos etiam loquimur,
nam huius putredinis humorū verè dictæ, cum Ga-
leno audacter asserimus causam perpetuò esse, pro-
hibitam transpirationem, nec aliter eam generari
posse; licet semper generetur ab extraneo & præ-
ter naturam calore, tanquam efficiente causa, & ex
humiditate tanquam ex materia, ac quiete etiam au-
geatur, vt liquet 3. de morbis vulgarib. Itaque cum
transpirationis prohibitio, putredinis occasio sit,
hanc (arbitror) summouere oportet, verum quo-
niam ea etiam variis generibus orta est, vt pote den-
satis exiguis meatibus, & constrictis corporibus,
& humoribus, tum abundantia, tum crassitudine,
tum lentitie sua obstruentibus, singulæ etiam ha-

*Causa pro-
xima putre-
dinis.*

*Obiectio
quæ mox di-
scitur.*

*Putredo a-
liquando pro
corruptio-
ne.*

*Comment.
3. super tex.
22.*

*Transpira-
tionis pro-
hibitæ cau-
sæ variae.*

rum affectionum curanda per contraria sunt, densitas, per ea quæ rarefaciunt, costrictio, per ea quæ fundunt, abundantia, per ea quæ euacuant, crassitudo, per ea quæ dissecant, & lentor iis quæ detergant,

Transpiratio prohibita que causa est putredinis humorum.
 vt citato II. methodi medendi cap. 8. a Gal. præcipitur. At cum nos loquamur de ea transpirationis prohibitione quæ putredinis humorum causa existit, perquam rarissime autem id contingat, cum ipsa densitas exiguis meatibus, aut costrictis corporibus, impediatur (nam diariæ febres ex his generari consueverunt, vt superius dictum est, potissimum vbi ab externa causa, ortum habeant, à quibus ex humorum putredine haudquaquam generari queunt) propterea prohibitam transpirationem, quam asseruimus putredinis causam esse, ex obstructione generari potius fateri oportet; ad hanc enim (potissimum vbi non exilis fuerit) ipsa prohibita transpiratio, ac putredo necessariò consequuntur,

Obstructionis causa.
 vt liquet octauo & decimo method. medendi. cuius obstructionis, non quæquam externa causa, sed humorum habundantia, crassitudo, aut lentor, aut omnia, vel eorum quædam causæ necessariò existunt:

Indicationes à putredine duæ.
A febre item duæ.
 vt verò quæ diximus omnia, ad ordinem redigatur, pariter & quæ dicenda supersunt, asserimus cum Galen. quod qui febrem hanc curare volet, necesse est putredinem inhibeat: ita duæ indicationes se exhibent, altera à febre, altera à putredine: atque à febre rursus duæ, scilicet vt portio febris quæ iam accensa est, curetur, quæ verò in generatione est, inhibeatur.

A transpiratione prohibita indicationes duæ.
 Alia quæ duæ rursus à putredine erunt indicationes, vt quod putredinis iam factum est sanes, & quod in generatione adhuc est sistas: porro quod in generatione est, id perspiratio impedita efficit; & ita ab hac quoque duæ alia indicationes nascentur: tum vt quod retentum est vacuetur, tum quod retinendum est prohibeatur: prohibebitur autem iis prædiis quæ obstructioni medentur: cuius rursus ipsius quod iam occupauit sanandum est, quod futurum est, propulsandum; at curabitur quidē quod obstructionis iam factum est, per ea quæ obstructa liberant: propulsabitur quod futurum est, si affluxum confluentium succorum compescas. Ergo quod vltimum in ipsa resolutiua methodo est inuentum inquit Gal. id primum omnium in curatione est peragendum. Aduertant tamen hoc loco studiosi tyrones, ne decipiantur, opinantes quod vltimum inuentum in resolutiua methodo fuerit obstructio, & quod hic desinat; dicebat enim Gale. quod curabitur quod obstructionis iam factum est, per ea quæ obstructa liberant: propulsabitur quod futurum est, si affluxum obstructentium humorum compescas; igitur compescere affluxum obstructentium humorum, est id quod per resolutiuam methodum inuentum est; sed diximus tribus modis humores posse obstructionem efficere, vel eorum abundantia, vel crassitie, vel lentore, quare si hæc auferantur, inhibebitur quod futurum est ipsius obstructionis, simul atque prohibebitur eorum affluxus; in hoc ergo, & non in obstructione desinit hæc resolutiua methodus, & hoc est illud vltimum quod per eam est inuentum: hocque primum omnium in curatione est peragendum, vt videlicet abundantia, aut lentor, aut humorum crassities quæ obstructionis auctor est, suo contrario auferatur. nam licet externæ quoque causæ à medico spectandæ sint, pro certiori affectuum notitia vbi latuerint, ab eisdem tamen nulla sumitur pro eorundem affectuum curatione indicatio, nec etiā

vt probauimus pro seipsis quicquam indicant, cum non permaneant, sed statim affectu genito abeant, & propterea ad remediorum inuentionem non conducunt. Cum igitur septem numero sint præternaturam affectus, quos narrauimus eo ordine sese consequentes, à quibus omnibus indicationes sumuntur, ita quod omnes, contraria esse adhibenda pro eorum sublacione docent, atque suum vnumquodque habeat contrarium; licebit propterea cuique eorum inuenire, ac adhibere contrarium, si febrem hanc quam proposuimus, curare velimus: eo tamen ordine, quo etiam ipsa fuerint per resolutionem inuenta, exordiendo ab eo quod vltimum per eam inuentum est: ita enim si nullum interim vehemens incidat symptoma, prohibeatque quod minus auxiliis ab initio morbi ab finem ita procedunt, celerrimè finietur febris, vt idem Gal. inquit. Indicabit itaque abundantia, seu multitudo (cum ex eorum numero sit quæ sunt ad aliquid in prædicamento quantitatis) vacuationem tanquam contrarium, letitia verò & crassitudo, quæ sunt in qualitatis affectu, licet forte eorum contraria non ita consueta nomina habeant, tamen quia, vt dictum est, largiori vocabulo eis vtiur, etiam si improprie talia dicantur, eorum etiam contraria indicabunt, vt letitiae deterfionem, seu incisionem: crassitudo, extenuationem, ita quod detergendi ac incidendi sunt lenti succi, & crassi extenuandi, vbi hac ratione offendant, obstructio instrumentarius morbus, existens, reclusionem exigit, transpirabilium retentionem, excretio ipsorum contrarium est, etsi symptoma existat, humorum putredini, iam dictum est, excretionem, refrigerationem, ventilationem ac semiputridorum concoctionem, ex aduerso respondere, ipsius verò febris refrigeratio, oppositum est. Hoc nanque ordine etiam ipsa contraria, & eorum remedia adhibere oportet, ita quod quamuis ab ipsa febre ceperit inueniendorum remediorum methodus, in auxiliorum tamen ordine, vltima est quæ ab hac sumitur indicatio. Vltimo enim loco ea exequi habent, quæ febris ipsa exigit, quæ febris est; & hæc est illa via rationabilis ac ordinata, qua febres omnes ex putredine humorum ortæ, cuius causæ adhuc adsunt, curari debent.

Abundantiæ humorum curatione Caput XLIIII.

Hordiamur autem ab ipsa humorum abundantia: nam vbi obstructio ab ea fuerit orta, ipsa primò auferenda erit, cum si his auxiliis quæ obstructiones eximunt, vt non vacuata prius abundantia velimus, fore, vt non modò nihil proficiamus, sed vt affectum maiorem reddamus; inquit Galen. lib. II. de metho. med. cap. 9. pugnantis scilicet inter se indicationibus; eadem autem prius vacuata si ad curandam obstructionem accedamus, medicamentis iis quæ obstructiones expediant, opus erit, vt liquet citato loco, & 8. eiusdem met. cap. 4. sic scriptum reliquit. [Præstat enim vitiosi succi maiore parte emissa, ad detergendas obstructiones accedere, cum alioqui metus sit, si obstructionibus liberandis priusquam vacuaueris, studeas, ne ipsas magis impingas.] Erit itaque prius humorum abundantia tollenda, idque suo contrario, quod quidem est euacuatio, perficiendum; quam per veng sectionem rectè molimur; sedulo igitur vena secanda erit, modo nihil eorum quæ prius diximus prohibeat, præsertim virtus, aut ætas; tam si hæc multitudo seu abundantia fuerit

fuerit quoad vires, quàm quoad vasa, tam simpliciter, quàm secundum quid. Appello autem multitudinē simpliciter, quando ex æquo quatuor humores fuerint aucti, aut etiam sanguis solus. nam cum alius quispiam humor redundarit, veluti est pituita, & vtraque bilis, eiusmodi auctiōnem, seu abundantiam, non plenitudinem, aut multitudinem simpliciter, sed cum appositione pituita, aut flaua, seu nigra bilis nuncupabimus, vt liquet 2. de compositione medic. secundū loca, c. 1. modo horum humorum redundantia fuerit iuxta sanguinem, aliā neque multitudinē, aut abundantiam, seu cacochymia diceretur: id quod manifestē declarauit idem Gal. lib. de multitudine, cap. 11. cum dixit: [Verū species multitudinis, cum scilicet æqualiter in corpus totum porrecta est, distinguui hac ratione conuenit. Ruborem præ se fert sanguinis copia, flaua bilis pallorem, pituita vbi dominatur, ad albidius quàm natura postulet; vt si potior sit atra bilis, ad nigrius declinat.] deinde subdit: [Porro singulis iis quos enumerauimus iuxta sanguinem quoque oportet augeri. nam si flaua bilis aliquādo sola, vt in ictericis superauerit, talis affectus, non plenitudo, aut abundantia, sed cacochymia, hoc est humorum vitium est: idem quoque in atra bile, ac pituita.] & eodem libro paucis quibusdam interiectis, illud confirmauit asserens: [nobis verò non simpliciter quid, quouis modo abundauerit inuenire, sed multitudinem considerare sententia erat, id autē humorum in toto animalis corpore exuperantia est.] & deinceps addidit: [nihil est igitur quod neque tumorum sigillatim species, neque cacochymia, hoc sermone cupias audire, sed cum aut cuncti pro veteri proportionē aucti fuerint, aut vnus ex iis breuem quandam cœperit excessum, potest ergo sanguis in plethoricis dispositionibus excessum amplissimum adipisci, nullus autem aliorum potest; humorum enim prauitas id genus, non etiam multitudo, neque plethora nuncupatur: eam ob rem pulsus quoque in cacochymia proprii ad amissum sunt humorum natura: in supradictis verò multitudinibus, non perinde euidentes seruant differentias, quoniam superfluens humor omnino cum copioso sanguine est. Ex quibus omnibus liquet in Galen. doctrina præter plethoram, seu abundantiam, seu multitudinem simpliciter dictam, & cacochymiam, hoc est humorum vitium, alteram dari plenitudinem, seu multitudinem secundum quid, & non simpliciter dictam, quæ sit quando aliquis alius humor, vtputa bilis flaua, vel atra, vel pituita, iuxta sanguinem, seu simul cum sanguine redundarit, ac breuem quandam cœperit excessum, licet omnino idem quoque cum copioso sanguine sit. nam vbi multum excederet, & non iuxta sanguinem, hoc est non simul cum copioso sanguine, cacochymia diceretur, & non multitudo, seu abundantia talis, vel talis succi: quemadmodum etiam sanguis ipse vbi redundarit, & breuis, seu pauca in eo fiat corruptio, adhuc non corruptionem, sed multitudinem nominabimus, vt patet commento aphor. 17. 2. libro sola ea vocata corruptione, vt Galenus inquit, quæ tam magnam habet eam quæ contranaturam est conuersionem, vt non possit iterum per naturæ coctionem ad pristinam humoris redire bonitatem. Quævis itaque fuerit humorum abundantia, venam pro eius sublatione secare oportet: ipsa nanque est, quæ multitudini opponitur. Verum semper seruari oportet, ne quid eā prohibeat,

præsertim virtus, aut ætas, vt in præcedentibus fusiùs differuimus, quapropter quantum satis sit sanguinis in principio detrahere licebit: & deinde, si videbitur, quod defuit in prima sectione, iteratione supplere; hoc enim tutius est quàm semel immodicè vacuare: potissimum cum aliquid eorum quæ venæ sectionem coindicare solent, pro ratione non satis respondeat; id quod semper aut saltem sæpius contingit: tum etiam quoniam nec obstructio, nec putredo curari per sanguinis missionem potest: vt quæ alia remedia (ceu vt prius est demonstratū) defiderent, & ob id aliquid sanguinis reponi ad curationis spatium debeat, quò minùs intempestiue nutrire necessitate vlla cogamur, vt citato lib. 11. de meth. med. cap. 14. scriptū est. Si verò aliquid venæ sectionem prohibeat, vt ætas, aut virtus, aut etiam propter ægri timiditatem, vel propinquorū eā prætermittere cogaris, larga purgatione vtendum erit, ex Galeni auctoritate, quarto de sanitate tuend. cap. 4. & deinde ad liberandam obstructionem accedere, modò aliquid hanc etiam non prohibeat, aut alia ratione educendum, quod superuacuum est. nam abundantia, seu plethora, tum venæ sectione, tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum frictione, præterea digerentibus medicamentis; & præter hæc omnia cibi parsimonia, & inedia curatur; vt patet 4. cap. 6. & 13. meth. med. cap. 6. & lib. de cur. ratione per venæ sectionem. ca. 10. Verum vbi febricitet æger (nā de hac modò sermonem facimus) nec exercitatione vacuare abundantiam licet, nec vnctione quæ excal faciat, nec multa frictione, nec balneo, imò sanguinis missione, vnā cum inedia, vel purgatione aliqua, vt eodē 13. de metho. med. cap. 6. liquet. Erit insuper & purgatione vtendum à venæ sectione, priusquam ad eximendas obstructions accedas, vbi abundantia non simpliciter fuerit, sed aliorum humorum, vt diximus, pro ratione humoris redundantis, quemadmodum in ea multitudine, quæ simpliciter dicitur, iterandam esse venæ sectionem non semel, sed bis, & sæpius si videbitur, consulimus. Sed quæres, num refragante ætate duntaxat, omnibus aliis cōsentientibus, omnino venæ sectio prætermittenda sit: & respondemus, quod non propter aliud à scopis venæ sectionis Hippocrates duas duntaxat ætates seclussit, ex Galeni testimonio, libro de curandi ratione per venæ sectionem; senum inquam, & puerorum; sunt nanque senes vt plurimum sicci ac pauci sanguinis, & propterea vires imbecillas habent; nulli enim qui in hac ætate est, robur inest, vt idem Galenus citato loco cap. 9. inquit. Pueri verò non propterea quod vires imbecillas habent, vt quibusdā non perperam visum est, sed quoniam plurimum corporis substantiæ quotidie eis absumitur, vt quæ calida & humida sit, venæ sectionem non admittunt. Quapropter si senibus multus addit sanguis, ac robustæ vires, formidare non oportet venam secare, vbi affectus iubeat, & alia omnia cōsentiant, minùs tamen his sanguinem detrahes, quàm affectus exigat, etiam si eandem affectionē habere videantur; quam corpus ætate florens: quinimò viribus, & corporis habitui cōfusus, despiciens annorum numerum, septuagenariis etiam venam secabis decreto eiusdem Galeni citato lib. c. 13. quo etiā loco docuit, quibus signis tantum minimè fallacibus, robustarum virium fides sit adhibenda, quia vehemēti pulsui, cum æquabilitate, & ex abundanti etiam, & magno; quod si prius eodem libro dixerit nulli qui in hac ætate est robur

Vena sectione iteranda.

Vena sectione, nec obstructio, nec putredine curatur.

Purgatio loco venæ sectionis.

Purgatio loco venæ sectionis.

Iteratio venæ sectionis.

Senibus, & pueris, cum sanguine non detrahendum.

Cap. 5 &
cap. 14

Quibus puer
in sanguine
educi po-
est.

cap. 14. &
x. ad Glau-
conem c. 14

inesse, intelligendum est ratione ætatis, & relatione, ad florentem ætatem, & non habitus ratione, & collatione facta ad reliquos senes succos, & pauci sanguinis, qui etiam sexagesimo ætatis anno venæ sectionem non ferunt; itaque senibus etiam, ubi abundantia sit huius febris auctor, venam audacter secabis, si reliqua omnia consentiant, minus tamen sanguinis his detrahes, quam abundantia requirat: corporis habitui, & virium robori confusus. Quod verò ad pueros attinet, Gale. est sententia non solum citato libro de curandi ratione per venæ sectionem, cap. 14. sed nono, & 11. de method. med. ac sexcentis etiam aliis in locis, quod si decimumquartum annu non attingunt, mitti illis sanguis non debeat: quoniam, ut decretum reliquit, eodem 11. metho. medendi quod ex incidenda vena molendum nobis fuerat, id vltro nobis excurati corporis natura præstat: quæ cum calida & humida sit, plurimum eius substantiæ quotidie absumentur, ac digeritur. Verum cum non propter aliud venæ sectionem Galen. pueris interdicit, nisi quod eorum substantia quotidie digeratur ac dissipetur: asserimus nos, quod ubi laxæ admodum, ac mollis carnis non sint, nec pingues & albi, aut etiam graciles venas habeant, & rarum corporis habitum, eisdem quoque si affectus iubeat, & reliqua omnia consentiant, venam secare licebit. nam non solum annorum numerum spectare oportet, sed etiam corporis habitum, eiusdem Galeni testimonio, qui ubi talis fuerit, quod ad digerendos tales succos propensus non sit, utpote densus, non laxæ admodum, ac mollis carnis, sed carnosus, multoque sanguine præditus puer, eisdem quoque audacter venam secabis, ubi affectus exigat, & reliqua omnia consentiant, ætate neglecta, quem admodum de senibus idem Galenus sentiebat; non enim propter ætatem qua ætas est, sed propterea quod in illa ætate puerorum natura, ac substantia cum calida humidaque sit, omnium facillime digeritur, ac dissipatur, vitanda est venæ sectio. At si contingat in tali ætate pueros diuerso ab ætate habitu præditos esse, ac bene sanguinea natura, iis magis quam ætati confusus venam audacter secandam esse censerem, nec illud Gal. contradicere. nam & de senibus ita sensuit, etsi illud in pueris affirmare ausus non sit, id non propter aliud puto, quam quod ipse perpetuo exquisita venæ sectione usus fuerit, ubi affectus præciperet, adessetque virium robor. excepit ergo pueros ab hac copiosa vacuatione, ut qui carnem facillè transpirabilem habeant. verum ubi non adeo exquisita, ac copiosa venæ sectione fieret vacuatio, nec pueri carnem adeo facillè transpirabilem habeant, neque ipse Galenus venam secare prohiberet, quemadmodum eodem libro de curandi ratione per venæ sectionem, constat, quo loco de quantitate mittendi sanguinis verba faciens, assererat duo esse, ob quæ maximè coniecturalis efficitur in hoc auxilio quantitas euacuationis; laborantis videlicet natura, qualis sit: quam utique ad amissum nouisse non liceat, & ambientis temperies qualis sit à misso sanguine futura. nam cum febrilis calor multum sanguinis digerit, atque abstinenter laborans victitat, necessario breui illum nutrimentum ex sanguine destituit, interimque virtus exoluitur. Absumentur autem ob laborantis temperiem calidam & humidam, cuiusmodi est puerorum, & ambientem calidæ regionis, & temporis æstiu: deinde subdit: [Proinde minus detrahimus quam mul-

tudo commonet, quod ad ætates quidem attinet, in pueris, quod ad corporis habitus, in candidis, & quibus mollis & tenera est caro, quales Galli sunt, quod ad tempus, sub cane: similiter etiam in regionibus, & constitutionibus. [quibus manifestè ostendit Galen. copiosam, ac exquisitam venæ sectionem pueros non ferre, quam sanè plenitudo commonet, moderatam autem ferre posse: & ob id non sine fortificatione censendum, quod ubique locorum præceperit pueris, ad decimumquartum vsque annum non debere venam secari, quod de eadem exquisita, & copiosa intellexerit, ubi similem quoque ætati habitum, ac naturam pueri habuerint, quam etiam semper nos interdicimus; quemadmodum modicā perpetuo admittimus, ubi quæ meminimus adfint, nihilque aliud obstat quam ætas. Animaduersione tamen dignum est, quod ubi pueri vnde decimum, aut saltem decimum annum non attingerent, etiam omnibus consentientibus à venæ sectione abstinentum esse putarem, ac tutius per scarificationem, seu hirudines, sanguinem mittere. Hæc de venæ sectione, quod ad ætates attinet seruanda esse sentio, non modo pro abundantia seu multitudinis curatione, de qua præsens est sermo; sed etiam pro curatione reliquorum omnium præter naturam affectuum, qui magni sunt, & venæ sectionem desiderant.

Humorum assitæ, aut lentitæ obstructiui, ac ipsius obstructionis, & prohibitiæ transpirationis, curandi methodus. Caput. XLV.

Vbi verò non humorum abundantia, sed iidem crassi, aut glutinosi obstructionem efficiant, suis etiam contrariis eos curare oportet, ita ut si crassi fuerint succi, iis quæ extenuant vtendum sit, si verò glutinosi, detergentibus, ac incidentibus medicamentis uti oportebit, ubi autem crassi sint, & glutinosi, eisdem complicatis medicamentis, tenues eos, ac fluxiles efficies. Extenuant autem, atque detergent, & incidunt ptisana, aqua mulsæ, & oxymeli, & reliqua nonnulla. Verum iis vtendum esse censerem, quæ aut citra calfactionem & exsiccationem eadem moliantur, aut saltem exigua sit eorum calfactio, & exsiccatio, quamquam ipsa ptisana extenuet atque incidat, non modo citra calfactionem, verum etiam absque exsiccatione, ut lib. de ptisana, scriptum est. Sed statim quispiam quereretur, num obstructione orta ex crassitie, seu humorum lentitie, priusquam iam dicta medicamenta extenuantia, ac detergentia adhibeantur, vena secanda sit? pro cuius quæstioni solutione, animaduertendum est id quod prius diximus ex Galeni mente de obstructione ipsa, videlicet quod curabitur id quod obstructionis iam factum est, per ea quæ obstructa liberant, propulsabitur autem quod futurum est, si affluxum obstructiui succorum compescas; duas itaque ex ipsa obstructione Gale. sumit indicationes, vnam ex eo quod factum iam est, alteram verò ab eo quod futurum est, quibus ita positis, dicimus quod sumpta indicatione ab eo quod ipsius obstructionis iam factum est, ubi eadem ex iam dictis succis ortu habeat, venæ sectio nequaquam conducere videtur, sed eisdem duntaxat extenuantibus, seu incidentibus vtendum erit, & potissimum si eam nec putredo, nec febris excipiant; hæc namque obstructio vnum habet scopum, ipsi morbo contrarium, nempe apertionem, seu reclusionem, eodem Galen. testis, libro

libro art. meden. cap. 94. cuius causæ salubres sunt, iam dicta medicamenta detergentia. & incidentia. Si vero ab eo quod futurum est, indicatio capiatur, audacter cum Galen. asserimus, quod priusquam talia adhibeantur medicamenta, vena secanda erit, non euacuationis gratia dantur, quemadmodum in ea quæ ex abundantia gignitur, sed reuulsione potissimum. etenim cū prohibeatur quod futurum est, si affluxum obstructionum succorum coalescas, eodem Galeno auctore, citato vnde decimo meth. med. cap. 10. prohibebitur utique obstructionum succorum defluxus ex tali venæ sectione, saltem etiam ipsis humoribus crassis aut lentis existentibus. id autem quod obstructionis iam factum est, per ea quæ obstructa liberant, curabitur, nempe detergentibus, ut dictum est, atque extenuantibus: quoniam nec obstructio, nec putredo curari per sanguinis missionem potest, ut quæ alia remedia desiderant, inquit Galenus citato loco. Sed adhuc instabis asserens hoc esse contra Galen. sententiam, 10. method. meden. quo loco talia retulit verba: iam verò obstructionum ipsarum alia est, quæ ex abundantia, alia quæ ex qualitate succorum, sed qui aut lenti aut crassi sint, incidit. & demum subdit, præferetur autem inter remedia, in ea quam copia facit, sanguinis missio, in ea quæ ex humorum qualitate consistit, attenuantium usus. [Huic responsum sit, recte Galen. hoc loco dixisse præferetur autem inter remedia, &c.] Nam in ea quam copia facit, præferenda est venæ sectio, ut quæ quantitatem ac copiam euacuet: reliquæ verò quæ ex qualitate humorum efficiuntur ex medicamentis contrariam qualitatem habentibus, præcipue curatur. Quapropter talia præferenda sunt medicamenta. Atqui non propterea negauit, quod priusquam hæc adhibeantur, sanguis mittendus non sit, reuulsione saltem gratia, aliis consentientibus, quo etiam modo intelligenda erit Alexandri sententia lib. 12. c. 1. cum dixit: quod si non copia, sed viscosi, crassique humores obstructionem procreant, sanguis mittendus non est, sed decoctis potius quibusdam utendum quæ extenuare possunt. Quinimo hoc idem Galenus luce clarius demonstrauit, octauo eiusdem operis libri. qua parte diarias febres, aut eisdem similes ex parua obstructione ortas, curare docuit, inueniens: [ac si liquidum vel puer, vel senex sit, sanguinem detrahare non licet, inter has ætates ubi robur ægro non deest, secanda vena est, etiam si plenitudinis signa non adsint.] præstat enim, ut ipse ait, vitiosi succi maiore parte emissi, ad detergentes obstructiones accedere, cum alioqui metus sit, si obstructionibus liberandis, priusquam vacaueris, studeas, ne ipsas magis impingas. & deinceps: lat solunt quidem obstructiones, quæ detergentiam facultatem obtinent, seu foris cuti sint admota, seu intro in corpus accepta, periculum verò est etiam ne quæ foras trahunt, vna cum his quæ obstruunt etiam aliud quippiam attrahant, & quæ ab interno sursum feruntur, aliquid secum ex iis quæ in vasis continentur, rapiant: quod si ipsum tenax sit & crassum, obstructionem sanè geminabit, sin aliter multitudine certè sua non parum omnino nocebit. Erit itaque sanguis mittendus saltem pro reuulsione, & ut tutius quæ extenuant ac dissecant adhibere valeas, in obstructione ex crassis, & glutinosis succis orta, præsertim ubi putredo & febris ad eam consequantur, de qua etiam est noster sermo

(postquam Galen. in exigua etiam obstructione, ad quam putredo adhuc coequeuta non est, sed diaria febris, etiam si plenitudinis signa non adsint, sanguinem mittere præcepit, priusquam ad liberandas obstructiones accedamus.) sanguis verò tum ad virtutis, tum ad obstructionis modo portionem mittendus erit, discernetur autem obstructionis magnitudo, ex ipsa magnitudine febris, ut quæ ex maiore obstructione maior, ex minore, minor incidit. Dissectis deinceps ac extenuatis, per ea medicamenta, quæ incidendi, detergentis, ac extenuandi vim habent, humoribus ipsis crassis, aut lentis, eandem obstructionem efficientibus, ad auferendum id quod ipsius obstructionis iam factum est, accedere est tempestiuum, pro quo iis medicamentis opus erit, quæ obstructionem expediunt tanquam contrariis, etenim obstructioni tanquam instrumentali morbo, contraria est reclusio, eodem Galen. auctore, citato lib. 11. de meth. med. cap. 13. Verum quoniam horum plurima calida sunt, metus est ne tum putredinem, tum febrem augeant. itaq; iis quæ liberare obstructiones valent, utemur, *εὐπαρκῆ* Græcè dicta, inter quæ ea eligenda sunt, quæ citra calorem obstructionem eximant. Et quoniam, ut dictum est, soluunt etiam obstructiones quæ detergentiam facultatem habent, foris, seu cuti sint admota, seu intro in corpus accepta, propterea aut nutrimentum aliquod, aut phar-macum cum his quæ detergent, exhibebis, sunt tamen non multa quæ in febribus id præstent, eodem Gal. teste, præcitato lib. 8. meth. med. In alimentorum enim ratione, sunt prisana & mulsa, in pharmacorum autem oxymeli, & quæcunque incoquenda mulsa licet, seu calamintham, hyssopum, origanum, serpillum, irim, & apium. Verum hæc omnia iusto sunt calidiora, ideoque febres accendunt, haud aliter, ac vinum. Oxymeli verò solum, nec febres accendit, & strenue detergent, sic ut ea quæ glutinosa crassaque sunt, dissoluat, & meatus obstructos liberet, ut liquet ibidem: poteris autem prædicta, non in aqua mulsa, sed aqua hordei incoquere, quandoque etiam eisdem uti, ubi febris valida non fuerit, & succi admodum lenti & crassi. incident enim, atque detergent non obscure, & meatus obstructos liberabunt cum exiguo calore, in quem usum & vinum quoque conducit aquosum, album, & subadstringens. cuius autem naturæ talia sint medicamenta omnia, ac qua methodo dignoscenda sint, & quæ inter ea magis, & quæ minus detergent, ac obstructionem liberent, Galen. libro de simplicium medicamentorum facultatibus, abundè docuit, præsertim quinto: quo loco repurgantia, ab extergentibus, quomodo conueniant & differant, abundè etiam demonstrauit. sunt namque substantiæ genere minime diuersa, ratione maioris, ac minoris differentia: nam quæ poros etiam expurgant, sunt subtiliorum partium quam ea, quæ in superficie sordem auferunt, siue in cute, siue in vlcibus, & extergentia propriè nominantur, illa verò propriè pororum ecphrastica, & eccharctica, quasi expurgantia poros, & factu liberantia appellantur, insuper & hæc propriè tum nitrosa, tum amara sunt: cum ea quæ cuti extimæ imposita, solam nitrosam qualitatem possideant exactam, est opus, ad ea peragenda quæ diximus, intro verò in corpus assumpta, etiam si adiuncta sit quædam adstrictio, possunt tamen sic quoque magnos purgare, abstergeretque meatus, cuiusmodi sunt in vasis: nam foris meatuum exiguitas, prius ab

adstrictione oclusa, quam probè queat expurgari, non etiam inde in altum abstergentem subitantiā recipit, nec expurgatur. At quæ circa ventrem sunt partes omnes, quæque in iocinore, liene, aliisque omnibus visceribus cum maximos in se meatus habeant, maius accipiunt commodum, ex vasorum corroboracione, quam propter osculorum exiguitatem lædantur. proinde intus absinthium expurgare potest, foris non potest, quippe quod compositum est ex amara, acerbâque facultate. Concludendum itaque, quod quæcunque reperiantur nitrosa & amara, ea ad purgandos meatus omnes valere, ac cutis vniuersæ, ac vicerum sordes, non hæc tantum, sed & viribus minora, auferre possunt, Galeauctore, citato lib. quinto de simplicium medicamentorum facultatibus, id quod in ipsis amygdalis accidit: nam & horum ipsorum ea quæ amara sunt & detergunt, & meatus expurgat, seu infarctum liberant, quæ verò edendo sunt, detergunt quidè, non tamen infarctum liberat. Vbi verò qui obstruunt humores deterfi, disiectique sunt, reclusæque viæ per quas expurgari debent, per ea quæ diximus medicamenta, per aluum, vrinas, & sudorem eos vacuare tentandum est, Gal. teste, præcitato libro vndecimo de metho. meden. si sponte non excernantur. cum verò materiæ quæ hæc efficiunt, etiam calidæ sint, quoad licet, id agendum erit, vt quæ minus calfaciat (quemadmodum in hoc casu balneum) vtique ea est petenda, vt inquit Galenus eodem loco. nos verò plura conscripsimus, quæ eandem vim habent, parumque calfaciunt, & quædam quæ nequaquam calfaciunt, paulò ante quando docuimus putredinem (cuius causa adhuc non adest) curare, quibus audacter vti poteris. interim in memoriam reuocabis Galenum hoc loco, nil aliud voluisse præcipere, quam id quod decretum reliquit Hippocrates, aphorismo nono, secundi libri, cum dixit: [corpora cum quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere.] erit autem fluidum, vt idemmet Galenus testis est in commento, omnibus meatibus quidem reseratis, humoribus verò incisis, absterfis, atque extenuatis, si quis fuerit humor in corpore crassus, ac glutinosus. si verò plures causæ obstructionis aliquando coeant, vt multi simul ac crassi, & lenti humores, omnibus etiam per contraria iam dicta occurreris, abundantia prius per venæ sectionem sublata, omnibus consentientibus, siquid verò prohibeat, alia ratione, vt dictum est, vacuata: deinceps crassos ac lentos humores extenuabis, ac incidēs. semper enim cœpisse à sanguinis missione conueniet, vt liquet eodem vndecimo de meth. med. cap. 14. Sequebatur obstructionem necessariò prohibita transpiratio, à qua duæ etiam indicationes oriebantur, tum quod retentum est vacuetur, tum quod retinendum est, iis præsidis quæ obstructiōi medentur, quapropter aliis non indigebis, quam modo dictis. quod verò retentum est, vacuare oportet: nam symptomati, quod est transpirabiliū retentio, vt testatur Galenus, excretio ipsorum contrarium est, quæ item non alia ratione vacuanda sunt, quam ea quæ obstructionem pariunt, vbi eadem obstructionem consequatur quibus hoc ordine peractis ad curandam putredinem, & deinceps ad extinguendam febrem, iis quæ paulò ante meminimus, accedendum est: nam si densatis exiguis meatibus, aut constrictis corporibus, quandoque

fiat transpirationis prohibitio, suis contrariis curanda esset, densitas siquidè per ea quæ rarefaciunt, constrictio verò per ea quæ fundunt. si verò omnes iam dictæ causæ coibunt, omnibus etiam per contraria occurrendum erit. siquidem fieri potest & coarctatum corpus sit, & exigui meatus densari, & multi simul ac lenti humores subiant, etiam ipsos maiores meatus obstruentes. in huiusmodi autem causarum complexu, si rectè quæ prius comprehensa sunt meminimus, cœpisse à sanguinis missione etiam conueniet, ac abundantia euacuata, tū ad extenuandos humores venire, ac obstructionē recludere: ab hoc ad remittendā quæ sunt adstricta, & rarefaciendō quæ sunt densata, eodem Galeno teste. Ex quibus liquet quomodo, & quibus curanda sit putredo febrem efficiens, tam si eius causæ abierint, & ipsa sola per se subsistat, quam si etiamnum adsint. Consequens est, vt ad secundam, quam posuimus putredinis differentiam, accedamus.

Methodus medendi putredinem, tam per totum animal diffusam, quam si in vna quadā parte consistat.

Caput XLVI.

RA T autem secunda putredinis differentia ex eo sumpta, quod per totum animal aut eius partem aliquam, diffusa putredo esset. etenim ipsa, vel æqualiter in omnibus subsistit vasis, vel in maximis, maximèque principalibus (ea porro sunt inter alas & inguina) vel vna quapiam particula, quæ vel phlegmonē in se habet, vel citra phlegmonem, veluti in foco quodam principium febris in se continet, & est tertia eiusdem putredinis differentia. In singulis his differentiis, seorsum exercitari conueniet, vt liquet II. meth. med. c. 4. Nos verò primum iā tractandā proponimus, quæ vel in maximis vasis, vel simul omnibus consistit: quæ autem ex tali affectu oritur febris, planè necessū est *σφοδρὸν*, id est, continentem esse. Erat namque harum continentium febrium natura, non simplex atque vna, nam quædam earum manifestam habet putredinis notam, de qua differere nunc proposuimus, quædam prorsus non habet, de qua prius sermonem fecimus: quoniam maiorem communiter habebat cum diariis: quemadmodum hæc cum iis, quæ ex humorum putredine ortum ducunt. Quamobrem merito in vtroque genere de ipsa mentionem fecimus: est enim harum continentium febrium substantia, totaque natura ex eo genere febrium quod nunc nobis proponitur: in vno tantum cum diariis conueniens: quod videlicet vna in totum, totius morbi accessio est, vnde & earum curatio, vnum hoc duntaxat commune cum diariis habeat oportet, in reliquis autem omnibus, conueniat cum his quæ ex putredine sunt ortæ, quod verò omnium earum commune est, communem habet indicationem. & ob id hæc quoque febris continens ex putredine orta, sub hac ratione cum omnibus aliis communem habebit indicationem: de quibus sermo prius habitus est. Quatenus verò ad propriam eius substantiam spectat, propriam quoque curationis indicationem habebit, & quantum à reliquis eiusdem generis est diuersa, intantum & diuersam ab illis sortietur indicationē. nec opus est iterum repetere quam indicationem ab eadē capere debemus communē: tanquā videlicet ex putredine orta, tam si putredinis causæ adsint, quam si ipsa putredo per se

per se sola subsistat: fufius enim de his paulò ante differuimus. Verùm cum eadem gigni nequeat, nisi per vnũ corpus per spirationes impedita fuerint, vasorum finibus stipatis, vel tota cute, propterea in his qui sanguine abundant plurimum, & corpulentis gigni cernitur: nam humorum putredo in omnes quæ inter inguina & alas interfunt venas, æquabiliter ac citò porrigi in frigido habitu non potest: debent enim quæ putrescunt tum calida humi- & aque esse, in calido humidòq; loco manentia, tum verò difficilem transpirationem habere, vt scriptum est 9. & 11. meth. meden. cap. 3. & 4. Quapropter cum in totum corpus diffusa putredo sit, toti etiam corpori per contraria est succurrendum, atq; ob id mittendus statim, morbo incipiente, sanguis est, vbi reliqua prius dicta consentiant, tam si putredinis causæ adsint, quàm si non adsint: hæc enim vniuersum corpus æqualiter euacuat. Vbi verò de tractus sanguis fuerit, neque etiam particularibus vtendum est topicis medicamentis, vt providentia habeatur eorum viscerum, quæ in medio sunt corpore, præsertim si relaxantia remedia fuerint, quippe deusta immo dico calore viscera, etiam amplius deurrunt, & torrentur ab eiusmodi medicamentis: talem namque providentiã illi duntaxat requirunt, quibus in vna particula putredo consistit, si tamen ij quoque sanguinem prius miserint, vt dicemus, reponi tamen debet aliquid sanguinis ad curationis spatium, quò minùs intempestiue nutrire necessitate vlla cogamur. Quamobrem eadem venæ sectione moderatè vtendum erit, & siquid defecerit iteratione potius supplere, quoniam, vt aliàs dictum est, nec obstructio, nec putredo curari per sanguinis missionem potest, vt quæ alia remedia desiderant. Deinceps quæ putruerunt expellenda sunt per vrinas, aluum, & sudorem, quòd si ad os vetriculi aliquando sua sponte impetum capiant, etiã per vomitiones, aliter autem non est quòd ea præter naturam irrites, quæ verò dictas vacuationes promoucant, superius annotauimus, vniuersum quoque corpus vbi vacuum fuerit, rarefacere expedit medicamentò aliquo, qui calor insit tepidus, cuiusmodi est quòd ex chamæmelo conficitur, vt inquit Galenus, insuper & frictions ipsæ in vniuerso corpore conducunt: quo etiam tempore si vinum quoque aquosum bibatur, id omnes vacuationes promouet, idem faciet & temperatum dulcis aquæ balneum, præsertim vbi magnitudo febris non obstat, quo casu vbi cetera omnia consentiãt, aqua frigida pota in his febribus est aptissima. Ad eundem verò modum, & cæteras naturæ ex putredine febrium differentias, sanari conueniet, nempe, sicut prius dictum est, indicatione tum à cõmuni ipsarum genere, tum à cuiusque propria differentia desumpta. Quapropter si in vna parte quapiam putredo inuaserit, præter indicationem, quæ à communi harum febrium genere sumitur, propriam habebit, quòd illi particulariter adhibenda iam dicta sunt remedia. Verùm non easdem omnes partes, vacuationes, medicamentave requirunt, cū & temperamentis, & posituris, & forma, seu figura, & omni denique constitutione, naturaque inter se disideant, ob id præter id quòd particularim affectus indicat in hac febrium differentia, adicere necessario oportet, eas nimirum quæ ex curandis ipsis suggeruntur particulares indicationes, vt eod. vñ. decimo de meth. med. liquet cap. 75. Atqui priusquã

vires prohibeant: leuata nanque, vt ipse inquit, quæ scens concitat humor, vbi præsertim nec ætas, nec nũs modo, verum etiam aliis omnibus, quas putredine locò, in febribus venam incidere, non contulida, etenim saluberrimum est, eodem Galeno teste sint, & quæ parti adhibentur medicamenta, sint ca- & secabis primò, potissimum vbi causæ putredinis ad- & adhibenda sunt, quapropter in his quoque venam ris, haudquaquam affecta parti iam dicta remedia sanguinem miseris, vniuersumque corpus vacuaue- & corpus nostrum regit natura, exonerataque eo quo veluti sarcina premitur, haud agrè quòd reliquum est, vincet, itaque proprii muneris haud oblita, & coquet, quòd cõcoqui est habile, & excernet, quòd potest excerni, & Paulus cap. 17. secundi lib. inquit, si vires sunt validæ, ei qui ex putredine febricitat, sanguinem demittes protinus, modò cruditas ven- & triculum non infestet. A venæ sectione ei parti quæ putredo inuaserit particularim remedia adhibenda sunt, prout vsus requirerit, ac ea quæ narrauimus ex- & postulant, atque ab eadem putredo euacuanda erit, quanquam nec easdem vacuationes, nec medica- & menta alia omnes eadem partes requirant, sed pro earum diuersitate, diuersa, consistit autem earum di- & uersitas in temperamento diuerso, diuersaq; actio- ne, nec non figura, & situ, & tarditate, seu acutie sen- & sus, vt septimo de meth. med. cap. vlt. scriptum est, à quibus omnibus, sumptis etiam indicationibus di- & uersis pro earum diuersa ratione, poteris iam dictis medicamentis rectè vti. A laborantis loci temperie quidem sumenda indicatio erit, etenim calfaciendi, refrigerandi, siccandi, humectandi, vel aliquid ho- & rum coniunctè cum alio faciendi mensuram præ- feribit, quemadmodum superius de vniuerso cor- & poris temperamento scriptum est, ob id quacumq; calidiores natura partes, ex frigore laborant, ea li- & beralius & diutius calefieri postulant, sicuti etiam quæ frigidiores natura sunt, si ex calore laborent, refrigerari, & sicciores siccati, & quæ humidiores na- & turaliter sunt humectari, vbi illa ex humiditate, hæc ex siccitate laborent, contrà verò pars quæ calidior natura est, si calido morbo ægrotat, exigua breuissq; & temporis refrigeratione eget, sicut quæ frigidior est calefactione; ita quoq; sentiendum erit de reliquis intemperantiis, etiam si coniugata fuerint, quippe eatenus redeat ad naturam eorum quòdq; necesse est, quatenus à natura recessit, ac veluti quadam via & retro feratur, quæ in diuersum agat ei, quæ facta est in ipso transmutationi, vnde etiam minùs pericli- & tantur quicunq; cognato suæ naturæ morbo labo- rant, vt inquit Galenus eod. 7. de metho. med. & decretum reliquit Hipp. apho. 34. secundi lib. quip- & pe cū priusquã ad propriam naturam particula redeat, nondum curationi impositum finem ar- & bitrandum, atque ita quidem à temperamento la- borantis partis auxiliorum indicatio sumitur, in hac etiam putredine curanda, quæ in vna parte consi- & stit: etenim, vt dictum est, eorum mensuram præ- scribit. A facultate item seu functione laborantis partis sumitur indicatio, ob id q. actio eius, omnib- & animalis partibus utilis sit, aut paucis quibusdã; aut vni sibi; in his tamen intemperiei generibus, quæ ex humoribus sunt orta, nanq; in iis quæ ab ijs hu- & more infestant, vtiq; nihil ex hoc scopo sumitur, qua- & licet, prout affectus suadebit, sed tamẽ etiam virtuti attetus, si necessarium opus eius sit, omnibus ani-

Vene se-
ctio omni-
bus febril-
bus putri-
dis compe-
tur.

Ca. supra-
citato.

Indicatio
à functio-
ne partis.

Partium di-
gnitates.

Partium
dignitates.

Indicatio
sua.

A figura.

A sen-
su partium
acutis vel
hebetudi-
ne.

malis partibus, veluti ventriculi, & iocinoris, non levis habenda sollicitudo de robore virtutis est, ne hanc dissoluas, magna semel vacuatione usus, ergo in illis quamprimum vacuare redundatiam licebit, prout volueris, ex ventriculo verò, & iocinore ut-
cunque vacuare non licet, sed cum cautione, ut ne-
quid virtuti officias. Quoniam autem non par est
actionum dignitas ad ægros seruandos, sed alig ma-
gis iis, aliæ minus viles sunt, utique ad portionem
actionum dignitatis etiam cuiusque partis, prospici-
endum est robori. maxima namque est cordis offi-
cij dignitas, atque agrotantibus maximè omnium
necessaria, cerebri verò ad vitam quidē par est mo-
mentum, non tamen par robur eius in agrotis re-
quirimus, cum necesse omnibus non sit neruorū ac
musculorum opera uti. itaque abundē fuerit, si tan-
tum eius seruatum sit, quo respirationis munus sit
obeundum. At verò iocinoris opus, omnib. particu-
lis per necessarium est, non tamen adeo saltē perpe-
tuam necessitatem habet, sicut ipsius cordis, ad por-
tionem autem iocinoris, etiā ventriculi opus se ha-
bet. Intelligens ergo omnium particularum tū fun-
ctiones, tum usus, haud difficulter inuenies quan-
tum cuiusque robur, in vacuationibus custodiri o-
por-teat, ut liquet citato septimo de meth. meden. ac
idem particulatim seruabis, vbi putredo in earum
aliqua consistat, quæ vacuatione indigeat. A situ in-
super earumdem partium indicatio dabitur, tum ad
solidarum intemperies, tum etiam ad succorum vi-
tium, sanè nō levis: nam per quæ vacuare oporteat,
atque quomodo ipse præcipue demonstrat. qui enim
pro summa corporis intemperie laborant, iis me-
dicamenta quæ intemperies requirit, applicabimus,
quibus autē in profundo corpore intemperies est,
in his rationem interualli inibimus: nam si medica-
mentis quæ intemperies requirit vtare, utique mul-
tò imbecilliora, quàm pro usu ad locum affectum
peruenient. Ad vacuationes quoque nonnihil situs
indicat, dum societatem laborantis particulæ cum a-
liis docet: nā nisi illud cōpertum haberemus, quod
cauo iocinoris subiicitur ventriculus, & ieiunum,
tum quod ieiuno ipsi tendē intestinum succedit,
id verò colon excipit, ac colon quod rectum appel-
lant, utique inuenisse illud non liquisset, quod iecur
& per aluum, & per vomitum expurgari possit: quā-
quam aprior sit prior vacuatio, tanquam vñ iam
callentibus intestinis iocinoris superflua tolerare:
A figura. A figura verò partis, ipsius quoque modi vacuandi
excrementi indicatio suggeritur, ad hunc modum,
ventriculus vomitu, deiectionēque inanitur, inte-
stina deiectione tantum, sicut etiam & iocinoris e-
uacuatio aptius quidem, renes verò & vesica, ac io-
cinoris gibba, si multo vitioso succo sunt referta,
per deiectiones, & pharmaca deiectionaria expurgan-
tur, sin mediocri, per vrinales meatus. Cerebrum
verò per palatum & aures: pectus & pulmones per
asperam arteriam & fauces. Non aspernanda autem
ea indicatio erit, quam sensus partium acuitas, hebe-
tudoque suppeditant, quando omne medicamen-
contemnunt, quæ tardi sunt sensus, etiam si non le-
uiter mordeant, at quæ acuti sensus, earum vires do-
lore resoluuntur. Expedit igitur has nec confertim,
nec semel valentibus auxiliis mederi tentes, sed tu-
to potius in tempore. vbi verò tardus est sensus, in
iis etiam celeriter obire quod iustum est, licet se-
mel vsis remedio, quod sit idoneum. si verò quispiā
hanc indicationem reponat in ea, quam ex virtute

partium desumimus, nihil quantum ad rectē meden-
dum errabit, quemadmodum etiam si quis eam velit
illis quatuor, quas ante memorauimus, quin tam an-
numerare, ut secūdo libro de arte curatiua ad Glau-
conem, à Galenō scriptum est. Has itaque omnes
indicationes memoria habere oportet, in quacun-
que particula, nedū putredine, sed quouis alio mor-
bo affecta, communi tamen perpetuò indicatione
seruata, quam ex ipso affectu semper affumendam
esse docuimus, & hoc non ab re. nam partis tempe-
ratura, & facultas, seu virtus, formatio, & situs, ac
facilitas, seu difficultas ad sentiendum, singulas quæ
in nobis sunt operationes commutat. Nihil igitur
in curationibus præterire oportet, præsertim earum
februm quæ ex putredine excitentur, & put-
redo in vna determinata parte cōsistit, ne nosmet-
ipsos decipiamus, in eum incidentes sermonē, mor-
bus quidem curatus est, homo autem obiit, quod à
quampluribus quotidie factitari videmus. Harum
autem indicationum quædam à parte tanquam ead-
em similari existente, quædam verò quæ instru-
mentalibus, non quæ similari exsistit, capiuntur. Sunt
& aliæ quæ tum vt instrumentales, tum etiam vt si-
milares communes sunt, vt similares quidem consi-
derata, secundum propriam naturam, ac tempera-
mentum indicat, vt instrumentalis, ex eius figura,
tum positione, indicatio sumitur. si verò eam ac-
tionem inspexerimus, præterea, an rara sit pars, an
densa, an acuti, vel hebetis sensus pars ipsa, tum vt
instrumentalis, tum vt similari indicabit. Sunt e-
nim hæc vtrisque cōmunia, vt 13. de metho. medi-
liquet. Hoc itaque est illud quod Gal. innuere voluit
11. lib. eiusdē operis, narratis indicationibus omni-
bus, quæ ex curandis affectibus sumuntur, pro ha-
rum febrium sublatione, cum dicebat: [siquidem
hic iam desinant, necessarium est indicationes, quæ
ex curandis sumuntur affectibus, post has verò eas
nimirum, quæ ab ipsis curandis suggeruntur parti-
culis, pro iam dicta methodo sumemus.

Putredinis in quapiam parte existentis circa phlegmo-
nem, & cum phlegmone curatio. Caput XLV II.

Putredinis in quapiam parte existentis, quæ in vna par-
te consistit, duæ sunt differentie: nan-
que alia est quæ cum phlegmone cō-
iungitur, alia quæ sine hac exsistit, à
quibus etiam diuersæ oriuntur indi-
cationes. Deius utique postremo differere opus est,
pro complemento vniuersæ methodi de curandis
febris ex putredine ortis, quanquam in his etiam
ipsis alia sit indicatio, præsentē adhuc effectrice cau-
sa, alia verò hac sumpta, de quibus iam abundē
sermonem fecimus, quo loco studiosi has petant in-
dicationes: sunt enim omnibus communes febrium
particularibus differentiis, quæ ex putredine na-
scentur, tanquam primæ & vniuersales existentes,
veluti etiam illæ, quæ ex propria natura putredinis
pullulant. Verum vbi absque phlegmone in parte
quapiam putredo consisterit, nullam aliam particu-
larem habebit curationis indicationem, præter eam
quæ modò à nobis dicta est, de ea putredine quæ in
vna parte consistit, distincta aduersus eam quæ per
vniuersum corpus diffusa est; est verò ea, quod ci-
dem parti & non aliis, neque vniuerso corpori me-
dicamenta adhibere oportet; hoc igitur duntaxat
præter alias communes putredinis indicationes de-
siderat putredo, quæ in vna parte cōsistit absq; phle-
gmone,

gnone, quanquam simul cum eadem modo dicta à nobis indicationes, quæ à partibus ipsis affectis capiuntur, spectandæ sunt. At si cum phlegmone conjuncta putredo fuerit, necessariò cum his quæ diximus indicationibus, eas quæ à phlegmone ipsa capiuntur pro eius curatione, considerare oportebit. Est verò phlegmone quæ totius generis nomen accipit, atque inflammatio nominatur (de qua etiam verba facturi sumus) morbus tum in quantitate, tum in intemperie, vt liquet libro de inæquali intemperie, & 13. de method. meden. Consistit autem omnis è sanguinis confluxu, qui statim calidior est quam pro natura fuit, omnibus certè in ipsa parte quæ phlegmone vexatur: calidior efficitur, vt eodem 13. de metho. medendi, scriptum est. Quò fit vt etiam curationis indicatio omnibus sit communis, nempe euacuatio redundantis in particula phlegmone obfessa, sanguinis: quoniam momentum omne curationis laborantis phlegmone partis, in redundantis in ipsa sanguinis vacuatione consistit, eodem Galeni teste citato loco. Hic etenim earum primus scopus est, euacuatio videlicet humoris, qui in parte phlegmone conflata grassatur, ex sententia eiusdem libri de constitut. artis medic. & tertio de temperamentis. Hoc itaque modo, licet duplici ratione à natura recesserit, & quòd pars ipsa videlicet, multo sanguine sit referta, & quòd eadè sit calidior, curare eam oportet: nam immò dicè calida, non statim ab initio, sed tempore fit inflammata pars, vt liquet libro de tumor. præter naturam: & propterea particula, quæ per phlegmonem ex calida est vacuationi, omnino succedit refrigeratio. ergo cum duplex in his, quæ à phlegmone laborant particulis, affectus sit vnus quidem in quantitate, ex superuacui naturæ modum exeuntis abundantia, alter in qualitate qui ex caloris spectatur ratione: sequitur prioris eorum curationem etiam posterioris curatio, fiuntque ex accidenti quæ vacuant, calentis materiæ remedia, & inflammationis particularum, seu feruoris refrigeratoria, vt eodem libro tertio de temper. scriptum est. Nec obstant Galeni verba libro de differentiis morbor. quæ propter eorum ob intelligentiam omnes (quos viderim) tum barbaram sectantes medicinam, tum etiam eos qui Galen. doctrinam profitentur, deceperunt. Arbitrantur enim citato loco Galen. velle, inflammationem primò morbum esse in intemperie, & deinde in magnitudine, seu quantitate. At si ea diligenter perpèdissent, ac intellexissent, percepissent vtique Galen. quiduis aliud potius subiungere voluisse, quam id quòd ei tribuunt. Nam proponens se velle differere de compositis morborum differentiis relictis eis secundum priorem suppositionem, volens eos determinare iuxta secundam suppositionem, assererebat in vnaquaque similari particula, qualitatibus naturæ modum egressis, quatuor numero esse compositas aggritudines, profluente verò ad ipsas aliqua substantia, adhuc pariter esse quatuor alias. Et quoniam continuitatis solutio non tantum in compositis instrumentis, sed in simplicibus quoque particulis fit, inquit ipse, quòd cõplicabitur & hæc nuper dictis iuxta veranque suppositionem, compositis aggritudinibus, & simplicibus iis, de quibus statim ab initio sermonem habuimus. Nam fieri potest vt idem membrum, & vlcus patiatur, simul & siccitatem habeat, aut humiditatem, vel frigiditatem, vel caliditatem præter naturam, aut vnà cum vlcere,

caliditatem simul atq. humiditatem. & demum subdit: [quæ igitur exulceratæ sunt partes & inflammantur, tripliciter ab eo quòd secundum naturam est, discedunt: propter exulcerationem quidem vnitas deperditur propriarum partium, quoniam autem inflammantur, calidiores & humidiores, eo quòd secundum naturam est, efficiuntur: tumor enim in ipsis, quando in tantam quidem magnitudinem attollitur, vt lædere operationem possit, propter hoc ipsum iam morbus appellandus est, aliter verò symptoma, & pathema tantum, quæadmodum & dolor. Omnia igitur quæ simul inflammantur atque vlcera sunt corpora, tres quidem necessariò, nonnunquam verò & quatuor aggritudines patiuntur.] Hæc sunt Galeni verba fideliter ex Græco codice translata citato libro de differentiis morborum. Ex quibus clariùs luce liquet, nunquam Galen. asseruisse inflammationem primò morborum esse in intemperie, & deinde in magnitudine, seu quantitate: sed bene falsus est, quòd exulcerata pars similis inquam (nam de huius generis morbis verba faciebat) poterat simul simplicem intemperiem, quandoque compositam habere, vtputa caliditatem simul & humiditatem: hoc est, ob calidam & humidam intemperiem præter vlcus laborare, id quòd accidit quando partes ipsæ inflammantur, ait, & non inflammata sunt, vt isti credunt: tunc enim tripliciter naturæ modum egrediuntur. Nam ob vlcus vnitatem admittunt, cum verò inflammantur, calidiores & humidiores, eo quòd secundum naturam est, efficiuntur. hoc etenim tempore partes verè inflammata ac inflammationem pati, haudquaquam dicentur, sed inflammari duntaxat, propterea quòd ex calida & humida fluxione, calidiores quoque & humidiores efficiuntur; & propterea partes vlcerè affici, insuper & calida & humida intemperie, quæ ratione tripliciter naturæ modum egrediuntur, quoniam propter vlcus, propter calidam, & tertio propter humidam intemperiem: quæ quidem intemperies, licet composita sit, calida videlicet & humida, ac genita à calida & humida substantia influente, non tamen propterea pars verè inflammata dicetur, sed bene compositum erit vlcus cum calida & humida intemperatura. Si verò præter iam dictam compositam intemperiem tumor accedat, veluti symptoma, & pathema tantum erit ipsius partis quæ inflammatur, quemadmodum & dolor: quo etiam tempore neque inflammatio dicenda erit, neque partem inflammatione laborare, nisi ad tantam magnitudinem attollatur, vt propter hoc ipsum lædere actionem possit: læsio enim actionis (vt idem Galenus inquit libro de tumoribus præter naturam, circa principium) est terminus excessus præter naturam tumorum. & hoc tempore verè & propriè inflammata pars dici poterit, & partem quadruplici morbo laborare, asserimus. Nam priusquam ad hoc deueniret, nequiquam inflammationem genitam esse, neque partem inflammatam asserere licebit, quemadmodum ipsemet se exponens post dicta verba explicabat, quidnam eo loco inflammationem appellaret, quoniam renitentem, ac rubescentem, dolorificumque tumorem; adeò vt si quid horum deerit, inflammatio appellanda non sit. potest itaque pars aliqua exulcerata intemperie calida & humida laborare, ac eo tẽpore eam quodammodo inflammari dicemus, nunquam autem inflammata esse verè & propriè inflammatione dicta;

Phlegmone
primò mor-
bus est in
quantitate,
deinde in
intemperie.

Curatio pu-
eris in phleg-
mone. Cap. 3.

Cap. 1.

Curatio
omni-
um mor-
borum. Cap. 2.

Indica-
tio mor-
borum. Cap. 3.

Cap. 17.

Cap. 5.

Cap. 2.
Indica-
tio mor-
borum. Cap. 3.

Vacuatio
per acciden-
tes refrigerat.
Cap. præ-
ter.

Cap. 12.
Gal. mens-
ura loco de
clarantur,
quem male
multi intel-
lexerunt. vn-
de vacua-
tione non
est primò
sopum con-
cluebant.

Curatio pu-
eris in phleg-
mone. Cap. 3.

nisi prius ad tantam magnitudinem pars attollatur, ut per eam operationes laedantur, & deinceps immodicè calida & humida fiat, quemadmodum ubique locorum disseruisse Galenum compertum est. Nec quicquam referi si inflammationem eo loco dixerit morbum esse primorum seu similiarium corporum: nam licet simile aliquod corpus primò ab ea oblādatur, secundariò verò & ex accidenti totum instrumentum, non tamen ipsum offendit ut simile est, sed ut partem constituentem totum instrumentum, cum ex ea distendatur, & in tumorem attollatur primò, ex quo totius instrumēti constitutio oblādatur, & propterea totius instrumenti, & ex accidenti morbus dicitur. Hoc igitur modo Galeni verba citato libro de differentiis morborum, exponenda sunt, quæ, ut mea fert opinio, hucusque à nemine, quos viderim, fuere intellecta. Non ab re itaque primus, præcipuus, ac proprius eius curationis scopus, est vacuatio. Atqui vacuatio hæc duplex excogitata est, aut translato ad alias partes, qui in ægra continebatur sanguine, aut foris à corpore expulso. satius profectò erit utraque uti, ut inquit Galenus, observantibus diligenter, ne qua ex accidenti læsio sequatur. Cum verò gemina sit dictarum vacationum utraque, quadruplex in vniuersum nascitur vacuatiū auxiliorum genus, translationis enim sanguinis ad alias partes vnum genus est, ubi ipsa pars quæ phlegmone laborat, sanguinem abigit, alterum cum ea quæ integræ sunt, ad se trahunt, eius autem quæ extra corpus educit, alterum sensibili effluxu, alterum ratione tantum contemplabili perficitur. Cum itaque observare oporteat diligenter ne aliqua ex accidenti læsio ex eisdem vacationibus sequatur, propterea eis quæ tutiores sunt euacuationibus, in principio vtendum erit, geminis videlicet iam dictis, à quibus sanguinis translatio ad alias partes efficitur, tam si ipsa laborans phlegmone pars sanguinem abigit, quam si alia quæ integræ sunt ad se trahant: ex reliquis nanque duabus læsio ex accidente sequeretur, ut dicemus. Trahunt autem ad se quæ integræ partes sunt, aut venæ sectione inanita, secta videlicet ex eisdem partibus vena, aut fortibus adhibitis vinculis, seu applicatis cucurbitulis, potissimum ubi cum parte phlegmone tentata communiter habeant. Repellunt autem à seipsis partes quæ phlegmone laborant sanguinem, infrigidantibus atque adstringentibus medicamentis adhibitis, tum quoniam id quod influit, ex eisdem inhibetur, tum etiam quod ex accidenti partes ipsæ corroborantur, ut minus promptè diffluentem in se recipiant sanguinem, ac quod in eis continetur promptius à seipsis abigant, ut II. & 13. de metho. medendi, decretum est. ob has itaque causas primò repellentia adhibemus, quamuis ex accidenti partes ipsæ ex eisdem roborentur, ut minus promptè recipiant excrementa, non propterea quod eisdem densentur ac constringantur, quemadmodum methodici sentiebant, sed quoniam morbi causa ab eisdem primò repellitur, ad cuius expulsionem necessariò partis roboratio consequitur, vnde minus promptè affluentem sanguinem recipiunt: quamobrem eisdem quoque medicamentis in inflammationum principio sapienter utimur, tum quod parum est quod eo tempore affluit, tum magna ex parte non ita crassum, tum partis ipsius quæ recipit virtus, nonnunquam valentior, utpote nondum lassata, tū quod in afflicta continetur

parte nondum violenter impactum, & citato libro 13. de method. medendi. restatur Galenus & libro 11. eiusdem operis, idonea esse in principiis adstringentia duplici ratione asserbat: & quod robur affectis particulis inferunt, vnde minus promptè affluentem excrementorum in se recipiant, & quod eorum quæ in iis iam contenta sunt, tenuissimum extrorsum exprimant. quæ de re licet quod impletum est vacuetur, non modò medicamentis iis quæ digerunt, sed etiam quæ adstringunt & refrigerant, magis profectò ad incipientes phlegmonas frigidis adstringentibusque, quam iis quæ digerunt, est vtendum, atque magis ubi quod confluit, crassum nō sit, cum neque partem phlegmone obsessam calfaciat, neque ad eandem trahant, veluti ea quæ digerunt. Inter hæc verò vacuantia, per quæ translatio sanguinis ad alias partes efficitur, ea præferenda sunt, quibus integræ partes ad se trahunt paulò ante à nobis conscriptæ, quanquam interim quoque purgatione ubi opus fuerit uti poteris, deinceps verò frigidis adstringentibusque medicamentis vtare, licet ubi admodum exigua inflammatio fuerit, priusquam corpus vacaueris, eisdem quoque medicamentis uti poteris, nedum in hac inflammatione, verum etiam in aliis quæ ex vitiosis sunt humoribus. Siquidem, ut inquit Galenus 14. de meth. medendi, exiguum vitiosum humoris etiam siquis ad viscera & magnas venas retrudat, nullum profectò quod sensu percipiatur, malum committet, ac si eius non levis quantitas sit, in princeps aliquod membrum aliquando procumbit, ubi prius totum corpus vacuatum non fuerit, quod quidem tutius esse arbitror, ut molitur in quacunque inflammatione. His itaque auxiliis in inflammationis principio pro eius curatione vtare. Si verò sanguis in particula quam phlegmoneprehendit vehementer est impactus, non est amplius repercutientibus vtendum, sed tum digerere est tēpestivum: etenim in phlegmone tantisper est refrigerandum, quatenus & ad incrementum eius sistendum inhibendumque est cōmodum. sistunt autem ac inhibent inflammationis incrementum refrigerantia & adstringentia duplici ratione, & quod immoderatum extinguunt colorem qui dolorem excitat, & quod repercutiunt id quod affluit, ac quippiam ex eo quod in laboranti membrum continetur, in proximas partes repellunt, id quod phlegmones iam factæ medela est, ut diximus. Simili etiam modo ubi sanguis in parte quam phlegmoneprehendit, vehementer fuerit impactus, & quæ modicè excalfaciunt, utraque ratione profunt, verum transacto principio, ac corpore prævacuato, quoniam & dolorem sedant, & quod contentum in laborante particula est, digerunt: quippe dolorem mitigando augeri phlegmonas vetant; digerendo quod earum iam impactum est, easdē sanant. Dixi autem non ab re his vtendum esse medicamentis post inflammationis principium, totòque etiam corpore prius vacuato, quippe cum particula quam obstructio, aut putredo, aut phlegmone obsedit, febris ipsius veluti focus sit. Ergo cum huic, propter calorem sua sponte trahenti, alia quæpiam occasio extrinsecus, ex iis quæ potestate excalfaciunt accessit, necesse est affectum intendi, ut liquet eodem 11. meth. meden. cap. 15. in incremento igitur cōmodè digerentibus vtendum est medicamentis, præsertim ubi quippiam amplius non affluat, nec repelli quod in laborante particula cōtinetur, possit, utpote quod violen-

Phlegmone
similiarium
par. primò,
totius in-
strumenti
per acci-
dent.

Vacuatio
duplex.
13. meth. c.
19.
Utraque
vacuatio.
gemina.

Translatio
sanguinis
duplex.

Cap. 15. &
cap. 6.

Foris
aliqui
tūc
cipiunt
mat.

Purgat
ne
accidat
quidam

Cap. 14.

Digerunt
in partem
vitiatam

Indicati
us sunt
de a pa
afflicta.
cap. 46.

Indicati
duplex
phlegmones
que ad
su.

violenter impactum ac crassum sit. Verum ubi fluxio non prorsus confluxit, repellere simul ac digerere hoc tempore conuenit, quamuis digerere magis, repellere autem minus, & ob id cum his quæ digerendi vim habent, adstringentia quoque miscenda sunt, exigua tamen, ita quod digerant magis, repellant autem minus, tum propter eas quas nuper tradidimus causas, tum etiam quia, ut inquit Galenus 3. de simplic. medic. facul. cap. 17. absurdum planè est semel, vnoque impetu, ab adstringentibus contrahentibusque substantiam, ad laxantia fundentiæque transire, sicut sanè æquum est in intermedio principij statusque spatio, dum videlicet morbi adhuc increscunt, nec planè repellere sicut in principiis, nec itidem digerere sicut in vigore, sed perinde ut morbi conditio media est inter contraria, ita medicinâ quoque mediam esse oportet, quæ videlicet non vt in principiis adstringat, nec vt in vigore digerat: quanquam semper vtrique miscantur oportet, & quæ repellendi, & quæ discutendi facultatem habent, nisi quando fluxio prorsus confluxit, & corpus vacuum fuerit. tunc etenim ad digerentem seu discutientem facultatem tuta est accessio, præsertim in vigore, & in inclinatione, quo tempore magis relaxantibus & digerentibus vtendum est, sicut in primis incurfibus infrigidantibus, ac repellentibus, vt liquet 1. de comp. med. per genera. cap. 4. hac igitur vacuationis specie in modo dictis inflammationis temporibus, quæ ratione tantum contemplabili ex ægra parte sanguinem euacuat, qui in inflammatione continetur, non autem in principiis earum vtilis erit, propter eas, quas nuper causas assignauimus interdum solis eisdem medicamentis vtentibus, quæ digerendi vim habent, interdum cum his quæ infrigidant & adstringunt permixtis, prout vsus requiret, & nos determinauimus. Ea autem vacuatio quæ extra corpus educit eundem sanguinem in phlegmone contentum, sensibili effluxu, vltimo loco molienda erit, quo videlicet tempore aliæ vacuationis species non satis fuerint. Ac tales quidem omnes phlegmone communes medicationes sunt, variantur autem pro laboratium particularum ratione. quapropter memoria tenere oportet semper cunctas, quas narrauimus indicationes, quæ ab ipsis affectibus partibus capiuntur: si etenim easdem inflammationes in quacunque parte fuerint excitatæ, rectè curabis. nam si quis eam quæ à partibus ipsis præstat indicationem adiumat nihil obstat quò minus medicinâ non sex mensibus, sed sex diebus totâ perdiscas, ut inquit Gal. eod. 13. meth. med. c. 20. quamuis nec si quæ à partibus sumitur, indicationem adicias, vt ipse inquit, iam totum quod exigitur ad curationem habeas, nisi etiam methodos de medicamentis didiceris. itaque eas agrediatur oportet quisquis consummate sanaturus est morbos. Vbi verò phlegmone in generatione adhuc sit, gemina oritur indicatio, veluti in reliquis morbis omnibus, quicunque in gignendo adhuc sunt, & causam habet, ostendimus, atque idcirco non simplicem, sed compositam esse totam, de iis agitudinibus quæ in generatione adhuc sunt, medentis sollicitudinem oportet, ex ea scilicet quæ providet, & ea quæ curat, eodem Galen. auctore citato lib. 13. de method. meden. cap. 2. quæ igitur causæ phlegmonem accersere videntur, has cum in corpore sint coceptæ, vtrique ne maiores fiant, cohibere conueniet, atque hoc præcauentis phlegmonem est officium, cum verò ea magnitudine sint ut iam phlegmonem

creent, eas summouere oportet, ac quantum iam phlegmone genitum est, sanare. itaque cum adhuc in generatione phlegmone fuerit, in ea, prior vacuationibus quas supra retulimus, confluentis ad affectum locum sanguinis, fienda est inhibitio. inhibebitur his commodè si ipsam fluxionis causam inuenerimus, ut idem Galen. inquit. est autem ea duplex, aliquando ex ipsa parte quam phlegmone vexat, orta, aliquando ex alia quapiam, aliisve. ex ipsa quidem quoties aut calidior est facta, aut dolore vrgetur non ex ipsa, quando vel ab alia quapiam parte, vel ab aliis superfluum illi transmittitur, vel etiam ex totius corporis affectu: inuenta itaque fluxionis causa eam primò auferre oportet, ut confluentis ad affectum locum sanguinis fiat inhibitio, ita vt si ex calore proritetur fluxio, idem primo fedetur, si ex dolore, in contrarium quoque alteretur, si verò ab aliquo, vel pluribus partibus superfluum transmittatur, tanquam robustioribus existentibus, aut etiam ab vniuerso corpore, ex eisdem prius vacuatio molienda erit, ac à tanta fluxionis parte reuulsio, & deinceps quod in affecta parte restitit, ac ipsius phlegmone iam genitum est, paulò ante dictis vacuationibus sanare oportet, curationem eandem immutantes pro ipsarum partium tum natura, seu temperamento, tum facultate, seu actione, tum positione seu figura, ac alijs quæ supra narrauimus. Et hæc pro curatione singularum trium differentiarum ipsius putredinis quas proposueramus, hoc est, tam si eius causæ adsint, quam si non adsint, tam si per vniuersa vasa, seu maiora & principaliora fuerit diffusa, quam si vna parte consistat; tam si fuerit cum phlegmone quam contra phlegmonem, dicta satis. Quibus omnibus, si eas quæ à viribus præbentur indicationes adiecerimus, absoluta nobis methodus de febribus omnibus à putredine incensis, sanandis, erit, ut Galen. inquit. Nos verò quæ indicationes à viribus sumendæ sunt, nedum pro febrium omnium, verum etiam quorumcunque morborum curatione, superius abundè descriuimus, quatenus spectat ad auxiliorum inuentiones. Restat modò de eis sermonem facere quod ad victus rationem attinet, id quod statim absoluemus pro complemento huius nostræ methodi de medicandis febribus, si prius rationes quasdam diluamus, quibus iidem iuniores probare etiam nituntur, eas indicationes, quas ab affectibus partibus necessarîo sumendas esse cum Galeno conclusimus, quicquam ad curationem conducere non posse, quemadmodum nec reliqua quæ secundum naturam sunt.

Soluntur rationes quibus quidam probare nituntur quod indicationes quæ ab affectibus partibus sumuntur, ad curationem non conducunt.

Caput XLVIII.

SI natura seu partis temperamentum, actio, seu virtus, situs, positura ac sensus omnia sunt secundum naturam, & propterea nobis familiaria & amica, qua ratione sui cōseruationem & tutelam perpetuò indicat, quomodo possunt curationem, aut remedij genus, qualitatem, locum, quantitatem & vtendi modum, aut quempiam alium scopum, quem in illis obseruare oportet, demonstrare, inquit isti, si modò vnum semper indicare vnum, sit opus, Galeno auctore 9. & 11. de meth. med. cap. 12. & cap. 13. Atqui nos vnâ cum Galen. asserimus, perpetuæ veritatis esse quòd quicquid pro natura

cap. 3.
Fluxionis
causæ.

Superat vna
solum in
dicatio à
viribus: sed
eadem est
in omnibus
morbis.

Indicatio
duplex in
phlegmone
quæ adhuc
est.

A temperamento partium sumitur indicatio, ut ipsum conservetur.

sua indicat, id vnum semper indicabit, seu quod vnam habet naturam: qua etiam ratione faciemus, quodlibet quod secundum naturam est, sui custodiam perpetuo indicare, nec propter aliud ab eo quampiam sumi indicationem, quam propter hunc finem, videlicet ut custodiatur. Quamobrem si Galenus precepit à partium natura, seu temperamento proprio sumi indicationem pro morborum (qui in eisdem excitantur) curatione, non propter aliud illud instituit quam ut earum partium natura, seu temperamentum conservetur ex eis medicamentis, quæ morbum auferunt: etenim eadem laborantis loci temperies medicamentis, quæ pro auferendis morbis adhiberi debent mensuram præscribit, ut liquet 7. de methoden. cap. vlti. quemadmodum etiam de vniuersi corporis naturali temperie superius differuimus, quippe eatenus redeat ad naturam eorum quodque necesse est, inquit idem Galenus, quatenus à natura recessit. item quod nondum curationi impositum finem arbitrandum, priusquam ad propriam naturam particula redeat, idem etiam Galenus testatur, atque ita à temperamento laborantis partis auxilium indicatio sumitur, in iis videlicet intemperie generibus, quæ absque humore infestant: nam & refrigerari, & cal fieri, & sicari, & humectari, & per conjugationem quidvis horum pati singulæ particulae pro morbi portione requirunt, ut citato libro 7. de methodo meden. scriptum est. Nō igitur propter aliud à propria partis temperie indicatio sumitur, pro dictorum iam morborum curatione nisi pro earum conseruatione, id quod indicant, contrarietatis iam dictæ, mensuram præscribentes. Pari ratione à virtute seu partis actione non propter aliud indicatio sumitur, nisi pro eiusdem custodia. etenim ea utilis est in iis intemperie generibus, quæ ex humoribus sunt orta, pro quorum curatione, vacatione aliqua vtendum est: quapropter eiusdem vacationis quantitas ab ea definitur. etenim non adeo vacuandum est ut affectus suadet semper, sed habenda sollicitudo erit, de virtute partium à quibus vacuatur non leuis quidem in iis quæ principes partes sunt, ne hæc (magna semel vacatione vsus) dissoluas, quemadmodum à quibusdam aliis partibus sibi solis inferuentibus, auctacter vacuare licet, prout affectus suadebit, eius tamen virtuti attentus, & quoniam non par est, ut diximus, actionum dignitas ad agros seruandos, sed aliæ magis, aliæ minus viles sunt, utique ad portionem actionum dignitatis etiam cuiusque partis prospiciendum est robori, atque id etiam nō propter aliud quidem, nisi propter ipsius virtutis custodiam. definit itaque actio, seu virtus partis affectus vacationis quantitatem, & pro dignitate eiusdem actionis, seu facultatis, robur seruandum erit, atque maior, vel minor sollicitudo habenda prout magis, vel minus fuerit eius officij dignitas, eatenus admittens vacationis quantitatem, quatenus & morbus

A partis figura indicatio ad ipsius partem custodiam refertur.

soluatur, eius verò virtus seu actio seruetur. Quemadmodum etiam à partis figura, si ipsius modi vacuandi excrementi indicatio suggeritur, non nisi pro ipsius partis natura, temperamento, ac naturali constitutione seruandis, quæ quidem si modo alio vacuaretur, utique destrui necessum esset, ut si ventriculum quispiam non deiectione, aut vomitu, sed per vrinales meatus inanire tentaret, & intestina per vomitum pectus & pulmonem non per asperam arteriam & fauces, sed per deiectiones & pharmaca deiectionaria. Ostendit itaque figura partis affectus vacua-

tionis modum, non nisi propter sui tutelam, & conseruationem: & propterea illud idem semper indicat. Nec aliter etiam & situs earundem partium, nam ab eo indicatio sumitur, tum ad solidarum intemperies, tum ad succorum vitium. Pro solidarum intemperie curanda, metitur quoque contrarietatis mensuram, adeo ut si quis per summa corporis intemperie laboret, ei medicamenta quæ intemperies requirit, applicabimus, si verò in profundo corporis intemperies sit, si his medicamentis vtaris quæ intemperies requirit, utique multo imbecilliora, quam pro vsu ad affectum locum peruenient: & propterea affectus non curabitur, nec affecta pars ad propriam naturam redibit. erit itaque fortioribus vtendum interualli rationem habentes. quandoque verò ubi medicamen affectum locum non attingat sua natura, admiscendum est aliquod, quod quidem dux veluti via sit: Ad succorum etiam vitium si non nihil situs indicat, societate laborantis particulae cum aliis docens, non alia ratione indicabit, quam pro eiusdem partis conseruatione: hac etenim ignorata vitiosos humores per conuenientia loca vacuare ignorabimus, quos si vacuare per alia loca quispiam tentaret, utique eiusdem partis substantiam, temperamentum, ac vniuersam constitutionem destrueret. Ad quodcunque itaque cōducatur indicatio quæ à situ datur, pro morborum sublatione, nō propter aliud conduceretur videtur, quam pro ipsius affectus partis custodia. Similiter & eiusdem partis sensus acuitas siue hebetudo pro viribus partium custodiendis, & non ob aliud indicant. nam quæ acuti sunt sensus partibus, si iis vtaris medicamentis, quæ non leuiter mordeant, earum vires dolore resoluuntur, inquit Galen. quapropter expedit has non confertim, nec semel valentibus auxiliis mederi, sed tuto potius in tempore, in iis verò partibus quæ tardi sunt sensus, seu hebetis, celeriter obire quod iustum est licet semel vltis remedio quod sit idoneum, propterea quod ab eo vires dolore non resoluuntur. ergo pro custodia virtutis earundem partium, indicationem sumimus ab acuitate & hebetudine sensus earum, ita ut propter ea ea admittant medicamenta, à quibus curari affectus valeat, vires autem haudquaquam soluit, ea verò non admittant à quibus virtutis substantia eiusdem partis aut dissipetur, aut immodicè alteretur. Sunt itaque dictæ indicationes ad curationem necessariae, & quamuis non vno eodemque modo ad affectus sublationem conferant, ut diximus, in hoc tamen omnes cōsentiunt, quod quicquid indicant, licet conferat ad eorum morborum sublationem, qui indeterminatis excitantur particulis, nam iis neglectis, curari nequeunt, tamen non propter aliud indicant primo & per se, quam pro earum partium tutela, ac custodia, naturæ videlicet, seu temperamentis, actionis, seu virtutis, & omnis denique earundem constitutionis. Nunquam igitur Galen. sui obliuiscitur, perpetuoque de eadem re, diuersis etiam in locis idem tradit, & posita principia semper seruat, ac tuetur, quamuis quandoque pro diuersa de qua agit tractatione, diuersa quoque afferere videatur, iis potissimum qui parum in eius doctrina sunt exercitati, ac perperam eiusdem verborum sententiam interpretantur: quò sit ut nimium etiam audaces sint in calumniando Galeno, ad contradicendum potius quam ad veritatem inuestigandam laborantes.

Quibus

Quibus potissima ratione vires custodiantur, ac quomodo vestiganda sit nutrimenti quantitas.

Capitulum XLIX.



VM necesse sit vitam, aut ipsas esse vires, aut earum actiones, nihilque ipsa vita prius in animatis corpore esse possit, propterea quod nec sanos esse citra vitam licet, eadem propterea omnium praeae custodiendae hominibus sunt. etenim has vires seruare, nil planè est aliud quam vitam seruare, ut liquet ex Galen. 9. de metho. medend. Quid verò per vires intelligere oporteat, fusiis in praecedentibus differuimus; nunc autem in memoriam iterum reuocemus, quibus, quòve rationibus vires seruari possint, quò id quod deficit in his quae diximus, pro viribus seruandis in aegris hac febre laborantibus, exactè definiamus, postquam & sanis & aegris adeò necessariae sunt, ut sine ipsis viuere non valeamus, nec quicquam conducere à morbis febribusque liberari, ipsis haudquaquam seruatis. Seruantur autem potissima ratione vires, ex eo quod de substantia earum vel inanitum, vel alteratum est corrigendo, secundo loco ex prohibendis iis, quae ipsarum substantiam vacuare, alterare possunt, ut 9. de metho. meden. scriptum est. Atqui quo pacto seruari ipsae debeant hoc secundo cōseruationis modo superius abundè cum Gale. demonstrauimus, quando vires ipsas necessariò cōsiderandas esse pro morborum sublatione, ac ad remediōrum inuentiones, ostendimus. Restat modò differere modum quo valeamus ipsas tueri, corrigendo id quod de earum substantia fuerit inanitum, & alteratum, quod verè & propriè earum est cōseruatio. id verò efficiemus si prius admonuerimus, vires, ut saepius dictum est, perpetuo sui custodiam praescribere, custodiam autem familiam exhibitionem indicare. cum verò virium substantia tum ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum solidis ipsis compleatur, ex iis quae similia sunt, moliri cuique suam custodiam conueniet, spiritui, ex respiratione, ac transpiratione, & qui ex sanguine attollitur, vapore, solidorum verò generi, ex solido nutrimento, carnoso autem per eam naturam, quae in medio humidorum, ac solidorū corporum est, Galen. teste 11. de method. meden. cap. 3. cuiusque autem horum quantitatem, seu modum, ex cōseruandae substantiae quantitate, seu modo inuenies, qualitatem verò ex ipsius tēperie. Cum verò horum cuiusque vel optima temperies sit, vel aliquidatenus vitiosa, quae quidem optima est, semper seruari debet, quae verò omnino vitio non caret, haec in sanis quidem vel seruanda est, vel alteranda, in aegris verò seruanda semper est. ac cum diuersitas non parua sit in partium animalis temperamento, propriam cuiusque mensuram fore eorum, quae ipsi sunt similia, nempe ei quae terrea magis est, eorum quae magis sint terrea, & ei quae humidior est, eorū quae sunt humidiora. ad eundem modum ei quae magis aerea est, eorum quae plus huius substantiae in se habent, sicut calidiori eorum quae magis substantiae igneae participant. hinc materias iam particulares omnes in cibis, potione, aere, & omnibus peragi solitis inueniendas esse decreuit Galen. citato libro 11. metho. meden. quamuis, ut ipsemet inquit, eodem loco, vires ipsas seruient praecipue cibis, potiones, & spiritus, certa mensura, & apta qualitate exhibita. idque non ab re, cum dictum sit eorum substantiam ex spiritu, carnosa specie, ac solidis compleri, atque

ob id iam dictis tribus etiam substantiis seruari, certa tamen mensura, & apta qualitate exhibita. quantum verò ad spiritum, seu aerem spectat, pro febriū curatione, ac spirituosae nostrae substantiae cōseruatione, satis abundè factus est in praecedentibus sermo. Restat modò differere quomodo reliquae duae virium substantiae praecipuae, carnosa videlicet, & solida, per ea quae similia sunt seruari debeant, id verò potissimum consistit in cibis atque potionibus, quamquam & ex iis quoque spiritus nonnihil utilitatis participant, cum ex sanguinis etiā attenuacione, seu vapore praeter aerem nutrantur. De hac itaque mensura seu quantitate ac qualitate victus, seu cibi, & potus, pro viribus ipsis seruandis, verba facere intendimus. etenim cum tota moles animalium in perpetuo fluore sit, ut inquit Gal. 1. de sanit. tuen. cap. 2. in similis altera substantia pro ea, quae defluxit; restituta sit, euaporabitur certè atque dissipabitur vniuersa, nedum in sanis, verum etiam in aegris corporibus, id verò admodum facile non existit, nam cum ars ipsa tota sit magna, non leuissima eius pars est scientia ordinandi victus, inquit idem Galen. 11. metho. meden. cap. 15. nos verò qua ratione inuestiganda sit nutrimenti quantitas in aegris, ac febri laborantibus, vestigabimus primò, deinde quomodo eiusdem qualitas, necnon & opportunū tempus differemus. Et quoniam diximus inueniri quantitatis eius mensuram ex virium substantia, nimirum assumari debet, quemadmodum vires, quae corpus regunt, in his se habeant: quippe cum vires legitimum robur suum habent, & morbi summus vigor breui futurus expectatur, tenuissimo victu vti licet, cum verò infirmiores sint, non licet sine graui noxa, sed adiciere ad nutrimenta tantum oportet, quantum de robore virium est imminutum, atque ex his scopis accipienda quantitas nutrimenti, ut liquet eodem 11. de meth. meden. cap. 5. quibus in verbis clara luce ostendit Galen. nutrimenti quantitatem desumendam esse, tum ex ipsarum virium substantia, spectantes, inquam num robustae, vel imbecillae fuerint, tum etiā ex morbi summo vigore, cum scilicet breui vel lōgo futurus tempore expectatur, nam si qui sunt alij scopi, pro hac victus quantitate instituenda illi coindicare, & non indicare dicuntur, quatenus vires metiuntur, ut aetas, tempus anni, regio, consuetudo, & reliqua huiusmodi. Quamobrem non immerito quispiam quaereret quid intelligat Gal. hic per nutrimenti quantitatem, num molem videlicet, seu copiam eiusdem, an quippiam aliud, quod scilicet ipsum nutrimentum plus, vel minus nutriet? Pro quo animaduertere oportet, quod hoc in loco Galen. vtitur voce Graeca πένος, interim πένος, quod Latine sonat, prima quidem quantus, aliquantus, & quotus, secunda verò quātitas, quamuis (mea quidem sententia voce πένος, hic quodammodo abutatur, volens etiam per eam, quantitatem subintelligere: sed quicquid sit, dicimus nos quod per quantitatem hoc loco Gale. non intelligit multitudinem, seu copiam alimēti, quemadmodum intelligere videntur tum ipse, tum etiam Hippocrat. apho. 14. & 15. primi libri, per voces πένος & πένος, καὶ πένος, hoc est plus & plurimus. etenim iis in locis de multitudine, ac alimentorum copia sermo ab iis sit, quae proportionalis esse debet, & quantitati eius, quod distatur, ac innati caloris multitudini, nisi forte aliquando ex aeris ambientis caliditate fusio adueniens, cogat subtrahere, ut inquit Galen.

Quantitas
cibi unde
petatur.

Coindicam
tia cibi quā
titatem.
Quantitas
cibi quid
sit.

Quantitas
cibi quan-
doque co-
pias apud
Hippoc. &
Gale.

Quantitas
cuius pro for-
ma seu spe-
cie hic sume-
da.

Loco cit.

comment. citati 13. aphorism. & propterea ubi mul-
tus fuerit calor ignatus, & vires robustas, multum quo-
que competit nutrimentum, ubi vero paucus, & vi-
res imbecillae, contra, sed voluit, ut mihi videtur, per
nutrimenti quantitatem Gale. intelligere diuersam
formam, figuram, seu speciem ipsius alimenti: quod
quidem alius in locis significauit per vocem *ῥημα*,
ut liquet comment. aphorism. 7. & 9. eiusdem 1. lib.
id quod eius verba manifestant. ait enim docens nu-
trimenti quantitatem ex quibus desumi debeat: [cum
vires legitimum robur suum habent, tenuissimo vi-
ctu vtendum esse, cum vero infirmiores sint, ad iuce-
re ad nutrimenta tantum oportet, quantum est de
robore virium imminutum.] quod quidem falsum
esset, si de alimentorum copia illud subintelligere-
tur. nam robore virium imminuto adiciere nutri-
mentorum copiam non oportet, neque etiam mi-
nuere, ubi legitimum robur suum haberent, sed con-
trarium efficere, ut in citatis aphorism. precepit Hipp.
Quinimodo in virium imbecillitate parum quidem a-
limenti offerre ipse Galen. docuit, comment. apho-
17. primi lib. quoniam virium imbecillitas non po-
test totam simul multitudinem alimenti substinere;
quod verò per nutrimenti quantitatem quam *πρόσθεν*
nominauit 11. de metho. meden. eiusdem nutrimen-
ti speciem seu formam intelligere voluit, ex qua plus
vel minus corpora nutriuntur liquet apud eundem
comment. citati aphorism. 9. primi libri. ait namque
Galenus, [nunc hoc in loco alterum adiciit scopum
scilicet victus, ut quantitatem declinationis exqui-
sitè noscamus. est autem hic scopus, vis ipsa agrotan-
tis, cuius gratia nutrimus; neque enim morbi gratia.]
& deinde subdit: [cum enim vis ita robusta fuerit, ut
speremus ipsam posse perdurare totum tempus in-
termedium vsque ad summum morbi vigorem cum
tali victus forma, specie, seu figura (victus enim vo-
ce *ῥηματι*) tunc (inquit ipse) exquisitam habebimus
declinationis, quam diximus quantitatem.] vtens ver-
bo *πρόσθεν*, & subdit: quod si imbecillior extiterit, ad-
diciendum aliquid victus, & plenior est adhibendus
tantum scilicet, quantum natura imbecillior expo-
stulat. consistit ergo nutrimenti quantitas exquisita
in ipsa victus forma, quæ talis instituenda est, ut æ-
ger perdurare cum ea possit vsque ad morbi summum
vigorem, ut clarè ex his verbis ostendit Galenus, &
comment. citati aphorism. 7. eiusdem libri, cum Hipp.
in aphorism. scripsisset: [ubi morbus peracutus est, ita-
tim extremos labores habet, & extremè tenuissimo
victu vtendum est; ubi verò non, sed pleniorẽ vi-
ctum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum
est, quanto morbis extremis est mollior.] inquit ip-
se, [in quibus verò morbi vigor statim futurus est,
hoc est in primis quatuor diebus, in iis possumus vi-
ctu extremè tenuissimo vtì, cum eundem vires to-
lerent: qui verò minus tenuis existit, què etiam ple-
niorẽ nominauit, illis conuenit morbis qui poste-
rius in suo debent vigore consistere, in quibus præ-
cepit tantum à victus tenuitate declinare, quantum
morbus ab extremis recedit, hoc est vigore summo.
Hoc enim proximo existit, hoc est vigore summo.
Hoc enim proximo existente, paulò pleniorẽ vi-
ctum offeremus: longius verò distante, plus: & quã-
to tardiorẽ fore summum morbi vigorem expe-
ctabimus, tantum victus speciem, formam seu figu-
ram commutabimus.] iterum vtens hac voce *ῥημα*,
liquet igitur ex iis, quo tam Hippocr. quàm Galen.
indicatione sumpta tum à viribus, tum à morbi sum-
mo vigore, pro quantitate victus instituenda, per

quantitatem victus diuersam, prout diuersi fuerint iã
dicti duo scopi, non multum dinem, seu copiam eius-
dem, sed formam, speciem, seu figuram subintellige-
re voluerunt. de qua etiam victus forma seu specie,
Galen. verba fecit commen. aphorism. 11. eiusdem lib.
sub voce *ἰδίος*, & aphorism. 12. vtens eadem voce *ῥημα*,
interim quoque victus qualitatem appellauit, vtens
voce *ποιότης*, ut liquet libro de optima secta. At idẽ
Hippocr. aphorism. 4. eiusdem primi libri, de hac me-
minit, asserens non vnam duntaxat in omnibus mor-
bis speciem, sed diuersam instituendam esse, pro di-
uersa morborum natura: & quoniam coniecturalis
erat hæc etiam quantitas, quæ in specie, seu forma
continetur victus, veluti reliquæ omnes, & propter
ea aberrare quandoque cõtingit in hac declinatio-
nis quantitate, nedum medicos ipsos, verum etiam
agros, non absque ratione aphorism. 5. eiusdem primi
libri collocatione facta inter eadem delicta, asser-
bat agros magis lædi cum ad magis quàm oportet,
tenuem victum fieret declinatio, quam vbi ad pau-
lò pleniorẽ, quæ Hipp. sententia hucusque à pau-
cis, ut mihi videtur rectè fuit intellecta. Non nega-
mus propterea quòd in hac diuersa nutrimenti spe-
cie seu forma quæ agrotantibus instituitur, ea qua
diximus ratione, consideranda etiam sit certa quan-
titas, seu mensura, quamuis id præcipuè à medico
non intenditur. Etenim de hac etiam victus specie
quibusdam plus, quibusdam minus, quandoque tri-
buere oportet, pro diuersa agrotantium ætate, seu
consuetudine, anni tempore, ac reliquis huiusmodi,
quibus eadem vires metiuntur, quemadmodum ne-
que ipse Hippocr. hanc prætermisit, sed de ea memi-
nit in paulo ante citatis aphorism. 14. & 15. primi lib. &
2. de ratione victus in morbis acutis, cum dicebat: ci-
borum autem adiectioni intendendum multò mi-
nus, &c. Verum asserimus quòd per nutrimenti quã-
titatem, quam primò inuenire debemus ex virium
substantia, ut Galen. docet citato libro 11. method.
meden. intelligere debemus speciem, seu formam,
& non copiam aut multitudinem eiusdem nutrime-
ti. sunt etenim diuersæ nutrimenti species diuersi-
modè quoque nutriendes, atque substantiæ virium
adiicientes, id quod præcipuè considerare debemus
in febribus ipsis, ac morbis omnibus, & propterea
eadem nutrimenti species immutanda erit, conside-
ratis tum virium robore, tum morbi summo vigore;
id quod etiam manifestè 10. metho. med. idem Gal-
lenus nobis demonstrauit, cum dixit: [sunt igitur tibi à pri-
mo statim die in omni agro spectanda duo illa quæ
Hippocr. iussit, à quibus cibandi consilia petas, mor-
bi summus vigor & agrotantis vires: postea si trans-
iri summum incrementum sine omni cibo potest, in
cibi abstinentia hominem seruabis, sin exiguum ad-
miniculum requirat, abundè erit sola mulla; quòd si
maius desiderat quàm sit ex mulla, pristinæ cremor
fatis erit. At si fas non est summum morbi incremen-
tum aut tenui victu, aut inedia transmitti, id agendũ
est ut homo statim in primæ accessions inclinatio-
ne cibetur.] Immutat igitur Galen. diuersam victus
speciem seu formam pro vario virium statu ac diuer-
sa morborum summo vigore, & non multitudinem
seu copiam eorundem alimentorum, quæ quidem
contrario ab hoc modo permittari debet. nam ubi
calor innatus plurimus fuerit, & propterea vires va-
lentes, plurimus quoque cibus adhibendus erit: ubi
exiguus, & propterea imbecillæ vires, exiguum quo-
que nutrimentum dabimus, ut aphorism. 13. 14. & 15.
primi

vtens spe-
ciem perm-

Cel

Apho-
sili-
stian

Cel

Dubitatur
Galienus
Hippocrati
nob. seu
sumant
que rat
sunt
calidius
vicio.
Cap. 14
super e
44

ptimi libri decretum est, oportet enim alimenta, ut inquit Galen. semper esse innati caloris multitudini proportionalia, & eorum quantitatem, esse eius quod diffatur quantitati, proportionalem, præsertim in sanis corporibus. Sunt verò ipsius speciei seu formæ victus differentiæ non paucae, quas pro diuersa morborum natura, variòque virium robore, artificiosa quadam coniectura assequi licebit. Etenim ubi morbus peracutus fuerit, ac statim summum vigorem habiturus est, hoc est in primis quatuor diebus, & vires suum legitimum robur habent, possumus victu extremè tenuissimo vti, quemadmodum illis morbis qui posterius in suo vigore consistere debent, non adeò extremè tenuissimum adhibebimus victum, & ubi paulò post consistant, extremè tenuem: ubi verò plus, victum tenuem adhibebimus, & deinceps etiam plenior, quandoque modicè, quandoque mediocriter, quandoque admodum prout vires requirent, & morbi summus vigor breuius, aut tardius expectatur. quocirca præcepit Hippocrates tantum à victus tenuitate declinare, quantum morbus ab extremis recedit, hoc est à summo vigore, adeò vt tunc quantitatem declinationis exquisitè habeamus, tum in febribus, tum in cunctis morbis, cum adeo vis robusta fuerit, vt tali vel tali victus speciei, speremus ipsam posse perdurare totum tempus intermedium vsque ad summum morbi vigorem. nam non permutandam esse victus speciem, prius quam signa coctionis manifesta sint, inquit Galen. Hippocra. auctoritate 2. de rat. victus, & deinde subdidit: [id autem fiet, si quot diebus ad vigorem morbus venturus sit præcognoueris.] & paucis quibusdam interiectis, eodem loco docens modum inuentionis generis victus, inquit: verum quomodo ad generis victus inuentionem, operæ pretium est vt cognoscas, an robusta, vel infirma sit laborantis facultas, quot item diebus morbi coctio futura sit, sic & considerandum quantum vel robusta, vel infirma fuerit, nempe in virtutis tum robore, tum infirmitate magis, & minus valde discrepant, sic morbi quoque discrimina differentiæque conicere oportet. Sed hic non ab re dubitaret quispiam asserens Hipp. & Galen. in hac victus ratione instituentem, sibi ipsis pugnare, nempe aphor. 7. 8. 9. & Gale. etiam comment. aphor. 11. & 12. & citato lib. 2. de rat. vict. aperte præceperunt, à duobus scopis sumendum esse totius victus rationem in vnoquoque morbo, nempe ex morbi constitutione, seu eiusdem morbi vigore, & ex viribus ægrotantis. At citato libro 11. meth. meden. Galen. hæc verba (post ea quæ modò citauimus) de victus quantitate conscripsit, inquit, [siquidem ostensum prius est solum virtutis respectum esse, qui de nutrimento indicationem præbet] & libro 1. de ratione victus inquit: [verum nos qui veritatem honoramus, laudamus Hippocra. cum in cæteris omnibus, tum quod in vnoquoque opere scopum ita docuerit, vt huic attentus omnino quispiam, definitam certamque inuentionis auxiliorum habeat viam: sic sanè & cibandi scopum vnum communem prorsus tum sanis, tum languescentibus esse demonstrauimus. his autem facultatis vitalis custodia est, quam nunc manifestè explicuit, cum dixit si validus fuerit, ob eandem sanè facultatem sani edimus & bibimus, aliæque omnia vitæ munia exequimur, propter hanc eandem & ægri ad cibos, potusque procedimus; nempe morbus suæ affectionis indicat auxilia, phlebotomiam videlicet, clystima, ca-

taplasma, purgatione, oxymeli, aquam mulsam, atque aliorum vnumquodque virtutis verò custodia sola indicat alimoniam.] Quibus in locis vnum solum esse scopum, qui alimoniam indicet, virtutis videlicet custodiam, dilucidissimè eos asserere patet, quamuis Galen. 1. de arte cur. ad Glauc. cap. 8. oppositum sentire videatur, quod videlicet in omnibus morbis commune præceptum est, vt ab initio statim ad vniuersum ægritudinis tempus inspicientes, rationem victus instituamus, nullam faciens de viribus mentionem. Nisi esset quod idem Gale. citato etiam loco 1. de rat. victus, per ea verba, quæ ea, à nobis modò conscripta, consequuntur, se ipsum ac Hippocra. conciliat inquit. [si igitur morbosam affectionem nullo pacto offenderet alimoniam, nos virtuti soli attendentes, ægros vt sanos aleremus, sed quoniam sanè prius noxam, vt ostendimus, affert, ob id morbi affectionem, non tanquam cibi indicationem, sed tanquam prohibetricem contemplamur. ubi ergo ea non prohibuerit, facultasque præceperit, tunc nutrimus, neque enim cibus morbi affectionem sua ratione iuuabit, nisi vim tum cibi, tum medicamenti obtineat.] [Hinc liquet vnum esse præcipuum ac proprium scopum, alimoniam indicans duntaxat. nempe custodia ipsius virtutis. Quod si Hippocra. & Galen. quandoque morbi constitutionem, seu eiusdem summum vigorem contemplari etiam iusserint pro ipsa alimoniam instituenda, ea non tanquam cibum indicantia, sed tanquam prohibentia spectarunt, veluti hoc in loco seipsum declarat Galen. concludens vniuersale tempus offerendi alimenti esse, ac tunc nutrire oportere, cum facultas præceperit, & morbus non prohibuerit: quemadmodum etiam de auxiliorum tempore lib. de opt. secta. definierat, id esse præcipiens quando morbus exigit, & facultas non impedit. spectatur itaque morbi affectio, seu eiusdem morbi summus vigor necessariò in ipsis ægris, pro victus ratione instituenda, non tanquam scopus quidam, quid faciendum sit indicans, sed tanquam prohibens. Atqui quod prohibet, haudquaquam vtile indicare posse, decretum reliquit idem Galen. citato lib. de opt. secta, & nos in præcedentibus suis declarauimus. Erunt itaque duo scopi, vnus, vt indicans, ac requirens nutrimentum, tanquam vtile ei existens: alter verò non tanquam ei conducent, sed tanquam prohibens. neque enim, vt diximus, cibus morbi affectionem sua ratione iuuabit: quod quidem (si verum fateri liceat) verè indicare haudquaquam admittendum est: & propterea reuera vnus erit cibandi scopus, communis prorsus tum sanis tum languentibus, nempe virtutis custodia, licet de altero quandoque scopo fiat sermo, hoc tanquam omnibus manifestò prætermisso, ab eodem Galeno, qua ratione conciliari poterit idem Galenus cum iis quæ scripta reliquit eodem lib. de optima secta, quo loco aduersus methodicos, morbi tempora haudquaquam quippiam vtile indicare posse, nonnullis rationibus demonstrauit: neque medicamenta seu auxilia, neque alimentorum genus quantitatem aut qualitatem, quoniam nihil quod expedit à temporibus indicari potest. Possunt tamen id quod à morbo seu facultate postulatur, quandoque impedire: idcirco & ipsa morbi tempora, interdum impediencia ea quæ conducunt, haudquaquam proposita, seu scopi verè esse dicuntur, vt ipse inquit, sed tanquam impediencia, eo quod nos auxiliis aut cibis vti, plerumque impediunt, consideranda sunt. Hinc Galen.

Super tex.

36

Solutur du
bitatio.Præcipuus
cibandi sco
pus, custo
dia est vir
tutis.Morbi sum
mus vigor
non vt in
dicans cibū
sed vt pro
hibens spe
ctatur. cap.
40.

Locopræci.

Cap 39.

Tempora
morbi non
indici. at, sed
impediunt.

concludebat quod quam vicem in exhibendis remediis facultas gerit, eandem in dandis cibis morbi tempora: quamvis ipsa quoque interdum auxilia exhiberi prohibeant, atque interuertat, veluti & cibum: itaque morbi tempora pro victus ratione instituenda, spectanda à medico, non tãquam alimoniam indicantia, nec quantitatem, aut qualitatem eiusdem, sed tanquam impediencia, & interuertencia quãdunque: & hac ratione Gal. interdum simul cum Hipp. ea contemplanda esse pro victus institutione (& nō tanquam scopos quicquam faciendum esse indicantes) nobis praeceperunt. Quemadmodum etiam sicubi in eorum doctrina compertum fuerit pro nutrimenti institutione, considerandam esse ætatem, consuetudinem, anni tempus, regionem, ac reliqua similia, non tanquam indicantia, sed velut coincidentia subintelligi debet: præcipuus siquidem est virtutis scopus, ut sæpius diximus. Hæc verò omnia tãquam eandem virtutem immutantia, ac propterea coincidentia, contemplari debent. Et ob id quispiam mirari non debet, si interdum solius virtutis meminerit Hipp. interdum simul cum ea, omnium, aut quorundam iam dictorum. Est etenim hæc Hipp. consuetudo, Galen. teste i. de rat. victus in morbis acutis, commen. aphor. 16 primi libri.

Nutrimenti qualitas ex quibus desumenda sit.

Caput L.



QUÆTERVM nutrimenti qualitas desumenda est ex morbi affectu vna cum solidorum corporum (quod tum est) temperamento ab affectu, si is obstructio sit, quæ extenuet, à naturali ipsorum temperie vna cum consuetudine, prout etiam prius est definitum, inquit Gal. citato, lib. II. metho. med. c. 5. ut velit qualitatem alimenti debere esse contrariam ipsi præter naturam affectui, similem verò naturali solidorum corporum temperiei, atque etiam consuetudini ægotantium, cum & ipsa vel temperamentum originale seruare possit, vel ascititium inducere. iis nanque seruatis circa nutrimenti qualitatem, seruabitur autem naturalis temperies, prout etiam superius definitum est de medicamentorum qualitate. Semper enim definitur contrarietatis mēsurā ab ipsa naturali laborantis temperie, vna etiam cum ipso morbo. quā ratione febrientibus frigida alimenta exhiberi debet, verum adeo frigida, ut & febris ipsa auferatur, naturalis autē tēperies, & consuetudo febrientis per eadem seruentur. ex iis nanque sanatio perficitur. At Hippocr. aphor. 16. i. lib. aliter de victus qualitate quæ febricitantibus competit, sentire videtur: ait etenim: [victus humidus febricitantibus omnibus confert, maxime verò pueris & aliis qui tali victu uti consueverunt.] subicit: nanq; hoc loco Hipp. indicationē quæ à corporis tēperamento sumitur. licet aliā adiecerit quæ ab ætate. At si in memoriam reuocabis ea, quæ in præcedentibus de ætate & cōsuetudine diximus, haud difficulter percipies hos viros idem asserere. Etenim & consuetudo & ætas non propter aliud in morborū curatione indicare videntur tam pro remediorum inuentione, quàm pro victus ratione instituenda, nisi medio temperamento, veluti præcipuæ causæ ipsum immutantes: quam obrem Hippocr. ætatis, & consuetudinis mentionem faciens, non aliud significare voluit (& si illud non exprefferit) quàm proprium temperamentum, quemadmodum ipse Gal.

ætatem subintelligere voluit sub temperamento, cuius simul cum consuetudine meminit. Hinc Galen. comment. citati aphor. huic tacitæ obiectio, satis faciens, dicebat, [verum si quid expressis verbis Hippocr. in aphor. non dixit, quod tamen idem habeat iudicium, cum iis quæ ab ipso dicuntur, hoc quoque fuisse dictum potentia, debemus existimare. nam & ætatis meminit, & consuetudinis, tu verò & naturalis temperaturæ, & tēporis anni, & regionis non absque ratione memineris, quæ & ipse Hippocrates adiecit aliquando, nōnunquam verò vnius aut duorum mentione facta, reliqua quæ sunt eiusdem naturæ atque ordinis prætermittit.] Quibus etiam verbis sibi ipsi Gale. satisfacere videtur, quod pro nutrimenti qualitate, temperamenti duntaxat, & consuetudinis meminerit. Nam sub iis reliqua etiam iam dicta subintelligere voluit, seruantibus nobis quod similem perpetuo victum exigunt corporum temperies naturales, etiam si inculpatæ nō sint in ipsis ægotantibus, & reliqua quæ secundum naturam sunt, quemadmodum quæ præter naturam per contraria corrigi debent. Id enim hac in breui sententia propalare nobis voluit Hippocr. non tamen hoc aphorism. simul præcipere intendit qualitatem victus in sanis, & agris, quemadmodum quidam sibi ipsi persuaserunt: etenim, (ut Galen. visum est in fine comment. præcedentis aphorism.) ab hoc aphor. 16. de victus ratione ægotantium sermonem facit Hippocr. inquit enim, [Deinceps autem de illa victus ratione quæ ægotis conuenit, sermonem faciet:] insuper nec perfectus esset sermo de victus ratione, quæ febricitantibus conuenit, si solam indicationem de eius qualitate sumpsisset ab ipsa febre, neque enim satis esset, nisi adieceretur ea quæ ab ætate, & consuetudine, hoc est corporis temperamento sumitur. Quapropter perfectam voluit qualitatem rationis victus, febricitantibus conuenientem, hoc in loco nos docere Hippocr. & non in simul sanorum existetium, nec propterea quispiam mirari debet si humidum dixerit, subitendo frigidum victum febricitantibus omnibus conferre: erat etenim hoc vel medicorum vulgo cognitum: nihil autem vulgare scribere Hippocr. dignatus est, ut liquet 2. & 3. de different. resp. ab affectu itaque qualitate, & solidorum corporum temperie, vna cum consuetudine, & etiam ætate si velis, anni tempore, & regione, nutrimenti qualitas desumitur, vel breuiter ex morbi affectu vna cum solidorum corporum, quod tum est, temperamento, ut Galenus testatur. sub his enim reliqua continentur.

De particulari exhibenda alimonia tempore.

Caput LI.



QUAMVIS nutrimenti tempora vniuersalia cum vniuersalib. auxiliorum temporibus consentiant, quia eadē scribi possunt, & instrumenta quibus eadem indicantur, similia quoque sunt, & scribi etiam possunt (vtriusque nanque opportuna vniuersalia tempora, ex eorum quæ conducunt postulantium præsentia, & potentis impedire absentia, deprehenduntur) non tamen similiter se habent, circa ea ex quibus particularia tempora colliguntur, cum neque ipsa particularium auxiliorum tempora, neque instrumenta seu proposita quibus eadem indicari valeant, scribi queant: ut liquet lib. de Opt. secta. Nam & remissionis spatia quibus potissimum adhibentur

Victus rationem non indicant, sed coincident etas, consuetudo, &c.

Super text. 45.

Qualitas alimonia sit contraria simili solidorum corporum temperaturæ &c.

Obiectio.

Dilutio.

adhibentur remedia, non æqualia omnium sunt, & conditiones absumiles, & symptomata disidentia, quæ rû singula particularis auxilij tempus conuariat, vt ipse Galenus inquit. At victus rationis particularim tempora scribi possunt, quemadmodum & ipforum morborum, simul atque eorum indicatoria instrumenta, tum Hippocr. tum Galen. auctoritate. Dico autem particularia tempora, quæ distinguuntur aduersus vniuersalia, & non propria cuique, nam proprium nec dici, nec præcipi, nec scribi ad vñguè potest, vt patet 3. Method. meden. & primo de Arte curat. ad Glau. Cum itaque cum Galen. concluderimus vniuersale nutrimenti tempus esse, cum facultas præceperit, & morbi affectio non prohibuerit, restat modò differere postquam scribi possunt alimenti particularia tempora, ex quibus ea defumenda sint. determinatis nãque propositis ex quibus talia capiuntur tempora, insimul etiã patebit quòd eadem scribi possint: id verò particularim ostendemus in ipsis febribus, & præsertim ex putredine ortis. nam in cæteris facile patere poterit. Hæ verò, vel vnam duntaxat habent accessiorem, vel plures vt sæpius dictum est, si vnam habeant, à principio ad finem vsque, in his facilis toleratio, & consuetudo spectari debebunt, quando cibis illis eo tempore est offerendus, quo facilius quàm in cæteris morbum tolerant, eo quæ potissimum diei tempore, quo prius in sanitate cibari erant fuerit. etenim facilius cibum ferent, si ex iis considerationibus assumunt, cap. 5 Galeno teste eodem vñdecimo metho. med. quamuis, vt ipse inquit, paucissimas sorbitiones, portionis quæ eisdem exhibere debeamus, quibus vtique ceu medicamentis potius, quàm nutrimentis egemus. maxima etenim febris est, ac cito finietur, & virtus vtpurimum valida. Si verò febris plures accessiones habeat, asserimus cum Hippocr. & Galen. in eorum principijs cibum nequaquam adhibendum esse dico in principijs, tã si cœperint accessiones, quàm si iam iam cœpturæ sint, liquet hoc ex Hippocr. aphor. 2. libri 1. cum assererat, [in accessionibus abstinere oportet, nam cibum dare nocuum est, &c.] & ex Gale. qui eodem comment. dicebat: [quomodo verò quispiam particularim cibum offerat cõuenienter, in hoc docet sermone, cauere iubens morborum accessiones. ipse verò manifestius in libro primo, de Victu acutorum dixit, quòd neque cum iam adsint, neque haud ita post affuturæ sunt accessiones, cibis dandus est, sed cum declinât aut cessant.] quæ quòque sententia quarto de Ratione victus scripta est. Præterea Aphor. 19. eiusdem primi lib. ait Hippocr. [is qui per circuitus accessiones habent, nihil dare oportet, neque cogere, sed subtrahere adiectioni ante iudicationem.] & Galen. in commen. dicebat. [nam tempora commoda ciborum particularium præcipuè docent accessiones, in morbis quidem in quibus ordinatè adueniunt, hoc est per circuitus.] libro etiam primo de Ratione victus, docens Hipp. particularia tempora nutrimenti, hæc conscripsit: [tempus autem dandæ sorbitionis, tum per initia, tû per omnem morbi decursum, hoc maximè seruare oportet. nam si pedes frigidi fuerint, non à sorbitione modò, verum quoque & maximè à potu temperandum. at cum caliditas ad pedes descenderit, tunc dare expedit.] Tunc etenim moderatissimè se habent, tum thorax, tum venter, quemadmodum terribimè in initiis. fit namque accessiorem principium calore omni, toto ex corpore ad cor, thoracemque

concurrere, Gal. auctore ex eiusdem textus comm. Quamobrem cõcludebat optimû tempus ipsis languentibus dandæ alimonie esse in inclinationibus, quemadmodum deterrimè in accessiorem principijs: tunc etenim moderatissimè se habet, quemadmodum in principijs deterrimè thorax, & venter, lib. quoque de humoribus idem Hippo. hæc scripta reliquit: [in exacerbationibus per circuitus fietibus, ciborum oblationes dandæ non sunt, neque cogere oportet, sed auferre de apositionib. ante iudicationes.] idem confirmatur quarto de Ratione victus, per hæc verba: [cum autem purgaueris sorbitionibus quibusdã vitior, obseruatis ita febrium accessioremibus vt nunquam cum adsint neque cum future sunt exhibeas: sed vel cum cessant, vel quicuerunt, & maximè à principijs recesserunt. frigetibus ergo pedibus, neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis.] Non vtique offerendus erit cibis in accessiorem principijs, ob iam dictas causas, neque etiam in incrementis ex sententia Galeni eodem 1. de Ratione victus cum dicebat, [sed quoniam in accessiorem tum principijs, tû incrementis ingesta alimonia lædere admodum nata est, ob id differimus ipsius exhibitionem, quâquam corpus ipsum iam iam digerere videatur.] secluditur etiam ab vtrisque, dico tam Hippo. quàm Gale. summus vigor accessiorem, cum eo tempore licet pedes caliant, manet tamen in corporis medio: hoc est ventre, & thorace, præter naturam caliditas immo dica necdum ad pedes descenderit, quo tempore dare expedit Hippocrate auctore, tum in morbis omnibus, tum præcipuè in acutis, & potissimum quibus febris vehementior suberit, periculûmq; summum. Sed quid clariùs quòd tria hæc tempora alimonie exhibitionem prohibeant, si in accessiorem iussuerit Hippo. abstinere oportere? nam cibum dare nocuum est. Et quarto de Ratione victus, per hæc verba particulare cibi porrigendi tempus instituit, cum dixit: [eius medicinæ partis quæ victu medetur, maximum est febrium tum intentiones, tum declinationes, non in acutis modò, verum quoque & in longis obseruare, vt tempora quibus cibi offerendi nō sunt, & tûd, quibus offerendi sunt, cognoscas, atq; adhuc quando plurimû ab intentione abierint.] in cuius textus expositione diuinif. Gal. nobis præscribit simul cum eodẽ auctore particulare tempus porrigendi cibi. inquit enim: [Artis ciborum exhibendorum maximum esse ait particulare cibi porrigendi tempus nosse, scopumq; vnum esse fatetur, quod scilicet tempus illud, quo cibis exhiberi debet, quâ plurimû absit à febris intentione (quam ἐπιτασιν dicit) accessiorem principium intelligens. Id autem nō in diuturnis solum, sed in acutis quoq; verû esse videtur.] deinceps subdit: [sed quare longis in morbis adiecit? nempe quòd in his magis, & forsân solis, euidens sit scopus, in acutis etenim morbis, deprehensa in pedibus caliditas, cibi tempestiuè offerendi signû sufficiens fuit: non tamẽ in longis ita nutrire oportet, sed melior declinationis pars est expectanda, quod in acutis haudquaquã est expectandû, timore cito future accessiorem: & ppter ea cõfestim cum caliditas ad pedes descenderit, tunc dare expedit.] Particularis itaq; repositi cibi porrigendi, vñ ait esse scopû Gal. hoc in loco, quòd videlicet tẽpus illud quo cibis debet exhiberi, plurimû absit ab accessiorem principio. Id verò in continuis inclinatio existit, in intermissionib. interuallû, seu integritas, & propterea

cum cessant, vel declinant, dicebat Hippocr. offerendum esse cibum, quanquam nec in omnibus continuus febribus eadem declinationis pars expectanda sit, sed prout citius, aut tardius sequens accessio futura est. Id quod dilucidissime manifestauit Celsus libro tertio, cap. quinto, inquit, [Scire licet optimum cibo tempus esse febre finita, deinde cum decessio eius consiluit, tertium si necesse est, quodocunque decedit, cetera omnia periculosa esse.] Idem verò Galeno citato vndecimo Meth. meden. in fine dicebat: [porro aptissimum in febribus quæ intermittunt, & repetunt tempus est, cum, vt dictum est, exhalare iam coeperit febrilis calor: statim enim corpus ad nutrimentum præparant, huius quoque opportuno tempore ex duplici coniectato respectu, nempe summo præcedentis accessio-
cap. ult. nis vigore, & futuræ principio. adhæc nanque spectantes operam dabimus, vt quamlongissime ab veroque nutriamus, ergo si spatium quod inter summum prioris accessio-
cap. ult. nis vigorem, & sequentis principium interuenit, satis sit amplum, facile est idoneum tempus inuenire: sin exiguum id affuerit, alterum facias necesse est, aut vt ægrum admodum adhuc calente nutrias, aut sequentis accessio-
cap. ult. nis inuasionem iam ad futura, quo magis præfagio Medici eiusmodi febris indiget, qui primus statim diebus, quanto spatio febris duratura sit, coniciet.] Quod si continua sit, & breui finiendam esse constabit, & virtutem non defuturam coniciamus, continendus à cibo æger erit. sin verò nutrire cogamur, propterea quod vires infirmiores sint, & febris ultra progressura sit, necessum erit id deligere quod minus sit noxium, vt in re ancipiti conuenit: id verò distinguere (vt ipse inquit) tum ex loco afflicto, vñ cum affectu, tum accessio-
cap. ult. nis, & principij, & summi etiam vigoris consuetudine: si qui dem vbi iecur phlegmone prehendit, perniciosissimum est paulo ante accessio-
cap. ult. nis cibare. vbi hæc abest, infirma autem sit virtus, vtilissimum. in aliis vero animalis instrumentis, quod iam dictis portione respondeat, tum ex situs eorum ratione, tum dignitatis, existimabis. summi autem vigoris & accessio-
cap. ult. nis principij morè sic consideres, summi inquam vigoris, an citra, magnitudinem febrilis caloris siccus sit, & squalens, an citra siccitatem vrens. priorem nanque humectante victu madefacere quamprimum oportet; in secundo dum plurimum caloris se remittat, manere. Principij verò accessio-
cap. ult. nis morem existimabis, an corporis extrema perfrigeret, & magnam sanguinis reuocationem ad interiora corporis faciat, an omnino corpus non premat: quippe hoc secundum, seu facile manifestumve contemnes. In priore distingue oportet: nam si absque visceris phlegmone, aut succorum redundantia motus ad interiora in accessio-
cap. ult. nibus polleat, nihil offendes paulo ante cibans: sin vel phlegmone, vel redundantia subfit, cauenda est ante accessio-
cap. ult. nis cibatio, ceu res maxime noxia. Celsus verò, vbi febris intermittens fuerit, his verbis cibandi tempus determinauit libro 3. cap. 4. satis esse principia cibi à decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi, ita si longius tempus secundum est, quam integerrimo dandus est, si breue etiam antequam ex toto integer fiat, sic itaque definiendum est
cap. ult. particulare tempus cibi offerendi. sed quoniam diximus cum Hippocr. & Galeno vnum esse scopum, quod scilicet tempus illud quo cibum exhiberi debet quamplurimum ab sit ab accessio-
cap. ult. nis principio, ani-

*Tempus ante accessio-
nem non indicat cibum
dandum esse, sed non
prohibet.*

maduersione dignum est scopum hunc non quod faciendum sit indicare. nam alimonia vñus perferendus scopus est, nempe virtutis custodia, vt sapius diximus. Verum quemadmodum de morbi affectione, ac eius vniuersali summo vigore determinauimus, ita etiam de hoc particulari tempore differere oportet: dicimus enim hoc cibi offerendi tempus esse, quoniam ipsum exhiberi non prohibet, hoc verò non esse, quoniam ipsum prohibet, & quoniam inter cetera accessio-
cap. ult. nis tempora declinatione non prohibet: quinimò rectius dixeris, si fatearis quod minus prohibet: etenim cibum sua ratione nunquam morbum inuabit, vt dictum est, ob id cum Hippocr. & Galeno conclusimus quatenus ad particularia accessio-
cap. ult. nis tempora spectat, in hoc duntaxat tempore, cibum exhiberi debere, vbi videlicet vires absque eo vsque ad morbi summum vigorem sufficere non valeant, alias haudquaquam ipse offerendus esset etiam in ipsa inclinatione. nam vbi ob copiam vel obstructionem, vel phlegmonem, vel vt semel dicam, humoris alicuius putredinem febris est orta, maximo malo est cibum, atque hos quidem nec in inclinatione febris citra noxam nutrias, vt inquit Gale. 10. Meth. med. Sumitur itaque scopus particularis exhibendæ alimonia, ab ipsius accessio-
cap. ult. nis inclinatione, non tanquam ipsum exhiberi indicante, sed tanquam minus prohibente, quam reliqua accessio-
cap. ult. nis tempora. Quæ obrem magnopere hallucinati sunt qui crediderunt Hippo. & Galenum hac in re admisisse tempora indicare, veluti methodici affirmant, licet aliis in locis Gal. illud negauerit. Nos verò in præcedentibus ab inde demonstrauimus, quantum à veritate deuiant.

*Quo accessio-
nis tempore præter inclinationem cibum
maiori noxa offeratur, ac quomodo in omnibus mor-
bis instruenda sit victus ratio. Caput LII.*

A occasione eorum quæ diximus de particulari nutrimenti tempore, non absque ratione quispiam dubitaret, quo accessio-
cap. ult. nis tempore præter inclinationem, cauenda magis cibatio sit, ceu res maxime noxia? Cernimus enim hac in re non barbaram duntaxat sectantes medicinam, sed eos qui Galeni doctrinam profitentur inter sese non parum digladiari, idque non ob aliud (vt me fert opinio) quam quod parum rectè intellexerint causam, ob quam interdum cogamur iis in temporibus cibum offerre febricitantibus, declinatione non expectata. Conabimur nos propterea breuibus quoad fieri poterit cum eodem Galeno, & Hippocrate illud dilucidare, asserentes primo nullum aliud opportuni-
cap. ult. us particularis cibationis tempus esse, quam accessio-
cap. ult. nis inclinationem in cōtinuis, & integritatem in intermittentibus, vt paulo ante determinauimus, ob dictas etiam causas, vbi hæc eadem tempora expectari valeant, & vbi fuerint angusta, id perpetuò seruandum esse censemus, quod cum Galeno conclusimus: interim videlicet ad sequentis accessio-
cap. ult. nis principium, quandoque verò ad præcedentis vigorem magis accedentes. Fateamur etiam secundum quod quocunque accessio-
cap. ult. nis tempore casus aliquis citius, res
cap. ult. interuenit, robor naturæ seu virium dissoluens, eodem neglecto tempore, cibum offerre cogimur, instante magis virium custodia, quam prohibente aliquo accessio-
cap. ult. nis tempore, quemadmodum cum Hippocrate decreuit Gal. com. aphor. 9. primi libri etiam de summo totius morbi vigore, quo tempore
cap. ult. omnino

omnino à victu abstinendum esse præceperat idem Hippocrates aphorismo octauo eiusdem libri. Effet item casus hic, animi defectus, seu syncope, aut quilibet alius adeo virum robur dissoluens, vt nutrire omnino cogat, propterea quia vt diximus, hic solus est alimoniarum scopus, nempe virtutis custodia.

Porro quærimus nos, vbi nullus similis interueniat casus, verum vires ferre inedia non valeant vsque ad accessions inclinationem, quo tempore cum minori noxa cibus offerri queat, & quoniam inter cætera corpora quæ minimè inedia ferre possunt, sunt ea quæ natura, seu temperamento calida & sicca existunt, siue ex prima origine talia sint, siue ex victu, & immo dico labore, vigiliis, & animi perturbationibus, regione, anni tempore, & cæli statu, talem naturam acquisierint: propterea quod his aduersissima sit inedia, eaque vehementer lædat, cum necessario viribus sint imbecillis, de eisdem præcipue loquimur, quemadmodum ipsemet Galenus verba fecit 10, Metho. meden. Quamobrem dicimus eisdem & cum inuafura adhuc sit, & cum incipiat accessio, cibum offerri debere; si coniectura assequare, eos vsque ad accessions inclinationem inediam ferre non posse, nam, vt Galenus inquit, cum accenditur in his febribus propter mordentem acrimoniam, ex calfactis, attenuatisque ex sole, & inedia, & laboribus succi, maximum eius remedium est humidum nutrimentum: quanto verò hos citius cibaueris, tanto scilicet magis febrem prohibeas, inquit idem Galenus, citato libro 10, metho. meden. Quibus ex verbis dicere licebit, corporibus iam dictis, vbi ex prænaratis præsertim causis in febrem incidunt, non modo adhiberi debere humidum cibum, cum primum coeperit accessio, aut cum iam inuafura sit, tanquam nutrimentum, verum etiam tanquam maximè remedium existens ipsis ex calfactis, attenuatisque propter mordentem acrimoniam succi, ac ipsi febri & quanto citius exhibueris, tanto magis febrem prohibeas, ob iam dictam causam. Vbi verò propter quampiam causam hoc tempore eisdem corporibus cibus oblatus non fuerit, audacter etiam fatemur cum eodem Galenus in eiusdem accessions vigore, cibum esse offerendum, quemadmodum ipse testatur citato lib. 10, potissimum vbi febris admodum valida non sit, ipsumque corpus siccum, & squallens, vt posuimus: hos nanque humectante victu, quamprimum madefacere oportet, inquit il. eiusdem operis lib. ne vel in febrem ardentem, vel eadem prætergressa, in hecticam incidunt, priusquam inclinare coeperit accessio. His itaque de causis non modò cum minori noxa, quinimò tanquam maximum remedium existens, humidum alimentum exhibebimus eiusmodi corporibus, interim in accessionum principiis, quandoque verò in earundem summo vigore inclinatione non expectata, præsertim vbi ex prædictis causis in febrem inciderint, & non ob aliquam inflammationem, aut humorum copiam: perquam rarissimè verò contingit hæc corpora ob humorum copiam, seu multitudinē febricitare. Quod si momentanei mebris phlegmone cum eiusmodi febre, ac corpore sit coniuncta, omnino æger morietur. nam quod ad phlegmonem, quæ in iis est participat, spectat, minimè planè est cibandum, quod ad virium infirmitatem, vtique sæpè, vt idem Galenus inquit citato loco, ita necessario aut vires resoluentur, aut phlegmone augebitur. Sed dices, quid afferendum sit de accessions incremento, num etiam

hoc tempore eisdem quoque corporibus cibum offerre quandoque liceat? Cui responsum sit, hucusque nec in Hippocratis, nec in Galeni doctrina me illud scriptum reperisse, quòd videlicet febricitantibus quibusdam hoc in tempore aliquando cibum exhibuerint. quinimò eodem decimo meth. med. cap. 4. Galenus omnino vitare videtur, cum dixit: [quod si horror præterierit, ac iam planè febricitent, cibandi id temporis non sunt.] & primo de ratione victus, per hæc verba idem confirmat, cum dixit: [sed quoniam in accessionum tum principiis, tum incrementis, ingesta alimonia ledere admodum nata sit, ob id differimus ipsius exhibitionem, quamquam corpus ipsum iam iam indigere videatur.] videtur ergo Galenus his verbis prohibere alimoniam in accessionum incrementis, quoniam hoc tempore admodum ledere nata est, quemadmodum in principiis. verum peracto incremento aduenientēque summo vigore, illud negare non videtur, licet in inclinatione sit optimum, quemadmodum nec ipse Hippocr. quarto de rat. vict. cum dicebat, [frigentibus ergo pedibus, neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis, sed maximum existimato, si id tantisper obseruaueris, donec valde incaluerint, deinde ita quod confert dabis.] Atqui valde incaluerint ægri in summo vigore, & non in incrementis accessionum, quo tempore paulatim ad extremas corporis partes calor sese expandit, paulatimque incalescunt ægri, quemadmodum in statu calor ex æquo corpus totum occupat, vt liquet eodem primo de ratione vict. & si dices æqualiter etiā prohibere in accessionum principiis alimoniam hoc in loco Galenus asserimus nos satis esse, quòd in incrementis cibum semper interdiciant Hippocr. & Galenus. nunquam verò admittant; in principiis autem, ac vigoribus, si quandoque prohibeant, interim admittere videantur, vt ex citatis locis patet, idque non propter aliud, nisi quòd eo tempore cauenda omnino cibatio sit, tanquam res maximè noxia. Ad hæc quem vsum afferat ægrotantibus exhibitus in incremento cibus, quemadmodum in principio, & summo vigore probauimus: eo etenim tempore si exhibeatur, neque maximum erit remedium ipsius febris, quemadmodum si in principio fuerit exhibitus, neque etiam febres prohibebit. insuper nec adeo inhibebit febrem, vt ea aut in ardentem, aut in hecticam non pertranseat, veluti si fuerit in vigore oblatus, & præter id, quod nihil confert, maxima ex eo parabitur noxa, quæ in neutro dictorum temporum si exhibeatur, contingit. Nam augebitur porro febris, vt decimo meth. meden. liquet, & cum detineatur ex cibo calor, prohibebit ne sese expandat ad extremas corporis partes, sed diutius in thorace, & corde, ac ventre contineatur, augebiturque ex eo putredo, seu phlegmone, si ex eisdem febribus fuerit orta, quæ omnia spectans Galenus. 11. meth. meden. in fine, cum exiguum fuerit spatium inter præcedentis accessions summum vigorem, & sequentis principium, tanquam minus noxium docuit, interim ægrum admodum adhuc calentem nutrire, quandoque verò iam iam futura sequenti accessione, nulla omnino facta de incremento mentione, non ob aliud quidem, nisi quòd in incremento cibatio esset magis noxia, quàm in dictis temporibus, alioqui parum rectè præcepisset in eisdem duobus temporibus distinguendum esse duntaxat quod minus sit noxiū, si cum minori noxa in incrementis cibus exhiberi

Respondet
questioni.

Super text.
46.

In incrementis
tu non dandus
cibus.

Tex. 39.

Loco citato.
Obiectio,
quæ mox dis-
citur.

Principio,
ex vigore,
subiungitur.
Loco citato.

Altera ob-
iectio.

posset. Sed adhuc instabis, quid fieri possit ut exhibitio cibo in accessione principio, eadem noxa, aut forte plures non inferantur, quam modo dicta vbi cibus fuerit in incremento exhibitus? eo magis cum ipse Galenus docuerit quarto de ratione victus, quod eo tempore accessionis cibus exhiberi debet, quod magis absit ab ipso accessionis principio, tanquam hoc tempus inter omnia deterrimum putarit. Huic responsum volumus, quod non modo si in principio fuerit cibus exhibitus iam dictis corporibus, similes noxa non provenient, quae in incremento generantur, aut maiores, & plures, sed ut dictum est, maximum erit remedium humidum nutrimentum exhibitum tum febris, tum humorum, qui propter mordentem acrimoniam excelsa facti, attenuatique sunt. & si qua noxa forte generabitur, maius sequetur commodum ex usu quem praestat, quam incommodum ex noxa quae fieri posset. Nec quicquam obstat, quod citato loco decreverit tempus quo exhiberi debeat alimentum, quamplurimum distinctum esse debere ab accessionis principio, nanque illud subintelligi debet, ut paulo ante demonstravimus, vbi vires, ac corpora ferre possint in ediam usque ad idem tempus: quod quidem declaraverat citato libro primo de ratione victus, idem Galenus: quo casu exhibitum in principio alimentum, quemadmodum & in incremento accessionis admodum laederet, & ob id differendum esset, quanquam corpus ipsum iam iam indigere videatur, ut ipse inquit: praefertim vbi ob humorum copiam, aut phlegmonem febricitet. Adhuc obiceret quispiam aduersus ea quae diximus de summo vigore, asserens quod maior noxa sequeretur ex oblato cibo in summo vigore, quam incremento, illud probans Hippoc. auctoritate, aph. 8. primi libri, dum inquit: [vbi morbus in suo vigore constiterit, tunc victu tenuissimo utendum est.] si igitur in vniuersali morbi summo vigore per haec verba vitandum esse cibum omnino praecipit Hippocrates, & non in incremento, simili etiam ratione de vigore particularis accessionis differendum erit. Huic responsum dabimus, similitudinem, quam credunt esse inter haec tempora, non valere. etenim in vniuersali morborum summo vigore, propter tum symptomatum magnitudinem, tum morbi coactionem, utendum est tenuissimo victu, ut ait Galenus in commento citati aphorismi. neque enim oportet naturam distrahere ad alteram novam coctionem, cum eo tempore noxiorum humorum coctioni fortiter vacet: & haud ita multo post ipsos sit cuiatura. at in eo qui particularis accessionis existit, neque adeo symptomatum magnitudo infestat, neque natura eo tempore ita noxiorum humorum coctioni fortiter vacat, ita ut paulo post ipsos sit cuiatura, cum in eodem particulari summo vigore materiam superauerit, ut Galenus inquit tertio de praesagit. ex pulsarque fuliginosum excrementum expiratione, & contractione eo tempore expellat. Quapropter per alimentum eadem natura ac virtus non distrahitur ad alteram concoctionem, videlicet ipsorum alimentorum: est insuper & eadem materia exigua valde, collatione facta ad eam, quae in vniuersali summo vigore concoquitur, qua etiam ratione non adeo impeditur: praeter id quod eadem sequuntur commoda quae paulo ante dicta sunt: quanquam & hoc etiam tempore vbi vires deficiant, cibare non inconuenit, ut dictum est. Ex iis itaque liquet cauendam esse omnino ci-

bationem in accessionum incrementis, cum rep maximè noxiam existentem, etiam in iam dictis corporibus, quae (vbi oporteat) nedum cum minori noxa quam in incrementis, verum etiam magno cum emolumento in principiis, ac vigoribus earundem accessionum perpetuo exhibetur. Sed iterum obicies, asserens hoc falsum esse eiusdem Galeni auctoritate, citato decimo method. meden. vbi verba faciens de eiusmodi corporibus, ac febricitantibus dicebat: cap. 5. [illos vero omni certè tempore, sed potissimum per inclinationem. Jaddas tu, nutrire poteris. ergo videtur, admittere in ipso etiam incremento alimoniam, dicens omni certè tempore. Huic dicas primo Galen. eiusmodi corporibus omni certè tempore cibum concedere, eorum videlicet, in quibus paulo ante cibum concesserat, & non eo in quo cibum offerre vitauerat, hoc est in incremento. Vel dicas omni certè tempore haec corpora nutrienda esse, sed potissimum per inclinationem, in ceteris vero temporibus, si cibus offeratur, minori cum noxa, aut (ut rectius dicam) citra noxam exhibebitur in principiis, seu vigoribus, maiori autem, aut saltem non citra noxam, in incrementis. in hoc nanque tempore semper maiori cum noxa, quam in principio, & summo vigore cibus adhibetur, vbi laborantes in ediam usque ad inclinationem ferre non valeant, id quod paucissimis quibusdam verbis, nescio quo diuino furore percitus, confirmavit Celsus cap. 5. lib. 3. cum dicebat: [si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistente iam incremento febris aliquid offerre, quam increfcente, satius esse instante quam incipiente, cum eo tamen ut nullo tempore is qui deficit non sit sustinendus.] Quamobrem nedum in praedictis corporibus (licet in his potissimum) idem in exhibendo nutrimento seruare oportebit, sed ceteris omnibus, in quibus protinus in primo, secundoque die, vires imbecillae cernuntur, licet rarius accidat, accedit tamen interdum, vel propter aegrotantis malum corporis habitum, vel propter senium, nonnullis vero fatigatio, vel tristitia, vigiliaeque praecesserunt, & media, & per totum sequuta est diem; item febris priusquam homo cibaretur circa vespem occupauit, & nox infomnis est acta, & propterea vires imbecillae reddita, ut eodem decimo method. scriptum est. Sit porro cibus, qui eisdem temporibus exhibetur, non copiosus, sed modicus, humectandi vim habens, & qui facile concoquatur, ita ut non modò ut nutrimentum, sed ut remedium conferat. Itaque victus species seu forma, modo quo diximus, instituenda erit, morbi summi vigorem, ac aegrotantis vires simul spectans. Deinceps si pertransiri summi incrementum sine omni cibo posse noueris, aegrum in cibi abstinentia seruato, si exiguum adminiculum requirant vires, talis victus adhibendus erit, quo sperare possit ea perdurare posse totum tempus intermedium usque ad morbi summi vigorem, vtruta tenuis. At si maius requirant vires adminiculum, tantum adiacere ad nutrimentum oportet, quantum fuerit de robore virium immutatum, ac plenior victus adhibendus erit, tantum scilicet, quantum virtus imbecillior expostulat. ab his denique scopis nutrimenti diuersa species, seu forma desumitur, cuius copiam maiorem licebit adhibere in morbi principio, quoque incremento, at in summo vigore minorem, & interim (si vires ferant) minimam, atque ita victus formam eo tempore etiam

etiam immutare quandoque, quam victus formam si alicui exquiritam artificiosa quadam coniectura non alicuius, ad paulo pleniorum victum declinare potius, quam ad tenuiorem nitari, tanquam minus malum: eritque talis cibis offerendus in his febribus ex putredine ortis, quæ vnam duntaxat à principio ad finem vsque accessiōnem habent, tempore quo consueuerunt cibari, ac potissimum eo, quo morbum facilius tolerant, in his verò quæ plures habent accessiones, in inclinatione, si continuæ fuerint, in integritate, si intermittant, & ubi spatium fuerit angustum, inter vigorem præcedentis accessiōis, & principium futuræ, interim ad vnum, quandoque ad aliud tempus magis accedere licebit, prout supra cum Galeno conclusimus. Quod si propter virium imbecillitatem tanto tempore incediam ferre non possint, in accessiōum principio sæpius interim verò & in earum summo vigore cibum offerre licebit, incrementum vitantes: quamvis ubi ob aliquem casum virium robur dissoluatur, omni certè tempore cibis sit offerendus. Verum non propterea damnandi sunt nostri temporis medici, qui in primis morbi diebus, primo videlicet, aut ad summum secundo tenuiori vtuntur victu in omnibus ferè morbis indifferenter, ubi exactè eorundem morborum natura non fuerit cognita, modò eadem cognita confestim conueniens victus forma, seu species vsque ad morbi summum vigorem instituitur, eam amplius non immutando præterquam in quantitate, & interim in qualitate seu specie quoque eo modo quo diximus, ni aliquid interuenerit. etenim vires eo tempore validæ sunt, & corpora vt plurimum crudis succis, ac cibis referta, nec adeo facile est morbi naturam, aut etiam febris statim in prima die exquisitè dignoscere. nam ipsemet Galenus dicebat octauo metho. meden. cap. 3. [ego verò nec in omnibus agrotantibus fateor exactè me scire in prima die affectum, nec vllam diaram me febrem posse fugere. J poterit etiam & morbus talis esse natura, vt eodem tenuiori victu indigeat, & ita quoque nihil in victu pecebant, non propterea negantes satius esse talem victus speciem à primo die agrotantibus, & præsertim febrientibus instituere, qualis expedit, habita eiusdem morbi, seu febris exacta notitia, ac perceptis agrotantis viribus.

Quomodo eorum quæ indicant magnitudo spectanda, & quomplex ea sit: ac qua ratione ubi plures coeant indicationes magnæ inter se conferenda sint.

Caput LIII.

VNCTA quæ circa ægrum spectari debent pro febrium curatione, ac eorum quæ conducunt inuentione, tam si medicamenta, quam si alimenta fuerint, satis superque cum Hippo. & Galeno exposuisse puto. Sed quoniam non satis hæc esse censet Galenus, sed inspicere etiam semper conuenit, quando indicationes omnes secum consentiant, & quando inter sese dissentiant, vt ipse ait: omnibus enim cōsentientibus vnam prorsus victus speciem constituemus, dissidentibus verò inter se quæ valentiores ac plures sint, præferemus, ita vt victus species quam hæc præscribunt, præferatur sic tamen vt ne contraria sit neglecta, vt liquet octauo metho. meden. id quod etiam feruari perpetuò iussit in inueniendis, ac adhibendis medicamentis, 7. 9. 10. & 11. eiusdem operis lib. etenim ubi ambiguitas,

pugnæque indicationum inter se ositur, eodem auctore, tum numerum indicationum, tum magnitudinem, simul conseras oportet, nihilque in contrariis indicationibus, vt ipse Galenus inquit, tam competit expendi quam magnitudinem eorum, quæ ad indicationem cōiērent, propterea quomodo hæc indicationum magnitudo inuestigetur, & qua ratione cum aliis conferenda sit, ac præterenda, ubi eadem indicationes pugnabunt, dissidere oportebit, postquam abunde tractauimus quid faciendum sit, ubi omnes consentiant; quibus dilucidatis huic nostræ methodo extremam manum imponemus. Quocirca indicationum potestates rectè examinabis, ubi magnitudinem eorum, quæ ad indicandum cōiērent, intelligas non est autem in omnibus rebus, vnius rationis ipsius maioris natura, eodem Galeno teste, tertio de sanitate tuenda, sed alibi pro viribus & quasi dignitate rei, alibi pro ipsius propria essentia spectanda est idem confirmare videtur octauo metho. meden. sub his verbis: [porrò nihil in contrariis indicationibus tam conuenit expendi, quam magnitudinem eorum, quæ ad indicationem cōiērent, quam vtique ex libro de sanitate tuenda, duplicem esse ostendimus, alteram quæ ex ipso forum quæ indicant dignitatibus censetur, alteram quæ ex ipsorum, vt sic dicam, propriis substantiis, spectetur, quas ex conferendo cum mediocri, & quod secundum naturam est, seu naturali habitu, accipiendas esse testati sumus.] Longè tamen diuersa ab his de indicationum magnitudine scripsisse cernitur idem Galenus vndecimo metho. meden. dum dixit: [ubi verò secum pugnaverint indicationes aliquæ superius comprehensa methodo, ad ea quæ agenda sunt inuenienda, vtendum esse perpenfis scilicet eorum quæ indicant tum magnitudine, tum dignitate. ostendimus enim eligendas eas indicationes esse, quas digniora, maioraque indicantia præscribent. at dignitatem eorum vel vitæ, vel sanitatis respectu iudicandum, magnitudinem verò duplicem esse, vel propriæ substantiæ ratione, vel declinationis à naturali habitu.] hanc verò methodum conscripserat tum citato libro octauo de methodo medendi, partim etiam & nono, & decimo. Porrò hic videtur non in vno duntaxat sibimet pugnare Galenus, nam citato octauo methodi medendi, & tertio de sanitate tuenda, magnitudinem tanquam genus quoddam diuidebat, in eam quæ censetur ex dignitatibus eorum quæ indicant, & eam quæ spectatur ex propriis substantiis eorundem, hoc verò in loco, magnitudinem seorsum à dignitate petpendendam esse præcipit. insuper citatis locis magnitudinem distinctam ab ea quæ ex dignitatibus censetur, seu viribus eorum quæ indicant, vnam esse ait, quæ ex propriis essentis, seu eorum quæ indicant, substantiis spectatur, hic verò duplicem esse magnitudinem fatetur, vel propriæ substantiæ ratione, vel declinationis à naturali habitu: citatis etiam locis eas quæ ex propriis substantiis spectantur, ex conferendo cum mediocri, & quod secundum naturam, desumendas esse præcepit, hic verò alteram dixit esse magnitudinem per declinationem à naturali habitu, seclusam ab ea quæ est ratione propriæ substantiæ. Horum primum facile conciliabimus, si dixerimus tertio de sanitate tuenda, & octauo methodi medendi, vniuersalius sumpsisse magnitudinem eorum, quæ indicent, & vt quoddam genus commune vtriusque magnitudinis, tam

Indicationum magnitudo ex dignitate eorum, quæ indicant, & propria essentia. cap. 9. cap. citato.

cap. citato.

Locus citatus. Gale. sibi ipse repugnare videtur.

Conciliatio locorum Gal.

illius quæ spectatur ex dignitate eorum, quæ indicant, quàm alterius quæ ex propriis substantiis desumitur. Sunt etenim magnæ ambæ indicationes, quæ ex ipsis desumuntur. libro verò vndecimo methodi medendi, perpendendam esse eorum quæ indicant tamen magnitudinem, tum dignitatem, asseruit; specificè magis subintelligens magnitudinem, sumens tamen nomē generis, ut eam distingueret ab ea, quæ pro dignitate capitur, non negans quod magnitudo generalius sumpta sit utrisque communis tanquam genus. At non perinde facile est reliqua conciliare. pro quo animaduertendum, quod ipsa magnitudo quæ ex aduerso distinguitur ei, quæ pro viribus, & quasi dignitate rei spectatur, potest sola seorsum existere absque aliis magnitudinibus eiusdem rationis, aut alterius, sed cum aliis duntaxat indicationibus complicari, quæ nullo modo magnæ sunt: potest insuper coire, tum cum reliquis magnis indicationibus eiusdem generis, tum etiam cum his quæ pro dignitate magnæ sunt. adhuc id quod dignitatis magnum dicitur, ratione etiam propriæ substantiæ magnum, paruumve esse potest, tam si seorsum consistat, quàm si cum aliis complicitur, id quod manifestè Gale. declarauit citato tertio de sanitate tuenda. Vbi exemplum ponens lascitudinis, quæ phlegmones sensum præfert, cum ea quæ vlcerosa seu excrementosa dicitur, si inuicem copulentur, dicebat dignitate maiorem esse primam. demum subdit utraque tamen ipsarum sic propria ratione essentia magna, paruaque esse potest, ut si sola seorsum consistat, utraque quoque ipsarum potest cum aliis copulari magnis, & potest seorsum consistere. Verum ubi seorsum consistant, coeuntes tamen cum aliis indicationibus, ac indicantibus non magnis, vna pro viribus, & quasi dignitate indicantis maior dicitur, reliqua verò pro propria essentia eius quod indicat, ut ibidem liquet. ubi verò simul coeant, id quod magis in indicando pollet, explorandum est. modum verò idem Galenus ostendit eodem loco, ubi continuans adhuc sermonem de iam dictis lascitudinibus dicebat: [si igitur utraque pari intervallo à naturali habitu, seu ab eo quod secundum naturam est, recessit, quæ phlegmones similis est, præcipuam curationis sollicitudinem ad se conuertet, utpote dignitate pollēs, sin exiguè quæ phlegmones, plurimum quæ vlcis sensum representat, à naturali habitu recessit, æstimandum num tantum superet magnitudine vlcerosa, quantum quæ phlegmone similis est, viribus, an minus, an magis, atque ita quod pollet explorare, quod si æqualiter pollentes videris, pari studio utrique consulendum, atque ratio hæc perpetua sit omnium coniugatorum affectuum.] Hanc eandem sententiam, scilicet ubi plura coeant, quæ ob eorum magnitudinem indicent, ac contrarium exigant, confirmant idem Galenus octauo methodi medendi, cum dicebat, [Porro nihil in contrariis indicationibus tam conuenit expendi, quàm magnitudinem eorum quæ ad indicationem coierunt.] dixit namque eorum numero plurali, deinceps hanc magnitudinem duplicem esse in libro de sanitate tuenda, se ostendisse fatebatur, & declarans insuper hanc duplicem magnitudinem, subdebat alteram, quæ ex ipsorum quæ indicant dignitatibus censetur, alteram quæ ex ipsorum, ut sic dicam propriis substantiis spectetur: & addit, quas iterum in numero plurali, & non dixit quam in singulari ex con-

ferendo cum mediocri, & quod secundum naturam est, accipiendæ esse citati sumus. quare doctæque plura coeant, quæ ob eorum magnitudinem indicant, ac contraria expostulant, eorum substantias spectare oportet, collatione facta ad id quod secundum naturam exiit, hoc est quantum eorum quodlibet à naturali statu recesserit, quantum enim quodque à naturali statu recesserit, ad tantam magnitudinem morbus peruenit, inquit idem Galenus primo de arte curatiua ad Glauc. cap. 1. hoc etenim inuento, eadem ratio seruanda erit in curatione perpetuò, quam docuit in paulò ante citatis verbis tertio de sanitate tuenda, libro verò vndecimo methodi medendi, easdem indicationes, quas digniora, maioraque indicantia præferunt, tam si insimul compliceantur, quàm si cum aliis indicationibus copulentur non magnis, ubi secum pugnaverint aliqua, particularem magis modum eas perpendendi docuit, ab eis tamen quæ citatis locis præceperat non recedens. Docebat enim primò quomodo iudicanda sit dignitas eorum, quæ indicant: quod videlicet vel respectu vitæ vel respectu sanitatis, ut vires ubi indicant, earum indicatio digna est respectu vitæ, febris autem indicatio digna respectu sanitatis: & ob id non de methodo medendi cap. 13. præcipiebat quod virtus omnium prima esset custodienda, utpote quæ dignitate magis pollet, à virium indicatione proximam esse, quæ ab affectibus, quos curare proponimus, datur, deinceps reliquæ, subdebat postmodum eodem vndecimo: [magnitudinem verò duplicem esse, vel propriæ substantiæ ratione, vel declinationis à naturali habitu: non quod hæc magnitudo quam ex aduerso distinxerat paulò ante, et quæ ex dignitate sumitur, re ipsa duplex sit, sed quod ea non semper vno duntaxat modo perpendenda sit, sed duplici, vno modo si sola seorsum consistat, pugnaveritque cum aliis indicationibus non magnis, & ita spectanda est ratione propriæ substantiæ, quoniam non comparatur alteri magnæ indicationi: hanc etiam noscendam esse magnitudinem ex priorum symptomatum quæritate, seu magnitudine præcepit, libro tertio de crisi, & libro de constitutione artis medicæ, secundo modo iudicanda erit per declinationem à naturali habitu, ubi videlicet cum aliis coeat magnis indicationibus, secumque pugnaverint. nam aut æquè ab eo recedunt, & ita utrique pari studio consulendum, aut magis, aut minus, quo casu magis de vno quàm de altero solliciti esse debemus, præcipuam semper curationis sollicitudinem ad se conuertens, id quod maiori intervallo à naturali habitu recesserit, vel licet pari intervallo recesserint, polleat tamen vna altera dignitate. Nam & hæc etiam dignitatis magnitudo ratione propriæ substantiæ quodque magna esse potest, nec aliter perpendenda erit, quàm per recessum à naturali habitu, tam si seorsum consistat, quàm si cum aliis coeat ratione propriæ substantiæ indicationibus magnis, & hæc ratio perpetua est omnium coniugatorum affectuum, inquit Galenus, præcitato libro tertio de sanitate tuenda. Ex quibus liquet, quod quamuis speciatim magis definiuerit harum magnitudinum naturam, libro vndecimo de methodo medendi, Galenus non propterea aliud re ipsa per easdem intelligere voluit, quàm id quod de eisdem distulerat citato libro tertio de sanitate tuenda, & octauo

Loco citato.

Loco citato.

Loco citato.

Loco citato.

Obiect.

Cap. 12.

Diluit
visione

Gale. m
quindi
pares
vires
vires

Cap. 12.

Gale. a
aque
ter de
plici
quindi
affectu

Concil
locorū
leni.

Comm
super

Cap. 9
Loco citato.

ob quo meth. medendi, neque in his sibi pugnancia scripsit. Sed non ab re quispiam quaereret, quomodo citatis locis Galen. duplicem tantum esse magnitudinem determinat eorum quae indicat, eamque esse spectandam vel ratione dignitatis, vel ratione propriae substantiae, si quarto de methodo medendi cap. 6. asserit non vlcera, vulneraque duntaxat, verumetiam reliqua omnia vitia grauiamagnaque posse reddi trifariam. Nam vel propter affectus partis praestantiam, vel propter affectus magnitudinem, vel propterea quod sunt cacoethae, & paucis quibusdam interiectis illud confirmauit asserens: [nam cum triplici genere morbus quisque sit grauis, aut propter praecellentiam partis, aut propter affectus magnitudinem, aut propter ipsius cacoethiam. I necnon & septimo eiusdem operis libri, de affectus magnitudine verba faciens, quod videlicet ea perpendenda sit, dicebat: [ea triplex est, alia quae ex laesa actionis praestantia spectatur, alia quae ex propria affectus essentia, & tertia praeter has, quae ex facultate quae laesum corpus gubernat, aestimatur.] Dicas perpetuo magnitudinem eorum quae indicant, duplici tantum ratione spectandam esse, nempe vel ratione virium, seu dignitatis, vel ratione propriae essentiae, seu substantiae: & sicubi Galenus plures conscripserit, clarioris doctrinae gratia, de eis speciatim magis verba fecit, tamen omnes ad iam dictas duas reduci, atque semper sub eis contineri voluit: & propterea cacoethiae, si ob magnitudinem quandam indicat, erit ratione dignitatis; quare sub ea continebitur. Si autem eadem quoque magna fuerit ratione propriae essentiae, vtraque ratione indicabit, ut paulo ante demonstraui. Similiter ea magnitudo quae aestimatur ex facultate, quae laesum corpus gubernat, ad eandem reducit magnitudinem, quae ratione dignitatis capitur. Sed quod mihi admodum difficile videtur, est concordare eiusdem Galen. dicta de triplici magnitudine ipsorum affectuum. Nam quarto de methodo medendi cap. 6. ut paulo ante annotauimus, pro tertia affectus magnitudine connumerabat cacoethiam, septimo vero eiusdem, non ex cacoethia, sed ex facultate, quae laesum corpus gubernat, aestimandam esse dicebat. Fateor me hercle diu fatigasse pugnanciam hanc, ac diu etiam laborasse pro ea soluenda, dicam tamen quid sentiam. Appellant medici vlcera quae omnibus rite decenterque factis tamen non sanantur. Graece *κακοῦν*, nos maligna, contumacia, rebelliae dicimus, ut liquet quarto methodi medendi, libro vero primo de morbis vulgaribus, fateatur Galenus sibi constare esse morbum *κακοῦν*, ubi cum recte omnia administrantur, nihilo fit mitior. Constat insuper apud omnes medicos tales morbos ob vitium, seu humorum corruptelam fieri, ac generari, siue in vniuerso corpore, siue in quibusdam partibus, aut in vna duntaxat corrumpantur, propterea quod virtus eos haudquaquam euincere, domare, ac concoquere valet, & assimilare. Hanc facultatem puto Galenum intellexisse per eam quae laesum corpus gubernat, diuersam siquidem ab eis quae in tribus principibus partibus residunt: est autem ea alteratrix, seu immutatrix facultas, quae singulis partibus communis existit, est cultas, quae singulis partibus communis existit, est etiam cuiusque propria. Quapropter & in quibusdam determinatis, & in vniuerso corpore laedi, seu

vitari eam contingit, qua taliter corrupta, aut particularis quispiam morbus *κακοῦν* est, siue malignus generatur, aut quispiam alius vniuersalis etiam in vniuerso corpore. Ex quibus cuius patere arbitror, idem fere esse dicere quod quidam magni reddantur morbi, propterea quod sunt *κακοῦν* est, quod asserere vitiatam esse facultatem, quae laesum corpus gubernat, atque eam aestimandam esse, cum ex eiusdem vitio, ut diximus, humores corrumpantur, ex quibus maligni contumacisque morbi originem ducunt.

Nonnullis exemplis, ratio spectandi indicationum magnitudines, examinatur. Caput LIIII.



T verò communis haec ratio, omnium quae inter se complicatae sunt contrariarum indicationum, magis pateat artis medicae tyronibus, pluribus exemplis eam examinandam esse duxi, atque primò in morbis ipsis, ubi simul coeant, siue contrarij, siue non contrarij sint, in quibus omnibus eiusmodi complexionibus triplex tibi propositus scopus, seu finis erit, Galeni auctoritate, tertio & septimo methodo medendi c. 9. & c. 12. Primò namque aestimare debes à quo maxime affectu discrimen agro impendere videatur. Secundo quid quae ex his, causae rationem obtineant, & quae ab ipsis efficiantur. Tertio, quae sanari ante alia possint, & quae non possint. Vbi enim à quoquam affectuum periculum non leue instat, ad id quod vrget dirigi primum curantis consilium debet. Nam affectus vnde primum maximèque periculum homini imminet, hic primum curari debet, interim verò non primus modo, verumetiam solus, quemadmodum exempla ponit Galenus eodem tertio de methodo medendi, de capite musculi puncti, & superueniente conuulsione, quae nulla convenientium medicamentorum vi remittatur. Praeciso etenim per transversum toto musculo, conuulsionem sanabis licet aliquem ex particulari motibus vitiaueris, similiter etiam cum è vena, vel arteria sanguis immodicè profluat, cogimur interdum totum vas praecidere, & etiam neruum punctum ubi conuulsiones vel deliria, aut etiam ambo magna, aegreque sanabilia superuenerint. Est itaque in hoc curationis consilio, quod ab urgente initur, affectus magnitudo semper perpendenda, cum ex his maximè ac primum agro periculum imminet, ut diximus, quacunque ratione magni fuerint. Vbi etenim inuicem copulentur morbi quidam, eatenus habebunt communem indicationem curationis, quatenus copulabuntur, vel nobis scilicet ad id quod magis vrget obuiantibus, non tamen alterius cura omnino posthabita, vel omnibus pari studio auxiliantibus, ubi videlicet aequè vrgeant, & magni sint, perquam rarissimè autem, ut dictum est, quandoque solum, etiam ubi maximè vrgeat, curamus. Sic itaque si quispiam morbo laterali, ac sanguinis spuratione laboret, qui contrarias exigunt curationes, ad id quod vrget magis obuiare oportet, non omnino posthabita etiam alterius curatione, ut inquit Galenus commento aphorismi 16. primi libri. Similiter si quis febricitauerit, & aqua intereunte laborauerit, ad ambos affectus respicientes, qui quidem contrariam exigunt cu-

Yy 4

rationem. Vtrique eorum solerter resistimus, sicut & in aliis omnibus pariter copulatis, ut ibidem testatur Galen. Atqui solerter omnibus talibus resistimus, ut si æquē vigeant, omnibus pari studio auxiliemur, si verò vnus altero magis vigeat, huic primo & magis auxiliabimur, altero tamen omnino non neglecto: hæc verò curationis prælatio fiet,

2. Scopus in indicationis complexibus considerandus.
eodem Galeno teste, octauo methodi medendi. cap. vlt. alias vtrisque in vnus auxiliij materiam mixtis, alias seorsum sumpris. Secundo loco exstimandum esse proposuimus, quid ex iis quæ copulantur causæ rationem obtineat, & quid ab ipso efficiatur, ita ut id augere aut gignere reliqua possit, reliquum verò vel gignatur, vel incrementum ab eo accipiat. Et enim manente adhuc eo affectu, qui velut causa alium excitauit, hunc prius tolli expedit. Nam omnino in omnibus, in quibus effectrix causa adhuc manet morbis, ab hac exordienda curatio est, inquit Galenus quarto methodi medendi, cap. 4. quemadmodum abunde etiam in præcedentibus à nobis demonstratum est, quapropter ubi aliud efficiens est, aliud quod ab eo efficitur, ipsa causa spectanda erit, ut liquet eodem septimo methodi medendi.

Loco citato.
3. Scopus de ordine curandorum.
Loc. citatus.
Si vnus morbus plures offerat indicationes.
Si verò in complicatis hisce affectibus, vnus rationem obtineat eius sine quo non, ita ut reliqui affectus sanari non possint, eo non curato, ipse verò ante alios curari possit, ordo spectandus est, quid ante quod videlicet, vel quid cum quo, vel quid post quod sanari possit, eodem Galeno teste, citatis libro tertio, & septimo de methodo medendi. At si non plures fuerint coeuntes morbi, sed is vnus sit, verum qui contrariam indicationem subiiciat, aut naturali laborantis temperamento, aut ei quod nunc acquisierit, præterea ætati, consuetudini, regioni, anni tempori, & cæli statui, ita ut pugna indicationum inter se oriatur, hoc etiam casu magnopere opus est tum numerum indicationum, tum magnitudinem simul conferre. Exempli gratia, si quispiam febre correptus fuerit, qua ratione victum requirat, qui refrigeret & humectet, reliqua verò contraria expostulent, nisi quispiam ita indicationum potestates examinet, nequeat sane mensuram victus inuenire. Nam cum refrigerandum, humectandumque esse febris perpetuo indicet, reliquorum verò cuiusque concors indicatio fuerit, nullum exhibetur negotium. Nam humectantia, refrigerantiaque exhibenda sunt non solum, sed etiam nec leuiter hæc, nec vtrunque faciendū, imò planè magnopere ac vehementer omnibus scilicet indicationibus idem distantibus. ubi autem discors, pro pluribus ac potioribus formari victus ratio debebit: quippe quæ à febre sumitur indicatio, ea reliquis, quando omnes contrarium faciendum indicabunt, numero quidem inferior est, magnitudine tamen quæ ex dignitate, aut potestate spectatur, superior, potissimum si longe à natura recesserit. Nam tum duplex magnitudo illi accedit, siquidem & quia febris plus ceteris omnibus sollicitos nos habet, & quia præterquam quod febris est, etiam illi magnitudo notabilis accessit, idcirco contrarias indicationes inducit, atque obumbrat: sin verò parua fuerit febris, fas est reliquas omnes indicationes vnâ coniunctas cum ea conferri atque expendi: ac siquidem pares videantur, neque febris indicatio præferatur, neque etiam reliquorum, imò media victus ra-

tio, ubi ita se corpus habet, eligenda erit: ita neque humectandum refrigerandumque sit, neque febris desiderat, neque calfaciendum & exsiccandum, quemadmodum reliqua præscribunt. Si altera indicatio exuperat, tantum recessisse à temperato & medio victu par est, quantum ea quæ preuident, sua contraria superant: qua de re tum exercitatum in his omnibus, tum natura prudentem esse medicum conueniet, quò cuiusque indicationis potestate diligenter considerata, omnibusque inter se collatis, vnâ idonei victus summam, quæ laboranti sit, comparet, ut liquet octauo de methodo medendi. cap. vltim. quo loco duorum hominum febre laborantium ponit exemplum, qui, licet in regione nati, ac educati sint temperata, in diuersis tamen febre corripiantur, ac diuersa quoque indicantia pro victus institutione contineant. Idem quoque seruari debet in victus forma, ac eius quantitate. Nam si febris peracuta fuerit infra septimum videlicet indicanda, qua ratione tenuis victus febrienti exhibendus sit, ut pitisanæ cremor, & eius quoque exigua quantitas, verum consuetudo, ætas & tempus anni, aut etiam ipsa per se sola consuetudo aliam victus formam, seu eiusdem maiorem copiam requirant, cum semper seruandam esse in agris consuetudinem præceperit Galenus, & quantum ipsius pitisanæ ingerere oporteat, ab ipsa consuetudine sumenda sit indicatio, ut liquet primo de ratione victus in morbis acutis, propterea ab hac indicationem sumentes alia victus forma, quam morbus requirat, immutanda erit, aut saltem eiusdem quantitate adaucta, dignitate pollens in hoc indicatio quæ à consuetudine sumitur, etiam si febris aliam admittat victus rationem. Item ubi quispiam affectu aliquo laborabit, qui pro sui curatione, vacationem requirat, vires autem extrema imbecillitate laborent, adeo ut nullam notatu dignam ferre possint vacationem, cum indicantia contraria sint, indicationes aduersentur, pariter & indicata, dicimus cum Galeno nono methodi medendi. cap. 13. quò toto illo tempore quo vires rescimus, eorum quæ affectum sanent nihil planè agrotanti exhibebimus. Quicquid enim indicationi, quam vires præbent, aduersatur, id secundi est loci, ac posterioris us, quæ illæ præcipiunt: dignitate nanque ipsæ prævalent, & propterea quæ ipsis aduersantur dicebat Galenus citato loco, aliquando administranda prorsus non sunt, ut in hoc casu, aliquando paulatim seu modicè, & quoniam à virium indicatione proxima est, ut ipse refert, quæ ab affectibus, quos curare proponimus, datur ubi eo roboris peruenisse eas conuicimus, ut nihil, aut parum ex vacuando sint lædendæ, tum quoque ad affectus curationem est accedendum. Nanque si abundantia paulò viribus superior fuerit, vtrique ex moderata vacatione, adeo nullum accedit viribus incommodum, ut etiam maximum comparatur commodum, eo quod eas premebat, sublato, eodem Galeno teste citato loco. Rursus laboret quispiam affectu quopiam, qui pro eius curatione multa vacatione indigeat, idque vel vena incisa, vel purgatione, vires verò adsint laboranti non adeo extrema imbecillitate, imbecillæ tamen, ut ex tanta inanitione resoluantur, sit porro affectus hic humorum corruptela: quod enim corruptum est, id alienum à natura existit quod tale est, id se auferendum

du in dictat, tuinimò quod omnino alienum est, nulla fieri ratione potest, ut id naturæ suæ gratiam recipiat, sed elucere id quamprimum est tentandum. Galenouctore, quarto de sanitate tuenda. Cap. 4. verum ubi perinde fuerit æger viribus imbecillis, utique quod affectus remedium est, id cum virtutis custodia pugnat, siquidem affectus, ut diximus, vaciandum esse præcipit, idque vel vena incisa, vel purgatione, harum autem neutram ferunt imbecillæ vires: quoniam verò in eiusmodi repugnantis incerta succurrendi ratio est, aliàs infanabili omnino affectus relinquitur, aliàs spatio & æge sanari poterit. Idque si magnum nactus sit medicum. Quapropter ubi indicationes, ac indicantia ita sibi aduersantur, & paulatim quod vitiosum est vacuare, & paulatim inuicem quod salubre est, pro eo reponere oportet. vocant autem medici eiusmodi vitiosi succi curationem Græcè *ἀνταγωνισμὸν*; hoc etenim casu cum vires non extrema imbecillitate laborent, ea quæ ipsis aduersantur, modicè & paulatim administranda sunt, & non prorsus vitanda, ut in eo quem ante hunc posuimus. Id etiam confirmavit idem Galenus libro de curandi ratione per venæ sectionem, cap. 12. dum inquit. [Vbi ergo multa euacuatione est opus, verum vires sunt imbecilliores, in his euacuationem partiri expedit.] Amplius cum tria sint illa prima quæ in febribus ob putredinem ortis agendorum indicationem nobis præbeant, ad quæ attentum te esse oportet in prædictis febribus curandis, vna quidem febris ipsa, altera effectrix eius causa, & tertia agrotantis vires, quorum prima duo submouenda sunt, tertium verò est tuendum; & idè oportet ut cum viribus tum febrem, tum causam inuicem conferas, ut inquit Galenus decimo de methodo medendi, cap. 1. ubi horum indicationes pugnant, quæ inter eas præferenda sit, nempe quæ cæteris sit valentior, hanc magis sequaris oportet, non tamen cæteras negligens, hinc doceberis, primum causam, febremque profligare, ubi videlicet conieceris harum remedia vires posse ferre. rursus primum roborandas vires esse, ubi hæ imbecilliores fuerint, quàm ut causæ, febrisque præsidia sustineant. Si verò causam ad febrem compares, plerumque causæ maior est vis: quamvis aliquando fieri possit, ut ea sit febris magnitudo, quæ præsentem perniciem, nisi occurras, offerat. quo casu oportebit hac prius summotâ, deinde ad causam accedere, quapropter ubi in idem consentiant, & quæ febrem extinguunt, & quæ causam oppugnant, in quod utraque conspirant cum vnum sit, sine cunctatione agendum est. sin febris, quæ iam accensa sit, sanatio, causam quæ hanc excitauit, est auctura, aut quæ causam summotam, febrem exasperabunt, diligens habenda consideratio est de remediorum specie, ut inquit Galenus citato loco. Hinc colligas, quòd ubi quispiam febre laboret ex putredine orta, quæ mediocri sit, ac vires valentes fuerint, quæ à causa sumitur, indicatio præferenda est, ut paulò ante concludimus: interim autem ea quæ à febre desumitur haudquaquam negligenda. si verò febris perinde magna sit, ut agro fuerit intolerabilis, adeò ut præsentem perniciem, nisi occurras, afferat, viribus adhuc validis existentibus, adhibenda prius sunt, quæ febrem extinguunt, cum eius indicatio maior, ac

valentior fuerit, non solum dignitatis ratione, verum etiam & propriæ substantiæ. Quare eadem præferenda erit, causam adhuc non contemnendo, sed ea extincta, deinde ad causam accedere oportet. Sed dices, si magna fuerit febris, & causa, ita ut ambo propter earum magnitudinem indicent, & vires non amplius robustæ, sed imbecillæ, adeò ut dictorum auxilia ferre non valeant, quam dicemus præferendam esse indicationem? Huic cum Galeno satisfacimus, quòd ea præferenda est, quæ à viribus desumitur. dicebat etenim citato libro decimo methodi medendi. [Rursus primam roborandam virtutem esse, ubi hæc imbecillior est, quàm ut causæ, febrisque præsidia sustineat.] & si dicas plures esse indicationes quæ à causa, & etiam febre capiuntur, ac etiam maiores quàm ea quæ à viribus desumitur, dicimus nos adhuc præferendam esse indicationem à viribus desumptam; & si numero inferior sit, præualet tamen magnitudine nam & sanitatis ratione quæ à febre, & eius causa desumuntur indicationes magnæ sint, licet in substantia adhuc magnæ sint, quæ verò à viribus, & æquè magna est, aut fortè maior ratione propriæ substantiæ, & dignitate etiam præualet, cum non respectu sanitatis iudicetur eius dignitas, sed respectu vitæ, nec quispiam asserere poterit quòd minus vires recedant à naturali habitu, cum posuerimus eas adeò imbecilles esse, ut dictorum auxilia ferre nequeant. Quòd si quispiam hæsitauerit asserens hoc in loco Galenum de virtute naturali duntaxat mentionem fecisse, cum 9. eiusdem cap. 10. tres facultates, seu vires corpus nostrum dispensare asseruisset, ac cunctas spectandas esse, cum nihil aliud sit vitam seruare, quàm easdem vires conseruare, fatebimur nos primò in quibusdam Græcis codicibus desiderari vox illa [naturalis], sed virtus duntaxat scribi, per quam idem intelligendum erit quòd de tribus facultatibus dixerat, citato libro 9. etenim vna est virtus genere, plures specie, ut in præcedentibus cum Hippocrat. declarauimus, quòd si eadem conscribatur, adhuc conciliari poterit Galen. cum iis quæ scripsit 11. libri eiusdem operis, cap. 9. cum dicebat: [neque enim pulsus duntaxat vires, ad huiusmodi agenda firmas requirimus, veluti nec eius facultatis quæ voluntarium motum præstat, sed sicut dictum est ipsius potiùs concoctricis.] quare dicendum erit in febribus nos vires omnes firmas requirere, præcipuè tamen naturales, & inter eas concoctricem. quapropter & si dixisset libro 10. à virtute naturali sumendam esse indicationem, intelligendum est præcipuè, non negans idem Galenus quòd cæteræ quoque firmæ requirantur, pro curandis febribus, præsertim ex putredine ortis. Sed quid agendum sit quæreret quispiam, si cum quapiam febre ex putredine orta, coëat vehemens aliquod symptoma, dixi vehemens, quoniam symptoma, quæ symptoma est, nunquā curationis ratione indicat, nec curationem interpellat, quippe cum vnà cū affectu vnde nascitur cesset: & propterea cum affectuum sanatio, eorum sublatio sit, hanc symptomatum quoque amotio sequitur, ut 11. & 12. med. meth. scriptum est. sed quæratur si cum febre incendant vehementia, seu grauiora symptomata, quibus prospici maiore medentis sollicitudine debet, quæ ratio eorum in curatione habenda sit. possunt etenim quemadmodum

*Dubitatio
cui mox satisfaci-*

Cap. præ-

Loco cita-

*Si cum febre ex putredine grauius aliquod symptoma copuletur.
cap. 12 & cap. 1.*

vnus morbus cum alio morbo, & symptoma symptomati vno tempore, ita quoque & symptoma cum morbo copulari; dico symptoma talis rationis quod scilicet vehemens, seu grauius sit: hoc nanque symptoma est quod ex accidenti quandoque curandi rationem mutat. causa scilicet locū eo tempore habens. At cum eorum omnium, quæ veluti causæ curationem immutant, vnum caput sit, dico id vnum læsionem, siue ea ipsius virtutis sit, siue affectionis, quando si nihil iis officiat, curationem non interpellat, ea propter cum Galeno decernimus, quod cum similia symptomata cum quavis febre incidunt, sollicitudinem medici ad se conuertunt, affectumque ipsum, hoc est febrem, deferere cogunt causæ eo tempore vt diximus, locum habentia, & veluti etiam causæ curationem immutant. Sunt verò potissimum symptomata hæc vigilæ, dolor & immodica euacuatio, vt liquet eodem 12. de method. medend. cap. 1. quæ quidem vires semper lædunt, affectui verò ea non vtique semper. Ceterum magna ex parte nocent, ac potissimum cum fuerint immodica, vt Galenus inquit. Ob hæc igitur curandi ratione, quam ab initio institueramus ad præsens mutata, symptomata prius submouere cogimur. Ergo si etiam labant vires ob aliquod iam dictorum symptomatum, non tamen vehementer sint resolutæ, sed adhuc resistent, ad symptoma tantum sumus attenti, atque id quamprimum submouere maturamus: si verò iam resolutæ vehementer vires sint, non modo symptoma sedare, sed etiam illas firmare properamus. nam si ex dolore vires resoluuntur, atque ex eo periculum impendet, & mitigari dolor, & roborari vires debebunt, quo & morbo resistere, & curationis spatio sufficere valeant, vt citato libro duodecimo method. medend. scriptum est. Eadem quoque ratio habenda erit de vigilis, & immodica vacuatione, ac reliquis symptomatis quæ cum febre incidunt: nam hæc febres non æque simplicem exigunt curationem. at pro

viribus metiendum est quanta sit febris, quam ex symptomatis periculum imminuat, atque ad id quod vehementius ac difficilius intendendum, non omnino alterius curatione posthabita, vt inquit 1. de arte curatiua ad Glauconem, cap. 14. Si quis autem velit quantum humanis permittitur viribus, hac nostra methodo in metendis febribus non errare; pauca hæc semper memoria tenere oportebit. Primum spectare debet omnia a quibus indicatio præstat ad auxiliorum inuentiones, quomodolibet ad eas conducere videbuntur, atque a singulis sufficientes indicationes sumere, quando si vel vnam aliquam earum prætereant ad portionem tum magnitudinis illius, tum facultatis, curatio claudicabit, Galeno auctore vndecimo method. medend. cap. 2. Quibus omnibus perperis id quoque necessarii spectandum erit, quod eorum quæ ad auxiliorum inuentiones conducunt, magis, quod vni minus alio valeat ad inuenienda remedia, aut adeo valens sit, vt solum indicare videatur, aut ita imbecillum vt omittatur: quinimo nec in aliis vllis curatio, quæ per methodum agitur consistit, quam in his, eodem Galeno teste nono method. medend. Tertium & vltimum, cuius nunquam obliuisci oportet, est, quod ubi indicationes ipsæ inter sese pugnauerint, valentiores, ac plures præferendæ sunt, aliis tamen non omnino neglectis. Dico valentiores, eas quæ magnitudine alias præcellunt: etenim nihil in contrariis indicationibus tam conuenit expendi, vt Galenus ait octauo method. medend. cap. vltim. quàm magnitudinem eorum, quæ ad indicationem coierunt: cum autem non vnus dūtaxat rationis sit magnitudinis natura, quomodo qualibet earum spectanda sit, paulo ante disseruimus. Nunc verò iam tempus est, ad particularem medendi methodum accedamus; qua media valeamus singulas particulares omnes febrium differentias inuestigare, tum dignoscere, tum etiam curare.

FINIS PRIMÆ PARTIS.

DON

DONATI ANTONII

AB ALTOMARI, ARTIS

MEDICÆ DE MEDENDIS

FEBRIBVS,
PARS SECVNDA.

Qua via particulares febrium differentia vestigantur: ac proponuntur quæ ex humorum putredine excutiantur differenda. Caput 1.



VOMODO tria prima ac vniuersalissima febrium genera quispiam methodo curare valeat, ad vngue definiuimus: sed quoniam in primis atque communibus generibus statim non est, ita vt ab illis duntaxat indi-

cationes sumamus, sed (vt posuimus) eadem quoque subdiuidere oportet, quousque ad ea quæ amplius sectionem non admittunt perueniamus, vt perfectè & particulatim omnes particulares febrium differentia curari possint. Hanc ob rem ad diuidenda ea prima genera transcendendum esse arbitror, vt ab omnibus, ac singulis particulatim desumptis sufficientibus indicationibus, in curandis eisdem febribus, quantum humanis permittitur viribus non erremus, ab ipsis diariis exordientes, quæ quidem quatenus in genere communicant, communem quoque omnes curationem desiderant, & nos eam in præcedentibus docuimus. Est verò diariis omnibus commune, quod in eis sola ærea seu spiritiosa substantia sufficienter incaluit, vt liquet primo de differentiis febrium, & ob id suapte natura & vna die soluantur, & vnam habent à principio ad finem vsque accessionem citra putredinem, perpetuæque quantum in ipsis est refrigerantia, & humectantia requirunt, vt octauo, nono, & decimo method. medend. scriptum est. Quatenus verò non omnes ex eadem causa accenduntur, neque etiam per eundem corporis affectum, sed à pluribus, ac variis causis, & per diuersos quoque corporis affectus generantur, in particulari curatione discedere videntur, particularibus ex iis pro earum curatione indicationibus desumptis, externas tamen causas semper à sermone excipiendo, à quibus nunquam pro curatione aliqua sumitur indicatio, vt fusius disserimus. Fieri autem consueverunt ex immodico frigore, exustione, balneo aluminosæ

aquæ, aut alterius adstringendi vim habentis, ex leui obstructione, labore, ira, timore, tristitia, vigiliis, pertinaci studio, cruditate, ex bubone, furore, ebrietate, inedia, curis, ac diuturnis cogitationibus. Quarum etiam diariarum febrium, quemadmodum non vna est causa, ita etiam neque vnus est affectus, per quem generationem habent, sed in quibusdam inseparabilis est stipatio, ab aliquibus minimè inseparabilis, sed vel plerumque simul adest, vel ambigua forte, vel raro, vt Galen. inquit 10. method. medend. cap. 2. Quamobrem diariarum febrium plures videntur esse particulares differentia, vna, quando iam prorsus abiit effectrix earum causa, veluti exustio, altera, quædo hæc etiam adest, sicut stipatio, vt liquet citato loco; quamvis vno quatuor modorum semper generentur, vt prius determinauimus. attamen cum harum omnium curationi quidem facilima ac in promptu sit: omnesque balneis curare oportet, Gal. teste 1. de arte cur. ad Glau. cap. 2. ob id ad particularem earundem curationem non descendam, tum propterea quod raro à medicis febres hæc particulatim curari soleant, eamque curationem promptè quispiam inueniet apud omnes fermè artis medicæ auctores, & præsertim apud Gal. 8. & 10. de meth. medend. & eodem 1. de arte cur. ad Glau. quemadmodum etiam, & particularem earum dignoscendi modum, non solum citatis locis, sed etiam 2. de crisi. cap. 13. idem auctor conscripsit. Reliquorum verò duorum generum, alterum in præcedenti nostra methodo subdiuisimus, abundeque monstrauimus hecticarum differentias plures quam tres esse non posse; licet quomodo speciatim illæ curari debent, distulimus: intendimus enim postea in particulari febrium exercitatione particularem modum curationis earum fusilime conscribere, vbi prius modum curationis docuerimus particularem omnium earum febrium, quæ ex putredine ortum habent. Hoc itaque genere primò desumpto, ac in particulares differentias subdiuiso vsque dum ad insectiles perueniamus, singulas eius differentias diuisua methodo vestigare intendimus, ac eis inuentis speciatim curare. Quocirca asserimus cunctas quas dinumerauimus putredinis differentias, qui in nostris corporibus continentur humores suscipere posse, licet quidam agrius, quidam promptius putrescât, id verò omnibus ferè medicis in cōfesso est. quæobrem pro humorum varietate qui eadem

*Diariarum
differentia.
cap. 14.
1. partus.*

Loco citato.

*Hæctica,
ex ex putredine ortæ.*

*Diuisio feb.
ex putredine,
ex humorum diuisione.*

Diariis omnibus commune materia & indicationes.

cap. 1. cap. 14. & cap. 15.

Diariis pro causis & particulatim naturæ, quæ & particulatim habent curationem indicationes Diariis causæ.

suscipiunt putredinē, particulares huius generis febrium differentias facile quispiam investigabit, simplices primò, de quibus in primis sermonem faciemus, & deinde compositas: quæ etiam via, & ratione ipsemet Galenus easdem differentias vestigare docet 2. de different. febr. & 2. de crisib. neque enim plures, neque pauciores esse possunt quam humores, qui eandem suscipiunt putredinem. Quamvis & in hoc etiam non vna duntaxat reperiatur erronea, ac prava opinio. Etenim quidam, ex bile solummodo redundante has febres accendi putarunt. Aduer-
cap. 1. & 2. cap. 1. & 2. seq.
Errores quorundam de febr. ex putredine.
 tentia abundè inuehit, citato libro 2. de different. febr. demonstrans quòd non ex sola flava bile, sed & aliis etiam humoribus febres oriri queunt. probat insuper neque etiam satis esse ad eandem febrium generationem, quòd flava bilis redundet, aut etiam cæteri humores, sed quòd eos prius putrescere oporteat, aliàs febrem haudquaquam efficient. Quidam verò non bilem, sed pituitam, febrium materiam esse censebant, ex eo quòd ad putrescendum, & obturandum non parum idonea est, cum humida sit, & crassa: indicareque illud dicebant pituitæ vocabulum quod φλέγμα Græcè dicitur ἀπὸ φλέγῃν, quod est inflammare. Cæterum quidam asseruerunt ab humore melancholico nunquam febrem ipsam accendi posse, eo quòd ipse frigidus sit natura & siccus, nihilque habet humidi aut calidi, unde putredines generantur. Nec desunt qui in vniuersum febrem nunquam à putredine fieri pronuntiauerint, nam humores in venis exardescere, & non putrefieri dicunt. Si namque hoc esset (inquiunt) cur tandem non etiam lumbrici, aut aliæ quædam bestię in vasis, si putrefactio est, gigni cernantur, quemadmodum in ventre, & aliis particulis? Quæ omnes prauæ opiniones ab Alexandro cap. 2. lib. 12. recensentur. Et si quis velit Gal. verba perfectè examinare, ac intelligere, omnes ferè iam dictæ opiniones, ab eodem confutantur circa principium 2. de differentiis febrium. Atqui nos non in refellendis aliorum opinionibus studebimus, sed in veritate inuestiganda duntaxat laborantes, simul cum Galeno fatemur tot esse primas particulares, ac simplices differentias febrium, quæ ex humorum putredine fiunt, quot numero sunt humores ipsi: quapropter ex eorum numero eadem diuisua methòdo vtentes eas inuestigabimus, quemadmodum etiam eadem prima vniuersalissima tria febrium genera ex triplici substantia, ex qua nostra constituuntur corpora, inuestigauimus, quæ Hippocrates continentia, contenta, & impetum facientia nuncupauerat, Galenus verò partes solidas, humores, ac spiritus. Cum verò tres etiam sint humores (præter sanguinem, in quo omnes continentur, & de quo etiam sermo fiet) tres denique particulares primæ differentię febrium ex putredine ortarum excitabuntur, totidémque numero fient febrium ex putredine ortarum exquisitæ formæ, seu figuræ. Quarum vna ex putrescente flava bile, altera ex pituita putrescente oritur; & tertia ex succo melancholico, seu nigra bile etiam putrescente nascitur. Verum quoniam earum quædam continuæ sunt, quas Græcis συνέχουσιν appellat, quædam verò intermittentes, quæ à Græcis διαλείποντες dicuntur, de omnibus particularim sermonem faciemus: prius tamen modum generationis earum explicabimus in

hac secunda parte, deinceps verò singulari tum di-
 gnotionem tum curationem speciatim docebo, imò
 in particulari exercitatione, & tertia huius parti.

Quid per continuas & intermittentes febres intelligenda: cur utraq; fiant, & quomodo inter se dissident.

Caput II.



VM itaque sex numero sint particularium febrium differentię simplices, quæ ex humorum putredine fiunt, priusquam deueniamus ad earum tum dignotionem, tum curationem, tanquam valde necessarium fore duxi modum generationis earundem prius animaduertentes quòd Galenus intermittentes febres, appellat quæcunque ad sensibilem infebrecitationem seu (vt rectius dicam) ad febris vacuitatem perueniunt, Græci ἀπὸ πύλιν dicunt, vt citato lib. 2. de differ. febr. liquet. cap. 2. Continuas verò, quæ ad iam dictam infebrecitationem seu febris vacuitatem, antequam ex toto soluantur, non desinunt, quamvis declinatio aliqua sensibilis appareat, quemadmodum ab eodem Galeno 2. de crisib. scriptum est. cap. 6. cui sententiæ subscribit Paul. c. 26. lib. 2. asserens, [continua itaq; febris est, quæ non ante ad integritatem terminatur quam ex toto fuerit soluta, & si inclinatio aliqua sensibilis appareat.] Quamvis, vt idem Gale. testis est. 1. de morbis vulg. bifariam veteres vt continui nomine, & intermittentes, videntur. nam continuas vocant febres, quandoque omnes quæ nullum tempus liberum habent accessione, quandoque non omnes quæ accessione nunquam vacant, sed solas extra ordinem illas, quæ omni carent, vsque ad iudicium, mutatione: ita intermittentes interdum appellant solas quæ accessione perpetuum non habent, interdum eas, quarum non recedit accessio, sed insignes faciunt mutationes in initium, incrementum, vigorem, & remissionem. At medici iuniores, quidam febres quæ non magnam mutationem habent, non continuas, sed synochos nominant (vt fusiùs declarabimus, quando continuas ipsas febres subdividemus) continuas autem, iidem has solas, quæ non deueniunt ad integritatem, & intermittunt singulis accessionibus, appellant. Has antiqui vocant interim continuas, interim intermittentes. nam sunt planè inter verè continuas, & desinentes ad integritatem, mediæ; proinde rectè vbi cum synochis conferuntur, intermittentes appellantur, cum ad integritatem venientibus, continuæ. Nos verò, Galeni vt diximus morem seruantes, quæcunque febres ad sensibilem infebrecitationem, seu febris vacuitatem perueniunt intermittentes appellabimus, reliquas verò omnes, continuas, quæ ad dictam infebrecitationem, antequam ex toto soluantur, non desinunt; & si declinatio aliqua sensibilis appareat, relicta veterum medicorum opinione. Fiant autem intermittentes ab humore febrem gerente extra vasa contento, sed qui per omnes corporis partes defertur. Continuæ verò, vbi idem humor qui febris est auctor, in vasis inclusus continetur. Quapropter idem genus habent continuæ febres cum intermittētib, vbi ex eodem humore ortum habeant, eandémq; hypothefim habere dicuntur, hoc

hoc non solo differentes quod per venas, vel per totum corpus in eis deferantur humores, Gale. auctor 2. de crisi. ceterum in continuis propterea etiam plures fiant accessiones, eadem ad infirmitatem non perveniunt, quoniam qui earum causa est humor, non expurgatur, ut liquet citato lib. 2. de crisi. Et cetera cum humores sibi invicem adhaereant, ac continui sint, suoque contactu vicinos ad putredinem trahant, quando in venis continentur, priusquam definat una accessio, alteram incipere necesse est. In intermittentibus vero cum humor vehementer moveatur, dissemineturque per singulas corporis partes, suo delationis impetu, per vomitum urinas, ac sudores saepe expurgatur, interim vero insensibiliter in vaporis portio quaedam digeritur, aut si crassus fuerit humor, per alui quoque deiectionem expurgatur, quamvis & tenuis etiam quandoque, & propterea sensibilem intermissione habent, & priusquam accessio superuenerit, altera praecedens intermittit, neque etiam adeo adherentes ac continui extra vasa humores sunt, quemadmodum si in eisdem continerentur. Sed cum eandem habeant hypothesein, idemque genus continuas cum suis intermittentibus, ubi scilicet ex eodem humore fiant, non ab re quaereret quispiam, quae causa sit, quod humores ipsi quandoque intra vasa, interim vero extra putrescant, & febrem efficiant? Quidam, ut Trallianus fatetur citato cap. 2. libro 12. arbitrati sunt febres intermittentes intra vasa consistere, quemadmodum & continuas, ac nihil prorsus loci, sed quantitatis, & qualitatis ratione differre. Etenim in continuis & multam & crassam esse materiam exsiliare convenit, atque ideo (inquiunt) neque extra vasa emitti posse, intermittentem vero tenuiorem, & ut in extimam cutem effertur, magis idoneam. Actius quoque cap. 74. libro 5. dicebat: [causa vero cur non excidant extra vasa humores in febribus continuis, est, aut multitudo, aut crassitudo, aut viscositas ipsorum.] ita ut admittere videatur, si continuarum, multitudo, aut crassitudo, aut viscositas humoris causa exsistit, quod paucitas & tenuitas ipsorum citra lentorem intermittentium febrium causa sit. Sed, pace eorum dixerim, non videntur hi viri satis admodum sufficienter tradidisse causas, cur intra vasa quandoque humores putrescant, perquam rarissime namque, si vera esset eorum opinio, ex putrescente bile febres continuas fierent; saepissime vero ex putrescente pituita, seu succo melancholico, cuius ferè contrarium & Galenus testatur, & nos indies experientia observamus, sed rectius cum Galeno dicamus, quas isti in medium afferunt causas, sufficientes haudquaquam esse, nam & praeter eas ob meatuum obstructionem, aut etiam propter virium imbecillitatem, ita ut nequeant quod superuacuum ac vitiatum est, vasa expellere, in eisdem putrescit humor, semper enim, ut ipse inquit citato libro 2. de differentiis febrium, cap. 5. natura suis viribus utens, quicquid optimum fieri contingit, iis quae aluntur partibus assimilare, quicquid vero alienum, conatur excernere. Quod si aliquando ob crassitudinem, aut multitudinem, tenacitatem materiae inutilis, aut aliquam meatuum obstructionem, aut propter sui imbecillitatem, totum quod vitiatum est nequeat expellere, necesse est, ut si id diutius perduraverit, in animalis corpore putrescat, ac corruptatur. Cum itaque vasorum natura, seu expultrix eo-

rum facultas, qui in eis redundant, ac geniti sunt, vitiosos succos expellere nequit, ob aliquam iam dictarum causarum, intus contenti putrescant, ac febrem efficiunt continuam, ut diximus, ubi verò nihil eorum obstat, foras propellit, qua ratione intermittentes generari contingit. Quamvis & alia quoque ratione continuas & ipsae febres generari possint, trahentibus videlicet vasibus ipsis ab universo corpore seu partibus quibusdam eisdem vitiosos humores, ut liquet quarto de ratione victus, & ipsae quoque intermittentes pari ratione, aut trahentibus carnosiss partibus eisdem vitiosos humores ab eisdem venis, aut etiam in se ipsis eisdem gignentes fieri possint, ut in sequentibus fusi demonstrabimus. Continuarum igitur ac intermittentium febrium causa dicta iam sunt.

Quot modis continua & intermittentes febres generantur. Caput III.

CUM autem eiusdem generis sint (ut dictum est) continuas febres cum suis intermittentibus, uno solo differentes, quod in continuis humoribus in venis inclusus continetur, in intermittentibus vero per totum corpus differatur, animadversione dignum est in venis nullam aliam materiam contineri praeter sanguinem. Verum cum is in duplici sit differentia, ut libr. primo de natura humana, & aliis plerisque locis à Galeno scriptum est, unus quidem syncerus aliorum humorum expers, utriusque videlicet bilis, & pituitae, alter vero non syncerus, sed utriusque bilis, & pituitae particeps; quando asserimus intra vasa nullam aliam substantiam contineri praeter sanguinem, subintelligendum est non de syncero, ac reliquorum humorum experte, etenim hic in venis nunquam contineri potest, sed de eo subintelligere oportet, qui, ut dixi, utriusque bilis & pituitae particeps est. Hanc sententiam confirmavit Galenus libr. de multitudine, cap. 10. cum dixit: [His antegressis praefinitionibus, poterit turgor tandem venarum sanguinae signum esse multitudinis, sanguine nunc per praevaletiam dicto, quippe cum exquisitus usque adeo sanguis in venis contineri nunquam possit, ut nihil in eo, nec bilis, nec pituitae, nec serosa feratur sanies, proinde ego supra siue humores dixissem, siue sanguinem redundare, censebam perinde audiendum, cum impermiscuus nunquam purusque aliorum humorum sanguis comprehendatur in venis.] Quapropter cum dixerimus in continuis humores inclusos in venis contineri, vel intelligendum est, talem sanguinem veteri omnino proportionem servatam, abundare, sic tamen per praevaletiam appellatum, seu eundem tanquam quartam substantiam, veteri proportionem haudquaquam servatam, superabundare, de quo fusissime differemus in sequentibus: vel quispiam alius humor excedens, simul cum eodem sanguine redundabit, ac putrescet. Idque bifariam esse poterit, ut liquet citato lib. de multitudine, quoniam aut iuxta sanguinem, & cum copioso sanguine idem redundabit, aut debita proportione non servata, magno pere excedet, ita quod non amplius cum copioso sanguine, sed ipse vehementer praevalet, sanguini tamen adhuc permixtus abundabit, ac putrescet. Si primo modo auctus fuerit quispiam aliorum humorum, ita ut breuem quen-

Ter. 1.

Sanguis duplex.
Super sex.
27.

Sanguis primus nostrae periturus.

Humores in venis inclusi quomodo intelligantur, quomodo putrescant, unde febres gignuntur continuas.

Humor aliquis cum sanguine in venis redundat ac putrescit. Quibus modis, aut ut efficitur plethoram cum adiectione, aut cacochymiam.

dam cœperit excessum, sitque commixtus cum copioso sanguine, adhuc verè & propriè non eundem humorem redundare, sed sanguinem ipsum simul cum tali humore fatebimur, unde potius biliosum sanguinem, pituitosum, seu melancholicum, (vbi bilis, pituita, seu succus melancholicus eodem modo excedat) redundare dicemus, quàm humores ipsos, est enim & hæc redundantia in numero plenitudinum seu multitudinum, licet non exquisitè, & simpliciter talis dici possit, sed cum adiectione bilis videlicet pituita, seu succi melancholici, quemadmodum & prius nos declarabimus, quando abundantiam curare docuimus, & in sequentibus demonstrabimus cap. II. Cum verò iam dictorum quispiam humor magnum susceperit excessum, ac in venis simul etiam cum sanguine commixtus redundans putrescet, tunc verè & propriè non amplius multitudo appellabitur, sed humorum vitium, seu prauitas, & eosdem humores in venis contineri, ac putrescere propriè fatebimur, ita vt nunquam humor quispiam in venis contineri possit citra sanguinis admixtionem, sed vnà cum sanguine semper contineantur, diuersimodè tamè prout modò differimus, neque etiam si magnum susceperint excessum, adeò quispiam eorum praualebit, vt omnino sanguineum, hoc est tres reliquas substantias superet, sed ipsum fatebimur, amplissimum excessum adeptum esse, quoniam pro veteri eius proportionem, magnopere sit auctus, aliàs nequaquàm animal viuere posset, aut sanè exiguo tempore si eundem sanguinem copia, seu multitudine exuperare admiserimus talem humorem redundantem, est etenim eius copia minor, quàm sanguinis, licet eidem valde propter redundantiam improporionatus sit, quàm cacoymià dicimus. Quomodo verò humores tales possint æqualiter in omnib. vasis seu maioribus principalioribusque vel in quibusdam non adeò principalioribus & particularibus contineri ac putrescere, in sequentibus patebit, nunc verò satis sit monstrasse modum, quo humores ipsi putrescentes, ac in venis contenti febres accendant diuersas: continuas siquidem, pro diuersa eorundem humorum putrescētium natura, eo, quòd ab eisdem, ad ipsum cor putrida fuligo, seu veluti quidam fumus putridus perueniat, licet non semper eodem modo: etenim neque cum pari vehementia, ac impetu in omnibus continuis febribus, vt dicemus, ad cor putredo ipsa fertur. Sed cum putrescentes humores intra vasa iis, qui putredine vacant, propter contactum, continuitatem, ac adhærentiam, possint facile commisceri, potissimum cum ex omnibus ad omnia confluxus & conspiratio fiat Hipp. auctore, qui fieri possit, interrogabit quispiam, vt putredo nunc vnā, nunc aliam occupet partem, & propterea continuas febres generentur, quæ plures habeant particulares accessiones, nisi inflammatio putrescentem humorem arceat, & coherceat; Huic responsum dabimus, propter easdem causas, in quibusdam febribus continuis per circuitum fieri accessiones, ob quas contingit in cæteris omnibus morbis, qui per circuitum repetunt; id verò fieri posse ob triplicem causam Gale. decretum reliquit.

1. de diff. feb. cap. II. Quarum vna est, cum partes robustiores ad imbecilliores excrementa transmittunt. Secunda est, cum ipsæ eadē partes, aliis haudquaquam transmittentibus, sibi ipsis præter naturam excrementa trahant, dolore, vel calore affectæ.

Altera, & tertia causa est, cum eadem partes sibi ipsis excrementa generent, quæ aut ob earum imbecillitatem, seu earum obstructionē expellere nequeant. Istis igitur tribus de causis, & febres ipsæ continentur, quæ plures accessiones habent, excitari possunt, quæ vel à maioribus ac robustioribus, cordiq; partibus, & vasis, redūdātes detruduntur humores ad imbecilla, ad minora, seu etiā à corporis habitu ad eadē effluunt vbi imbecilliora fuerint, & carnes valdiore, aut eadē parua vasa à corde disita, calore immodico, aut dolore affecta, nedū ex iā dictis vasis maioribus, sed ex reliquis etiā corporis partibus, eosdē humores præter naturam attrahunt, vel in eiusdemmet geniti eos nequeutiā detrudere, propter imbecillitatē, aut meatuum obstructionē, in eisde quoque detenti, ac putrefacti febrem generant, in qua per circuitus accessiones fiunt, id quod breuissimis verbis nos docuit Gal. in fine citati libri 2. de differentiis febrium, inquit: [Quæcunq; per circuitus aliquos ægritudinum accessiones fiunt, ex partium dispositionibus ortum habent, quæ scilicet partes, vel mittunt, vel suscipiunt, vel generant, vel attrahunt superfluitates, eo quo nuper diximus modo; sed quæ circuitum non habent, in iis nulla est corporis pars præcipuè offensa, quemadmodum de continētibus febribus paulo post declarabimus.] Neq; hic accessionum circuitus vnquam definit, donec iidem affectus in eisdem partibus superfluitates generantibus seruetur, vt ibid. liquet. Cæterum quemadmodum asseruimus in continuis febribus humores semper intra vasa contineri ac putrescere, ita quoq; fatemur in intermittētib; perpetuò eos extra vasa contineri, ac putrescere, neque amplius vnā cum sanguine permixtos esse, sed per singulas corporis partes disseminatos, etenim per totū corpus in eis deferuntur humores, vt liquet 2. de crissibus ac citato lib. 2. de differentiis febrium, cap. 3. à natura ipsa detrusi. quapropter & quòd putrescant, & quòd vehementer per partes sentientes deferantur humores, oportet vt intermittētes accendantur febres, aliàs nunquam quapiam earum generabitur, vt citatis locis liquet. Sunt autem qui velint eiusmodi humores accessions tempore in intermittētib; semper ex ipsis vasis detrudi, à maioribus siquidem primò ad minora, dein ex ipsis ad reliqua, quo ad extra ad sentientes corporis partes propellantur: neque alium dari generationis modum censent earundem intermittētiū febrium. Nos verò licet admittamus hanc vnā esse, & fortè præcipuā earundem febrium generationis causam, cum eodem tamen Gal. asserimus, ob alias quoque causas, quas nuper tradidimus de ipsis continuis, easdem intermittētes generari etiam posse tum videlicet ipsis sentientibus corporis partibus ad sese humores trahentibus, tum etiam in seipsis eosdem gignentibus, nequeuntibus tamen eos propellere. Quòd verò sentientes corporis partes, carnes, seu partes solidæ, dolore, aut immodico calore laborare possint, nemini in dubium venit, quibus ita laborantibus, quis hæsitabit eas, humores etiam viciosos trahere è venis, etiam si ab eis non mittantur, quibus attractis, ac præter naturam in eis detentis, quòd putrescant opus est, & vehementiori motu per eas moueantur, ac febrem generent, quòd quidem confirmare videtur Galenus 4. de ratione victus asserens, quemadmodum venarum facultas attractoria perpetuò vicinis ex partibus humiditatem

Cap. 44. I. partis.

Cacoymià.

Cur continuas febres plures habeant accessiones.

Respondetur quæstioni, triplicem causam assignatur.

tatim attrahit, substantiam ipsius qualifimam sit nullo facto discernens, veluti pueri, ac bruta animalia, ad casu oblatum humidum, cum sitiunt irruunt, ita quoque & carnes ab ipsis venis habent enim & huius quoque vim eorum quorum indigent, attractifiam, siue in parte vna, siue in toto corpore eas pati contingerit. Volens nobis ostendere quod febris ardens non modo generatur, cum venula exsiccata tempore aestiuo, acres, biliosas, & tenues humiditates ad se trahunt, sed ubi eodem modo affecta fuerint carnes, eandem quoque generari contingit, simili etiam modo ubi in parte, vel in toto dolore, aut immodico calore laborauerint, ab eisdem venis eosdem succos, haud aegre attrahere valent, etiam si ipsa vasa haudquaquam eos transmiserint, qui deum easdem carnes stimulant, ac pungentes, & propterea delati violenter per corporis singulas partes, ac disseminati, febres generant. Quod vero primo modo intermittentes febres generari possint, omnes ferè medici consentiunt, præter paucos quosdam, qui vt videantur paradoxa scribere, illud destruere tentant. Quorum rationes refellere non piguisset, nisi facillime à quouis solui possent, concessis facultatibus naturalibus, tam in ipsis vasis, quam etiam in corporis habitu, ac perpenfis eis, quæ diximus, & dicemus de harum febrium generatione, neque enim perpetuò, vt dictum est, febres hæc ortum habent, propterea quod vasa, tanquam robustiora, humores in corporis habitum propellant, sed geminam aliam ob causam: neque cum hoc modo generantur, semper necessum est à maioribus, ac cordi propinquioribus venis in minores, & ex his in corporis habitum propelli, vt ipsi putant, sed interim ab omnibus, interim à quibusdam determinatis alicuius visceris venis, id quod sapius contingit, ad sentientes partes propelluntur humores, quemadmodum sapius Galenus testatur, præsertim citato libro 4. de ratione victus, quo loco docens diuersum ab eo quem posuerat modum generationis febris ardentis in carnibus, inquit: [Præterea & fieri potest vt modo altero similis affectio fiat, modum alterum dico, cum ex validioribus partibus ad imbecilliores aliquam mittantur excrementa, ergo fieri potest vt interdum quidem ex parte, interdum verò & ex pluribus, acres biliosas, quæ tenues sint humiditates exacte, ad dictas fundantur particulas, quæ scilicet imbecilliores sunt:] fusiùs autem id explicauit, non de febribus duntaxat, sed morbis omnibus, qui hoc modo generationem habent, Galenus citato libro secundo de differ. febrium tertio de naturalibus facultatibus, cap. 13. & sexcentis aliis locis. Quam autem ipsi persuadere tentant de harum febrium generatione, opinionem, impugnare ac refellere superuacaneum fore duxi, cum chimera potius videatur, parcant mihi cineres eorum, quam quippiam rationis habere, aut verisimilitudinis: quamuis ipsi non ratione tantum, sed exemplis eam confirmare tenent. Fiunt & tertio modo intermittentes febres, veluti etiam de continuis diximus, cum ipsæ sentientes, partes, seu totius corporis carnes, à venis nec trahant, nec suscipiant excrementa, sed in se ipsis easdem generent, quemadmodum de tertiana scriptum reliquit Gal. 1. de morbis vulg. volens tradere causam cur tertianæ febres in illa 2. constitutione, numerosiores erant ardentibus, vt dicebat Hippocrates siquidem: [propter fluxum bilis exuperantiam fe-

bres ardentes & tertianas oriri, atque hoc conuenire inter illas, locis verò in quibus superfluum contrahitur humor distare, etenim si ardentes febres sint, in venis abundat, præcipue iocinoris & ventris. Tertianæ fiunt cum totius corporis carnes affluant fluxa bile proinde transpiratione impedita eorum, qui natura biliosa sunt, quantum bilis in carnoso genere congestum ante expurgabatur, in hoc statu non purgatum, tertianas generant, ardentibus frequentiores.] Quibus in verbis Gal. ostendit non modo in carnoso genere colligi, ac generari bilem fluxam, ex qua tertianæ originem habent, verum propter earum carniū expultricis imbecillitatem, ac meatuum impedimentum, ipsam expurgari non posse, & hac ratione tertianæ magis generantur febres, idem quoque de eisdem tertianis luce clariùs confirmauit, lib. de tremore, rigore, & palp. ca. 7. cum dicebat: [Medicamentorum enim calidorum vsu, quandoque horror solus, multoties rigor etiam superuenit, sicut in ardentibus, & tertianis, fluxa bile, non in vasorum cauis, sed per carnes mota, vel quod in illis supra metrum generata fuerit, vel quod mediis illis natura expurgetur, hoc enim solo distat ab ardente tritæ, seu tertianæ. Ardentes enim in vasis bilem delatam, tritæ per sensitiua loca extra habent.] Quod item ratione firmari poterit: nam si sudor eandem habet materiam quam vrina, & eundem generationis modum, siquidem vtriue ex bibito humore constat generatio, ex calfacto simul in corpore, & biliosa non nihil substantiæ adepto, quamuis sudor plus est elaboratus, vtpote qui ad cutem vsque permeatis omnibus quæ interfunt, partibus, peruenit, vt idem Gale. inquit 10. de simplic. medic. fac. ubi idem sudor crassior redditus, aut immodicè auctus fuerit, cutisque meatus constipati, diuque detineatur in eodem corporis habitu, nonne necessario putrescet, quo putrefacto, ac per sentientes corporis partes vehementiori motu delato, cui in dubium venerit quod febrem accendat, & quidem biliosam, cum multum ipsius bilis particeps sit, vt dictum est, nec minus & in eodem corporis habitu ceteri quoque humores (pituitam dico, & succum melancholicum) generari possunt, ubi corpora non natura biliosa, sed pituitosa seu melancholica fuerint, liquet igitur ex his febres ipsas intermittentes triplici modo oriri posse quemadmodum & continuas, quæ plures accessiones habent, & tandiu perdurare quam diu tales in partibus superfluitates generantibus, affectus seruantur. Verum, vt dictum est sapius, ex humoribus à venis detrusis ad eundem corporis habitum generationem habent: id quod innuere voluit Galenus 1. de arte curatiua ad Glauc. cap. 5. cum dicebat: [quotidiana verò intermittens raro aduenit quin os ventriculi patiatur, quemadmodum quartana ex male affecto splene generatur, tertiana ex icore laborante.] in his namque visceribus præcipue tales coacervantur humores, quibus in eorundem venis congestis, robusta existente expultrice facultate, eisdem venis mediis, ad totius corporis carnes eos propellant, tanquam imbecilliores existentes, bilis siquidem ex iocinore, pituita ex ventriculo, succus melancholicus ex affecto splene. Dixit insuper Galenus raro, & non semper, haudquaquam ignorans quod ob alias iam dictas causas, licet raro, easdem quoque febres generari contingat, quemadmodum nos cum eodem probauimus, & libro 2. de different.

februm, cap. 5. sub iis verbis illud idem confirmavit cum dixit: [Lapsum etiam aut hepatis, aut splenis affectus attulit febrem.] quamvis indifferenter intelligat cum continuas, tum intermittentes hoc loco. Poterunt insuper & earum causarum plures tam in continuarum, quam intermittentium febrium generatione complicari, eadem etenim pars, quæ ab aliis tanquam imbecillior, excrementum admittit, propter eandem causam & in se ipsa quoque eadem generare potens est, quibus deinde putrefactis, febris generabitur, quæ duplex habebit principium, quod si dolore etiam, aut calore immodico laborabit, ob triplicem causam febris accendi poterit, & tandiu etiam perdurabit, quandiu affectus hi in eadem parte permanebunt. Tot igitur sunt cum continuarum tum intermittentium febrium generationis modi.

Propter quid intermittentibus, & non in continuis, rigor, horror seu extremarum partium refrigeratio fiat: & quomobrem eadem in earum accessuum principis fiant, & naturalis calor intus se colligat.

Caput IIII.

ET E R V M cum omnis febris continua sui quidem ratione cum exquisita fuerit, neque rigorem habeat, neque horrorem, ut citato lib. 2. de diff. febr. cap. 8. liquet, inuestigare licebit quæ obrem hoc fiat, in his potissimum continuis quæ plures accessiones habent: postquam ipsæ intermittentes semper cum rigore, horrore, aut fortiter extremarum partium refrigeratione inuadunt. Huius prima causa est quod putrescens humor in paruis ac particularibus vasis non amplius propter obstructionem, per eadem vehementiori motu deferatur, sed in eisdem inclusus detinetur; qua ratione minus etiam lædit, quam si vehementiori motu moueretur, id quod commune est omnibus excrementis præsertim acerbis, ac mordacibus, ut liquet 2. de caus. sympt. cap. 5. Præterea nec eadem vasa adeo exactiori sensu prædita sunt quemadmodum totius corporis carnes, ita ut ab eisdem putrescentibus succis vehementer stimulentur, ac pungantur; & propterea ad eos excernendos vehementius moueantur, etiam si per eadem putrescentes succi vehementiori motu deferantur, ut ibidem scriptum est. Sed dices, cur continuæ quædam febres in prima earum generatione cum aliquo dictorum symptomatum incipiant, ut indies obseruamus, & deinceps illud non admittant? Ad hæc idem Gale. 1. de arte cur. ad Glauc. cap. 5. de tertiana rigore verba faciens, dicebat: quod si cum paruo rigore inceperit, tunc magis alia signa attendere oportet, quoniam non quotidiana intermittentes tantum, atque quartana, sed etiam hemitritæus, aut aliqua alia ex continuis esse potest. Et Hippocr. 1. de morbis vulgar. in continuis febribus quæ omnino nunquam intermittebant rigores omnibus, dicebat inordinati & errantes erant. At non inconueniens, dicemus nos quod in prima continuarum accessione, quædam febres rigorem, frigus, aut horrorem præ se ferant. Verum non ratione qua continuæ sunt, sed quia ob humorum copiam, seu eorundem tenuitatem, quæ in vasis contineri nequeat, pars quædam ad sentientes confluit partes, ex qua tale aliquod symptoma gignitur, & non ex eo humore qui in vasis continetur, temporis vero progressu cum magis in eisdem vasis impingantur humores, ac propterea obstructio au-

geatur, crassioresque reddantur, & vasorum vires imbecilliores, propterea non amplius cum aliquo dictorum symptomatum inuadunt, quoniam nec eiusdem humoris propterea pars aliqua, ad sentientes partes effunditur. Ad Hippocratis & Gal. auctoritatem eodem modo satisfacimus, nam quæcunque febres continuæ, cum aliquo dictorum symptomatum incipiant, quamvis sapius ac plures earum accessiones comitetur, id non ratione qua continuæ sunt, euenit; vel exquisitæ continuæ non sunt, quæ ratione & in semitertianis, & cæteris quoque continuis nonnullis, ubi exquisitæ non fuerint, & rigores parui, & horrores, extremarumque partium refrigerationes quandoque fieri contingit, quomodo interpretari debet tum Hipp. tum Gale. citata sententia. Sunt verò continuæ quædam febres pyriæ, seu valde malignæ dictæ, in quibus fortis extremarum partium refrigeratio fit, ob maximam inflammationem ortam seu erysipelas in visceribus, ex quibus excitari consueverunt; id verò aliam ob causam fit, quemadmodum paulo post dicemus. Intermittentes autem febres, ac earum accessiones omnes, propterea cum aliquo dictorum symptomatum semper incipiunt, eo quod in eis (ut dictum est) per sentientes corporis partes, putrescens succus vehementiori motu fertur, cuius delatione, & acuitate lædens, morsum, ac dolorem eisdem partibus infert, ob quem duo contingunt, sanguinem in corporis profundum ferri, eoque corporis exteriora frigeni, ac partes sentientes in quibus humor adest, expultrice vi in proximam vnamque eum reicere, quousque ab omnibus expulsi via aliqua expurgentur. Quare non mirum, inquit Gal. 2. de caus. sympt. (licet de rigore loquatur) si refrigerentur omnes externæ partes, animalis virtutis vna cum sanguine in profundum cōmeante; sentiunt enim hoc tempore qui rigent, externarum partium frigus, non earum quæ sunt in profundo, quippe cum sitiant sensibilibus eo tempore nonnulli, tanquam calore iis in internis partibus seruato. Quod verò id rationaliter accidat, inde colligi licet, nam si in vna quapiam parte dolor vehemens infixus, tum animi deliquia, tum perfrigeratione inferat, in eo qui in toto fit corpore, si non animi deliquia fiant, neque mors, certe perfrigerationes effici debent. Sunt etenim dolores rigentium eiusdem (cum cæteris aliis doloribus) generis: deficiunt ab his qui intermunt, magnitudine, & tempore, quippe cum & minores magnitudine sint, & breuioris temporis, ut citato lib. 2. de causis sympt. liquet. Quæ de re si rigor, aut horror futurus sit, non modò humorum redundantia opus est, sed vehementia etiam motus per corpora sensibilia requiritur, quo tempore, dum sanguis cum calore simul in incūto corporis, & viscera confugit, cutis frigida partes sunt & exangues, manuum etiam, & pedum summa frigidissima, utpote quod admodum absunt a visceribus, ut lib. de tremore, rigore, &c. scriptum est. Quod verò nedum in principis accessionum intermittentium febrium, verum etiam & continuarum quæ plures accessiones habent calor naturalis vna cum sanguine ad corporis intima confugiat, comm. aphorism. 1. 2. libri liquet, his verbis: [In principis siquidæ accessionum, & calor naturalis totus, & humores in profundum corporis vergunt, quemadmodum ipse docuit] innuens Hippocr. & deinceps addit: & præcipue in quibus horror quispiam, vel rigor, vel fortis

1. causa cur continuæ sint sine rigore, &c.

2. causa.

Cur continuæ quedam primum cum rigore inuadunt, postea nunquam. Cōmen. 2. text. 25.

Super 39.

Cur in intermitten- tibus inuaduntur ad eos intus se colligat.

Quæstio difficilis cor- dam G. & veri- tem des- te.

Respon- quæstio

Loco citat

foris partium exteriorum refrigeratio contingit.] Et lib. 1. de rat. vict. accessio principium fieri ait. Calor omni toto ex corpore ad cor, thoracemque concurrente, & 4. de ratione victus, volēs Hip. addere causam ob quam pedes in accessio principii frigeant, asserbat, hoc provenire calore toto eo tempore ad supernas partes concurrente, quapropter non absque causa pedes frigescunt, utpote qui natura & carne vacent, & nervis abundant, præterea & à calidissimis locis separati refrigerantur, sese ad thoracem colligente calore. Confugit itaq; calor naturalis simul cum sanguine ad corporis intima in accessio principii, tam si intermittentes, quam si continuæ fuerint, maiori tamen cum impetu, ac vehementiori motu, in intermittentibus: etenim in his putrescens succus per sentientes partes vehementiori motu delatus, sua acuitate magis lædet easdem partes, ac dolorem infert maiorem, cum & ipsæ partes exactiori sensu præditæ sint, quam vasa ipsa, quemadmodum prius dictum est, & propterea in intermittentibus, & non in continuis dicta symptomata fiunt. At si verum est quod Gal. scriptum reliquit. 2. de differ. febr. cap. vlt. videlicet quod ubique accenditur, atque augetur caliditas, isthuc ab aliis partibus sanguis confluere soleat, quo verò tempore confluit, illas quidem refrigerari priuata sanguine est necessarium, quod verò patitur membrum grauari ac distendi, idque fieri contingat in accessio principii, cur in intermittenti febrium accessio principii ad corporis intima, thoracem inquam, & cor naturalis calor simul cum sanguine se colligit? cum præter naturam caliditas in intermittentibus ipsis accendatur, atque augetur per singulas sentientes corporis partes, seu per corporis habitum, quæ de re ad easdem, & non ad corporis intima confluere deberet? Tam sanè apud quosdam vim habuit hæc difficultas, quod coacti sunt hac in re Galenum deserere, ac alio modo sentire quam ipse sentiat. Quidam verò quod in vasis, & non extra contineatur in intermittentibus putrescens succus, ausi sunt dicere. Alij quod extra vasa, non tamen in toto habitu contineantur humores, sed omnium propria sedes & origo, in prima sit corporis regione, circum præcordia, ventriculum, diaphragma, iccoris caua, lienem, pancreas, omentum, aut mesenterium, hæc siquidem partes (inquunt isti) quasi publica corporis sentina, in quam omnis confluit, cumulatque humorum colluies, ex quibus etiam sedibus horrores, rigores, ac partium extremarum refrigerationes succitantur, idque persuadere tentant ratioculis quibusdam ac pluribus exemplis confirmare. Verum nos ducem nostrum Galenum in hoc, velut in reliquis sectabimur eiusque sententiam ac veritatem tuebimur, asserentes, quod cum in principii accessio febrium intermittenti putrescentes succi moueantur vehementiori motu per sentientes corporis partes, ut sæpius dictum est, eodem partes hoc in tempore mordacitatem, ac dolorem sentiunt, ob quem doloris sensum vehementi quodam impetu, calor ipse tanquam offensus, simul cum sanguine in intima corporis, & viscera confugit, propriè tamen ad thoracem, adq; cor ipsum, tanquam ad suum principium & fontem, non siquidem (ut quidam ignari putant) ut ipsi cordi opem ferat, tanquam ad putridis vaporibus oblatso, sed ut ibid. collectus, vnitus, ac vigoratus, vehementiori quodam impetu

redeat, ac certet cum eo quod sentientes partes doloribus laceat, ac ipsas molestat (modo non accidat idem calidum innatum eo tempore in profundo extingui obstructum adeo, ut extra expirare nequeat, aut à frigidis causis euictum.) Vbi verò hoc non contingat, violentia victa aceruat: quo pacto instrumentum expultricis, in quocunque membro est, euadit, hæc etenim & per se ipsam nata est lædendia expellere, fortius autem cum calore redundante ab intra, propulsabit ea expellere adiuta, quod motus impetus promptior contingat, unde quæ lædunt per cutem, sæpius propellit vomitu, atque citata aluo pluries, ut eodem libro de rigore, tremore, &c. à Galeno decretum est. Non igitur se colligit ad corporis intima calor in accessio principii, ut cordi opituletur, nec etiam ut ibi permaneat, sed ut collectus, roboratusque in eodem suo principio, maiori cum impetu foras redeat, perueniatque ad affectas partes doloribus laceatas, ut tanquam instrumento, eodem vtantur calore, ut inquit Galenus, ita enim quod molestum est, promptius propulsabunt. Itaque tandiu extremarum partium refrigeratio, rigor, seu horror perdurabit, quamdiu calor ipse naturalis, cum causa dolorem, ac molestiam inferente, pugnabit. Quinimò nec idem solus naturalis calor simul cum sanguine & spiritu, qui in sentientibus partibus continebatur, ac ad intima corporis confugerat, verum & aliarum quoque partium quiddam ad eas peruenit. Nam ut refert idem Galenus commento aphorif. 53. quinti lib. hæc est quædam ratio communis in his quæ natura aliquid violenter excernit, ut sanguinis & spiritus impetus eo feratur: quibus duobus veluti instrumentis natura vtens, ea quæ infestant, per vim expellat. Vera est itaq; citata Galeni sententia libro secundo de different. febr. quod ubique accenditur atque augetur caliditas, isthuc ab aliis partibus sanguis confluere solet, nam licet primò intus calor cum sanguine & spiritu se colligat, accessione incipiente, statim tamen ad eas redit partes in quibus accenditur, siue augetur calor, hoc est ad totius corporis carnes, per quas putrescens succus deferatur, si intermittentes fuerint febres, quoties enim aliquid per has violenter agitur, ac ad cutim deferatur, necesse est dum carnem cutimque permeat, omnia in quæ incidit, pungat, stimulet, diuidat, ac vulneret: ut citato secundo libro de causis sympto. liquet. Quamobrem satis rectè asserbat eodem loco Galenus [quod qui in rigore habetur caloris naturalis motus, non ei qui in timore, sed ei potius qui in verecundia, ac frigida lauazione videtur, similis est, pugnat enim virtus, ac certat cum his quæ offendunt, quoad excusserit, profligaueritque omnia, in verecundia nanque primò quidem intro agitur animalis facultatis motus, deinde rursus foras celeriter vniuersus, quippe cum nisi redeat, timor sit, non verecundia, siquidem verecundia de repente fit omnino nihil expectare malum animali facultate, sed, ut sic dicam, præ mollior, & timiditate naturali, cum homine longè meliore versari non sustinente, sed refugere, & si possit, à conspectu subducere properante, idèq; veluti refugiens tantum, citra vllam perfrigerationem, in profundum recedit: ratione verò patibilem partem animi, id est, quæ terretur & verecundatur excitante, atq; inhortante, redit, extorsumque mouetur, similimo motus modo, atq; cum ex frigida lauazione, caloris

fit repercussio.] hæc Galenus. Huic itaque motui similis est qui in rigoribus habetur, primo etenim naturalis calor confugit ad cor tanquam offensus, impeditusque ab eius naturali motu, deinde collectus, ac vigoratus, vibratus magis, maioriq; cum impetu, ad ea quæ offendunt, peruenit, pugnatq; cum eis quoad ipsa excusserit, ac profligauerit. Quod verò de rigoris motu asseruit Gale. de horrore quoque, ac partium refrigeratione similiter subintelligere oportet, etenim non alia ratione calor naturalis mouetur vbi hæc contingant in principijs accessionum, quam in ipsis rigoribus propter dolorem videlicet, qui in toto corpore fit: hoc etiam tempore, ex putrescentibus succis, per sentientes corporis partes vehementiori motu delatis, neque alia ratione inter se discedunt, quam maioris, minorisve, valendi namque motus sunt expultricis facultatis in rigoribus, mediocres in horribus, ac multò magis mediocres in inæqualitate, & partium extremarum refrigeratione, ita ut eiusmodi motus dixeris propemodum motus non esse, sed tantum sensus. Insuper mordacior, vel copiosior humor concutientem rigorem infert, minus mordax, seu mediocriter auctus horrorem exciuit, vbi verò quæ dicta sunt remittantur, ne horror quidē fiet, sed vel inæqualitas, vel refrigeratio extremarum partium, adeo q; si paucus fuerit humor, aut exigua eius acrimonia motusue lentus, ac languidus, solum frigus inuehit sin copiosior sit, aut acrior, ut eius motus impulsusque concitior, horror inuadit, cum verò plurimus, sique vehementer acer, ac mordax, magnòque impetu per sentientes corporis partes deferatur, verus rigor inducitur, ut apud eundem Galenum legitur, citato libro secundo de causis sympto. & decimo de method. medend. cap. 10. Quamobrem accessum exacerbationis sæpe cum rigore huic, alij cum horrore, alij cum frigore solum accessisse fateamur: nominumque eiusmodi passim vsum, per volumina medicorum omnia reperias, ut nisi quis quassatione atque agitatione frigeat, rigere non appelles, nam vbi rigor nominandus sit, difformens, & inuoluntariam motionem adesse sit oportet præcium: quod hoc vacat, nisi superficiem etiam impariter commoveat, dicunt frigeactione: q; si hanc per aliquas accessiones turbet, & concutiat, reliquum non moto corpore, horrorem nominant, ut solius cutis horror eiusmodi affectio existat, sicut rigor vniuersi corporis, est enim rigor repentina, violentaq; innati caloris frigeactione, quoniam eiusdem caloris naturali motu violenter impedito fit, atque ita rigere, horrere, frigerique in valetudinariis ac febrientibus ipsis differre dicendum erit, ex eiusdem Galeni testimonio, libro de rigore, tremore, palpitati ne, & conuulsione.

Epilogantur quæ dicta sunt de causa motus caloris naturalis in principijs accessionum: ac ostenditur alia ratione ipsum moueri, vbi in visceribus magna fuerit inflammatio orta, aut erysipelas: confirmaturque intermittentes febres fieri non posse, nisi per corporis habitum humor putrescens deferatur.

Cap. V.



OMMVNE est itaque omnibus succis putrescentibus, ac vehementiori motu per sentientes partes delatis, ex quibus etiam intermittentes sunt febres, ut eorum mordacitate &

acuitate, dum carnes, cutimq; permeant, pungunt, stimulent, diuidant, ac vulnerent quodammodo, & proinde dolorem inferant; ob quæ naturalis calor simul cum sanguine & spiritu in corporis profundum fertur, ad viscera corque confugit. Hinc extrema corporis partes frigida, exanguesque fiunt. Verum vbi ob aliquam iam dudum dictarum causarum ipsum in profundo extingui non contingat, violentia victa, aceruatur, & quasi in sese coactus ac unitus, vehementiori cum impetu, cum peristere in suo principio nequeat (substantiæ enim semper mobili, quies est mors) iterum ad propulsanda ea quæ molesta sunt, redit, ut dictum est: ac tandiu cum his quæ offendunt, pugnat, quoad ea excusserit, ac profligauerit. Verum quanto maior ex redundantibus succis, sentientibus partibus infertur dolor, adeo maiori cum impetu, & intro confugit, & extra progreditur ut ea expellere valeat, atque euincere: quæ admodum vbi minori dolore lacessitæ sentientes partes fuerint, & eius impetus minor erit, semper tamen duobus hisce motibus in accessionum principijs, calor naturalis vnâ cum sanguine mouebitur, primò foras intro confugiens, deinde ab intra foras rediens, ut demonstrauimus, atque ita nedum in intermittentibus febribus, verum etiam in continuis, vbi plures habeant accessiones, vbiunque accenditur atque augetur caliditas, isthuc calor naturalis semper vnâ cum sanguine ferri consuevit; ut liquet secundo de differentiis febr. cap. vlt. At non perinde ut in intermittentibus, in continuarum accessionum principijs, aliquid iam dictorum symptomatum necessario incidit, propter iam dictas causas, licet quandoque, quamuis raro admodum, in earum quoque accessionum initiis, aliquid eorundem symptomatum incidat. Verum aut propterea q; exquisitè continuæ non sunt, ut diximus; aut leuis quædam refrigeratio contingit, ob id quæ magna sanguinis fit reuocatio ad corporis interiora, ob copiam, seu mordacitatem maximam putrescentis humoris intra vasa: & sic magnitudine distinguitur ab ea, quæ in intermittentibus fit partium extremarum refrigeratio; modo citra phlegmonem intra vasa putrescant succi. Nam quando aliqua fortis inflammatio in corporis parte profundiori, vel erysipellate euenerit, totus ex toto corpore sanguis ad locum trahitur patientem, atque ideo vrantur profunda, sed cutis refrigeratur, ut fit in principijs accessionis, ut liquet commento aphor. 48. quarti libri. Contingit autem hoc in febribus ardentibus, perniciosis, ac valde malignis, lipyris dictis. Quo casu non amplius leuis, sed fortis fit partium extremarum frigiditas, quemadmodum in principijs accessionum febrium intermittentium, verum alia ratione quam in istis eadem partes extrema refrigerantur, nam vbi inflammationis calor in visceribus orta adeo vehemens fuerit, ad se cucurbitulæ modo, ex toto corpore sanguinem trahit; & propterea iis qui ita se habent, viscera peruruntur; extrema autem partes frigescent propter defectum sanguinis ad viscera se recipientis, ac cucurbitulæ modo attracti, eodem Galeno auctore, commento aphorismi primi, septimi lib. in principijs verò aliarum iam dictarum febrium, nõ quia trahitur calor, sed quia alia ratione ad corporis intima confugit, dictæ extrema partes refrigerantur, ut iam dudum declarauimus, neq; his qui ita laborant adeo viscera peruruntur, quemadmodum accidit in magnis vilce-

Idē est motus caloris naturalis in horrore, & refrigeratione extremorum, qui in rigore.

Loco citato.

Rigor quid.

Refrigeratio.
Horror.

cap. 6

viscerum inflammationibus, ac erysipelatibus: de quibus verba faciens Hippoc. secundo prognostic. dicitur: si manus, caput, & pedes frigidi sunt, venter, costisque calentibus, malum est. Nam in morbis acutis (vt ait Galenus in commento) propter inflammationis magnitudinem in visceribus fatigantis, partem sanguinis in omne permeat corpus, plurimum verò eius in parte inflammatione affecta includitur, & ob eam rem mediæ corporis partes, quæ sunt thorax & venter, admodum calênt; & subdit: at verò per morbos acutos interdum annotatio cum rigoreprehendens aut frigore non solum extremas corporis partes, sed etiam cutem circa costas, ac ventrem, frigidam reddit, & quidem circa viscera vitium non ostendat. Quibus in verbis (vt mea fert opinio) demonstrare nobis voluit Galen. non solum quòd alia ratione in internis inflammationibus, extremæ partes refrigerantur, quàm in annotationibus febrium acutarum, quæ cum rigore aut frigoreprehendunt, verum etiam modum docuit quòd valeamus has febres inter se distinguere, ac dignoscere, iniquens, quòd quando in visceribus inflammationis magnitudo orta est, licet aliæ partes frigidae sint, venter tamen & costæ admodum calent, secus autem in reliquis, in quibus annotatio cum rigore aut frigoreprehendit: quoniam eadem partes, veluti reliquæ, frigidae redduntur. * Sed statim obiciet quispiam aduersus ea quæ diximus de intermittentiū febriū generatione, iniquens non semper opus esse vt ipsæ fiant, quòd putrescens succus deferatur per vniuersum corporis habitum, seu totius corporis carnes. Nam putrescat humor quispiam in ventriculi cavitatē, aut intestinorum, seu vtriusque vesicæ, aut vterius dico extra vasa, qua ratione intermittens febris gigni debet, in hac aut neutrum dictorum symptomatum incidit, aut si fiat, falsum est quòd asserimus eandem ortum habere, propterea quòd vehementiori motu per sentientes corporis partes putrescentes, succi deferuntur. * Tu verò nodum hunc dissoluas, iniquens, quòd si ex iam dictis putrescentibus succis intermittens febris generetur, necessum est aliquid dictorum trium symptomatum fieri, cū sine his intermittens febris gigni nequeat, & quoniam nullum eorum generari vnquam potest, nisi per sensibiles corporis partes deferatur eorum causa, asserimus cum Galeno decimo de method. med. quòd non mordax succus duntaxat, verum etiam & mordax halitus, vbi per sensibilia corpora feratur, horrores, & rigores facit. Quapropter vapor seu halitus ad eadem saltem corpora perueniens, ex putrescentibus in iam dictis locis fieri possent, Galeni auctoritate, secundo de causis symptomatum. cap. 6. nam licet quælibet dictarum partium expulsiōe facultate sit prædita, qua quòd molestum est, excutiat, in eo tamen excernendo, nullo dictarum sensibiliū motuum vitur: sunt nanque carniū, & musculorum omnino proprii: quare vbi eadem non lædantur, neque hi motus inæquales totius corporis fiunt: & tunc eadem ratione fierent hæc symptomata, quæ ex mordacibus, acrisque medicamentis vlceribus adhibitis, seu pores, progigni solent: moueretur etenim per sentientes corporis partes mordax ille halitus, seu vapor ex putrescentibus succis eleuatus, & non putrescens ipse humor. Vel dicās, quòd hæc quoque intermittens febris, ex delatis putrescentibus succis per sensibiles corporis partes, generatur. nam

accessionis tempore, aut vniuersus humor putrescens in modo dictis partibus, aut saltem pars quædam ad corporis habitum effunditur, aliās febres intermittens fieri nequit; sed vel diaria, vel intra vasa inclusus, ac effusus talis humor, continuam excitabit febrē, quòd quidem difficile haudquaquam videri debet. nam si ex eisdem sentientibus partibus, accidit quandoque, quòd humor putrescens ad ventriculū seu intestina confluat, ac vomitu, seu deiectione excernatur, quinimò eodem tempore potest, partim per sudorem, partim per vomitum, partim etiam per deiectionem humor, & præsertim bilis excerni, simul eodem die intro, forasque delata, vt liquet eodem secundo de differentiis febrium, & secundo de causis symptomatum. ita quoque difficile non erit, quòd humor, qui in ventriculi, seu intestinorum, aut reliquarum dictarum partium cavitatē collectus est, etiam si inceperit putrescere, vi expulsi ab eisdem partibus vniuersus, aut saltem pars quædam eiusdem, ad sentientia corpora, seu vniuersum habitum accessionis tempore, effundatur; & hac ratione aliquod dictorum trium symptomatum fiat, & febris generetur intermittens, quam alio modo fieri non posse, iterum cum Galeno proculdubio tenemus, & absque controuersia confirmamus; & hæc de generatione intermittentiū, & cōtinuarum febrium dicta satis.

Loc. citatis.

Quomodo tres intermittentiū febrium differentia conueniant, & dissideant inter se, & continuarum ex bile ortarum subdiuisio. Caput. VI.



Tqui iam tempus est vestigare quomodo iam dictæ tum intermittentes, tum continuæ febres inter se conueniant, & dissideant, ac quot etiam numero sint continuarum differentia. Id verò promptius fiet, si iterum in memoriam reuocemus omnes earundem intermittentiū febriū differentias ex putredine ortarum. Sunt ergo intermittentiū differentia omnes numero tres, tertiana videlicet, quartana, & quotidiana, à Græcis τριταλος, τετραταλος, & ἀμνημονος appellata, vt secundo de differentiis febr. cap. 2. & secundo de crisib. cap. 9. scriptum est, tertiana quidem ex putrescente huiusmodi, eaque vehementiori motu delata per sentientes corporis partes, generatur, quartana ex putrescente nigra bile, atque simili modo per sentientes corporis partes vehementer delata accenditur, quotidiana, ex pituita putredine ortum habet, similiter per sentientes corporis partes à natura detrusa, vt liquet citatis locis. Conueniunt itaque hæc tres intermittentiū febrium differentia, quòd nisi humor qui est earum causa putrescat, ac vehementiori motu deferatur per sentientes corporis partes, nulla earum gigni poterit. Verum cum proposuerimus de simplicibus harum febrium differentis primò verba facere, attendas oportet tertianam, interim exquisitam, interim simplici appellatione appellari tertianam ab Hippocrate, & Galeno, vt patet commento aphorismi 59. quarti libri, & secundo de differentiis febr. interim verò intermittens tertiana, vt distinguatur, à continua nuncupatur, eodem Galeno teste, citato lib. secundo de differentiis febrium, cap. 3. Nec alia ratione dicendum erit de quartana, & quotidiana: nam interim simpliciter absque alia adiectione ita appellantur. Interim cum adiectione exquisita, interim quotidiana, seu quartana inter-

Intermittent. species tres.

In quo conueniant omnes intermittentes.

mittēs dicitur: sed de nominibus nō oportet prolixius disputare; neque de eis (vt Plato inquit) magna cura habenda est; sed satis sit nouisse, has esse tres duntaxat intermittētiū febrium simplices differentias; quā causarū diuersitate inter se disident, vt ex dictis patet, ac etiam circuitus forma. Etenim tertio quoque die efficitur tertianā circuitus, quartanā verō quarto quoque die, ipsius autem quotidianā singulis diebus. Sunt etiam & earum symptomata quoque diuersa, vt dicemus. Nunc verō ad cōtinuarum differentias accedamus, & primō earum quā ex bile fiunt, tanquam sapius contingentes, quā reliquā, vt apud eundem Galeaum citatis locis scriptum reperitur. Continuarum ergo, quā ex bile fiunt, inquit Galenus eodem secundo de differentiis febrium, cap. 2. duplex est species, altera earū quā a continuo ferore synochi appellantur, quarū vniuersum tempus in vna consumitur accessione, quā a principio vsque ad finem pertingit. Altera earum quā vna cum genere nomen fortiuntur, & continuā etiam appellantur, atque in pluribus circuitibus continentur. Earum verō quā synochi dicuntur, tres sunt omnes numero differentia, quemadmodum in præcedentibus dictum est. Nam quādam earum a principio ad finem vsque æqualiter perdurant, quas *ῥυοζοὺς* τῆς καὶ ἀμυγμῆς, hoc est in eodem statu & vigore perseverantes. Quādam paulatim augentur, quas *ἀναβαλόντες* τῆς καὶ ἀμυγμῆς, hoc est assurgentes, atque inualescentes dicunt, quādam paulatim decrescunt, quas *καταβαλόντες*, hoc est decrescētes appellantur. At continuarum quā idem nomen cum genere fortiuntur, duæ item sunt primæ differentia; nonnullarum quidem quā singulis tertiis diebus inualescunt, aliarum verō quā die intermedio alteram faciunt accessione, quā sanè nullum præcipue obtinent nomen, vt Galenus inquit. Verum, quā tertio die inualescunt, fatetur ab eo nominari consueuisse *πρίλας* quæ, id est, tertianā naturam referentes, vt liquet apud eundem citato libro secundo de differ. febr. & primo, & sexto de morbis vulgaribus: non tamē prohibet quin pro suo quisque arbitrio alterum eis nomen imponat, modo rerum obseruet differentiam, ita vt hæc sciat alteram esse differentiam ab ea, quam suprà diximus, quā ad infrebricationem terminatur, nam hæc licet ad febrilem declinationem definat, nunquam tamen intermitit vt illa. Quā re clarioris doctrinæ gratia poterit hæc continua tertiana appellari. Præterea alia quoque est natura illius, quā die intermedio etiam accessione facit, cuius quidem duæ accessiones inter se dissimiles sunt; nā si similes essent, haudquaquam ex bilioso humore ortum haberent, sed ex pituitoso potius, vt dicemus: sunt autem dissimiles, nam primæ quidem, tertia similis est, & secundæ, quarta, in figura duarum tertianarum progredientes: & propterea aut duplicem tertianam continuam, aut duas tertianas continuas, appellare poteris; tot itaque sunt continuarum quā ex flaua bile proueniunt, febrium differentia, iuxta Galeni sententiam eodem secundo de differentiis febrium.

Qua ratione ex putrescente intra vasa flaua bile, febriū synochos dicta accendatur: & quod similiter ex alijs humoribus generari possit, nedum ex solo sanguine

Caput VII.



X his itaque luce clariū cūlibet, patere poterit continuas febres ex bile, indifferenter accendi posse, tum eadē putrescente in particularibus quibzdam venis, ac a corde disitis, & primo inde febres easdem plures habere accessiones, iamdudum explicauimus, tum insuper in omnibus aut saltem principalioribus, magnisque vasis, quæ sunt inter alas & inguina, postquam alia ratione oriri haudquaquam possent ex eadem bile intra vasa putrescente, continuas febres vnam duntaxat a principio ad finem vsque accessione habentes, quemadmodum decretum reliquit Galenus secundo de differentiis febrium, cap. vlt. iuxta finem cū dicebat: [sed quā circuitum non habent, in his nulla est corporis pars, quā præcipue sit offensa, sed qui in venis & arteriis omnibus continentur humores, atque hi præsertim qui in maximis, atque plurimo calore abundantibus sunt; aut ob aliam quamuis causam, quemadmodum in ephemeris, aut ob putrefactionē feruentes, febrem accendunt *ῥυοζοὺν* appellatam, quā a principio vsque ad finem nullam habent intermissionē.] * Nemo itaque hæsitare debet, quod vbi continua febris generatur, quā a principio ad finem vsque vnam duntaxat accessione habet, o- pus est humores in omnibus vasis æqualiter, aut saltem in maioribus, ac principalioribus putrescere, vbi ex putredine ortum habuerit. Verum cū hoc genus febrium ex sanguine putrescente generari consueuerit, vt in sequentibus fusiū demonstrauimus, id quod subintelligere voluit Galenus non de method. meden. cap. 3. cū dicebat: [Alterum genus est vbi in omnibus vasis, ac potissimum maximis æqualiter succi putrescūt,] * idē enim subintelligēdum est in eius doctrina per succos, seu humores æqualiter putrescere, quod sanguinem ipsum, quemadmodum ipsemet testis est lib. de multitu. cap. 10. cū inquit: [Demonstratum hoc est alibi nobis, nihil referre, humores, an sanguinem de mixto appelles, modo ei non temere, sed vt in mensura quadā mediocri, animalibus naturali habitu præditis, admixti alij fuerint. Nam cunctis in naturali commo- ditare augetur cum sanguine, per præpotentiam dicto, idem humorum vocabulum notat, nihilque discriminis est creuisse humores an sanguine proferas, oratione quā humores dicit, id ipsum demonstrantem, nimirum pro veteri omnino proportionē abundare.] Propterea non ab re hæsitare contingit; qui fieri possit, vt hoc idem genus febrium ex putrescente flaua bile gigni valeat? quod verō Galenus admiserit continentes has febres, quas Græci *ῥυοζοὺς* appellant, (nos verō clarioris doctrinæ gratia continentes nuncupamus) ex eadem putrescente bile intra vasa accendi posse, liquet in hoc secundo de differentiis febrium, cap. 2. nec minis & secundo de crisib. cap. 6. ab eodem confirmatur, quo loco tradens differentiam inter continuas febres & intermittentes ex bile ortas, hæc protulit verba: [Continuam quidem omnino febrem, quā ad infrebricationem antequam ex toto soluat, non definit; & si declinatio aliqua sensibilis appareat. Cū autem neque declinatio aliqua sensibilis fiat, semper verō a primo principio febris vsque ad crisim similis perseuerauerit, erit & hæc ex genere febriū deurentiū, ab eisdem verō acutis differt. sed neque in primo die, neque in secundo est huiusmodi febrem præ- noscere, neq; aliter vtile; sufficit enim genus agno- scere,

In quibus
disident.

Continua-
rum ex bile
species dua.

Synochos
differentia
tres.

Continua-
rum pluriū
accessio. dif-
ferentia dua.
Loco citato
Commen. 2.
tex. com. 25
Ex comm. 3
tex. com. 5
Ex comm. 2
tex. com. 23

Tertiana
continua.
Duplex ter-
tiana.

scer, quod scilicet biliosa sit, atque deurens, & peracuta, neque enim si etiam *συνόχην* ipsam nominaueris, ut quidam medici faciunt, appellationis ratione a febribus deurentibus differt.] *συνόχην* igitur febrem ex bile ortam his verbis clara luce fatetur Galenus, idem quoque confirmare videtur citato loco. nam cum dicebat eiusdem generis esse intermittentes cum suis continuis, comparans tertianam cum sua continua, illam significare voluit, per febrem ardentem semper & non *τρεπασθόν*, quo nomine (ut paulo ante diximus) consuevit ipse Galenus tertianam continuam nuncupare; ergo quippiam aliud significare voluit præter tertianam continuam, & id non nisi *συνόχην* febrem; hæc namque, duo genera sunt continuarum ex bileortarum, ut dictum est. Amplius quarto de ratione victus, cum venæ totius corporis supra modum exsiccatæ, acres, biliosas, ac tenues traxerint humiditates ex carnosissimis partibus, ardentem febrem simul cum Hippocrate fieri, testatus est. Quod si continens febris humores requirat in omnibus venis redundantes, ut prius diximus habebit & ipsa, ex bile generationem, cum idem humor ex carnosissimis partibus ad omnes venas fuerit attractus, atque in eisdem inclusus putrefcat. Poterit insuper & hac ratione illud confirmari. Nam si ex putrescente sanguine, seu humoribus æqualiter adauctis in omnibus, vel principalioribus vasis putrescentibus gignitur *συνόχην* febris, quidnam prohibebit si biliosus humor, simul cum copioso sanguine similiter redundarit, quod ex eodem *συνόχην* febris generari nequeat? potissimum cum ipsemet Galenus fateatur hanc quoque redundantiam connumerari inter multitudines, quamvis non simpliciter ea dicenda sit, sed cum adiectione bilis. Nemini itaque in dubium veniat *συνόχην*, seu continentem febrem generari posse ex redundante bile simul cum sanguine putrescente in omnibus, aut saltem maximis, & principalioribus vasis. Quod licet Galenus non de methodo medendi asseruerit ex sanguinis redundantia tale progigni febrem, cum his qui sanguine abundant, & corpulentis gigni cernatur; quando nec obstructio, nec humorum putredo, in omnes, quæ inter inguina & alas intersunt venas, æqualiter, & citò porrigi in frigido corpore potest, propterea quod quæ putrescunt tum calida, tum humida esse debet, tum etiam difficilem habere transpirationem, non tamen omnino negauit, in aliis quoque corporibus eandem gigni posse, potissimum ubi corpora, & calida etiam sunt, & redundantes humores biliosi, simul etiam cum copioso sanguine, & breuem quandam excessum susceperint; dixit enim plurimum contingere in his qui sanguine abundant, & corpulentis, & non dixit in his dūtaxat semper, & perpetuò *συνόχην* febrem ex putredine generari. Potest enim ipsa bilis breuem quandam excessum vñ cum copioso sanguine adipisci, quæ etiā plenitudo, seu plethora nūcupabitur secundum quid, ut liquet libro de multitud. & c. ubi in omnibus, aut saltem principalioribus vasis redundauerit, putrescere, & hac ratione febrem accendere continentem, quæ à principio ad finem vsque vñam habeat accessionem, quemadmodum ubi multum excedat, non cum copioso sanguine in quibusdam particularibus vasis putrescens, etiam efficit continuam, quæ plures accessiones habet. Ad hæc, si ex putrescente sanguine fit continens febris ergo ex putrescente bile. Nam ubi admo-

dum exactus ac putrefactus fuerit in bilem vertetur, præsertim quod in eo pingue, ac tenue existit; quare aucto in eodem sanguine calore, ac magis putrescente, quæ prius erat ex sanguine orta continens febris, modo ex bile accensam esse verè quispiam affirmauerit; id verò necessariò consequitur, ubi confestim eadem continens ex sanguine orta non fuerit curata, aut si interficere anticipauerit, priusquam in bile sanguis conuertatur. Sed mox inquires, plures ergo erunt harum febrium differentiarum quàm sex, si tot sint continuarum quæ ex flaua bile sunt differentie? Huic responsum sit, totidem esse continuarum febrium simplices, ac primas differentias, quot etiam sunt intermittentes, & propterea sex sunt numero, ut simul cum Galeno conclusimus, licet eademmet

1. continuæ possint in plures particulares differentias secari. 2. Id verò quod magis vrget, est, num quæ admodum ex ipsa bile simul cum copioso sanguine in omnibus, aut principalioribus vasis putrescente, continens accenditur febris, ita quoque eadem gigni possit pituita, aut nigra bile, eodem modo simul cum copioso sanguine redundante? potissimum cum hi etiam succi paruum quendam excessum adepti in simul cum copioso sanguine redundare possint, atque hæc etiam multitudo, seu plethora nuncupari, secundum quid tamen, ut superius annotauimus, & liquet apud eundem Galenum citato libro de multitudine? Porro asserimus nos, & ex eisdem quoque eandem *συνόχην*, seu continentem febrem gigni posse. Nam quemadmodum sanguis veteri aliorum humorum proportionem in eo seruata, aut etiam inter eos solo sanguine superabundante, ac alios excédente, potest æqualiter in omnibus vasis putrescere, perinde etiam ubi quispiam aliorum humorum breuem quendam excessum, simul cum eo susceperit (quemadmodum de bile dictum est) sentiendū erit. 3. Nec obstat si dixeris pituitam, ac nigram bilem frigidam naturam esse, & hanc ob causam non adeò facile posse eorum humorum putredinem in vniuersa, aut principaliora vasa porrigi, & ob id neque febres continens generari. Nam eosdem humores semper cum copioso sanguine redundare intelligimus, ipsos verò exiguum quendam suscipere excessum, adeò ut potius pituitosum aut melancholicum sanguinem redundare dixerimus, ita etiam & biliosum, quàm pituitam nigram, aut flauam bilem in sanguine superare. Quapropter cum copiosa fuerit sanguinis substantia, exiguus verò eorundem humorum excessus, haud agere porrigi eorum putredo poterit per singula, aut principaliora vasa quamvis non adeò promptè, ut si æqualiter adaucti omnes succi putrescerent, seu solus sanguis, ut quarta substantia excesserit, aut bilis cum copioso sanguine, & propterea sæpius ex putrescente sanguine, non raro ex bile simul cum eodem copioso sanguine, perquam rarissimè autem ex nigra bile, ac pituita, simul etiam cum copioso sanguine, eandem *συνόχην* seu continentem febrem accendi posse, simul cum Galeno censemus; quod verò ex pituita gigni possit, confirmari etiam poterit ex Hippocratis, & Galeni auctoritate, libro quarto de ratione victus, quo loco ex pituita falsa à totius corporis venis attracta, aliud causæ genus generari fatetur. Cum itaque propterea *συνόχην* febres vñam accessionem à principio ad finem vsque habentes generentur, quod in omnibus, aut maioribus, & principalioribus vasis putrescant humores, ita quoque attracta pituita ab omnibus venis, eaque

1. Nam præter continuas plures accessiones continens vñam accessionem continens dicuntur, earum continuas quædam sunt ex succis equaliter adauctis ex putrescentibus, quædam ex bile, quædam ex pituita, & c. ut paulo post dicetur.

2. Altera capituli pars. An *συνόχην*, ex adfusa humoribus quæ ex sanguine oriatur? Pituita & atra bilis cum sanguine possunt putrescere.

Text. com. men. 13

*Cur febriū
continen-
tiū ex pitui-
ta & atra-
bile Gale.
non memi-
nit?*

in eisdem putrescente, in hoc causi seu febris arden-
tis genere, eadem continens generabitur febris. At-
qui statim inquires, propter quid Galenus ne vnum
quidem fecerit verbum de his continentibus febri-
bus, quæ ex pituita, & nigra bile fiunt, si ab eisdem
generari possunt, nec in secundo de differentiis feb-
rium, nec in secundo de crisib. nec etiam libro de
methodo medendi verum ex his quæ iamdudum di-
ximus, responsum facile patere poterit. Nam de eis
sermone fecit, quæ sæpius accidunt, parui faciens
ea quæ raro, & perquam rarissimè contingunt. Nam
cum ex dictis humoribus febres continuæ, quæ plu-
res accessiones habent, raro accendantur, eodem

Cap. 2

Galeno teste, citato libro secundo de differentiis feb-
rium & admodum raro fiant illæ, quæ vnam dun-
taxat habent à principio ad finem vsque accessione,
propterea has consulto prætermisit. difficulter nã-
que hi humores, cum frigidi sint, intra vasa putre-
scunt, & si putrescant, difficilimè eorū putredo per-
uenerit vasa æqualiter, & citò porrigi potest, sed
potius in quibusdam paruis, minusque calidis vas-
is impacti, ac detenti ob eorum crassitiam & tenacita-
tem, præsertim si multum excedant sanguinem, in
eisdem putrescunt, priusquam per omnia, & calidiora
vasa diffundantur, eisdem etiam maximis vas-
is quam calidioribus existentibus extenuantibus, ac eu-
uicentibus, aut saltem tales expellentibus humo-
res, ad eadem minora, ac remotiora vasa, ita vt diffi-
culter in eis acceruentur, & proinde continuæ magis
febres ex eis fient, quæ plures accessiones habent
quàm synochi seu continentes, vbi eos cõtingat in-
tra vasa putrescere. Adde quod nec etiam alia ratio-
ne curari deberent, quàm reliquæ continentes, qua-
rum putredo in omnibus, vel in maximis, maximè-
que principalibus subsistit vas-
is, paucis quibusdam
adiectis, siue immutatis, pro ratione exigui excessus
humoris cum copioso sanguine redundantis, & pro-
pterea eas non meminit Galenus, & non quia nulla
ratione fieri nequeant, id nanque nullibi ab eo scri-
ptum reperitur. Sed dices, si ex pituita & nigra bile
fient continentes febres, id saltem vitare nequeas,
quod plures videlicet, quàm sex erunt primæ febriū
ex putredine ortarum differentiæ; etenim Galenus
quotidianæ & quartanæ intermittenti nullam com-
munem opposuit vocem, quæ omnes eiusdem gene-
ris (continuas tamen) significaret, quemadmodum
in his quæ ex bile accenduntur per vocem *ardens*, sed
inquit quotidiana intermittens & continua; & quar-
tana intermittens & continua, vt liquet secundo de
crisib. & secundo de differentiis febrium. Nisi ef-
feret quod vt dictum est, perquam rarissimè fiant ex
iam dictis humoribus continentes febres, quo circa
de eis sermonem non fecit: & per vocem etiam con-
tinuam Græcè *συνεχὴς* dictam, continentem etiam
subintelligere voluit. Vel rectius dicas, continentes
febres, quas ex eiusmodi humoribus oriri diximus,
accendi non posse, nisi cum copioso sanguine redun-
dauerint, eorum verò humorum paruus fuerit exces-
sus, adeò vt pituitosus, aut melancholicus magis di-
catur sanguis redundare, quàm pituita, & nigra bilis.
Cum verò vestigauit Galenus particulares febrium
differentias ex putredine ortas, per continuas quæ
ex eisdem fiunt humoribus, intellexit quando co-
piosi fuerint, ac multum redundauerint; hæ nanque
febres propriè eiusdem sunt generis cum suis inter-
mittentibus; quapropter neque erunt plures quàm
sex, quæ ex eisdem humoribus redundantibus fiunt;

Cap. 6

Cap. 1

tres, inquam, intermittentes, & totidem continuæ,
quoniam licet non intermittant, plures habent ac-
cessiones, eandem formam seruantes cum suis inter-
mittentibus, vt liquet secundo de crisib. ca. 6. pos-
sunt itaque continentes febres non modo ex putre-
scente in omnibus vas-
is sanguine, seu bile cum co-
pioso sanguine generari, verum etiam ex pituita, &
nigra bile, modo paruus fuerit eorum excessus, & cū
copioso sanguine etiam redundauerint, vt dicunt
est, neque propterea plures erunt primæ particula-
res febriū differentiæ, quæ ex putredine oriuntur quā
sex, subdiuisis eis in intermittentes & continuas.

Quid per ardentes, seu febres ardentes intelligendum sit.

Caput VII.

Cum itaque plures tradita sint conti-
nuarum febrium ex bile putrescente
ortarum differentiæ; tanquam valde
necessarium disserere putauimus, nunquid
omnes, vel earum quasdam per *ardores*,
hoc est febre ardente subintelligere oporteat; cer-
nimus enim sæpenumero in Hippocratis, & Galeni
doctrina diuersimodè vocem hanc usurpari. Nam
quarto de ratione victus, cum Hippocrate de *ardore*
verba facit (quæ vox nil aliud Latine significat, quā
cõbustionem, seu ardorem) quamuis ipse determi-
nasset cum fieri, cum venulæ tempore æstiuo ex-
siccata, acres, & biliosas, tenuisque traxerint ad se
humiditates, Galenus in commen. causum nedum
in vniuerso corpore, verum in vna eius parte, quæ-
uis illa sit, interdum gigni fatetur, vt in vetriculi ore,
atque ipso ventriculo, & stomacho, & febre etiam pul-
mone, & subinde in ieiuno, vbi earundem partium
venæ ad se easdem traxerint humiditates. Quinimò
admittere videtur quod in carne etiam, siue in parte
vna, siue in toto corpore pati eam conrigerit, gene-
rari causus possit, ita vt videatur & vniuersalem &
particularem causum admittere, nedum intra, sed
etiam extra venas, ex biliosis acerbisque humida-
tibus ortum. Et eodem libro post pauca, non modò
ex bilioso humore, verum etiam ex salsa pituita, fe-
brem, causum dictam, hoc est ardente, oriri fatetur
simul cum ipso Hippocrate, idem Galen. libro verò
de rigore, tremore, &c. tertianam de genere arden-
tium febrium esse fatetur: ait enim: [nullus autem sa-
næ mentis febrem hanc in succo frigido fieri affir-
met, cum genere ardens sit, illius tantum continui-
tatis egens.] & paulò post: [hoc solo distat ab ardē-
te tertianæ (dicebat) ardentes enim in vas-
is bilem delatam, tertianæ verò, per sensitiua loca extra ha-
bent.] & secundo de differentiis febr. cap. 3. loquens
de tertiana inquit: [atque de genere ardentis est.]
Idem quoque confirmauit octauo de Hippocratis,
& Platonis decretis, cap. 6. inquires: [ita nunc satis
erit tantum quæ illis in libris demonstrauimus, com-
memorare, acutissimas scilicet, & ardentissimas fe-
bres à flaua bile oriri, & tertianam ex ardentium fe-
brium esse.] Nec minus & secundo libro de crisib.
cap. 6. similem videtur proferre de tertiana senten-
tiam, dum ait: [continuas febres idem habere genus,
eandemque hypotheseim cum intermittentibus, cū
tertianæ quidem exquisita, exquisitam ardente &c.]
quamuis & eodem loco, & commen. aphor. 58. & 59.
quarti lib. & primo etiam de morbis vulgaribus, læ-
pissimè tertianam febrem ab ardentibus separet, af-
serens eam hoc solo ab ardentibus discedere, quod
in illis intra vasa, in ea verò extra, bilis putrescat.
Quamobrem

Quamobrem mirum videri non debet in hac re plu-
rimis hallucinatos esse, postquam diuersis in locis
varia de febre ardente scribere conatur Galen. con-
stat enim nos eiusdem Galeni in hac re sen-
tentiam exponere id prius pro hypothesi assumen-
tes, quod quidam sit causus propriè dictus, quidam
autem communiter, propriè dictum per vehemen-
tem totius corporis caliditatem, inextinguibilem-
que sitim circumscribi tanquam per propria, ac pa-
thognomonica signa. hanc etenim febrem, cum vi-
delicet vrens caliditas, sitisque incompefcibilis ho-
minem torquent, *adulv* (hoc est ardentem) simul
cum reliquis medicis simplicem, ac exquisitum ap-
pellat idem Galenus citato libro quarto de ratione
victus. Et tertio de morbis vulgaribus, inquit, quod
non appellabitur ardens febris, nisi adiunctam per-
petuò habeat per totum morbum sitim assiduam,
atque exurentem calorem. Huic causo opponitur is
qui communiter, & non ita propriè sic appellatur,
utpote si in vna parte fiat, ob quam non de neces-
sitate sitim pariat, aut etiam in totius corporis carne
eum generari contingat, ut diximus eiusdem Galeni
auctoritate, citato libro quarto de ratione victus,
fit autem & hic ex ipsa etiam flaua bile. Sit insuper
& secunda hypothesi quod causus, siue febris ardens,
adhuc etiam propriè dictus bifariam esse potest ea-
iusdem Galeni sententia, quia aut propriè exquisi-
tus, simpliciter, ac legitimus est, aut pro dimidia par-
te, quem breuioris doctrinæ gratia, haud perperam
fuerit causum nothum, illegitimum, seu spurium ap-
pellare; ita quod quemadmodum tertianarum duo
esse genera quispiam dixerit, vnum exquisitum, le-
gitimumque, alterum verò nothum, & spurium, cui
videlicet ex legitimi quidem symptomatis nonnul-
la insunt, aliqua verò non, ut in sequentibus patebit,
ita quoque duo causarum genera esse intelligemus,
homonymiam inter se habentia, verum non eam per
quam nullo pacto nisi nomine inter sese communi-
cant, verè æquiuoca nuncupatas, sed modo quo dixi-
mus. Quibus ita iactis fundamentis, asserimus, inter-
mittentes febres ex bile ortas, delatas per sentientes
corporis partes, aut etiam si ex erysipellate genera-
tionem habeant, quæcunque fuerint, etiam si pars ip-
sa de necessitate sitim non pariat, communì appella-
tione *adulv* denominari posse, ut liquet ex Gale-
no citato libro quarto de ratione victus, qua ratio-
ne tertiana ipsa ardens febris à Galeno interdum nun-
cupatur; insuper cum eodem fatemur nothum cau-
sum ex alio humorum, quàm ex bile, generari posse,
utpote ex falsa pituita; legitimum verò non nisi ex
eadem putrescente bile. At si non modo legitimus,
sed simpliciter, & exquisitus causus generari debeat,
cum eodem Galeno sentemus, non nisi eadem bile
intra vasa putrescente fieri posse, & propterea per
exquisitum causum, seu exquisitam febrem ardentem,
quam interdum consuevit Galenus acutissimam, ac
ardentissimam nominare, vsus vocibus *ἐξυττος*, *ἐξυττος*
καυσὸς *ἁλτος*, ut liquet secundo de crisib. c. 3.
continuum febrem ex bile ortam intelligimus, indif-
ferenter, nam si æqualiter in omnibus vasibus putrescat,
&ynam habeat à principio ad finem vsque accessio-
nem, quàm si in quibusdam particularibus, plures in-
se continens accessiones, siue tertio quoque die ex-
dem fiant, siue etiam die intermedia aliam accessio-
nem habeant; id verò ubique locorum manifestauit
Galen. quo tertianam ab exquisita febre ardente se-
cernere voluit, cum non in alio disidere asseruerit,

quàm quod in febre ardente intra vasa bilis, in ter-
tiana, extra putrescat, & propterea illa cōtinua, hæc
verò intermittens est, & secundo de crisib. cap. 6. fa-
cta hac distinctione, quidnam per continuas intel-
ligeret febres, his verbis propalauit, inquit, [conti-
nuam quidē nomino febrem, quæ ad infrecitatio-
nem, anteaquàm ex toto solvatur non definit, & si
declinatio aliqua sensibilis appareat, cum autem ne-
que declinatio aliqua sensibilis fiat, semper verò à
primo principio febris vsque ad crifim similis per-
seuerauerit, erit hæc & de genere febrium deurenti-
um, ab eisdem verò acutie differt.] & paulò post
subdit: [neque enim si etiam synochum ipsam no-
minaueris (ut quidam medici faciunt) appellationis
ratione à febribus deurentibus differt.] Iquam etiam
sententiam scriptam reliquit Paulus cap. 26. lib. 2. dū
ait: [continens itaque febris est quæ non ante ad in-
tegritatem terminatur, quàm ex toto fuerit soluta,
& si inclinatio aliqua sensibilis appareat; cum autē
nulla accedit quæ sensibus queat percipi, hæc quo-
que ex ardentium genere habetur, sed acutie seu a-
crimonia ab ipsis variat.] Illud etiam clara luce no-
bis patefecit eodem quarto de ratione victus, nam
cum dixisset, causum propriè dictum non calidita-
tis modo, quæ per totum sit corpus vehemētia, præ-
stare, verum quoque & siti, quæ in eo vehemens &
incompefcibilis est, declarassetque eum fieri posse,
quemadmodum Hippocrates docuerat, cum venæ
totius corporis supra modum exsiccatæ calidas car-
nosæ à partibus humiditates traxerint, subdit: [defi-
cit ergo præfenti dictioni singularis de causi gene-
ratione sermo, quem nos nuper adieciimus, nempe
in vna corporis parte quævis illa sit interdum causus
gignitur, interdum & toto in corpore.] & paulò post
aperit demonstrat in qua etiam corporis parte fie-
ri posset propriè & exquisitè dictus causus, qui iam
dictas etiam duas conditiones contineret, vrentem
scilicet caliditatem, & incompefcibilem sitim, exem-
plificans de ore ventriculi, ac ipso etiam ventriculo,
stomacho, ac pulmone, in quarum partium venis si
causus fiat, necessariò præter vrentem caliditatem
incompefcibilis sitis paritur. similem quoque sentē-
tiam non semel duntaxat, sed sæpius conscripsit li-
bro primo de morbis vulgaribus. quod videlicet cau-
sus, seu exquisita febris ardens accedatur cum in va-
sorum capedinibus, vna cum sanguine putrescens fla-
ua bilis contineatur, præcipuè verò ubi in vëtris aut
iocinoris, aut pulmonis venis, bilis efferuescat, tan-
quàm cordi proximioribus existētibus. Ad hæc quod
per exquisitam febrem ardentem Galenus quamli-
bet continuam ex bile ortam subintelligat, citato
secundo de crisib. cap. 6. manifestauit his verbis: [Di-
co autem febres continuas idem habere genus cum
singulis intermittētibus, cum tertiana quidem ex-
quisita, exquisitam ardentem.] & paucis quibusdam
interiectis asserbat citato loco: [Nam quæ in sola
flaua bile febris accenditur, sine aliquo visceris affe-
ctu, siquidem manente adhuc intra vasa bile accen-
datur, exquisita febris ardens nuncupatur; si verò per
totum corpus deferatur, exquisita tertiana.] Non igitur
quam vulgus medicorum, tertianam continuam
appellat duntaxat, Galen. febrem ardentem exqui-
sitam nominat, verum quamlibet continuam quæ ex
flaua bile accenditur, quemadmodum in citatis lo-
cis patet. Quinimò si quispiam rectè perceperit ver-
borum sensum eiusdē Galeni, quæ conscripserat ci-
tato loco de febre continua, clara luce intelliget.

Super text.

Commen.

Super text. 9

Com. 2.

Super text.

20. & 73

Exquisita

febris ardens

dicitur à

Galeno cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

tinua cō-

quod ea continua genita ex flaua bile, quæ vnam duntaxat habet accessiōem à principio ad finē vsque, & ardens, & peracuta magis ab eodem esse dicatur; dicebat etenim: [erit & hæc ex genere febrium deurentium.] & paulo post: [sufficit enim genus agnoscere (asserbat)] quod scilicet biliosa sit, atque deurens, & peracuta. [v]ocibus vtens *deurentis, καὶ κατόχως*, licetque illud non Galeni auctoritatibus duntaxat, sed & rationibus confirmari. Nā si ea est exquisita febris ardens, quæ exurentē habet calorem, & incompefcibilem sitim, hæc duo non magis fiunt in ea continua biliosa febre, quæ plures habet accessiones, & continuam tertianam appellant, quā in illa quæ vnam duntaxat habet à principio ad finem vsque accessiōem, imò potius in hac, ac magis calor exurēs erit, vehemētiſque sitis, cum bilis putredo extēsa sit per omnia vasa, aut saltem per maiora, & principaliora. Quare si ea quæ plures habet accessiones, exquisita febris ardens appellari debet, multo magis & hæc, propter iam dictas causas. Ad hæc si continuam duntaxat tertianam appellasset Galenus exquisitam ardentem, cum eadem consueuerit *τρίημερον* appellare, cur nullibi eam meminerit, cum tertianam exquisitam ab eadem secernere intendit, sed semper vsus est voce *καύστος*, seu *καύστος ἀρπύνης*, hoc est ardēte, seu ardente & exquisita febre. Pater igitur exquisitam febrem ardentem nuncupari in Hippocratis, & Galeni doctrina, quamlibet continuā ex bile ortam, tam si tertio quoque die accessiōem habeat, quā si etiam in die intermedio aliam habuerit, & multo magis eam, quæ à principio ad finem vsque vnam habet accessiōem. Nec quicquam obstant eiusdem Gal. verba citato lib. secundo de cris. c. 3. cū inquit: [in adurentibus autem febribus singulæ accessiones ad infabricitationem nō perueniunt, quoniam qui earum causa est humor, non expurgatur.] etenim hæc auctoritas verificatur indifferenter in his, quæ vnam habent accessiōem à principio ad finem vsque, & in his, quæ plures; in omnibus enim accessiones non perueniunt ad infabricitationem, quousque morbus ex toto soluitur; quod si per hæc verba velit adurentes febres esse, quæ plures accessiones habent, quæ tamen ad infabricitationē non perueniunt, id etiā nos cum eodem Gal. admittimus, quod hæc febres connumerentur inter ardētes. Verū hoc loco Galenus noluit has duntaxat nuncupari ardentes, sed eas cum exquisitis tertianis comparauit, volens causam reddere cur hæc non intermittant, illæ autem intermittere videantur; asserens quod licet habeant plures etiam accessiones, quemadmodū & exquisitæ tertianæ, non tamen vt illæ intermittūt, neque ad febris vacuitatem perueniūt, quoniam qui earum causa est, humor non expurgatur, etiam si plures accessiones habeant, non negans alias quoque febres continuas adurentes esse, si ex eadem bile vnā cum sanguine putrescente intra vasa accendantur, vt iam dudum concluderat in præcedentibus verbis, cum dicebat: [in aliis verò adurētibus febribus quæ nullam habent intermissionem flauæ bilis humor in vasis vnā cum sanguine contineri ostendebatur, atque hoc ipsæ à tertianis differunt, quamuis eo, qui vtrunque facit morbum humore communicent.] Qua etiam ratione liberari à calumnia poterit Aëtius, qui libro 5. cap. 76. dicebat: [differt autem febris ardens à continente putrida, eò quod hæc ex sanguine putrefacto conflat, & à principio vsq; in finem vnam habet exacerbationem, febris autem

ardens ex flaua bile putrescente accenditur, & alternis diebus exacerbatur, & quandam habet febriſ diminutionem, ac velut remissionem, continens verò putrida, similis manet vsque ad solutionem.] Videtur etenim hoc loco Aëtius eam febrem ardentem quæ altera diebus exacerbatur, cum ea continetur, quæ ex sanguine putrefacto conflat, comparare, & non quamlibet febrem ardentem ex flaua bile putrescente ortam, quam etiam hic fieri posse non negauit, aliā insufficientis fuisset in tradendis ardentibus febribus, iuxta Hippo. & Gal. sententiā, quorū nos semper imitatores sumus. An verò exquisita tertiana de genere sit acutorum morborum, quemadmodū ex genere ardentium est, nos fusiūſ discutiemus in nostro quæſito, num tertiana sit morbus acutus.

De continuarum febrium quæ plures accessiones habent conuenientia & differentia. De Epiala, & compositis febrium differentijs: de quæ singulas particulares febres ex putredine ortas curandi via.

Caput IX.

QUEMADMODVM continētēs febres quæ vnam accessiōem à principio ad finem vsque habent, ex quouis humore redundante fiant, conueniunt, eò quod in omnibus vasis, aut saltem in maioribus continetur putrescens humor, qui breuem quandam cepit excessum, & simul cum copioso sanguine redundat: vt paulo dictum est, perinde etiam & illæ continuæ quæ plures accessiones habent, ex quouis humore accendantur, inter se consentire videntur. Nam in particularibus quibusdam à cordēque disitis venis inclusus humor, amplissimum excessum adeptus simul etiam cū sanguine putrescit, tam si bilis flaua, quā nigra fuerit, quā etiam si pituita, & propterea primam, continuam tertianam appellabimus; alteram, quartanam continuam quæ ex nigra bile accenditur: reliquam verò, continuam quotidianam, quæ ex putrescente pituita generationem habet. Hoc tamen inter se dissident, præter humorum diuersitatem. Nam licet quemadmodum aliquando ipsa tertiana tum intermittens, tum cōtinua duplex, aut triplex sit, ita quoque & ipsa quartana, non modò duplex, sed etiam triplex euadit, prout in pluribus, ac diuersis locis istarum febrium causa continetur, cumulat, ac putrescit. Attamen continuæ quartanæ perrarò eueniūt, tertianæ frequenter, vt liquet 2. de crisib. cap. 9. & 2. de differ. febrium, cap. 2. & eadem ratione magis rarò fit duplex, aut triplex quartana, quotidiana verò duplex aut triplex admodum rarò fit, quoniam & ipsa quotidiana tam intermittens, quā continua rarò admodum accidit, fit enim omnium rarissima. Nā pituitosus humor propter sui tum frigiditatem & humiditatem, tum crassitatem & lentorem, seu tenacitatem, ægrè accenditur, & propterea de duplici quotidiana sermonem non habuit Galen. libro 2. de differentiis febrium, cap. 9. licet eam admittere videatur lib. 2. de cris. cap. 3. & libro de typis. Verū cū ipsius pituitæ differentiæ plures sint, siue quatuor eas dixeris, vt acidam, dulcem, fallam, & vitream, siue tres, nam & vitrea pituita acidæ qualitatē est particeps, animaduertendum quod ex hac quæ vitrea pituita appellatur, differentia quædam particularis pituitosæ febris generatur, vbi putrescat, & per sentientes corporis partes deferatur, quæ à Græcis *ἐπιπλοή*, Latine epiala

Respondet obiectioni.

Aëtium à calumnia liberatum.

Epiala dicitur febris continua, quæ ex sanguine putrescente orta est quotidiana.

In quibus febribus continuæ sunt.

In quibus febribus intermittens.

Nulla est continua exquisita si duplex dicitur.

Intermittens si simplex est, quæ ex pituita orta est, quæ ex sanguine.

epiala febris dicitur. cur verò febris hæc epialos Graece nuncupetur, sequenti capite de quotidiana explicabimus; hæc ab intermittente, seu exquisita quotidiana differt, non solum ipsius pituitæ differentia, verum etiam & putredinis modo. Nam in hac febre simul febricitant, & rigent agrotantes, atque eodem tempore in toto corpore, utrunque sentiunt affectum, propterea quod humor hic vitreus, satis cum frigidus sit, & tenax, ac substantiæ inæqualis, nõ adeo promptè vniuersus putrescit, sed veluti semiputrescens, vbi modica aliqua in ipso fiat putrefactio, per sentientes corporis partes delatus quatenus frigidus admodum natura est, frigus ac rigorem sentiunt laborantes: quatenus verò putrescens, calorem, ita vt accessione tota non modo rigeant, sed etiam febricitent qui hac febre laborant, epiala appellata: in his etenim febribus, tum ab interno, tum exiguis portionibus, eoque vniuersum corpus, ambo sentire videtur, cum enim exiguis portionibus aspersum per corpus, tum calidum sit, tum frigidum, nullam sensibilem alterius portionem ita paruum desumas, in qua non alterum sit comprehensum, vt patet lib. de inæqui. in temperie, cap. 2. quod si vehementius putrescat ac æqualiter, rigor quidem antecedit, febris verò sequitur superata frigiditate à multitudinis caliditatis, adeo vt dum febris incalcescit, atque consistit, minime sentiantur. Atqui licet hæc febris valde diuturna, & difficiliter solubilis sit, in quotidiana tamen specie, seu figura progreditur, vt liquet citato lib. 2. de diff. feb. cap. 2. & propterea in quotidianarum genere reponenda est, quauis ab exquisita quotidiana, modo quo diximus disidere videatur. Est etiam & in numero simplicium, & non compositarum febrium, quoniam à simplici causa febris hæc ortu habet, quæ pituita vitrea, modo dicere tamen putrefacta, per sentientes corporis partes delata exsistit: totum enim id quod ex eadè putrescit, febre accendit, reliquum verò quod nondum putrescit, rigoris ac frigoris causa est, non eandem ferè habens cum putrescente qualitatē. Quapropter ab hac quidem rigor, à putrescente verò febris generatur, vt citato loco testatur Galenus. Tot itaque sunt simplicium febrium differentia, quæ ex putredine ortum habent, tam si continua, quam si intermittentes fuerint. Quarum omnium primæ sex duntaxat numero sunt, tres videlicet intermittentes, & tres continuæ, quemadmodum auctoritate Gal. 2. de crisi. cap. 9. & 2. de diff. feb. cap. 2. prius declarauimus, licet affinitate quadā sermonis, de quibusdā compositis habitus fuerit sermo, de quibus differere iam tempestiuum est, si prius his quæ simpliciter consistunt, quod deesse videtur adiunxero: quod videlicet nulla dictarum febrium, vbi continua fuerit, exquisita simplex esse poterit, nec tertiana, nec quartana, nec quotidiana, cum saltè reducens humor nunquam omnino à sanguine secerni possit: sed simul cū sanguine intra vasa contineatur, licet quadoque magis, quandoque minus, vt prius dictum est, sanguine sit admixtus, & cum copioso interdum sanguine redundet, interdum non cum copioso sanguine. Si verò intermittentes fuerint, possunt exquisitam simplicitatem seruare, præsertim quo ad sensum: nam secundum rei naturam fortè neque hæc simplices omnino consistere queunt. Verum simplices eas fateamur esse, cū nullus alius humor qui sensu iudicari possit, cum eo qui febre generat est permixtus. Atque ita asserimus exquisitam tertianam, exquisitam quartanam, atque exquisitam quotidianam existere, cum flaua,

aut atra bilis, seu pituita sola putrescens, per sentientes corporis partes vehementer mouetur, vbi verò eorum quispiam humor non solus, sed alteri cuiuspiam permixtus fuerit, vbi bilis flaua cum nigra, aut pituita, tunc haudquaquam talem febrem, aut talem febris differentiam exquisitam simplicem esse fatebimur, sed si bilis dominabitur, tertianam illegitimam, notham, seu spuriam nominabimus, si pituita, & singulis diebus æqualem habeat accessionem, quotidianam spuriam: si nigra bilis, spuriam quartanam, quæ singulis quatuor diebus accessionem habet. Neutra tamen earum adhuc composita febris denominanda erit, vt quidam falsò imaginantur, licet efficiens eam humor amplius syncerus non sit, sed alteri permixtus, vna siquidem est dispositio, vna febris forma, seu species, hæc tamen ab eius exquisita simplicitate recedens, quatenus fuerit eius causa alteri humori permixta, dicitur itaque febris hæc simplex adhuc, licet non exquisitè talis sit. Quoniam & si legitime & exquisitè febris symptomata aliqua nõ insint, sed eorum nonnulla habent, eundem tamen seruat intentionis ac remissionis ordinem eundemque typum, & propterea vna, simplexque erit febris, licet non exquisitè, quicquid alij sentiant, quod manifestè Galenus confirmat citato libro secundo de differentiis febrium, sub exemplo tertianæ, neque enim sola tertiana appellabitur quæ omnia in se habeat, quæ exquisita tertiana requirit, erit tamen hæc exquisita, si verò aliquid horum defecerit, non propterea tertiana non appellabitur, licet non amplius habeat exquisitæ nomen, sed vel tertiana simpliciter, vel extensa, vel magis seu plurimum extensa dicitur, seu quomodoque eam appellare volueris, satis sit eam esse, & dici tertianam, quoniam typum formam, seu speciem tertianæ seruat, tam si eius accessio breuiori tempore vltra duodecim horas protrahatur, quam si longiori, tam si exiguis fuerit, flauæ bili permixtus pituitosus, seu melancholicus succus, quam si multus, modo ipsa præualeat ac dominetur. Genus verò febris compositum dupliciter constituitur, vt inquit Galenus 2. lib. de crisi. cap. 7. vel quia hæc quas diximus, febres citra alicuius membri passionem, seu inflammationem commiscuntur, vel quia ex membri cuiuspiam inflammatione accenduntur. Nos verò relicta ea febrium compositione quæ ex affectis, seu patientibus inflammationem locis accidunt, eam prosequemur, quæ citra inflammationem, seu alicuius membri passionem commiscuntur, nam simili ratione febres quæ ob membri alicuius inflammationem oriuntur, permisceri possunt, quemadmodum illæ quæ citra hanc, generationem habent, eodem Galeno teste citato loco, cap. 6. quinimò sæpenumero idem Galenus easdem febres quæ à phlegmone excitantur in communi putredinis genere comprehensas intelligit, vt liquet 10. de metho. med. Commiscuntur autem febres ipsæ dupliciter, aliquando quidem per se totæ, hoc est per se mixtæ, & has febres implexas, implicatas, seu complexas dicimus, nonnunquam verò per se totæ, hoc est confusione sunt etenim per se totæ (vt quispiam dixerit) confusæ seu temperatæ, verum siue per complexionem seu complexum, siue per confusione febres ipsæ misceantur, id non vno duntaxat modo erit, nam quandoque quædam febres vnius generis, cum alijs eiusdem generis componuntur, vel vnius speciei cum alijs eiusdem speciei interim verò contingit etiam differentes sint, vt citato libro secundo,

Notha intermittens.

Notha febres non compositæ ob id quod nothæ sunt, sed simplices non exquisitæ.

Febres compositæ dupliciter.

Febres & mixtæ dupliciter.

Febrium commixtio per complexionem & confusione multiplex.

de crisi scriptum est; vnius siquidem generis, cum aliis eiusdem generis, vt diaria cum diaria, aut quæ ex putredine ortum habet, cum alia quæ ex humorum putredine nascitur: vnius generis cum aliis diuersis genere, vt diaria cum hectica, aut ea quæ ex putredine originem habet, vel hæc etiam cum febre hectica complicatur. Complicantur item febres vnius speciei cum aliis eiusdem speciei, vt tertiana cum tertiana, quotidiana cum quotidiana, & quartana cum quartana, & quælibet earum siue intermittens cum intermittente, aut continua cum continua, siue intermittens cum continua. Diuersæ autem speciei febres componuntur, vt tertiana cum quotidiana, aut quartana, siue quotidiana cum quartana; quandoque etiam & tertiana & quotidiana & quartana insimul siue etiam intermittentes siue continuæ fuerint. Tot itaque modis permisceri febres possunt, & potissimum quæ ex putredine ortum habent, licet quandoque per implexum, quandoque autem per confusionem, vt dictum est. Voco autem implexum, quando eadem febres horis differentiis inuaserint: confusionem verò, quando eodem tempore inceperint, vt liquet citato libro secundo de differen. febrium, modò earundem febrium compositarum putredinis sedes fuerit diuersa, seu accessions principii diuersum. Nos verò (ne nimis prolixus noster reddatur sermo) de singulis dictarum compositarum febrium differentiis, particulatim differere non intendimus, sed de ea duntaxat quæ ex quotidiana continua, & tertiana intermittente componitur, huius nanque tum modum generationis ac dignotionis, tum etiam curationis in sequentibus conscribimus, sub huius etenim exemplo, reliquæ omnes compositæ febrium differentiæ tum cognosci, tum curari haud ægrè poterunt, potissimum vbi quispiam exercitatus fuerit in dignoscendis simplicium febrium differentiis, atque in eisdem curandis, modo quo in sequentibus conscribemus, quibus ita perpensis ac exactè definitis, haud ægrè quibus curandi viam & rationem dictarum particulariū febrium ex putredine ortarum, tam simplicium & exquisitarum quam nō exquisitarum & etiam compositarum inuestigare poterit, etenim citra eas quas in vniuersali methodo recensuimus indicationes tamquam necessariò sumendas in omnibus febribus ex putredine excitatis, hæc particularis adicienda erit, quæ ex qualibet particulari iam dicta differentia oritur: ea verò non nisi ex diuersa humoris natura, qui putredinem admittit, proficiscitur, alia nanque particularis indicatio sumitur vbi flaua bilis putrescat, alia vbi nigra, & alia vbi pituita, pro particulari curatione febrium, quæ ex eisdem humoribus putrescentibus excitantur, nam si continuæ, aut intermittentes hæc fuerint, nullam aliam præ se ferent diuersam indicationem: vbi scilicet continuæ plures accessiones habeant, ab eis quas diximus ex affectis partibus, ac inflammationibus ipsis esse desumendas (vbi eadem etiam fuerint ortæ) si verò continentes pariant febres, nullam præscribent, quæ à parte affecta sumitur, indicationem, nihilque particulariter indicabunt, præter id quod ex eorundem humorum natura diuersa indicant, oportet præterea quæ singulis iam dictis febrium particularibus differentiis, ex putredine ortis, propria esse diximus, considerare (præsertim intermittentibus) vt distinguas videlicet, nunquid earum quælibet exquisita sit, & legitima, aut non exquisita & illegitima, & velut notha? nam

Per imple
cum com
plicate fe
bres, &
per confu
sione quid.

quantum quælibet earum à legitima, & exquisita distabit, tantum oportet ab eo qui committus est humore, pro eiusdem febris curatione, indicationem sumere, id quod seruandum esse puto in compositis etiam febrium differentiis, vbi diuersi generis, aut speciei fuerint in continuis verò cum exquisita esse non possint, quantum quilibet humor putrescens sanguini cui semper, seu alteri humori, cui interdum permiscetur, exactè perpendendum est. At quomodo hæc dignoscenda sint, in particulari exercitatione patebit. Nunc verò tempus iam est vt determinati cuiuslibet humoris periodi causas inuestigemus.

De quotidianis, tertianis, & quartanis circumscriptionibus.

Capitulum X.

Quid autem humorum motus efficiat, & cur putrescens pituita quotidie, bilis, tertio, melancholia quarto quoque die impetum faciat, non satis admodum liquet. Quin potius plena demonstrationis ac controuersie existit hæc disceptatio, nec minus difficilis Galeni. auctore lib. 3. de diebus decret. cap. 8. cum dicebat: [quæ igitur causa sit, ob quam in acutis morbis tertio quoque die plurimum accessiones fiant, in longis autem vel quotidie, vel quarto, non promptum est inuenire.] Propterea eam silentio præterire nolui, sed breuissimis quoad potero huius veritatem simul cum eodem Galeno vestigare conabor. Sunt nanque nonnulli, qui putant hoc ex humorum multitudine provenire: nam quoties ad eam aucta & collecta sint excrementa, vt partem ad excretionem stimulent, tunc validior in imbecillam, ea quasi onus excutiens deponit, atque ideo morbos omnes qui per circuitum repetant, fieri affirmant: quæ etiam ratione interpretantur pituita: satis quotidie, bilis flauæ non nisi tertio, ac ipsius melancholice non nisi quarto die proinde cumulari posse, vt naturam ad excernendum proritet, circuitumque moueat: est etenim maior pituitæ copia, quam bilis flauæ, & maior bilis flauæ, quam melancholice in corporibus nostris, vti ipsi fatentur. Quæ opinio admodum erronea esse videtur, nonnullique erroribus scatens: nanque non omnes causas repetentium per circuitus morborum tradit, sed vnam duntaxat, vtpote quando à robustioribus ad imbecilliores partes, excrementum transmittitur. Nos verò cum Galeno duas alias recensuimus, videlicet quando partes quædam dolore, vel calore affectæ sibiipsis excrementa trahant, aliis quidem non transmittentibus: item cum eadem sibiipsis, ac in seipsis propter ibidem dictas causas generant excrementa. Nec minus deficit in narrandis fluxionum causis, etiam earum quæ sunt robustioribus ad imbecilliores excrementa transmittentibus: neque enim multitudine duntaxat seu copia grauata partes à seipsis (vbi robustæ fuerint) superfuitates excutunt, verum etiam à qualitate irritatæ, cum videlicet acere vel mordax fuerit excrementum: vt apud eundem Galenum legitur tertio de naturalibus facultatibus, tertio de causis symptomatum, 2. de differen. febr. & sexcentis aliis in locis. Ad hæc sequeretur quòd vbi admodum nō adesset pituitæ copia, sed exigua quædam ipsius portio putresceret, quotidianum non efficeret circuitum cuius in dies contrariū cernimus: nam vbi putrescat, siue multa, siue exigua fuerit, quotidiana efficit febrem. Rursus pone quòd quibusdam

Altera
epio
causam
que e
iam im
probatur

Tertia
pituita
eadem
causam
causa
minus
probat
Causa
cuius
Gal. 1.
pituita
confluit
humor
etc.

dam in corporibus maxima adfit bilis flaua copia, aut fucci melancholici, pauca verò pituita; tunc idē humores ob copiam pari ratione quotidianam efficiunt febrē, cuius oppositū in dies cernimus, quantumvis enim fuerit auctus quilibet eorū, tertio quoque die, si bilis flaua fuerit, & quarto, si nigra, accessiōnem pariet. Adde quod idem Gal. (vt paulō post dicemus) humorum copiam non typi seu accessiōnis formam variare fatetur, sed accessiōnis longitudinem efficere; non igitur potens est humorū copia, diuersorum circuituum causa esse, neque eorum ordinem ac speciem mutare. Quidam alij non solam extremam copiam, sed aliam quandam vim maiorem eorundem circuituum, necessariō causam esse fatentur: est autem vis hęc propria contractæ putredinis qualitatisue natura atque conditio, quæ vis seu qualitas in humore genita, efficit vt putrescens pituita quotidie, bilis flaua tertio, atra quarto die impetum faciat, atque vt sua est cuiusque humoris species, ita & sua cuiusque putredo & qualitas, suis cuiusque motus: sed inuenire nequeo quomodo contractæ putredinis, qualitatisue natura atque conditio efficere valeat horum circuituum diuersitatem, cum eadem putredinis natura vna sit, Gal. auctore in de meth. med. cap. 8. est etenim mutatio totius putrescentis corporis substantia ad corruptelam a calido externo; vna quoque ponitur ab ipso Aristotele 4. meteor. cap. 3. cum dicebat, quod est corruptio quædam in vnoquoque humido, &c. cum itaque vna sit cuiuslibet putredinis natura, qua ratione poterit eadem diuersos typos, diuersosque circuitus efficere, etiā si materiis diuersis suscipiatur, ipsius natura eadem semper existente? At si velit iste vir per propriā contractæ putredinis naturā, putredinis proprietatem intelligere, ita vt velut cuiusque humoris sua est species, ita & sua cuiusque propriā putredo, nil aliud asserere intendit, quā, id quod fere vbiq; fatetur, causam videlicet cæcam esse, & occultā: sed à forma (vt quispiam dixerit) specifica, seu à proprietate substantiæ id prouenire: quia quemadmodū quilibet humor suā propriam habet speciem, ita etiā & putredinē, seu putredinis qualitatem propriam: & propterea propriū etiam motū ac circuitum; quam opinionem via alia confutare nequimus, nisi manifestam vnā cum Galeno inueniamus causam, hac etenim inuenta, frustra ad occultam quispiam confugiat. Sunt & qui huius causam ad stellas siue planetas quosdam referendam esse contēdunt: quæ opinio cum adeo sit (vt mea tertio opinio) à veritate aliena, impugnationem non desiderat, confugiunt enim ad communissimas causas, propriam ignorantes, qui isthæc fatentur: neque nos fallas omnium opiniones, hic refellere intendimus, sed rei veritatem inquirere, pro qua inuestiganda sit prima hypothesi, quod pituita (vt inquit Galenus eodem 2. de differentiis febr. cap. 4.) humor est frigidus & humidus in temperatura, lentus autem, crassius ac tenax in consistentia, & idcirco ægrē accenditur, ac tardē mouetur, sæpiusque in foraminibus retinetur, & longum etiam consumit tempus, dum inualefcendo peruenit ad summum, ita vt eius caliditatem cum putrescit, igni fumido in lignis viridibus accenso, non malē assimilaueris: nam quædam fumosa caliditas cum multo vapore cōmixta, exire videbitur, eō quod magis ignis in multo humore suffocetur, quā ipsum possit conuincere, vt patet primo de arte curat. ad Glau. cap. 7. opposito modo se habet flaua bilis: nam temperatura est calida & sicca substan-

tiæ tenuis, quæ nullum in se habet, nec lentorem, nec tenacitatem, qua ratione humor hic putrescens, promptius accenditur, citiusque mouetur & inualefcendo peruenit ad summum, nec foraminibus adhærens detinetur, quāpropter eius calor veluti ignis effulgens, purusque est, omnis fumosa fuliginis expers. Ipsa verò nigra bilis medio quodammodo ambigit, frigida ac sicca temperatura constans, crassa & terrea substantia, nullum tamen lentorem, nullamque tenacitatem in se continens, & propterea vbi accensus fuerit in eo calor præter naturam, paulatim succenditur, velut lapis aliquis, aut testa, aut os, aut tale aliquid huiusmodi corpus frigidum & siccum. Sit altera & secunda hypothesi, ex Galeni sententia citato loco, quod eadem pituita cum putrescit, ac calor præter naturam in ea accenditur, propter iam dictas causas eius accessio admodum producit, magis quā in cæteris febribus, quæ ex vtraque bile accenduntur, neque intermissionis tempus est adeo, vt in tertiana, syncerum, sed humoris putrefacti seruat indicium, idque propterea, quod cum frigidus, lentus, tenaxque sit humor, parua eius fiunt vacuationes in accessiōnum inclinationibus, neque integrē expurgatur, sed sæpius in foraminibus retinetur, vt diximus, ita quod cum exquisitē suam seruauerit naturam, plerisque videatur puram intermissionem habere, & nos quoque hoc idem non raro fatemur, cum nimium diligens sermo fuerit intemptius inquit Galenus, licet ad integram quietem manifeste (exceptis paucis) non perueniant, eodem Galeno teste citato libro primo de arte curatiua ad Glauconem. Si verò bilis flaua putrescat, præter naturam calor qui in ea accenditur, contrario modo se habet; etenim eius accessio breuior erit quā in aliis febribus, vbi exquisita fuerit: neque enim vltra duodecim horas æquinoctiales protelabitur, tempusque intermissionis longius ac syncerius quā in quotidiana. Nam cum humor natura sit calidus & siccus, consistentia tenuis, & cito accenditur, & quāprimum etiam ad summum peruenit vigorem, & propter ipsius humoris tenuitatem vniuersus in accessiōnibus expurgatur; & propterea ad puriorem quandam infebriationem terminare videtur, post quam accessiōnem breue aliquod putridæ caliditatis vestigium reliquere. Cum verò nigra bilis putrescit paulatim (vt dictum est) veluti lapis, aut testa succenditur. Verū vbi aliqua ex ea flamma fuerit accensa, nihil humidum aut semicombustum in accessiōne relinquit, & idcirco in hoc humore copiosiores fiunt vacuationes quā in pituita, cuius febris accessio temporis spatio est similis tertianæ: nonnunquam & longior, cum adhuc exquisita perseuerat, vt quæ ex frigidiore humore consistat, atque intermissio exquisitē pura videretur, quoniam quicquid nigræ bilis fuerit accensum, exhauritur, atque dissipatur, propterea, quod licet crassus consistentia sit, nec lentitiem, nec tenacitatem possidet, quemadmodum pituita. Quibus ita positis cum eodem Galeno fatemur, nullam aliam causam esse quod pituita quotidie, flaua bilis tertio, & nigra quarto quoque die accessiōne pariat: quæ eorundem humorū naturā: appello autē naturā eo modo quo Gal. eā definiuit 3. de temper. cum dixit: [sanē naturā cum dico, vniuersam substantiam, ac temperiem quæ ex primis elementis conflatur, significo: calido, frigido, humido & sicco.] ita vt per humorum naturam intelligā,

tum eorum consistentiam, seu substantiam, tum etiam temperaturam, quæ in calido, frigido, humido & sicco consistit. Cum verò dixerimus ex Galeni auctoritate pituitam esse frigidam & humidam temperaturam, crassam, lentam, ac tenacis consistentiam, hac ratione ægre quoque accendebatur, ac tardè movebatur, longumque consumebat tempus, donec inualescendo perveniret ad summum. Ob quas causas rationabiliter concludimus eius accessiorem citius quam decem & octo horis terminari non posse, cum egrè (ut dictum est) accendatur, tardèque moveatur, ac longum tempus consumat, dum ad vigorem perveniat, insuper cum tenax lentusve sit humor, & propterea cutis foraminibus retineatur, necessario sequitur eum non exactè expurgari in accessiorem declinationibus: quamobrem eius quod veluti succendi videtur, non parum etiam relinquit, in eisdem accessiorem declinationibus, ita ut ob id longè deterior sit eius intermissio quam in tertiana, ac secundæ accessiorem festinat inuasio eodè Galeno teste citato loco, quæ festinatio cum citius fieri nequeat una die, sequitur quòd quolibet die faciat impetum; & si dicas quòd non propterea protelari ultra unum diem eius circuitus non valet, fateamur & hoc quoque fieri non posse: nam adeò plurimæ sunt reliquæ ex prioribus accessiorem derelictæ, adeoque copiosum est id quod veluti succendi videtur, & prohibitum ob cutis stipationem ne transpiret, & propterea determinata eius intermissio, ut ultra diem unum sequens accessiorem protogari nequeat, ob quas causas Galenus eodem loco dicebat, quòd pituita singulis diebus accenditur, quamvis minus calida sit biliosa tertiana; ac si velit innuere quòd quamvis pituita minus sit opportuna ut accendatur quam bilis, citius tamen secundæ eius accessiorem festinat inuasio, quoniam non integrè expurgatur, neque parum relinquit eius quod veluti succendi videtur, eiusque intermissio propterea longè deterior est quam in tertiana, quæ omnia bilis maiori opportunitate, longè prævalent. Non igitur citius, neque tardius quam quotidie pituita accendi valet, propter iam dictas causas, & propterea quotidiani circuitus ex propria pituitæ natura, hoc est substantia ac temperie, & non aliam ob causam, proveniunt. Similiter & flava bilis, cum calida & sicca temperatura existat, tenuisque substantiæ, & propterea ad accessiorem parata, quia tamen cum accensa est, facile subinde propter subtilitatem, quicquid ex eadem efferverit, totum in accessiorem expurgatur, ac ad puriorem quandam infebriationem terminare videtur, & post accessiorem quoque breve aliquod putridæ caliditatis vestigium relinquit, propterea secundæ accessiorem non ita festinat inuasio, quemadmodum in pituita, sed tertio quoque die fatigat. etenim quantum ad eius naturam spectat, opportunus magis est humor hic, accessiorem quam pituita: quia verò uniuersus accessiorem expurgatur, exigua propterea relinquitur occasio, ut iterum succendatur reliquus humor, cum breve aliquod putridæ caliditatis vestigium relinquitur accessiorem soluta, adeo ut eius intermissionis tempus, longius, ac syncerior sit quam in quotidiana; & ob id non ut pituita ipsa circuitum pariet, sed ipsam consequitur, euincitur enim eius opportunitas quam ad accessiorem magis, ac citius quam pituita habere deberet, ab eius integra expurgatione, ob quam causam tardius accenditur, ergo quatenus ipsam præcedit pituita in accessiorem, eatenus eam insequi debet, sed pituita

singulis diebus fatigat, & ipsa igitur flava bilis tertio quoque die fatigare debet. At nigra bilis, quoniam frigida & sicca temperatura existit, terrenæ crassæque consistentiæ, difficilius quam flava bilis accenditur, quamvis in hoc humore copiosiores sint vacuationes, quam in pituita; nihilque humidum, aut semicombustum in accessiorem relinquitur, quapropter & intermissio exquisitè pura videtur, eò quòd quicquid nigre bilis fuerit accensum, exhauritur, atque dispergitur in eius accessiorem, & ob id licet cum flava bile conveniat quòd accensus humor uniuersus in accessiorem expurgetur, differt tamen ab ea & substantia seu consistentia, & temperatura, ob quæ difficilius accenditur: frigida etenim & sicca, ac crassa, consistentiæ existit; tardius itaque accendi debet quam flava bilis: & quam proportionem eadem flava bilis habet cum pituita in secundæ accessiorem generatione, eandem & hic humor cum flava bile, qui propter eius frigiditatem, ac crassitiam duntaxat ægrius quam ipsa flava bilis accenditur, & non ob aliam causam. Quare rationi consentaneum est quòd par sit tempus quò ipsa quam bilis flava tardius accenditur, cum eò, quo etiam ipsa flava bilis pituita; erit itaque propterea quarto quoque die eius circuitus, quemadmodum bilis tertio quoque die.

De quintanis, septimanis & nonanis circuitibus, longitudine & breuitate ac ordine & perturbatione ordinis ipsarum accessiorem. Caput XI.

Sed statim obiicies, cum nonnullæ sint febres quintanæ, septimanæ & nonanæ, quemadmodum ab Hippocrate scriptum est. i. de morbis vulg. sequeretur quòd nullus posset dari humor ex quo oriri possent, si ex eorundem humorum natura dicti circuitus, & non alij excitari valent. At nos (id quod Galenus fatetur eodem l. & 3. de morbis vulgaribus, & l. de different. febr. cap. 5.) asserimus quòd quemadmodum ipse, etsi ab ipsa adolescentia ad illum usque diem obseruasset nunquam septimanum, aut nonanum omnino viderat circuitum, nec clarè, nec obscurè; quintanos tamè obscuros, sed non exactè, aut aperte, ut quotidianos, tertianos, & quartanos; ita & nos, cum hucusque obseruauerimus, neque eodem circuitus inspexerimus simul cum ipso Galeno, illos fieri posse negamus, nam (ut ipse inquit) non habebis ex quibus signis, aut humoribus oriri dicas, vel quintanum, vel septimanum, vel nonanum circuitum. Hippocratis autem auctoritati simul cum eodem Galeno satisfacere poterimus, quòd videlicet illa quæ l. lib. de morbis vulgaribus, de his febribus scripta sunt, non sint eiusdem Hippoc. sed ab alio fuerunt infarcta. nam cum eodem libro & 2. & 3. eiusdem operis, multos separatim ægros adduxerit, ac temperatas integras sit prosequutus, nunquam nec quintana nec septimana quæquam ægrum laborasse scripsit, nusquam etiam de quintanis, vel septimanis, vel nonanis meminit, nò modo in præfagiis, sed nec etiam in aphorismis, quemadmodum ipse Galenus testatur. Quòd si eundem textum Hippocratis esse cõtendentes, & non alterius, adhuc eius sententiam saluare poterimus, potissimum cum libro de Typis, cap. 4 & c. 5. videatur Gale. non negare tales circuitus, cum dicebat: eadè de quintano, & septimano intelligantur, & si quis alius Typorum ordo inuenitur. Ina ut ipse inquit libello de exercitio paruz pile, c. 4. nihil pro-

prodest qualitas, vbi quãtitate labefactetur.] Et lib. 3. de simpliciū medicamentorum facul. cap. 23. de letalibus, seu de leteriis medicamentis verba faciens, tam calidis, quã frigidis, dicebat: [opus est enim vt quicquid agat, etiam si valentissimum sit, quod ali quantam tamen & magnitudinem habeat, quando mirũ & ignis ipse, si prorsus minimus sit, præterquam quod non vret, ne calfaciat quidẽ, quippe cum & centesima quidem scintilla portiuncula sensu à nobis sit imperceptibilis.] ita quoque & nos dicere poterimus quod quemadmodum letalia medicamenta præ paruitate innoxia corpus permeare valent, licet suapte natura interficiant, perinde etiam & humores ipsi, licet suapte natura iam dictos excitent circuitus, poterit hæc eorumdem natura ex quantitate labefactari, adeo vt eorum circuitus forma, seu species omnino propter exiguitatem peruertatur, quoniam nec naturam proritant, vt eos ad proprios eorumdem etiam motus excitet, nisi eo tempore quo conueniens etiam copia eorumdem fuerit cumulatã; hoc verò esse poterit quinto, septimo, vel nono die, vt non prius ob eorum exiguitatem, ob quam impeditur eorum proprius determinatus motus, sed protelatur; horum autem circuituum causa potissimum atra bilis esse poterit, Paulo teste capite 21. secundi libri. Sed iterum pugnabis, inquis, nos decreuisse quod siue multa fuerit eorum copia, siue exigua, semper tales seruabunt circuitum; ergo propter exiguitatem eorumdem circuitus ordo non peruertetur. Huic satisfacies, nos de ea exiguitate sermonem fecisse, cum qua poterit humorum natura, ac temperies seruari, ita quod aliquantam habeat magnitudinem, & non vbi prorsus minima sit eorum quantitas, adeo vt in ea propria natura seruari non possit, ita vt à nobis sit perceptibilis, quemadmodum de centesima scintilla portiuncula exemplum dabat Galenus: hæc etenim est illa exiguitas, quam asseruimus posse eorumdem proprios circuitus pervertere, ac diutius protelare, potissimum vbi nigra bilis fuerit; poterit enim eius circuitus ob iam dictam causam vsque ad quintum, septimum, vel nonum diem produci, licet simul cum Galeno censamus per quã raro illud euenire posse, & inter eos circuitus, potius quintanos quã septimanos, & nonanos contingere posse: & si signa propria non habeamus talium circuituum, satis sit nouisse eorumdem causam ex propriis eiusdem signis. Poterunt etiam casu interdum iam dicti circuitus prouenire, atque adeo simili etiam victus ratione, licet reuera circuitus dici nequeant: qui enim ægroti non prorsus sunt affectione morboſa liberati, sed semen aliquod retinuerunt, iis ad victum negligentioribus euenit, interdum sexto die à principio febricitare, sæpe septimo, non raro octauo, sæpenumero alio; & cum febris cessauerit, putantibus se prorsus esse liberatos, eodem etiam victu omnino vtentibus, ex semine morbi reliquo totidem diebus in eandem affectionem deuenientibus similiter febricitare; quod quidem sæpe potest accidere, vt & æquale sit quod affectionis est residuum, & ægroti eundem victum habeant, Galeno teste citato libro 1. de morbis vulgaribus. Cæterum cum quolibet accessio dictarum trium differentiarum februm, in eo quod magis & minus plurimam habeat differentiam, tanquam valde necessarium, ac vile differendum est, quam ob causam hoc fiat: & breuiter vnã cum Galeno asserimus citato 2. de differentiis februm, cap. 3. triplicem ob causam hoc fieri posse,

quarum vna humoribus, secunda viribus, & tertia corporis dispositioni tribuenda est. Humoribus quidem, aut propter eorum multitudinem, aut qualitatem, seu substantiam, & consistentiam; viribus quoniam aut robustas, aut imbecillas sunt, corporis dispositioni, quoniam aut rara aut densa corporis dispositio existit. Multus siquidem humor, eo qui paucus est longiorem affert accessionem, & crassius tenui. Robustas vires breuiorem, quemadmodum imbecillam longiorem. Corporis autem dispositio, rara quidem, breuiorem, densa longiorem affert. Et vbi omnes, aut plures iam dictæ causæ copulantur, breuissimam aut longissimam efficient accessionem; tantoque tempore earundem accessionum ordo seruabitur, donec in partibus quæ accessionum causa existit, similis seruatur affectus; qui quidem duplex existit Gal. auctore eodem 2. lib. de diff. feb. c. vlt. alter quidem imbecillitas partis, ex qua fiunt superfluitates, alter verò qui ex eisdem quotidie genitis oritur. Peruertitur autem earundem accessionum ordo, aut ob transmutationem humoris, aut ob victus errorem; at qui maximè transmutatur, ac in alteram naturam transit sanguis cum putrescit, cum pars vna fiat flaua bilis, alia verò nigra, vt dicemus. Accedit etiam interdum, quod qui putrescere incipit humor in aliquo membro consistat, alter vero ex aliis defluat partibus, qui, vel in ipsis solis continebatur, aut in vniuerso corpore animalis redundabat; quantum igitur in ægotantium corpore humores mutantur, tantum etiam & accessionum circuitus; sic quoque & quæcunque circa victus rationem errata ab ægotantibus fiunt, nihilominus hæc circuituum ordinem euertunt; etenim quodcunque offensionis genus efatu dignum interuenerit, vel circuitus anticipare, vel alios diuersæ naturæ à prioribus oriri est necessarium, à quibus accessionum ordo peruertitur. Animaduersione tamen dignum est quod sæpius ob circuituum complicationem, quæ à medicis ignoratur, videntur absque ordine accessiones in ægotantibus fieri: sed non ita reuera res se habet, quemadmodum videtur; nam tunc verè ordo euariatur, vt diximus, quando qui febrem faciunt humores, in alteram naturam transierint, aut in victu errare contigerit, & ob id aut diuersæ naturæ à prioribus circuitus fiunt, aut anticipant, vel cunctantur.

Causa ordinis accessionum seruati.

Causa ordinis accessionum peruersi.

Considerandum ne ordinis accessionum immutatio existimus esse quæ sit circuituum complicatio.

De febre sanguinis, & quod ipse interdum putrescat, permaneatque sub forma propria, & febris ex ea orta sit sanguinea. Caput XII.

SEed iam tempus est, vt completus fiat sermo de omnibus febribus ex humorum putredine ortis, id quod iam consulto distulimus aggredi. Est verò, Num ex sanguinis putredine aliqua febris species oriatur diuersa ab iis de quibus sermonem habuimus? Contemplatio siquidem omnibus ferè quæ de ipsis febribus differuntur, præstantior. Nam ephemeræ eo tantummodo calefacto, non autem putrescente fieri, nemo hæsitare videtur. Verum cum hac in re nonnullos videam inter sese digladiari, quod facilius veritas cuilibet pateat, ordine quodam nonnulla differenda putavi. Quorum primum est, Num sanguis ipse veluti & ceteri humores, putrescere possit? Secundum, Num si putrescat, confestim quod putrescere incipit in alterius humoris naturam vergat, vel adhuc suam propriam

Aaa 3

Com. 3. super text. 7. Causa diuersitatis accessionum triplex.

3 formam seruet? Tertium, si sanguis putrescat, febris quæ ex eo generatur, num contineatur in aliqua iam dictarum trium differentiarum, vel sit quarta differentia seorsum ab eisdem distincta? Quartum, Num hæc eadem febris, siue quartum genus sit, siue sub iam dictis tribus contineatur, febris dicatur ardens, vel non? Quintum & vltimum, Num eadem febris sit acuta, vel non acuta? Et si acuta, num acutior, vel minus acuta ea quæ ex flaua bile generatur? Quibus declaratis, quæritur veritas facile patebit. Quantum ergo ad primum attinet, simul cum Galeno 2. lib. de differ. feb. cap. 9. asserimus sanguinem ipsum necessarium quandoque putrescere, & propterea, inquit ipse, querendum quænam sit harum febrium species; idem quoque confirmari poterit eiusdem Galeni auctoritate 1. de differ. feb. cap. 4. & 9. & 11. method. med. c. 3. & cap. 4. cum dicebat quod promptissime putrescunt quæcunque corpora sunt calida & humida, atque in calidis locis permanētia, nisi dissilari, ac refrigerari contigerit, cum verò sanguis sit eiusmodi, non modo putrescere, sed etiā promptissime valet, ubi difficilem transpirationem habeat, in eoque putredo oritur ab aliena caliditate, quemadmodum in cæteris omnibus: hæc nanque apta est putrefacere, & corrumpere quemadmodum insita atque natia coequere; veluti idem Gal. Aristo. auctoritate citato lib. 2. de different. feb. scriptum reliquit; & cum putredo nedum in omnibus, aut principalioribus vasis, verum etiam in quibusdam particularibus ac determinatis partibus generari possit, eodem Galeno auctore vndecimo de method. med. cap. 4. ut sepius dictum est, simul cum eo etiam fatemur sanguinem, non modo in omnibus, aut principalioribus vasis posse putrescere, verum etiam in quibusdam particularibus, quod verò in omnibus ac potissimum maximis interim putrescat, citato li. 9. meth. med. c. 3. scriptum est; ubi de *σύνεργον* (hoc est continente febre) verba faciens, postquam declarauerat vnum genus eiusdem febris circa putredinem existens subdit hæc verba: [alterum est, ubi in omnibus vasis, & potissimum maximis æqualiter succi putrescant.] At qui per humores, ut in præcedentibus dictum est eiusdem Galeni auctoritate libro de multitudine, ca. 10. sanguinem perpetuò subintelligit Gal. ita ut nihil referat si humores, an sanguinem appelles. idem quoque confirmavit 11. eiusdem operis libr. & in fine citati lib. 2. de differ. feb. c. 1. illud luce clariùs patefecit cum dixit: [Sed quæ circuitum non habent febres, in illis nulla est corporis pars, quæ præcipuè sit offensa, sed qui in venis & arteriis omnibus continentur humores, atqui hi præsertim, qui in maximis, atque plurimo calore abundantibus sunt, aut ob aliam quamvis causam quemadmodum in ephemeris, aut ob putrefactionem feruentes febrem accendunt *σύνεργον* appellata.] Quid clariùs quod feruentibus ob putrefactionem humoribus qui in vasis omnibus continentur, hoc est sanguine ipso, continens accendatur febris: quod verò in aliqua corporis parte, particularibusque & paruis vasis, sanguis putrescere, ac interdum corrumpi consueverit, idem Galen. manifestauit citato lib. 2. de different. feb. cap. 9. inquires: Etsi & quando in aliqua corporis parte sanguis plurimus accruatus eiusdem corporis facultatem opprimit, corrumpi consuevit, ac tum præcipuè cum in paruis vasis propter crassitudinem obstruitur, aut propter multitudinem impingitur, quemadmodum inguinum tumoribus ac collectionibus, atque ut v-

niuersaliter dicatur, in inflammationibus vniuersis: nam in huiusmodi affectibus, duplicem ob causam corrumpitur sanguis, & quia scilicet non diffatur, & quia natura non conuincitur. Ex quibus manifeste iam liquet sanguinem ipsum quandoque putrescere, non modo in omnibus seu maximis & principalioribus vasis, verum etiam in quibusdam paruis, in aliqua corporis parte existentibus, patet insuper quo pacto in eisdem locis putrescat. At quod secundo loco differere proposuimus, admodum in Gal. doctrina difficile videtur, ita ut propter eius difficultatem eiusdem Galeni opinio præuē à quibusdam fuerit intellecta. Nam Auicenna libro quarto fen. tracta. 2. cap. quadragesimo tertio habet hæc verba: [opinatus est Galenus, quod non sit febris sanguinis, à putredine sanguinis; nam sanguis cum putrescit fit cholera, & non est sanguis; sit ergo tunc febris cholericæ, & non sanguineæ, & sit causon prædictus, aut tertiana, & cura eam cum illa cura.] Auerroes verò 4. collig. cap. 31. dicit: quod Galeni verba vana sunt in hac febre, quia aliquando dicit quod est cholericæ continua, & aliquando dicit quod est aliud à cholericæ, & quod non debet attribui cholericæ, nisi quia non habet putrefactionem perfectam, quia natura istius febris est media inter febrem diem, & febrem putridam.] Hæc Auerroes. Nos autem conabimur eius opinionem, ac veritatem dilucidare, qua inuenta, clara luce patebit quantum iuxta Arabum familiā præcipui viri (pace eorum dixerim) hallucinati fuerint; cum aut Galeni sententiam non perceperint, aut si perceperunt, gratis & absque vlla ratione, satyrico intellectu, & leonino, ut quispiam dixerit, dente, eundem damnare, ac dilacerare conati sint. Pro cuius veritatis inuestigatione, statuumendum est primo pro hypothese, quod cum sanguinem dicimus putrescere, non eundem exquisitè syncerum subintelligere oportet; sed eum qui vtriusque bilis & pituitæ particeps est, quippe cum exquisitus vsque adeo sanguis, in venis contineri nunquam possit, ut nihil in eo nec bilis, nec pituitæ, nec ferolæ feratur saniei, Galeni auctoritate libro de multitudine, per præuolentiam tamen seu præpotentiam sanguine appellato, quamvis mensura quadam mediocri, animalibus naturali habitu præditis, admixti alij fuerint succi, ut sepius dictum est, qui etiam proportionem quandam inter sese seruant, etenim non solum maior copia est eius substantiæ quæ sanguinea dicitur, quàm pituitæ, sed etiam maior pituitæ, quàm bilis flauæ, & maior bilis flauæ quàm nigræ; sunt verò perpetuò iam dicti humores intra vasa confusi: & ob id cum dicimus sanguinem putrescere, & sub eius forma adhuc permanere, de hoc sanguine intelligendum est, quem etiam sæpe confundere videtur Galenus cum humoribus, ita ut idem sit dicere humores redundare, aut putrescere, quod sanguinem; ut citato libro de multitudine, & aliis plerisque locis à Galeno decretum est. Sequitur ex dictis altera, & secunda hypothesis, quod talis sanguis licet ad sensum homogeneus, ac similis videatur, tamen secundum rei naturam, heterogeneus est, ac similis, plures in se continens diuersas substantias, ac humorum naturas, ut diximus, quia pituitæ, & vtriusque bilis particeps est; id verò indies cernitur etiam in sanguine, selecta vena euacuato; si pauco post tempore inspicatur, nam in diuersas ac inæquales substantias dissoluetur, licet primo intuitu similis videatur, quemad-

Sanguis
quandoque
putrescit.

Cap. præc.
Sanguis pu-
trescere po-
test in om-
nibus va-
sis, vel in
quibusdam
ex Galen.

Sanguis et
humores i-
dem.

Sanguis
aqua
secundum
omnes
partes
treficit.

Sanguis
humores
et
humores
idem.

Loco

Sanguis
humores
et
humores
idem.

Si san-
guis
putre-
scit, i-
dem
humores
et
humores
idem.

quemadmodum etiam & lac. Et proinde rationi consentaneum est, quod cum ipsum putrescere asserimus, non æqualiter secundum omnes eius partes putrescere intelligamus, cum non æqualiter eadem partes præter naturam calorem suscipiant, ac putredinem, sed una magis, altera minus; una promptius, altera ægrius, prout una, vel earum altera maiorem reperitur habere aptitudinem ad suscipiendam putredinem, & calorem præter naturam. Quinimò tantam inceptitudinem quandoque ad suscipiendam putredinem, ac præter naturam colorem, aliquam earundem substantiarum habere possibile est, quod licet commixta sit coherereque cum aliis putrescentibus, nequaquam & ipsa putrescat. Quapropter illa promptius ac magis putrescit, quæ magis obnoxia putredini existit; deinde altera quæ minus, & deinceps (ubi inualuerit putredo) altera quousque propulsetur omnes ac singulas sanguinis partes, quoad autem adeo augeatur putredo, ut vniuersus sanguis secundum singulas eius partes corrumpatur, semper in eo permanet, saltem una eius substantia, quæ videlicet minus putredini obnoxia sit, à putredine innoxia, aut saltem semiputrescens, quamuis quod eadem alteretur, ac incalescat necessum sit, cum commixta, ac confusa cum putrescente substantia intra vasa, consistat, quæ quidem sanguinis pars cessante putredine, & sedata febre, febre in omnibus vasibus, siue in aliquibus sanguis putrescat, confestim ad suam redit naturam, id verò comprobare licebit: nam genita continente febre ex sanguinis putredine ac per venæ sectionem curata (etiam si visque ad animi defectum fiat) sanguis quidam omnino in ipsis venis permanebit, qui nutriendo idoneus est, etiam si nulla alia sanguinis portio recenter fuerit genita, nullumque alimentum fuerit exhibitum; aut exiguum adeo, ut tantam sanguinis copiam, quæ pro animalis vita satis sit, gignere non valeat, hac enim victus ratione in his febribus vtendum est, id verò fieri haudquaquam posset, nisi cum tali sanguine putrescente, aliqua ipsius substantia immunis à putredine seruaretur, alterata duntaxat, ac calfacta, aut saltem semiputrescens, adeo ut sublata putredine, posset ad pristinam redire naturam, corpusque nutrire, alterata siquidem, ac vtili reddita à naturali vasorum facultate, liquet igitur quod cum sanguis putrescit, non æqualiter secundum quamlibet eius partem præter naturam calorem ac putredinem suscipit, nisi eius putredo fuerit exitiosa, aut valde magna in eo fiat corruptio, sed perpetuò aliqua eius substantia à putredine immunis, aut saltem semiputrescens, seu semimala remaneat. Cuius simile ostendimus de febre hectica; nam licet in ea solida accendantur partes, non tamen in earum qualibet, singula substantia quæ solida constituunt partes accensæ sunt, sed quædam incalescunt duntaxat, ut in principio, seu prima specie febris hectica fieri demonstrauimus. Nec quisquam dixerit quod tunc quod putresceret non diceretur sanguis, sed alius quisquam humor; nam nullum alium dicimus humorem redundare, sed veterem seruare proportionem, & propterea non quempiam eorum, sed sanguinem putrescere asserimus, magis tamen secundum vnam quam alteram eius substantiam, ob iam dictas causas: similiter, & æqualiter succos putrescere fatebimur, hoc est sanguinem. Insuper & tertio pro hypthesi habeatur, quod quemadmodum

putredo in reliquis omnibus corporibus, ac cæteris humoribus non generatur in instanti, sed in tempore, ita quoque asserendum est de sanguinis putredine, quod non in instanti, sed in tempore introducatur, est namque putredo, de qua nunc fit sermo, non substantialis, sed accidentalis forma, & propterea sicuti ea in instanti non introducit, & cum accidentalit sit, suscipit etiam magis & minus in quacunque re generetur, alioqui dicere haudquaquam valeremus hæc maior, illa minor putredo est; perpetuò tamen per putredinem intelligentes, mutationem totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelam, à calido externo, quæ etiam à Gal. quandoque exigua seu parua corruptio nuncupatur. Quapropter cum mutatio sit in alteratione, ac (ut sic dicam) in fieri consistens, aucter asserimus non solum putrescente sanguine, non æqualiter omnes eius partes putredinem suscipere, verum etiam illas quæ putredinem suscipiunt, non æqualiter putridas esse, etenim cum asserimus aliquod putrescere, quandam eius partem putrefactam, seu omnino corruptam esse fatemur, quandam verò non ita, sed semimalam seu semiputridam, quemadmodum de method. medend. cap. 8. Galenus testis est; quæ iterum pars semimala, & alterari, & concoqui, & vtilis reddi valet, id quod perpeti haudquaquam posset, si omnino putrefacta, ac corrupta foret, quod lucidissime manifestauit Galenus comment. aphor. 17. 2. libri, cum dicebat: [quod incipere quidem potest ea quæ ad vires refertur multitudo absque corruptione, verum non potest bona permanere, nam omnino necesse est ut secundum qualitatem transmutetur & processu temporis corrumpatur.] & addit: [quod enim in vinis accidit acceffentibus, tale quiddam & in sanguinis alteratione contingit: quod autem in vinis accidit, tale est, ubi ex toto acida facta sunt, non redeunt rursum ad vini naturam, paruo autem in ipsis facto momento, ita quod acidum quidem habeant saporem, nondum tamen acetum sunt, multa sæpius ex his pristinam naturam recuperarunt; hoc idem in sanguine euenit, nam & ipse ubi magna in eo facta sit corruptio, non redit amplius ad habitum naturalem, si verò pauca fiat, ubi id quod est superfluum fuerit euacuatum, quod residuum existit, ad suam naturam restituitur.] Id etiam confirmauit de singulis humoribus libro 2. de differentiis febr. cap. 5. inquit: [semper etenim suis viribus natura vtens, quicquid optimum fieri contingit, iis quæ aluntur partibus assimilare, quicquid verò alienum conatur expellere, quod si aliquando ob quampiam causam expellere non valeat, fieri non potest, qualiscunque fuerit humor, nedum alienus, ut talis permaneat, qualis erat ab initio, sed alterum omnino sequitur, ut scilicet concoquatur, atque assimiletur solidis partibus animalis, aut putrescat, & corrumpatur.] Non itaque opus est ut confestim quicquid excerni non valeat, etiam si alienum sit, nedum sanguis ipse, ut putrescat & corrumpatur, sed ubi diutius in animalis corpore perdurauerit, & concoqui, apponi, atque assimilari solidis animalis partibus nequeat. Neque etiam cum assimilari non possit, confestim corrumpitur vniuersus, sed paulatim putrescens, exiguaque prius in eo facta corruptione progressu temporis magnoperè putrescit, ac corrumpitur, ut ex iam dictis liquet. Quibus ita positis asserere non dubitabo, quod sanguis interdum putrescens

sub eius formā permanere poterit, ita ut non confestim in alterius humoris naturam transeat, potissimum ubi exigua in eo putredo, seu corruptio generetur, etenim ubi quod est superfluum, fuerit euacuatum, quod residuum existit, ad suam naturam restituitur, ut paulo ante ex Galeni auctoritate commentis aphorismi 17, secundi libri, conclusimus: si enim omnino corrumpetur, ac eius formam penitus deperderet, utique non posset iterum ad primam redire bonitatem, ut liquet citato loco. Id quoque contingit, ubi non omnes eiusdem sanguinis partes aequaliter corruptae sint; quod fieri posse paulo ante demonstrauimus, sed quaedam eiusdem sanguinis partes veluti seminales, seu semiputrescentes sint. Nam vacuato prius quod putrefactum est, possunt ab ipsa natura alterari, ac viles reddi, quemadmodum & ceteri humores semiputrescentes, seu seminales existentes. Quod verò si in omnibus corporis venis, aut maioribus & principalioribus putrescat sanguis, adhuc sanguis sit, & dicatur, decretum reliquit Galenus libro sexto de morbis vulgaribus, cum inquit: [inter omnes corporis partes, plurimas, grandissimasque venas vteri habet, cumque eos aut menses, aut à partu purgamenta suppreffa, aut phlegmone aliqua utcumque orta, male accipiunt; ipsos sanguine compleri necessum est; quo deinde putrescente si febris excitetur, inter synochorum species ipsam connumerari opus est; nam id genus febrium, ex putrido sanguine accendi ostensum est.] & secundo de differentiis febrium, circa finem, illud idem affirmavit, cum dicebat: [quod quando qui in venis & arteriis omnibus, aut praesertim in maximis, & calidioribus continentur humores, aut ob aliam quamvis causam, aut ob putrefactionem feruentes sint, febrem accendunt synochon appellatam.] hoc idem & nono, & vndecimo de methodo medendi, ab eodem scriptum est, quemadmodum in praecedentibus demonstrauimus. At quòd in quibusdam partibus, seu paruis & determinatis vasibus, idem sanguis putrescens, quandoque suam formam seruauerit, neque in alterius humoris naturam transeat, clarissimis verbis scriptum reliquit Galenus citato lib. secundo de differentiis febrium, cap. 9. inquit: [eius verò quod dicitur fidem facere potest id etiam quod in laterum inflammationibus cernitur: nam quidam in ipsis spumofum, quidam pallidum, quidam rubrum expuunt liquorem; quod nihil aliud est, quam ea humoris pars in inflammatione exuperantis quae retineri non potest, sed praetenuitate sudat exterius.] & paulo post subdit: [quando pallida sputa fuerint, bilis exuperantis sunt indicia, quemadmodum spumosa, pituita, rubra verò sanguinem indicant: quare (inquit) decens est ipsum sanguinem nonnunquam in his quae inflammationem patiuntur particulis subire putredinem, ex qua simpliciores quidem, quam ex aliis humoribus febres fiunt, similem verò accessionum proportionem assumere, qualem tertianae maxime febres ostendunt, nam ita in iis qui laterum inflammationes patiuntur obseruatum est, quo tempore maxime rubrum expuunt.] Nemo itaque in Galeni doctrina haesitare debet, quòd interdum putrescens sanguis, siue in vniuersis aut maioribus vasibus, siue in paruis & particularibus adhuc propriam in se sanguinis formam retineat, adeò ut sanguis dicatur, & sit, quamvis non optimus, sed putrescens sanguis appelletur, nullum-

Commen. 1
super text. 2

Locus supra
citatus.

que aliud sortitur nomen alterius humoris, potissimum ubi exigua fuerit eius putredo, seu corruptio, aut non omnes eius sanguinis partes eandem aequaliter susceperint, sed quaedam minus, quaedam forte nullo modo, eiusque febrem sanguineam esse, & dici, & videri videlicet hoc est continentem appellatam, si in omnibus, aut maioribus vasibus, aut eoque simpliciores fieri febres, quam ex aliis humoribus, & si vniuersis fuerit, similem accessionum proportionem assumere, qualem tertianae febres ostendunt.

Quod licet febris orta ex putrescente sanguine sit sanguinea, potest biliosa appellari, quo sit, ut non detur quartum genus febrium.

Caput. XIII.

SED confestim instabis, inquit hanc non esse Galeni sententiam, sed potius eidem aduersari, nam secundo de crisib. cap. 11. loquens de sanguine, secundum naturam se habente, impacto ac detento in aliquo loco, ac inflammationem faciente, quemadmodum in inguine, habet haec verba: [liquet autem quòd cum hic putrescere coeperit, non amplius bonus remanet, sed iam ad amarā bilis naturam transit, seu iam biliosus fit.] habet enim textus Graecus ἀλλ' ὅδ' ἡ πύρεξις οὐ γίνεται: hoc est, sed iam biliosus, seu biliosae naturae fit, non igitur putrescens sanguis, eiusdem formam seruare poterit, postquam cum putrescere coeperit, non amplius bonus remanet, sed biliosus fit. Hae Gal. sententia nonnullos transeuerfos egit, ex prauo eius intellectu, ita ut propterea quidam putarent, ut diximus, Galeni opinionem esse, quòd sanguis putrescens, confestim in amarā bilis naturam vergat, & non amplius sanguis sit, nec dici possit. Verum si quis intimius eius verba spectauerit, optimèq; perpenderit, inueniet hanc sententiam, nedum ei quam prius conclusimus aduersari, sed eandem esse cum illa. Nam fatemur nos insimul cum eodem Galeno, quòd cum putrescere coeperit sanguis, non amplius bonitatem suam, ac mediocritatem seruare, ita ut possit optimus aut bonus sanguis appellari, quemadmodum etiam verum est in ceteris humoribus, qui cum putrescere coeperint, haudquaquam optimi, vel boni sunt, sed idem sanguis cum primum putrescere incipiat, simul etiam incipit mutari, ac conuertere quodammodo in bilis naturam, ita quòd incipit biliosus fieri, quasdam bilis quantitates participas, quoniam calidior quodammodo redditur, cum à praeter naturam calore mutetur, & alteretur: at non confestim & immedie omnino conuertitur in bilis, adeò ut ipse fiat exacte bilis, ac in eandem conuertatur: sed taliter alteratus, ac transmutatus aptior redditur, ac praeparatur ad suscipiendam bilis formā, quae quidē alteratio, transmutatio, putrefactio, seu sanguinis corruptio adeò magna, ut ipse omnino corrumpatur, in instanti haudquaquam fieri potest, sed in tempore, paulatim ascensum, & per gradus quoddam acquiratur: quo stante proculdubio fieri licebit, quod donec haec alteratio, ac sanguinis putrefactio, seu corruptio exigua est, in motu, ac generatione, & (ut quispiam dixerit) in fieri, licet non amplius bonus remaneat, ut optimè inquit Galenus, & propterea bonus sanguis dici nequeat, appellari tamen poterit sanguis, sed biliosus, & non bilis: participat enim qual-

Febris
sanguinea
putrescens
in omni
buius
maioribus
venis
tineat
si in pa
quibus
contin
plurim
accipit

Locus cit.

Sanguis
putrescens
biliosus
non plus
bilis

quasdam qualitates ipsius bilis, ut dictum est: non tamen exacte in eandem conuersus est, quousque magna in eo corruptio facta fuerit, sitque in alterationis termino, & eandem bilis formam susceperit, id enim subintelligere voluit Galenus, cum dixit quod fit biliosus, & non dixit quod cum putrescere coeperit, fit bilis, & non est sanguis, ut falso eidem imponit Auicenna. Quinimo toto alterationis tempore, quo putrescit, ac corrumpitur, sanguis est, & non flaua bilis, licet biliosus, ut saepius dictum est. Neque etiam vniuersus sanguis cum putrescere coeperit, fit biliosus, licet calidior reddatur, sed duntaxat quod in eo pingue, ac tenue est. Quod demum cum magnopere exustum, putrefactum, ac corruptum fuerit, fit flaua bilis, eodem Galeno auctore citato libro secundo de crisis, & de differentiis febrium. Quatenus itaque putredine ei adueniente, sanguis ab eius natura, & bonitate recedit, eatenus ad bilis naturam accedit. Verum toto hoc tempore quo ab eius natura recedit, ac ad bilis naturam accedit, donec eiusdem bilis formam suscipiat, verum erit dicere sanguinem putrescere, eiusque formam ac naturam seruare licet non optimum, nec bonum, sed quodammodo biliosum esse. Temporis autem progressu, cum valde putrefactus, corruptus, ac exustus fuerit, tunc pars quidem eius subtilior, & pinguior omnino in flauam conuertitur bilem, quae autem crassior, in atram: quemadmodum citatis locis ab eodem Galeno scriptum est: nec amplius sanguis appellari poterit, cum iam conuersus fuerit omnino in aliorum humorum naturam, speciem, ac formam, & hoc tempore fateamur bilem esse ab eo genitam flauam seu atram, verum quemadmodum in humoribus qui carbunculi appellantur, ex sanguine crassiori supra modum effervescente, ortis, ad atrae bilis humorem eiusdem sanguinis fit transmutatio, appellatque Galenus atrae bilis humorem, licet nondum exquisitè in atrae bilis naturam transierit, sed in quodam sit confinio constitutus, ut patet citato libro secundo de differentiis febrium, ita quoque improprie quispiam, licet non verè poterit, tenuiorem, ac pinguiorem sanguinis partem, cum putrescere coeperit, licet nondum in flauae bilis naturam transierit, sed in quodam confinio sit constituta, bilem appellare. Neque nos de nominibus haudquaquam altercantes, reclamabimus, modò rei natura seruetur, quod vicelicer re ipsa sanguis sit, etiam si putrescere coeperit, & biliosus fiat: licet non amplius bonus permaneat, ut Galenus inquit, & febris quae ex eo oritur, sanguinea sit, & non biliosa, quemadmodum nescio quo pacto, parum rectè interpretatus hoc in loco Galenum, princeps Arabum Auicenna contrarium ei imposuerit, quod videlicet idem Galenus velit, cum sanguis putrescit, fit cholera, & non est sanguis, & tunc febris fit cholericæ, non sanguineæ: quod quidem vnquam ne vel somniasse visus est, quinimo contrarium sentire iam dudum demonstrauimus, & nono etiam de methodo medendi. cap. 3. non modo duplex esse febrium genus, quod ex sanguine proficiscitur, manifestè fateatur, cum dixit, atque vnum quidem hoc, siue genus, siue speciem, seu quiduis aliud appellare libeat *συνόχων*, id est, continentium febrium est, quodque ex eadem cum diariis natura constat, alterum est ubi in omnibus vasis, ac potissimum maximis, æquabiliter succi putrescunt.] Verum etiam ambo dicta duo conti-

nentium febrium genera se curasse testatur, vnum in adolescente libero, & palestræ perito, alterum in seruo adhuc exercitato, liber quidem, ut ipse inquit, continenti citra putredinem febre laborauit, seruus verò continenti cum putredine. Qui etiam locus, si optimè fuisset ab Auerroë interpretatus, ac perpenus, non utique sic temerè asseruisset, quod verba Galeni varia sunt de hac febre, non enim (ut palam ex eius verbis liquet) percepit hoc duplex genus febrium *συνόχων*, id est, continentium dictarum, à Galeno fuisse positum, quorum vnum est citra putredinem, & bene (ut idem Auerroës inquit) mediam habens naturam inter febrem diei, hoc est diariam, & febrem ex putredine ortam: exoritur enim velut tertia quædam formula in transitu diariarum febrium, & neutri extremitatum est idem, ut citato libro nono de methodo medendi scriptum est, de qua febre non quæritur num biliosa sit, cum in hoc febrium genere sanguis haudquaquam putrescat. Alterum verò cum putredine existit, quemadmodum eodem loco scriptum est, & aliis plerisque, & hoc est illud quod cum perfectam non habeat putrefactionem, hoc est (ut nos declarauimus) magnam, & in termino, adhuc sanguinea, & non biliosa febris nuncupatur, licet idem sanguis quodammodo biliosus fiat, & quandam putredinem, licet exiguam suscipiat. Verum ne sic libenter tanti viri condemnentur, excusandos esse puto, quod deprauatos habuerint Galen. codices, & propterea parum rectè eum hac in re fuisse interpretatos, quicquid autem sit, satis fore putavi me propriam Galeni in hac sententiam demonstrasse. Et ne quis eum impugnare putet, inquit, quod ubi hoc verum esset, daretur quartum genus febrium ex putredine ortarum, cuius contrarium ipse semper sentire videtur, præsertim secundo de crisis. cap. 9. & de differentiis feb. cap. 2. inquit, tria tantum esse prima simplicium febrium ex putredine ortarum genera: tertianam videlicet, quartanam, & quotidianam, quarum vna ex amara bile, altera ex atra, & tertia ex pituita generatur, ad diluendam hanc dubitationem accedam. Porro si quis rectè percepit ea quæ de sanguinis putredine retulimus, haud ægrè eam e medio tollet: etenim cum is putrescere coeperit, suam bonitatem amittit, ac continuè ad flauae bilis naturam accedit, sitque biliosus, quanquam non propterea secundum rei naturam non sit sanguis, sed quia à principio quo putrescere incipit ad finem usque, quo bilis formam recipit, eo magnopere putrefacto, ac corrupto, semper alteratur, ac transmutatur in bilis qualitatem, præparaturque ad eius formam suscipiendam, tanquam ad finem: propterea quæ hoc tempore medio, ex eo febris accenditur, licet secundum rei naturam sanguinea sit, quoniam ex sanguine oritur, quia tamen non bonus existit, sed biliosus, & continuè magis biliosus fit, à sua natura recedens, accedensque ad eam quæ bilis est, ob id febris hæc poterit quodammodo dici, & appellari biliosa, licet sanguis non omnino conuersus sit in bilem, sed proximus sit ut eius formam suscipiat: admittit enim denominationem à fine, seu à termino ad quem, tanquam à suscipienda forma, ac acquirenda, cui proximus iam sanguis est: & hac ratione dici poterit, licet improprie, quodammodo febris biliosa, & reduci ad vnum iam dictorum trium generum febrium ex putredine ortarum, & ita quar-

Loco citato
Febrium con-
tinens cum
putredine,
est ex san-
guine pu-
trescente,
& sangui-
nea, non bi-
liosa.

Respondet
obiectioni.
Si febris sit
sanguinea,
est quartum
genus fe-
brium ex
putredine
ortarum.

tum genus non dabitur, nam licet pars illa pinguis, ac tenuis, quæ in sanguine est, fiat flaua bilis, eo putrefacto, ac corrupto, vniuersum tamen sanguis cum putrescere cœperit, calidior redditur à calore præter naturam, & propterea biliosum reddi quispiam eum dixerit: sanguis enim ex moderato calore generatur, flaua autem bilis ex maiore, atra verò, ex sufficienter immodico, inquit Galenus, & id est quod voluit asserere lib. secundo de crisib. cap. 12. cum dixit: [argue in hoc illud seruatur, triplex esse genus vniuersum simplicium febrium, quæ enim ex sanguinis putredine fit, iam quodammodo biliosa est.] dixit enim: [ἡ δὲ πρὸς χολῆς καὶ ἐν-ν,] hoc est, iam quodammodo, seu quoquo pacto biliosa est, quasi velit quod non omnino sit biliosa, sed potest ita quodammodo appellari, propterea quod cum sanguis putrescere cœperit, non amplius bonus remanet, sed biliosus fit, qua ratione saluari poterit triplex esse genus vniuersum simplicium febrium ex putredine ortarum, verum cum idem sanguis immodicè exustus, seu putrefactus fuerit, tunc verè & propriè quod in eo pingue ac tenue est, fit flaua bilis: crassum verò ac veluti sæx, atra: & proinde verè vna, vel altera febrium species generabitur, & pro varietate humorum, in quos conuersus fuerit sanguis, febres fient, sola bonitate vel malitia differentes: siquidem illæ quæ sanguinis transmutationem consequuntur, simpliciores sunt, tum in reliquis, tum in caliditatis qualitate mitiori, vt liquet secundo de differentiis febrium. Generatur itaque ex putrescente sanguine, donec exigua in eo putredo fiat, reuera sanguinea febris, cum sanguis adhuc sit eius causæ, appellari tamen quodammodo potest, licet impropriè, & non verè biliosa, propter eas quas nuper tradidimus causas, quoniam ad illud genus reducitur, & ita non dabitur quartum genus febrium, sed seruari poterit triplex in vniuersum existere, quemadmodum citato libro secundo de crisib. à Galeno decretum est, etenim & illæ quoque febres quæ fiunt eodem immodicè exusto, ac putrefacto, bonitate etiam differunt à reliquis similibus, quæ ab aliis excitantur humoribus, non ex sanguine genitis, ita quod non vndeque eadem esse videantur.

Cap. citato

Loco supra citato.

Quod febres ex putrescente sanguine ortæ, non sint de genere ardentium. Caput XLIII.



VARTVM quod de febre sanguinis absoluendum proposuimus, erat, num sanguine putrescente, quæ ex eo oritur febris, sit de genere ardentium, seu deurentium, ita vt possit appellari *ἄδυσος*, hoc est febris ardens, subintelligimus autem per sanguinem putrescentem, quando idem breuem quandam & exiguam susceperit putredinem, seu corruptionem, priusquam omnino putrescat ac corrumpatur, hoc est toto eo tempore quo ipse alteratur, mutatur, ac putrescit: diximus enim toto eo tempore febrem esse sanguineam, quamuis biliosa quodammodo appellari possit, impropriè tamen. Huic facilis est responsio, si in memoriam reuocentur quæ à nobis explicata sunt de *ἄδυσος*, seu febre ardente. Conclufimus enim cum Galeno exquisitam febrem ardentem ex flaua bile intra vasa putrescere accendi: quam duo necessariò comitatur, exurens scilicet caliditas, & incompe- cibilis sitis. Quibus ita positis, absque controuersia

asserimus, febrem ortam ex putrescente sanguine, donec is suam seruauerit formam, & exiguam susceperit putredinem, non esse, neque dici posse *ἄδυσος*, id est, febrem ardentem, etenim toto hoc tempore, neque sanguis ipse putrescens bilis est, vt declarauimus, neque etiam hanc febrem illa duo necessariò comitantur, quod facile patere poterit inspecta ipsius sanguinis natura. Sed aduersus hæc statim inuehūt quidam, asserentes quod febris hæc de genere est deurentium, Gal. auctoritate secundo de crisib. cap. 6. cum dicebat: [continuum quidem nomino febrem, quæ ad infabricitationem antequam ex toto soluiatur non definit, etsi declinatio aliqua sensibilis appareat: cum autem neque declinatio aliqua sensibilis fiat, semper verò à primo principio febris vsque ad crifim similis, perseverauerit, erit & hæc ex genere deurentium. [sed febris hæc (inquiunt isti) quæ à principio ad finem vsque vnam habet accessionem *συνεχὴς*, à iunioribus appellata, oritur ex sanguinis putredine, ergo erit ex genere ardentium atque deurentium. Sed pace eorum dixerim: peruertunt enim hoc in loco Galeni sententiam, cum non de continente, quæ ex putrescente sanguine accenditur febre, hic sermone faciat, sed de ea quæ ex bile oritur, quemadmodum paulo ante à nobis explicatum est: id verò confirmant verba eiusdem Galeni quæ subsequuntur: ait enim: [sed neque in primo die, neque in secundo est huiusmodi febrem prænoscere, neque aliter utile: sufficit enim genus agnoscere, quod scilicet biliosa sit, deurens, & peracuta: neque etiam si synochum ipsam nominaueris, vt quidam medici faciūt, appellationis ratione à febribus deurentibus differt.] cum itaque Galenus paulo ante determinasset exquisitam febrem ardentem esse, ac fieri quando flaua bilis intra vasa putresceret, hoc in loco voluit docere, quod eadem bilis quandoque in particularibus, & exiguis vasis putrescat, & tunc febris continua nomine generis appellabatur, plures accessiones vsque ad eius solutionem habens: quandoque in omnibus, aut saltem maximis, & principalioribus, & tunc synochos à iunioribus medicis nuncupabatur, vnicam habens à principio ad finem vsque accessionem. Et comparans has duas febres ex bile ortas inter sese, de hac secunda differentia dicebat, quod satis erat genus agnoscere, quod scilicet biliosa sit, atque deurens, erit itaque propterea ex deurentium genere febris hæc, quoniam ex putrescente bile, & non sanguine ortum habet, vt liquidò ex Galeni verbis constat, quinimò & tanto ardentior est febris hæc ea, quæ plures habet accessiones, quanto bilis in pluribus, ac maioribus vasis putrescit. De bilioso ergo synochos, & non sanguineo, hoc in loco Galenus loquitur: neque de febre ex putrescente sanguine adhuc verba fecerat, sed post nonnulla, ferè circa finem eiusdem libri, cap. 12. priusquam de ephemericis febribus loqueretur, de hac febre meminuit, suamque de ea propalauit sententiam, quemadmodum præcedenti capite fusiùs differuimus. Tendant secundò probare, hanc eandem febrem ex genere deurentium esse, in medium afferentes Galeni auctoritatem, nono de meth. med. cap. 4. quo loco verba faciens de ambabus synochis ortis ex ipso sanguine dicebat febrem hanc esse magnam, imò maximam, & facta collatione eius quæ cum putredine existit, cum ea quæ citra putredinem est, dicebat, eam putredinis notas, tum in lotio, tum in pulsu, tum in grata caloris qualitate manifestare. Atqui non

Quam-
vis san-
nea sit
nima, &
propterea
non arde-

Febris a
dentis q
est.

Qualitas
caloris
nimium
synochi
non feb-
liscens.

Tertia o-
culio, qu-
monipili-
um.

Laco 1

Altera
obiectio

Quamuis se non negamus nos febrem hanc magnam esse, imò & maximam: semper enim febrilis caloris multitudo, in multitudine defluxus consistit, inquit Galenus secundo de diff. febr. cap. 9. porro multum defluit in hac febre ex putrescente sanguine orta, cum sanguis natura sit calidus & humidus, & propterea propensus ut exhalet, ac digeratur in halitum eius substantia, potissimum ubi putrescens supra modum incaluerit, & id circo plurima manui tangenti se offert in hac febre caliditas: est tamen omnino mitis, sicut ea quæ in balneo contrahitur, ut ait idem Galenus, etiam si supra modum exultus fuerit, & in aliorum humorum naturam conuersus: ideòq; ardēs febris dici nequit, non enim consistit in caloris febrilis multitudine, neque in multitudine defluxus ipsa febris ardens, sed in eius caloris mordacitate, molestia, ac acrimonia: quamobrem exurentem, & non multum calorem, dicebat esse febris ardentis signum pathognomonicum, qui quidē ex humoris acredine provenit, & tangenti manui molestus sentitur: hocque tibi sit maximum humoris febrem facientis indicium, eodem Galeno teste citato loco: qualitas videlicet caliditatis, nam quæ magis vaporosa, ac minus molesta existit, ex sanguine nascitur: quæ vero molestæ sunt, & erodentes, atque mordaces, utrâque bile consequuntur. Quare non propterea quod febrem hanc magnam, seu maximam appellauerit Galenus, ardens, seu deuens febris dicenda erit, quæ non multam caliditatem requirit, sed eam exurentem, mordacem, atq; molestam. Et cum inquirunt, quodd in synocha ex putrescente sanguine orta sentitur caloris ingrata qualitas, admittimus nos quodammodo eius qualitatem ingratam sentiri, idque ratione putredinis ac febris. Verum collatione facta ad reliquas febres, cum Galeno fatemur mitiorem esse hanc caliditatis qualitatem, hoc est minus mordacem, minusq; insuauem quam ea quæ ex utraq; bile provenit saltem, & propterea dici non potest exurens, similiter est dicendū si huius caloris qualitas comparatur ei quæ provenit ex continente absque putredine, cuius relatione eodem nono de method. meden. dicebat, huius febris ingratam esse caloris qualitatem, verum non simpliciter talem esse. Quodd si dixerint Gale. secundo de different. febr. cap. 9. de febre sanguinis verba facere, quæ generatur eodem putrescente in quibusdam determinatis partibus, & non de ea quæ oritur cum putrescit in omnibus, aut maximis, & principalioribus vasis: nam in hac febre caloris qualitas mordax est atque insuavis. Dicam & ego satis admodum in hisce verbis ostendere sese pertinere esse, cum Galenus citato libro secundo de different. febr. dicat: [semper enim febrilis caloris multitudo, in multitudine defluxus consistit, quod verò manui tangenti molestum sentitur, ex humoris acredine provenit.] Non igitur ex diverso loco, sed ex humoris diuersitate, inquit Galenus, semper caloris qualitatem similem percipi à manu tangente, & propterea hoc tibi dicebat esse maximum humoris febrem facientis indicium, qualitatem videlicet caliditatis: nam quæ magis vaporosa, ac minus molesta existit, ex sanguine nascitur semper, & non quandoque ut isti putant. Adhæc quæ vnquam poterit diuersitatis causa reddi, si in quibus vnquam poterit diuersitatis causa reddi, si in omnibus, seu maximis vasis, aut exiguis & particularibus sanguis putrescat? nonne sanguis est vtroque? nonne æqualiter erit id quod defluit vapo-

rum, minusq; molestum, potissimum ubi æqualiter vtroque putrescat, an forte ex loci diuersitate mutabitur eius natura? Quæ de re licet febris ex putrescente sanguine orta, magna, seu etiam maxima dici possit, nunquam autem exurens, seu ardēs proprie appellabitur, ut ex iam dictis liquet, cum in alio febrilis caloris multitudo consistat, & in alio eius acredo, seu mordacitas, cuius relatione febris ardens dicitur. Adhuc febrem continentem ex putrescente sanguine ortam, nedum ardentem, sed ardentissimam esse Hippocratis, & Galeni auctoritate aphoriz. 23. primi libri, probare conantur, inquit et enim Hippocrates: [atq; ubi vsque ad animi defectionem expedit ducere, faciendum, si æger tolerare possit.] & Galenus in horum verborum expositione dicebat: [ea igitur animi defectio quæ sit ratione euacuationis, nunc ab Hippocrate dicta est mensura euacuationis, & in maximis inflammationibus, & in ardentissimis febribus, & in vehementissimis doloribus.] & post pauca inquit: [nos sæpius huiusmodi euacuationes prodesse plurimū experientia didicimus: nam & in ardentissimis febribus, si vsq; ad animi defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur, & febris extinguitur, & plurimis etiam alius citatur, & sudores emanant, & quidā eorum ex iis sanitati sunt prorsus restituti, alij adiuti plurimum, vehementiam ægritudinis absciderunt.] Atqui inquit hi viri, hæc sanguinis missionem vsque ad animi defectionem nullibi Galenum præcepisse, præterquam nono de meth. med. pro curatione febrium synochon dictarum, hoc est continentium, quæ fiunt ex ipso sanguine tum putrescente, tum etiam non putrescente, cum igitur has febres ardentissimas, hoc in loco nūcupauerit Galenus sequitur quodd nedum ardentēs, sed ardentissimæ etiam sint. Sed si verum dicere fas est (parcant mihi) parum recte videntur hoc in loco Galeni verba exponere, licet de synochis verificentur, de quibus sermonem habuit citato libr. nono de meth. med. Nam licet in primis Galeni verbis Græcus codex habeat *πυρετὸν διαναστῶν*, à verbo *διαναστω*, quod Latine inflammo, ardeo, seu inflammationem infero, significat, non propterea interpretari debent eius verba in febribus ardentissimis ducti à vocis significatione, sed potius inflammationem inferentibus, utpote quæ calidissimæ sunt. Id verò idem Galenus confirmare videtur citato loco. Nam cum dicebat se didicisse experientia, plurimum prodesse huiusmodi euacuationes in eiusmodi febribus, non amplius vsus est voce *διαναστῶν*, sed dicebat *θερμοτάτους πυρετὸς*, hoc est calidissimis febribus, à verbo *θερμαίνω*, quod Latine significat calfactio, ita ut calidissimas appellauerit eas febres, in quibus tali vsus est veng sectione, etiam eodem nono de meth. meden. & non ardentissimas. Quodd verò calidissimæ sint febres quæ ex putrescente sanguine oriuntur, & non ardentissimæ dici debeant, idemque voluerit intelligere per vocem *διαναστῶν*, quodd *θερμοτάτους*, nedum hoc in loco manifestè ostendit, verum etiam citato libro secundo de different. febr. illud luce clariùs demonstrauit Galenus, cum dicebat, febrilis caloris copiam, seu multitudinem semper positam esse in ipsa effluuij copia, quapropter si vaporosa sit, ac minus molesta, ex sanguine nascitur, cum etsi plurima manui tangenti se offerat, est tamen omnino mitis, ut paulò ante dictum est. Itaque nō nega-

Quarta obiectio, quæ diluitur ex plicatione verborum Gale. per am intellectum.

Cap. citato In commentario apho. 23. lib. 1. pro febribus ardentissimis, recte calidissimas.

Cap. citato

mus continentes febres ex putrescente sanguine ortas, esse magnas & calidissimas, cum semper in eis tangenti manui se offerat febrilis caloris copia, seu multitudo, magis quam in ceteris febribus, ob eam quam nuper diximus causam, verum non propterea ardentissima aut ardens dici debet, de cuius ratione est, quod non multus sentiat calor, sed exurēs, acris, ac mordax, quemadmodum prius à nobis demonstratum est. Non igitur *αυροί*, hoc est febris ardens exquiritur & propriè quæ ex sanguinis putredine accenditur febris, etiam si continens sit, dici poterit, si quis autem velit eam improprie sic appellare, quemadmodum etiam non verè, & propriè biliosa dici potest, propterea quod proximus est putrescens sanguis, ut in bilem conuertatur, ita etiam quoniam proxima est ut febris ex eo orta in ardentem transmutetur, modò rei veritas seruetur, quod videlicet verè & propriè ardens, neque sit, neque dici possit: ne videamur de nominibus litigare, non reclamabimus. Quinimò ipse Hippocrates etiam febres has continentes ab ardentibus se iunxit aphor. 21. tertij libri, cum dicebat: [aestate autem nonnulli horum & febres continuas, & arduas, & tertianas &c.] quo in loco liquidò constat febres continuas ab ardentibus separasse, intelligens per continuas febres, non alias quidem quam has continentes, quæ ex sanguine nascuntur, licet vltus sit voce *συνεχες*, quæ Latine continuas interpretatur: nam nunquam vel Hippocrates, vel ex antiquis aliis continuam febrem appellavit *συνεχες*. Galeno teste, in fine secundi libri de natura humana quare alias non potuit per continuas subintelligere febres, quam continentes ex sanguine, quas generari aestate, potissimum circa eius initia consuevit, quemadmodum & arduas, & tertianas.

Quod febres quæ ex sanguinis putredine generantur sunt de genere acutorum morborum. Cap. XV.

A T S I ardens non sit febris ex putrescente sanguine orta, non ab re quaereret quispiam, num saltem possit dici acuta? & si acuta, num acutior vel minus acuta ipsa febre ardente, quæ ex putrescente bile oritur? Hanc responsionem dabimus insimul cum Galeno lib. tertio de crisib. cap. 4. q. cum in omnibus morbis per acutus, ut ipse inquit, necessarium sit febres, vel synochos esse, vel continuas quidem, sed quæ per tertium exacerbantur, sequitur synochos ex putrescente sanguine ortas non solum ex acutorum morborum genere esse, sed per acutorum. Nec quispiam interpretari poterit per synochos, eas duntaxat febres, quæ ex putrescente bile vnà cum sanguine in vniuersis aut principalioribus vasis fiunt, cum indifferenter, ac vniuersaliter dixerit Galenus vel synochos esse, subdēs demum: [synochi quidem raro eueniunt.] Id quod etiam confirmare videtur tertio de dieb. decretorijs, cap. 8. cum dicebat, [quæ igitur causa sit ob quam in acutis morbis tertio quoque die plurimum accessiones fiunt.] & non dixit semper, quasi velit innuere, quod synocha febres, licet ex genere acutorum morborum sint, raro eueniant. Id etiam confirmari poterit ex eiusdem Galeni verbis citato libro tertio de crisibus, cum dicebat: [nam si febris synochus fuerit, ac nullus error acciderit (nam semper eiusmodi oportet meminisse) in quarto die sperandum est crisin futuram.] cum ergo citò terminetur, quo-

niam non vltra quartum diem, ut ipse inquit & eius solutio per crisin fiat, quæ fieri nequit, nisi in morbis magnis, & qui celeriter mouentur, sequitur necessarìò q. acuta sit febris: hos etenim morbos appellauit acutos Gal. secundo de dieb. decretorijs, & sexto de morbis vulgaribus, cap. 12. qui videlicet celeriter mouentur, interim quoq. magnitudinem adiciit, ut liquet commento aphor. 19. & 23. secundi libri, ut quæ motus celeritatem adiuvat, eodem auctore, tertio de crisibus. Quod verò celeriter moueatur, facillè patere poterit, quoniam cum putrescere cœperit sanguis, iam biliosus sit, cuius natura est celeriter moueri. Est itaq. continens febris ex putrescente sanguine genita, de genere acutorum morborum, & acutarum febrium ob iam dictas causas, similiter etiam si continua fuerit plures habens accessiones, erit adhuc acuta: quoniam similem accessionum proportionem assumit, qualem tertianæ febrium, scriptum est, licet eis simplicior sit, cum ergo per tertium exacerbetur, erit & hæc etiam febris acuta, ut ex iam dictis patet. Num verò acutior sit, vel minus acuta febre ex bile orta, non ita facillè dissere licet. Nam sunt qui opinantur hanc febrem ex putrescente sanguine accensam, biliosa acutior esse. Nos verò oppositum cum Galeno tenemus, propterea nostram statuemus prius opinionem, & deinceps rationes eorum qui contrarium sentiunt, diluemus. Fatemur enim *συνεχες*, hoc est continentes febres, ex putrescente sanguine genitas, minus esse acutas, quam continentes ex bile ortas, & continuas quæ plures accessiones habent, etiam minus acutas esse, eis continuis febribus quæ ex putrescente bile, in determinatis ac exiguis vasis excitantur, bi ac propterea plures etiam accessiones habent. Nam si esse acutum in motus celeritate consistat, ut iam dudum Galeni auctoritate explicauimus, nemini venit in dubium quod cum calidior sit, ac tenuior bilis flaua ipso sanguine, quod celerius ac citius mouebitur, ad crisin quam sanguis ipse. At si velis acutum morbum non solum consistere in motus celeritate, sed in symptomatum magnitudine, adhuc liquidò constar, quod maiora, & seuiora symptomata ex putrescente bile, quam sanguine hant, id quod decretum reliquit Galenus secundo de differentiis febrium, cum dicebat, febres ex putrescente sanguine ortas mitiores, seu simpliciores esse quam reliquas ex alijs humoribus ortas; & si tales humores ex eodem sanguine geniti sint, adhuc febres mitiores esse, tum in reliquis omnibus, tum in caloris qualitate, etiam si immodicè exultus, in bilem conuersus fuerit: quoniam ex tali bile adhuc mitior generatur febris, quam ex alia bile non genita ex putrescente sanguine, & ait tum in reliquis omnibus simplicior, seu mitior esse, hoc est, reliquis symptomatis. Cōcludimus itaque ex dictis vnà cum Galeno continuas febres, quæ ex putrescente flaua bile intra vasa accenduntur, tam si vnā habeant à principio ad finem vsque accessionem, quam si plures, acutiores esse quam continuas ex putrescente sanguine genitas, spectata ipsa acutie, tam relatione facta ad motus celeritatem, quam ad symptomatum magnitudinem, modò semper in ceteris paritas seruetur. Quod verò falsa sit hæc nostra opinio probare tentant quidam, primò Galeni auctoritate, secundo de crisibus, cum dicebat: *συνεχες*, hoc est continens febrem esse nedum acu-

acutam, sed peracutam, eisque ex genere febrium deurentium, ab eisdemque acutiē differre, quoniam magis acuta existit. Huic obiectioni si quis memoria teneat, quæ paulo ante à nobis dicta sunt, facile respondebit: diximus etenim eo in loco Galenum haudquaquam de syncho, quæ ex sanguine putrescente ortum ducit, verba facere, sed de ea febre continente, seu syncho quæ ex bile generationem habet, etenim idem Gal. dicebat: I sufficit enim genus agnoscere, quod scilicet biliosa sit, atque deurens, & peracuta. I quam etiam prius dixerat esse ex genere febrium deurentium, & ab eisdem acutiē differre, hoc est, quod magis acuta est febris continens orta ex bile, quam continua plures habes accessiones, quoniam in maioribus, ac principalioribus vasis, cordique proximioribus putrescit. Inueniunt secundò, Gal. auctoritate freti tertio de crisisib. cap. 4. cum dicebat *συνόχης*, id est continentes febres, licet rarò eueniant (vbi nullus sit error) in quarta die per crism finiri, quæ ratione idem asserbat rarò accidere, vt in quarta die fiat crisis, ita vt bis tantum Archigenes toto tempore vitæ suæ id obseruasset. Ipse verò vsque ad eadem horam semel solum, sed quæ tertio die exacerbantur (inquiunt isti) ex bile originem ducentes, perquam rarissimè in tertia aut quarta die iudicantur, sæpius verò in quinta, septima, & vltra. quæ propter asserendū erit acutiores esse continentes febres ex putrescente sanguine ortas, quam continuas plures accessiones habentes ex bile genitas. Atqui nos fatemur primò quod quicunque morbi ex bile fiunt, in cæteris paritate seruata, potissimum ea intra vasa putrescente, sunt acutiores, & celeriori motu mouentur, quam qui ex putrescente sanguine. dicebat enim Galenus citato libro tertio de crisisibus, [adiuuat motus celeritatem morbi magnitudo, & anni tempus, & regio, & ætas, & quæcunque alia amaræ bili conueniunt. I & cum aiunt per crism finiri synochum in quarta die, fatemur nos Galenum de omni syncho subintelligere voluisse, tam ex sanguine, quam ex bile: & facta inter has febres collatione, adhuc dicimus quod si ex bile fiat febris continens citius per crism finiet quam si ex sanguine, cum & ipsa bilis velocior sit motus, vt probauimus; ac maiora, sæuioræque symptomata inferat. continuæ verò febres ex bile putrescente in particularibus ac paruis vasis plures accessiones habentes, quamuis sæpius post quartum iudicentur, & rarò ante, nō propterea dici debent minùs acutæ, cum & celeriori motu etiam moueantur, & magnitudinem habeant magis quam ipsæ etiam continuæ, quæ plures accessiones habent genitæ ex sanguine putrescente similiter in particularibus & exiguis vasis. sunt etenim hæ simplicioresemp, quam aliæ quæ ex aliis humoribus fiunt febres, vt sæpius dictum est, & propterea minus acutæ, cum neque ita celeriori motu moueatur sanguis, quemadmodum flaua bilis, neque adeò magna, sæuiæque symptomata pariat, modo æqualiter putrescant, qua ratione licet continentes febres ex sanguine citius iudicentur, quam quædam febres biliosæ continuæ quæ per tertium exacerbantur, non propterea sequitur eas esse simplicioresemp acutiores; nam facta inter eas relatione, celerior semper erit motus ipsius bilis, quam sanguinis, & maior ac acutior erit quæ ex bile, quam quæ ex sanguine putrescente accenditur febris, dummodo

semper seruetur in cæteris paritas, id est continens continenti, & continua continuæ comparetur, vtriūque humores pariter putrescant: quamuis etiam adducter cum Galeno celsatius, aliquam febrem quæ per tertium exacerbatur ex putrescente bile ortam, acutiorem esse aliqua continente ex putrescente sanguine genita, vt ea in quæ tertio die crisis fit, licet eius motus non adeò continuus sit, & æqualis, id quod etiam manifestauit Galenus citato libro tertio de crisisib. cap. 4. cum dicebat, quod quamuis oportet crism in idem tempus incidere cum accessione, & propterea rarò accidat vt in quarta die fiat crisis, cōtingit tamen in ipsis synochis febribus, natura à propriis circuitibus ad crism perueniente, quasi ex seipsa excutientis quod molestum est, non irritata ex ipsis accessioneibus, neque à velocitate motus, ac symptomatum magnitudine, ita vt propterea citius moueatur ad crism, sed sponte fere ad crism peruenit, vt exoneretur ab eo quod velut onus molestum existit; citius ergo iudicatur propterea continens febris ex putrescente sanguine genita, quam continua plures accessiones habens, ex putrescente bile orta, quandoque non propter eius motus celeritatem, aut symptomatum magnitudinem, sed ipsa natura à propriis circuitibus ad crism perueniente. sunt etenim acutiores, vt diximus, morbi qui ex bilioso humore fiunt, quam qui ex sanguine ac reliquis humoribus. Quod etiam ostēdit Galenus commento aphorismi septimi, tertij libr. cum dicebat: [siccatas verò pauciores quidem humores efficit, sed qualitate biliosiores, & ob hanc causam febres numero quidem sunt pauciores quam in temporibus pluuiosis, sed acutiores. Cum ergo continuæ hæ febres quæ per tertium exacerbantur ex bile genitæ, in accessioneibus crism habeant, possunt in tertia die finiri, vt eodem tertio de crisisibus, liquet, & ita acutiores erunt quam continentes ex putrescente sanguine accense, quæ in quarta finiuntur, id quod prouenit non propter aliud, quam propter accessioneis magnitudinem, ac motus celeritatem maiorem quam habent ipsis synochis ex sanguine genitis. Cum verò inquiunt, propterea acutiores esse febres ex putrescente sanguine ortas, quia Hippocrates primo de ratione vict. dicebat, quod harum vi complures pereant, asserimus Hipp. citato loco tex. 8. connumerasse morbos, quos prius acutos nominatim perstrinxerunt, quemadmodum est pleuritis, peripneumonia, phrenitis, lethargus, caulus, & quicunq; alij hos consequuntur morbi; & propterea per febres continuas, non continentes ex sanguine putrescente ortas duntaxat subintellexit, sed quæ ex aliis humoribus, diuersisque inflammationibus fiunt, quapropter & peripneumonia; & lethargi, & cauli, hoc est ardentis febris meminit, & deinceps dixit: [& quicunque alij hos consequuntur morbi, quorum febres prorsus cōtinuæ interficiunt. Iac si velit innuere omnes febres continuas, præsertim ex inflammatione viscerum ortas, ex quouis humore generationem habeant, acutas esse, ac vt plurimum interficere, etiamsi ex humore frigidus generentur, vt lethargus. Nec etiam nostræ opinioni pugnat Galeni auctoritas libro de curandi ratione per venæ sectionem, cum inquit: [ceterum vbi feruescentis inest sanguinis plenitudo acutissimam accendens febrem.] Nam ex sanguinis plenitudine febrem acutissimam fieri

Bbb

2. Obiectio
que dilui-
tur explica-
tione senten-
tiæ Galeni.

Cap. præ-
m.

Cap. præ-

3. Obiectio
qua solui-
tur decla-
rata senten-
tiæ Hippo-
cratis.

4. Obie-
ctioni re-
solvitur sen-
tentia Gal.
declarando
cap. 12.

non negamus, cum de numero peracutorum morborum sit (vt prius dictum est.) at quæ ex bile excitantur non propterea eisdem acutiores esse non fatemur, quinimò has perpetuò eisdem acutores magis esse affirmamus (iis quæ retulimus seruatis) quauis citato loco etiam Galenus de plenitudine seruicentis sanguinis, qui quodammodo biliosus est, ad biliosamque accedit naturam, & non de putrescente, seu redundante solo sanguine verba fecerit. Reliquas quas in medium afferunt rationes, consultò prætermisimus, cum & parui momenti sint adeò, vt quiuis vel parum in medicina exercitatus, facile eas diluere valeat, tum etiam quòd de putrescente omnino sanguine, ac corrupto extra vasa, supràque modum exulto potissimum concludant, & non de eo qui modicè putrescit, ac corrumpitur intra vasa, adhuc eius formam seruante; de quo noster est sermo, vt sæpius dictum est. Qua de re cum eodem Galeno proculdubio tenemus, continentem febrem ex putrescente sanguine accensam, minùs acutam esse, quàm ea quæ ex putrescente bile oritur, similiter & continuam febrem quæ plures accessiones habet ex eodem sanguine ortam, minùs acutam esse quàm continuam, ex bile quæ per tertium exacerbatur. Quinimò & quasdam istarum febrium plures accessiones habentium quæ ex bile generantur, adhuc acutiores esse, quàm ex putrescente sanguine, & (vt vniuersaliter dicam) quæ ex putrescente bile febres ortum ducunt, in cæteris paritate seruata, semper eis acutiores esse, quæ ex sanguine putrescente accenduntur; quicquid alij sentiant: sunt tamen & hæ febres quæ ex sanguinis putredine generantur acutæ, licet non verè & exquisitè ardentes. Sed mox quereret quispiam, num sicuti febres quædam acutæ esse possunt, & non ardentes, vt de synochis ex sanguine conclusimus, ita quoque possint ardentes quædam esse, & non acutæ: quod quidem admittere videtur Hip-

An febres
quædam ar-
dentes esse
possint, &
non acutæ.

pocrates tertio de morbis vulgaribus sub his verbis: [februm ardentium quæ vigeant, hæc erat natura, initio sopore erant oppressi, fastidiosi, inhorrescebantque, febris non acuta, neque magnoperè sitibundi, vel deliri.] manifestè hîc Hippocrates admittere videtur ardentem febrem, quæ non sit acuta. Verum nos quamlibet ardentem febrem acutam esse cum Galeno fatemur; Hippocratis autem auctoritati eo modo satisfacimus, quo ipsemet Galenus in commento satisfacere videtur, dicens; quòd cum dixit febris non acuta, in quibusdam codicibus absque negatione reperitur; vtputa febris acuta. Deinceps vtroque modo conatur Hippocrat. dicta verificare, inquit, quòd qui negationem omittunt, quòd diuelli ab ardente febre, acuta febris nequeat, intendunt, vel intelligendum est, quòd quemadmodum non magnoperè erant siticulosi, tamet si etiam in febribus ardentibus hoc sit peculiarissimum, ita consentaneum esse eos non valde febricitasse acutè, & propterea potuit ab Hippocrate scriptum esse febris non perinde acuta, deinceps corruptum ab eo qui primus hæc scripsit, errorque remansisse; quamuis quidam (vt ipse fatetur) velint, quòd quemadmodum raro iis, & nouo quodam exemplo acciderit sopor, ita hæc febris. Atqui nos vel esse auferendam dictionem [non] vel si non auferatur, addendam esse, valde, aut perinde, cum eodem Galeno putamus; & proinde nullam febrem ardentem esse, quæ etiam non sit acuta, cum eodem Galeno verum esse arbitramur. Qua etiam ratione in nostro quæsto de tertiana, num sit morbus acutus, probauimus eam esse de genere morborum acutorum, cum etiam de genere ardentium sit; nam qua ratione ardens dicitur, similiter etiam & acuta febris dicenda erit, vt fusiùs nonnullis cum auctoritatibus, tum rationibus eodem loco demonstrauimus.

FINIS SECVNDÆ PARTIS.

Febris
duplex

Contin-
getur
ex
gine
di
romie



DONATI ANTONII AB ALTOMARI, ARTIS MEDICÆ DE MEDENDIS

FEBRIBVS,

P A R S T E R T I A.

EXERCITATIO.

De dignotione, prognostico, ac curatione febrium
ex putredine sanguinis accensarum.

Caput I.



VOMODO

particulares omnes febrium differentiarum, præsertim earum quæ ex putredine accenduntur, eadem diuisua methodo vtentes, vestigetur, & quot, quæue sint, ac quis sit modus earundem generationis,

quæue curationis via & ratio suisimè explicasse arbitror. Reliquum est, vt tyrones instituamus, quomodo se exercere debeant, pro dignotione, ac curatione earum, adeo vt in singulis dignoscendis primo se exercent; & demum eis cognitis, quid de ipsis prædicendum, ac quibus curari debeant, haudquaquam ignorant. id nanque est quod pro huius tractationis perfectione, ac complemento à principio docere proposuimus, & ne longius euagemur, ab hac quæ ex sanguinis putredine oritur differentia, quæ tot in medium attulit lites, exordium esse putauimus, vt vniter sus de ea absolueretur sermo; vtque ea cognita & sublata, ad reliquas quietius transire valeamus, neque propterea reliquarum & dignotionis, & curationis ordo peruerteretur, vt patebit. Pro loci porro diuersitate, in quo sanguis putrescere consuevit, duæ etiam febrium differentiarum oriuntur, vt dictum est; quarum altera *συνεχης*, hoc est continens, altera *συνεχης*, id est continua appellatur. Prima, quoniam in omnibus aut principalioribus vasis idem sanguis putrescit, vnam à principio ad finem vsque habet accessione, quæ in multos dies porrigitur, cum ob vehementem stipationem sanguis non transpiret, nec vlla subit occasio, quæ alterius accessione principium excitet, vt iam dudum differimus. Huius tres differentiarum (quemadmodum de syncho absque putredine explicatum est) reperiuntur apud artis medicæ auctores, & præsertim apud Galenum nono de meth. med. c. 3. Nam alia

similem tenorem seruant, à principio siquidem ad finem vsque æquali magnitudine, ac vehementia perdurant, quas Græci *συνεχης*, & *συνεχης* vocant, quædam verò semper augentur, & exiguum aliquid adiciunt, eas Græci *αυξαντες*, & *αυξαντες* nominant, hoc est crescentes, seu incrementum suscipientes, alia paulatim diminuuntur & decrescunt, quas Græci *αποσυνεχης*, hoc est decrescentes appellant. Reliqua differentia, licet ad febris vacuitatem priusquam ex toto soluat non desinat, plures tamen habet accessiones, ac declinatio aliqua sensibilis in ea apparet, quoniam in paruis quibusdā vasis sanguis putrescit, & vt vniuersaliter dicatur, in inflammationibus vniuersis, adestque occasio aliqua, quæ alterius accessione principium excitat: similem verò accessione proportionem assumit, qualem tertianæ maximè febres ostendunt, vt liquet 2. de diff. feb. cap. 9. Commune autem omnibus febribus quæ ex sanguinis putredine accenduntur exillit Alexandro auctore cap. 3. lib. 12. quod mitis statim calor ad primum manus tactum percipitur, qui nihil habeat rodens & acre, quale in febribus, quæ ex flaua bile plus satis adusta generantur, deprehenditur. differt etiam hic calor ab eo qui ex putrescente pituita sentitur: quoniam licet per initia tum mitis, tum vaporosus sentiat, paulo post tamen, manum diutius admoventis rodens caliditas, tactui occurrit, veluti per colum quoddam aut cribrum sursum emergens in eadem pituita putrescente, vt ipse inquit. Quam sententiam prius conscripserat Gale. 2. de diff. feb. asserens quod quamuis manui tangenti plurima se offerat caliditas in hisce febribus ex putrescente sanguine ortis, earum tamen caliditas mitis est, magis vaporosa, ac minus molesta, quam quæ ex cæteris putrescentibus humoribus percipitur. hoc itaque signum maximum, commune est omnibus febribus ex putrescente sanguine accensis. Pulsus eis qui ita febricitant, præsertim ubi continens fuerit febris, maximus, vehemens, celer, frequens, & æqualis est, arteriarum constitutio, nec durior quam pro natura est, nec mollior, celeritatis tamen frequentia quæ eo peruenit, quo febris ipsa magnitudinis hæc tamen indicia communia sunt, vt inquit Galen. eodem 9. meth. meden. cap. 3. cum syncho citra putredinem: priuatim tamen huic de qua sermo nem facimus putredinis signa aderunt, tum in lotio, tum in pulsu, tum caloris ingrata qualitate. In lotio,

Continue
feb. ex san-
guine.

In quo con-
ueniunt feb.
omnes ex
sanguine.
Caloris qua-
litas.

cap. supra
citato.

Pulsus.

B b b 2

Vrina.

quoniam colore & crassitudine magis à naturali habitu recedent vrinae, crassae siquidem & rubrae, vt liquet libro de vrinis. Est etenim sanguinis color rubeus, licet quandoque etiam & flauus, non tamen adeò vt bilis natura semper rubicundior existit, Galeno teste i. de crilib. cap. 12. eruntque cruda in principio, aut saltem obscure concocta. In

Pulsus communis febrib. omnibus ex putredine.

pulsu manifestabitur putredinis signum, etenim celerior erit contractio quam distensio, & pulsus per externam quietem frequentior, quod signum commune est omnibus febribus ex putredine oris, vt 3. de praesagit. ex pulsibus scriptum est. In caloris etiam qualitate putredo ostenditur: nam quamuis semper ex sanguinis putredine calor sit mitior, quam ex putredine ceterorum humorum, vt iam dudum ostendimus, erit tamen aliquantisper acris & mordax in continente hac febre ex putredine

Quibus in corporibus febris ex sanguine generetur.

orta, relatione facta ad continentem citra putredinem: rubicundi quoque ac pleni apparent aegri, ac plenitudinis sensum se percipere aiunt. Hae febris neque in frigida aetate, nec frigidus corporis temperamento excitari consuevit, nec in gracilibus, vel qui raro sunt corporis habitu, imò tum aetate, tum natura, tum acquisitio temperamento quae calida sunt, ac praecipue si & carnosus, & multo sanguine affluens, & denso corpore aeger fuerit, aut etiam calidis excrementis refertus, vt patet citato libro nono de metho. med. cap. 3. & propterea qui hac febre percipiuntur, si recte curari debeant, iis sanguinis missio est adhibenda, pro certo habens quod nisi id adhibeatur praesidium, fore, vt vel suffocentur, vel certe syncope prehendi, & omnino periclitentur: nisi eos, vel virum robur, vel plurimus sudor, vel largum sanguinis profluvium à morte vindicat, vt liquet ibidem, cap. 4. Harum verò omnium continentium febrium deterima est quae incrementum suscipit, inter reliquas, quae similem tenorem seruat, deterior est. Quocirca eiusmodi febris curatio, non fecus ac illius quae citra putredinem, à venae sectione auspicanda erit: quam licet Galenus citato loco, vbi valida subsit virtus, & aetas permiserit vsque ad animi defectum, fieri debere praeciperit, quia tamen vt ipsemet fatetur ii. eiusdem operis lib. cap. 14. nec obstructio, nec putredo curari per sanguinis missionem potest, vt quae alia remedia desiderent, & propterea reponi sanguinis aliquid ad curationis spatium debet, quominus intempestiue nutrire, necessitate vlla cogamur: ob id satius esse puto, ac tutius, vt quantum satis visum fuerit, tantum principio detrahas: quod verò defuit iteratione supplere oportet: quod quidem nec ipse negavit eodem 9. de meth. med. vbi vires, aut aetas non satis responderet, cetera autem quae pro huius febris curatione adducunt, tum eo loco quo continentem citra putredinem curare docuimus, tum etiam vbi abundantiam curare praecipimus, ac putredinem, studiosi petant, ne iterum eadem hic repetamus: reperient enim quibus febrilis calor extinguat, obstructio eximatur, & putredo vacuetur. Similiter & victus rationem requirant in vniuersali methodo, in qua eius institutionem fufius disseruimus, nedum in his, sed in ceteris omnibus febribus particulatim autem sis contentus in eiusmodi febribus, paucissimas forbitiones, potionisque exhibere, quibus utique ceu medicamentis potius quam nutrimentis egemus, eodem Galeno teste ii. de meth. med. cap. 9. veluti est

*Iteranda venae sectio. Eodem citato.**Victus ratio.*

aqua hordei, aut ptisanæ cremor. Nam quibus febribus continuis status non ultra septimum futurus est, & vires validae sunt, atque aetas praeterea consentit, his quidem admodum exquisitus, & tenuis victus est institutus, vt patet i. de arte curat. ad Glaucon. cap. 8. vnum autem iterum repetere non grauabor, quod maxima continentium febrium remedia haec duo sunt, sanguinis detractio, & potio frigida, verum illa, nullo non tempore, modo vires sustineant, haec, cum & impulsu, & vrinis concoctionis euidentes cernuntur notae, febris autem est maxima, vt citato libro 9. de method. med. scriptum est. Continuas verò febres quae plures accessiones habent ex eodem putrescente sanguine genita, ex eisdemmet signis dignoscas, hoc solo ab eis disidentes, quod plures habent accessiones, quoniam non in omnibus seu maximis vasis, sed in quibusdam, ac paruis sanguis putrescit, & similem habent accessionum proportionem, qualem tertiae maxime febres ostendunt, differunt autem ab eis febris bonitate. sunt etenim haec quae ex sanguinis putredine oriuntur, simpliciores, tum in reliquis symptomatis, tum etiam in caloris qualitate, vt saepius diximus, quod si non modo sanguis ipse putrescat, sed inflammationem pariat, aderunt & eadem simul inflammationis indicia: ac etiam propria si ex sanguine excitetur, diuersaeque ab aliis humoribus, si eadem fiat, vt in laterum inflammatione clare cernitur, quarum inflammationum signa, ac curationis modum, potissimum vbi internis partibus fiant, fufissime & particulariter in nostra arte medica docuimus. verum vbi in quibusdam paruis vasis propter eius crassitudinem aut multitudinem impingitur, adeò vt putrescat, propterea, quia non diffilatur sanguis, & febrem accendat, si omnia consentiant, vena secanda erit, eaque repetenda, vt dictum est: praesertim si multitudine obstruat, deinceps ad liberandam obstructionem, ac crassitiem extenuandam accedere, putredinemque euacuandam, sub eadem via & ratione, qua in vniuersali methodo praecipimus: ea autem deligenda medico sunt, quae citra calorem liberare obstructiones valeant, ac putredinem auferre, aut saltem quae citra calcificationem siccationemque valentem, eadem moliantur, tum intus assumpta, tum foris adhibita. quae verò sint quae tali facultate polleant: in vniuersali methodo sunt explicata. particulatim autem, aqua hordei non decorticati, aut ptisanæ cremor exhibeatur, vel radices cichorii, apij, borraginis, vel feniculi decoctum in aqua, aut oxyfacccharum, vel syrpus acetosus, seu oxymel interdum. De foris verò ea quae extenuandi, digerendi, alterandique vim habent, adhibeantur, perpetuo indicationibus à parte affecta, quas prius in vniuersali methodo explicauimus, sumptis, atque perpenfis. Sed quoniam exiguo quodam tempore sanguis hic putrescens suam seruabit naturam, sed paulò post in aliorum humorum speciem permutabitur, propterea pro diuerso humore in quem mutatur, varia quoque exigit tum topica, tum alterantia ac purgantia medicamenta, quorum copiam studiosi insequentibus requirant. Si verò in eadem parte in qua sanguis putrescit inflammationem pariat, pro eadem curanda, illae etiam indicationes pensandae sunt, quas supra in vniuersali methodo disseruimus, cum scilicet putredinem cum inflammatione curare doceremus. semper enim (ne eadem saepius repetamus

mus) sub eadem via & ratione particulares febrium differentia curandæ sunt, quam in vniuersali methodo seruandam esse monuimus, particulari quadam indicatione addita, quæ ex cuiusque causæ adhuc manentis differentia desumitur, ex qua & diuersa particularis febris, ex putredine ortæ, differentia gignitur, ac varius modus generationis ipsius circuitus: quemadmodum in præcedenti secunda huius operis parte fusiùs explicauimus.

De causis, id est, ardentis febris dignotione, prognostico, ac curatione.

Caput II.

VOD per exquisitum causum, seu exquisitam febrem ardētem vnā cum Galeno quamlibet febrem continuā ex bile ortam, subintelligere debeamus, tñ si plures habeat accessiones, quā si vnā duntaxat à principio ad finem vsque, in præcedentibus abundē demonstrauimus. Nam quæ in sola flaua bile febris accenditur, sine aliquo visceris affectu, siquidem manente adhuc intra vasa bile accendatur, exquisita febris ardens nuncupatur. si verò per totum corpus deferatur, tertiana, eodem Gal. teste 2. de crisi. cap. 6. ipsa verò febres continuæ ex bile genitæ, in alio non dissident nisi quòd quandoque eadem bilis in omnibus vnā cum sanguine, aut maioribus, principalioribusque vasis putrescit: interim in exiguis ac à corde disitis. nam cum in vasorum capedinibus, vnā cum sanguine continetur flaua bilis, vtcunque accendatur, contingit febres ardentes prodire: præcipue verò vbi in ventris, aut iocinoris, aut pulmonis venis bilis effluat, vt liquet ex eodem Galeno primo de morbis vulgaribus. Harum itaque omnium dignotionem primò aggrediemur; & deinceps prognosticum ac curationem. Cum autem duo sint, vt priùs dictum est, propria, eximia, ac pathognomonica indicia ardentium febrium, sitis videlicet incompe- scibilis, ac exurens caliditas, neque appellari possit febris ardens, nisi adiuncta perpetuo habeat per totum morbum hæc duo, vt liquet tertio de morbis vulgaribus, propterea ab his exordienda est harum febrium dignotio. Pulsus eorum qui hæc febre laborant, celerior, & frequentior erit, quā qui fit ex sanguinis putredine, inā qualis magis: nam multò celerior erit contractio distentione, & frequentior secundum exteriorem quietem; erit etiam & durus, & propterea non adeò magnus ac vehemens, quemadmodum in continentibus ex sanguine ortis videbitur, aderitque manifestum proprium febrium signum, hoc est inæqualitas in vno pulsu: nam multò velocius principium, finemque motus inuenies, quā medium, licet hoc commune sit omnibus continuis, vt patet primo de arte curatiua ad Glauconem cap. 8. Est etiam proprium harum febrium symptoma lingua nigricans, vt liquet primo de locis affectis, nigrescit autem ob immoderatam caliditatem quemadmodum etiam arida & aspera redditur ob immoderatam siccitatem, eodem Galeno auctore quarto de ratione victus: cap. 5. quo loco ab auctore cuncta hæc quæ sequuntur si- gna conscripta sunt, inquit: [sit quoque & lingua aspera, sicca, & valde nigra, ventræque morfu dolet, deiectionesque & liquidæ, ac pallidæ sunt, vrgēque sitis vehemens, & vigilia, atque interdum mentis aberratio:] quæ etiam ab Aetio capite 78. libro 5. & à Paulo cap. 28. libro 2. annotata sunt. Ve-

rūm non omnia hæc symptomata perpetuò febribus ardentibus insunt. nam ventrem morderi & biliosa deicere, non de eis quæ perpetuò insunt, nisi cum morbus vehemens sit, motusque acrimus & tenuium humiditatum ad interna fiat. quapropter iis qui ventrem hepârque causi veluti sedem habent, hæc contingunt, verū iis qui pulmonem veluti sedem habent, hæc non admodum contingunt, sed quæ de lingua dicta sunt, & desipientia magis, diffi- culter etiam & hi spirant. (ea scilicet quæ densa, & magna est spirandi difficultate) efflātque cōtinen- ter os aperientes, igneique spiritus efflatione leuan- tur, vt ab eodem Galen. citato libro 4. de rat. victus scriptum est. vnde Hippoc. aphor. 50. 4. lib. dicebat: [vbi in febre non intermittente difficultas spirandi, & delirium acciderit, letale:] sit autem in his febri- bus interdum mentis aberratio, seu desipientia, ob eam, quæ ad caput recurrit, bilem, & ob temperatu- ræ caliditatem siccitatemque, & propterea vbi ad- modum vehementes fuerint hæc febres, est hoc pec- culariæ; quemadmodum etiam sanguinis ex naribus profluuium. etenim nihil habet admirationis si re- cludantur, & disrumpantur huius regionis venæ à sanguine qui sursum incitatus calore effertur, à quo non possunt non inflari, ac tum referari venæ, & rumpi ob spiritus copiam, qui disrumpit vel vitres ac dolia, cum in musto feruescente accumulatur, vt liquet 1. de morbis vulg. cum ergo copiosus ad ca- put calor attollatur, vbi vehementes fuerint hæc fe- bres, sanguinis sunt profluvia, & delirant. erunt & vrinæ in his febribus tenuiores, quā in febribus ortis ex sanguine putrescente, similiter non adeò rubæ, sed rufæ, seu flauæ & igneæ. Differunt autem hæc febres ab exquisitis tertianis, quoniam neque cum rigore inuadunt vt illæ, neque etiam si plures accessiones habeant, ad febris vacuitatem defi- niunt, propter eas quas supra meminimus causas. di- stinguunt autem eas, quòd quæ continentes non sunt, plures habent accessiones, illæ verò vnā dun- taxat, minùs etiam quodammodo sitiunt ægri, & calor, ac cætera modo dicta, in eisdem sunt paulò mitiora; reliqua verò quæ vtriusque communia sunt, sequenti capite de tertiana expectabis, ne eadem bis repetamus. Nunc ad prognostica transeamus. Si incipiente ardente febre confestim parum ri- geant laborantes, prauum est signum: etenim iudi- care ardentis febres rigor solet, Hippoc. auctore a- pho. 58. 4. libri cum dicebat: febre ardente laboran- ti, rigore superueniente solutio fit. I bile siquidem ex qua febris ardens habuerit ortum, expurgata. At- qui decretoria nō statim elucere oportet, vt idem- mer testatur 2. de morbis vulg. insuper malum est si insomnes ac fastidiosi sint, grauitèrque angantur. nam vigiliarum & angoris symptoma semper ex- tiosum est, nedum in principio. Ad hæc vbi paulu- lum in fronte & clauiculis sudabunt, multumque delirabūt, prauum est signum: nam eiusmodi sudor, etiam si frigidus non sit, minatur syncopem: pessi- mus autem erit, si frigidus egrediatur, quippe qui non fore sed iam esse syncopem indicet Galeno tes- te primo prognosticorum, & propterea dicebat Hippocrates aphor. 37. quarti libri, [frigidi sudo- res cum acuta quidem febre mortem, cum mitiori autem, longitudinem morbi significant.] delirare verò læsum significat cerebrum, nec minùs timo- res, molestiæ, extremitates subfrigidæ, vt summi pedes, magisque minùs, prauis sunt timores inquam,

Bbb 3

Locis pra- cit. Delirij cau- sa.

Sanguinis profluuii causa.

com. 2. tex. cōment. 63. et 66. Signa ex vrinis.

Prognosti- ca lethalia ex rigore.

Secl. 1.

Ex vigiliis angore. Ex sudore.

Super text. 26.

Ex delirio, timore et c.

Com. 2. su- per text. 20.

Signa pro- pria febr. ardentis.

Com. 3. tex. com. 34. Signa ex pulsu.

Ex lingue colore.

Super text. 1. Signa alia.

Extremorum frigus.

quoniam magnopere acris, & deusta flaua bilis symptomata sunt, cognatae verò timoribus sunt morbositas. At partium extremarum frigus perniciosissimum febribus ardentibus symptoma est, & signum, quemadmodum etiam desipere: febris aestu caput inflammante, cum proprium sit, & familiare febribus acutis, vbi extremis corporis partibus; quae si quando refrigerentur, regionisque ad viscera continentes ardeant, in corporis medullis coactum sanguinem esse, indicio est, extrema autem membra sanguinem desiderare, refrigerari, & semel emori, destitute iam ea natura. Quapropter Hippocr. aphor. quadragesimo octauo, quarti lib. sic scriptum reliquit; [in febribus non intermittentibus, si partes exteriores sint frigidae, interiores verò vruntur, & sitim habeant, lethale.] & aphorismo primo, 7. libri, [in morbis acutis frigus partium extremarum malum.] Nec minus & malum quoque est, vbi ardentes febres plures habeant accessiones, si eadem diebus paribus fiant à principio statim; nam interim ad sextum diem pessimum iudicium fore praenunciant, interim in longum producendum morbum: at siquidem velociter moueantur (quarto die prauam accessionem habente) ad diem sextum de vita decedunt. Galen. auctore 1. de morbo. vulg. & praesertim si eadem die quarta, sudores diutissime frigidiores appareant. Hippo. verò aphor. 61. 4. lib. scriptum reliquit, quod qui morbi diebus paribus iudicantur, male iudicantur, ac lubenter repetunt. insuper quod febricitans, nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidiuare. si verò extremitates liuescant simul cum earum frigiditate, neque; amplius calor eis redeat, demori eos indicat, & est argumentum constans, vt inquit Galen. non posse ultra diem sextum vires sustinere: quod si cum antea aestuassent, & propterea siti flagrant, postea sint à siti liberi, ita vt amplius non sitiant, horum duorum alterutrum esse necesse est, aut morbi solutionem, aut virtutis extinctionem, ita vt impraesentia mala amplius non sentiant. At si cum lingua nigra, arida, ac aspera à principio, absit ingens sitis, alterutrum indicat, aut mentem laesam agrotum esse, vt propterea quae patiuntur non sentiant, aut ventriculi naturalem facultatem extinguere, vt 3. de morbis vulgar. ab eodem Gal. scriptum est.

Ex accessione febrium quae paribus diebus sunt.

Com. 2. super tex. 75.

Ex siti segna sine causa.

Com. 1. super tex. 2.

Ex urinis.

Ex sanguine guttatum e naribus stillante.

Com. 2. super tex. 63.

verò iam dicta exitalia symptomata adfuerint, atque prius sitierint, cum non contingat eos à morbo vindicari, proinde si amplius non sitiant perditum sensus signum est. fiunt tamen interdum minus siticulosi ob siccas tussis, leuiter irritantes, siue ob faucium asperitatem, siue ex sola intemperatura instrumentorum respirationi seruientium accidunt: nam ex locis vicinis humor aliquis tenuis, vel distillat, vel trahitur ad loca quae ad asperam arteriam pertinent, vt liquet aphorism. 34. libri 4. Vrinae item nigrae, tenues ac paucae, alique durae, in his febribus, exitalia sunt signa. nam nigrae, ab adusto iam bilioso humore proueniunt; paucae, quod omnis sit ex sanguine humor aquosus, ab ardente febre tostus, significat; quodque vrinae instrumenta iam emortua sint, tenues, quia à natura bilis non euicta est. eandem etiam ob causam alui durae fiunt. Perniciosum insuper signum est cum in aliis, tum maxime in ardentibus febribus, sanguinis è naribus stillicidium in his febribus; siquidem familiarissimum eis est sanguinis è naribus profluuium, vt liquet citato libro 1. de morbis vulg. Quod etiam in

cæteris febribus malum sit, ex eodem Gal. liquet 4. de ratione victus. At quod non solum sanguinis è naribus stillatione, sed quaelibet alia exigua excretio in febribus potissimum ardentibus, praua sit, idem Galen. decretum reliquit 2. prorrh. sub his verbis: [excerni pauca in agris vnum quoddam ex signis est, quae ex toto prauitatem habent, siue sanguis per nares excernatur, siue deorsum per ventrem, siue per vomitum tale quippiam, quod superfluum sit, excernatur. idem & in sudoribus est, & his quae per vterum excernuntur.] & reddens causam subdit: [nihil etenim eorum quae decretoria existunt, exigue fecerint conuenit, sed quae ita vacuantur, omnia duorum alterum subeunt. nam vel quod non queant tolerari ob copiam, ab affectis effunduntur partibus, vel imbecillitate ostendunt naturae, quae proponit quidem superflua excernere, sed nequit. si verò cum iam dictis symptomatis prauis inuoluntariae ex oculis lachrymae cadant, mortem significant, vt liquet 6. de morbo. vulg. quamquam & hoc symptoma malum sit in cæteris febribus, ac aliis quibusque morbis Hippocrate auctore aphor. 52. quarti libri. exitiosum autem atque letale in morbis acutis, vt patet 1. prognostic. Idem quoque Hippocr. aphorism. 34. & 35. citati libri quarti sic scriptum reliquit. [si febrem habenti suffocatio repente superuenierit, nullo tumore in faucibus existente, est lethale.] Item, [si febrem habenti, repente collum peruertatur, ac vix deuorare possit, non existente tumore, est letale.] & aphorismo sexagesimo quinto: [in febribus circa ventriculum fortis aestus, & cordis morsus, malum.] & 67. [in acutis febribus conuulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.] malum quoque est spiritus offendens, mali item ex somnis timores, & conuulsiones, seu labores, vt aphorism. 67. & 68. scriptum est. Insuper si in frigido ambiente vehementer vri hominem contingat, exigua salutis ipsius spes est habenda. si verò nec concoctionis habeat signa, nec vires validas, seruari is planè non potest Galeni auctoritate 11. de meth. med. cap. 9. Cum verò tot explicauerimus mala, ac letalia signa ardentium febrium, tempus est bona, & salutaria, si qua sunt, conscribere. Ergo bonum erit signum vbi aegri morbum facile ferant, ita vt non admodum aestuent, propterea quod calor non admodum fuerit exurens, neque incompossibile ita siti detineatur, neque fastidiosi sint, nec grauiter angantur, similiter si bene ac facile spirent: magnam etenim habet vim in omnibus morbis acutis qui cum febre sint, spirandi facilitas, vt inquit Hippocr. 1. prognost. Adhuc si nullum sentiant dolorem, praesertim interinarum partium, si eorum corpus aequaliter calidum esse videatur, ac molle, lingua non admodum nigra, arida, & aspera. insuper si eorum vrinae bonae sint, nedum in colore, substantia, & quantitate, sed si statim coctae appareant, candidum sedimentum habentes, leuèque & aequale per omne tempus dum morbus iudicetur: securitatem enim, ac morbum fore breuem significabunt, vt liquet ex eodem Hipp. 2. prognost. & deiectiones similiter, si concoctae appareant, bonae sunt, sudores item boni sunt, si per diem decretoria eueniunt, ac ex toto corpore prodeant, à quibus à febre vindicentur, aut saltem facilius morbum ferant. quod si dormiant & ex somno iuuentur, salubre quoque erit signum. similiter si non delirèt, aut saltem parum: nam in quouis morbo mente

Delirium
nullum.

mente constare, & bene se habere ad illa quæ offeruntur, bonum est, contra verò se habere, malum ut ait Hippocrat. aphorism. 33. 2. libri, si etiam non timeant, nec mæsti sint, ac de salute confidant, bonum. si verò signis concoctionis prius apparentibus, cum virium robore, in aliqua die critica largum fiat sanguinis è naribus profluuium, aut sudor qualis modo dictus est, absque dubio æger liberabitur. similiter quoque febris fiet solutio, si rigor superueniat: si modo dicta præcesserint. Nam à febre ardente habito rigore superueniente, solutio fit, inquit Hippocrat. aphorism. 58. quarti libri, ubi verò febre non intermittente rigor incidat (videlicet non semel) ægro iam debili existente, letale est, eodem Hippocrat. auctore aphorism. 46. citati libri 4. ut verò summam dicam, nedum de his febribus, sed de cæteris omnibus, præter ea quæ diximus, calorem videlicet, articularum motus, vrinas, excrementa, & corporis habitus, & nonnulla alia quæ inspicenda sunt, ut regiones, anni tempora, constitutiones, ætates, corporum temperaturas, consuetudines, & antecedentes causas: necnon & quæ simul cum morbo inuadunt, & quæ in medio tempore apparent: præ cæteris omnibus quoddam maximum, breue tamè dictu spectandum erit, si velis rectè prædicere: est verò hoc morbi quantitas, ac vitium, res quæ ad eam explicandam vno indiget verbo, ad vsum verò permagna; neque enim bene prænoscerè possumus, nisi horum singulorum magnitudinem diligenter perscrutemur: nam utrum morbus sit exitialis, aut non, & quando magis debeat mori, aut sanitati ægrotus restitui, nisi omnino quæ diximus diligentius animaduertentis, ad duo ea redigens capita, scilicet ad ipsius morbi magnitudinem, & ægroti vires, nō poteris verè prænoscere, ut liquet primò de arte curatiua ad Glauconem, cap. 8. etenim si vires adeò validæ sint, ut possint morbum superare, necesse est ægrotus euadat: si verò contrà, omnino morietur. Non igitur solum inspicias qualis sit morbi species, seu forma, sed & eius magnitudinem aduersas, quod quidem non paruam exigit experientiam: nanque ex nulla alia re possumus ad exquisitam peruenire noticiam ipsius quantitatis, seu magnitudinis, quam ex crebra exercitatione circa quantitatis coniecturam, ut eodem loco scriptum est, & libro 2. prognostic. inquit idem Galenus quòd summa totius præfagitionis in morituris conualiturisq; est, quoties vis agrotationis cum ægri facultate conferatur: si enim morbus vehementior est, æger omnino morietur, si debiliior quàm ægri facultas, haudquaquam morietur, ubi nihil comitatur. Hæc itaque de prognosticis dicta satis. Nunc ad curationem harum febrium accedamus. Prima ergo auxilia in ardenti febre, decubitus sunt in locis frigidis, qui ad purum aerem patent, ac persflantur; stratum verò sit molle, amacula assidue permutata, satis gracili & non sordida, sit etiam lectus abundè amplus quo possint membra calefacta subinde ad alias atque alias eius partes transferri, & per flabellum aer ignauior concitetur: quin & alia animi oblectamenta procurentur, folia vitis viridia, item myrti ac rosarum per pauimentum spargantur, & aqua frigida frequenter irroretur, ac aquæ salientes in vicinia forni edant, ut liquet ex Aetio Philumeni auctoritate cap. 78. libro 5. somnus quoad fieri potest conciliari debet, nam vigiliæ, ut dictum est, magnopere lædunt. Motus omnino prohibeatur, vitentque im-

moderatos animi affectus; iram scilicet, tristitiam, & timorem, citandaque aluus erit quotidie clysteribus lenientibus, ac emollientibus, potissimum ubi naturæ sponte eadem alui excrementa non excernantur. Quod ad cibum & potum atinet, ab initio statim ad vniuersum ægritudinis tempus inspicientes, rationem victus instituemus. Nam quæ velociter fiunt, ac celeriter ad statum veniunt, etsi valde tenuem victum exhibueris, haud magnum afferes detrimentum, ut inquit Galenus 1. de arte curatiua ad Glauconem cap. 8. potissimum ubi vires validæ sint, quæ verò sint diuturniores, nisi ab initio pleniori cibo reficias, hominem cum morbo pauciter perimes, aut intempestiuè victus formam commutabis: neque enim oportet statu aduentante pleniorum quàm prius cibum offerre, sed contra potius tenuissimum victum qui in toto morbo adhibeatur, ad statum reseruare, ut patet citato lib. 1. de arte curat. ad Glauconem, sunt insuper cibi offerendi qui humectandi, refrigerandi quæ vim habeant, ut lactuca, intybumque agreste, & domesticum: omnibus verò prifana cremor idoneus existit Alex. teste cap. 3. libro 12. Prædicta autem olera cum aquosa posca seruefacta exhibeantur, ex Aetij præcepto. Verum cum ex oleraceis nihil sit, quod bonum succum præstet, lactuca enim in iis quæ boni, malique succi sunt, mediocriter se habet, Galeno teste libro de cibis boni & mali succi: propterea in iure parui pulli dictis oleribus decoctis, aut quibusdam aliis, ut malua, portulaca, attriplice, rumice, oxalide, buglosso, buccellæ panis macerata, tutius, ac vtilius exhiberi poterunt. Interim eadem panis buccellæ aqua frigida lotæ, inspersæque præsertim aut citrangelorum, aut citri acido, seu malorum puniceorum acidorum succo, exhibeantur. Nec minùs & prifana cremor, seu eadem prifana, iniectis in ea malipunici granis, conducere videtur. ubi verò propter virium infirmitatem pleniorum coegeris victum exhibere, paruorum pullorum, aliarumque paruorum auium montanarum carnes elixas, cum aliquo iam dictorum olerum, aut etiam cucurbita, præbebis. & si pleniori indigebunt alimento ægri, ad gallinarum seu caponum, perdicum, fasianorum ac sturnarum carnes accedendum erit; interimque eisdem contusis, aut in aqua tabefactis, adiecto citri, limoncelij, limonis, aut citrangelorum acido, aut malorum puniceorum succo, seu omphacio, vtare. Perpetuò tamen vitare consulo cibos qui ex amygdalis conficiuntur: sunt enim temperamenti calidi, & pinguis, ac oleosa qualitatibus participes, ut liquet 6. de simplic. medicam. cap. 11. & 2. de aliment. facult. cap. 29. Qua ratione, quemadmodum & cætera dulcia calidioribus corporibus exhibita, facili in bilem mutantur, ut 2. de naturalibus facult. cap. 8. scriptum est, ita & hæc, ubi nedum calidis, sed calidissimis corporibus exhibeantur, & eò potissimum quòd nedum quia dulcia sunt & calida, verum etiam oleosa & pinguis, ut dictum est, promptissimè in bilem mutantur, igitur cane peius & angue amygdala eorum sorbitiones, & quicunque alij ex eisdem parantur cibi, aut dulciarij panes, vitari debent, nedum in istis febribus, sed cæteris omnibus, præsertim acutis, quinimò & multò deteriores redduntur cibi ex amygdalis, si cum saccharo parentur. nam & ipsum quoque saccharum in his febribus vitandum est quoad fieri poterit, quoniam velut cætera dulcia facili in bilem vertitur, nisi quispiam alterius cuius-

Viciu
tio.

cap. 8

Cap. 6 &
2. de alim.
fac. cap. 11.Duo ad be
ne prædicē
dum neces
sario spectā
da.Super text.
6.Curatio.
Aer.Somnus.
Quies.

Potus.

dam rei gratia, & non pro cibis eisdem interdum vtatur. Pro potu aqua hordei tribuatur, aut leuiter decocta aqua exiguo adiecto mali punici acido, seu mali medici, vinum quoque vbi vires exigant, aut propter consuetudinem ægri ab eo abstinere nequeant, exhiberi poterit, quod tum aspectu, tum viribus sit aquosum: id enim ad omnia vtilius quam aqua est, vt pote quod & concoctionem iuuat, & vrinæ, ac sudores prouocet Galen. auctore 8. de meth. meden. cap. 3. Nam & Hippocr. quoque non modo in diariis febribus, verum etiam in acutis vinum ex-

Comm. 4.
Text. com.
15.

hiberi præcepit, vt liquet 3. de rat. vict. in morbis acutis nec propterea sibi ipsi pugnat, si 6. de morb. vulgar. dixerit (etiam si ipse sit auctor) [calidæ naturæ refrigeratio potus aquæ, quies,] nam in eiusmodi naturis non omnino vinum prohibet, sed sua det copiosius vtendum esse aqua quam vino: id quod etiam nequaquam nos negamus, admittimus autem quod quibusdam ardente febre laborantibus ipsum innocue exhiberi poterit, modò, vt dictum est, tum aspectu, tum viribus sit aquosum, insuper & medio-

Cap. 3.

criter aqua dilatum. Huius generis vina sunt Amynea quæ in eo colle nascuntur qui Neapoli immittitur, vt liquet ex Galen. 1. de cibis boni & mali succi; quo loco eoque delato ac magis aprico nostrum situm est rus amœnum, mihi quæ iucundum, & quod in eo nascitur vinum album (nescio tamen an amyneum sit) tenue, aquosum, ac subadstringens est, ac ferè infirmisimum vt citra nocumentum hac febre laborantibus exhiberi possit, vt sæpius obseruauimus haud tamen me præterit, & in aliis quoque regionibus Italiæ præsertim, huius generis vina reperiri, quibus hac febre laborantes innocue vti poterunt. idem quoque vinum interim colluendum, seu gargasandum præbeat aut aqua hordei, seu iam dicta aqua leuiter decocta, adiecto granatorum acidorum succo, aut mali medici, seu exiguo aceto, inuicem aquæ frigidæ fractæ quam Aetius præbet. Verum acetum tanto debeat aquæ frigidæ permisceri, vt bibi possit, ita enim refrigerabit & humectabit, vt liquet 10. de metho. med. cap. 9. confert item post cibum, vt inquit Aetius, si quandoque frigidam cochleari vnus aut duorum mensura absorbeant, potissimum vbi frigidæ potui assueuerint ægri. Inter prima quoque auxilia venæ sectio suum habet locum, & proinde inito etiam venam statim incidere oportet, vbi quippiam non impediat Alexan. auctoritate cap. 2. & 3. lib. 12. quod quidem præcipere videtur Galen. lib. 1. de arte curat. ad Glau. cap. 13. quo loco docet continuorum febrium curationem inquis: sanguinem verò mittere oportet & ob morbi magnitudinē, & quibus robur multò priusquam naturæ conueniat, & maior quam pro corporis consuetudine tumor, & venæ eminentes atque extensæ, iis omnibus est auferendus, nisi vires aut ætas, aut aliquid eorum quæ supra meminimus, prohibuerint. Id etiam & ratio dicitur: nam cum bilis simul cum sanguine intra vasa fuerit aucta, efficacius remedium est venæ sectio, ac tutius etiam, quam purgatio; cum febris validissima sit, incognitaque sæpius ægotantis natura quomodo se habeat ad purgationes. Quamobrem hoc auxilio nedum morbi causa exhauritur, verum etiam ex accidenti corpore refrigerato, febris extinguitur, id verò animaduertendum erit, ne admodum copiosa fiat, ac vsq; ad animi deliquium venæ sectio in hisce febribus ardentibus, vt quidam iuniores temerè con-

Vene
sectio.

sulunt, aut amantes se Gal. fauorem habere, commiphorism. 23. primi libri, quæ auctoritas, vt paulò ante exposuimus, nonnullos fefellit, cum non de his febribus, sed de continentibus ex sanguine ortis Galen. sententia verificetur. nos verò satius esse cõsulimus moderata vt venæ sectione, etsi quod deficit in prima sectione, potius repetenda sit, quam venæ sectionem tanquam efficacissimam, ac tutissimum remedium fiendam esse arbitramur; nedum in eiusmodi ardentibus febribus, verum etiam & aliis omnibus quæ ex putredine excitantur, vbi reliqua omnia consentiant ex Galeni vniuersalissimo decreto 11. de metho. meden. cap. 15. cum inquit: [saluberrimum autem, vt prædiximus, est in febribus venam incidere, non continuis modò, verum etiam aliis omnibus, quas putrescens humor concitat, vbi præsertim nec ætas, nec vires prohibent. leuata nanque quæ corpus nostrum regit natura, exonerataque eo, quo veluti sarcina premitur, haud ægrè quod reliquum est vincet. itaque proprii muneris haud oblita, & coquet quod concoqui est habile, & excernet quod potest excerni.] Quapropter valeant & Arabes, & Barbaram quidam sectantes medicinam, qui præter rationem timentes, vt ipsi aiunt, bilis efferuescentiam in hisce febribus, venam secari vetant in ægrorum perniciem; ignorantes (vt mea fert opinio) quod per venæ sectionē redundante flaua bile cum sanguine intra vasa, perpetuò eadem proportio seruabitur vtriusque succi si venæ sectio fiat, adeò vt non magis de vno quam de reliquo euacuetur; sed semper eandem seruabunt proportionem quam intra vasa habebant. sectetur autem interna cubiti venæ; nam velocissimè, & plurimum ex iis quæ principes sunt partibus; venæ ea corpus vacuat, Galeno auctore 4. de ratione victus. prius tamen quam sanguis mittatur, alius emollientibus, lenientibusque clysteribus exinaniri debet, qualis est is qui recipit foliorum maluarum, violarum betæ, & lactucæ, singulorum manip. 1. fiat decoctum secundum artem, cuius per colum transfusi R. libram j. s. vel libras ij. adiciatque olei violacei vnc. iij. vel iijj. mellis violacei vnc. ij. mellis calsiæ fistularis recenter extractæ, aut etiam calsiæ tractæ vnc. 1. salis communis drach. ij. vel iij. misceantur singula, & fiat clyster, quo nedum ante sanguinis missionem, verum vbi vltus requirat sapius, & quouis ferè die vti poteris, quibus auxiliis hora quietiori vtendum esse omnes consentiunt, potissimum vbi febris ardens plures habeat particulares accessiones. At quoniam si perfectè ardens febris solui debeat, horum alterutrum fieri necessarium est, aut biliosos excerni humores, aut eosdem extingui Paulo auctore cap. 29. libro 2. ob id à venæ sectione per sudores, imum ventrem, aut vomitiones, eadem bilis excerni tentanda est, atque etiam extingui, aut frigidæ potus, aut reliquis infrigidantibus, & humectantibus. vt verò promptius eadem bilis expurgetur, potissimum per imum ventrem, eiusdemque feruor mitigetur, ac putredo extingatur, vbi eandem occasionem arripere poteris, syrupum acetosum simplicem, de oxylaccharo, de citri acido, cum eo qui fit de succo buglosi, endiuæ, cichorii, seu ex succo vel infuso rosarum, aut violarum præbeas, adiectis æquis cichorii, endiuæ, aut buglosi, non siquidem in accessionum principio si eadem adsint, sed in earum incremento, seu summo vigore. Quam primum autem poteris, à

venæ

Quæ
andSape
38.3Repro
dum
rater
magisSuperior
Chylifer
necesseChol
pharTempus
tendi
Purgatio
humori
refrigeratioFr
tio

venæ sectione, vbi purgatione indigeant agri, ea vtare; nec numerus dierum spectandus est, vt quidam Neapolitani medici falso opinati sunt, perpetuò quartum expectantes diem; nam vel statim ab initio priusquam in partem aliquam firmentur humores, medicandum, vel postea cum ad maturitatem perducti fuerint. Quam ob causam & prima interduum die, & secunda, & quarta, & interdum quinta, & non in quarta solum medicamenta dedimus, inquit Galenus 4. de ratione victus, & Hippocrat. aphorism. 29. libro 2. [cum morbi inchoant, ait, si quid videtur mouendum, moue.] & aphorism. 24. primi libri. [in acutis morbis raro, & in principiis medicinis purgantibus vti.] & hoc cum præmeditatione faciendum præcipit. cuius causam reddit Galenus in comment. asserens deinde quòd in acutis morbis circa principia, statim circa primum videlicet diem, vel nò vltra secundum, si sumus vsuri purgantibus medicamentis, eis vtendum. non igitur expectandus est perpetuò quartus dies, sed vbi eisdem opus sit, singulis iam dictis à Galeno diebus, & quam citius poteris præbenda erunt, etiam concoctione non expectata, quemadmodum nos fusiùs nostro tractatu de purgatione explicauimus; præterquam si crisis aliqua futura speretur, quo casu omnino à purgatione abstinere oportet. vbi verò purgantia medicamenta conueniunt, cholagoga Græcè dicta, hoc est bilis educitiua, ea eligenda erunt, vt in vniuersali methodo docuimus, quæ aut calida non sint (qua ratione dicebat Hippocrates, raro eisdem in principiis vtendum esse) aut parum calida cum sint, alia miscenda erunt medicamenta quæ refrigerandi vim habeant, cuius generis medicamenta nostris temporibus non pauca reperiuntur. Quamobrem audaciores esse poterimus in exhibendis purgationibus in eiusmodi febribus quam veteres. Sunt verò hæc tamarindi, cassia fistularis, mel aereum, saccharum violaceum, syrupus è pluribus infus. rosarum, seu violarum, atque etiam rosarum succus, rhabarbarum, quibus hunc in modum vti poteris. Recipe florum buglosi (intelligo autè per buglossum, borraginem) nymphæ, violarum, & hordei decoricati ana drachm. iij. tamarindorum vnc. j. fiat decoctum in aqua fontis, in quo per colum transfuso dissolue mellis aerei vnc. ij. s. rhabarbari vigorati macerati in vnc. ij. succi rosarum, & colati scrup. iij. fiat potus: vel inuicem mellis aerei vnc. j. s. pulpæ cassiæ fistularis adiecto, aut sacchari violacei vnc. iij. vel syrupi è pluribus infus. rosarum, vel violarum tantundem. vbi verò robustiora sint corpora quæ hac febre laborat, vnc. s. diacath. iam dictis medicamentis adiacere poteris, aut vnc. iij. sacchari violacei sumito, & cum drachm. iij. aut diapruni solutui, aut electuarij è succo rosarum cum eodem decocto exhibeto. Quòd si bolum potius quam potionem sumere cupiant ægrotantes, ex eodem saccharo violaceo, diacath. diapruni, aut electuario de succo rosarum & rhabarbaro formari poterit, vel ex pulpa cassiæ fistularis, seu saccharo violaceo, & rhabarbaro, ac diacath. formetur. Cæterum à purgatione apparentibus manifestis coctionis indicis, instante iam vigore, viribusque valentibus (& nullo alio prohibente, ex iis quæ incontinenti febre citra putredinem relata sunt) aqua frigida exhibenda est, quam si quid impediatur, aqua hordei commodè exhibebitur, aut etiam stillatitia aqua buglosi, cichorij, seu domesticæ endiuiz, quibus vnc.

2. vel 3. zuplij violacei, aut rosacei, seu syrupi de oxyfaccharo aut ex citri acido, adiacere poteris; cuius quantitas eo etiam modo determinetur, quo iam dudum citato loco exposuimus. Possunt item & pastilli hunc in modum figurari quibus tutè vti poteris cum iam dictis aquis, Recipe pulueris diamaritonis frigi. drach. j. triafantalati drac. s. feminum com. frig. vnc. i. sacchari dissoluti in aqua rosarum quantum satis sit, misceantur & fiant pastilli. Vt verò bilis feruor mitigetur, restinguaturque febris, ac putredo arceatur, & sitis sedetur, hoc nostro medicamento sæpe tum à purgatione, tum etiam ante vtare. Recipit autem sacchari violacei, buglosi, & rosacei singulorum vnc. i. s. dissoluantur in aqua acetosellæ, buglosi, & endiuiz, cuiuslibet libram s. deinceps per colum transfundatur, & adiecto pulueris diamarig. frig. drach. 2. syrupi de pomis, de citri acido, & de oxyfaccharo ana vnc. 2. foliorum auri num. 4. quibus simul cōmixtis omnibus, æger sæpe vtatur, cochlear vnū pro qualibet vice asforbēs. Reliquū est vt ad topica medicamenta transeamus: verum animaduersione dignū est quòd vbi febris ardens vnā duntaxat habebit à principio, ad finem vsque accessione, eadem cordi, ac thoraci, & non reliquis adhibenda sunt partibus, si verò plures accessiones habeat, inuestiganda prius est ea pars, in qua bilis ipsa corruata putrescat: num videlicet in venis pulmonis, iocinoris, aut ventriculi, in quibus præcipue putrescere consuevit in eiusmodi febribus, vt liquet primo de morbis vulgarib. aut in reliquis. nam illi præcipue parti, & non cæteris præterquam cordi adhibenda remedia sunt; cordi verò perpetuò tanquam principi membro, ac semper affecto succurrendum erit: non enim cōuenit indiscriminatim (vt maior pars medicorum hodiernis temporibus præcipit) medicamenta adhibere, tam si refrigerantia, quam si calfacientia sint, imò illi maxime parti quæ primò affecta est, quemadmodum in cura hecticarum febrium decretum reliquit Galenus decimo de metho. meden. cap. 9. Nam siue refrigerantia sint medicamenta, siue calfaciendi vim habeant, semper partes quæ eis non indigent, læduntur. Quamobrem cordi hoc epithemate succurrendum erit, Recipe aquæ rosacæ libram i. aquæ acetosellæ, & buglosi, & melissæ ana libram s. santalorum omnium, & corallorum rubeorum singulorum drachma 3. ligni aloes, corticum citri & seminis basiliconis ana drachm. i. ofsis de corde cerui numero 2. croci parum, & vini albi odoriferi parum, misceantur & fiant epithemata pro corde. sunt qui margaritas, aliòsque preciosos lapides adiciant, quæ cum parum, aut nihil conferre videantur (vt mea fert opinio) consulto prætermitto. hæc epithemata communia sunt ardentibus febribus omnibus ac calida adhibenda sunt, confert etiam magnopere huic febri, si panniculi linei complicati moderatè graciles, madefacti in aqua rosacea oleoque rosaceo pauco adiecto aceto, thoraci imponantur, interim pampinorum vitis, cichorij, endiuiz, lactucæ, aut cucurbitæ succus adici poterit. oportet autem vt abundè calida sint, nam tepida partium firmitatem exolunt Aetio teste præcitato loco; id enim mirum in modum febrium ardorem sedabit, assiduus tamen horum vsus vitandus est, eodem autem iocinore verò laborante, hoc applicandum est remedium, Rec. succi solani, & cichorij ana lib. s. aquæ rosacæ & endiuiz ana. lib. i. santalorum

Pastilli cō
aquamisc
di.

Topica.

Loc. pluries
citatus.

Quædo pur
gandum.

Super text.
30. & 76.

Cholagoga
pharmaca.

Frigida po
tio.

omnium drachm. 3. aceti parum, misceantur, & fiant epithemata, ex succo insuper cichorij, solani seu endiuæ, vnguentumque rosaceo, fantalis, paucio aceto & cera, vnguentum parari poterit. Vbi vero ventriculus primò affectus sit, palmulæ cum vino & rosaceo, aut melino tritæ adhibendæ sunt, ex eiusdem Actij testimonio: vel, Rec. aquæ rosaceæ lib. 1. s. succi pampinorum vitis, polygoni, seu cichorij lib. s. vini albi odoriferi, in quo leue prius factum fuerit decoctum absynthij, & chiæ mastiches parum, vnc. 4. misceantur & fiant epithemata. Poteris insuper & ex fantalis siue corallis quippiam adicere, vitandæque perpetuò sunt hoc in casu, quæ validam calfaciendi vim habent, velut vulgus medicorum, & medici etiam quidam nō vulgares in dies, in ægrorum perneciem indifferenter abutuntur. Tempus autem horum frigefaciendum epithematum ac similibus in his febribus quæ plures accessiones habet, est vigor exacerbationis, ut inquit Aetius: nam in principiis ac augmentis earundem, dum adhuc inæqualiter affectū est, & caliditas circa viscera residet, si hæc adhibeantur, diffundant quidem sensum, verum repellentia caliditatem in profundum maius detrimentum inducunt, incluso intus feruido calore, & rursus febrem ardentiorē efficiunt. At in vigore expansa caliditate per totū corpus, facile extingui poterit ea, quæ adhuc reliqua est circa viscera. nam & melius spirantes, & minus siccitulosi fiunt, his in tempore adhibitis, & ipsorum rorsum vapore excluso, ad summum conuertuntur. Si verò vnam duntaxat accessiōnem habeant, omni certē tempore à purgatione adhiberi poterunt. Quod si remes etiam admodum calfacti videantur, albo Galen. cerato, aut rosaceo vnguento, oleoque violaceo, aut de cucurbita, paucio adiecto aceto, exiguaque cera inungantur: nec parum eis confert, si odoramentum parabis hūc in modum: Rec. aquæ rosaceæ, myrtillorum, & florum nymphææ ana vnc. 2. fantalorum omnium, & corallorum rubeorum, singulorum drach. 1. s. corticum citri drachm. 1. aceti rosacei vnc. 1. s. misceantur in ampulæ tenui panniculo lineo tecta, quam sæpe agitatam æger odoret. Hunc etiam in modum medicamentum parare poteris ad vigiliarum instantiam. Reci. florum, & foliorum lactuæ, & hyoscyami, ac florum nymphææ singulorum drachm. 4. corticum papaueris albi, & nigri, ana drach. 2. rosarum rubeatum pugillum s. fiat decoctum in aqua fontis, de quo recipe lib. s. & adiecto olei de nenufære, de papauere, & violacei, singulorum vnc. 1. aceti parum, & fiat odoriferum, interim & pomorum, seu radicum man dragoræ drach. 1. adicere poteris, aut etiā opij scrup. s. Porro Balneum illis solum cōuenit in ardente febri, ut inquit Aetius, qui citra tumorem aliquem inflammatum, aut erysipelatum ægrotant, vbi concoctionis signa apparuerint in vrinis. si verò qui ægrotat, iuuenis sit bene carnosus, seu bona corporis habitudine, tum status celi calidus & siccus, vires cunctas valentes habeat, febris sit ardentissima, & concoctionis notæ planè euidenter sint: etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haudquaquam laedet: quinimò protinus sudabunt, & nonnullis eorum aluus biliosa redditur. Galen. auctore 11. de metho. meden. cap. 9. subintelligere autem oportet quod citra visceris alicuius inflammationem febri citet. at si mediocris febris sit, vires non adeo validæ cum eisdem tamen concoctionis notis, iis etiam qui ta se habent, balneum prodest, nō tamen aquæ fri-

Balneum.

gidæ, sed temperatum, aquæ dulcis, ut liquet eodem 11. de metho. meden. & ab Aetio citato loco. aduertant autem studiosi quod Galenus de putredine quæ totum corpus occupat, indifferenter hoc loco verba facit, quæ synochos, id est continentes efficit febres, & non de continente ex sanguine sola, ut quidam putant, quapropter & eas etiam subintelligit quæ ex bile continentes excitantur febres, quas ardentissimas, & vehementer vrentes ibidem appellat, in quibus etiam frigidam natationem commendat. quæ enim ex sanguine putrescente continens excitatur febris, licet maxima dici possit, nunquam tamen ardentissima, ut sæpius dictum est. Alexander verò præcitato cap. 3. lib. 12. de balneo sic scriptum reliquit: [lauandi sunt qui feruida, & per ardentem febrem laborant, in domo potissimum, vbi solium habeatur tepente aqua plenum, ut totum ægri corpus vndeque ab aqua operiatur.] verum vbi nec concoctionis habeat signa, neque vires validas, ambiens verò sit frigidus, quoniam seruari, ut dictum est, is planè non potest, nec lauandus est in balneo, nec aliquod aliud medicamentum exhibendum. in quo enim desperata omnino salus est, imprudentis consilij fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuisse salutis, eodem Galeno auctore citato libro 11. de meth. meden. cap. præcit. Cum verò lypyriæ febres quæ ex aliqua forti inflammatione in corporis parte profundiori genita, vel erysipellate fiunt, ex genere sunt ardentium, licet malignæ, & perniciosæ magis, ut liquet comment. aphor. 48. 4. lib. & lib. de inequ. intemperie. cap. 2. cum dixit, [tales perpetuò febres sunt, & quæ lypyriæ vocantur, præterea quoddam ardentium febrium perniciosum genus.] nō alia ratione curari debent, vbi curari queat, quam reliquæ ardentēs febres, particularibus tamen indicationibus desumptis, tum ab inflammatione quæ cum putredine copulata est, seu erysipellate in his febribus, tum etiam à parte affecta, in qua talis genita est inflammatio, seu erysipelas, quas fusi in vniuersali methodo explicauimus, perpetuò tamen abstinebis ab eo medicamento quod à Mes. Alchermes nuncupatur, & maior pars Neapolitanorū medicorum in eiusmodi febribus sæpe vitur, propter eas quas capite de curat. febr. pestilentium recensimus causas.

De exquisita tertiana dignotione, prognostico & curatione.
Caput III.

Væ ex eadem flaua bile sincera per sentientes corporis partes declaratur febris, exquisita tertiana nuncupatur, quandoque simplici appellatione tertiana, vbi videlicet suam naturam seruat puram, atque sinceram, ut liquet comment. aph. 59. lib. 4. & nos etiam prius exposuimus. seruat autem suam naturam sinceram, eritque simplex, impermixta, ac legitima, vbi omnia quæ enumerabimus, in ea manifestantur. Atqui primum est, quod cum valido rigore incipit, quo cum nulla alia febris incipere potest, eritque rigor vehemens, pungens, ac carnem feriens. in quotidianis etenim rigor non antecedit, neque statim ab initio, neque in progressu, sed solum frigefactio, aut fortè exiguus quidam rigor. Quartanæ autem non primo statim die cum rigore inuadunt vehementi: nam progrediente ipsa, atque aucta vñ etiam rigor augetur, sensusque ægrotantibus adest, nō quasi pungantur, sed potius refrige-



Ex tempore accessu
nis.

Prognostica
ca.

Ciment
3.
sex.8.

de morbis vulgarib. [Tertiana exquisita, inquit, citò iudicatur: nec est letalis. Galenus verò idem confirmauit comment. aphorism. 43. lib. 4. & lib. primo de arte curat. ad Glau. cap. 8. [ex intermittentibus, ait, breuissima quidem, ac mitissima est tertiana.] & lib. secundo de crisib. cap. 3. dicebat: [quòd in tertiana exquisita ruffiore vrina existente, neque suspensione aliqua, neque nebula in primo circuitu apparente, ad septem circuitus extendetur.] Si verò subruffa vel subflaua, & crassitudine mediocri appareat, ac paulò post vel albam nebulam, vel suspensionem optimam fecerit, vltra quartum circuitum non progreditur. Omnium autem tertianarum illa est simplicissima, quæ cum omnia seruet exquisita: tertianæ indicia, in vrinis subidentiam etiam habet, & leuem, & æqualem statim in prima die: hæc etenim vltra tertium circuitum non progreditur. Trallianus verò cap. 6. lib. 12. asserit: [tertiana quidem facilis curatu est, cum autem à medicis illis qui nulla ratione, & via vtuntur, male tractatur nõ difficilis modò curatu, sed etiam insanabilis interdù redditur.] quod confirmare videtur Galenus citato libro primo de arte curat. ad Glau. cap. 9. sub exemplo eius, qui corrupto iudicio calidis balneis vsus, extenuato corporis habitu, deinde ad tantam deuenit perniciem, vt tabe consumptus interiret. Cum verò exquisita tertiana ex flaua bile per sentientes corporis partes commota inualeat, sit quæ flauæ bilis humor inter omnes qui in corpore sunt, aridior, ac calidior, quanto magis fieri potest, pro eius curatione: refrigerare, ac humectare oportet, Galeno auctore primo de arte curatiua ad Glauconem, & Aetio cap. 80. lib. 5. necnon & Paulo cap. 20. lib. 2. Quapropter in loco frigido æger decumbat, pauimentumque frequenter spargatur aqua frigida vel rosacea, cum exiguo aceto insuper sternantur salicis, seu vitis folia, myrti, rosarumque, aut violarum flores, ac etiam nymphæ, constat etiam cunctis hac febre laborantibus cibum humectantem, refrigerantemque præbendum esse. itaque ptisanæ cremor super omnia utilis ipsis censetur, vt inquit Alexander citato loco. ab omnibus autem cibis qui vim calfaciendi habet, abstineant, Paulo teste: quamuis Galenus ante eum ipsa etiam vitauerit. præter hæc autem ab omnibus dulcibus abstinendum esse præcepit Aetius citato loco. Qui verò humectant atque refrigerant, omnes utiles sunt exquisitis tertianis, Galeno teste citato loco. eorum verò quantitas tanta sit, vt bene concoqui possit. qua de re ex oleribus conueniunt atriplex, blitum, lapathum, malua, lactuca, & cucurbita, ptisanæque succus. Addas tu cichorium, endiuia, buglossum, seu boraginem, quamuis vitilium sit his oleribus vti modo quo in præcedenti capite docuimus: nam licet refrigerent, & humectent, probum tamen succum non generant, vt diximus. & ex piscibus, saxatiles, ex volatilibus quæ mollibus constant carnibus: quæ autem talia non sunt, eorum alaz necnon & gallorum testiculi, vt ipse Galen. inquit. suum verò pedes, & cerebra, ac etiam porcellorum carnem liquefactam, nostris temporibus vitamus. licet (vt ipse inquit) non lædant, cum & præstantiores, ac longè temperatiores cibos habeamus, quemadmodum præcedenti capite explicauimus. interim quoque & oua ad sorbendum offerimus, præsertim vitellos. permittendum quoque est ex fructibus vitillos degustent, qui non sunt omnino concocti difficiles, nec etiam facile cor-

rumpantur, vt sunt pruna damascena, seu surrentina, & qui azarolæ, seu amarenæ vulgò appellantur. Verum vbi non admodum delictiosi sint, qui hac febre laborant, succus ptisanæ duntaxat vsque ad crism exhiberi debet, vt idem Galenus citato loco fateatur, aut ex illis quos præcedenti capite narrauimus, aliquem eligas cibum pro natura, ac ægrotantis consuetudine, seu viribus, vt in vniuersali methodo fusiùs disseruimus, quo in loco conuenienter exhibendi cibi horam, etiam studiosi requirant. A vino verò antequam morbus concoquatur omnino abstinendum: aut vbi concoqui cœperit, tenue, aquosum, ac modicum primò dandum est: vbi verò iam prope est vt morbus soluetur, amplius offerendum, vt liquet ex eisdem auctoribus præcitatis locis. Toto verò eo tempore quo à vino abstinere debet, aqua hordei, aut aliquo alio ex eis, quæ in præcedenti capite narrauimus, pro potu vtantur: ac reliqua etiam in motu & quiete, inanitione & repletione, animi affectibus, & somno, & vigilia seruentur, quæ ibi præcepimus. Illud verò præcipue seruandum tam in hac exquisita tertiana, quam etiam continua, ac singulis febribus quæ plures accessiones habent, quòd in accessionum principiis haudquaquam dormire debet ægri, propter ea quæ à somno, hoc tempore consequuntur mala à Galeno cõscripta, commento aphorismi primi, libri secundi. quo etiam tempore nec cibus, nec medicamentum exhibeatur, nisi aliquid vigeat, retineretur siquidem longiori tempore saltem intus. calor naturalis, non sine magno eiusdem ægri detrimento: ob quam causam & vigilias præcepimus hoc in tempore, & à cibo, aliisque medicamentis abstinemus. alui etiam excrementa si excernantur priusquam inualeat accessio, confert, & si non natura, saltem mollibus clysteribus aluus exinanienda erit. in earum verò accessionum incrementis frictiones lenes compertunt: excitant enim calor naturalis ad exteriora motionem, humoremque extenuant, qui in vniuerso habitu continetur, ac cutis meatus rarefaciunt. At in summo vigore tempus est sanè ægro vt bibat, Galeno teste secundo de crisib. cap. 3. & Aetio cap. 79. lib. 5. bibant autem aquam hordei ex hordeo potissimum decorticato factam, aut stillatitiam aquam intybi, seu cichorij, aut endiuia, aut buglossi, cui zulapij violacei, aut rosacei vnc. 2. addito, aut syrapi acetosi simplicis, siue oxyssachari tantundem: nec minùs adiciere poteris syrupum è succo cichorij, seu endiuia, aut buglossi. si verò malint pastillos aliquos potius quàm syropos, ex margaritarum drachm. 1. & saccharo dissoluto in aqua rosacea quantum satis sit, formari poterunt. interim vnc. s. seminum communium frig. addito. quandoque etiam demptis margaritis drachm. 1. pul. diamargaritonis frig. addere poteris. vbi verò portione æger fuerit recreatus, statim copia vaporis calidi per cutem emergit sudoris nuntia, & vomitus bilis quandoque superuenit, aut aluus soluitur, & per vrinam biliosa reddunt, vt liquet ex Galen. Paulo, & Aetio, qua de re si ad ventriculum bilis repat, per vomitum educere oportet, cum verò vergit ad inferiora, per inferiorem excretionem, vbi spontè à natura eadem excretionem non perficiantur, iuuat enim per inferiores partes bilis expurgatio, & per vrinam quoque, & sudores, eam diuertere oportet, vt ipse Galenus testis est citato libro primo de arte curat. ad Glauconem. mollibus itaq; clysteribus eo tempore aluus

abus exinaniatur, vomitus, aqua tepida exiguo acetosi, seu syrupo, acetoso adiecto proritetur. reliquæ excretiones per urinâ & sudores à medico prouocari non debent, nisi vbi maior pars bilis per aluum, aut vomitum fuerit excreta, aut saltè manifestè concoctionis notæ appareant, nec ipsius bilis multa copia adsit, præterquam si frictionibus mollibus, ac leuibus sudores excitabis. Quamobrem accessione finita, in tempore intermissionis, eodem oxysaccharo, seu syrupo acetoso simplici, aut reliquis modò dictis cum cichorij, endiuia, aut buglosi aqua vti poterunt ægrotantes, necnon & mollibus clisteribus ex hordei, foliorum maluarum, violarum, mercurialis & betæ prius factò decocto, deinde adiecto pauco sale, vnc. 3. vel 4. olei violacei, & duabus mellis rosacei, & fiat clyster. interim addere poteris vnc. j. medullæ calsiæ fistularis, aut calsiæ tractæ, interdù etiam vnc. s. diacatholici aut diapruni solutui drac. iij. Apparentibus verò manifestis concoctionis indiciis, perseverantèque accessione, potissimum ultra tres periodos, vbi crisis aliqua non expectetur, purgans medicamentum exhiberi poterit: nanque iuuat in hac febre, vt inquit Galenus, per inferiores partes bilis expurgatio, & libro secundo de morbis, Hippocrate ascripto, reperitur: [si tertiana febris tenuerit, siquidem non omisis tribus inuasionibus, quarta corripit, pharmacum deorsum purgans, bibendum dato. & Actuar. cap. 19. lib. 3. suæ meth. med. his verbis clariùs id significauit, cum dixit: [febre verò leuiori facta modicè quoque purgantibus, refrigerantia ac humectantia medicamenta permiscentem, quò purgantia, quæ magna ex parte calida sunt, & turbandi vim obtinent, minùs offendant, vacuare oportet.] Quibus autem purgantibus medicamentis vtendum sit, præcedenti capite explicauimus. at qui deinceps cienda vrina erit ex iam dictis seminibus communibus frig. cum radicum & foliorum cichorij decocto: interim etiam apium, aut fœniculū adiecto, aut syrupum è tribus radi. præbeto, quo casu etiam, cum fiducia absinthium exhibere poteris vbi concoctionis signa monstrantur, quod alioqui summum est stomacho remedium, vbi bilis infestauerit Galeno teste, si præsertim ex ipsius coma (vt ipse inquit) quantum sufficiat, accipiens, mellicrato intinxis, tutius autem cum iam dicto cichorij decocto exhibebis. ex eodem quoque decocto cichorij, radicūque apij, & fœniculi, sudor prouocari poterit, si vnc. iij. vel iij. eiusdem præbebis, cum aliquo ex prædictis pastillis, aut etiam sequenti. Recipit autem diarhodon drac. s. triasantalati drach. j. seminū melonum drach. vij. sacchari dissoluti in aqua rosacea quantum satis sit, fiant in mortulis. Nec minùs prouocant balnea temperatè calida, ex aqua potabili, tum quia aliquid bilis educunt, tum etiam quia sua qualitate plurimum iuuant: nam huiusmodi balnea humectant, ac potentia refrigerant. semper autem oportet cōtrarias qualitates opponere illis, quæ præter naturam inualuerint, cum hoc multò plus iuuat, quàm quomodo libet euacuare, vt liquet citato primo de arte curat. ad Glauconem cap. citato. Illud tamen in memoria semper habeto, vt in tempore fiat: si verò etiam concoctionis signa ostendantur, tunc & si etiam sapiùs laueris, nihil deliqueris, vt ibidem liquet. Reliquis etiam medicamentis alterantibus, tum intus, tum extra adhibitis præcedenti capite explicatis, commodè vti poteris. Vnum tamen ma-

gnoperè necessarium pro curatione huius febris, definiendum restat. Num videlicet competat venæ sectio? Quam licet Galenus vniuersaliter commendauerit in de meth. meden. in omnibus febribus ex putredine ortis, superius annotauimus, eam tamen primo de arte curatiua ad Glauconem, pro exquisitæ tertianæ curatione subtrahit. Hunc nodum sic soluerem, quòd cum sine periculo sit, & citò iudicetur hæc febris, quantum in ipsa est, modò nihil in ea delinquatur, si quis eam solam inspiciens, venam secari non præceperit pro eius curatione, non errabit, id quod inspiciens Galenus (vt mea fert opinio) propterea in eius curatione eam non præcepit, sed ipsius bilis motum spectans, per eadem viam qua vergit, & à natura tentatur excerni, eam vacuari iussit. At si multa sit bilis copia, ex qua exquisita tertiana accenditur, coaceruata intra vasa, à quibus accessio- nis tempore excernatur ad sentientes corporis partes, si quis nō inspiciens bilem putrescentem solam, quæ accessio- nis causa est, sed eius copiam in venis, ac iocinore genitam, nondum tamen putrescentem, venam secari iusserit, nec rationi, nec Galeni sententiæ pugnabit. Taceo Arabes qui eam commendant, potissimum si reliqua omnia consentiant, eademque moderatè fiat, etenim leuata natura ab eo quo velut sarcina premitur, quemadmodum ipsemet Galenus fatetur citato lib. vndecimo de meth. meden. cap. 15. haud ægrè quod reliquum est, vincet: itaque proprii muneris haud oblita, & coquet quod coqui est habile, & excernet quod potest excerni. At si quispiam dixerit propterea non debere fieri venæ sectionem, quoniam Galenus eam non præcepit, citato libro primo de arte curatiua ad Glauconem, quemadmodum eam commendauit pro cura tertianæ nothæ, asserimus nos quòd si eam non commendauit, non tamen omnino negauit. nec obstat eam commendasse in cura tertianæ nothæ, cum de ea curanda magis dubium esset, num competet venæ sectio, quàm pro curatione exquisitæ tertianæ, eo potissimum quòd (vt diximus) imperum duntaxat putrescentis bilis, accessione facientis, spectauit, non negans quod vbi formidetur, propter eius copiam, naturam non posse eam euacuari, aut vix, & fuluiores apparuerint in primo circuitu vrinæ & crudæ, quod tutius erit statim venam secare, hoc tamen tanquam in vniuersali metho do explicatum, hic subtrahit. vbi igitur prædicta adsint, ac reliqua consentiant, confestim sanguis mittendus erit, hora tamen quietiori, & aliis quæ sapiùs diximus, seruatis: id quod confirmauit Actuarius præcitate loco, cum dixit: [nisi quid impederit, sanguis est detrahendus, etenim in omnibus propemodù febribus sanguinem mittere, nisi adsit quod interpellat, præstat.] Quæ etiam via, & ratione, & duplicem seu triplicem curabis tertianā, modò exquisitæ sint: nanque hæc non propter aliud fieri contingit, quàm propter multitudinem, & crassitudinem, ac bilis inæqualitatem, vt inquit Aetius citato cap. 79. libri quinti. Dignosces autem duplicem, aut triplicem tertianā, ex iam dictis signis. etenim & cum rigore vehementi irruent, & omnes prædictas habebunt notas in pulsibus, vrinis, ac reliquo corpore, & omnino similes accessiones erunt.

De tertiana notha dignotione, prognostico, ac curatione.

An sectio
venæ com-
petat in
tertiana
notha.

Duplicem
ac triplicem
tertianæ cu-
ratio.

Caput. IIII.



OMNIA, quæ in præcedenti capite tertianarum febrium indicia scriplimus, adfuerint, exquisitam reddunt tertianam, cuius accessionis tempus vt dictum est, breue existit: nam quatuor, aut quinque, aut sex, & longissimè vndecim aut duodecim horas cõplectitur: quarum etiam febriũ vrinæ tertio die, aut ad summum quarto coctionis signum ostendunt. Si verò aliquid eorum desit, non amplius exquisitæ erunt, nam quæcunque febris exquisitam simplicitatem seruauerit, vnã obtinebit formam, veluti regulam quandam aliarum quæ exquisitæ non sunt, etenim quæ aliquo modo ab illa defecerit, tantum etiam à febrium simplicitate recedet: vt liquet secundo de differ. febr. cap. 3. id quod tanquam proprium, nedum tertianis, sed singulis febribus intermittentibus primùm considerare oportet. Itaque in ipsis tertianis primùm distinguere opus est, si exquisitæ & (vt quispiam diceret) legitima sit febris, aut non exquisitæ, sed velut nothæ, Gale- no auctore primo de arte curatiua ad Glauconem, cap. 10. quantum enim natura differunt, tantum rationabile est, & victus rationem, ac reliquam curationem permutare, sunt nanque tertianæ quædam, quibus aliquid iam dictorum deficit, quæ non exquisitæ, sed simpliciter tertianæ appellantur, quarum accessio longius quàm duodecim horarum occupat tempus, adeò vt ad decem & octo perueniat horas, tantòque longiores sunt hæc tertianæ, quàm illæ quæ exquisitè dicuntur, quanto earum accessiones maiores extiterint ac longiores, si verò longiorem habuerint accessiõnem, intermissionem autem minorem, accessione videlicet in longius tempus protracta, quàm decem & octo horis, tertianæ extensæ vocantur: licet & hæc ipsæ extensæ tertianæ plurimam in eo quod magis, aut minùs differetiam suscipiant, nam licebit ex his aliquam simpliciter extensam nuncupare, quæ cum viginti quatuor horas in accessione consumpserit, reliquas habet febris expertes: aliquam verò sufficienter extensam, quæ vsque ad triginta extenditur horas, atque aliquam etiam in longius tempus productam, vt quæ vsque ad triginta sex horas protendatur, atque aliam adhuc amplius vsque ad quadraginta, vel plures: neque enim ex his aliqua certis terminis potest definiri. Et quanquam huiuscemodi nomina adeò curiosè inuestigare non sit necessarium, tamen clarioris doctrinæ gratia, præter exquisitam tertianam nominatam, quæ parum ab ea distat, simpliciter tertianam appellabimus, vt dictum est, deinde aliã paululum extensam, deinde aliã sufficienter extensam, aliam verò amplius, & deinde aliã plurimùm extensam, vt liquet secundo de differ. febr. cap. 8. nam si ea sola tertiana esset, quam exquisitam consuevit Hippocr. appellare, vtique simpliciter tertianam eã appellasset, & non exquisitam, quæ duodecim horis breuiorem accessiõnem habet. cum verò aliæ sint tertianæ iam dictæ quæ exquisitæ non sunt propterea iam dictam exquisitam nuncupauit, vt sexto de morbis vulgaribus, scripsit Galenus aduersus Agathinum, & eius sectatores, qui extensas tertianas non admittébant, sed eas semitertianas nuncupabant, differunt autem inter se accessiõnis longitudine, vt dictum est: qua etiam ratione magis, vel minùs ab ea quæ exquisitæ est, recedunt, nam quanto longior fuerit earum accessio, tanto

impuriore erunt: rarò tamen reperies febrem, quæ vltra tria interualla exacerbationem producat in vocatam integritatem desinere, vt liquet ibidem. Appellat autem Galenus interuallum, interstitium, seu spatium duodecim horarum, vt liquet secundo de crisib. cap. 3. Vt verò quibus valeat singulas, quas dinumerauimus tertianas nothas, seu non exquisitas dignoscere, illius signa explicauimus, quæ exquisitæ tertianæ maximè contraria existit, nam ex extremis determinatis, non difficulter inuenies intermedias, haud quidem numero paucas, vt Galenus refert citato lib. primo de arte curat. ad Glauconem, cap. 8. erit autem maximè cõtraria ea quam plurimùm, seu admodum extensam nuncupauimus, cuius accessiõnem vsque ad triginta sex, seu quadraginta horas, vel etiam plures diximus extendi. Quam tertianam sub exemplo adolefcenti cuiusdam, qui medio tempore inter occasum Pleiadum, & autumnale æquinoctium tali febre laborare cœpit, nobis significauit Galenus eodem libro primo de arte curatiua ad Glauconem cap. præcit. incipit enim febris hæc, quemadmodum in eo adolefcenti cœpit, haudquaquam cum rigore, sed cum horrore: quæ etiam neque in caliditate similis est exquisitæ tertianæ: mitior etenim est eius caliditas, neque adeò confectum per vniuersum corpus effunditur, neque etiam similatur ei in pulsibus, neque subsequitur bilis vomitus, neque sudor efficiens, sed pauci quidam humidi vapores exeunt in eius inclinatione, ex quibus febris pedetentim transpirat, ac vix intermittit, longo tamen tempore, cum eius accessio diutius producat, vt dictum est. pulsus verò minores, tardiores ac rariore sunt, & in dies duriores euadunt: permanet etiam in pulsibus intermissionis tempore febris signum satis manifestum, in quam febrem, licet adolefcentes, & iuuenes incidunt, non tamen ij, qui natura biliosi sunt, sed pingues, aspectu albi, qui in otio degunt, & crapulis, balneisque plurimis, & repletionibus vsi sunt, & propterea bene cibos, non concoquant: simulque eis aduenit pulsus durities in prima, atque secunda die mediocriter, in tertia autem, quarta, atque sequentibus vsque ad septimam, ad magnam peruenit duritiem: qui quidem multorum fore dierum, ac mensium, ægritudinem indicant: deinde paulò post tempore paulatim mollescere incipit, ac minores etiam quotidie fiunt accessiones; vrinæque meliorem habebunt subsidentiam, cum in priori tempore admodum crudæ fuerint: tardius etenim concoctionis signa apparent in hac spuria tertiana, quàm in exquisita. His itaque indiciis non exquisitam tertianam cognoscet, eã scilicet quæ exquisitè maximè contraria existit, reliquas verò intermedias, cognitis exquisitæ tertianæ indiciis, & huius non exquisitæ, eadem maximè contrariæ, non difficulter inuenies: & eatenus eas magis accedere, vel recedere ab altera earum percipies, quatenus plus, vel minùs eiusdem signa participabunt, ac earum accessio longius, aut breuius supra duodecim horarum tempus occupabunt. Hæc verò omnia prouenire censendum est, propterea quod bilis ex qua nothæ tertianæ accenduntur, amplius sincera non sit, sed alteri permixta humori, crassiori, ac frigidioris naturæ existenti; & prout frigidior, ac crassior fuerit ac maior eius copia cum bile permixta, eò impuriore tertiana fiet, accessiõnemque habebit longiorem, & intermissionis tempus breuius, quemadmodum in hac quam modò de-

Tertianæ
simpliciter
etiam non
exquisitæ.

Tertianæ
extensæ, sim-
pliciter, suf-
ficienter,
&c.

Comment.
& super text.
23.

Cap. 8.
Glauco.

Loco
to.
Comet
super
23. et
33. super
5. com.
per text.
Progn.
ta.

Ex
ram.

Minu
midan
mixta
ara
quam
plurim.

Cura
v. et
tis.

dò descripsimus, in qua multa admodum commixta est pituita copia, vt ex enarratis indiciiis colligitur, & propterea non ab re eam dicebat Galen. esse maximè exquisitæ tertianæ contrariam non negans quòd si minor sit copia pituitæ eidem bili permixta possit aliqua notha tertiana generari, quæ non adeò sit exquisitæ contraria, neque etiam eodem loco, aut alibi negare visus est, vt quidam iuniores Galenici sentire videntur, quòd eadem tertiana spuria gigni possit, atra bile, & non pituita ipsi flauæ bili permixta, quemadmodum etiam vniuersa Arabum schola admittit. Verùm de his particulatim haudquaquam verba fecit, excusans se, citato libro primo de arte curatiua ad Glauconem, quod cognitis extremis tertianis, hoc est exquisita, & illa quæ ei maximè contraria est, quam ipse figurauerat sub exemplo adolescentis, vt diximus, haud ægrè poterant inueniri reliquæ intermedia, quæ quidem numero pauce non sunt, vt ipse fatetur. Decepit autem hos viros quòd arbitrati sint aliam Galen. non nouisse tertiam notham, quàm eam de qua verba fecit præcitato libro primo de arte curatiua ad Glauconem, subcitato exemplo; non animaduertentes quod primo, & sexto de morbis vulgaribus, & secundo de differentiis febrium, plures conscripserit tertianæ spuria differentias; hoc verò in loco arte & breuitate quadam vsus, eam describens, quæ (vt diximus) extrema est, poterant reliquæ intermediae facillè percipi, quemadmodum etiam & curari. De hac quoque verba faciens, dicebat se vidisse aliquam tertianam notham in autumno incepisse, & deinceps vere terminasse: nam non omnes nothæ tertianæ in tam longum protrahuntur spatium, sunt nanque inter eas quæ citius terminantur, & eò citius quòd pulsus paulatim ad molliorem non longo post tempore ab eius initio tendant. similiter vbi non longo post tempore à principio, accessiones minores fiant, & in vrinis coctionis nothæ apparuerint meliores, subfidentem scilicet habentibus, quæ priori in tempore crudæ, aut minùs concoctæ visæ sint; quapropter interdum in sexaginta, interdum verò in quadraginta diebus terminentur: minùs tamen formidanda erit, ac citius quoque soluetur ea quæ ex atræ bilis permixtione generatur, quàm quæ ex pituita, in ceteris paritate seruata; quamuis nulla earum quantumuis impura & illegitima fuerit, ex seipsa periculosa existat, vt liquet aphorismo 43. libri quarti, nisi in aliquo fuerit delictum, nec opus est vt particulatim hic cuiuslibet signa conscribamus. nam si bili pituita permixta fuerit præter ea quæ diximus, quædam alia aderunt indicia ex eis quæ in capit. de quotidiana narrabimus, & prout plura aut maiora adfuerint eiusdem quotidianæ indicia complicata, aut minora, maiorem, aut minorem etiam permixtionem ipsius pituitæ coniectare licebit. perinde etiam existimare oportet, vbi atra bilis flauæ fuerit commixta; aderunt enim & nonnulla quartanæ indicia & pro eorum multitudine, aut paucitate, maiorem, vel minorem atræ bilis permixtionem percipies, ex cuius quoque notitia vnà cum accessione maiori vel minori longitudine prædicere poteris, num longiori vel breviori tempore iudicentur. Pariter etiam patebit curationis modus, vbi iam dictæ tertianæ nothæ, exquisitæ maximè contraria, curationem præceperimus, ac quotidianæ & quartanæ. Vniuersa itaque victus ratio pro eius curatione, non quæ refrigeret,

ac vniuersum corpus humectet, institueda erit, qualis in exquisitis exhibetur tertianis, sed & aliquem modum assumat ad calfaciendum & incidendum, eodem Galeno auctore, citato libro primo de arte curatiua ad Glauconem. quem etiam sectari sunt Paulus cap. 20. lib. secundi, & Aetius cap. 81. libri quinti, nimirum velut crassiore bile subiecta, & nõ valde calidiore, vt idem inquit Aetius. Prouidendum etiam pro viribus est, ne morbus augeatur, neque agrotantis vires prosternantur, quæ longiori tempore debent laborare, difficilè vero est seruare vtrumque, quoniam inedia, quatum profunt ad morbi coctionem, tantum, vel amplius officiant viribus, cibi verò quantum ægri vires adaugent, tantum coctiones impediunt sed id quoque noscere opus est, ad quantam magnitudinem perueniat morbus, ac quantæ sint agroti vires, vt ad ea inspiciens quæ maius auxilium exposcunt, inedia quidem in valentioribus vtariis viribus, & morbo coctu difficili, largiori autem cibo vbi vires sunt debiliores, neque morbus admodum concoqui contumax. hæc quidem & in omnibus aliis morbis considerare oportet, vt liquet ex eodem Galeno, & nos in vniuersali methodo fusiùs disseruimus. Maximè verò eis conducit pitisanæ succus iniecto pipere, hyssopo, aut origano modico, necnon & alia sorbitiones concoctu faciles, ex prædictorum auctorum testimonio. semper autè plenior victus in hac febre adhibendus erit à principio, quàm in exquisita tertiana. Reliqua verò quæ ad victum spectant, tum præcedenti capite de tertiana, tum sequentibus de quotidiana, & quartana sunt petenda, eatenus ipsum victum varians, quatenus ipsa tertiana notha ab ea quæ exquisita est, declinauerit. & cum accessione habeat longiorem, cibum non quotidie exhibere oportet, sed alternis diebus (nisi quippiam virgeat, vt in accessione cibum offeras) quanquam etiam exiguum magis, minùsque nutriendum, ac medicamentosus eo tempore exhiberi debet. Sed mirum sanè est de Alexandro, qui cap. 6. libri 12. adeò facillè putat Galenum condemnare, eò quòd condemnauerit pitisanæ succum paucò pipere, hyssopo, vel origano adiecto in hisce febribus, inquit, huiusmodi plerumque periculosa esse, & febres vehementiores accendere, idque magis adhuc si temperamentum corporis calidius inueniatur, & pituita minor quàm bilis; & quæ non adeò calefacientia requirat, parum (vt mea fert opinio) animaduertente quòd nec Galenus eis, qui ita laborauerint, eadem præceperit, neque vt eisdem immodicè vtatur cum pitisana: docet enim (vt diximus) eam notham tertianam curare, quæ alteri exquisitæ tertianæ maximè contraria existit, cuius exemplum paulò ante conscripserat in adolescente, circiter decimum octauum ætatis annum, albo aspectu, pingui, & sæpius antea in otio degente, ac crapulis, balneis plurimis, & repletionibus vsò: quæ quidem febris nec vehementior erat, neque in corpore temperamento calidiore, nec pituita permixta bili, adeò mitis, ac exigua erat, vt nõ etiam calfacientia requireret, simul cum his quæ refrigerant & humectant. In qua etiam febre ea quæ supra modum calefaciunt & exsiccant, ipsemet Galenum omnino vitauit, eodem loco. Conatur etiam idem auctor citato loco Galenum reprehendere, quòd pro curatione exquisitæ tertianæ, apparentibus concoctionis signis absynthij decoctum comprobet, tanquam valde nocuum ægris,

Cap. citato.

Resellit Alex. under reprehendens Gale.

Vide de absynthio cap. 3. huius partis cusa fin.

Ccc 2

calidum & siccum temperamentum habentibus, asserens se nouisse in quibusdam, qui immoderatus illud assumpsissent, particularum colligationem expertos esse, quibusdā partes solidas ficiore reddi, aliis verò bilem efferuescentem qualitate potius offendere, alium autem igneam intemperiem, aut inflammationem in ore vetriculi sentire. atqui ex eisdemmet verbis liberari à calumnia Galen. poterit cum immoderatum eius usum non commēdet, sed moderatum, ex ipsius coma quantum sufficiat accipiens. ad hanc quis vnquam arbitrabitur tanta posse prouenire incommoda ex absynthij decocto, modò immoderatus illo ægri non vtantur? neque enim tantam habet vim calfaciendi, licet amaroris particeps sit, cum & adstringendi facultatem habeat, plurimam etenim obtinet adstrictionem, vt sexto de simplicium medicamentorum facultatibus, liquet, maxime vbi ponticum sit, & propterea intus assumptū idoneum est medicamentum ad repurgandos meatus; gratumque est stomacho, adeo vt propterea neque igneam intemperiem, aut inflammationem in ore vetriculi proritare valeat. parcat itaque mihi Alexander in hoc, cum satis animosè, exigua seu nulla ratione promotus, in Galenum inuehere conatus sit. Nos verò ad pensum redeuntes, asserimus etiam, quòd pro potu vti poterunt hac febre laborantes cinnamomi decocto, aut hordei cum exiguo cinnamomo, & vbi admodum delitiosi sint, vt à vino abstinere nequeant, eo etiam vti poterunt, pauco, tenui, atque aquoso potissimum circa initia. nam procedēte tempore amplius offerri poterit, neque ita aquosum, modò tenuis substantiæ sit. Quòd si sanguinem mittere oporteat, neque hoc quoque omittendum erit, sed ab initio statim adhibita earum rerum, quas explicauimus distinctione, tantum mittendum, quantum præfens exigit status, eodem Galeno auctore erit: itaque secunda interna cubiti vena, vbi quippiam nō impediatur statim ab initio. Conferunt etiam clysteres, iique nō admodum molles, vt idem auctor inquit, qui parari poterunt ex maluarum, mercurialis, foliorum betæ, florum camomillæ, & hyssopi decocto, cui colato iuri, mellis rosacei vnc.2. olei communis, vel chamæmelini, & violacei vnc.3. vel quatuor, cōfectionis de dactylis dr.4. aut diacatholiconis, seu hieræ picræ simpl. vnc. s. salis communis drac.4. adiciito, & fiat clyster. extenuantes quoque modicæque calfacientes syripi exhibeantur, permisti cum iis quæ vim humectandi ac refrigerandi habēt, veluti syrupus acetosus simplex, rosaceum mel, aut ipsummet oxymel, cum syrupo de succo borraginis, endiuix, aut cichorij parato hunc in modum, Recipe syrui acetosi simp. mellis rosacei, aut oxymellis, & syrui de succo borraginis, endiuix, vel cichorij, ana vnc.1. aquarū cichorij, & borraginis vnc.3. misce. quibus sapius assumptis, apparentibusque concoctionis notis, aliquod exhiberi poterit pharmacum ex his quæ leuiter ventrem subducunt, vt rhabarbari dilutum, diaphænicon, seu diacatholicon, quod quidem hunc in modum componas, Recipe rhabarbari vigorati cum spica, diluti in vnc.2. succi rosarū, & per colum transfusi scrup.4. diacat. drac.7. aut diaphæniconis drach.4. mellis aerei vnc.2. cum aquis cordialibus fiat potus. Potes in vicem mellis aerei vti vnc.3. syrui de pluribus infusionibus rosarum, vel violarū, aut vnc.1. s. pulpæ calsi fistularis. Cum verò febris hæc ex crassiori accendatur bile, non vnicam

fortè purgationem duntaxat desiderabit, sed plures, quod quidem sub his verbis nobis insinuauit Alexander citato loco: [conuenit igitur, vt qui humores dissolutos nouerit, non modò semel exhibeat, quæ per aluum subducere possunt, sed etiam rursus humectante victu vsi, & dissoluentes, si quæ sicce & crassæ reliquæ subsint, iterum leuiter expurgent.] Quapropter vbi adhuc perseuerauerit, reliquis vtendum est syrups extenuantibus, ac aperientibus magis, vt syrupo de tribus radic. cum aceto, quo Neapoli vimur, aut syrupo de duabus, vel quinque radic. vel etiam acetoso composito, de bizantiis, aut de eupatorio, aut etiam oxymelite; quibus etiam adicias aliquem ex iis quæ refrigerandi vim habeant, vt syrupum de succo, vel infus. rosarum, aut de succo cichorij, seu borraginis. Quibus deinde sapius assumptis repetenda erit purgatio, eisque vtendum est medicamentis, quæ expurgandi crassiores bilem vim habeant, & propterea agaricum adiecto simul cum rhabarbaro, vel catapotia quædam tribus quæ ex eisdem figurentur, aut ex agarico & aggregatiuis pil. seu ex rhabarbaro, & eisdem pil. catapotia formato, drachm.1. pilularum aggregatiuarum, & alteram seu scrup.4. seu agarici, seu rhabarbari accipiens, à quorum assumptione, mellis aerei vnc.2. aut syrui de pluribus infusionib. rosarum vel violarum vnc.3. aut sacchari violacei vnc.2. s. præbeto cum aqua cichorij, aut buglosi. Conferunt etiam hoc in tempore ea quæ urinam ciunt, præterquam illa quæ supra modum calfaciunt & exsiccant, vt inquit Galenus, cuiusmodi est decoctum hyssopi, aut spicæ nardi, & post diem septimam danda est (vt ipse Galenus ait) iugiter absynthij coma. insuper pastillis in hunc usum vtantur, hoc modo confectis, Recipe diarhodon abbatris, & aromatici rosana scrup.2. seminum communium frigidorum maiorum, aut melonum duntaxat vnc. s. cum saccharo in aqua rosacea, & capillorum veneris, seu mellisophylli dissoluto, fiant pastilli, quibus vtantur cum aliquo ex prædictis decoctis, aut syrups, aut aquis cichorij, vel borraginis. multis quoque fuit auxilio oxymel e-potum, vt citatis auctoribus visum est. vomitus insuper post cibum adeo iis, quibus hæc febris perdurauerit, utilis est, vt multos sciam solis vomitibus statim fuisse curatos, vt Galenus inquit citato libro primo de arte curatiua ad Glauconem. Vbi verò adhuc perseuerauerit febris, neque iam dictis cedat medicamentis, iis quæ leuiter expurgant, semel saltem in hebdomada, vtare, vt troscis de rhabarbaro, seu de eupatorio, aut de absynthio cum syrupo de pluribus infusionibus rosarum perficarum, aut syrupo composito de cichorio Nicholi hunc in modum, Recipe troscorum de rhabarbaro de absynthio, aut de eupatorio drachm.1. dissoluatur in vnc.2. syrui de cichorio Nicholi, aut de pluribus infusionibus rosarum perficarum tantundem, & cum aqua mellisophylli, cichorij, aut capillorū veneris, fiat potus, vel ex drac.1. seu scrup.4. troscorum dictorum, tria catapotia formato cum melle rosaceo, seu oxymelite, & vtare. Et si videbitur, poteris post horam vel alteram vnc.2. dictorum syrupsorum cum iam dictis aquis simul exhibere. nec etiam parum efficaces sunt troscisci rosos, præsertim vbi admodum laborauerit venterculus, malèque concoxerit, & febris admodum producta sit, ac color ægri fuerit vitiatas, quorum poteris drachm.1. exhibere singulis tribus, vel quatuor diebus cum vnc.3. aut 4. decocti ex radicibus cichorij,

Cap. pro-prio.

Potus.

Vena sectio

Clysteres.

Syrupi.

Purgationes.

Potus
pochi-
tus.

Potus

Purgatio

cichorij, & paucō absynthio facti. conducit etiam non parum si vnc. i. vini albi odorati adicias. Iuvat insuper ex Galeni præcepto citato lib. de arte curatiua ad Glauconem necnon Pauli, & Aetij citatus locis, hypochondriorum calefactio seu fatus, at non indifferenter omnia calefacere oportet (vt sapius animaduertimus) sed ea quæ laborant. Quare laborante iocinore tales fiant fatus, Recip. cichorij, & fumariz an. manip. s. florum chamæmeli, meliloti, & fœnigræci an. drach. 4. summitatum absynthij, & rosarum an. manip. i. spicæ iunci odorati, cuiuslibet drach. i. bulliant secundum artem in sufficienti quantitate aquæ, deinceps acetum albi vnc. 2. vel 3. addito, & cum panniculis lineis in eo irrigatis, iecur sapius foueatur, inungatur demum hoc vnguento, Recipe olei rosacei, & de absynthio ana vnc. i. olei chamæmemelini, & amygdalarum amararum, singul. vnc. s. olei nardini drachm. 3. pulueris feminis lini, fœnigræci, & florum chamæmeli an. drach. 2. coral. rub. i. s. succi cichorij drach. 6. cum cera & exiguo aceto, fiat vnguentum. At si lien laborauerit, ac intumuerit, non iocinori, sed lieni calfacientes sunt approximadi fatus, quos hunc in modum componas, Recipe corticum rad. capparorum, & tamaricis an. dra. 4. scolopendrij, absynthij an. p. i. spicæ drachm. 3. lupulorum, fumiterræ singulorum manip. s. florum chamæmeli, fœnigræci, meliloti, feminis lini & anethi ana drach. 4. s. fiat arte decoctum in quatuor partibus aquæ, & vna acetum albi, & irrigatis in eo spongiis, fiant fatus, à quibus tale applicetur vnguentum, Recipe olei liliorum alborum, & irini an. vnc. s. olei de capparibus, & amygdalarum amararum an. vñ. i. nardini drach. 4. succi scolopendrij vnc. i. s. butyri recentis, & adipis anseris cuiuslibet drach. 4. pul. feminis lini, fœnigræci, & florum chamæmeli an. drach. i. s. cum aceto paucō, & cera, fiat vnguentum. huic etiam vnc. i. capparorum, aut tamaricis, interim etiā vnc. s. succi ciclamini adicere poteris. Vbi verò vetriculus primò affectus sit, aut etiam ob dicta hypochondria laborauerit, statimque sit oppletus, & sub tumida in facie decoloratio apparuerit, idem quod que fouendus erit, ex eo quod ita paratur fomento. Recipe summitatum absynthij, & rosarum rubearū ana manip. i. spicæ nardij, chie mastiches an. drach. 2. cinnamomi drach. i. s. florum chamæmeli, meliloti, & anethi, singulorum drach. 4. singula bulliant in tribus partibus aquæ, & vna vini albi odorati, vt conuenit, & spongiis in eo irrigatis, vetriculus foueatur. vel, Recipe vtriusque mēthæ & absynthij ana manip. i. chie mastiches, cinnamomi, ligni aloes, cort. citri, singulorum drach. i. maceris galangæ, an. scr. 2. florum chamæmeli, anethi, & meliloti an. drach. 4. rosarum rubearū manip. i. s. singula cōrundantur, & ex eis cum linteo lineo fiant faccelli, qui irrigati in sequenti decocto, calidi vetriculo applicentur. Recipe absynthij & rosarum rubearum, an. manip. s. cinnamomi, chie mastiches ana drach. i. fœnigræci, feminis lini, cuiuslibet drach. 2. ebulliant omnia in sufficienti quantitate aquæ, & vini albi, tribus videlicet partibus aquæ, & vna vini, & fiant fatus, quibus sapius adhibitis, licet eundem vetriculū hoc vnguento inungere quod accipit oleorum de absynthio, & mastichis ana vnc. s. olei rosacei, & amygdalarum amararum ana vnc. i. olei nardini drach. 4. corallorū rub. drach. i. s. cinnamomi, chie mastiches ana scr. i. vini albi, & ceræ parum, fiat vnguentū. Hęc satis esse puto pro tertianæ nothæ curatione, nam licet plu-

res, vt recensuimus, sint eius differentiæ, nō diffculter tamen earum curationem inuenies, vbi extremarum curationem non ignorabis; eius videlicet quæ exquisita est, & alterius quæ eidem maximè contraria existit; cuius curationē hoc in capite docuimus. Etenim prout magis, vel minùs ab exquisita recedit, ita poteris tam victus, quàm medicamentorum rationem permutare, ac pro eadē ratione permiscere. similiter pro diuerso humore qui permiscetur, poteris eadem etiam cōponere, nedum ex his quæ pro cura tertianarū explicauimus, verum etiam eis quæ sequenti capite de quartana, & alio de quotidiana conscribemus.

Exquisita quartana causa, dignotio, prognosticum, ac curatio.

Caput V.

ALTERVM intermittentiū febriū genus est exquisita quartana, quæ ex solo melancholico humore generatur, qui frigida & sicca constat temperatura, succenditur autē paulatim velut lapis aliquis, aut testa, aut os, aut tale aliquod huiusmodi corpus frigidum & siccum. verum si neque putrescat, neque vehemēter per sentientes corporis partes deferatur melancholicus hic succus, nūquam efficiet quartanæ exquisitæ circuitū, vt liquet secundo de differentiis febrium, cap. 5. quamuis Alex. cap. 8. lib. 12. velit quod quartanæ febris non vna sit species, sed multiplices, & diuersæ existant: etenim alia ex flaua bile nimium adusta, alia ex sæculento sanguine nascitur, quod quidem neque negare videtur Galenus tertio prognostic. quo loco quartanam (dicebat) ex melancholico humore consistere, atque ipsum duplici modo generari, tum ex sanguine crassiore, qui respondeat proportionē in venis, subfidenti faci in dolio vini, tum etiam flaua bile vehementer assata. Insuper illud confirmare videtur comment. 22. aphorism. tertij libri, sub his verbis: [quin etiam illo tempore quartanas febres fieri inquit (loquens de autumno) quia scilicet ex atra bile ortum habent, quæ duplicem habent generationem, alteram quidem ex flaua bile superassata, alteram verò ex sanguine crasso. Jex quibus indifferenter innuere videtur quartanā febrem generari posse, licet secundo de differentiis febrium (vt dictum est) contrarium sentiat. Verum ne quispiam putet sibi pugnancia conscripsisse Galenum, hunc in modum conciliandus erit, quod exquisita quartana, incipiens præsertim à solo melancholico humore frigido & sicco, temperaturam existente, ac vini faci simili, eoque putrescente, ac vehementer per sentientes corporis partes delato, generationem habet, quemadmodum ipse fatetur citato libro secundo de differentiis febrium, cap. 4. Nam licet frigidus natura sit hic succus, tamen cum putredinem sibi adiunxit, cuius causa febrem accendit, tantum possidet caloris, quantum etiam putredinis, vt liquet secundo de causis symptomatum. Eam verò quæ ita exquisita non est, neque statim ab initio inuadit, sed aliis febribus subsequitur inordinatis, seu (vt ita dixerim) erraticis, ex præassatorum, ac effluenscentium humorum, & veluti in cinerem versorum putredine, quando eadem affectio in cunctis fiat venis, ita vt in eis generetur atra bilis, non tamen quod eadem in eis putrescat, sed exuperet duntaxat, & deinceps accessiones tempore ad sentientes corporis partes transmittatur ac putrescat, generari contingit, potissimum vbi præcedens febris

Febris quartana multa species.

Super text. 27.

Loco citato. Conciliatio locorum Galeni.

Quartana febris ex bilis adustione generatur.

*Loco cita-
to.*

præter inordinationem intermiserit, atque ita per finem ætatis eueniat, autumnoque propinquet, ex Hippocratis auctoritate, citato libro tertio prognosticorum. & hoc modo, fortè subintelligere voluit Galenus eodem loco febrem quartanam fieri etiam posse ex atra bile, genita ob vehementer assatam flauam bilem, non autem synceram, sed ob veluti cinerem quandam vehementer assatorum humorum (inquit) quem natura non antea excreuit, putrem quandam recipientium affectionem: ex immodicè enim cocto, & feruente sanguine, veluti cinis quidam, atra bilis efficitur, ac quæ in eo tenuior pars continetur & biliosa, ac assata fuerit, in atram conuertitur, ex quibus quartana generatur vbi putrescant, & per sentientes corporis partes vehementer deferantur. & vbi maior fuerit superassata bilis copia, ex superassata bile quartanam generari fatebimur, non synceram, sed atræ bili ex feruente crasso re sanguine genitæ, permistam. nam pituitosus humor vique admodum minimè assari poterit, vt ex eo atra bilis, & deinde quartana generetur (quemadmodum Arabum principi, & sectatoribus eius visum est) bene autem ceteri humores. ex putrescente itaque melancholico succo, seu quod in sanguine crassum, ac veluti fixum est, immodicè excalefacto, per sentientes corporis partes delato, exquisita acceditur quartana febris, ac statim ab initio sæpius inuadere solet. ex putrescente verò, ac vehementer superassata bile, eaque haudquaquam syncera, & impermixta, perinde etiam vehementer per sentientes corporis partes delata quartana etiam interdum accendi poterit, non tamen statim ab initio inuadens, neque adeo exquisita; nunquam tamen ex superassata pituita. Quapropter neque sibi ipsi in hoc pugnantia cōscripsit Galenus, si quis autem velit cum Galeno facerè quartanam tam statim ab initio inuadentem, quam si alias consequatur inordinatas febres, semper à melancholico succo, natura frigido & sicco accendi, & non ex flaua bile assata, vtique non errabit: ait enim Galenus tertio prognostic. [sed si nō antea natura quodammodo excernat veluti cinerem vehementer assatorum humorum, hic rursus permanens in corpore, ac calefscens, putrem quandam recipit affectionem; idque quoties ei accidit, feruendo excitat febrem, quoties verò in cunctis venis eadem fiat affectio exuperante atra bile, quartana consistit febris. Jaque clarum est in Galeni doctrina per humores sanguinem semper subintelligere, vt nos etiam in præcedentibus adnotauimus, eoque magis hoc in loco, cum inquit, quoties in cunctis venis eadem fiat affectio, per quam videlicet veluti cinis vehementer assatorum humorum generetur, tunc enim exuperante atra bile, quartana consistit febris. per cinerem itaque vehementer assatorum humorum, non bilis, aut alterius succi intelligit, sed sanguinis, neque propterea quod duplicem dixit comment. aphorism. 22. libri tertij, habere generationem atram bilem, alteram ex flaua bile superassata, & alteram ex sanguine crasso voluit quod ex vtriusque quartanæ fiant febres, sed explicata duplici atræ bilis differentia, tanquam in aliis locis declaratum, ac manifestum, reliquit differere quod ex ea duntaxat quæ ex sanguine crasso generatur, fiant quartanæ febres; ex hoc nanque feruescente, immodicè cocto, & exusto veluti cinis quidam, nigra bilis efficitur, frigida quidem, eo quod terrea, caloris autem particeps, si-

*Pituita per
adulionem
in atram bi-
lem mutari
non potest,
contra Aui-
cennam.*

*Loco cita-
to.*

cuti cinis, & acetum, eodem Galeno auctore, tertio de causis symptom. Id itaque quod in sanguine crassum, & veluti fax existit, quando immodicè excalefactum exaruerit, fit atra bilis vt liquet 2. de crisib. & 2. de different. febr. Quare semper ex putrescente melancholico humore, seu atra bile, ex eo genita, quartana accenditur febris. Nam quæ ex superassata flaua bile, nigra bilis generatur, præter cetera mali moris est, & erodit, seu exulcerat partes vbi contingat plurimum colligi, & propterea ab ea quartana febris generari nequit. exulceraret etenim ipsas, præsertim si syncera esset, priusquam quartanam accenderet febrem, ac putresceret: demum ea putrescente & vehementiori motu per sentientes corporis partes delata, multo magis eas eroderet, cum mota mordacia excrementa magis lædant, quam quiescentia. verum interim exquisita, vbi syncerus fuerit talis melancholicus humor, interim non exquisita, vbi alteri humori fuerit permixtus, quartana accenditur, quemadmodum etiam de tertiana determinauimus. Nunc verò exquisitæ indicia explicabimus: ea etenim cognita, faciliè etiam non exquisita dignosci poterit. Hæc quidem manifestum sui præbet indicium in principiis accessionum, quando rigent adhuc qui quartana laborant: est etenim eius rigor non vehemens, quemadmodum in tertiana, sed mediocris seu paruus: etenim quartana febris non primo statim die cum rigore inuadit vehementi, verum ipsa progredientem atque aucta vna etiam rigor augetur, sensusque ægrotantibus adest: non quasi pungatur ac percutiatur corpus, sed frigefactionem similem habent, qualis per gelu tempore hyberno sentitur, cum ex frigido accenso humore ortum habeat, vt dictum est: necnon & cum quibusdam veluti contusionibus vsque ad ossa tendentibus, ita vt eos audire licebit dicentes quod videantur in ossibus pati laborem, & carnem habere contractam vt liquet 2. de crisib. cap. 3. quo etiam tempore eorum pulsus qui quartana laborant, satis tardi sunt, ac rari, parui, ac debiles, & magis quam in nulla altera affectione: nam quamuis in tertianis etiam parui, debiles, tardi ac rari cum inuadunt pulsus necessariò adsit, tarditas tamen, ac raritas non parum ab iis abest, qui in quartanis accidunt: nam in quartanarum principis videbitur ibi arteria quodammodo esse alligata atque ad interiora retracta, neque liberum habere ascensum; in tertianis verò, neque aliquid tale percipitur, tarditasque propè accedit ad eum, qui secundum naturam est motus, quapropter vbi quartanæ febres inuadunt, quamuis iuuenis ægrotus fuerit, talis sit motus arteriæ, qualis in ætate decrepita, in qua cum calor paucus existat, cui par quoque est generatio fuliginosorum excrementorum, spiritusque animalis nutritio, iure pulsus paruos, tardos ac raros habent, vt 3. de causis pulsuum cap. 5. scriptum est. Cum autem consistit atque etiam augetur huius febris accessio, necesse quidem est vt veloces fiant, atque frequentes pulsus, seruatur tamen & tunc ipsius tarditas ac raritas, si additam velocitatem atque frequentiam in accessionibus ratione perpendas: & quidem si comparaueris quartanæ febris consistentiam, tertianæ consistentiæ, non paulò velociores atque frequentiores in tertianis pulsus ostendere arteriæ videbuntur, & quæ etiam omnibus communis est febris in vno pulsu arteriæ inæqualitas, in quartana manifestissime licet

Ex qua

Ex

*Ex n
egri
Actu
Tepo
ne*

*Loco
to.*

*Loco
to.
Sudo
pia.*

*Non
fieri*

*Prog
ca.*

*Loco
to.*

*Cum
ter.*

licet comprehendere ex Galeni decreto libro 1. de arte curatiua ad Glauconem, cap. 6. Caliditatis quoque indicia diuerso modo se habent quàm in tertianis: nam æstus, & deullionem, & quendam veluti feruorẽ qualiter in tertianis videtur, in quartanis haudquaquam inuenies, vt liquet ibidẽ. Vrinæ quoque tenues, & albæ & aquosæ erunt, nimirum propter materiæ crassitudinem percolate, progrediente verò morbo, pro ratione coloratioris sunt, & subsidentiam habent crassam, Aëtio teste cap. 83. lib. 5. quo circa inquit Gal. citato libro 1. de arte curatiua ad Glauconem, cap. 7. in quartanis variæ erunt urinæ, sed crudæ omnes. Hæc igitur signa maxima sunt ipsius quartanæ. Verum non propter ea reliqua omittenda sunt signa, sed ægrotantis natura inspicienda, si in ea atra bilis abundat, & ætas, si senior sit quàm consistentiam, vt pote declinans, tempus quoque anni si autumnus, frigidam & siccam, ac inæqualem habens temperatam, in hoc enim magis sperabis quartanos circuitus fore frequentiores. similiter & loci natura inspicienda, si lien intumuerit, febrisque sine ordine antecesserit, si cibus, potusque, ac victus vniuersus, frigidus & siccus præcesserit, necnon si eo tempore quartanæ febres populariter fiant, quod si febris cessauerit, remanseritque adhuc in pulsibus febris signum, ac iidem pulsus iis qui secundum naturam sunt, ratiore, ac tardiores fuerint, proculdubio huiusmodi febris quartana censenda erit, vt eodem primo de arte curatiua ad Glauconem, scriptum est. huius etiam febris accessio temporis spacio est similis tertianæ, nonnunquam & longior, cum adhuc exquisita perseuerat, vt quæ ex frigidiore humore consistat in qua nec etiam bilis flauæ vomitus, quæ admodum in tertianis expectandus est, vt liquet 2. de different. febrium, cap. 5. & citato libro 1. de arte curatiua ad Glauconem. Sequitur autem sudorum copia circa exacerbationis declinationem: copiosiores etenim in hoc humore euacuationes fiunt, quàm in pituita, quoniam quicquid atræ bilis fuerit accensum, exhauritur, atque dispergitur. Eadem insuper in hisce febribus, atque aliis omnibus est causa, quæ differentiam facit longitudinis accessionum, quemadmodum in præcedentibus declarauimus, multitudo videlicet, ac humoris qualitas, vigor insuper ac virtutis imbecillitas, & præterea ipsius ægrotantis dispositio rara & densa: ex iis enim diuersitas assumitur. Exquisita autem, an non exquisita sit, nedum ex accessionis breuitate seu longitudine, sed & aliis quoque indicis percipi poterit. Neque enim omnia aderunt exquisitæ quæ explicauimus quartanæ indicia, sed nonnulla derunt, & alia quædam alterius humoris, cum eadem atra bile permisti, percipies. Ex intermittentibus verò febribus, quemadmodum tertiana breuissima quidem, & mitissima est, ita longior ac quantum in ipsa est haudquaquam periculosa quartana existit: quæ neque etiam statim ab initio inuadere solet, sed aliis quæ antecesserint febribus, præsertim inordinatis, subsequi, vt 1. de arte curatiua ad Glauconem, scriptum est: etenim admodum difficulter putrescit melancholicus humor, cum frigidus & siccus natura sit, promptius verò ubi prius effervesceat, ac supramodum exustus fuerit. Hippocr. verò 1. de morb. vulgarib. inquit, quod omnium est quartana securissima, facilissima, longissima, hæc enim non est ipsa quidẽ tantum per se talis, sed etiam

à magnis aliis vindicat morbis, & 6. eiusdem ait. Com. 6. su-
[quartana laborantes magno morbo non capiuntur: si prius autem capiuntur, & quartana superuenit, liberantur.] Id etiam confirmat aphor. 70. lib. 5. cum dixit: [à quartanis capti non admodum à conuulsionibus capiuntur: si verò capiatur, & quartana superuenierit, liberantur:] verum animaduersione dignum est per quartanas, intermittentes subintelligere Hippocrat. nam continuæ (licet perrarò eueniant, liquet 2. de differentiis febrium) cum nullam habeant usque ad iudicium molestiarum remissionem, sed perpetuò infestant, meritò graues & dicuntur, & sunt. oportet item quod ea genita sit absque lienis, aut alterius visceris affectu, quandoquidem ex liene sæpenumero grauiter vidimus (vt inquit Galenus) citato libro primo de morbis vulgaribus, homines febre laborasse quartana, ac deinde collecta aqua inter cutem, esse defunctos. Verum ipsa sua sponte quartana, absque alio visceris affectu, præsertim magno, periculo vacat, neminemque iugulat, vt inquit Celsus cap. 15. libro tertio, & ab aliis etiam morbis liberat, atque ita nouimus morbos comitiales fuisse à quartana, diutamen infestante, discussos: vt ibidem testatur Galenus, id verò nulli dubium est quod prius quartana febre laborantes, comitialis morbus adoriri nequit, quandoquidem iam adortum, superueniens quartana discutere consuevit: quo circa multò sanè magis ipsum impendentem arcere poterit, vt præcitato libro sexto de morbis vulgaribus, à Galeno scriptum est. Quartanæ insuper à splene initium fumentes, diuturniores sunt: sunt autem manifesta ex colore, & cruditatibus, & quod venter non facile egerit, & ex splenis tumore, & quod ad sinistram magis se reclinent: est autem periculum ne progressu temporis etiam in aquam inter cutem incidant, Aëtio auctore præcitato loco. At verò propter hepar inflammatum quartanarij, vt ipse inquit eodem loco, coloris sunt albicantis, & toto corpore tumidi, & vrine ipsæ valde rubræ, sandaracham referentes, & ad contactum tumor dextri hypochondrij occurrit, & hic etiam magis difficulter spirant quàm splenici, & subtrahunt, & postremum in hydropem ineuitabilem labuntur. Atqui aphor. 25. libri 2. Hippocrat. dicebat quod æstiuæ quartanæ magna ex parte breues fiunt, autumnales longæ, & maximè quæ hyemem attingunt, quamuis nedum de quartana verificetur aphor. Gal. auctore in commento, sed de quolibet alio morbo; nullus etenim æstate fit longus, Hippoc. verò de solo omnium longissimo fecit mentionem, veluti per exemplum de omnibus aliis ex isto præcipiens. Vetus verò quartana rarò, nisi verò soluitur, vt inquit Celsus cap. 16. lib. 3. omnium verò pessima est quintana; etenim & ante tabe, & ià tabidis superueniens perimit. septimana verò longa est, verum non letalis. Nonana hac longior etiã, at non letalis, eodẽ Hippoc. auctore præcitato libro 1. de morb. vulg. Cæterum quod ad curationem ipsius quartanæ attinet, illud primò seruare oportet, quod qui ea laborat, ab initio mediocriter ac leniter tractandi sunt, ita vt neq; aliquod ex fortibus medicamentis, neque vacuationem adhibeamus, Galeno teste præcitato libr. 1. de arte cura. ad Glauconem, cap. 11. quem sectati sunt Paulus cap. 22. lib. 2. & Aëtius cap. 84. lib. 5. victum itaq; instituere oportet optimum, minimèque flatuosum, arcendique sunt à carnibus suillis, atque ab omnib.

eduliis quæ tenacia sunt, & tardum habent exitum, ac quæ refrigerant & exsiccant corpus, ut ibidem à Galen. scriptum est: ob id boni succi cibi, concocti faciles, substantia non crassa, nec tenaci, tribuendi sunt, quemadmodum volatilia quæ in paludibus non degunt, ut Gallinæ, earumque pulli, similiter & columbarum, capi, perdice, fasiani, & reliquæ huiusmodi, insuper & qui non refrigerandi exsiccandique vim habeant, sed leuiter calfaciendi, ac humectandi corpus. Conducunt quoque pisces mollibus carnibus, nihilque tenacis habentes, & concocti faciles. Interim autem falsis quibusdam & sinapi in cibo uti poterunt, pro extenuando, incidendoque crasso humore: est etenim valde terrestri, ac crassius. Quapropter neque colymbades interdum, neque parui quidam pisciculi sale conditi vitandi sunt, in quem usum confert etiam, & quod Neapoli paratur condimentum quoddam ex sapa, & sinapis semine, pauco etiam adiecto cinnamomo, quâdoque uti, vino quoque vtendum est albo, & tenui, non autem aquoso, sed mediocriter calido, optimè diluto, aut aqua in qua cinnamomum fuerit decoctum. à frictionibus autem, ambulationibus, & balneis, atque aliis vſitatis arcendi penitus non sunt, quanquam omnino possent à balneis abstineri, solis contenti frictionibus quàm plurimum ex eo iuuamen admitterent, & si quartana febris brevis sit, neque admodum violenta, nihil nocuerit si diebus intermediis ad consueta exercitia se transferant laborantes. reliqua quæ ad victus rationem pertinent, nostro capite de melancholia studiosi petant. Illud verò haudquaquam prætereundum esse arbitror; quòd quartana laborantes, vbi vires non indicent, in die accessions minimè cibandi sunt, aut satis modicus eis exhibeatur cibus, isque per sex, aut saltem quinque horas ante accessiōem, aut eadem finita: etenim natura ipsa cibo non impedita, facilius humoris tum euctiōi, tum etiam expulsiōi vacabit. quod quidem confirmare videtur Actuarius lib. 3. suæ metho. meden. cap. 20. cum dixit: scæterum in omnibus accessiōnū annotationibus, ne aliquis in ventriculo sit cibus, qui mali pondus ingeminet studendum est. Nam cum natura tempore accessiōis ad propellendum ea, quæ affligunt exurgat, si quis intempestiue nutriendus illi obstitit, dubio procul quo minùs valide noxios humores adoriatur præpedit. Optimè iis quoque est ventrem quantum possibile sit, mollem facere his quæ vſitata sunt, quòd si ea nihil proficiant, clysteribus vtendum erit, à principio quidè mollioribus, postmodum acrioribus, ut idem Gal. inquit, molles quidè ex præcedenti capite de tertiana petas, aciores hunc in modum parabis, Rec. foliorum maluarum, mercurialis, betæ, & florum chamæmeli ana M. j. folliculorū senæ drac. 4. fursuris M. s. decoquatur omnia in sufficienti quâtitate aquæ, cui decocto per colum transfuso admisceantur olei communis, chamæmelini seu anethini vnc. 4. mellis rosacei vnc. 2. medullæ calsiæ fistularis, aut calsiæ tractæ vnc. 1. salis communis drac. 3. diacat. vnc. s. seu dra. 7. Interim confectionis de dactylis, aut hamech, seu electuarij indi drac. vel 3. adiacere poteris. Vbi verò sanguis abundare valde videatur, ab initio quoque venam secare licebit aliis consentientibus, etsi vena incisa, is qui fluit sanguis, niger & crassus videatur, audacius mittendus erit, præcipue verò in iis qui lienem laborant talis visitur. Quòd si flauus, aut tenuis

apparuerit, statim suppressendus est: venam verò secare oportet, aut interiorem, aut eam quæ est in sinistro cubito mediam, Galen. auctore citato lib. 1. de arte curat. ad Glauc. Secunda autem erit interna, aut media in sinistro cubito vena (ut Galen. inquit) si splenicus fuerit homo, Aëtio teste præcitato loco: nam si circa hepar fuerit affectio (ut ipse fatetur) in dextro secanda erit. Quamobrem non semper in quartanis febribus in sinistro cubito vena secanda est, sed interim in dextro Aëtio auctore, præsertim, si circa hepar magis quàm lienem laborauerit æger. Illud tamen perpetuò seruare oportebit, quòd si flauus, ac tenuis sanguis appareat, statim suppressendus est ex Galen. decreto, quancunque secaueris venam. A venæ sectione, quamuis Galen. omne vitauerit ab initio forte medicamen, ac vacuationem, quam non nisi coctionis indicia apparentibus admittere videtur, tamen vbi multa adsit atræ bilis copia, & quædam apparuerint concoctionis indicia, licet non admodum manifesta, seu perfecta, purgans aliquod, atque id lenè medicamentum exhiberi poterit. Nec propterea Gal. purgnabis cum fortem interdixerit ab initio vacuationem, quam etiam vitandum esse omnino arbitramur, quemadmodum leuem intermitimus: id quod puto Celsum subintelligere voluisse, quando aluum ducere præcepit post septimam diem, quam purgationem hunc in modum parare poteris, Recipe florum borraginis, fumarie, violarum, & hordei decorticati, singulorum drach. 4. vna passæ vinciatis detractis vnc. s. fiat decoctum in aqua fontis, aut aqua lactis caprini, cui per colum transfuso vnc. 2. mellis aceti, aut vnc. 1. s. medullæ calsiæ fistularis, vel vnc. 3. syrupi ex pluribus infusionibus violarum, vel 2. sacchari violacei cum drachm. 7. diacatholiconis adiecto: in vicem autem diacathol. vnc. 3. syrupi domini Augustini adiacere poteris, prius tamen quàm tale præbeat purgans medicamentum, syrupi aliqui, non semel duntaxat, sed sæpius exhiberi poterunt, etiam accessiōis tempore, potissimum sex à principio transactis horis, ut syrupus ex succo borraginis, fumarie, aut de pomis cum syrupo ex infus. rosarum, adiectis aquis melissophylli & borrag. his quippe purgantibus medicamentis, etiam si non satis manifeste, aut perfecte coctionis notæ apparuerint, citra noxam uti poteris, vbi ea adsint quæ paulò ante explicauimus. Atque hæc quidem in principio, & augmento faciendæ sunt. Si verò in statu morbi præcipue ægrotus esse videatur, aut propè statum, tunc subtilioris victus ratio est adhibenda quàm antea: statim quoque præcipiendum est, ut diu conquiescat, & visceribus prouidendo, vngendo, atque emplastrando, iis quæ mollire ac laxare possunt: deinde medicamentis vtendum, quæ ciendi vſnam vim habent: quamuis vbi coctionis morbi indicia apparuerint, tunc purgare oportet iis quæ humores atros exinanienti vim habent, non semel tantum, sed sæpius, si fuerit necessarium, ut inquit Galenus præcitato loco. Quamobrem & aliis quoque vtendum est syrupis, ac purgationibus validioribus: syrupis quidem, ut syrupo ex epithymo, ex duabus, tribus, seu quinque radicibus paratis, ac syrupo de bizantiis, cum eo qui è succo fumarie aut rosarum fit, simul permistis, adiectis etiam prædictis aquis, vel aquis lupulorum, scolopendrij, seu abſynthij, purgantibus verò medicamentis sequentibus vtare, Rec. florum viola-

Potus.

Frictiones
& exerci-
tationes.Tempus ci-
bi exhiben-
di.

Clysteres.

Venæ sec-
tio.Loco præ-
citato.Purgans
venæ sec-
tio.

Syrupus

Præ-
Gal.
mact
succo
naic
quan

violarum, fumariae, & borraginis singul. drac. 4. feneg & epithymi cuiuslibet drac. 2. s. scolopendrij, capillorum veneris ana drac. 2. vnae passae vinaceis detractis vnc. j. fiat decoctum in aqua fontis, in quo per colum transfuso, dissolvas mellis aerei, aut sacchari violacei vnc. 2. rhabbari in parte praedicti decocti infusi, & iterum per colum transfusi scrup. 4. spicae gra. v. diafenae drach. 3. vel 4. diacat. vnc. s. aut confectis hamech. dra. 2. s. Poteris insuper & eiusmodi capotitiis vti, Rec. pill. de lapide lazuli, vel de lapide armeno, aut aggregatiuarum drac. j. rhabarb. vigorati cum spica, aut agarici trocisc. scrup. 2. figurentur pillulae quinq; cu melle rosaceo, aut aqua melissophylli, a quibus post hora vel alteram absorbeat laborantes vnc. 2. mellis aerei, aut 3. syrapi e pluribus infus. violarum cum aqua borraginis, melissophylli, & scolopendrij. Et quoniam non semel tantum, sed saepius, vbi vltus vrgcat, praecipit Gal. purgans medicamentum exhiberi, quod vim habeat humores atros exinanienti, propterea eadem vbi oporteat repetenda sunt. in quem vsum etiam confert, si exhibeatur decoctum senae & epithymi in aqua lactis, senae & epithymi drac. 3. vel 4. accipiens, & vnae passae vinaceis detractis vnc. s. ex quibus arte in vnc. v. vel vj. aquae lactis fiat decoctum, & exhibetur. Hoc etiam tempore si pastilli quidam figurentur, ac exhibeantur, conferunt nedum in diebus intermissionis, verum etiam & accessions tempore, per sex horas post principium: vt, Recipe pul. diamarg. frigidi drach. i. diambrae, diarhodon, seu diamoschi dulcis, aut electarij de gemmis drac. s. vel scrup. 2. seminum communium frig. dra. 4. vel vnc. s. sacchari dissoluci in aqua rosacea & melissophylli quantum satis sit, fiant pastilli, quorum vnus vel duo praebantur cum 3. aut 4. vncis aquae borrag. aut scolopendrij, & melissophylli. insuper semel saltem in hebdomada, theriacae drac. i. exhibere poteris cum pauco vino albo odorifero, aqua scolopendrij aut melissophylli diluto. quam etiam per tres vel duas horas ante accessiorem fumendam esse commendamus, cum magnopere etiam rigori conduceret, apparentibus tamen coctionis morbi indicis, ac a purgatione (si modo eadem rite confecta reperiri valeat, quod mihi semper in dubio fuit, tum propter alia, tum vel maxime propter ipsius viperae cognitionem incerta) in hunc quoque vsum Galenus tanquam sibi familiare, & praeter ceteris laudatissimum, quod succu cyrenaicum recipit medicamentum eodem i. de arte curatiua ad Glauconem c. 7. commendauit. Est etenim quartanariis summè praesentaneum remedium, praesertim dum a rigore maximo tenentur, eodem auctore libro de rigore, tremore, palpitatione, &c. hoc medicamentum Aetius citato capite 84. lib. 5. hunc in modum descripsit, Recipe succi cyrenaici, piperis, myrrhae troglodyticae, & florum ruta viridium, singulorum aequales partes, singula seorsum leuissimè teruntur, & ruta cum melle trita excipiuntur, fiuntque pillulae de quibus aliquibus obolus vnus, alijs duo, exhibentur. sed quoniam citato libro de tremore & palpit. Galen. medicamentum ex cyrenaico succo & castoreo compositum commendat quartanariis, propterea si dimidia pars castorij praedictis adiciatur, non parum commendarem. Nam & ipse per tres, aut saltem duas horas ante accessiorem castorij & myrrhae cuiuslibet drachm. s. apparentibus coctionis signis manifestis, seu perfectis, cum vnc. 3. vini albi odoriferi diluti cum aqua

borrag. exhibere consueui, ex quo medicamento semper ingentem quartanariis vtilitatem prouenire conspexi, vbi tribus, vel quinque vicibus fuisset assumptum: nam castoreum potum rigores mitigat, & morbosam carnem consumit, & concoctionibus in venis opitulatur, & segnitiam ad motum eximit, vt inquit Aetius Archigenis auctoritate praecitato loco: & myrrha Dioscoride auctore horres discuit, duabus horis ante febrium accessiones, fabae magnitudine epota cum pipere & aqua vt ipse ait, nullum autem ex praedictis medicamentum ab initio exhibendum erit, aut omnino ante statum: nam saepius quae simplex est duplicem faciet, aut ex duplici triplicem, aut omnino maiorem ac difficiliorem reddunt, vt liquet ex eodem Galeno citato loco, nec minus etiam confert hoc in tempore vrinam cientibus vti, inter quae, praeter eos quos supra annotauimus, tum syrpos, tum pastillos, apij, ruta, & anethi decoctum ex aqua multa valde commendantur. At visceribus prouidendum erit iis quae mollire ac laxare valent medicamentis, quae capite de tertiana notha studiosi requirant, paucis quibusdam adiectis, vbi ea non suffecerint, inter quae sunt iris, chamæpithys, ruta, semen apij, feniculi, anisi, dauci, & cumini, potissimum vbi lien, aut ventriculus afficiantur. vtendum est etiam & vomitibus a cibo, & a raphanis, si nihil impederit. plerique enim ipsis assidue vti, partim perfectè à morbo liberati sunt, partim facile pertulerunt. Nam vna cum hoc quod euacuant ea quae stomachum infestant, etiam facilius concoquunt tales, vbi verò nihil iam prohibet, etiam album veratrum dandum est, primum quidem raphanis infixum, veluti in sermone de purgatorijs dictum est: postea verò ipsum per se, vt inquit Aetius citato loco, quem etiam vomitum a cibo cum iam dictis etiam albo helleboro & raphanis Galenus commendauit eodem i. de arte curatiua ad Glauconem. Id verò intelligendum est in iis qui prompti ad vomitiones sunt: nam qui vomere nequeunt, per inferiora valentius purgandi sunt, vt ipse ait, tutius autem pro ciendis vomitionibus oxymelitis, simp. vnc. ij. cum lib. s. aut vnc. 4. aquae tepidae exhibebis. interim ipsius raphani, seu radicem in eadem aqua facto decocto, aut adiectis eiusdem succi vnc. 2. vel tribus, ab albo helleboro aegros abstinendo, quoad fieri poterit. Alexander verò eodem cap. 8. lib. 12. vomitum omnibus vtilissimum esse fatetur, praesertim iis qui humores crassos in ore ventriculi continent. verum non a cibo, sed optimum eius tempus esse inquit, accessione incipiente, quoniam etiam tunc humores cum materia mouentur, & illi in stomachum confluunt, illumque rodunt & nauscam excitant. exhibet autem mulsam non nimis aquosam, ac praecipit anserinis pennis praecipue vtendum esse, vt maiori irritatu vomitus omnino proueniat, praesertim vbi humores valde lenti sint, ac difficulter auelli possunt, quo modo inueteratas quartanas discussisse fatetur, vt nonnullae ipsarum superata iam deteriore parte conqueuerint. porro quae de vomitu inquit Alexander, licet ab iis quae de eo praecipit Galenus, Paulus, & Aetius dissidere videantur, haud ægrè conciliari queunt: nam a cibo vomitus quem praecipunt iam dicti viri, eos exinanire videtur humores, qui futuram accessiorem excitare debet: & proinde aut ipsam prohibebit, aut saltem leuiorem efficiet, vbi potissimum praecedenti die ante accessi-

Lib. 1. c. 67.

Topica.

Vomit.

Cap. citato.

Conciliantur, Alexander cum Gal. Paulo & Aetio.

*Ostendit
Galenum
iniuria ab
Alexan-
dro repre-
hensum.*

tionem talis fiat vomitus: propterea id spectantes Galenus, Aetius, & Paulus, à cibo cum præceperunt, quò promptius crassiores succi aptitudinem quandam habentes ad futuram accessionem per cum exinaniantur. Alexander verò eos duntaxat tentauit per vomitum crassos succos exinanire, qui iam accessionem efficiant, & propterea incipiente accessione vomitum commendauit: insuper & motum eorundem humorum, ac confluxum in stomachum eo tempore inspexit, vt ipsemet eodem loco manifestauit. vterque igitur vomitus diuersa ratione iuuabit, vbi ad eundem prompti fuerint laborantes. Sed magis mirandum est de eo qui tam facile in Galenum inuehit, ipsumque condemnare tentat, quòd quartanariis omnibus (vt ipse ait) præcipere videatur idem Galenus non alium victum quam qui calfacere ipsos & siccare possit: præbet enim ipsis antidotum diatrion piperis, & quod diaspolites dicitur: item liquorem cyrenaicum, & theriacum, & in cibo salsamentum, & piper. hoc autem potissimum quotidie bibere iussit, & in vniuersum (vt fatetur idem Alexander) præcipit Galen. abstinere ab iis, quæ refrigerant & humectant, eo quòd humor (inquit) morbum efficiens frigidus existat, ex quibus siccantur, assanturque magis, ac crassiores redduntur qui quartanam efficiunt humores, vt ipse Alexander concludit. sed pace tanti viri dixerim, nimis animosè Galenum condemnare tentat. Nam arcendos esse qui quartana laborant ab omnibus eduliis, quæ tenacia sunt, & tardum habent exitum, ac quæ refrigerant exsiccantque corpus, præcepit Galenus, & non quæ humectant, vt ipse eidem Galeno imponit. est enim suapte natura melancholicus succus, seu atra bilis ex eo genita, frigida & sicca temperatura, caloris participans velut cinis, & acetum, vt vbiq; locorum ab eodem Gal. scriptum est, præsertim 3. de causis sympto. c. 2. similiter vbi putrefcat, adhuc frigidus & siccus est natura, tantam ex accidenti habens caliditatem, quantum habet putredinem, eodem auctore 2. de causis sympto. & hanc ob rem victum prohibens, omne quod refrigerat ac exsiccet, ex necessitate admittit, quod vim habet calfaciendi & humectandi. & si quandoque eis quæ calfaciunt, simul atque exsiccant vt præcipit, vt salsis, & synapi, diatrio piperis, & diaspolitico, quæ certis diebus assumenda esse dixit, non propterea condemnandus est; nam cum crassus valde, ac terrestris fuerit hic humor, qui quartana auctor est, non solum quæ proprio temperamento eius contraria existunt, calida videlicet & humida, sed quæ quodammodo eius substantiæ se opponunt exhibenda sunt. Quamobrem crasis quæ extenuant contraria sunt, & tenacibus quæ detegunt ac incidunt, vt II. de meth. med. c. 13. ab eodem scriptum est, extenuandi igitur gratia eadem assumere iussit & non semper, sed certis diebus, vt ipse refert, quasi dixerit quibusdam, ne ea proueniant quæ ipse Alexander fatetur incommoda, quo etiam modo neque ipsemet Alexander ratione coactus eodem loco inhiat. Quare non inconuenit, & si siccus natura fuerit hic humor, quandoque siccantibus vt pro eius extenuatione, præparatione, ac etiam euacuatione, per quæ etiam curatio per contraria efficitur. Nam licet frigidus & siccus natura sit hic humor, qua ratione quæ siccant non conducunt, quia tamen terrestris valde, ac crassus est, per ea quæ extenuant tanquam per contraria etiam curabitur;

qualia sunt quæ siccant, ac calfaciunt, nō tamen immodicè adeò vt assent. At si quispiam dixerit Galenum quartana laborantibus piper quotidie commendare, dicimus nos ipsam cum aqua potum admittere, & non solum. Atqui si cum aqua etiā quotidie bibatur, multam esse aquæ copiam, paucam verò ipsius piperis coniectandum est. quapropter non adeò valde calfaciendi ac exsiccandi vim habebit potus hic, quinimò leuiter calfaciendi potius & humectandi, simul atque extenuandi, & detergendi, vbi (vt dictum est) multa fuerit aquæ copia, exiguumque piperis recipiat. Theriacam quoque ac medicamen, quod succum recipit cyrenaicum probat; apparētibus prius coctionis morbi indicis, & posteaquam purgans medicamentum assumpserint, vt quod reliquum est ipsorum humorum euictorum iam ab ipsa natura, per eadem extenuatorum facilius possit expellere, necnon vt per ea partes corporis alteratæ, amplius in futurum eundem humorem non generent. pugnat itaque Galenus cunctis modò dinumeratis semper iis quæ præter naturam sunt, pro quartana curatione contrariorum vsu, tam victu, quam medicamentis, & prout vsus vrget diuersimodè, diuersisque in temporibus eisdem vt præcipit, & proinde nullum ex eorum vsu incommodum seu malum prouenire poterit, vt Trallianus persuadere conatur iis, qui parum artem medicam gustarūt, eo potissimum quòd quartanam Gal. exquisitam videlicet, à nullo alio humore quam à melancholico, seu faculento & crassiori sanguine, aut ex atra bile ex eo genita ortum habere arbitratus sit, quemadmodum supra explicauimus. miror insuper cur Aristotelem non legerit Alexander problemate 58. primæ sectionis, vbi habet quòd quartanis febribus victus calfaciens prodest, quia febris quartana imbecilla est: nam nisi imbecilla esset, quartana non fieret, & propterea ignem corpori inferendum esse præcepit: quo etiam curationis modo & duæ, vel tres quartanae, vbi exquisitæ fuerint, necnon & continuæ, quamuis raro eueniant curari poterunt, modò febris valida non fuerit, quomodo autem continuæ febres omnes dignoscantur, & ab intermittentibus discernantur, Galen. docuit I. de arte curatiua ad Glauco. cap. 5. & 8. & nos in secunda huius operis parte, modum generationis earundem demonstrauimus. Vbi verò non exquisitæ fuerint, pro diuerso humore qui eidem nigra bili permiscetur, ac diuersa etiā quantitate eiusdem curationem variare licebit, habita ratione humoris, qui cum eadem nigra bile permiscetur, quod quidem in continuis semper perpendere oportet: nam cum sanguine saltem perpetuo permixtus est humor. At præter iam dicta medicamenta serunt (inquit Dioscorid.) tres plantaginis radices cum tribus vini cyathis, & pari aquæ modo tertianis auxiliari, & quatuor quartanis. & capite de trifolio, bituminoso videlicet (nam hoc per trifolium intelligit) inquit: quidam terna folia aut semina in tertianis cum vino potui dedere, & in quartanis quaterna, vt quæ febrium circuitus discuterent. Aetius præcitato loco, Dioscoridis etiam auctoritate easdem plantaginis radices quatuor siccas tritas in vino bibendas esse fatetur. similiter conferre (inquit) si verbenaca rectæ quartus à terra geniculus tritus cum vino poterit, in tertiana verò tertius: quamuis Dioscorides de supina verbenaca, & non recta idē asseruerit. insuper radices libanotidis dra.

1. si in vino etiam exhibeatur confert. & ne sic doctissimum Alexandrum deseramus, medicamenta quæ appendi solent ab eodem conscripta quædam hic annotare placuit; inquit enim multis experimentis sæpe ab eo comprobatum fuisse quod scarabeus quartanarios curat; oportet autem ipsum vinum extrinsecus fuluo lineoleo firmiter alligatum collo suspendere. dicunt autem hoc ipsum præstare si ita appedatur. Referunt quoque si quis ex gena hirci pilos excerptos ægros alliget, mirabiliter quartanæ posse mederi, omniumque naturalium medicorum testimonio firmatum esse fatetur, sanguinem, qui primus à virgine fuerit excretus, naturaliter quartanæ aduersari. Similiter etiam corruptæ sanguinem efficere, si quis ipsum ægro ad brachiale dextræ manus, aut eiusdem brachium alliget. Hæc ex Alexandro hic conscripsisse libuit, cum Galeni doctrinæ non pugnent. Quæ verò aduersus eum scribere ausus fui, insoluta non deferuisse, quo Galeni veritas elucescat, non ab re arbitratus sum. Ad hæc fatetur quoque Dioscorides quod vermiculi in duplici capitulo inuenti in aluta clausi tum collo brachiōve hominis alligati, quartanas finiunt febres, sinit & easdem cum etiam & tertianas hypericum in vino potum. Insuper id buglossum quod quatuor tantum caules protulerit totum cum radicibus ad tertias decoctum quartanariis adbibendum datum, confert: bibuntur etiam pentaphylli folia in dulci aqua, aut diluto vino, addito exiguo pipere contra circulares febres, quartanas quidem ex quatuor ramulis, tertianas tribus, quotidianas vno. quatuor quoque heliotropij semina cum vino pota ante accessiones quartanas, tertianas verò tria finire febres idem inquit Dioscorides.

De exquisita quotidiana dignotione, causa, prognostico ac curatione. Caput VI.

EST altera & tertia exquisita simplicitatis febris, quæ ex pituita putredine ortum habet, per sentientes corporis partes à natura detrusa, Græcè ἀμφοτέρως, Latine quotidiana dicitur, licet à quibusdam iunioribus medicis κατὰ μέρους ἢ μεθ' ἑαυτὴν appellari solet, præsertim vbi ad integritatem non desinat, vt 1. de morbis vulga. & 2. de diff. feb. scriptum est. At Gale. quotidiana etiam continuas ἀμφοτέρως cum hac adiectione, continuas nominare consuevit, fateturque hoc vocabulum κατὰ μέρους nusquam apud Græcos scriptum reperisse, vt liquet 2. de diff. feb. verum quoniam (vt inquit Plato) non est habenda de nominibus cura, nos hanc febrem quotidianam simpliciter, nulla alia sermone facta adiectione, interim verò intermittentem appellabimus, quæ non ab re ἀμφοτέρως Græcis vocatur: etenim de ambabus participat, die videlicet & nocte, vniuersum tempus accessiones faciens horarum plerumque 18. Aërio teste cap. 85. libro Quinto, hæc febris incipit ab extremorum frigeactione, atque horrore potius quam rigore, vt patet eodem 2. de differ. febrium, cap. 4. quinimò rigor eam non antecedit, neque statim ab initio, neque in progressu, sed refrigerationes potius quam rigores ipsis adueniunt vt 2. de crisib. ca. 5. scriptum est. Quarum etiam caliditatem humidiorum cum quadam acritudine esse oportet, non cum primū manus admouetur confestim occurrentem, sed per moram. Nam quædam fumosa caliditas cum

multo vapore commista exire videbitur cum magis ignis in multo humore suffocetur, vt inquit Gale. 1. de arte curatiua ad Glauc. cap. 7. quàm ipsum possit cōvincere. Cum itaque in primo tactu calor quidam potius vaporosus quàm acris se manui repræsentat, at per morā paulatim mordacitas aduenit, ac maximè inæqualis, adeo vt per colum quoddam & cribrū percolari videatur, ex pituita putredine huiusmodi febrem oriri cognoscas, eodem Gal. teste præcitato lib. 2. de differ. feb. cap. 9. & 1. quo loco causam reddit, cur in febribus aliis calor æqualis occurreret, quæ verò ex pituita ortum habent, talem caloris inæqualitatem ostendunt: inquit, quod nulla potior causa sibi visa est, quàm tenacitas, atque humoris crassitudo, qui difficulter dissoluitur. Nā & in hoc sicut aliis omnibus primò ea pars omnis expirat, quæ fuerit extenuata, vix autē extenuatur quicquid valde crassum extiterit, quod si etiam natura frigidum fuerit, tunc & difficultas augetur. Non itaque totus humor, neque ex omni parte æqualiter, sed ex illa tantummodo inquam putredo inualuerit inflatur, atque extenuatus effertur. Hæc ille. Cum primū autem accessiones fiunt, neque vllus ordo, aut æqualitas pulsibus assidet, vt liquet 2. de crisib. qui etiam pulsus in his febribus multo minores sunt pulsibus quartanarum, quàm istarum pulsus pulsibus tertianarum, vt patet eodem 1. de arte curat. ad Glauc. Nam humor ex quo febris hæc constituitur, frigidus est, & humidus temperatura, lentus autem, & tenax in consistentia, ita vt magis ignis in multo humore suffocetur, quàm ipsum possit cōvincere, vt dictum est. Tarditas verò pulsus in vtrisque febribus tā videlicet quartanis, quàm quotidianis, eodem modo se habet, inquit Galenus, verum tanto rariores sunt in quotidianis intermittentibus pulsus, iis qui in tertianis, quanto quotidianis, pulsus quartanarum: nam cum in tarditate eodem modo se habeant, verum multo minores sint pulsus in quotidianis, quàm pulsus quartanarum, & magis recedant à paruitate ab eis qui in quartanis fiunt, quàm pulsus quartanarum, à pulsibus tertianarum, propterea licet in quotidianis rariores sint pulsus quàm in tertianis, tamen pulsus quartanarum tantò illis rariores sunt, quanto quotidianarum pulsus, pulsibus tertianarum: expletur enim magis vsus in quartanis, cum non adeo minores sint pulsus, veluti in quotidianis, & propterea pulsus rariores fiunt quàm in quotidianis, licet in tarditate eodem modo se habeant. Sunt itaque quotidianarum intermittentium pulsus minores pulsibus quartanarum, æquè tardi, licet minùs rari, opprimunt autem atque aggrauant aliquando virtutem humor qui quotidianam constituit. hinc inæquales, & debiles magis, ac paruus efficit pulsus, quamprimum ea inuadit, atque inualefcit, vt secundo de differ. feb. scriptum est, cap. præcit. Sed dices, Galenus secundo de crisib. cap. 3. loquens de quartanis asserit, quod hæc paruus, & debiles, & tardos, & raros adeo pulsus faciunt in inuasionibus, sicuti nulla altera dispositio, ita vt quamuis iuuenis fuerit agrotus, talis sit motus arteriæ, qualis in ætate decrepita, ergo sibi ipsi pugnat cum dixit 1. de arte curatiua ad Glauc. c. 7. quod minores sunt pulsus in quotidianis quàm in quartanis. Tu verò hoc modo eius dicta conciliabis, verissimum esse affirmans, quod in quartanis paruus, & debiles, & tardi, & rari pulsus sūt, in inuasionibus, magis quàm in ceteris

Cap. citato.

Cap. citato.

Obiectio quam diluit Galeni locos duos.

Coment. 3.
super text. 4.
cap. 7.
loc. præcit.

Signa febris
quotidia-
næ.
Horror &
extremorum
refrigeratio.

Caloris quæ
lib. 4. cap.
185.

aliis dispositionibus, ac febrib. Verum non inconuenit quod in aliqua alia febre minores duntaxat pulsus adsint, quemadmodum de quotidianis asseruit citato loco primo de arte curatiua ad Glauconem, sed neque deunt laborantes hæc febres, neque denudare corpora, & pallia iactare coguntur, neque multum, aut frequenter respirare, ac veluti flammam ex ore efflare, frigidumque potum expetere, quemadmodum in tertianis, minimèque sitiunt, vt 2. de crisi bus scriptum est cap. 5. minùs etenim siticulosa hæc febris est, tantumque eam quartana excedit, quatum istam tertiana. lingua verò, & totum corpus siccissimum est in tertianis, in his febribus humidissimum. Vrinæ in primis diebus tales sunt, quales in quartanis incipientibus adsunt, inquit Galen. 2. de crisi b. c. præcit. At 1. de arte curat. ad Glauconem, c. 7. ait, quod in quotidianis urinæ vel albæ sunt, & tenues, vel crassæ & turbulentiæ, vel rubidæ. Aetius verò citato cap. 85. lib. 5. id declarauit asserens, quod urinæ in primis quidem diebus albæ & tenues minguntur, postea verò crassæ & turbatæ fiunt, quoniam humor concoquitur & euincitur, ac etiam expurgatur per eas; qua etiam ratione rubidæ fieri possunt: vomitus etiam pituitosi, & quæcunque per ventrem excernuntur, frigidiora sunt, atque humidiora, crudiora, aquosiora, & pituitosiora, vniuersum denique corpus in his febribus plenum crudis humoribus inuenitur, vt citato libro 1. de arte curatiua ad Glauconem, scriptum est in primis diebus minimè sudant, sed progrediente tempore hoc etiam illis aduenit, qua ratione ad integram quietem manifestè exceptis paucis, non perueniunt; & quidem ætatibus, naturis, anni temporibus, & temperaturis humidioribus accidunt. Nam iuuenem biliosa ac sicca natura nunquam vidi huiusmodi corripit febre, inquit Galenus. Pueri autem, & maximè paruuli, & ex iis qui iam perfectum corpus habent senes, pituitosi, & habitus crassi, atque otio plurimo dediti, crapulis, ebrietatibus, balneis alsiduis, post cibum præsertim vtentes, à quotidianis facillè capiuntur. loca etiam humidiora atque ex anni temporibus hybernum, & ex constitutionibus humidiores, hanc præcipuè afferunt febrem. ac perrarum est, quin & os ventriculi, & hepar in ipsis malè afficiatur, sed & cruditates antecedunt plurimæ, & coquendi moræ, & acidi ructus, & cum primum febre incipiunt, præcordia ultra naturalem habitum intumescunt, magna verò ex parte inflantur, ac distenduntur; color iis cum palliditate albus, etiam cum accessio ad statum venerit, & accessionum principium sub vesperam inuadit. Quod si sit etiam populo communicata, tunc præter ea quæ ante diximus signa, hoc quoque non parum ad hanc febrem dignoscendam conducit, quæ omnia eodem libro 1. de arte curatiua ad Glauconem. 2. de crisi bus. & 2. de differen. febr. à Galeno scripta sunt; & magna ex parte ab Aëtio præcitato loco, & Paulo cap. 23. lib. 2. ac Alexandro cap. 7. lib. 12. quo in loco modum etiam docet dignoscendi hanc febrem, quando germana, seu exquisita fuerit, & quando non exquisita, asserens quod quandoque indicia omnia simul adsunt, interdum non, in germanis ac exquisitis vniuersa prope inueniuntur, in falsis autem non omnia, sed quædam ipsorum adsunt, quædam non semper, propter varias ipsarum causas, qua etiam ratione in curatione differunt, quemadmodum de reliquis dictum est. Cæ-

terum cum quatuor sint pituitæ species, vna videlicet dulcis, altera salia, tertia acida, & quarta vitrea appellata, aut saltem si diuersos earundem duntaxat sapores spectes, tres, dulcis inquam, salia, & acida: nam & vitrea pituita acida qualitatè est particeps, vt liquet lib. de multitudine, & 2. de diff. febr. cap. 11. quæreres à qua istarum pituitæ specierum quotidiana ortum habet, num à quibusdam, vel ab omnibus? Huic cum Galeno satisfacimus quod à quauis earum, vbi putrescat, & per sentientes corporis partes deferatur, quotidiana accendi potest febris, quemadmodum idem Galenus sentire videtur citato lib. 2. de differen. febr. c. 6. ex cuius etiam auctoris verbis facillè percipi poterit modus dignoscendi ac distinguendi, quando ab vna seu ab altera pituita specie quotidiana accendatur. Nam vbi ex dulci pituita ortum habeat, aut etiam acida, verum non vitrea existente, accessio cum extremarum partium frige-factione incipit, frigit autem magis in acida, quam in dulci, vt pote quæ frigidior sit. At si ex falsa pituita quæ talis sit, aut propter putredinem, aut propter falsæ serosæ humiditatis permulsionem, febricitare contingat, accessio incipiente horrent potius quam rigent, & hoc est illud quod voluit inuere citato loco Galenus cum dixit: [incipit autem ab extremorum frige-factione, atque horrore potius quam rigore:] ex dulci enim & acida pituita extremæ partes refrigerantur: vbi verò falsâ, hanc efficiat febrem, horrent potius febrientes in accessionum initiis. At si ab acida, ac vitrea pituita ortum habet hæc febris, si modica aliqua fiat eius putrefactio, febrem epialam appellatam, inducit, in qua non modo rigent, fed etiam febricitant agrotantes, atque eodem tempore in toto corpore vtrique sentiunt affectum. si verò vehementius putrescat, rigor quidem antecedit, febris verò sequitur superata frigiditate à multitudine caliditatis, inquit Galen. eodem loco, adeo vt dum febris inualefcit, atque consistit minimè sentiat. Verum vbi per sentientes corporis partes deferatur hæc acida & vitrea pituita nondum putrefacta, sine febre rigores generat. Quantum verò ad fomnos attinet, ex prædictis quidè pituitis omnibus, paulò supra modum naturæ sunt, & crudus, seu vitreus humor perinde, ac dulcis pituita aperte somnulosos facit, vt liquet citato lib. de multitudine. Sed statim hæc fitabis, si Gal. 2. de crisi b. scriptum reliquit, quod in quotidianis non antecedit rigor, neque statim ab initio, neque in progressu, sed solum frige-factio, aut eodem 2. de differen. febr. dixit quod hæc febris quotidiana incipit ab extremorum frige-factione, atque horrore potius quam rigore, quomodo post pauca citato loco fatetur in epiala febre, quæ ex genere quotidiana est, insimul rigere, & febricitare laborantes, & si vehementius putrescat humor, rigorem antecedere, febrè verò sequi. Atqui dicimus nos in exquisitæ simplicitatis quotidiana, neque rigorem statim ab initio, neque in progressu, sed solum frige-factionem antecedere: hanc autem generari asserimus ex dulci, seu acida pituita, quæ vitrea non sit, vbi prius putruerint, & per sentientes corporis partes deferantur; nam alias (vt sæpius dictum est) febris hæc non accenditur, si verò quosdam febricitare hæc febre contingat ob falsam pituitam, horrent tantummodo, & non rigent superueniente accessione, cum non adeo mordax & frigidus sit humor hic, quemadmodum vitreus, nec adeo exquisita quotidiana

quotidiana ab eodem humore constituitur, velut à modo dictis aliis duabus speciebus, præsertim vbi eadem propter falsæ serosæ humiditatis missionem generetur, minus etiam frigidus existit quàm dulcis, & etiam acida pituita, & propterea horrore potius, quàm frigefactione, aut rigore incipit quotidiana ex falsa pituita genita, vbi verò vitrea atque acida pituita modicè putrescens, per eandem sentientes corporis partes deferatur, febrem epialam appellatam inducit, quæ nec verè quotidiana, nec exquisita à Galeno nuncupatur, sed ait eam progredi in quotidianæ figura, quòd si vehementius putrescat, rigor quidem antecedit, febris verò sequitur, superata frigiditate à multitudine caliditatis adeò, vt dum febris inualefcit atque consistit, minime sentiantur rigor, quæ etiam febris cum ex eodem humore vitreo generationem habeat, licet vehementius putrescens, eiusdem erit quoque generis cum ea quæ propriè vocatur epiala, quam non veram quotidianam appellari, sed in quotidianæ figura progredi diximus, quapropter non inconuenit qd in his febribus rigor incidat aut quòd simul febri- cident & rigeant, atque eodem tempore in toto corpore vtrunque sentiant affectum, vt in ea febre quæ propriè vocatur epiala, aut quòd rigor quidem antecedit, febris verò sequatur, eodem humore vehementius putrescente, neutra tamen earum nec vera, nec exquisita quotidiana dicitur, licet in eius figura progrediatur, sempiternæ itaque veritatis erit Galen. sententia, quòd in quotidianis veris, ac exquisitis rigor non antecedit, neque statim ab initio, neque in progressu temporis, sed aut ab extremorum frigefactione incipit, si exquisitæ simplicitatis febris fuerit, vel ab horrore, si non adeò exquisitæ simplicitatis fuerint quotidianæ febres, vt pote quæ ex falsa pituita ortum habeant, quæ verò cum rigore inuadunt, veræ quotidianæ dicendæ non sunt, licet in eius figura progrediantur vt dictum est, ortu siquid ex pituita vitrea vel modicè, vel vehementius putrescente, ac per sentientes corporis partes delata. Ex quo etiam tamè humore quotidiana intermittens generetur, longa est, & non sine periculo, vt liquet i. de arte curat. ad Glaucon. cap. 8. etenim nunquam eam verè intermittere dixeris, minus tamen diuturna erit, ac minus periculosa ea, in qua citius sudor apparuerit, coctione tamen præcedente, quæ verò ex vitrea pituita ortum ducit, est valde diuturna, & difficulter solubilis, vt liquet citato libro 2. de differen. febr. cum frigidus magis, crassius ac tenax fuerit humor, sunt autem febres quarum quædam interdum tenent, nocte intermittunt, quædam nocte tenent, die intermittunt, quas Hippocrates nocturnas & diurnas appellat i. de morbis vulgaribus, & Galenus ad quotidianas reducere videtur, harum nocturna non admodum letalis, lingua tamen est, diurna longior, sunt quibus ad tabem vergat, vt idem inquit Hippocrat. cuius causam Galenus reddit in commen. si verò exquisita non fuerit quotidiana, breuior erit quàm exquisita: nam quemadmodum exquisita tertiana, vt diximus, breuis est temporis, sic quotidiana, & quartana cum exquisitæ fuerint, sunt diuturniores Galeno teste i. de arte curatiua ad Glaucon. cap. 8. Quod ad curationem huius febris attinet, vniuersa victus ratio extenuans ac incisoria esse debet, quapropter aer eligatur ad calidum & siccum vergens, modicè tenuis, purus, ac clarus, qui si natura talis nõ

fuerit arte paretur, somnus esto mediocris: pro motu seu exercitio, frictions adhibeantur, præstat singulis diebus aluum adstrictam glandibus, aut clismatis inanire, animi affectus omnes vitandi sunt, cibum boni succi, nec crassum æger sumat: permiscenda autem cibo sunt quæ incidere, tenuare & meatus obstructions liberare possunt, non tamen admodum calida esse debent, vino potandus est æger tenuiori & paucifero in morbi principio. At vbi iam tenuior humor dissipatus est, etiam ruffiore, ac si licet tota victus ratio in calidiorem migret ex Actuarij sententia libro 3. suæ meth. cap. 20. eligantur itaque pro cibo gallinæ, gallinacique pulli, capri, perdoes, fasiani, aliæque aues non in aquis degentes, passerculique omnes; interim quoque & lepuseulorum, capreolorum, seu cuniculorum caro exhibeatur: irem & vitulina, hædina, & iuuenum castratorum: gallinarum autem, pullorumque gallinaceorum ac caponum caro interdum confusa, aut alio modo liquata, quomodo iura quædam Neapoli parantur, exhiberi poterunt, in earum autem iure seu decocto quædam extenuandi ac incidendi vim habentia decoqui possunt, vt hyssopus, radix apij, petroselinij, aut fœniculi, & reliqua huiusmodi, interim confert eas in ptisanæ succo decoquere; habet etenim & ipsa ptisana leuem quandam extenuandi atque incidendi vim, licet humidum præbeat alimentum, vt liquet libr. de ptisana, similiter & cinnamomi modicum cū iam dictis cibis permisceri poterit: conducunt quoque cappares cum aceto conditi, interim etiam exiguo melle adiecto, & inter fructus vna passa, panis exhibeatur optimè fermentatus, modico sale adiecto, & post primos morbi dies, si seminis fœniculi aut anisi quippiam imposueris, non parum confert: qui etiam panis in gallinarum seu caponum iure modico cinnamomo adiecto madefactus, seu maceratus, exhiberi poterit, verum in triduo primo magnopere abstinere oportet, vel si ex quartana quotidiana facta est, per biduum abstinere oportet, vt inquit Celsus cap. 13. & 17. libro tertio, potissimum vbi crapula præcesserint, & admodum frigidus, ac crudus humor quotidianam excitauerit, talis itaque victus ratio omnibus competit quotidianis ex quocunque humore accendantur, verum animaduertere oportet quòd prout magis vel minus frigidus fuerit humor, ex quo generationem habent, perinde etiam magis, vel minus calefacientia ac extenuantia iam dictis cibis permiscenda sunt, ita etiam & diuersa ipsius quotidianæ febris tempora, obseruare licebit, nam in primis morbi diebus non indeo calida, extenuans, ac incidens victus ratio instituenda erit quemadmodum temporis progressu, & post primos morbi dies, tunc etenim efficacioribus vtendum erit, ac calidioribus, vt liquet ex Actuario præcitato loco, & Galeno i. de arte curat. ad Glaucon. licet non indicatione sumpta à morbi temporibus, sed à diuersa causæ motione illud definiatur, ita vt nemini in dubium venerit, quòd febris quotidiana, vt quæ semper ex pituita nascatur, extenuantium incidentiumque vsum requirat, vt pote quæ crassa & tenax sit, verum cum quædam eorum admodum calida sint, ac ad incidendum efficaciora, quædam verò modicè calfaciant, atque exsiccent, aut in totum non calfaciant, quemadmodum à principio eis vtendum esse præceperunt dicti auctores, quæ non admodum calida, ac effica-

Ddd

Aer.
Somnus.
Frictions.
Clysters.

Potus.

Tempora
morbis ob-
seruanda
in victus
ratione.Cap. 10. &
12.Prognosti-
ca.Com. 3. su-
per tex. 2.
& 6.Curatione, in
qua primis
spectatur
victus ra-
tio.

*Alexan-
dri refel-
lit, qui Ga-
leni repre-
hendit,
precipien-
tem in fe-
bre quoti-
diana ex-
tenuanti-
bus semper
esse uten-
dum.*

Tex. 36

cia ad extenuandum, incidendumque sint, ita quo-
que putandum esse non indifferenter in singulis quo-
tidianis ex quavis pituita ortis eisdem medicamen-
tis utendum esse consiluisse, utpote quod non igno-
rauerint aliquam pituitae speciem valde frigidam,
aliquam non adeo, sed mediocriter aut parum fri-
gidam esse, quocirca non parum mirandum est de
eodem Alexandro, qui adeo aut oscitanter, aut tor-
uis ut (sic dixerim) oculis Galeni verba perlegerit,
ac eadem impugnaverit, ut qui indistincte (ut ipse
ait) Glauconi philosopho praeceperit, ut in hac fe-
bre extenuantibus utatur, inquiring quod falsa pitui-
ta non similiter extenuantia ad curationem deside-
rat, ut quae calida sit, & sicca facultate, etiam si vi-
deatur humida, quod verò calida sit, probat exem-
plo dysenteriae, quam nihilominus bilis suscitatur, &
propterea nequit eadem pituita falsa extenuari,
quandoque & diffundi per ea quae ipsam inflan-
mant, siccantque: sed potius adhuc crassior ex eis
efficitur: illud insuper probans nitri, & salis exem-
plo, ac falsi iuris: haec quippe calescentia crassiora
redduntur, nec minus & Aristotelis auctoritate,
quarto meteororum, ac experientia: nam ea quae à
calore coacta fuerint, non à calore, sed à contrario
dissolui possunt. Qua de re ubi falsi humores quo-
tidianam excitauerint, non calefacientia, aut quae
admodum siccant, aut extenuare possunt, adhibere
oportet, saltem per initia morbi, cum falsus adhuc
humor fuerit, verum tanti viri sententiam ac verba
impugnare haudquaquam audem, nisi diuinis.
Galeno aduerfarentur, qui ubique locorum, praeser-
tim secundo de differ. febr. cap. 6. & lib. de causis
morborum, cap. 6. quemcumque humorem natura fri-
gidum, atque humidum pituitam appellari asseruit,
quamvis unus altero frigidior exsistat, qua ratione
& pituita etiam falsa, siue ob putredinem talis sit,
siue propter falsae serosae humiditatis missionem,
perpetuo quae pituita est, frigida & humida erit na-
tura, alioqui pituita appellanda non esset, inquit e-
nim: [quicumque enim frigidus atque humidus natu-
ra humor exsistat, ad pituitae appellationem reduci-
tur, si Hippocra. omnesque non modo priscos, sed
alios etiam Graecos in nominibus imitari velimus.]
adeo ut quavis humor donec frigidam atque humi-
dam seruauerit naturam, ex pituita genere sit, ut li-
quet citatis locis, non igitur imaginatione, seu actu
duntaxat frigida humidaque est pituita falsa, sed et-
iam natura propria, ac facultate, aliis sub pituitae
nomine non contineretur, minus tamen frigida est,
quam ceterae pituitae species, ex accidenti tamen,
caliditate & siccitate quadam participabit, aut ob
putredinem videlicet, aut propter missionem falsae
serosae humiditatis, ut dictum est, quapropter cum
crasse etiam substantia, atque essentia sit, non ob
immodicam caliditatem, ut putauit Alexander, sed
ob frigiditatem, extenuabitur utique calidis, non ta-
men adeo immodice ut ipsam inflammant, atque
exsiccant, quocirca nec exemplum salis, seu nitri,
nec Aristotelis auctoritas, neque etiam ipsa experi-
entia erit ad propositum: neque enim cum Galeno
negamus nos, quod ea quae à calore coacta fuerint,
non à calore, sed à contrario dissolui possunt, at
cum eodem asserimus, pituitam falsam haudqua-
quam ab immodico calore coactam esse, sed propter
frigiditatem crassiorem habere substantiam, &
ob id non secus quam ceterae pituitae species eam
extenuantia desiderare, quae tamen modice calfa-

cient, atque exsiccant, aut in totum non calfaciant,
quod si dysenteriam efficiat, eamque crudelissimam, ut
inquit Galenus commento aphor. 11. lib. 3. tum pro-
pter eius putredinem, aut falsae serosae humiditatis
permissionem, tum etiam propter lentorem in tra-
situ per intestina inharens, ac tardans, semperque
aliquid deterens, & non propter eius immodicam
caliditatem naturalem ac siccitatem eam efficere
videtur: est etenim natura semper, quae pituita est,
humor hic frigidus & humidus: quod verò Gal. nec
in hac quotidiana, quae ex falsa pituita ortum ducit,
neque in ceteris aliis per initia morbi, eis quae effi-
caciùs extenuant, ac incidunt, valdeque calefacien-
di potestatem habeant, uti Glauconi praeceperit,
clara luce ex eius verbis liquet, cum dixerit eisdem
utendum esse non statim à principio, sed post pri-
mos morbi dies: id quod idem Alexander minime
negare videtur: inquit etenim Galenus, *μετὰ τὰς
πρῶτας ἡμέρας*, tunc enim (ut ipse inquit) oxymelice
utendum, & illis quae possunt urinam valde ciere, &
vniuersum totius victus caput sit ad incidendum ef-
ficacius, quasi velit etiam innuere, quod in primis
morbi diebus, iis quae concoquendi, leuiterque ex-
tenuandi, ac calfaciendi vim habent quotidianam
curare oporteat tam cibis, & potibus, quam ceteris
medicamentis, quanti igitur momenti sint rationes
Alexandri aduersus Galenum cuius facile admodum
ex iam dictis patere poterit. Nos verò rursus ad pē-
sum redeunt cum eodem Galeno, ac à cuario sa-
temur, leuiter in principio extenuantibus medica-
mentis quae non valde calefaciendi facultatem ha-
beant, aut etiam iis quae citra calorem extenuare
possunt utrumque esse, nec minus & humoris coctio-
ni vacandum: ex quocumque humore pituitoso
quotidiana accendatur febris. Conueniunt itaque
in hunc usum syrupus acetosus simplex, syrupus è
succo borrag. è corticibus citri, mel rosaceum sim-
plex, & cum saccharo confectum, cum aquis borrag.
foeniculi, & capillorum veneris: quibus per se, aut
inuicem prout videbitur compositis, pluribus vicibus
in accessionum inclinatione uti poteris pro re-
dundantis humoris concoctione, ac praeparatione,
quo etiam tempore clysteribus utare, qui ex malua-
rum, mercurialis, foliorum betae, ac fursuris decocto,
interim etiam & florum chamemeli, adiectis pau-
co sale communi, & vnc. 3. aut 4. olei communis, aut
chamemelini, & vnc. 2. mellis rosacei, vnc. 5. aut dra-
4. diacathol. hierae picrae simplicis, aut confectionis
de dactylis parari poterunt, humore autem conco-
cto, ac ad euacuationem parato, purgans exhiberi
debet medicamentum, quod pituitam subducatur.
Verum (ut recte inquit Alexander) non conuenit
vniuersam curationem moliri, sed per vices, & in-
terualla: ita namque accommodari debet morbis,
qui ex crassioribus generantur humoribus, ac sen-
sim extenuare, & leuiter purgare materiae copiam
oportet, donec satis habere videbitur, & primò
simplicioribus, hinc demum aliquantò valentiori-
bus uti medicamentis: cum enim materia sit cras-
sa, haud facile iis cedit, quae vniuersam, celeremque
vacuationem praestant, ut ipse inquit, inter quae sum-
moperè commendauit agaricum, ubi scrup. 3. aut 4.
ex melle exhibueris, interim etiam plus, aut minus
pro aegrotantis virium ratione, & humoris qui su-
perat quantitate, quippe pituitam educit, nec mor-
bum inueterari sinit, ut ipse fatetur. Tu autem pote-
ris purgans medicamentum huc in modum parare, Reci-

peaga-

pe agarici trochif. scrup. 4. diacath. vnc. s. vel drach. 7. medullæ cassiæ fistulæ, vnc. i. s. fiat bolus: vel, Rec. agarici drac. i. vel scrup. 4. polypodij drac. i. s. fiat leue decoctum in aqua borrag. in quo per colum transfuso dissoluas vnc. 2. mellis æreici, & drac. 7. diacath. & fiat potus: interim drac. i. rhubarbari, quod etiam pituitam edacit, adiciere poteris: interdum verò vice diacath. drach. 4. confectiois de dactylis aducito, & pro melle æreo vnc. 3. syrapi est pluribus infus. rosarum, aut tantumdem syrapi domini Augustini, vt licebit. & quoniam (vt dictum est) non oportet vniuersè hos purgare, sed per vices, iterum extenuantibus ac incidentibus medicamentis materiam præparare licebit, eisdemq; efficacioribus vbi prædictis morbus non cesserit, in quem vsum conuenit syrapius de hyssopo, acetosus compositus, de absinthio, syrupus de duabus radicibus, de bizantiis, & oxymel simplex, tum etiam & compositum, quibus pro diuerso humore redundante, diuersimodè quoque vt oportebit, ac non semel, sed sæpius quoq; eos exhibere conuenit, quò crassissimi humores, ac lenti extenuentur, & discedunt, vacuationique paratiores reddantur, deinceps repetenda purgatio est, & vbi prædicta non suffecerint, iis quæ valentius pituitam subducunt vt expedit: vt recipe pil. aggregatiuarum, aut stomachicarum ex descriptione Mesuæ, & agarici trochif. an. drac. i. formentur pillulæ cum oxymelite, à quibus post horam vel alteram, vnc. 2. mellis æreici, aut vnc. 3. syrapi ex pluribus infus. rosarum rubearum, vel persicarum, cum aqua borraginis absorbeat æger, poterunt insuper ex puluere hieræ simplicis Gal. & agarico trochif. catapotia formari, quibus singulis decem diebus æger vt poterit: formentur autem ex drac. vna agarici trochif. & scrup. 2. pulueris hieræ simplicis pil. quinq; cū oxymelite, quibus (vt dictum est) vtantur, in quem etiam vsum trochisci de agarico, & etiam de absinthio magnoperè conducunt, circa statum etiam huius febris de ventriculo habenda est sollicitudo, ac de eius ore præsertim, Galeno auctore, citato lib. primo de arte curat. ad Glaucon. cap. 12. in quem vsum tali medicamento vtare, Rec. absynthij ac menthæ vtriusq; an. m. i. cinnamomi, chiæ mastiches, corticum citri, maceris, & ligni aloës. singulorum drac. 3. sentalorū omnium, & corallorum rubeorum, cuiuslibet drac. 2. rosarum rubearum m. i. s. contendantur omnia, & fiant tres facelli, ad seuti figuram, quorum duo per vices madefacti in vino Græco, aut guarreto, & aqua rosacea, seu citoniorum succo, calidi ventriculo adhibeantur, alter verò aridus, ventriculo superimponatur, vel hoc applicetur vnguentum, quod recipit olei nardini, de absinthio, & mastichini an. vn. s. chiæ mastiches, caryophyllorum, & ligni aloës an. drac. i. olei rosacei drac. 4. corallorum rubeorum drac. i. ceræ quod satis sit, & vini odorati parum, fiat vnguentum, quo ventriculi regio inungatur, confert insuper si chiæ mastiches vnc. i. aut vnc. i. s. dissoluatur in oleo nardino, aut de absinthio, & cum pauca cera in modum emplastri in aluta extēdatur, & supra ventriculi regionem imponatur, interim quoq; drac. 2. vel 3. aloës adiciere poteris. Nec parū confert hoc etiam tempore iis quæ intus assumpta ventriculum roborant, vt, quemadmodum est aromaticum rosaceum, diarthodon, ac confectio de xylaloës. Tutius autem eis vtare si drac. i. alterius eorum assumas, & drac. 4. aut vnc. s. seminum communium frigidorum adicias, & cum saccharo dissolu-

to in aqua rosacea pastillos parabis, vnum, vel duos pro qualibet vice tribuens, cum aqua fœniculi, vel borrag. vel absynthij & cichorij inclinante accessione. Ad oris etiā ventriculi imbecillitatem, etiā ad eam animi defectus sequatur, magnoperè conducit emplastrum, eiusdem Gal. citato lib. primo de arte curat. ad Glau. quod ex palmulis conficitur, vno, farina hordei, croco, aloë, & mastiche, ea quoq; quæ vrinā validè ciere possunt hoc tempore exhibeantur, veluti apij, asari, & acori decoctum, vel etiā hyssopi, seu spicæ nardi, præsertim in aqua mulsā, quamquam etiā & ex iis quæ diximus, nonnulla eandem vrinā ciere valeant. Quòd verò vomitus insuper hoc in tempore conferat, etiā à cibo, omnes ferè conueniunt. Vt verò facilius fiat, octo, aut decē vnciæ, seu libra vna aquæ tepidæ, vna cum syrapi acetosi, aut oxymelitis vnc. 2. vel 3. bibantur. At quid sentiendum sit de venæ sectione non admodum liquet, cum neque Galenus, nec post eum Aëtius, Paulus, & Alexander, eam meminerint. Actuarius verò præcitato loco hæc verba scripsit: [quotidianam, quæ à pituita ortum duxit, neque venæ sectione (nisi aliud vrget) nec refrigerantibus medicamentis compescere oportet.] Taceo Arabum principem, cum eum non sectemur, qui ait: quoties videris vrinam grossiorem & rubicundiorē, non erit malū si phlebotamaueris. Iverū asserimus nos, quod quotidiana quatenus quotidiana est ac exquisita, venæ sectionem pro eius curatione non desiderat, præsertim vbi à frigidiore humore ortum habeat: & propterea nec Gale. nec citati auctores Græci eā præceperunt: vbi verò aliquid aliud vrget (vt inquit Actuarius) potissimum si corpus cum pituita redundantia simul sanguine plenum sit, adeo vt pituita cum copioso sanguine redundet, viribus valētibus, ac reliquis omnibus consentientibus, quæ in vniuersali methodo commemorauimus, sanguinem mittere non inconuenit, vniuersalissimo præcepto sæpius citato ipsius Galeni vndecimo de meth. med. cap. 15. Ad hæc si morbi magnitudo adsit cum virum robore, mittendus siquidem sanguis est, vt idem inquit libro de curandi ratione per venæ sectionem, quibus scopis præsentibus (vt ipse refert) nulla esse potest crudorum humorum tanta, talisq; plenitudo quæ hoc inhibere auxilium possit, venam itaque secare interdum non inconuenit pro quotidianæ curatione, modò vires, ac cætera omnia quæ requiruntur pro venæ sectione, eam non prohibeant, haudquaquam tamen copiosus mittendus est sanguis: leuata enim per eam natura, atque exonerata, eo quo veluti sarcina præmitur, haud agrè quod reliquum est, concoquet, ac vincet. Ea autem febris, quæ priuatim à leni afflictione epiala appellatur, vt inquit Aëtius cap. 87. libri quinti, vel vt refert Paulus cap. 25. lib. 2. per translationem à sale, dico autem mari, quod à principio tranquillum appareat, cum turbatur difficilimum euadit, vel ab *ἡνθιας*, quod est moliter, & *ἀλγαιον*, quod significat calfacere, quasi dicas, quoniam blandè, & leuiter calfacit, cum ex quotidianarum genere existat, in earum figuram progrediens, vt dictum est: similiter quoque curanda erit incisorio tum curationis modo amplius aucto, vt inquit Aëtius, vel (vt ait Paulus) nisi quòd tanto commemorata quotidiana calidioribus, magisque incidentibus prædiis indiget, quanto etiā pituita frigidiore illa existat, si verò contingat continuam fieri quotidianam, nō alio etiam

Vrinam ciente.

Vomitus.

Venæ sectione, an competat in febre quotidiana.

I. 4. tract. 2. Cap. 55.

Epiala vnde dicta.

Epiala curationis.

modo curanda erit, quàm intermittens, nisi quòd propter pituita cum sanguine permissionem, ubi reliqua consentiant, audacter venam secabis magis, quàm in intermittentibus, vitanda autem quæ admodum calfaciunt atque exsiccant in hac, magis quàm in intermittentibus, quamuis admodum raro cum intermittens, tum etiam continua quotidiana, præsertim exquisita febris accidat.

De semitertianarum differentiis, earumque dignotione, prognostico, & curandi ratione. Caput VII.

QVAMVIS non pauca ac varia sint (vt dictum est) compositarum febrium differentia & eadem post simplices tractari debeant, ex Gale. auctoritate, cum tamen de ea duntaxat differere proposuissim, quæ confusa est ex quotidiana & tertiana, nam sub huius exemplo, & reliquæ omnes compositæ febrium differentia, præsertim si ex putredine ortum habeant, facillè dignosci, ac curari poterunt, propterea sermonis quadam afinitate ductus, hoc in loco de eadem composita febre differere institui (licet nondum de simplicium febrium differentiis sermonem absoluerimus) vt còpletus fiat noster sermo de febribus, quæ ex putredine ortum habent. Appellatur autem hæc febris Græcè *ἡμικριταλός*, Latine semitertiana, ex duarum siquidem febrium temperatura composita, quoniam ex duobus etiam humoribus constat, miratur tamen Galenus libro primo de morbis vulgaribus, quæ re adducti, sic potius nomen huic febri posuerunt primi istius auctores, quàm aliter. Pro quibus quatuor in medium affert responsiones, quarum prima est, quòd cum tertiana febris habeat, vt tertio quoque die inuadat, & ad integritatem veniat, quòd semitertiana alterum habeat de his, alterum non habeat, & propterea ita fuisse ei institutum vocabulum: habet enim vt tertio quoque die inuadat, vt autem ad integritatem veniat, non item, inquit, secundò quòd potuerunt hoc nomen imposuisse, qd & accessione careat cum rigore incipiente. Ad hæc & tertio quòd non cum excretionem finiatur. Iam etiam & quartò qd diem secundum non habeat integritatem. Attamen cui potissimum tribuat febri semitertianæ nomen Hippocra. non planè tenemus, vt ibidem à Galeno scriptum est: neq; ex proprio instituto semitertianam appellauit, sed dixit eodem loco: in febre quam semitertianam vocant, & non pronuntiavit simpliciter in febre semitertiana. Iqua si videatur, vt censet Galenus, vt improprium vocabulum, illud reprobare: siquidem illis quæ integræ non sunt absolutionem consequuta, dimidij attribuius vocabulum, quæ ratione dicimus semimortuum, semiuocalem, semi deum, semiasinum, & semiassum, & id genus reliqua, at semitertiana tantum abest vt dimidia sit, vel multitudine symptomatum, vel viribus, vel horum tota conditione, vt longè etiam sit tertiana deterior, vt potius huius illa, quàm hæc illius esse videatur dimidia, vt liquet ex eodem Galeno citato loco, quicquid tamen sit, de huius febri conuenienti nomine, quoniam (vt dictum est) ex quotidiana & tertiana tota eius natura confusa est, dimidiam partem vtranque ex dictis febribus retinens: etenim dimidiam eius partem habet tertianam, alteram verò partem dimidiam, quotidianam, ob id non omnino sine ratione inditum est huic febri nomen semitertianæ. Pro cuius

febris faciliore notitia animaduertendum est, quòd pituitosa cum biliosa febre quatuor modis commisceri potest: nam, aut quotidiana continua permiscetur cum tertiana continua, aut intermittens cum intermittente, aut continua tertiana cum quotidiana intermittente, vel intermittens tertiana cum quotidiana continua, ex his autem diuersis harum febrium mixtionibus non omnibus, sed vna duntaxat, semitertiana febris, verè, & propriè generationem habet, Galeno teste, secundo de differentiis febrium, vt pote ex quotidiana continua, & tertiana intermittente. Id verò comprobatur Hippocratis auctoritate, qui eodem primo de morbis vulgaribus, hæc verba de semitertianis conscripsit: Instabant illos plerisque hæc incommoda, febres horridæ, continuæ, acutæ, non intermittentes, modus erat semitertianus, vno die leuiore, altero grauius iterum inuadentes, in summa, in dies acutiores euadebant. Idem itaque horridæ sint febres semitertianæ, non poterunt ex duabus continuis originem ducere, quarum altera ex bile, altera ex pituita generetur: etenim hæc commixtio febrè horridam, ac quæ multas habeat reduplicaciones non facit, cum febris omnis continua sui quidem ratione, cum exquisita fuerit, neque horrorem habeat, neque rigorem, neque etiam quæ ex eisdem componitur horrida fiet. Appellauit autem Hippocrates horridas has febres, non quòd initio accessio- nis horrores incidant, sed quoniam per totam prope accessio- nem horrores symptoma produceretur, & si id bifariam contingat, modo cum reduplicat incrementum, modo cum nihil nisi ipsum inæquale faciat incrementum, vt liquet citato libro secundo de differentiis febrium, & primo de morbis vulgaribus: neq; etiam generari poterit semitertiana ex duabus febribus intermittentibus, quoniam neque erit continua. Necessè est igitur si horrida simul atq; continua futura sit semitertiana, ex duabus ipsam febribus generari, quarum altera sit intermittens, altera verò continua cum neq; vtraque continua, neque vtraque intermittens huiusmodi quæc febrem generare. Verum ubi mixtio fuerit ex quotidiana intermittente, & biliosa continua, licet & ipsa potest continuam simul, atque horridam febrem efficere, quoniam continuitatem quidem ex bile obtinebit, horrorem verò ex pituita, reduplicaciones autem ex pugna mutua: non tamen verè ac propriè febrem hanc semitertianam appellabimus, improprie autem & abusuè, si quis eam ita appellauerit, non reclamabimus, cum neque illud negare videatur Galenus secundo de differentiis febrium, licet febrem hanc semitertianam appellare ausus non fuerit: contrario tamen modo se habet quàm ea, quæ verè semitertiana dicitur, ea etenim continuitatem quidem habet ex quotidiana, horrorem verò ex tertiana, & propterea quæ ex tertiana intermittente, & quotidiana còtinua còposita est febris, semitertianam appellamus, vt ipse inquit: nā verè semitertiana ex quotidiana continua, & tertiana intermittente tota eius natura confusa est, quæ quidem aut flauam bilem habet exuperantem, atque ob id in ea sunt tertianæ febri symptomata maiora, aut hic quidem humor paucior, pituita verò abundantiore est, atque idcirco quotidianæ continuæ affectus firmiores, aut neuter horum alterum vincit, sed ambo æquipotentes existunt, quo tempore exquisita semitertiana est, & dicitur: nam æqualis sit earum

Commen-
tes. com. 5.
Cur semi-
tertiana no-
men sit po-
situm.

Semitertia
na impro-
prie dicta
videtur.

Semitertia
na exequi-
ta.

earum febrium mistio sola exquisitum hæmitritæ constituit eodem Galeno teste citato loco, quamvis Archigenes hanc haud intellexit, neque in scriptis suis ostendit, sed omnino prætermisit, & solas duas semitertianarum differentias cognouit, alteram in qua præualet tertiana videlicet, alteram verò in qua quotidiana, parum etiam rectè semitertianæ naturam fuit assequutus, cum in numero febrium intermittentium ipsam posuerit, quo circa licet triplex fuerit semitertianarum differentia, exquisita tamen quæ talem repræsentat formam, qualem de ea Hippocrates manifestauit præcitato libro primo de morbis vulgaribus, quod videlicet sit horrida, continua & acuta, ex æquali dictarum duarum febrium temperatura composita est, atque etiam ex duobus humoribus constat, quæ verò exquisita non est aut bilem, aut pituitam habet præpotentem, & propterea cum æquales magnitudines fuerint, & febris ex bile intermittens, & ex pituita continua, accessio- nis initium fit cum horrore, qui medium inter rigorem & frige- factionem obtinet locum, cum ab utroque extremo æqua distet proportionem, quorum alterum tertianam febrem, alterum quotidianam comitatur, neque etiam cum horrore duntaxat inuadit hæc febris, sed horrida ab Hippocrate dicitur: quoniam ut (dictum est) magnam accessio- nis horrores assumunt, altera dierum scilicet in qua & tertiana, & quotidiana simul inuadunt: nam altera dies solam habet quotidianam, etenim cum ab inuasi- one inualefcit, tertianæ quidem ratione citò calefcit, ac festinat ad summum, at propter quotidianam ex pituita tardatur, atque in ascensu retinetur nonnunquam, ac interruptitur, estque inter varios affectus veluti pugna quædam, cum æger nonnunquam inualefcite febre tertiana, atque ad cutem humores impellente, vehementius calefcit, contra verò remorante atque ad interiora reuocante ipsius motum febre quæ ex pituita ortum habet, ut quæ tardi ac difficilis motus, frigidaque ac lenta existat materia, in hoc autem certamine cum humor frigidus superauerit, summisiones, horrores, atque extremarum partium, & cutis refrigerationes sequuntur: adeo ut videatur altera rursus accessio renouari, cum verò calidior vicerit, tunc statim totum corpus calefcit, ac iam videtur febris penè in summo consistere, mox paulò post ad pituitam redeunte victoria, ægroti denuò contrahuntur, refrigerantur, & horrent, neque hoc terminum vllum habet, donec febris ad summum perueniat quod quidem citius accidit, quam pro more pituitæ, tardius tamen quam in bile fieri consuevit. Nam humi- lius quidem celeritatem cohibet pituita, ac rursus pituitæ tarditatem, atque hebetudinem excitat bilis, accessio igitur semitertianæ ex utriusque humoris ac febris commistione atque confusione, nam de hac mistione loquimur, quâdo humores fuerint æquipotentes, & propterea exquisita semitertiana fiat, talis utque erit qualem descripsimus. Cæterum non exquisita semitertiana, aut biliosum humorem, habet præualetentem, aut pituitosum, cum verò tertiana præualetentem, horridior sit febris, atque in accessione sibi aliquid rigoris associat, confestim verò & feruidior est huiusmodi febris, & incendiij plus habet, magisque festinat ad summum, & ali- quid bilis per vomitum, aut per aluum, aut per sudorem excernitur, at cum altera ex pituita febris potentior existit, tunc frigus vehementius extre-

mas occupat partes, horroresque pauci fiunt, & pulsuum fit afflictatio maior, ac diuturnior, tardiusque accessio inualefcit, ac longiù post tempus consistit: non tamen aut statim, aut magnum affert incendi- um, neque in ea per vomitum, aut per aluum, aut per sudorem bilis excernitur. Duplex autem est semitertianarum generationis modus, vel scilicet duabus in vnum tempus conuenientibus accessio- nibus, quia altera præuenit, altera verò differtur, quemadmodum de adolescente testatur Galen. eodem secundo de differentiis feb. cap. 7. aut statim ab initio ambabus accessio- nibus inuicem confusis, quæ tamè fit in vnum tempus conuenientibus utraque accessio- ne, altera scilicet præueniente, altera verò retardante, vnam tantummodo habet hæmitritæ naturæ accessio- nem, altera autem omnes à principio ægritudinis usque ad finem, quæ maximè atque præcipue ab omnibus febris semitertiana appellatur, ut liquet eodem secundo de differentiis febrium talis itaque est tam exquisitarum, quam non exquisitarum semitertianarum natura, ex Galeni, Pauli, ac Aetij sententia, quamvis earum naturam parum rectè fuerit assequutus Archigenes, ut dictum est, & minùs etiam Agathinus, qui semitertianam in eodem genere cum tertiana manifestè locauit, ac sola accessio- nis vehementia ab eadem differre fatetur; eodè Galeno auctore, citato libro secundo de differenti- bus feb. At Hippocrates nullam ex iis quæ ad integritatem euadunt febribus, semitertianam vocare vi- sus est, ut liquet ex eodè Hippocrate primo de mor- bis vulgaribus, & Galenus tum eodem loco, tum etiam secundo de differentiis febrium, cap. 4. quamvis idè Galenus libello de typis, huic sententiæ pugna- re videatur, quo loco loquens de semitertiana, ha- bet hæc verba: [Porro non semper continua est, sed etiam intermittens reperitur.] nisi esset quòd eodem loco dicebat Galenus, quòd semitertiana tres habet in magnitudine differentias, alia enim exi- gua est, alia media, alia magna, exigua siquidem est, alia media, alia magna, exigua siquidem est, quæ horarum 24. intervallo vertitur, media quæ 36. magna verò quæ 48. quæ & continuæ febri propinqua est, ex quibus verbis videtur Galenus non ex propria sententia, sed Agathini potius de semitertiana verba facere: hic enim (ut iam dudum diximus) eandem semitertianam in tertianarum genere collo- cauit, eas appellans semitertianas febres, quæcumque tertianæ existentes, vehementiores habent accessio- nes, ac magnoperè productas. Nam licet quandam quotidianam & quartanam febrem appellauerit ex- tẽsam Agathinus postmodum in tertiana non ser- uauit eandem vim proportionis, cum si longius ac- cessio protendatur, non tertianam, sed semitertiana appellat, ut liquet apud eundem Galenum ci- tato loco secundo de differentiis febrium. Id etiã confirmari poterit ex eiusdem Galeni verbis primo de morbis vulgaribus, cum dicebat: [Atqui sanè qui aiunt, si horas quatuor & viginti quis febre vacet, mediam eum semitertianam habere, in numero habent talẽ febrem intermittentem:] sic etiam qui mediam, & paruum à magna distare horarum nu- mero fuerunt, studentes utranque ad integritatem deducere, ab Hippocrate sensu discedunt, dum in febribus intermittentibus ponunt semitertianam, quia nihil hæc periculi habebit, quãvis ab illo letalis di- catur.] damnat itaque Galenus eos qui horarum numero aiunt semitertianas distare, studentes eas quæ

Modus ge-
nerationis
semitertianæ
duplex.

Semitertiana
ex con-
tinuis est
semper.
Locu citat.

Conciliatio
locorum
Galen. in
quibus sibi
contradice-
re videtur.

Commen-
tex. com. 5.

Com. 3. su-
per tex. 2

media & parua sunt, saltem ad integritatem reducere, quicumque hi fuerint, posset & aliter huic controuersia satisfieri, quod uidelicet lib. de typis, omnem missionem quotidianam cum tertiana largiori vocabulo semitertianam appellauerit, qua ratione dixerit eam non semper continuam esse, sed reperiri intermittentem semitertianam, quando scilicet intermittens quotidiana, cum intermittente tertiana fuerit permixta, quod quidem confirmare videtur ipsemet Galenus citato libro primo de morbis vulgaribus in expositione illius textus: [inter febres quaedam continuas sunt &c.] inquit enim eo loco, quod intermittentes dicemus febres, siue integritatem, siue remissionem quam vocant, assequantur: & demum post pauca subdit: [At ex semitertianis quaedam vtrique incedunt via, quaedam altera tantum earum quae ad integritatem non veniunt.] videtur siquidem hoc in loco quaedam admittere semitertianas, quae vtraque incedunt via, videlicet ad integritatem, siue remissionem peruenientes, & istae sunt communiter, & non proprie dictae semitertianae, quae quandoque possunt intermittere, hoc est integritatem assequi, & quaedam quae ad integritatem non veniunt, & sunt proprie dictae, & praesertim exquisitae, vel dicas quod quando libro de typis, asseruit quod aliqua semitertiana intermittens reperitur, pro intermittente non intellexit quae veram integritatem, sed quae remissionem magis assequitur, cum bifariam intermittere intelligat citato loco de morbis vulgaribus. ita quod eam intellexerit semitertianam intermittere, quae licet verum non intermittat, tamen magis accedit ad veram integritatem, ut ea quae exigua seu media ab eo nuncupatur. Altera vero quae magna dicitur, non adeo remissionem assequitur, & propterea continua magis dicenda erit: nullam etenim ex iis quae verum ad integritatem euadunt, semitertianam, neque Hippo. neque Galenum vocare compertum est. De qua semitertiana sic scriptum reliquit idem Hippoc. citato libro primo de morbis vulgaribus. [in febre quam semitertianam vocant, cum morbi eueniunt acuti, tum praeter cetera haec, est letalis, ac tabidis, & qui longis aliis morbis detinentur, praecipue aegrotant.] ex quibus verbis infert Galenus in commen. quod fortassis, etiam si horrore careat, vocabimus eam semitertianam, si die secundo iterum inuadat, quamuis improprie. Nam propriam & exquisitam semitertianam potius eodem libro non modo horrore non carere, sed horrificam esse asseruerat Hippoc. ut iam pridem explicauimus, & libro de typis, clarius hanc confirmauit sententiam, cum dixit: [traditum est ab Hippocrate non modo acutis eam morbis annumerandam esse, sed etiam diuturnis.] veram enim propriam, & praesertim exquisitam ait Hippo. citato libro de morbis vulgaribus esse acutam, non veram autem ac improprie dictam semitertianam tabidis, & aliis qui longis morbis detinentur contingere, ac diuturnis annumerari. Quod vero semitertiana periculum minatur, ut quae non solum stomachum, & nervosam eius partem attingat, & summatim media, sed etiam lethargicas animi delationes, attonitasque vigilas inuehat, interim & ad syncope usque corpus deferat, linguam valde siccet, animae defectum efficiat, vehementer ea quae in alto sunt commouens, scriptum reliquit Galenus eodem lib. de typis, & deinde subdit: [in vniuersum typus hic & ferus est, & periculosissimus.] ac post

Semitertiane periculosa.

Cap. citato

pauca inquit, quod frequentius corrumpit naturam virilem, aetatem florenti proximam, tempore potius autumnali, quando etiam valde periculosa accidit, non exquisita semitertiana, si abundantior em habeat pituitam, magis curationi renititur, ut liquet ex Paulo, quam exquisita. Quod ad curationem eius attinet, cum ex vtriusque humoribus relatis conflatur, etiam mixtam esse conuenit curationem, Aetio auctore, cap. 82. lib. 5. quare ex his quae de tertiana & quotidiana relata sunt, curationem componere oportet, & ubi exquisita fuerit semitertiana, ex aequo vtriusque prospiciendum, tum tertianae, tum quotidianae, ubi vero exquisita non sit, si flaua bilis superior sit, praesidiis maxime utendum est, quae in cura tertianae explicauimus, quotidiana non penitus neglecta, si pituita largior fuerit, iis maxime vitare medicamentis, quae pro cura quotidianae approbauimus, similiter bile non neglecta, in totum ei quod vrget incumbentes, sed ita ne alterum profus negligamus, ut inquit Paulus cap. 33. lib. 2. & ut summatim dicam, cum complicati sint affectus, quorum vnus magis vrget quam reliquus, id seruandum est, quod in vniuersali methodo docuimus: similiter ubi aequaliter vrgeant. Non igitur conuenit hic particulatim iterum omnia recensere, quibus febris haec curari debeat, cum prompte quiuus ex eiusdem capitibus de tertiana & quotidiana colligere poterit, ac pro humorum diuersitate recte uti. Nam si quis simplicium febrium curationem exacte sciuerit, absque vlllo labore, & compositas curare non ignorabit, & proinde etiam quae de biliosa & pituitosa febre simul commixtis conscripsimus, licebit ad atrae bilis humorem transferendo, eius cum vtraque illarum complexionem, seu implexum, ac confusionem pariter coniectare, voco autem complexionem, ut superius iterum annotauimus, quando horis differentibus inuaserint, confusionem vero quando eodem tempore inceperint commixtae febres, sic etiam & tres simul febres per se quispiam completi & confundere poterit, ac easdem haud aegre dignoscere: nam harum omnium primum fons atque elementum est singularium atque simplicium febrium formam ac figuram exquisitè cognoscere, ut Galenus inquit secundo de different. febr. cap. 10. & nos in praecedentibus explicauimus qualiter ipsae dignoscendae sint, quibus cognitis, & earum quoque curatio facile patebit, & ob id particularem omnium compositarum febrium curationem, haudquaquam scribere arbitratus sum, sed ipsius semitertianae duntaxat, tanquam sub exemplo quodam reliquarum omnium, curationis vniuersalem modum instituimus, sub qua via & ratione, ad particularem tum eiusdem semitertianae, tum etiam & ceterarum compositarum febrium curationem facile quiuus accedere poterit, quemadmodum in secunda etiam huius operis parte docuimus.

De febrium hecticarum prognostico, ac curatione.

Caput VII.

Cum duplici via quae febres hecticae appellantur ortum habeant, nam aut statim ab initio inuadunt, aut reliquis succedunt febribus, sitque earum differentia duplex, quandoquidem aut hecticae febres duntaxat, aut nedum hecticae, sed etiam tabidae existunt, quemadmodum in vniuersali methodo fusiùs explicabimus quaecumque statim ab initio inuadunt

Prognosticum.

dunt, nondum autem tabidæ sunt, non admodum difficile est eas curare. At quæ ex ipsis ad tabem pervenerunt, ubi iam exquisitæ consistunt, & iam dudum inceperunt, non modò eas curare difficile est, sed impossibile: etenim omnium hæcticarum febrium dispositio difficilis est, ubi iam principij tempus præterierit, Galeno auctore, libro primo de differ. febrium, cap. 8. & 9. quæ verò quodammodo ad utranque partem declinat, ac medium obtinet locum inter eam tabidam febrem, quæ penitus curam non admittit, atque illam quæ citra tabem, ac facillimè in principio curari potest, quoniam eius & ampla latitudo est, & multæ sunt in eo quod magis & minus diversitates, pro eadem ratione magis vel minus difficulter curationi resistit. Nam quæ æqualiter distat ab utraque, & ea scilicet quæ exquisitè tabida existit, atque illa in qua nihil est adhuc tale, medio quodammodo se habet ad curationem, dubio ad partes ambas inclinans momentè; quæ autem tabidæ proximior, est etiam periculo vicinior. At quæ alteri primæ magis adhæret, non parvam salutis spem afferre potest, eodem Gale. teste citato loco cap. 9. Quod verò ad earum curationem attinet, nos primò qualiter curandæ sint quæ citra tabem existunt, deinceps, quæ simul etiam cum tabe, docebimus. Illarum etenim vera & propria curatio est, quemadmodum & diatarum, utpote simplicem habentes primam curationis indicationem, quoniam & ipsæ simplices affectus sunt. Quapropter non ab re Galenus decimo de meth. med. cap. 6. dicebat, quòd caput totius curationis harum febrium in iis remediis quæ refrigerent & humectent, statuere oportet, quæ autem simul tabidæ existunt, quæcunque fuerit substantia solidarum partium, exsiccata propria humiditate, humectantis nutrimenti ope, replere etiam oportet. Quapropter non adeò simplicem habent curationis indicationem, licet ubi propria solidarum partium substantia, membranosa videlicet, & fibrosa fuerit exusta, seu exsiccata, ea ut corrigatur fieri omnino non potest, veluti nec feni, ut liquet septimo, & decimo de meth. med. c. 5. & 6. & lib. de Marasmo. c. ult. erit itaque pro cura hæcticæ febris citra marasimum, aer eligendus qui non admodum calidus, aut admodum frigidus sit, verum si temperatus est, qualem se exhibet, utique tali nobis est utendum, nihil amplius de eo sollicitis; ubi verò admodum calidus fuerit, pro calido reducendus est arte contrarius subterraneis inuentis domibus, quæ & frigidiores sint, & maximè persæ, & ad Septentrionem versæ, tum auris quibusdam quæ ipsis sint suaves opera nostra paratis, alias ex euripis in quo se deiciat multi aquarum fontes, alias aqua frigida, de vasis in vasa transfusa, quod quidem statim etiam somniferum est; præterea domi assidue aqua quæ prorsus frigida sit aspersa, ac rosis plurimis humi fusis, aut vitium capreolis, aut ruborum summitatibus, seu etià arundinum, aut denique reliquarum quæ refrigeret stipium aliquibus, turba quoque hominum ingredi prohibita; nam id quoque domum calefacit. At qui ita calidissimum aerem refrigerare tentandum est, qui non nisi æstate calida & sicca accidit: quandoquidem in hyeme calidissimus esse non potest, sicut nec frigidissimus in æstate, si quis verò aer modicè frigidus sit, hoc esse contentos oportet, nihil aut machinantes, aut de ipsius temperie alterantes, qui verò frigidissimus est, utique quatenus respirando attrahitur admittendus est, ut qui calorem qui est in

corde admodum refrigeret, non tamen quatenus extrinsecus ægrum contingit, quippe id densat coagitque cutim, ac putredinorum humorum fluxum transpirare prohibet: maius tamen fore ex frigida inspiratione commodum scire licebit, quàm ex cute densanda incommodum, præsertim cum operimentis hanc calfacere liceat. Porro utendum maximè eiusmodi aere est, in his hæcticis, quibus primò quod afficitur est ipsum cor. A corde verò ubi pulmones primò afficiantur, plus cæteris omnibus refrigerantem aerem requirunt. Ubi verò ex reliquis partibus primò afflictis ipsa febris hæctica generetur, temperato, aut modicè frigido aere contentos esse oportet; somnus item sit moderatus, vel paulò longior, & ut inquit Actuarius, c. 21. lib. 3. somnus conciliandus est à cibo; ac querenda animi oblectamenta, & relaxationes, ac quodcunque tandem cum refrigeratione humectare putatur, quies iniungenda erit, & pro exercitio lenibus frictionibus utendum est, & ubi alius plus æquo adstricta fuerit, lenes clysteres adhibere oportet, qui ex hordei, foliorum maluarum, ac violarum decocto, exiguo sale, & vnc. 3. olei violacei, & vnc. 2. sacchari, vel sacchari violacei, vnaque medullæ cassiæ fistulæ aut cassiæ tractæ adiectis, parari poterunt. Interim eadem gallinarum iuri, aut ex capitibus arietum parato decocto, adicias. Vident omnes animi affectus immodicos, præsertim iram, timorem, & tristitiam. Nutrimentum autem humidum esse ac frigidum, quod hæcticis febribus sit conducturum, nemo nescit, inquit Galenus decimo de metho. med. c. 11. huiusmodi est pitisanæ cremor cum frigidus sumitur, & exiguus in aqua frigida panis. Cæterum nullius horum pura frigiditas esse debet, sicuti potionis, quippe hæc mature tum incalcescit, tum per corpus digeritur, illa cum plusculum temporis in ventriculo morentur, ipsum fortassis refrigerant, si fuerint immodicè frigida, eodem Galeno auctore citato loco. Alexander cap. 4. lib. 12. iis qui primariò in hæcticam febrem inciderint, præter pitisanæ cremorem, & panem in aquam tinctum, lactucas commendat, & post cibum, aquam frigidam quantum æger velit, potui tribuit, etenim in hac febre cauere febri insultus, & metuere non oportet, neque enim remissionem, aut accessionem in hac febre, quæadmodum in febribus ex putredine ortis inuenire licet, ut ipse inquit: ea siquidem tribuenda factetur, quando febris hæctica per se, ac primariò fuerit, ægrique vires non imbecillæ, & non alia febris ex putredine creata ei sit admixta. Possunt quoque & his saxatiles pisces exhiberi, ac etià scorpij, & muli, eodem Actuario auctore citato loco, necnon & borrago, endiua, & cichorium, & panis item in pulorum seu Gallinarum iure maceratus. Insuper & aues parue quæ in montibus degunt. Pro potu aqua hordei præbeatur, aut aqua in qua coriandrorum præparata semina fuerint decocta: quibusdam etià & aquosum vinum modicè dilutum conuenit, iis præsertim qui aquam bibere non ferunt, ac vires quodammodo imbecillas habent, eodem Actuario, ac Alexandro testibus. Ubi verò febris iam traxerit, dandum quoque erit asininum lac, sed diligenter observare oportet ne in ventriculo cogatur: id verò interim ipse nos æger docebit, utpote qui suæ ipsius naturæ peritus, interim id à nobis inueniendum est paulatim ad eius usum accedentibus, ac mel exiguum illi admiscantibus, seu saccharum, licet quoad fieri potest in hæcticis febribus, à melle, atque idcirco

Somnus.

Quies, & motus. Inanities per clysteres.

Affectus animi.

Cibus.

Potus.

Lac asininum quomodo hæctici propinandum.

etiam à mulſa abſtinendum ſit; quippe protinus ver-
titur in bilem, & ſicciores, acrioriſque caloris febres
reddit, & proinde à principio nō plus aſinini lactis,
quā cyathus dandus eſt, inducta in ipſum cubicu-
lum aſina, quō nullum tempus interponatur, ſed æ-
ger id protinus bibat; & vbi nō corrumpatur (quod
quidem dignoſcere ex pulſu præcipit Galenus cita-
to lib. 10. de meth. med.) cap. præcit. dimidium cya-
thi lactis adaugeas, deinde rursus aliud dimidiū ad-
iicias, ſicque ſenſim vſque ad mediocrem modū ad-
das; id verò quouis tempore exhiberi poterit, illud
tantum obſeruans quòd per quatuor, aut ſaltem tres
horis ante cibum offeratur, manē potiſſimum; quo
etiam tempore non inutiliter & alia quoque medi-
camenta refrigerantia ac humectantia præbebis, eſti
(vt diximus) ea quacunque hora præbere poteris; mo-
dò vacuus à cibo ventriculus fuerit; neque enim in
hac febre acceſſionum ſeruantur tempora, cum eiſdem
careant, huius generis ſunt zulapium roſaceum,
& violaceum, ſyrupus violaceus, de nymphæa, de ſuc-
co endiuia, de ſucco cichorij, de ſucco borrag. & de
ſucco ſeu inſuſ. roſarum cum aquis endiuia, cicho-
rij, ſeu borrag. aut paſtillis vtare, qui hunc in modū
parentur, Recipe diarhodō abba. aut tria ſantalati,
ſeu diatragacathæ, aut electarij regū ſine ſpeciebus
drach. j. quatuor ſeminum com. frig. vnc. s. ſacchari
diſſ. in aqua roſacea quantum ſatis ſit, ſiant in mor-
ſulis, quorum vnum qualibet vice præbeas cum vnc.
3. aquæ endiuia, aut cichorij; his verò neque indiſcri-
minatim vtare: nam cum eorum quædam magis,
quædam minùs refrigerandi facultatē habeant, quan-
tò hecticarum febrium affectus fuerit calidior, tan-
tò vtique frigidiora requirit auxilia, & ſimul maiore
ſollicitudinem habere debemus, ne valentibus auxi-
liis vtentes quicquam lædamus, vt decimo de meth.
med. cap. 11. ſcriptum eſt. Purgantia autem medica-
menta eis qui febre hectica laborant, propinanda
non ſunt, niſi aliqua ex eis quæ ex putredine ortum
habent, fuerit ei copulata; verum vbi admodū alius
adſtricta fuerit, nec leniri lenientibus iam dictis cly-
ſteribus valeat, aut æger eis vti recuſauerit vnc. 2. ſac-
chari violacei, aut iij. ſyrupi de pluribus inſuſ. violarū,
aut vnc. 2. mellis æreici, vel vnc. j. aut vnc. j. s. medullæ
caſiæ fiſtulæ cum prædictis aquis præbere non in-
cōuenit, cum & alius ex eis ſoluatur, nec febrī quic-
quam obſunt; nam corpus neque calefaciunt, neque
exſiccant. Sed quoniam communis febrium omniū
hecticarum ſanatio eſt, per ea quæ extrinſecus appli-
cata refrigerant & humectant, licet ea non indiſte-
ſenter etiam admoueri debeāt ſingulis partibus, ſed
illi maximè, quæ primò affecta eſt, vt liquet eodem
decimo de metho. med. cap. 9. ſequitur propterea vt
de iis medicamētis agamus. porro horum ea deligē-
da ſunt, vt inquit Galenus citato loco, quæ citra ve-
hementem adſtrictionem refrigerant: etenim talia
præterquā quòd non humectant, etiam dimittere
frigiditytem ſuam non valent; propterea quòd cu-
tim cogunt, & coarctant; quapropter optima ſunt
quæ non modo citra adſtrictionem refrigerant, ſed
etiam corporis ſubſtantia ſunt tenui, abſolutiſſimè
verò quæ tenuium partium ſit, ſubſtantiam exactè
frigida inueniſſe fortaſſe non eſt, cum neque ace-
tum quod omnium quæ nouimus poteſtate refrige-
rarium, tenuiſſimarum eſt partium exactè frigidum
ſit, ſed admiſtam ſibi aliquam caliditatem habet, at-
tamē deligi materias oportet, quæ ad cuiusmodi me-
dicamentorum compositionem maximè ſunt ido-

neæ, quæ etiam pro ratione partis primariò affectæ
admouendæ ſunt, quæcunque tamen ea ſit, ſemper
cordi proſpiciendum erit; quandoquidem in omni-
bus neceſſe eſt vt ipſum ſimilem intemperiem reci-
piat, citra quam nec maraſmus, nec hectica, nec re-
liquarum vlla febrium cōſiltere poteſt, vt liquet ab
eodem Galeno citato loco, cap. 8. quapropter tali
epithemate cordi ſuccurrendum eſt, quod recipit a-
quæ roſaceæ, & nymphææ ana vnc. 8. aquæ borrag.
& oxalidis, cuiuſlibet lib. s. ſantalorum omnium, co-
ral. rubeorum ana dr. 2. corticum citri dr. 3. oſis de
corde cerui numero 1. croci gra. 3. vini albi aquoſi
vnc. 3. olei roſacei omphacini vn. 2. s. interim vbi cor
primò affectum ſit, & febris hectica non exigua, vn.
2. ſucci polygoni, cichorij, vel endiuia adicere po-
teris, miſceantur, & ſiant epithemata, quæ ſæpius re-
petenda ſunt. Iteur inſuper hoc epithemate refrige-
rare & humectare licebit, quod recipit ſucci ſola-
ni, & cichorij, ſingulorum lib. s. aquæ roſarū rubea-
rum, violarum, nymphææ, & endiuia, cuiuſlibet vn.
4. ſantalorum omnium, & corallorum rubeorū ana
drac. 2. acetū vn. 2. miſceantur, & cum duplicato lin-
teo lineo in eis madefacto, iocinoris regioni impo-
nantur, ſæpiuſque renouentur, præſertim vbi ipſum
primò fuerit affectum. Pro renibus hoc vnguento
vtitor, Recipe ſucci polygoni, vel lactuæ, portula-
cæ, ſeu ſemperuiui, vel vmbilici veneris vnc. 1. s. olei
de nymphæa, de papauere, & de cucurbita, ana vnc.
s. olei amygdalarum dulcium, roſacei, & violacei,
ſingulorum vnc. 1. medullæ cruris vituli drac. 3. lenti
cremoris tragacanthæ extractæ cum aqua roſ. dr. 4.
ceræ quod ſatis ſit, & acetū parum, fiat vnguentum.
in quem vſum magnopere conducit Galeni ceratū,
quod ex cera quā optima & clota, vtpote alba, &
roſaceo omphacino, ac etiam aqua conficitur, pau-
co aceto addito, vt liquet ex eodem decimo de me-
tho. med. cap. 9. Id verò medicamentum (vt ipſe
inquit) aſiduè mutari debet, ac eoſque ſuper ægrū
corpus manere, donec manifeſtè incalcat. Idē quo-
que Galenus refrigerandæ particulæ, quæcunque ea
ſit, imponenda nonnulla medicamenta, citato loco
conſcripſit, quemadmodum eſt oxalidis, aut oxyla-
pathi ſuccus, cum exigua polenta miſta: quinetiam
portulacæ, ſemperuiui, & vuz immaturæ ſuccus, ſimi-
liter ſi polentæ miſceantur. Ad hæc lentis paluſtris,
& viridis tribuli, polygoni, & lactuæ, ac intybi ſuc-
cus, etiam cum tenui polenta, quamuis etiam ſine
polenta liceat integris dictis herbis tuſis. vt, vt ipſi
refert, & ſi dictorum ſingulis roſacei quippiam ali-
quando miſcere volueris, nihil vilius pharmacum
habebis, eodem auctore, modo ſimplex, & perfrigi-
dum ſit, & quod factum ex oleo ſit ſalis experti. Tu
verò omphacino roſaceo cum eiſdem vtare, exigui-
que acetū albi adicito, atque illi maximè particulæ,
quæ primò affecta eſt, imponito, vt in ea veluti ignis
fomitē extinguas. At peſtori non nimis refrige-
rantia medicamenta admoueri debent, niſi multus
feruor, aut inflammatio in eo ſpectetur, verum ne
ſic quidem linamenta diutius in hære ſinemus, cō
quòd pleroſque ab immodica ipſorum refrigeratio-
ne haud mediocrem nō ſolūm reſpirationis, ſed et-
iam vocis noxam expertos nouimus, vt Alexander
inquit præcitato loco, id quod etiā ante eū inuener
ferè videtur Galenus de his quæ ſtrenuè refrigerat,
præcordiis impoſitis eodem decimo de meth. med.
cap. præcit. Porro aquæ dulcis balneum, eis qui he-
ctica febre laborant, nemo eſt qui non commēdet,
præſertim

Syrup.

Purgatio.

Admouē-
da extrin-
ſecus.

Loco præci.

præsertim Galenus citato loco, ut quod tum prima ratione, tum etiam ex accidente eis proficiat, utraq; siquidem ratione refrigerans & humectans: est autem & ipsum quouis tempore huic febri idoneum. atqui licet totum curationis momentum in his febribus in refrigerando humectandoque consistat, & propterea illico qui hæctica laborant, refrigerandi sunt antequam progressi in marasim perueniant, quoniam omnibus refrigerantibus auxiliis propter corporum horum fragilitatem quodammodo noxam minet, ubi præsertim eis quispian non rite vtatur. ob id non statim in frigidam aquam balneandi sunt, sed prius in eiusdem aquæ dulcis balneo temperatè calido, moderatissime primo calfaciendi ac balneandi sunt, ac in eo moderatè etiam commorari debet: deinde priusquam de eorum propria substantia aliquid exhauriatur, seu sudor aliquis excitetur ab eo demittendi sunt, atque in frigidum balneum demittendi: nam qui hæctica febre laborantes ad balneum accedunt, nisi in frigidam sunt dimissi nihil iuuantur, ut liquet eodè 10. de meth. med. cap. 10. quoniam in hæctici febribus id quod remedium affert, calidæ solidum non est, sed frigide, ex hac nanque & innoxie refrigerantur quæ fuerant exalfecta, solidarumque partium ariditas corrigitur, & vires firman- tur, sit autem ea frigiditate aqua in qua balneatur, ut nullam evidentem qualitatem nec prorsus frigiditatem, nec tepidarum aquarum præferat, sed qualem ea quæ fontana vocatur, quæ & frigoris quod ferit, & teporis qui resoluit, est in medio, præsertim si marasino etiam tentetur, eodem Gale. teste citato loco. quicumque igitur hæctica febre laborant, modò his alia nulla febris, vel ex solo putrescente humore, vel cum phlegmone sit adiuncta, eos omnes audacter ita lauabis, sed prorsus citra omnem laborem, ne vires resoluas; protinus verò ubi à balneo fuerit egressus æger, alter paratam habens sintonem ipsi iniiciat, ac deinde aliam, & in lectulo collocetur, mollibusque deinde linteis blandissime detergetur, ita ut qui detergent violentius seruandum est, ubi nedum febre hæctica sed tabe etiam laborabit, post lauati- onem oleo vngendus est, ne videlicet plus iusto digeratur, sed obstruantur exigua cutis spiramenta, idem protinus & siccitati remediū fuerit, & aduersus incommodum quod ab aëre ambiente contin- git, veluti munimentum, ut patet 7. de meth. med. c. 6. erit autem oleum violaceum, aut rosaceum omphacinum, seu de nymphaea, aut amygdalarum dulciū, quo sepe vtor, solo, aut violaceo admisto. Post hæc aut lac exhibebis, præsertim ubi eo delectetur, aut prorsus diligenter coctam, seu eius cremorem, quem in gallinarum seu pullorum contusorum iure paratum assumendum præbeo: nam tunc potius in vniuersum corpus distribuitur atque attrahitur, quæ ferè omnia breuibz quibusdam verbis Actuarius præcitato loco sub his verbis conscripsit: [Balnea porro iis sunt idonea quæ corporis squallorem humectent, verum tepida esse debet, nec vllam resipe- re qualitatem, nec tempus in iis trahere conuenit, sed ubi modicè fuerint immorati, egredi, ne quod ex nativo humore superest, euanescat, & exhalet, egresso sorbitio quæpiam refrigerans dabitur.] & post pauca subdit: [quod si solum exeuntem melino, aut rosaceo, aut omphacino saltem oleo inunxeris, & meatus præcludes, & ne maior fiat diffusio, prohibebis, ac antea ex irrigatione inductam humiditatem

intro compesces: atque hoc quoque pacto opem ho- mini tulisse videberis:] conferunt etiam semper, po- tissimum eo tempore quo ægri balneantur, media quæcunque odorata refrigerat, quorum copiam ca- pite de cura febris ardentis studiosi petat: inter sim- plicia sunt rosæ, violarum, & nymphaeæ flores, seu etiam myrtillorum.

Hæcticarum febrium cum tabe curatio. Cap. IX.



I verò febres non hæcticae duntaxat sunt, sed quæ Græcè *μαρμαρδεις* di- cuntur, hoc est tabida & siccitati co- iunctæ, quatenus hæcticae sunt, non a- liam desiderant curationem quam mo- do dictam, quæ in refrigerando & humectando co- sistit, quatenus verò siccitatem, seu tabem coniun- ctam habent, deperditæ substantiæ humidæ etiam indicant instaurationem, seu refectionem, hanc au- tem inferere particulis sine nutrimento non est; quare præter eam quam instituius victus ratione, alimenta quoque eligere oportet, quæ reficere cor- pus valeant, nam quæcunque partium solidarum sub- stantia fuerit exsiccata, eadè genere victus ratio co- petit, quamuis vna altera difficilius instauretur, & quædam nullo modo refici possit, primum enim e- iusmodi febris propriam partium humiditatem ex qua nutriuntur, depascit: hinc verò ad carnosum genus transit, quod circa tum fibrosas tum membranofas partes solidorum corporum hæret, ita deinde ipsas solidas po- pulatur, quado exactè tabida febris dicitur: Gale. teste citato lib. 10. de meth. med. c. 11. Donec autè pro- pria partium humiditatem depascit, non admodum difficile esse am curare, nam hanc humiditatem etià si omnino sit assumpta regni licet: cum verò ad carnosum ge- nus pertransit, licet curare difficilius sit, utique eam sanandi adhuc spes est. At cum verè solidas popula- tur, fibrosas inquam, & membranofas, fieri haudqua- quam potest ut talis siccitas persanetur, verum ne desperata horum salus relinquatur, hac etiam victus ratione uti debent, saltem ut quoad fieri liceat, eorum vita proteletur. Ut verò paucis alimenti summam co- plectar, sit coctu facile, & nutriendum, minimèque glutinosum atque excrementosum, quamuis maximè nu- triente cibo haudquaquam sit vtendum. nam si nu- trimentum ipsum seipsum coqueret, ac in partes di- gereret, præterea assimilaret alièdis partibus, & qui- bus alimento plurimo est opus adhæresceret, pro- culdubio maximè nutriente cibo esset opus. Verum quoniam non aliud est quod nutrimentum deside- rat, aliud quod ipsum conficit, sed quod nutriendum est, ipsum sibi & nutrimentum attrahit & mutat, & concoquit, & adiungit, & assimilatur, ad duo nimirum nobis in opportuno cibo eligendo, spectandum es- se dicat. vnum ipsius cibi naturam, alterum vires suas proprias insitantesque. itaque ex his illud patet, nec pla- nè quod maximè nutriat optimum esse iis corpori- bus quæ refici magis egent, utpote quibus conco- quendi facilitas non est: nec etiam quod facillimum concoctu est, cum scilicet ipsum nequeat maximè esse nutriendum ex Galeni decreto, 7. de meth. med. c. 6. medius itaque victus seu optimus est præferendus qui modicè refrigeret, pleno nanque victu opus non est quod is concoqui nequit, sed cibus boni succi ac coctu facilis dandus, ut inquit Actuarius citato lo- co. Quo circa panis purus qui curiose sit in furno co- ctus exhibetur, qui tum fermenti, tum etiam salis

Quarum
partium sic-
citas instau-
rari possit,
& quarum
minimè.

Victus ra-
tio.

quippiam habuerit, carnes gallinarum, caponum, pullorum gallinaceorum, & præsertim eorum testes qui lacte sunt alti, idonei sunt, similiter phasianorum, perdicum, starnarum, omniumque avium montanarum, & mollis carnis. vitanda tamen sunt quæ palustria, & quæ etiam carnem duram habet, insuper & hædinæ carnes, vitulina, capreolorum, leporum, ac cuniculorum iuuenum, necnon & arietum castratorum conducunt, quæ omnes elixatæ potius, quam assatæ præbeantur: cum quibus etiam decorticatum hordeum, lactuca, cucurbita, endiuiæ, cichorium, seu etiam buglossum decoqui poterit, quæ item recentia, & sordida, casumque mollissimum, ac recentē ipsis dare, alienum non est. Et quoniam qui ita se habent, plurimo nutrimento indigent, nequeunt autem, vel quod mediocre est concoquere, paulatim hos, & sæpius cibare melius fuerit: & hac de causa Galenus inquit: [ipse ter eos cibare sum solitus.] *Potus.* Verum quando iam manifestè meliores facti appareant, etiam bis nutriendi sunt. Pro potu vino utendum est, quod quidem aquosum natura sit, & leuiter adstringat, utpote albo & tenui, idque modicè diluatur: hoc enim ab aqua imbecillitate recedit, & vini noxam nondum habet, vitanda est frigida potio, præsertim multa, & quæ prorsus sit gelida, cum corpora extenuata, exiguique sanguinis sint. Quocirca eisdem minus tuta est frigida potio, ut quæ celeriter ad solidas animalis partes peruenit, nulli quod eius vim frangat occurrens, ut liquet 9. de metho. med. cap. 5. Possunt etiam & ea animalia quorum carnibus hæc febre laborantes vescuntur, per aliquod tempus prius decocto hordeo & decorticato, seu eius farina, insuper & lactuca endiuiæ, portulacæ, seu cichorii foliis nutrir, vel cochlearum, seu testudinum carnes prius decoctas, farinamque hordei permistas, eisdem pro cibo præbeas, & quibusdam eorum lac quoque tribuendum erit. Consueuerant etiam Neapoli ex his carnibus contusis quibusdam etiam ex iam dictis refrigerantibus alteratis, cibos prædictis parare, utpote quæ citius ac promptius concoquantur: interrim verò & iura quædam ex contusis ac liquatis eisdem carnibus, similiter etiam cum piscina, aut dictorum refrigerantium aliquo alterata, ac exigua aqua rosea parantur, quibus etiam quandoque nemoralium testudinum carnes adiungunt, insuper & stillatitium quendam liquorem extrahunt, ex pullorum, gallinarum, caponum, seu fasianorum carnibus, similiter contusis: adiciuntque & testudinis nemoralis carnes buglossi, oxalidis, & lactucæ, seu endiuiæ folia minutatim concisa: necnon & poma dulcia quædam, ex quibus omnibus qui postea stillat humor iam dictis agrotantibus præbetur. Quidam verò nostræ tempestatis Medici, nescio qua ratione; seu auctoritate freti stillatitium cochlearum liquorem eisdem agrotantibus præbent, putantes eos cum refrigeratione quadam valenter reficere, verum cum hoc & à ratione alienum sit, & Galeno pugnet, omnino ab eo abstinendum esse consulo. Nam licet acuatim

*Cochlearii
stillatitium
liquorem
non probat
in hæctica.*

reficere possint, maximeque nutrant cochleæ si efficiantur, in corporibus tamen quæ refici magis egent, talia nutrimenta quæ concoctum difficilia sunt, non competunt, utpote quibus concoquendi facilitas non adfit, ut liquet ex Gale. 7. de meth. med. c. 6. Adhæc si nutrire debeant cochleæ, non crudæ, nec semel, aut bis elixæ, sed ter, & veluti in aqua tabefactæ exhiberi debent, ut tertio de alimen. facul. ca. 3. scriptum est. Præter id etiam quod crassum ac lentum generant succum, ex quo promptè obstructio, & putredo sit, ac præter naturam calor augetur, potissimum hæctica febre laborantibus, in quibus nedum concoctio, verum etiam distributio imbecilla est. At si dixerint non totam cochlearum substantiam, sed earum tenuiorem succum ignis artificio extractum conducere, dicimus nos, & hunc quoque difficilem concoctum esse, quod ex earum substantia trahatur, quæ talis est naturæ tum vel maxime quod ab eis crudis, quæ esculenta non sunt, extrahatur, quamobrem promptius alium soluere, quam eos nutrire poterit, possunt item hunc in modum pastilli formari non parum conferentes, ut Recipe, carnum gallinarum, pullorum vel caponum, elixatarum vnc. 2. carnum testudinis, similiter elixatæ vnc. j. electarij regum siue speciebus, dr. 2. margaritarum dra. i. quatuor feminum communium frigidorum vnc. s. sacchari dissoluti in aqua rosa. quantum satis sit. fiant in mortulis, quorum vnc. j. s. vel vnc. 2. pro qualibet vice exhibeantur cum vnc. 3. aque endiuiæ vel buglossi, aut tantundem prædicti stillatitij liquoris. Iac etiam iis mirifice prodest, præsertim muliebri: & ubi ex ipsa mulieris papilla ipsum hauserint: id verò optimum quidem, utpote cognatum, inter alia existit, sed quoniam plerique id sibi adhiberi recusant, afininum ipsis dare cōuenit: id enim reliquis omnibus ad propositum affectum est vile: quippe cum tenuissimum sit, & minime coagulatur & quoquo versus ocysimè in corpus digeritur, aut si hoc etiam recusauerint, aut ægrè assumpserint, caprillum iis dandum est, quod medium ferè existit, & magis potest nutrire, ut liquet ex Tralliano, miscendumque ei erit exiguum mellis, aut sacchari, ut paulo ante dictum est. quod verò balneum quoque mirum in modum eis proficiat, atque conueniat, decretum reliquit Galenus citato libro decimo de meth. med. c. 10. quo etiam loco, modum præcipit quo tales sint balneandi, etiam si exactè tabidi fuerint, ac non parum imbecilles, eo itaque in loco studiosi hæc petant: quamuis nonnulla præcedenti capite explicauimus, etenim maiori cum diligentia hi balneandi sunt, quam ceteri qui hæctica duntaxat febre laborant. Nec etiam parua cura habenda est aliorum refrigerantium medicamentorum, quibus etiam & in hac febre uti licebit, tam si intus, quam si extra adhibeantur. vitanda nanque perpetuo magis erunt quæ immodicè refrigerant in his febrilibus, quam in hæctis quæ quæ nondum tabidæ sunt.

Papilli

Lat. in vnc.

*Morbi
rades
et que
causa.
Tex. ca.*

Balnei

*Tex. i
Morbi
munes
eorum
sa.*

FINIS TERTIÆ PARTIS.

SIVE EXERCITATIONIS.

DE PEST-

DE PESTILENTI FEBRE.

Quid per communes, quidve per dispersos, & dissimiles morbos subintelligendum sit, ac ex quibus proficiantur.

Caput I.

QVAMVIS febris communissimus sit morbus, eius tamē duo sunt genera Hippocrate auctore lib. de flatibus, quorum alterum commune omnibus, pestis appellatur, alterum propter malam dietam priuatim iis contingit qui ea vtuntur, de quo, vt cuique patere poterit, abundē disseruimus. Vt igitur completus fiat noster sermo de febribus, reliquū est de altero genere pertractare, quod quidem omnibus commune, ac pestē citato libro Hippo. appellauit. De quo febrium genere, licet à recentioribus nonnullis multa fuerint exarata, ac passim scripta reperiantur, non propterea visum est nostram de eo, quam veram Galeni, quę putamus esse sententiam, non explicare, breuibus tamen quoad fieri poterit. Vt verò promptius tyrones eā assequi valeant, animaduersione dignum est morbos in Hipp. & Gal. doctrina, quosdā esse vniuersales seu communes, quosdā verò particulares, dispersos seu dissimiles. Appellant autem morbos dissimiles eos, qui sparsim, priuatimqueprehendūt, ægros discrepantē fatigantes, neque secundum cōmunem modum constantes, *σπορὰς* Græcē dicti, vt patet 1. de ratione victus, etenim diuersis eodem tempore morbis homines afficiuntur, seorsūmque vnumquemqueprehendunt, horū causa est suis cuique victus, vt liquet 2. de natura humana, cū dixit Hippoc. [At vbi diuersis eodem tēpore morbis homines afficiuntur, suis cuique victus sine cōtrouersia causa est.] Vniuersales autem seu communes appellāt morbos, vbi omnes, aut multi vno morbo homines corripiantur eadē tempestate, qui morbis dispersis ē regione opponuntur, Græci *παρὰ νόσος*, interim *παρὰ νόσος* & *νόσος* appellant, quorum causa referenda est ad quoddam communissimū, quo maxime vtimur vniuersi, tūc enim victus cuiusque nostrū nequaquam in causa esse, manifestum est: cū morbus omnes iuxta attingit, tam iuuenes, quā senes, tam fœminas, quā viros, perinde vinū, ac aquā bibentes, tam qui offam, quam qui panem commendant: tam qui multū, quā qui parum laborant, non ergo fuerit victus ratio in causa, cum homines quoque victu vtentes in eundem incidūt morbum, *Tex. 2.* vt ibidem testatur Hippocrates, & proinde non immeritō asserēbar eodē loco, quod morbi sunt partim à viuendi ratione, partim à spiritu, cuius attractione viuimus: dispersos morbos tribuens viuendi rationi, pro suo cuique victu, viuendi rationē nuncupans, non ipsa sola esculenta & poculenta, sed vniuersam vitę sortem complectens: neque enim cibi solum, & potiones, verū etiam balneæ, exercitationes, otium, vigilia, meror, ira, frigus, æstusque pariunt morbos: vt Galenus inquit, in commenta-

vniuersales autem seu communes morbos quidam causę, quę quidem communissima ab eo appellatur, referens, spiritui videlicet, seu aëri, cuius attractione viuimus. Sed mox inquit Hippocrate sibi ipsi pugnare, quoniam citato libro de flatibus postquam duo posuit febrium genera, vt dictū est, subdit hæc verba: [vtriusque autem generis auctor, & causa aër existit.] cur itaque eodem loco vnum dixerit febrium genus priuatim contingere ob malam dietam? & 2. de natura humana illud confirmauit nedum in febre, sed in aliis morbis qui dissimiles, dispersique sunt, eos asserens oriri ex diuersa viuendi ratione, quę cuique propria existit? Atqui nos hunc in modum Hippocr. dicta conciliabimus, asserentes verum esse omnē morborum causam esse aërem: verū quorundam proprię, vt pote eorum qui communes omnibus sunt, quorundam verò improprie, quemadmodum ipsemet Hippocr. seipsum declarat. nam cum multorum ciborum ingellione necesse est, & multū spiritum ingredi: omnia etiā quę eduntur, & bibuntur, spiritus in corpus inferunt aliquando plures, aliquando etiam pauciores (vt ipse inquit) & propterea ipsorum etiam morborum dissimilium qui ex victu oriuntur, cibo inquam & potu quodammodo spiritus auctor existit, qui simul corpus ingreditur cum eodem cibo & potu. Id verò signo quodam confirmauit cū ait: [id autem inde manifestum est quod plurimis eructationes post cibos & potus cūenire solēt, discurrente nimirum aëre incluso, vbi peruerit bullas quibus fuerit inclusus.] deinceps declarat modum quo affectus præter naturam ex eo simul cum cibis & potionibus ingestis generantur, vbi exire nequeant, erit itaque aër seu spiritus nō proprię seu primaria ratione horum morborum causa, sed ex accidenti quodammodo, & improprie quatenus simul cum cibis & potibus qui morborum causa præcipue sunt, corpus ingreditur, aliorum verò qui multis seu omnibus communes sunt, proprię & primaria ratione auctor, & causa existit, vel dicas vnum esse morborum genus quod ex inspirato aëre proficiscitur, idque commune eodem Hippocrate teste 2. de natura humana. Alterum verò semper priuatim accidit ex mala victus ratione, quod quamuis dixerit ex spiritu seu aëre quoque oriri, modo quo prius explicauimus, non tamen asseruit ex inspirato aëre, sed potius, vt dictum est, cum cibis seu potionibus ingestis, non igitur sibi pugnat Hippocrates, nam verē & proprię hoc morborum seu febrium genus ob malam dietam priuatim contingere fallus est, licet quodammodo aër cum eisdem ingestis possit aliquo pacto dici esse etiam eorum causa, at communium, seu vniuersalium morborum solus præcipuus & proprię auctor & causa aër existit, non cum cibis & potibus ingestis, sed per respirationem attractus, vt liquet citato lib. 2. de natura humana. Atqui adhuc cum Galeno obiciēs huic Hippoc. sententię, videtur siquidem non rectē, vt Galenus inquit, citato loco, communium morborum ortum in solum aërem conferre Hippocrat.

Obiectio, quę soluitur conciliatione duorum locorum Hipp. qui repugnare videntur.

Alia obiectio, quę diluit declaratione sententię Galeni.

nam cum in fame quidam frumentum semiputre coacti essent manducare in communem, communi de causa, morbum inciderunt, aliquando etiam cum vsus infecta aqua esset totus exercitus, similiter afflictos omnes milites fuisse, idque confirmabat Thucydidis auctoritate 2. historiarum volumine: quo loco scripsit quod qui Aeno grassante fame leguminibus vescerentur, cruribus debilitabantur, qui vero eruum essent, hos genuum dolor corripiebat. Huic obiectioni ipsemet Galenus satisfacere videtur in proemio libri de morbis vul. cum dicebat: [Porro. qui à cibo proficiuntur & potu (loquens de vniuersalibus, ac communibus morbis) tum infrequentes, tum cogniti sunt faciles.] cum itaque infrequentes sint qui ab hisce causis oriuntur vniuersales morbi, sintque cogniti faciles, propterea eos Hippocrat. prætermisisse videtur, de sola ea causa verba faciens, quæ nedum communis, sed communissima est, communissimam causam appellans aërem à quo sæpius ac frequentius vniuersales morbi proficiuntur. Sed dices, nonne idem Galenus in eodem proemio libri de morbis vulgarib. inquit, quod cum tres sint causæ à quibus morbi auspicantur, vna quidem in iis quæ offeruntur, altera verò in operibus quæ obimus, & tertia in his quæ extrinsecus occurrunt nobis, per vnamquamque communes morbi fieri consueuerunt, igitur eius verba quæ mox citauimus Hippocrat. à calumnia non liberant, nisi esset quod statim post citata eius verba subdit: [ac præsertim quidem per affectum aëris ambientis: non enim frequenter accidit, vt per ingestos cibos morbus communis ciuitatem, vel nationem, vel exercitum peruat, sicut neque per communes tum occupationes, tum labores. At continens nos aër si immoderatus calefiat, frigescat, humescat, vel siccescat, corporum symmetriam, quæ sanitas est, confundit, interturbat, ac corrumpit: aliis verò causis neque omnes simul obuiamus, neque integrum diē subiciimus, sed aër solus extrinsecus omnes ambit, & inspiratur. Non enim fieri potest, quin corporum animalium temperaturæ cum eius permutatione afficiantur, ac permutantur.] Hæc ille. quibus ex verbis id quoque elicitur, quod quamuis ex illis etiam duabus ab eodem Galeno explicatis causis, veluti ceteri priuati, & dispersi, ita quoque communes morbi fieri consuevere, frequentius tamen, ac præsertim ab aëre nos ambiente communes morbi contingunt: ab aliis verò perquam rarissime ob eas quas ipse tradit causas, & ob id iterum ad eandem Hippocrat. sententiam conuersi, simul cum eo asserimus, communes morbos qui communissimam causam habent, & frequentius contingant, à spiritu seu aëre cuius attractione viuimus, quoque maxime vtimur vniuersi, originem ducere, reliquos verò à viuendi ratione, raro autem contingere, quod per ingestos communes cibos & potus, communesque occupationes, seu labores idem communes morbi fiant.

Quot modis Aer nos ambiens qui communium morborum auctor est, in calido, frigido, humido, & secco, alteretur.

Caput 11.



Vm verò aër nos ambiens non vno duntaxat modo immutatur, quæ etiã ratione diuerforum communium morborum auctor & causa esse potest, propterea à quibus causis ipsum im-

mutari contingat, differere putauimus: illis namque habitis ac intellectis, facile poterimus in quo communium morborum genere pestis contineatur, inuenire. Alteratur autem aër bifariam Gal. auctore, lib. artis medic. 2. de natura humana, 1. de sanit. tuen. c. 5. ac 12. meth. med. cap. 11. vno modo secundum manifestas eius qualitates, quando videlicet eidem accidunt mutationes in frigido, calido, humido & secco, aut horum coniugatione, secundo modo in tota eius substantia mutationes adueniunt, seu in totius proprietatis essentia, quæ ex vtraque simul iuncta, forma inquam, & materia constituit, vt liquet lib. de constitutione artis medicæ. c. 11. vtputa quædo ex puro impurus, coinquinatus, seu infectus, ob quampiam causam redditur, vt paulo post docebitur: prius tamen causas ob quas eidem aëri mutationes accedunt, in calido, frigido, humido, vel secco recensere videmus, quas mutationes omnes, cœli statum vocare consuevit Galenus, hoc est ipsam ambientis nos aëris temperiē, vt liquet 9. de met. med. cap. 5. quæ tēperies eidē provenire potest, tum propter regionem ipsam, tum anni tempus, tum ob præsentem cœli statum, hoc est particularem eius præsentem temperiem quemadmodum liquet ab eodem Galeno citato lib. 9. de meth. med. necnon & 11. eiusdem. cap. 1. Alteratur siquidem à diuersa regione aër, prout in concauo, aut sublimi sita fuerit, ad Orientem, vel Occidentem, Aquilonē, vel Austrum exposita: pro eius item regionis natura diuersa, vtputa si sulphurea, aluminosa, paludosa, petrosa, vel argillosa regio fuerit iuxta mare, flumen, aut montes, aut alia simili ratione, diuersa fuerit regionis, loci, siue ciuitatis natura: ex cuius aëris alteratione communes quidam oriuntur morbi, quos Hippocrat. interim *ἐν κοινῇ* vocat, interim vero *ἐν ἑκάστη* *ἐν ἑκάστη* *ἐν ἑκάστη*, hoc est collectaneos, vtriusqueque, patrios, seu regionales, & publicos morbos appellare consuevit, vt liquet ab eodem libro de aëre, regione, &c. & à Galeno primo de morbis vulgaribus. in quo quoque primo de ratione victus in morbis acutis. Qui morbi quouis tempore procedente, seu æstate, seu hyeme, & quoquo anno, in eadem regione communes multis superuenire consueuerunt, etenim perpetuo tenent locum quempiam, incolæque ac si cognati essent nullo non tempore comitantur. & hoc vnum genus est communium morborum modo quo diximus ab Hippocrate & Galeno locis citatis nuncupatum, de quibus morbis, in eodem libro de aëre, aqua, & locis egit Hippocrates. Alteratur item, & secundo nos ambiens aër, ex diuersis anni tēporibus; distant autē mutuo anni tempora humiditate, calore, frigore, & siccitate, & propterea magna differentia tēperamenti, quas recte generales appellaueris, annū diuidunt in quatuor tēpora, genere inter se, aut specie differentia, vt cuique tibi appellare visum sit. Nominantur autē Hyems, Ver, Æstas, & Autumnus. Horū temporum hyems humiditate aliis frigoreque præstat. Æstas itē calore ac siccitate. Ver planē in medio est vtriusque: nā in vtraque oppositione neutrum alteri illic præstat, neque sicco humidum, neque calido frigidum. Verum quasi ambarum est æquilibrium oppositionū, æqualitasque horarum omnium rotius prope diē & noctis, atque nulla in illis sit magna immutatio, aut exuperantia; cuiusmodi conspicias in Autumno: hic enim de matutino frigus viget, circa meridiem magnus æstus qui rursus ad crepusculum vespertinum

Tex. com. 3

*Alia item
obiectione ex
Gal. quam
similiter
dilexit.*

*Sape
Com.
per te
Ver q
do cal
& hu
melli
tur.
Lo. o c
cap. 4*

*Com.
per te
Hyen
paries*

*Me
due.*

*Qua
dum
per
per
per*

*Tr
sequ*

num transit in algorem, dominatur tamen in eo siccum humido, & frigidum calido. Atque hoc est temporu anni temperamentu, quoru ferè mutatio fit paulatim, vt à nemine toto tempore sentiat, vt liquet primo de morbis vulgaribus. Quod si libro primo de natura humana Hippocrat. Ver dixerit calidum esse & humidum, quemadmodum etiam nonnulli alij philosophi fatentur, poterit & illud quoque veritatem habere; etenim sic dicunt in temporibus anni, Ver esse calidum & humidum, vt in genere corporeorum animalia, hæc cum plantis conferentes. Ver autem cum Autumno optimu inter tempora anni, & quasi solum prorsus naturali præditum statu, cum illo quod præter naturam affectu est, rectius tamen erit asserere ipsum temperamentum esse; vt eodẽ libro de natura humana à Galeno scriptum est, ob eam quam modo ex eius sententia primo de morbis vulgaribus tradidimus causam, & vt fusiùs nonnullis rationibus primo de temperamentis demonstrat, horum autem quatuor temporum ordo hic est. Ab ortu Pleiadum, seu dixeris Vergiliarum, vsque ad Arcturi ortu Æstas dicitur ab Arcturi ortu vsque ad occasum Pleiadum, Autumnus perdurat, deinde occasus Pleiadum, principium facit hyemis, & quod hyemem sequitur Æquinoctium, Veris principiu habet, totumq; tempus eius ad ortum vsque Vergiliarum, seu Pleiadum protenditur, atque hæc sunt quatuor anni tempora, vt liquet primo de morbis vulgaribus, & commen. aphor. decimiquarti lib. 3. qui verò in septem partes annum diuidunt, quemadmodum inuenies libro de seprimanis, qui Hippocr. nomen præfert, ij hyemem in tres partes dissecant, cuius sub solstitium tempus, mediũ constituunt, de extremis duobus primam sementẽ, postremam *φύλαξιν*, quod est inferendi tempus: nã hoc pacto illi ista appellant. Æstatem autem in duas dissecant partes, quarum vna est à Pleiadum ortu, & dicitur eius prima pars, post quam Canis ortus oportet, id est, fructuum generationẽ inchoat, quam & ipsam pro secunda parte æstatis ponunt; & vsque ad Arcturi exortum protendunt. Veris autem tempus, quoniam ne duos quidem habet solidos menses, factum est vt iure indiuisum permanferit, quemadmodum etiam & Autumnus, quod licet sit Vere maius, quia in menses duos extenditur, magnitudine tamen longè ab æstatis & hyemis tempore vincitur: est enim inter Vergiliarum & Arcturi ortum tempus, mensium quatuor; pluriũ etiam quàm quatuor inter Pleiadum occasum, & Æquinoctiu vernũ interest, atque est & hæc etiam anni vilis partitio, vbi duas differentias generales hyemis scilicet, & æstatis in maius & minus feces, in duas quidem æstatem, in tres hyemem. Verum nos primã anni temporum diuisionem in quatuor generales differentias admittimus potius, vt quæ magis nostro proposito arideat: nam quamuis bifariam tempus quod intercedit inter Vergiliarum exortum, & Arcturum diuidas, nihilominus omni nimia caliditas & siccitas est communis, vt etiam hyemi immodicus algor & humiditas, licet eam in tres partes diducas, cum itaque tali prædita sint temperata, quatuor anni tempora, vt dictum est, fieri etiam non potest quin animantium corporum temperaturæ ab eisdem nõ afficiantur ac permutantur, & humorum exuperantiæ in iisdem corporibus non disideant: & propterea dictum est ab Hippo. lib. 1. de natura huma. singulis anni temporibus, singulos vigere humores: siquidẽ

hyeme pituita viget, sanguis Vere, Æstate bilis, Autumno bilis atra. vnde fit vt frigida & humida appellatur pituita iuxta ac hyems, & calidus humidusque sanguis vt ver, calida & sicca vt æstas bilis flaua, atra vero, vt autũus, frigida & sicca. Cum verò hæc eodem loco confirmasset Hippo. voluit etiam causam adducere sub hyemis exemplo, inueniens propterea hyeme maiorem esse pituitæ copiam, quod frequentiores sint pluuia, & noctes longiores, quod perinde est, ac si dicas (vt ait Galen. in comment.) quod humidum sit, frigidumque hoc anni tẽpus, humidum esse pluuiarum frequentia probatur, frigidum, noctium prolixitate, siquidem caloris quo præditus est aer nos ambiens æstare, auctor sol est: qui tum antecedit propè supra verticem nostrum, & diem longiorẽ efficit. Item frigus hyeme inducit, quod obliquus & humilis, paucòque tempore supra terram feratur, vult denique Hippo. cum circũfusi aeris status, vnã animalium corpora affici, sicari in siccis eius temperamenti, humectari in humidis, incalefcere in calidis, & in frigidis algefcere: & proinde libro de aere regio. & aquis. [Quicumque artem medicam integrè assequi velit, (scriptum reliquit) primum quidem temporum anni rationem habere debet, quantum potentia quodlibet eorum valeat: non enim simile quicquam in illis existit, verum differunt inuicem propter varias quæ in eis sũt mutationes.] Quare si humida hyems, & frigida est, merito in ea frigida & humida præualeat pituita. Quæ ratio, & aliis etiam anni temporibus constat; æstare flaua bile dominante, quando sicca & calida virtute est. Vere sanguine, humido, & calido humore, etenim & ver esse ait calidum & humidum. Autumno, atra bile, vt quæ iuxta, ac hoc anni tempus, frigida sit & sicca, si autem velis ver esse potius temperatum recẽlere, Galeni opinionem sectatus, eadem etiam ratione non calidum & humidum, sed temperatum esse sanguinem dices: est etenim humorum temperatissimorum quemadmodum temperatum anni ver. & propterea in bene temperata constitutione abundat, eodem Galeno teste in præmio libri primi de morbis vulgaribus. Quia igitur non propter dictorum temporum appellationes, in eisdem tẽporibus, dicti generantur ac redundant succi, sed ob eorum proprias temperaturas, aliàs vbi ab eorum temperatura aliquando degenerarent, alios generare succos non valerent, vt liquet ab eodem Galeno citato loco, propterea pro ratione, seu tẽperatura, & non propter nomen prædictos succos vnumquodque tempus augeat. quo fit vt quãdo ambientis nos aeris temperatura ab eisdem tẽporibus permutatur, permutantur etiam succi, & corporum temperamenta, necessitate cogẽte, & ob id vti singula anni tempora propriam temperaturam seruabunt, pro suarum naturarum ratione, etiam morbi ipsi creentur: nõ enim existimare debes quod propter anni temporum appellationes singula agitudines accendant, tales scilicet, vel tales, vt inquit idem Gal. secundo de crisibus, sed propter ambientis aeris temperaturam: nam qualem hic naturam habet, ita etiam nos afficit, sicut itaque morbi pro ratione cuiusque anni temporis, similitudinẽ habentes cum natura succi exuperantis vbi ipsa tempora propriam seruabunt. Quæ etiam ratione & communes seu vniuersales esse dixeris, ac sub eisdem contineri, cum causam habeant vniuersalem atque cõmunem aerẽ videlicet, vt liquet 3. prognost. de quibus loquutus

E e e

Tex 36

In princip.

Cap 3

Morbi pro ratione cuiusque temporis anni, altera species morborum communium.

Tex 33. sequent.

Super text. Com. 1. super tex. 33. Ver quomodo calidum & humidum intelligatur. loco citato. cap. 4.

Com. 1. super tex. 1. Hyemis partes tres.

Æstatis due.

Tex. 38.
Obiectio,
quā diluit
explicata
Gal. sen-
tentia.
Commen. I.
tex. I.

fuit Hippoc. 3. lib. apho. 20. 21. 22. & 23. apho. quod si dixeris hoc pugnare eidem Galen. qui 1. de morbis vulg. ait: [Itaque experimentis & ratione didicimus ubi in hunc modum anni tempora procedant, & in se mutuo conuertantur, non existere, neque pestem ullam, neque quēquam alium morbum vulgarem, sed solos dispersos quos vocant morbos, qui victus comites sunt.] asserimus nos quod ubi quatuor anni tempora sua seruant naturam, & paulatim in se mutuo conuertantur, neque morbus vllus vulgaris generabitur (quorum morborum causas, nos in sequentibus explicabimus) sed bene vniuersales & communes (vt dictum est) quoniam à causa vniuersali, aëre inquam nos ambiente, à diuersis anni temporibus immutato. & si dicas contrarium asserere Gale. citato lico 1. de morbis vulg. quoniam fatetur dispersos solos generari, eosque victus comites esse, admittimus nos cum eodem Galeno hos morbos qui in diuersis anni temporibus suam seruantibus propriam naturam generantur, quodam modo dici etiam dispersos, eo quod in his generantur qui praua vtuntur victus ratione, vt ipse inquit, & non in aliis: hi enim dispersi appellantur morbi, Græci *απορροισμοί* dicti, at quoniam nō iidem eos tenent omni tempore morbi, vt ipse Hippoc. docuit in præcitato aphor. sed immutantur, eorum species seu forme pro diuerso anni tempore, quemadmodū pro diuersa natura, & ætate, pro quibus tum corporum alterantur temperamenta, tum humorum exuperantiæ dissident, vt ipse inquit Galenus citato libro 1. de morbis vulgarib. ob id communes morbi appellari possunt, propterea quod communem habeant causam: obtinet enim parem vim laborantis corpus ad cōcitandā causam, ac aër, quē ubi ambo coeant, acquisititium efficiunt temperamētum, cuius comes est publicē prodeuntium, seu vagantium morborum ortus, vt idem Galenus inquit, sunt itaque hi morbi de genere communium, quatenus ab aëre ortum habent, alterato pro diuerso temperamento anni tempore, at quia sufficiens non est talis alteratio morbos procreare, licet causa sit, cur singuli in singulis temporibus anni, humores vigeant, pro quorum etiam ratione morborum species cōmutantur, sed opus est etiā, vt hi quos morbi tentant, praua vtantur victus ratione, propterea dispersi quoque morbi ab eodem Galeno, quandoque sub hac ratione appellantur: nam ex offensione quidem in ratione victus proficiuntur, ceterum immutantur eorum forme pro anni tempore, vt diximus. De genere etiam morborum qui multos in communi inuadere solent, & communes seu vniuersales appellantur, sunt ij qui à Græcis *ἐνδημιοί*, tum *ἐνδημιοί* vocantur, Latini populares, seu vulgares nuncupāt, dicuntur autem vulgares morbi hi qui per aliquod tempus aliquam regionem inuadunt, vt liquet à Galeno 1. de morbis vulgaribus, & primo de ratione victus: dicebat idē Galenus quod vulgaris morbus est, qui tempore anni aliquo, in regione aliqua abundat, insolefcitque: neque enim certi est morbi nomen vulgare, sed quicumque vno in loco multos simul inuaserit, vulgaris hic vocatur, eodem Galeni auctore 3. de morbis vulgar. quorum etiam morborum auctor, & causa aër existit, at non ex regione, aut anni tempore aliquo alteratus, sed ex peculiari cœli statu, ipsique anni temporibus præter naturam immutatis, quare ex particulari aëris intemperie proficiuntur, quē eidem prouenire

Morbi epidemij, tertii species morborum communium. Loco citato

Com. 3. super tex. 20.

potest, ex nonnullis, ac diuersis statibus, conditionibus, tempestatibus, seu constitutionibus dixeris, eundem ambientem nos aërem in calido, frigido, humido, ac sicco, aut horum coniugatione immutantibus, de quibus summam, & velut per capita docuit Hippocrat. libro tertio aphorism. particulatim autem, libro de morbis vulgaribus. Ceterum scire licet hos morbos quos vulgares, seu publicē grassantes nuncupauimus, non quemlibet aëris particularem statum, seu particularem constitutionem comitari: nam cum quædam exigua esse possint, quædam vehementes, & quædam mediæ aëris ambicis intemperaturæ, seu particulares cōstitutiones, vt liquet cōmentato aphorismi 14. libri tertij, non quælibet earum potest esse vulgare morborum causa, quia non quæ modico tempore durat, ac imbecilla est, sed quæ vehemens existit, ac etiam multo tempore durat, quod significare voluit Hippocrates per verbum dominari, inualefcere, seu vigere, vt testatur idem Galenus citato libro 1. de morbis vulgar. atque hæc de communibus morborum generibus, quorum auctor est aër à diuersis causis immutatus, dicta satis sunt; cum non ob aliam causam, quàm ob tres quas narrauimus in calido, frigido, humido, aut sicco, ei mutationes adueniant.

Quod pestis è genere sit vulgare, & non aliorum communium morborum: & quo modo ab eis etiam dissideat. Caput III.

SE diu tempus est vt ad pestem nostra conuertatur oratio, cuius gratia cūcta quæ de aëre ac morbis ab eo genitis disseruimus, à nobis explicata sunt, quod quidem è genere communium etiam morborum qui ex aëre proficiuntur ea sit, præter id quod auctoritate Hippocratis paulo ante demonstrauimus, cum dicebat libro de statibus, quod alterum febrium genus commune omnibus Pestis appellatur, poterit etiam confirmari eiusdem Hippocrat. auctoritate 1. de ratione victus in morbis acutis, cum assererat: [cum enim nullum commune genus pestilentis morbi vulgetur, &c.] necnō & Gal. auctoritate in præmio lib. de morbis vulg. cum dicebat: [quod morbi qui perpetuò tenent locum quempiam, *ἐνδημιοί* vocati, ex illorum sunt genere qui multis cōmunes sunt, vt pestis quoque.] & deinde subdit: [nam & hæc in communibus morbis est.] At cum tria à nobis communia morborum genera fuerint enarrata, in quonam eorum pestis reponenda sit, nondum liquet, quod verò fieri non possit pestis, aëre ex anni temporibus immutato suam seruantibus naturam, paulatimque eorū facta mutatione, seu conuersione in se mutuo, idem Galen. confirmauit citato 1. libro de morbis vulgar. cum dixit: [Itaque experimentis, & ratione didicimus, ubi in hunc modum anni tempora procedant, & in se mutuo conuertantur, non existere, neque pestem ullam, neque quēquam alium morbum vulgarem.] Ad hæc quod neque generari pestis valeat ab ea aëris alteratione quæ fit ab ipsis regionibus diuersis, eiusdem Hippoc. auctoritate lib. de aëre, re-gio. & aquis confirmari potest, cū dicebat, eos morbos, quoquo tempore procedente & anno, ciuitatem tenere, seu æstate, seu hyeme. Præterea Galen. in præcitato præmio lib. de morbis vulgarib. cap. 1. fatetur eiusdem Hippoc. auctoritate, quod qui morbi perpetuò

perpetuò tenet locum quempiam, endimi vocantur: cum verò pestis perpetuò locum, regionem, seu ciuitatem aliquam non occupet; nec etiam quam occupat regionem, eam omni tempore teneat, sed quibusdam annis, seu anni temporibus, ac certis aeris constitutionibus, vt infra patebit, sequitur propterea quòd nequaquam pestis sit ex eorum communium morborum genere qui à Græcis ἐνδὲμιοι, à Latinis publici, vernaculi, seu regionales appellantur, quo circa necessariò asserendum erit pestem esse numero, seu genere eorum communium morborum esse, qui ex aëre ob cœli statum immutato proficiuntur; quemadmodum Galenus testatur citato libro 1. de morbis vulga. quo loco de morbis vulgaribus verba faciens sic inquit: [horum perniciosissimi quique pestilentes vocantur, qui perinde ac totum vulgarium morborum genus, ex cœli statu proficiuntur.] & libro 1. de ratione victus in morbis acutis, sic scriptum reliquit: [Nullum autem peculiarem de peste confecit librum, quoniam ex epidemiis vnum esse illam, per lib. de morbis vulgaribus demonstrauit.] Nemo itaque hæsitare debet, & communem esse morbum pestem ipsam ex eorum genere, qui ab aëre immutato, proficiuntur, ac sub his contineri qui vulgares; seu populares appellantur: eo quòd & genere vulgaris est morbus, pestis, vt inquit idem Galenus citato libro primo de morbis vulgaribus. Dissidet tamen ab iis perniciem; nam (vt testis est Galenus citato loco) pestes appellant omnes homines, sciuntque exitiales morbos esse, & post pauca de vulgaribus (vt paulò ante diximus) verba faciens, dicebat: [horum perniciosissimi quique pestilentes vocantur, qui perinde ac totum vulgarium morborum genus, ex cœli statu proficiuntur.] & eodem primo de ratione victus inquit:

Com. 3. sup.
per tex. cit.

[pestis verò est epidemia perniciofa.] Tercio quoque de morbis vulgaribus, clarius illud confirmauit cum asseruit: [neque enim certi est morbi nomen vulgare, vel pestilens, ceterum quicūque vno in loco multos simul inuaserit, vulgaris hic vocatur, qui simul si hoc habeat, vt multos perimat, pestis est.] Pro cuius rei exactiori notitia animaduertendum, quòd pestis à Græcis λοιμός appellata, nil aliud significare videtur quàm morbus pestilens, qui ab eisdem Græcis νόσσημα λοιμώδης, seu λοιμικόν nuncupatur, vt liquet ex iis quæ diximus. Quapropter cum pestis vnus sit morbus ex genere epidemiorum, ab epidemiis sola perniciem differens (vt dictum est)

Loc. citat.

propterea rectè inquit Galenus eodem 1. de ratione victus quòd pestis epidemia perniciofa est, si quis autem quæ de peste asserit Galenus in procemio libri de morbis vulgaribus, ritè perpenderit, reperiet vtique pestem morbum esse communem, nam & hæc in communibus morbis est, vt ipse inquit, ac ex genere vulgarium, cum dicebat, ex vulgarium morborum esse genere eos qui pessimi, seu malignissimi, & pestilentes appellantur, & paulò infra, horum perniciosissimi ait, quique pestilentes vocantur perniciosissimi ait, quique pestilentes vocantur. Ex quibus omnibus liquet, quòd nihil aliud sit pestis quàm morbus communis, vulgaris, pessimus, atque perniciosissimus, quæ perinde ac totum vulgarium morborum genus ex cœli statu proficiuntur: additum est autem clarioris doctrinæ gratia, quòd ex cœli statu proficiatur, cum id sub vulgaris morbi nomine cõtineatur, quòd verò pestis pessimus ac exitialissimus morbus sit, ex eodem Galenus ac exitialissimus morbus sit, ex eodem Gale-

Cap. 16. no etiam patet libro de Theriaca ad Pissonem, cum

ait: [Nanque pestis tanquam & ipsa existat quædam bellua, haud paucos interimit, & ciuitates quoque totas depascens, male conficit.] Ceterum nõ ab re, perniciem pestis dissidere videtur à cæteris morbis vulgaribus, cum non à quouis cœli statu, quauis anni præter naturam constitutione, seu quauis tempestate eadem oriatur, etiam si valde vehemens, ac inæqualis, & diuturna fuerit: nam cum tot in libro aphorismorum, & libris de morbis vul. varias tempestates conscripsisset Hippocr. ex quibus vulgares morbi orti fuere, cunctæ sanè fuissent pestilentes, nunc verò cum non omnes ab eo pestilentes fuerint appellatæ, neque multi in singulis tempestatibus perierint, necessariò asserendum erit, quòd non in omnibus pestilentes morbi, licet vulgares fuerint orti. Hinc patet eorum error qui volunt ex quauis aeris diuturna intemperie pestem oriri. quocirca cum eodem Hippocr. & Gal. fatemur, quòd cum tot fuerint ab eodem Hippocr. status, quorum comes est vulgarium morborum ortus, conscripti, duo duntaxat ex eis fuere pestilentes, vnus qui in 3. lib. de morbis vul. tractatur, alter qui in secundo, primum in vnum caput reduxit, his verbis: [Annus austrinus pluuius, à ventis in totum silens.] iam alium statum initio secundi scripsit, hunc in modum: [erant carbunculi in Cranone æstiu, pluebat per æstum larga pluuiæ; acciderunt autem magis Austro spirante.] qui duo status, Gal. teste citato lib. 1. & 3. de morbis vulg. in alio non dissident, nisi quòd hic in vno anni tempore accidit, æstate videlicet; at ille de quo in 3. lib. agitur per totum annu, & propterea diuturnior, addidit etiam in hoc statu, à ventis in totum silens, id quòd illic non ascripsit, nisi fortasse arbitreris, vt inquit Gal. quòd illo libro addidit: [acciderunt magis austro:] hinc tale quid significari. nam hic etiam austrinum simul, & tranquillum totum dicit annum fuisse, nobis ita accipientibus, tanquam possit tranquillum simul, & australis aut Aquilonius esse, & dici totus annus. verum quicquid sit, cum valde calidi, humidique fuissent ambo hi status, & ob id etiam pestilentes, asserendum propterea absque controuersia erit, nullam aliam tempestatem, seu præter naturam constitutionem pestem comitari, quàm calidam & humidam, quamuis diuturna ac inæqualis, seu vehemens fuerit, cum hæc solæ quæ talem habuerunt aeris temperaturam, inter tot quas Hippocrates conscripsit, & 3. lib. aphor. & libro de morbis vulgaribus, fuerint pestilentes.

Pestis non
à quouis cœ
li statu,
quamuis ve
hemens, &
diuturno o
ratur: sed a
liis epidemiis
oriuntur si
ne peste.

Com. 3. a
principio,
2. sect.

Quòd vt pestilentes morbi generentur opus est, nedum in manifestis qualitatibus, verum etiam secundum rerum substantiam aerem immutari. Cap. IIII.

Sed mox quæres, num pro pestis generatione, satis sit aerem in manifestis qualitatibus à calida & humida constitutione immutari, vel opus sit vt in substantia etiam, seu propria essentia tranmutetur. Huic responsum sit nullu pestilentem morbu oriri posse ex aeris alteratione in manifestis duntaxat qualitatibus, etiam si immodicè calidus & humidus fiat, nisi & ipse etiam in tota substantia mutationem accipiat, quòd quidem probatur primo auctoritate Hippocr. lib. de flatibus, quo loco de communi febrium genere, quòd pestem appellari dicebat, verba faciens, reddens causam cur omnibus accidat, quòd eundem spiritum omnes attrahunt, inquit: deinceps cur alicui animantium ge-

Ecc 2

neri, & non omnibus incidat quærens, ait, quia corpus differt à corpore, natura à natura, & nutrimentum à nutrimento; & post pauca dicebat: [Quando igitur aer eiusmodi inquinamenti plenus est, quibus humana natura offenditur, homines ægrotant:] his in verbis clare docuit quod ut homines peste laborent, opus est aerem adeo esse inquinamenti plenum, ut natura humana offendatur. Non igitur qualitate sola, sed tota substantia aer, cum inquinamenti plenus est, oblaedit, & propterea pestis oritur. Idem confirmatur eiusdem Hippocr. & Galen. auctoritate 2. de natu. humana, cum positus duobus modis generationis morborum, volēs docere Hippocr. eorundem etiam curatione, eam instituit morborum ab aere genitorum curationem, qui non ex aere in nuda qualitate alterato ortum ducebant, sed potius ex eodem, totius proprietate essentia, immutato, ut Galen. etiam in commen. fatetur: referens siquidem eorum curationem in duo proposita, loci vicissitudinem videlicet & paucula attrahendæ vsum animæ, ex quibus autem aer in propria substantia immutetur, idem Galen. meminit citato loco, & nos in sequentibus explicabimus. Nunc satis sit quod ex modo curationis quem docent Hippocr. & Galen. in commen. confirmat, tales morbi, qui ex aeris attractione in propria substantia, sed totius proprietate essentia immutati, sunt, pestilētes sint, & non ij qui sunt ex eius qualitate duntaxat immutata, quoniam hi altam exigunt curationem, ut Galenus inquit in commen. cum pestilentes, & exitiales non sint, & propterea Hippocrat. pro eorum curatione, hæc scripta reliquit: [At spiritus ut fluxus quam parvis corpus subeat, utque sit quam familiarissimus providebis, atque solū quoad eius facere poteris, in quo morbus vigeat, veritas, corporaque extenuabis: ita enim minimè multum spiritum, & frequentem, homines requirunt.] Ad hæc, & fortius si in peste (ut inquit Galenus libro de theriaca ad Pisonem) prava quædam aeris ad corruptionem prompta mutatio efficitur, & mutatio ad corruptionem (quæ putrefactio dicitur à Galeno 11. de meth. meden.) cap. 8. est totius putrescentis corporis substantia ad corruptelam mutatio, à calido externo, sequitur necessariò quod aeris ad corruptionem mutatio fiat in eius substantia, & nō qualitate sola, quando pestis oritur, præterea eodē loco ait Galenus, quod cum homines hoc tempore respirationis necessitate, periculum evitare nequeant, ipsum aerem veluti venenum quoddam, ad se per os attrahunt, quod si venena tota substantia nobis aduersantur, & aer ipse, veluti venenum redditus inspiratur, erit utique & ipse non in qualitate sola, sed in propria substantia, seu essentia immutatus, rursus si Hippocrat. luem illam ex Æthiopia Græcos inuadentem, non aliter curauerit, quam aeris immutatione, alterationeque, ne talis amplius inspiraretur, ignem per totam urbem incendi iubens, neque simplicem lignorum materiam alimentum ipsius esse consuluit, verum feta, floresque suauissimos, vnguētaque pinguisima & odorifera ipsis superinfundi, ut aerem purum hoc modo redditum, homines in mali subsidium respirarent, ut inquit Galen. citato loco, cui venerit in dubium, quod cum hoc modo pestem curasset, non ex simplici aeris alteratione in manifestis qualitatibus ea fuerit orta, sed ex eodem coinquinato ac impuro, & propterea hominibus aduersissimo, post-

quam feta, floresque suauissimos ignis alimentum esse consuluit Hippoc. & non simplicem lignorum materiam, necnon & vnguēta pinguisima & odorifera, ipsis superinfundi, ut hoc modo aerem impurum coinquinatumque, purum redderet. Ex quibus etiam patet eorum error, qui putant propterea fieri posse pestem ex frigida & humida aeris intemperie, quod Hippoc. hanc igne curauerit: etenim non simplicem voluit Hippoc. lignorum materiam fuisse ignis alimentum, sed feta, floresque suauissimos, necnon & vnguēta iussit pinguisima, & odorifera ipsis superinfundi, & in hoc decepti sunt quidam magnæ auctoritatis viri, nisi ab eorum codice auferatur hæc vox (frigidum) ut itaque pestis generetur, necessariò (ut demonstrauimus Hippoc. & Galen. auctoritatibus) aer nedum in manifestis qualitatibus, & per calidum & humidum, verum etiam secundum totam eius substantia, seu essentiam immutari debet, intelligentes per totam substantiam eam, quæ ex utraque simul iuncta consilist, forma inquam & materia ipsam excipiente, ut paulò ante animaduertimus, supra cap. 2. & propterea non ab re pestilentes morbos valde malignos ac exitiosissimos esse: atque hac ratione à ceteris vulgaribus morbis disidere à Galen. decretum est. Præter id quod nec etiam à quouis cœli statu proficiscantur, sed à calido duntaxat, ac humido, ut præcedenti capite definiuimus. Sed dices hoc pugnare Hipp. & Galen. sententia, qui constitutionem pestilentem tam 2. quam 3. de morbis vulg. conscriptam fuisse asseruerunt calidam & humidam, nihil asserentes de eiusdem aeris immutatione in propria substantia. Quamobrem & pestilentes morbi oriri poterunt absque eo quod aer mutationem suscipiat, in eius propria essentia seu substantia. huic obiectioni hunc in modum satisfacies, quod in citatis statibus, seu constitutionibus pestilentibus 2. & 3. de morbis vulgaribus, ab Hippocra. conscriptis, aer etiam nedum in manifestis qualitatibus, sed etiam secundum totam substantiam fuit immutatus: fuit enim nedum calida & humida constitutio, sed nebula turbida, vmbrosa, seu caliginosa, aer multis nubibus plenus, non lucidus, nec purus, neque omnino serenus, ut inquit Galenus, propterea igitur quod austrinus simul, pluuius, nebulosus, turbidus, & nonnunquam nubium plenus fuit aer toto anno, in ea pestilenti constitutione, quæ 3. de morbis vulg. scripta est, quemadmodum tota æstate, in ea quæ 2. de morbis vulg. conscribitur, ob id à naturali temperie immutatus ob caliditatem & humiditatem, tota eius substantia seu essentia impurius, vaporibusque plena crasis, ac caliginosa, reddita est. Quod quidem luce clariùs manifestauit Galenus tercio de morbis vulg. Inquiens, [tamen affectus utriusque communis tempestatis, putredo est, utique causam obtinens humiditatem citra ventos.] & subdit: [& videtur putredo ex materia quidem gigni humida: ex causa verò efficiente extraneo, & præter naturam calore, augeri porro quiete, quæ omnia in his constitutionibus, aeri adfuisse cernuntur. Necnon & lib. 1. de diff. feb. c. 4. illud confirmauit cum dixit: serat autem eorū summa (ut ostendit Hipp.) ipsa putrefactio. Iloquens de his duobus statibus: quæ quidem (ut prius dictū est) mutatio est totius putrescentis corporis substantia, & nō qualitatibus. Quod verò talis tempestas humida calidatque, & pluuiæ propterea pestilens sit, quod aer, nedum in qualitate, sed etiam

Tex.com.4

Cap. citato

Cap. citato

Error
runda
pestis
liur.loco cit.
cap. 2.
ita.Obi
que
exp
feg
& H
LacPrima
penn
quisio.Com. 2.
per tota

Te

etiam in tota substantia immutetur, Aristoteles testatur proble. 21. sect. primæ his verbis: [cur annus pestilens tunc inuadit, cum sol multum vaporis de terra excitat? An tunc annus humidus, pluuiusque significetur necesse est, terramque madescere necessarium: sit igitur ut quasi locis palustribus, grauiusque proinde inhabitetur, & corpora quoque multis tunc excrementis redundare necessarium est, ita ut ægrotandi materiam habeant in æstate.] cum itaque aer (ut inquit Aristot.) similiter alteratur in hac cōstitutione, perinde ac in locis palustribus, & grauius ex eorum halitu, seu euaporatione, & hac ratione in totius proprietate essentia, & non in nudis qualitatibus aëri accidunt mutationes, Galen. teste 2. de nat. hum. Et 12. de metho. meden. sequitur necessarium quod in iam dictis constitutionibus aer fuerit etiam alteratus in propria substantia, & non in qualitatibus solis, nec minus idem Aristot. illud confirmare videtur, quod videlicet pestilentes morbi ex aëre oriuntur in propria substantia immutato, & non in qualitate sola, probl. 4. sect. 7. cum dixit: [celerissime autem omnes morbis arripiuntur iis, qui spiritui corrupto proueniunt, quale est omne pestilens genus, prouenit ergo omnis morbus pestilens ex corrupto spiritu, seu aëre, & propterea secundum totam substantiam, & non in sola qualitate immutato, & ut ex iam dictis liquet.

Quomodo ac quibus ex causis Aer putrescat: & quod ex eo, & non ab aliis causis pestilentes morbi fiant.

Capit. V.

PORRO ex his que diximus, duo insurgunt necessario de ipso aëre dissendenda, primum, num possit in propria substantia seu essentia alterari, & putrescere, adeo ut propterea pestilens reddatur, cum inter corpora simplicia connumeretur: secundum, esto quod talis fieri possit, inuestigandum est quomodo, & ex quibus causis illud efficiatur. Quantum ad primum attinet asserimus aërem, donec propriam seruat naturam, vel substantiam, ita ut prorsus purus, ac sincerus sit, putrescere nullo modo seu corrupti, & pestilentem reddi posse. At ubi contingat, ut amplius, eo modo quo fieri possit, syncerus, ac purus non fuerit, sed aliqua ei permisceatur substantia praua, ut expiratio, halitus, seu vapor putridus, fatemur aërem nedum posse putrescere, verum etiam & corrupti, ac secundum totam substantiam immutari, adeo ut pestilens, seu venenosus reddatur: coinquinatur namque atque inficitur, nobisque aduersissimus redditur, ex putrida euaporatione, putridoque halitu, & pestilenti quadam aura, ut paulo post declarabimus. Quod verò nedum aër, sed cætera quoque elementa (excepto igne) putrescant, decretum reliquit Aristoteles 4. Meteororum, tum propter alias causas, ut inquit Alexander in commen. tum vel maxime, quod cum putrefactio corruptio sit calidi in humido, in omnibus aliis elementis præterquam in igne, humiditas reperitur: etiam in ipsa terra, quæ licet humiditatem secundum propriam naturam non habeat, est tamen in ipsa quadam humiditas, per quam vnitur, ac simul manet: potest itaque aër, secundum totam ac simul manet: potest itaque aër, secundum totam substantiam, seu in totius proprietate essentia, quæ & materia eiusdem consistit, ut prius diximus, immutari, putrescere, ac corrupti, ubi prorsus purus

non sit, sed altera ei permista fuerit praua substantia, quamuis vnum sit elementorum. At si idem Aristoteles proble. 20. sect. 25. dixerit aërem, & ignem non putrescere, sed aquam, & terram, causam reddidit hanc esse non ob aëris naturam, sed quia igne refertus est, qui imputrescibilis omnino existit, cum eo nihil sit calidius, quemadmodum ergo qui igne refertus est aër non putrescit, ita ob alteram ei permistam substantiam prauam, suamque humiditatem, non raro putrescere contingit, quo fit ut sibi ipsi non pugnet Aristoteles. Quod verò ad secundum, asserimus nos nolle inuestigare causas pestilentis aëris, ut Theologi, aut Christiani. nam hanc haudquaquam Deo referendam esse ignoramus, quemadmodum & cæterarum rerum. Quinimò Galenus qui neutiquam Christianus fuit, in proemio libri primi de morbis vulgaribus, hæc de peste protulit verba: [At pestes appellant omnes homines, sciuntque exitiales morbos esse: & verò etiam ad Deos sæpe referunt, de curatione earum consulentes.] Neque etiam ut Astronomi tales causas vestigare intendimus, haudquaquam etiam ignorantes illos ortui & occasui astrorum, seu siderum, diuersisque aliis aspectibus, effectus hos inferiores tribuere: indagabimus tamen eas, ut medici philosophi, non recurrentes ad abditas, & cæcas, ut quidam qui artem medicam, ac philosophiam profitentur, asserentes pestis causam, ac pestilentis febris esse perniciosam, venenatamque qualitatem è sublimi, cœlitusque in aërem demissam. Etenim frustra, cum manifestas habuerimus causas, ob quas aër venenatus ac pestilens redditur propter eius putredinem, ad abditas cōfugimus, præsertim cum in Hippocr. & Gal. doctrina passim eadem conscriptæ reperiantur, quibus inuentis ac enarratis facile patere poterit quàm toto etiam (ut inquit) cœlo errarint, qui ex diuturna duntaxat aeris intemperie, pestem oriri credunt: necnon & hi qui ex prauo victu, seu ex humoribus, ad putrescendum paratis citra aeris immutationem pestem generari posse arbitrantur: cum nunquam excitari possit pestis, seu morbus pestilens, nisi, ut diximus, aëri nedum in caliditate, & humiditate immodicè, verum etiam secundum propriam substantiam mutationes acciderint, ita ut putridus, impurus, coinquinatus, & ut ita dixerim, venenosus redditus sit, ac nature humane aduersissimus, & perniciosissimus ob aliquam putrescibilem euaporationem sibi permistam, vel cadauerum multitudine non crematorum, quemadmodum in præliis contingere solet, aut ex aliquorum lacuum, vel stagnorum seu paludum, vel locorum cœnosorum halitu, etiam fluminum quorundam, potissimum æstatis tempore, vel ob auram pestilentem, quæ ex profundo specu spiret, vel ex cloacis quæ urbem, aut numerosum exercitum purgēt, aut ex aliorum animalium mortuorum, olerum, aut leguminum putredine, aut etiam fimo coinquinatus fuerit, poterit etiam ipse aer per contagium primo infici, coinquinari, ac pestilens reddi, quemadmodum Thucydides inquit de ea pestilentia quæ Athenienses inuasit, propterea quod ex Æthiopia per continuum quadam putredinis fluxu contagia, verum & experientia compertum est non modo ventorum vi, aut alteratione, pestilentia semina à remotissimis regionibus prouenire posse ad reliquas, verum etiam ex peregrinis aduentantibus, cum vestimentis, aut aliis quibusdam rebus pestilentem

Ecc 3

Aristot. si
bi constat
etiam si di-
xerit aërem
non putre-
scere.

Secunda
questio-
disquisitio
à quibus
causis aër
putrescat.

Thucydides
de peste
Atheniensium
lib. 2. cap. 48.

Thucydides

lib. 2.

Prima que
fuit dis-
quisitio.

aërem inclusum afferentibus, quemadmodum etiā periculosa est conuersatio cum pestilēti morbo laborantibus, ne inde cōtagium contrahatur, vt inquit Gal. 1. de diff. feb. cap. 2. Et Aristoteles probl. 4. sect. 7. sic quoque & cum aëris temperatura à naturali habitu ad caliditatem atque humiditatem immodicē fuerit conuersa, vt in his statibus quos Hippo. scripsit 2. & 3. de morb. vulg. pestilentes quidem oriri morbos est necessarium, vt citato lib. 1. de diff. feb. scriptum reliquit Gal. & nos paulo ante annotauimus. Nam in his quoque aëris constitutionibus putridi vapores qui è terra eleuantur, ad eum perueniūt, ipsūque aërem secundū totam substantiā inficiunt, & coinquinant, ac si in locis palustribus, grauibusque inhabitaretur, vt inquit Aristoteles citato probl. 21. sect. primæ. ex his itaque omnibus aër putrescere, coinquinari, ac pestilens reddi potest, Gale. auctore 1. de diff. feb. 2. de nat. huma. 1. de san. tuen. lib. de morbis vulg. & aliis plerisque locis.

Qui verò pestilentia semina occulta, cæca & à sensibus aliena esse contendunt, aduersus hanc Galeni sententiam inuehunt, primò quòd cum nulla putrida, nullaque intemperantior aëris constitutio ex iam dictis causis orta, possit in valde multas mundi regiones euagari, illisque vigere, pestilentia verò tam immaniter interdum sæuit, vt vniuersum planè orbem occupet, propterea eadem ex iam dictis causis oriri non poterit, verum si quis memoria teneat ea quæ paulo ante diximus, facile hanc eorum rationem soluet. Nam quamuis in vna mundi regione possit pestilentia oriri, potest tamen per continuum nonnullis communicari, veluti ex Æthiopia Thucydides, ait, propterea quòd per continuum quædam putredinis fluxere contagia, Athenienses etiam inuasit, potest itaque per contagium in diuersas regiones pestilentia disseminari, tum mediis vêtis quibusdam, tum etiam peregrinis per diuersas regiones vagantibus, aut quapiam alia simili ratione. Pestilens item aëris constitutio, calida inquam, & humida immodicē poterit nedum in vna, sed pluribus regionibus vno in tempore dominari, aut in vna, vel duabus prius vigere, & deinde in valde multas euagari, & ita pestilentiam nonnullas mundi regiones occupare. Rursus inquirunt, si vna putredo tantæ perniciæ causa foret, omnes animantes per æquē attingeret: nam salubris aër spiritu ductus, omnes animantes tuetur, ac sustinet, toti illarum generi salutaris. qui ergo ex aduerso à putrida illuue pestilens euaserit, toti animantium generi æquē perniciosus euadet, & inspiratus omnes per æquæ lædet, neque homines magis quàm boues, aut hos potius quàm oues, & fues. Sed non possum

3. Obiectio.

Dilutio.

tantum virum non admirari, vt qui huius solutionem apud Hippocratem libro de statibus, non perlegerit, postquā eiusdē obiectiōne vtitur. Ait namq; Hippo. citato loco: sed est fortasse qui dicat, vt quid ergo nō omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi morbi: cui ego sic responderē, differt corpus à corpore, natura à natura, & nutrimentum à nutrimento: non enim omni animantium generi eadem aut non conferunt, aut commoda sunt, sed sunt alia aliis magis conuenientia. quādo igitur aër eiusmodi inquinamenti pleuius est, quibus humana natura offenditur, homines ægrotant: quando verò alteri cuiuspiam animantium generi aër inconueniens est, tum morbus illud genus corripit.] soluit itaque Hippocrates his verbis di-

lucidissimè hanc secundam eorum rationem. Quinimò nedum in pestilentia quadam nonnulla animantium genera possunt illæsa permanere, quemadmodum Hippocrat. nos docuit in citatis verbis, verum etiam & nonnulli homines, Galeno teste in præmio libri de morbis vulgaribus, ob eas quas ipse tradidit causas: ait namque: [cur igitur in vnaquaque tempestate non omnes vno & eodem morbo capiuntur? quoniam sanè non parum adinuicem distant (vt ipse fatetur) per connatas naturas, & per ætates, necnon per viuendi formas, quo circa hic quidem facile cedit malitici temperaturæ præsentis tempestatis, alius verò quàm multum repugnabit, alius verò lædetur omnino nihil, alius verò per malam viuendi rationem prius morbo occupabitur, quàm tempestatis sentiat læsionem.] quod etiam confirmauit fusissimè libro primo de differentiis febrium, capite sexto. Arguunt & tertio aduersus Hippocratem responsionem, asserentes cum homines soli pestilentia corruunt, quænam causâ hanc stragem facit? num simplex putredo, vt quæ omnes animantes pariter attingit, necesse igitur fuerit abditorem causam, & peculiarem esse, ipsūque aërem peculiari quodam quasi veneno inquinari, quòd huic, non illi animantium generi sit insensum, totaque substantia contrarium, & siquis asseuerauerit aëris putredinem causam esse pestilentia, sed quæ tamen non vna semper sit, & vnius modi, verum nunc illi, nunc alteri animantium generi perniciofa: inquirunt isti, ergo necesse est fateamur malignam hanc esse, & quæ huic, illive præcipuè aduersetur, id autem quid aliud est quàm venenum tota substantia, non manifesta qualitate insensum? non enim explicare possis quis modus, aut quæ ratio sit eius putredinis, quæ ouibus, vel bobus, vel hominibus solis sit insensa, igitur, si nec dilucidè exprimi, nec animo percipi potest, debet in eorum genere censei, quæ cæca, obscura, & abdita nuncupauimus & quæ tota substantia contraria sunt, tantoque genere deleteria, quæ nec ab elementis, nec ab eorum qualitibus fluxerunt, itaque quicquid asseratur, omnis pestilentia cæca, & delitescens est causa, & aliunde quàm ex primis qualitibus, aut ex putredine perfecta, hoc est à certa permissione syderum, seu celesti configuratione, itaque concludunt terrenas, inferioresque infectiones solas pestilentiam inferre non posse, quamuis ad illam non parum præparant, & excitant. Atqui nos cum Hippocrate & Galeno fatemur propterea huic, & non illi animantium generi aërem pestilentem esse insensum, quia tota substantia eidem contrarius existit, & non illi, verum huius putredinem solam ipsius aëris causam esse censemus, à quacunque causarum quas paulo ante meminimus eiusdem aëris putredo initium sumpserit. Insuper asserimus illam quoque malignam esse putredinem, quæ huic, illive præcipuè aduersatur animantium generi: quoniam talibus plenus est aër inquinamenti, quòd alteri cuiuspiam generi inconueniens est, totaque substantia alienus: aliis verò nequaquam, ita vt propterea confugiendum non sit ad cæcas, abditasque causas, & cum inquirunt, quòd tunc aër nil aliud est quàm venenum tota substantia, nō manifesta qualitate insensum atque contrarium, quæadmodum quæ toto genere sunt deleteria, admitimus nos quòd ob putredinē, eamque paruum ac malignam secundū totam

*Quid sit febris pestilens, & quòd non nisi ex pestilenti
aeris statu proficiscatur : solvunturque rationes in
contrarium.* Caput I^o.

Loco citato

Quid febris
pestilens.

Obiectio
quam pau-
lo post di-
luit negā-
do.

Locis citatis.

Cap. 4.

nam causam, ut veneni tum qualitatem, tum vires
æquet, eodem Galeno teste sexto de Locis affectis.
Et libro de Cibis boni & mali succi, idque non ob al-
liud quam ex prava victus ratione, prauorumque ci-
borum usu, & ob id non mirum si in febres inci-
dant putridas adeo malignas, & pestilentes, hoc est
perniciosisimas dicantur, non tamè omnino pesti-
lentes sunt, cum earum causa non sit aer. Incidit itaque
ex pravis cibis nonnulli in putridas febres que adeo
malignæ & perniciose sunt, veluti pestilentes verè
dictæ, ut Galenus testatur hoc in loco, & lib. de Ci-
bis boni & mali succi, & non tamen possunt exqui-
sitè & verè pestilentes appellari, ut diximus, quem-
admodum insigniores quidam medici, etiam si sine
peste oriantur febres hæc, ex ipso cordis corpore
excitata pestilentes vocat, Gal. teste tertio de Pre-
sag. ex pulsibus. Quoniam exitiales sunt. Ad hæc di-
xit Gale. q. nonnulli ex usu talium prauorum cibo-
rum urgente fame non in putridas, & pestilentes fe-
bres inciderunt, sed pustulas instar scabiei & lepræ
in corpore contraxerunt, ita ut non omnes eodè mor-
bo laborarint. At pestilentes febres cum sunt, om-
nibus accidunt, omnibusque communes sunt, ut inquit
Hipp. in ea verò famie non solum non omnes homi-
nes in eisdem febres inciderunt, quinimò nonnulli
(ut inquit Gal.) contraxerunt pustulas instar scabiei
ac lepræ, ex quibus neque etiam perierunt, ita ut pro-
pterea neque dictæ pustulæ pestilentes fuerint, idque
non ab re: nam quibus pravi humores ex vitiatibus ci-
bis orti intra vasa, ac in visceribus quibusdam fuerunt
detenti, ibidemque putrefacti, in febres inciderunt
putridas, ac perinde etiam perniciosas, & interierunt.
At quibus tales humores ad cutem priusquam in in-
ternis partibus putrescerent, peruenerunt, tales pus-
tulæ fuerunt ortæ, & febre non laborarunt putrida
& pestilente, imò neque etiam febre, & propterea neque
interierunt. Fuerunt itaque hæc febres ex putredine,
ob vitiosorum ciborum usum ortæ, & propterea
prauæ, & perniciose, non autem verè pestilentes,
ut quæ non omnes inuasit, neque ex particulari
& pestilenti aeris statu principium habuerint. Sed
quomodo (inquies) ex pestilenti aeris statu pesti-
lentes febres perpetuò oriuntur, si conuersatio eorum
qui pestilenti morbo pestilenti que febre laborant,
periculosa est, ne inde contagium contrahatur, ut
inquit Gal. citato lib. 1. de diff. feb. cap. 2. Admodum
facilis est huic obiectioni responsio, nam hæc quo-
que febris quæ per contagium ex conuersatione cō-
trahitur, ex pestilenti aere quem prius laborantes
inspirarunt, & deinde expirant, ortum habet, vel ab
eisdem inspiratus inficitur, ac coinquinatur prius;
qui demum ita infectus, ac pestilens expiratus, ab his
qui cum eisdem conuersantur attractus, pestilenti
in eis gignit morbum, ac febrem. Adhuc obieci-
as afferens quod cum Gal. dicat eodem. 1. de diff. feb.
in pestilentibus verò constitutionibus, inspiratio
potissima, seu maxima causa est.] & subdit: [fit
quidem & aliquando propter humores ad putredi-
nem paratos in corpore existentes.] loquens de fe-
bre pestilenti, sequi videtur quod non semper pes-
tilens febris ex aere gignitur, neque etiam ex pes-
tilenti statu, huic breuiter satisfacies, quod licet a-
liquando febris pestilens ob eos qui sunt in corpo-
re humores ad putrescendum paratos, fieri possit,
hoc tamen ad eius generationem satis non est, nisi
aer etiam ambiens concurrat, quod quidem ma-
nifestauit Gale. adiciens statim citatis verbis: cum

breuem aliquam occasionem ad febris originem,
ab aere ambiente acciperit animal.] itaque ut fe-
bris pestilens generetur, satis non est ut in corpore
humores ad putrescendum parati, consistent, nisi &
hi quoque breuem saltem aliquam occasionem, pro
eiusdem febris origine, eorumque putredine, ab
aere ambiente susceperint. Sed confestim fortius
instabis aduersus hanc responsionem inquires, Ga-
lenus post dicta quæ modo citauimus, verba cap. 4.
statim subdit: [ut plurimum autem ex inspiratione
incipit aeris ambientis à putrescibili euaporatione
vitiati.] ergo non semper ad generationem pesti-
lens febris, necessaria est pestilens aeris constitu-
tio, cum dixerit sæpe, seu ut plurimum, & non sem-
per. Nisi esset quod Galen. noluit per hæc verba
asserere pestilentem febrem magna ex parte fieri ex
ambiente nos aere à putrescibili euaporatione vi-
tiato duntaxat, & interdum fieri posse ab aliis causis
præter ipsam aerem; ita quod nequaquam is ad e-
ius generationem concurrat; sed cum paulo ante
dixisset ipsam quandoque fieri posse propter hu-
mores qui sunt in corpore, ad putrescendum para-
tos, cum breuem aliquam occasionem in originem
febris, ex ambiente aere acciperit animal, statim
subdidit hoc raro accidere, quemadmodum ut plu-
rimum contingit eam incipere ex respiratione am-
bientis aeris à putrescibili euaporatione vitiari; ita
ut opus sit quod ambo coeant si pestilens febris ge-
nerari debeat, & pestilens videlicet aeris constitu-
tio, & qui humores in corpore, seu ipsamet corpora
sint ad patiendum parata, sed quandoque magis
sunt humores ad putrescendum parati, quam aer se-
cundum totam substantiam immutatus, interim
contra, quod & sæpius accidit. Sed inquires iterum,
saltem effugere non poteris quod licet semper cō-
currat aer pro pestilentium febrium generatione,
non tamen semper opus est, ut vitiatum sit, à putre-
scibili euaporatione, seu pestilens effectus; nam ci-
tato lib. 1. de diff. feb. cap. 4. Paulò post dicta verba
quæ modo citauimus idem Gal. inquit: [contingit
autem quandoque præcedere ambientis aeris cali-
ditatem immodicam quemadmodum in ea pesti-
lencia quæ Athenienses inuasit, ut Thucydides in-
quit, in hac ergo pestilentia immodica ambientis
aeris caliditas præcessit, & non pestilens eiusdem
aeris status, quare non semper requiritur eundem
esse coinquinatum secundum propriam substan-
tiam, sed satis est, ut in qualitatibus manifestis fue-
rit alteratus, ut immodicè calidus redditus, verum
dicimus nos, quod in hac quoque pestilentia, aer
fuit secundum totam substantiam immutatus: nam
(ut inquit Thucydides) in suffocatis tuguriis, æstatis
tempore, habitantium corpora corruptione labo-
rabat, & quia erant humores corporum ex victus pra-
uitate geniti putredini obnoxii, hinc febribus pes-
tilentibus origo data est eisdem corporibus, quem-
admodum enim qui in cauo loco aer inclusus nul-
lum recipiens perflatum, suffocans, putrisque est, &
similiter is qui in domibus quibusdam est inclusus,
suffocans ac putris existit, potissimum in quibus ob
putredinem, & per status defectum plurimum accu-
uatur situs, ut inquit Galen. 1. de sap. tu. cap. 11. Ita
quod in hac pestilentia ea corpora in febres pes-
tilentes inciderunt æstatis tempore, quæ in suffo-
catis (ob domorum penuriam) colebant tuguriis
seu cavernis, propterea quod haudquaquam per-
flatum recipere posset aer in eisdem cavernis, seu
tuguriis

Obiectio
qua Gal.
auctoritas
nititur,
explicatur
& solu-
re ad se-
sum suum
accom-
dandus
testatur
se dissolu-
tū putat.

Cap. 8
1. de a-
feb.

Alia
iectio
dilatatur
per res-
pirationem
si aliter
causa con-
currat.

Obiectio,
cui respon-
det febrem
quæ per cō-
tagium cō-
trahitur, ex
pestilenti
quoque ae-
ris statu o-
riri.

Alia ob-
iectio. Cui
respondet,
non satis
esse humo-
res in cor-
pore putri-
dos ad ge-
nerationem
feb. pestilē-
tis, nisi aer
pestilens
concurrat.

tuguriis inclusus; ex immodicoque calore præcedente, putris, suffocansque redditus est, & ita in substantia immutatus, quemadmodum in cæteris pestilentibus, verum cum non adeo praua esset hæc aeris immutatio in propria substantia, sed minifestius ad caliditatem immodicam fuisset alteratus, propterea Gal. dicebat febribus pestilentibus originem datam fuisse ex eo, quia erant humores in corpore ex victus prauitate putredini parati, ac si voluisset dicere, quod harum febrium pestilentium origo, magis referenda est ad humores ex victus prauitate genitos, & putredini obnoxios, quam aerem, licet ambo requirantur: siquidem exigua erat aeris putredo, quod verò ambo requirantur, & quæ quandoque vna causa potentior altera existat, ipsemet Gal. citato loco, fusissimè demonstrat, inquit; Loportet enim hoc in toto sermone memoria repetere, quod nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest, alioqui omnes qui sub æstivo sole commorantur, febricitarent, & circa canis ortum omnes ægrotarent, & in pestilentibus aeris statibus morerentur, sed magnam in generatione ægritudinum partem habet, eius qui passurus est habilitas corporis. [& ob id ex aeris pestilentis inspiratione rationabile est, quædam corpora statim à prima inspiratione principium putredinis sumere, ac plurimum in malo procedere, nonnulla verò nihil, & nonnulla minimum mali sentire, ac facili ad naturalem habitum habere regressum, itaque ubi aeris ambientis intemperatura ac immutatio in propria substantia admodum immodica non fuerit, necessum est plurimum eos pestilentibus morbis laborare, quicumque magis ad patiendum parati sunt, utpote in quibus superflua adest humiditas, & ex victus prauitate præcedente humores magis putredini parati sunt, minus verò quæ corpora sicciora sunt, ac modicis laboribus vsa, victusque moderato; hæc etenim vel nullam omnino sentiunt offensionem, vel exiguam, ac facili ad naturalem habitum reuertuntur, sunt propterea nedum in pestilentis febris generatione, sed cuiuslibet alterius ægritudinis, necessaria præter causas eas efficientes, corporum dispositiones, verum quandoque efficiens causa valentior est, corporum verò dispositio non magna, interim verò maxima est corporum dispositio, quamuis efficiens causa non admodum valida existat, ut in hac pestilentia, interdum verò ambæ valentes existunt, ubi verò ambæ imbecilliores fuerint, haudquam morbus generabitur, licet ergo in hac pestilentia præcesserit ambientis aeris caliditas immodica, fuit tamen efficiens eius causa immediata, aer putris, suffocans, in propria substantia immutatus, ob persflatus defectum, qui ab habitatibus in eisdem tuguriis seu cauernis inspirabatur, potissimum autem iis febres ortæ sunt pestilentes, in quibus lumbres ob victus prauitatem erant putredini obnoxii, tanquam maiorem habentibus aptitudinem ad suscipiendam aeris inspirati putredinem. Poteris & aliter etiam dicere cum eodem Galen. ibidem, quod non ex immodica aeris ambientis caliditate præcedente fuerit talis pestilentia orta solum, sed per continuum ex Æthiopia quædam putredinis fluxere contagia his, quorum corpora erant ad patiendum parata, febrium causæ futura, quomodocunque tamen fatearis, sempiternæ veritatis erit, quod febris pestilens ortum ducat ex ambiente nos aëre, nedum

in qualitatibus manifestis, sed secundum totam eius substantiam immutato, quantumuis humores corporum, seu corpora ipsa sint putredini obnoxii, & ad patiendum parata. Cæterum aduersus hanc sententiam iterum pugnabis probans cum Galen. non semper pestilentes morbos, pestilentesque febres ex aëre originem ducere, sed ex praua duntaxat victus ratione: nam in illa annona caritate assiduas fuisse multas nationes Romano imperio subditas afflixit, ut scribit Galen. lib. de cibis boni & mali succi, [Cum coacti essent homines mali succi alimentis toto vere vesci, utpote teneris fruticibus, arborumque germinibus, & extremis ramulis, tum bulbis, & mali succi plantarum radicibus, ac agrestibus oleribus, herbisque ferè omnibus virentibus decoctis, quas nemo vnquam prius degustauerat, easque ad satietatem edebant: propterea nonnulli vltimo vere, sed ferè omnes ineunte æstate multimodis, variisque per cutim vlcibus laborarunt, cumque nonnullis instar carbunculi, aut phagedænæ cum febre acciderunt, multos longo quidè tempore sustulerunt, vixque paucissimi ita affecti, morbi periculum euaserunt, quin etiam febres permultæ absque cutis vlcibus fiebant, quas nonnullæ graues excretionum sequebantur, quibus verò nulla earum excretionum seu abscessus contingebant, omnes, vel aliquo ex extis euidenti phlegmone correpti, vel ex vehementi, prauaque febre interièrunt.] Horum itaque variorum vlcum, prauarumque febrium, & exitiosarum, causa extitit solus prauus victus, ex quo vitiosi in corpore succi geniti sunt, nihil conferente ambiente nos aëre. At si quispiam Galen. verba perlegerit, quæ citato libr. paulò post ea quæ modo citauimus, conscripsit, quam facili hæc obiectio tollatur, promptè dignoscet, cum non solum pestilentes non fuerint morbi illi, seu febres eo tempore geniti, quinimò neque πανδημοί, seu πανδημοί, hoc est communes seu vniuersales: etenim non omnes quoque victu vtentes in eundem inciderunt morbum, neque etiam ex eodem victu, vno eodemque morbo correpti sunt omnes: horum etenim morborum velut generatio, ita quoque & causa communis est, Actio & Paulo testibus, sed diuersos contraxerunt morbos, prout variis, dissimilibusque cibis vti, pro fame cogebantur, quamuis omnes fuerint prauis succi. Quare sporades seu dispersi potius, tales appellandi sunt morbi eo tempore orti, quam communes, aut pestilentes, quod quidem manifestauit Galenus sub his verbis: [sed nec mirum fuisse contrarios morbos, symptomataque quibus tunc illi corripentur, cum non modò natura, aut ætate inter se, inuicemque differrent, sed victus quoque ratione, quo variè, & contrarias vires habente, superiore victus inopia vsi sunt: his enim rebus quarum cuique copia erat, vesciebantur, quæ cum dissimiles, variæque essent, eas nonnulli sumebant, quæ vel acido, vel acri, vel amaro salsòve succo forent, alij quæ austero, aut tenaci, aut astringendi, vel refrigerandi, vel egregiè quidem humectandi vim obtinente, aut quæ veneni participes extitissent] ex quibus quibus, vel parum in Galen. doctrina exercitatus haud ægrè percipiet tales morbos, talisque febres, licet ex prauo victu fuerint ortæ, nedum non fuisse pestilentes, sed neque communes & vniuersales, quamuis nonnulli ex eis perierint: nam de ratione pestis (ut dictum est) non solum est ut plures perimat, sed

Alia obiectio quæ refutatur negando morbos fuisse communes seu pestilentes, sed sporades erant.

Sporades seu dispersi potius, tales appellandi sunt morbi eo tempore orti, quam communes, aut pestilentes, quod quidem manifestauit Galenus sub his verbis:

Obiectio quæ Galeni auctoritatem minuit, explicanda est ad finem suum accomodando, etiam si diffinitio mutatur.

Cap. 8. lib. 1. de differ. feb.

Alia obiectio quæ refutatur negando morbos fuisse communes seu pestilentes, sed sporades erant.

vt ex aëre originem ducat, eoque non modò in manifestis qualitatibus, sed secundum totam substantiam immutato: quod etiam perpetuè veritatis existit de pestilentibus febribus, quarum causæ tot numero esse possunt, quot supra explicauimus posse aërem inficere, coquinare, putrefacere, ac in totius proprietate essentia, immutare.

De modo generationis pestilentium febrium, & quòd in nullo trium primorum genere contineatur.

Caput V II.



ST itaq; pestilentium omnium febrium ortus ex putredine, vt inquit Gale. I. de diff. feb. cap. 4. Quæ putredo prouenit (vt dictum est) semper ex aeris vitiat, seu coquinati & putrefacti inspiratione, cum sine eo febris pestilens generari nequeat, perueniens siquidem talis aer ad cor, necessum est & ipsum ab eo infici, coquinari, & præter naturam calidum reddi, quemadmodum eodem puro ac sincero per inspirationem attracto eius caloris symmetria seruabatur, & ita febris generatur pestilens, nam quamuis eodem etiam tempore idem aer pestilens extrinsecus corpori circumfus, per transpirationem ab arteriis trahatur, quia tamen ægrè cum sua substantia, suisque viribus ad cor peruenit, quemadmodum ubi fuerit inspiratus, propterea qui per inspirationem attrahitur aer pestilens, potissimum pestilentis febris causa existit, quod etiam subintelligere voluit Gal. cum dicebat præcitato lib. I. de diff. feb. cap. præcit. In pestilentibus aeris constitutionibus inspiratio potissimum causa existit, dixerat enim prius quòd ex calidiori aeris statu æquè poterat febris gigni, tum per inspirationem, tum etiam per transpirationem eodem calidiori aëre attracto, ipsoque corde immodicè calefacto, quamuis non eadem ratione. At in pestilenti statu aer non ita, sed potissimum febrem efficit per inspirationem attractus, vt pote q; promptius sua qualitate & substantia ad cor perueniat, non negans omnino, q; si per arterias quæ ad cutim terminantur, idem vitiat aer trahatur, quòd possit etiam cor affici, & eadem febris generari, vt cunq; tamen sit, vt febris pestilens generetur, opus est vt putrefactus, ac coquinatus aer sua cum substantia ac viribus ad cor perueniat, & media putredine febre generet. At non propterea quispiam dixerit pestilentem febrem eiusdem generis esse cum his quæ ab humorum putredine accenduntur, cum non vna duntaxat ratione ab eisdem dissideat: perpetuò etenim illa ab externa causa exoritur, aëre inquam coquinato & putrefacto, istæ verò semper ab internis fiunt causis, nunquam autem ab externis, recentibus, ac manifestis, putredinis item excellentia febris pestilens ab eisdem differt, nam illæ à quauis humorum putredine excitantur, ista verò generari nequit nisi maxima ac excellens putredo fuerit genita, ita vt potius corruptio per putredinem, quàm putredo simpliciter appellanda sit, cum neque alterari, neque concoqui, neque euinci, adeo possit, quod in hac febre putrescit, vt iterum naturæ gratiam suscipere queat, amplius in hac febre id quod putrescit perpetuò est aliqua cordis substantia, in aliis verò febribus ex humorum putredine ortis, admodum rarò hoc accidit: sed aliis in locis humores sæpius putredinem suscipiunt, quamuis febris etià generari nequeat ex humorum putredine,

Febris pestil. in quo dissideat ab iis quæ ex putredine oriuntur.

nisi & qui in corde continentur humores fuerint præter naturam calefacti. Dissident rursus & magis, quòd in febribus ex humorum putredine accessis, semper aliquis ex humorum quatuor putredinem suscipit, in pestilenti febre nequaquam, sed possunt aliæ etiam cordis substantia præter humores qui in eius ventriculis continentur, à pestilenti aëre infici, coquinari, ac eiusdè aeris putredinem admittere, vt pote spiritus, qui in sinistro eius ventriculo continentur, ac etiam eius partes solidæ, quo fit vt in nullo trium febrium genere propriè contineri possint hæ febres, vt quidam arbitrantur, diuersi inquam ad diuersa genera reducentes, quamuis omnes à putredine ortum habeant, sed pro diuersa cordis materia, in qua præter naturam calor accenditur, ab inspirato pestilenti aëre diuersimodè sit denominanda, ita vt interim diaria, interim hæctica febris pestilens appelletur, quandoque verò ex numero sit earum quæ ex humorum putredine excitantur, improprie tamen, atque etiam non verè, cum neque diaria neque hæctica, neque ex humorum putredine orta verè dici possit, vt patet ex his quæ diximus, & clariùs ex dicendis. Quod autem ex humorum putredine possit febris pestilens generari, ubi à vitiat aëre inspirato principium putredinis susceperint, propterea quòd ipsi magis fuerint ad putrescendum parati, decretum reliquit Galen. citato lib. I. de differen. feb. Et 3. de præfag. ex puls. de inspirato aëre qui putredine infectus sit, loquens, sub his verbis illud confirmauit: [Nam quibus calor hic putridus ad humores quos continent cordis sinus, vniuersus deflexit, non autem ad corpus ipsum visceris, multi horum fuerunt superstites.] quibus etiam in verbis (vt cuilibet patere poterit) manifestauit calorem hunc putridum posse ad corpus cordis deflectere, & ita hæctica generabitur. Quod paulò ante dilucidius explicauerat inquit: [quod in sermone præteritum ubi aer quem inspirando attrahimus infectus putredine sit, ac putredo ad corpus cordis peruenierit, illi pulsus fiunt &c.] & post nonnulla eodem libro talia protulit verba: letenim sunt (vt docuimus) pestilentes non paucae, vsque ab initio hæctice, distantesque ab omnibus aliis febribus, quæ ex magna putredine oriuntur. Quæ ante omnia præcitata verba, inter causas ob quas corpus cordis largius incaluerit, qua ratione febris excitatur hæctica, dinumerauit aerem pestilentem spiritu attractum, offenso cordis corpore, & non aliis substantiis quæ in eius sinibus continentur. Ad hæc 10. de method. medend. in fine inquit: [verum de colliquantibus febribus disserere in postremum licebit æquè, vt de his hæcticis febribus quæ in pestilentiis contingunt, cuiusmodi ea est quæ nunc publicè grassatur: dicetur nanque & de hac inter pestilentes febres.] Nemo itaque hesitare debet pestilentem febrem, nedum in humoribus accendi posse, verum etiam in partibus solidis ipsius cordis, ex Galen. sententia, quòd si ex pestilenti aeris statu possunt tum humores, tum solidæ cordis partes præter naturam calorem suscipere, quis negabit spiritus etiam eiusdem cordis posse ex eodem inspirato aëre infici, ac propterea in eisdem eundem præter naturam calorem accendi, & ita diariam fieri pestilentem febrem? Quinimò promptius ipsi hunc præter naturam calorem admittent, quanto paratiores sunt ab inspirato aëre alterari, & veluti ex eod-

Quoniam pestil. diaria cum i. trefc.

ex eodem puro ac syncero inspirato generantur, ac nutriuntur, ita ex eodem coinquinato & infecto, putrescunt, ac corrumpuntur: neque hoc etiam intactum prætermisit Galen. nam 1. de diff. febr. cap. citato. Dinumerans nonnullas procatacticas causas, ex quibus homines febricitare conspiciuntur, dicebat: [& quidem quod aeris pestilens constitutio febrem afferre consuevit, nemo sanæ mētis dubitauit.] At qui cum causâ quæ ab eo narrantur, omnes sint externæ, à quibus diariæ fiunt febres, cōnumerans inter eas aerem pestilentem, ex quo febris generatur, subintelligere etiam voluit eam esse diariam, aut certè asserens absolute, pestilentem aeris statum febrem afferre, non magis intelligendum est de aliis, quàm de diaria, in d. de ea potius cum causa sit febris externa, ex qua diariæ potissimum accenduntur febres. Ad hæc eodem libr. paulò post dicta verba, explicans modum generationis febris propter adhæsum alterius caloris, posuit exemplum ambientis status aeris calidioris, qualis maxime cōtingit circa canis ortum, inquit, [quod talis aer per inspirationē attractus, manifestè cor calefacit & febrem generat, corpori autem extrinsecus circumfusum, totum ipsum prius calidius efficit, & præfertim arterias quæ aliquid dicti aeris ambientis substantiæ attrahunt, ex quibus demum omnibus simul cor afficitur: & cum supra modum incaluerit febris generatur.] & deinde subdidit: [in pestilentibus autē constitutionibus inspiratio potissima causa est.] si ergo ex calidiori aeris statu, tam per inspirationem attracto, quàm per transpirationem, & etiam toti corpori circumfuso febris generatur, eaq; non nisi diaria, licet diuersa ratione, sequitur necessariò quod ubi idem aer coinquinatus & pestilens fuerit per inspirationem attractus, diaria etiam pestilens debeat generari, cum eadem sit causa externa, & idem generationis modus, aut saltem præcipue, vel non minùs ea quàm cætera, verùm si pestilentes febres omnes à putredine ortum habent, nō ab re dubitabis, quā fieri possit ut diariæ pestilentes generentur, cum spiritus haudquaquam putrescere queat? Huic responsum sit, quod quāuis ex putredine accendi possit diaria febris, modò ea ad cor non perueniat, ut de bubone scriptū reliquit Hipp. aph. 55. lib. 4. & Galen. 1. de diff. feb. cap. 5. Spiritibus ipsis haudquaquam putrefactis, quia tamē inspiratus pestilens, ac putrefactus aer ad cor peruenit, asserimus diariam pestilentem febrem fieri non posse, nisi & spiritus qui in cordis sinubus continentur, putrescant: qui licet ex eorum natura synceri, tenues, ac puri existentes putrescere nequeant, permixta tamen eis aeris putrefacti substantia impuriore, crassiorēque propterea redditi, putredinem admittunt, quemadmodum de aere dictum est, qui licet syncerorem habeat naturam quàm spiritus, simpliciorēque fuerit, ex permixtione tamen putrescibilis alius substantiæ quandoque putrescit, hac etiam ratione & magis spiritus putrescere, licebit asserere, cum eisdem aliqua putrescibilis substantia, (ut aer pestilens) fuerit permixta: donec autem suam seruauerint propriam naturam ac puritatem, putredinem non admittunt, non igitur in qualitate sola vitales spiritus, quemadmodum in cæteris febribus diariis, immutantur cum pestilens ac putrefactus aer inspiratus eisdem permiscetur, verùm etiam in propria substantia, & propterea diarias asserimus esse has febres, quatenus in spiritibus ca-

Quomodo
pestilentes
diariæ fiunt,
cum spiri-
tus non pu-
trescant.

lor præter naturam accenditur, pestilentes autem, eo quod secundum propriam substantiam immutantur, inficiuntur, ac coinquinantur, & propterea putrescunt, commissa eisdem iam dicta pestilenti, ac putrida aeris substantia per inspirationem attracta, quæ etiam ratione, nec verè & propriè hæc febres diariæ nuncupari poterunt, sed diariæ pestilentes, simili quoque ratione dicimus alienum à veritate nō esse, heclicas generari febres ex pestilenti aeris constitutione, quamuis & hæc quoque à putredine ortum habeant. Nam ubi aer quem inspirando attrahimus, infectus putredine sit, ac putredo ad corpus cordis perueniat, corpus ipsum cordis non solum præter naturam calorem suscipit, ut in cæteris heclicis febribus, sed eius vniuersa substantia solida inficitur, ac coinquinatur à praua, malignaque aeris qualitate, & substantia, ita ut similis etiam eidem aeri reddatur, & quemadmodum ab eodem aere puro ac syncero existente per inspirationem attracto, eius propria substantia, natura, ac temperamentum in symmetria seruabatur, ita quoque cum coinquinatus ac putridus, pestilensque redditus fuerit, ac vniuersus ad eiusdem cordis corpus deflexerit, eius naturam, temperamentum, ac propriam substantiam destruit, putrefacit, ac corrumpit, & veluti alienam ac venenatam reddit, adeo ut propterea nullus ab hac febre euadat, quemadmodum testatur Galen. 3. de præfag. ex pull. cap. 3. Cum inquit: [quam enim excogites medicinam ad putredinem quæ cor occupauit? Aliorum autem nonnulli superflites fuerunt, quibus videlicet ad humores quos continent cordis sinus, vniuersus aer putridus deflexit, sed de his in sequentibus fiet sermo, cum de prognosticis huius febris pertractabimus, nunc verò satis sit nouisse, quod cum putrefactus aer ad corpus cordis peruenit, heclica febris pestilens generatur quæ verè & propriè heclica non est: quoniam non solum in solida cordis substantia præter naturam calor accenditur, eadem ex calfacta, sed putrefacta quodammodo ac corrupta. Cæterum adhuc dubitabis quomodo generari possit febris pestilens diaria, aut heclica, si Galen. 1. de diff. febr. cap. 4. dicebat: [eam promptius generari iis corporibus quibus humores ex prauitate victus erant putredini obnoxii?] Nisi esset, quod aliquando, dicebat Galenus, & non semper febris pestilens generatur ob eos, qui sunt in corpore humores ad putrescendum paratos, cum breuem aliquam occasionem ad febris originem ab aere ambiente acceperit animal, id quod nequaquam nos negamus, & si dixeris, quod in ea pestilentia quæ Athenienses inuasit, iis etiam corporibus febrium pestilentium origo data est, ut ibidem post pauca scriptum est, adhuc asserimus in ea pestilentia corpora promptius laborasse, in quibus, ob victus prauitatem humores erant putredini obnoxii, quæque in suffocatis tuguriis habitabant, at non propterea negauit Gal. quod in illa, & in aliis etiam pestilentis possint, & diariæ, & heclicæ, pestilentes febres generari, nō ob id quod humores sint in talibus corporibus magis putredini obnoxii, sed spiritus magis parati ad suscipiendam talem aeris putredinem, vel partes solidæ cordis, quod etiam innuere videtur idem Galenus citato libro primo de differentiis febrium, cap. 8. cum dicebat: [oportet enim in toto sermone memoria reperere quod nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest.] & paulò post in-

Dubitatio.

Respondet
Non sensum
per feb. pe-
stilens ge-
neratur ex
humoribus
putridis.

quit: [At vt diximus magnam in generatione morborum partem habet eius qui paffurus est, habitas corporis.] satis est itaque vt plurimum eos pestilenti febre laborare, qui magis parati sunt ad suscipiendam aeris putredinem: quæ dispositio corporis, non modo referenda est ad humores putredini obnoxios, verum etiam ad spiritus, & partes solidas, eo quod indifferenter aeris putredo inspirata, singulas has tres cordis substantias occupare potest, prout vna vel altera ad suscipiendam eius putredinem magis parata est. Nam veluti febris ipsa indifferenter incipere potest calore præter naturam accenso, in vna trium substantiarum seu materiarum, quæ nostra corpora constituunt, humoribus videlicet, spiritibus, aut partibus solidis, vt liquet citato libro primo de differentiis febrium, cap. i. quamuis in genere primo laso non sistat, sed duo reliqua genera inuadat, progressu temporis, nisi antea soluat, perinde etiam non inconuenit vt ab inspirato pestilenti aere febrilis dispositio alias ex aliis dictarum cordis substantiarum initium sumere possit, & si dicas hoc non esse vndequeque simile, nam non solum maior dispositio vnius, seu alterius substantiæ efficit vt quandoque vnum, quandoque alterum genus febrium generetur, sed requiritur etiam causarum efficientium diuersitas: ex aliis nanque causis diariæ oriuntur febres, & ex aliis hæctica: atque etiam ex aliis quæ ex humorum putredine fiunt. At febrium pestilentium omnium vnicam asseruimus esse causam, aërem siquidem pestilentem, ac putridum, & ob id fieri nequit, vt ex eadem causa diuersæ cordis materiæ seu substantiæ accendantur: & propterea diuersæ etiam genere febres pestilentes fiunt. Huic responsum dabimus, quod licet perpetuo aer putridus seu pestilens, auctor, & causa sit pestilentium febrium, non tamen semper idem aer, eadem ratione, eodemque modo coinquinatur, ac pestilens redditur, sed diuersa ratione, & quandoque magis, quandoque minus talis efficitur, ob quam diuersitatem, maiorem etiam, vel minorem proportionem habebit cum hac, vel illa cordis substantia, quo fit vt interdum spiritus, interdum humores, non raro autem solidam cordis substantiam occupet, atque in ea primo febrilis dispositio initiumumat, progressuque temporis, reliquas etiam, nisi antea soluat, inuadat. Diuersum itaque genus est pestilentium febrium à iam dictis tribus primis generibus, cum in nullo eorum contineantur, sed indifferenter, non solum ex hæctica, & diariarum numero esse possit, sed earum quæ ex putredine ortum habeant, si earum febrium subiecta inspexeris, semper tamen in aliquo ab eisdem discrepabunt pestilentes febres, vt in præcedentibus explicauimus, & propterea Hippocra. libro de flatibus alterum genus febrium esse dicebat commune omnibus, quod pestis appellatur: quarum febrium tempus iam est signa recensere, primo dignoscitua, & deinde prognostica.

De pestilentium febrium dignotione, ac prognostico.

Caput VIII.

Signa febrium pestilentium.



VONTIAM in peste omnia horrendissima fieri possunt, & grauissima quæque superueniunt, nihilque in ea velut in aliis morbis definitum est: plurima etenim, & varia sunt

symptomata, Aetio & Paulo testibus, ob id à maximis exordiemur indiciis febrium pestilentium, quemadmodum in cæteris febribus egimus: & deinde reliqua omnia recensebimus, sunt autem maxima quæ à calore, pulsu, & vrina sumuntur, calor siquidem harum febrium ab aliis per putredinis excellentiam differt, nam tangentibus nobis eos qui tali febre laborant, neque calidi, & perurentes videbuntur, quamuis interius magno flagrant incendio, vt liquet ex Galen. 6. de morb. vulg. ita vt in ea peste quam Thucydides descripsit, adeo interiora agri vrebantur, vt neque valde subtilium vestimentorum, neque linteolorum velamenta, neque aliud quicquam præter nuditatem, ferre possent, quamuis tangenti corpus exterius valde calidum non erat, neque viride, sed subrubrum, liuidum, pulsus exiguus, & vlceribus efflorescens, & si manum thoraci exercitatus medicus in explorando febrili calore, imponat, caliditatem maiorem, ac acriorem sentiet, quam in reliquo corpore, & æstus quoque sentiant agri in thorace maiorem. Pulsus aderunt omnino celeres, frequentes sæpius, non autem præualidi, sed quibusdam imbecillimamifesti, & in hac febre celeritatem contractionis percipies, in quacunque cordis substantia præter naturam calor fuerit accensus: magis tamen, vbi pestilens febris cordis humores occupauerit, quibusdam verò aderunt pulsus ferè moderatis similes, parumque præternaturam immutati, ac in eodem statu perpetuo permanentes, aderitque similiter respirationis frequentia, interim & magnitudo, & si quispiam obserauerit expirationem agrotantium, sæpius graueolentem reperiet, quemadmodum vulgus obseruare vsu consuevit. Tu verò non vsu modo, sed & ratione æstima id veritatem habere. Vrina non semper eodem modo videbuntur: nam quorundam conturbata, & aquosiores erunt, nonnullorum autem multò quam pro natura tenuiores. Quibusdam vrina naturali ferè vndequeque similis erit, calore, crassitudine, & sedimentis: quæ inter omnes exitiosior est, vt dicemus, erit quoque animus, præsertim vrinarum sublimamentis, adhibendus: nam quædam quæ subliuida quodammodo sunt, fugiunt: & item alia quæ aranearum latas telas referunt, in modum lanæ congestæ. At si quid tale animaduertas, aut nullum planè sublimamentum innatare vrinis, in peiorem partem hæc interpretare, vt Gal. inquit 3. de prælag. ex puls. verum ex vrina in eiusmodi febribus, præsertim vbi corpus cordis occupauerint, firmam notitiam petere semper non licebit, vt ipsemet Galen. testis est: sed alia sunt perpendenda. Nam & in ore eorum cernes aliquid pestilentis coloris, cum partim erysipelatosum, partim colorem habent depascentibus herpetibus similem, per plures partes diffusum, cibum respuunt, sitiunt præter modum, ac frigidum postulant, & oculi manifestè calidi & flammæ redduntur, potissimum si licebit eos balneare, à balneo hæc accidunt, vt Galenus inquit citato libro tertio de prælag. ex puls. Accidunt quoque eis deliria varia, bilis vomitus, præciorum distentiones, dolores, sudores multi, extremitatum frigiditas, profluua biliosa, tenuia, flatuosa, vrina aliis aquosa & tenues, aliis biliosa, aliis nigra, malas subsidietas habentes, & pessima ea quæ in medio vasis depêdet, sanguinis narium destillationes, æstus in thorace, linguæ torrefactæ, vigilæ, conuulsionēs violente: sed & vlcera praua, & carbunculosa, & perni-

& pernicioſa in peſte fieri poſſunt, & in reliquo corpore, & in facie, ac conſiſſis, vt ex Ruſſi auctoritate fatetur Aetius cap. 95. lib. 5. & Paul. cap. 35. lib. 2. interim ex hac febre incidunt in ſyncopem, anguſtia premuntur, ac inquietudine vehementi. Alui excrementa ſiunt graueolentia, quādoque verò ſynſtectica & pingua, & vrinae etiam oleoſae: interim in cataphoram incidunt, & vox eiſdem vitiatur. Ex his omnibus, aut eorum quibuſdam, peſtilentem febrē dignoſces. Num verò in humoribus, partibus ſolidis, aut ſpiritibus cordis accenſus fuerit præter naturam calor, ita diſcernas. Nam ſi in humoribus fuerit accenſus, interius magis aſtu laborabunt, & vruntur, & hi ſunt qui maximè velamenta linteolorum tui ferre non poſſunt, neque aliud quicquā præter nuditatem: licet exterius corpus valde calidum non ſit, ſed ſubrubrum, liuidum puſtulis exiguis, & vlceribus efflorefcens. Puſſus habent celeriores, neque adeò imbecillos, quamuis neque præualidos, percipiuntque agri ſe febre laborare, neque æqualiter perpetuò, ſed inæqualiter febricitat. Reſpiratio maior, & frequentior erit, vrina quoque conturbata, interius aquoſa & tenuis, aliis biliola, aliis nigra, malas ſubſidentias habentes, aut peſſima ſuſpenſa, ſeu etiam ſublimamenta: interim oleoſa, & pingues videbuntur ſpiritus graueolens, & in ore aliquid peſtilentis coloris magis percipitur: ſitiunt magis ac linguam habent aridiorem, & frigidam maximè deſiderant, ac cibum reſpuunt. Poſt aures, aut ſub aliis, aut circa inguina potiſſimum ſiūt abſque manifeſta cauſa eiſdem bubones, vigiliae, conuulſiones, deliria, anguſtia, inquietudines, alui excrementa graueolentia magis, biliola, & inter ſynſtectica, & pingua maximè aderunt. Si verò ſolidæ cordis partes fuerint accenſæ, febris admodum exigua erit, adeoque exiguus præter naturam calor, ac perpetuò æqualis aderit, vt quidam ſe febricitare negent, cum ſe febricitare non percipiunt. Puſſus etiam aderunt moderatis ſimiles, eo quòd parum ſunt præter naturam immutati, & in eodē ſtatu perpetuò manebunt, neque maiores iuſto, atque interim neque crebriore, omnino tamen celeres quodammodo, eo quòd celeritas febricitantium puſſibus perpetua eſt, ſuntque omnino etiam imbecilli, cum ipſum corpus cordis fuerit occupatum. ſimiliter vrina colore, craſſitudine, & ſedimento, naturali ſimilis erit. Galen. auctore eodem 3. de præſag. ex puſſ. verum non propterea hæc accidunt (vt quibuſdam viſum eſt) quòd natura præ malitia ſeu venenoſitate aggredi non audeat peſtilentis febris cauſam. quidam verò aliter atque aliter interpretari hoc conantur, qui omnes, quos viderim, vſque ad noſtra tempora in hoc hallucinati ſunt. Neque enim propter aliud (vt Galen. viſum eſt citato libro 3. de præſag. ex puſſ. febris exigua eſt, calorque exiguus, puſſuſque moderatus, ſeu hiſ qui ſecundum naturam ſunt admodum ſimiles, in eodēque ſtatu perpetuò manent, nec febricitare ſe percipiunt, & vrina quoque colore, craſſitudine, ac ſedimento admodum naturalibus ſimiles ſunt) niſi ob id, quòd febris peſtilens, ipſi cordis corpus occupauerit, planèque cõfirmata fuerit: & vt ita dicam, hecetica, & in habitu. qua ratione hi ſunt quoque qui omnino inter omnes qui peſte laborant morituri ſunt. Nam quam excogites medicinam, inquit Gale. citato loco, c. 3. ad putredinem, quæ cor occupauit: cum autem ad corpus ipſius viſceris calor hic putridus vni-

uerſus deflexerit, non ab re puſſus non omnino celeres erunt, nec maiores, aut crebriores, in eodem ſtatu perpetuò manentes, parumque præter naturam immutati, licet imbecilli ſint omnes, febrilisque calor exiguus & æqualis, quoniam nullam accenſionis inuaſionem, nec incrementum, nec vigorem, nec remiſſionem habet, vt cætera febres heceticæ. Et quoniam vaſorum facultas concoctrix ſerè oblaſa non eſt, aut parum ob februm exiguitatem, ob id etiam vrinae colore, craſſitudine, & ſedimento naturalibus penè ſimiles erunt, miniuſque deliria, vomitus, ſudores, alique profluvia hiſ febris accidunt: neque puſtulae aut vlcera quædam in corpore efflorefcent, aut bubones ſiunt, & dolores, ſeu labores miniuſ eos afficiunt. At ſi contingat calorem hunc putridum ad cordis ſpiritus deſcendere, & ſi raro eueniat, quòd ſi contingat ſtatim hominem perimit, aut ad aliquam duarum ſubſtantiarum peruadit (non enim in eiſdem ſpiritibus diu ſiſtere poteſt) non tamen deſt facultas id dignoſcendi, ægiuſ tamen ab hecetica, quàm ab ea quæ in humoribus accenditur, diſtingui poteſt: quemadmodum & cætera diaræ ab incipientibus heceticis febris diſſicultate etiam ſecernuntur. erit autem in hiſ febrilis calor non adeò exiguus & æqualis velut in hecetica, nec ita acris & mordax, vt in ea quæ in humoribus accenditur. Corporis extrema non admodum frigida. & ſi thorax tægatur, licet calidior reliquis corporis partibus reperiatur, miniuſ tamen acris, & mordax ſentietur caliditas, quàm in cæteris peſtilentibus. Puſſus non adeò imbecilli velut in heceticis, celeriores tamen, & frequentiores: minus quidem celeres & frequentes quàm ſi in humoribus calor hic putridus fuiſſet accenſus. vrinae admodum ſimiles hiſ quæ ſecundum naturam ſunt. Incidunt in animi deliquia, ac ſyncopen ſæpius qui hac febre laborant, quàm cæteri. qua etiam ratione pauci quoque ſudores, præſertim in ceruice & fronte, in hiſ cernuntur, ſeu maiores quidam, lingua aderit non admodum ſicca & ſalebrosa, & propterea neque ſitis intenſa, corporiſque iactatio, ac inquietudo circa dolorem quempiam, propter virium imbecillitatem in hiſ percipitur: neque etiam puſtulae, aut vlcera, ſeu bubones eiſdem oriuntur, aut alui profluvia. Hiſ quippe indiſciſ febres peſtilentes dignoſcuntur: atque hoc modo inter ſe diſſidere videntur. Nunc ad prognostica tranſeamus. Si quis ſolerti fuerit ingenio præditus, futuram peſtem prænoſcet, & animaduertiſſione malignorum anni temporum & vitæ ſtudioſi ad ſanitatē haud conducentium, aliorumque animalium præcedente interitu. Inſuper etiam ſi expendit cuiuſmodi ſit præſens anni tempus, qualiſve vniuerſus annus, vt liquet ex Aetio & Paulo præcitatis locis. Cæterum neminem præterit peſtilentes febres omnes pernicioſas eſſe magna ex parte ex earum propria natura, cum non modò duplicem, ſed ſæpius etiam triplicem in ſe magnitudinem contineant. inter cæteras verò illæ ſunt pernicioſiores in quibus plura, ac ſeuiora ſymptomata accidunt, vbi eiſdem generis fuerit. Quòd in humoribus calor hic putridus ſuſcipiatur, miniuſ periculosa febris erit, ſi puſtulae, aut vlcera in corpore efflorefcent, ſeu bubones appareant, quàm vbi talia non ſiant, etenim virium robur præ ſeferunt, vt quæ adeò robuſtæ ſint, vt venenoſam materiam extra expellere conentur. Quamuis vbi peſtilens fuerit conſtitutio, vt plu-

Si calor putridus cordis ſpiritus inuaſit.

Prognostica.

Quæ peſtis miniuſ periculosa, & quæ periculosa.

Fff

rimum crises ad mortem ter minantur, vt liquet cōmentario aphor. 13. secundi libri. Verum relatione ad eas febres pestilentes in quibus aeris putredo ad corpus cordis peruenit, semper minus minatur periculum hæ, in quibus calor hic putridus ad humores quos continent cordis sinus, vniuersus deflexerit, cum horum multi superstites fuerint, illi verò omnes interierint, vt inquit Galenus tertio de præfagit. ex pulsib. Quapropter neque hos curare tantandum erit, cum nullam excogitare poteris medicinam, ad putredinem, quæ cor occupauit, eodem Galeno teste. vbi verò aer quem inspirando attrahimus, putredine infectus ad spiritus cordis vniuersus peruenerit, admodum exitiosa esse consuevit febribus pestilens, ac cito interimens, nisi spiritus prætergrediens priusquam omnes inficiat ac corrumpat, ad humores quos continent cordis sinus, siue solidas cordis partes deflexerit, & ob id neque etiã tales pestilentes febres curationem desiderant, cum autem citò interimant, aut in aliud pestilentem febrium genus transeant. Reliquum itaque est, vt earum quæ curationem admittunt aggrediamur: earum inquam, in quibus aer infectus, putredine, inspiratus, ad humores quos continent cordis sinus, vniuersus peruenerit. Nam harum quædam curari poterunt.

De pestilentium febrium curatione. Caput IX.

QUOD V M verò hæ febres omnes ex putredine ortum habeant, vt conclusimus, Galen. auctore 1. de different. febriu cap. 4. neque etiam simplicem habebunt curationis indicationem, quemadmodum de cæteris febribus quæ ex humorum putredine fiunt, cum eodem Gal. determinauimus, sed geminam, alteram videlicet quæ ex putredine sumitur, alteram quæ ex ipsa febre præstatur, quamuis putredo nimirum primò sananda sit, tanquam febrium causa. nec interim febris quæ per eã accēsa est, ratio non erit habenda, modo vires valeant. & si in idem consentiant quæ febrem extinguunt & putredinem auferunt, sine cunctatione id agendum erit. At cum putredo in his febribus, non ex quapiam interna causa, sed ex putrido inspirato aere originem ducat, huic primò prospiciendum erit, ne & putredinem & febrem amplius in corporibus efficiat atque augeat, deinde quicquid eorum iã factum est summouere tentandum. Et ob id 2. de natura humana (siue Hippo. fuerit, siue alius quispian auctor) scriptum est: [At spiritus vt fluxus quam parcissimus corpus subeat, vtque sit quam familiarissimus prouidebis, ac solum quo ad eius facere poteris in quo morbus vigeat, vertes, corporaque extenuabis: ita enim minimè multum spiritum & frequentem homines requirant.] & Galen. in comment. dicebat: [auctorem, curationem eo loco ordine tradidisse eorum morborum, quos totius proprietate essentia, potius quam nuda qualitate corpora offendens parit aer, in quorum numero febris pestilens est: in duo (vt ipse inquit) referens proposita, loci siquidem vicissitudinem & pauculæ attrahendæ vsum animæ.] verum vbi ob quampiã causam solum vertere non liceat, id saltem quam primùm curabis, vt quam parcissimus aer, & minimè frequens, corpus ingrediatur, sitque his quam familiarissimus: ac corpora extenuabis: ita enim (vt inquit Hippocr.) mi-

nimè multum aerem, & frequentem homines requirant, parumque ab eo nondum familiarissimo reddito, oblatetur: quoniam aeris nos ambientis temperamentum, corporis dispositionem secum mutat, acq̃isitiũque efficit temperamentum, quemadmodum natura & ætas, Galeno teste quarto de ratione victus, & primo de morbis vulgaribus. eoque magis, si nedum in qualitate, sed in tota substantia fuerit immutatus. Quo circa huic attenti esse cogimur, maximè & primò, quoniam non tanquam causa sine qua non duntaxat, vt in cæteris febribus ab eo indicationem sumimus, sed velut efficiente, cum ipse putridus, ac pestilens redditus (vt dictum est) sit harum febrium auctor, & proinde domus in qua æger decumbit, eligenda erit sita versus aquilonem, in loco non vtiq̃ue cauo, qui nullum percipiat perflatum, sed clato: sint tamen fenestræ clausæ quodammodo, ne multus, & pestilens aer ingrediatur, præsertim si quæ erunt versus austrum. Quæ verò ad aquilonem sunt posite, interim patere cōuenit, vbi potissimum aer clarus, ac serenus fuerit. Turba quoque hominũ quātum fieri potest, ingredi prohibeatur: nam præter id quod aerem pestilentem secum trahant, domum etiam calefaciunt. Atqui curare oportet ipsum ad frigidum siccũque alterare, quod ad qualitates spectat. Quod verò ad substantiam, vt syncerus, purus, atque odoratus sit, ob id alsidue domus hæc aqua rosacea aspergatur, aut aceto rosaceo, vel vtriusque simul permixtis, aut humi rosæ plurimæ, violæ, nenupharis flores, seu myrti substernatur in reliquis verò ædibus, aula in qua æger iacet, contiguis quotidie ignis succendatur ex optimis, atque odoratis lignis, quo illatus pestilens aer purgetur: vt quercus, iuniperi, pinus, oliuæ, lentis, cupressi, lauri, myrtillorum, rorismarini, sarmentorum vitis, & huius generis similibus, ponanturque desuper res odoratæ, vt santali, rosæ, rorismarini, mali medici, seu citrangelorum flores, neque inconuenit vt interdũ in eodem conclau in quo æger decumbit, paruus quidã accendatur ignis, ex dictis lignis odoratis rebus etiã ac floribus odoratis iniectis, præsertim vbi febris valida non fuerit, ac tempus anni non vehementer calidũ. Nam & putredine calidus aer, etiam in febribus à Galeno probatur, vt patet decimo de methodo medendi cap. 8. præter id quod talis ignis purum ac familiarem aerem reddit, in hunc etiam vsum cōfert si domus hoc decocto inspergatur, Recipe rosarum rubearum manip. j. santalorum omnium drach. 4. florum nenupharis, & violarum ana manip. s. bulliant in sufficienti quantitate aquæ, & addita quarta aceti parte, vtare. interim iuniperi baccas, & myrtillorum folia ac fructus aduicito, ac poma quæ apia vulgo appellatur, seu eorum cortices, lauri, maliq̃; medicum folia, tum flores. item odoramenta alsidue æger teneat, quæ capite de febre ardente requiras. & licet in hac febre vigilie & somnus moderatè conueniant, quia tamen sæpius vigilie ægrum molestant, cum his quæ eodem capitulo conscripsimus somnus conciliandus erit. Cauendus tamen immodicus somnus, cum humidiora corpora reddat, quæ admodum vigilie, sicciora, & imbecilliora vbi modum exceßerint: omninoque motus vitandus erit. tum quod febrientibus haudquaquam conueniat, tanquam calorem in corpore augens, vt liquet ab Hipp. & Gale. 6. de morbis vulgaribus, & ex eodem Gale. comm. aphor. 28. libri secundi & 20. lib. tertij, tũ vel maximè quod maius frequentius infectum & venenatum

Indicatio duplex, apu
tredine &
a febre.

Tex. comm
4.

Iman
reple
Ani
fictu
Cib
potus

Supet
Com
per

De
quali
gelat
ste.

Com.
8. con

Tex.

tem
di alio

Pur

V
Elio

Te
24

Somni
Quali

Quæ
motus
Commi
tex 31.

d
b
p

venenatum aerem inspirare cogentur. quies igitur ægrotis inungenda pari ratione repletio viterur, ac excrementorum omnium, præsertim alui inanitio procurabitur congruo tempore singulisque diebus, prout docuimus citato cap. vitentur insuper animi ac cidentia omnia immoderata, cibus etiam & potibus eisdem vtantur, quos eodem capitulo de curatione ardentis febris probauimus, semper eisdem acetum, aut acida quædam, præsertim mali medici acidum permiscendo: nam corruptela exigit contemperamentum, & non solam adiectionem Gal. teste commentario aphorismi 17. primi libri. Et quamuis cogendi sint ægri vt cibos assumant, vbi eos fastidierint: nam fortissimi, qui vim sibi ipsis afferentes, cibum oblatum assumpserunt, omnes ferè superstitites fuerunt, vt ait Galenus tertio de morbis vulgaribus plurimi verò mori quam comedere quicquam prius duxerunt, & minimè vtile sit, vt inquit Celsus capitulo septimo lib. 3. fame vti, vitanda tamen cane peius & angue erit nimia cibi & potus repletio, quam quidam Emperici ac Barbari nimio opere probarunt parum rectè eadem Galeni verba intelligentes, ac propterea ægros nimio cibo implentes, citius stragulant, eo quod putredinem, ac humorum corruptionem augeant. quocirca corpora extenuare præcipiebat Hippocrates libro 2. de natura humana, ita enim minus cogentur multum ac frequentem spiritum attrahere, & non eadem replere iussit. Tanta itaque cibi & potus quantitas exhiberi debet, quantam vires exigunt, vt ex ea seruati possint vsque ad morbi summum vigorem, vt fusius in vniuersali methodo explicauimus. & vbi non valeant vnica vice vel duabus in die eam euincere ac concoquere, in plures tum diuidenda erit, hoc est ter & sæpius, sed parum, cibus exhibendus erit, quemadmodum docuit idem Galenus commentar. citati aphorismi 17. libri primi, vbi videlicet vires laborantis debiles fuerint, & ea quæ est in corpore dispositio sit ex corruptione humorum, vel defectu. confestim autem in primis morbi diebus nulla expectata coctione, quoniam neque omnino euinci, aut concoqui quod putrefactum, ac corruptum est in his febribus, à natura valet, euacuare tentandum est; nam quod alienum à natura est, ita vt amplius ad primam humoris bonitatem redire non possit, e-ducere, idque primum est tentandum, vt liquet quarto de sanitate tuenda. cap. 4. quapropter omnibus consentientibus, per venæ sectionem tentabis quod putrefactum est vacuare, & ob id statim vbi potissimum sanguis abundet (vt inquit Aetius) venam secare licebit internam dextri cubiti. nam velocissimè & plurimum ex his, quæ principes sunt, partibus, vena hæc corpus vacuat, quo circa in acutissimis morbis ad hanc incidendam se confert Hippocrates, vt liquet ex eodem, & Galenus quarto de ratione victus in morbis acutis. qua secta, eam quæ sinistri cubiti interna est, venam, iterum secabis: neque enim simul multa sanguinis copia in his febribus extrahenda erit, ne vires prosterantur: sunt etenim hæc semper in eiusmodi febribus parum valida, vt dictum est, propterea quod cor primario sit affectum, & ob id tutius erit venæ sectionem repetere, quam simul multam sanguinis copiam vacuare, etiam si morbus exigat: in quem etiam vsum confert sinistri cubiti secundò venam secare, magis quam dextri vt quæ magis è directo sita sit ipsi cordi. si verò cum hac febre, post aures, vel

sub alis, aut in inguinibus bubones fiant, non minus etiam vena secanda erit, potissimum vbi non tota materia ad easdem partes fuerit delegata, & expultrix facultas segnis fuerit ad excernendum. At non semper interna dextri cubiti, sed seruata rectitudine, ea incidatur quæ cum iam dictis partibus maximè communicat, vt humeralis, vbi post aures, interna cubiti vbi sub alis, poplitis, seu maleoli vena, vbi in inguinibus bubones apparuerint; dextra tamen vbi in dextra, & sinistra vbi in sinistra bubones emerferint. Exonerata etenim natura ab hac venæ sectione, potentior efficitur ad excernendum à corpore quod corruptum, ac omnino alienum est. At si vlcuscula, pustula seu reliquæ cutis efflorescentiæ in toto corpore apparuerint, quæ vlcuscula, seu *ἔσθημα*. Græci vocant; perpendendum est critica, vel symptomatica excretionem sint. distinguas autem id ex conferentia & tolerantia: nam si critica fuerint, conferent, & ægri lenius se habebunt, si symptomatica, haudquaquam, sed contra, secabis itaque venam aliis consentientibus semper, vbi symptomatica ratione hæc proueniant; neque enim ab eiusmodi excretionibus natura iuuabitur vniquam, præsertim vbi ea fuerint exanthemata, quæ vulgò *πυλὴ* Neap. appellantur, & propterea non modo ea iuuanda non erit per hanc viam, cum vitales tales vacationes non fuerint, sed cohibere Hippoc. decreto aphorismi 2. lib. 4. id quod in dies admodum formidare cernimus quamplures nostros Neapolitanos medicos, in similibus febribus pestilentibus, cum eiusmodi cutis efflorescentiis. Qui ob eorum imperitiam putantes à venæ sectione naturæ motum, ac si esset criticus, impediri, eam omnino prohibent, & propterea ægros veluti gladio quodam ingulant, quamuis nos non cohibendas, hoc est repellendas eas esse asserimus, sed cum ex eis æger iuuetur, quod venæ sectionem, aliæque medicamenta, tum intus, tum etiam de foris adhibita non impediunt, fatemur. quinimò eisdem audacter vtendum esse, censemus. Si verò critica natura ad cutim pellat redundantes, ac vitiosos humores, animaduertere oportet num integrè eos excernat, vel excreuerit, hoc est perfectè, & indeficienter, an non, vel excreuerit, hoc est perfectè & indeficienter sit iudicatum, aut iudicetur, neque mouere, neque mouere aliquid oportet, Hippocratis decreto aphorismi 20. libri primi, & ita inhibenda erit venæ sectio. At si non integrè, & perfectè expellantur, si pustula aut fuerint expulsi ad cutim contenti in corpore vitiosi ac venenati succi, sed permulta fuerint eorum copia, adeo vt à natura expelli nequeant, eadem per venæ sectionem exoneranda prius erit, vbi reliqua consentiant, & deinceps iuuanda per ea quæ per cutim vacuant, vt sexto de morbis vulgaribus à Galeno decretum est. Nec propterea natura impeditur, sed citius ac promptius aggressam iam crissim perficiet, à multa humorum copia exonerata, ob quam prius grauata, inceptam crissim perficere non poterat, si verò ætatis, aut virium ratione, seu alterius cuiuspiam, venæ sectio fieri nequeat, cucurbitulis scalpello circuncisis, aut hirudinibus vtendum erit. similis quoque ratio de purgatione habenda erit. Nam vbi ea indigeant ægrotantes, nulla (vt diximus) coctione expectata, eadem vti oportet, quam citius poteris à venæ sectione, vel statim in primo saltem, vel in secundo die, si venæ sectio fuerit impedita, etiam si materia non tur-

Pustula si efflorescentia in toto corpore apparuerint, quæ vlcuscula, seu ἔσθημα. Græci vocant; perpendendum est critica, vel symptomatica excretionem sint. distinguas autem id ex conferentia & tolerantia: nam si critica fuerint, conferent, & ægri lenius se habebunt, si symptomatica, haudquaquam, sed contra, secabis itaque venam aliis consentientibus semper, vbi symptomatica ratione hæc proueniant; neque enim ab eiusmodi excretionibus natura iuuabitur vniquam, præsertim vbi ea fuerint exanthemata, quæ vulgò πυλὴ Neap. appellantur, & propterea non modo ea iuuanda non erit per hanc viam, cum vitales tales vacationes non fuerint, sed cohibere Hippoc. decreto aphorismi 2. lib. 4. id quod in dies admodum formidare cernimus quamplures nostros Neapolitanos medicos, in similibus febribus pestilentibus, cum eiusmodi cutis efflorescentiis. Qui ob eorum imperitiam putantes à venæ sectione naturæ motum, ac si esset criticus, impediri, eam omnino prohibent, & propterea ægros veluti gladio quodam ingulant, quamuis nos non cohibendas, hoc est repellendas eas esse asserimus, sed cum ex eis æger iuuetur, quod venæ sectionem, aliæque medicamenta, tum intus, tum etiam de foris adhibita non impediunt, fatemur. quinimò eisdem audacter vtendum esse, censemus. Si verò critica natura ad cutim pellat redundantes, ac vitiosos humores, animaduertere oportet num integrè eos excernat, vel excreuerit, hoc est perfectè, & indeficienter, an non, vel excreuerit, hoc est perfectè & indeficienter sit iudicatum, aut iudicetur, neque mouere, neque mouere aliquid oportet, Hippocratis decreto aphorismi 20. libri primi, & ita inhibenda erit venæ sectio. At si non integrè, & perfectè expellantur, si pustula aut fuerint expulsi ad cutim contenti in corpore vitiosi ac venenati succi, sed permulta fuerint eorum copia, adeo vt à natura expelli nequeant, eadem per venæ sectionem exoneranda prius erit, vbi reliqua consentiant, & deinceps iuuanda per ea quæ per cutim vacuant, vt sexto de morbis vulgaribus à Galeno decretum est. Nec propterea natura impeditur, sed citius ac promptius aggressam iam crissim perficiet, à multa humorum copia exonerata, ob quam prius grauata, inceptam crissim perficere non poterat, si verò ætatis, aut virium ratione, seu alterius cuiuspiam, venæ sectio fieri nequeat, cucurbitulis scalpello circuncisis, aut hirudinibus vtendum erit. similis quoque ratio de purgatione habenda erit. Nam vbi ea indigeant ægrotantes, nulla (vt diximus) coctione expectata, eadem vti oportet, quam citius poteris à venæ sectione, vel statim in primo saltem, vel in secundo die, si venæ sectio fuerit impedita, etiam si materia non tur-

Purgatio à venæ sectione, & ante.

geat: est etenim venenosa, & in corde consistens: quapropter neque concoctionem admittit, neque si eam admitteret, eadem expectanda esset, ratione partis in qua continetur; quemadmodum fufius nostro libello de concoctione disseruimus. est itaque in principio statim purgatione vtendum, vbi ea indigeant aegrotantes, nulla expectata morbi coctione in his febribus. Nam non solum per vrinas, euacuationes, sed quasque alias corporis purgationes, probantur Aetius cap. 95. libro 5. & Paulus capitulo 35. libro 2. ambo tamen ex Ruffi auctoritate. & Galenus primo de differentiis febrium, cap. 4. corpora in quibus superfluitates redundabant, pestis tempore, purgatione sanabat, inquit ipse: quamuis de praeservatione loqueretur; neque enim alia & diuersa ratio est, quod ad causam abscissionem, in praeservatione & curatione, quamuis in illa qua potest in futurum morbum facere, causam tollimus, in hac, quae iam actu facit: quoniam sub hac, iam sensibiliter ex ipsa causa morbus est genitus, in illa vero est futurus, utraque tamen prophylactice appellatur, ut liquet vndecimo de metho. meden. cap. 2. quamuis & curatio quoque appellari possit, nam & quae praecustodia dicitur, est etiam curatio quodammodo, eodem Gal. teste citato libro primo de differentiis febrium cap. 4. at purgationis ea ratio habenda erit, ut per ea purgantia medicamenta perficiatur; quae nihil venenati, nihilque molesti habeant: per haec etenim non modo morbi malitia non augetur, neque cum maximo labore, & virtutis prostratione, putrefactus humor simul cum bono educitur, ut quibusdam visum est: quinimod redundans humor, licet excellenti putredine & malitia praeditus fuerit, tuto & non multo cum labore, ac cum virtutis robore eadem exonerata, expurgatur. Neque enim eadem seruanda est lex in educendis eiusmodi venenatis humoribus, ac in ceteris, ita ut concoquendi, ac praeparandi prius sint, neque natura, post coctionem & secretionem, eos excernere tentat, sed cum omnino alieni sint atque venenati, eos quam primum expellere conatur, aequè certè, ut quae in ventre corrupta prorsus sunt, & propterea confestim etiam indiget aliquo manu porrigente, & hunc eiusdem motum adiuuante, ut ex utroque noxij humoris fiat euacuatio. Natura quidem expellente, medicamentum verò attrahente, perinde ac in materia turgente, cum non minus in pestilenti febre, imò magis eadem pericula imminuant: decumbunt etenim ad membrum princeps, & non per corpus vagantur putrefacti ac venenati humores. sunt verò haec, mel aëreum, cassia fistula, tamarindi, saccharum violaceum, rosarum rubearum succus, rhabarbarum, agaricum, senna, epithimum, myrobalani, & quibus ea seligenda sunt, ac inuicem componenda, quae tibi pro ratione redundantium succorum conducibilia esse videbuntur. Interim diacatholicon, ac etiam triseram persicam descriptione Mesues adiacere poteris: neque enim in his febribus omnino despicienda erit. Id verò memoria semper teneas, quod vbi putridus ac pestilens inspiratus aer vniuersus ad partes solidas cordis, aut eiusdem spiritus deflexerit, neque venae sectione, neque purgatione vtendum erit, neque his quae vrinas, aut sudores ciunt, quibus à purgatione iam dicti vti poterunt, sed ceteris medicamentis alterantibus intus & extra, quae statim docebimus: sunt etenim haec communia omnibus pestilētibz febribus. nam quod futurum est putridum, seu venenatum, vitandum est, ne

*Si putridus
aer solidas
cordis par-
tes occupa-
uit, neque
venae sec-
tione, neque
purgatione
vtendum.*

fiat in cunctis pestilētibz febribus, quod verò corruptum atque omnino à natura alienum, omni via vacuare tentandum est, potissimum autem vbi humores tales fiant, ut dictum est, & licet id vitabitur praecipue vbi causa fuerit summoti, non parum etiam confert, si cum eiusdem medicamentis, aeris inspirati malitiae valde obsistat, & corpus imparatum ad suscipiendam eiusdem aeris putredinem reddas, eamque listas, ne amplius progrediatur, ac reliquas nondum putrefactas cordis substantias occupet, & corrumpat, & quamuis in reliquis pestilētibz febribus non ex putredine humorum ortis, frustra haec etiam ferè remedia tentabis: sunt etenim exitiales ferè omnes, vtunque non ea exhibere non inconuenit: in quem usum magnopere à Galeno commendatur terra Armenia, seu lapidem nominare volueris. Inquit enim nono de simplicium medicamentorum facultatibus. quod in magna illa peste, cuius eadem facies fuit, atque eius quae Thucydides memoria grassabatur, quotquot hoc medicamentum bibere, celeriter curati sunt. At quibus non profuit, omnes interiere, scilicet cum nec alio quouis iuuarentur. vnde colligitur quod iis duntaxat non fuerit auxilio, qui planè erant incurabiles. vult itaque Galenus hoc in loco quod qui à peste curari possunt, omnes hoc medicamento liberantur. Deinceps exhibendi modum docens, asserit: [Ceterum bibitur ex vino albo, consistentia tenui, modicè diluto, si aut planè febris careat, aut leuiter ea teneatur, sin grauius febriat, admodum aqueo, non tamen calore vehementes sunt febres pestilētes.] haec ille. sed vtinam bolus hic, lapis, seu terra, ex Armenia, ea quae Cappadocia finitima est, etiam siccantior (ut ipse ait) ad nos perueniret: neque enim haesitandum esset de eius facultatibus, quas Galenus citato loco testatur, neque in peste praestantius vllum medicamentum esset praerendum. verum cum talis lapis seu terra ex Armenia haudquaquam ad nos deferatur, aut saltem per quam rarissimè, & paucissimè, & propterea neque verus, & syncerus reperitur, ut ex eius tum colore, tum substantia coniectare licet, ab eo potius abstinendum esse arbitror, ne per lapide Armeno, alia vtamur adstringenti ac obstruente terra, ex qua potius aegri laedantur, quam iuuentur, ut in dies cernimus quosdam Neapolitanos medicos in omnibus ferè febribus, etiam non pestilētibz, vti, non parum aegrotis noxam inferentes, cum obstructionem ac putredinem augeant, ob eiusdem terrae crassam substantiam, frigidumque ac siccum temperamentum. neque hic qui apud nos reperitur (orientalis bolus communiter dictus) omnis ex Lemno vehitur: esset etenim fortè vera terra lemnia; sed adhuc eius conditiones omnino participare haudquaquam videtur. Quamobrem neque etiam eodem vtore, neque vti consulo, postquam terra illa non est armenica, quae ex Galeno commendatur, sed dubia res est, num etiam ex Lemno feratur. sed verissimilius est adulteratam esse terram, tum ob eius copiam, quae passim in Italia reperitur, tum vel maxime quod neque terra lemnia omnino conditiones participare videtur; & valde difficile sit, etiam veram à non vera discernere, ita ut veram à ficta dignoscere queat nemo, ut liquet ex Galeno 1. de antidotis. cap. 2. sed pone veram esse terram lemniam, non eam sed armeniam commendauit Galenus, quam si conducere iis febribus non uisset,

Cap. 3.

Theriaca.

Quæ
stio
bre
me
de
cap.
prio.

Syrupi.

Pulueres.

Epithema.
ta.

uisset, non vtrique subiciuisset inter tot quas ei tribuit facultates, licet tutum reddere accipientem eam, à venenis, aliisque mortiferis medicamentis, ac fortè ferarum moribus non negauerit, 9. de simplicium medicamentorum facultatibus, simul cum iuniperi fructibus, quod medicamentum posse à peste etiam præseruare cum eodem Galeno admittimus. vbi autem lapis hic armenus fortè haberi poterit apud quosdam Regulos repertus, modo quo Galen. commendauit, tutò in his febribus vtare. Commendatur etiam non minùs à Galeno libro de Theriaca ad Pisonem, Theriaca, seu ipsa quoque ignis quidam purgatorius existat, vt ipse inquit, præsumentes enim in pestifero aeris statu, neuiquam malo corripì sinere nouimus, correptis iam posse mederi aeris inspirati malitiam inalterantem mutantemque, vt quæ corporis temperaturâ infici magis prohibeat: de qua similis mihi occurrit hæsitandi ratio, velut de bolo armeno, tum propter viperæ varias opiniones, atque eius incertitudinem (neque enim hucusque, licet magnopere laborauerim, & plures ad me sub hoc nomine fuerint delatæ, veram viperam suis cum cõditionibus inspicere potui) tum etiã propter alia medicamenta simplicia quæ Theriaca compositionem ingrediuntur; quorum nonnulla haudquaquam comperiuntur. At vbi fortè exactè & probè præparata reperiri contingat, audacter ea vtare. In hunc etiam vsum confert magnopere mali medici succus acidus solus, aut exiguo saccharo paratus, nec minùs & limonum, & limoncelij aut cæterorum malorum aureorum acidorum, ac malorum puniceorum, ac pomorû acidorum, oxalidis, sonchi, buglosi, melissophylli, ex quibus separatim, aut quibuscumque eorum permixtis cum saccharo, syrupum conficere poteris, cum quo interim smaragdi gemmæ pollinem (vbi diues fuerit æger) misceto. Cõducit insuper syrupus acetosus simplex, aut oxyfacccharum. poteris etiam hunc in modum medicamentum quo ipse vtor, parare. Reci. sacchari rosacei, & buglosati ana vnc. i. s. dissoluas in lib. i. s. aquæ melissophylli, oxalidis, aut seris seu buglosi, transfunde per colum, & adicito syrupi ex citri acido, oxyfaccchari, & de pomis singul. vnc. 2. pulueris diamargarit. frigidi drach. 2. foliorum dictamni, zedoariæ, & radicis heptaphylli ana drach. s. foliorum auri numero sex misceantur, & ægrotanti sæpius in die & nocte, parum exhibeatur. Huius etiam pulueris per duas horas ante cibum drach. i. exhibere poteris cum vn. i. vini albi odoriferi, & altera aquæ rosaceæ, & mirificæ confert. Recipe radicis heptaphylli, & pentaphylli ana drach. i. zedoariæ, dictamni cretensis, seminis mali medici, & cornu cerui vsti singulorum scrup. 2. cyperi, baccarum iuniperi cuiuslibet scrup. i. ossis de corde cerui scrup. s. croci gra. 3. misceantur & fiat puluis tenuissimus. interim drachmam s. margaritarum, aut smaragdi pollinis adicere poteris. & vbi synceram habueris terram armeniã drach. i. s. eiusdem adicito. denique ex his inuicem diuersimodè commixtis, diuersos componere poteris, prout vsus vrgebit, pulueres, eosque prout conducere magis videbitur, accommodabis. Cordis insuper regioni epithema hoc erit imponendum, quod recipit aquæ oxalidis, buglosi, nymphaeæ, & rosarum rubear. ana vnc. 4. aquæ melissophylli, & florum citrangulorum ana vnc. 2. santalorum omnium, & corallorum rubeorum singulorum drach. 3. ligni aloes, corticum mali medici, seminis basiliconis, cin-

namomi, cuiuslibet scrup. i. ossis de corde cerui numero 2. croci grana 4. vini albi odoriferi vnc. 2. s. omnibus simul commixtis cum serico, purpureoque linteo, fiant epithemata. Conuenit insuper eidem cordis regioni hoc medicamentum imponere, Recipe Theriaca drach. 4. terræ lemnia, & santalorum rubeorum ana drach. i. aquæ rosaceæ, & aceti parum, fiat ad modum vnguenti: roborat enim cor, medicamentum hoc, forasque trahit id quod in eo venenarum est, & prohibet ne ulterius ac magis inspirati aeris malitia eiusdem cordis substantiam inficiat. etenim non propellendo à se Theriaca, aut cætera alexiteria medicamenta, sed ad se trahendo venenum vacuant, Galeno auctore 5. de simplicium medicamentorum facultatibus. cap. 18. & præsertim vbi foris fuerint imposita. ait nanque [omne deleterium venenum à foris impositis medicamentis euacuatur, nempe aut caliditate attractionem mollientibus, aut totius substantiæ similitudine.] horum tamen medicamentorum quæ alexiteria, seu alexipharmaca vocant, duplex est natura; vna eorum quæ diximus, quæ vacuant à patiente corpore venenum, seu deleterium medicamentum; altera quæ alterant, aut vna duabusque qualitatibus, aut denique tota substantia. vt ibidem à Galeno scriptum est. Sacculi insuper parari poterunt hunc in modum, Recipe florum nymphaeæ, buglosi, rosarum rub. ana manip. s. florum citrangulorum, rorisinarini, & melissophylli ana drach. 2. santalorum, & corallorum rubeorum ana drach. 3. ligni aloes, corticum citri, seminis basiliconis ana drach. i. foliorum dictamni, zedoariæ, cyperi, & baccarum iuniperi ana scrup. s. croci grana 3. ossis de corde cerui numero 1. interim margaritarum, aut lapidum pretiosorum contritorû, seu folius smaragdi drach. s. aut scrup. 4. adicere poteris: ambræ quoque & moschi grana 2. & cum serico, & purpureo linteo, omnibus simul commixtis, ac confusis, sacculi fiant; atque his topicis medicamentis vtendum est, etiam si exanthemata quædam apparuerint, quæ Neapoli vulgo pastitij vocantur vt dictum est, cum per ea materia aliqua intus non repellatur, neque per hæc exanthemata vnquam crisis fieri possit, cum non humor, sed vapor ad cutim perueniat; etiam si à natura fiat eorum excretio. Adhæc roborato per eadem medicamēta corde, promptius ad alias saltem cutis partes à se quod molestat, excutiet, adeò vt semper maius sequatur commodum quàm incommodum. Quod quidem persuaderi quibusdam nostris Neapolitanis medicis, nunquam potuit, in grauem tamen ægrorum perniciem, ob eorum pertinacem ignorantiam. & hæc satis esse duxi pro cura febris pestilentis. neque enim me præterit complura pestis remedia apud nonnullos eruditissimos viros, qui de ea conscripserunt, reperiri, à quibus, vbi hæc non suffecerint, studiosi petant. Nos verò quæ præstantiora ac magis conducibilia sunt, vsuque comprobata, hic conscripsimus. At bubonum, exanthematum, aliorumque symptomatum quæ cum his febribus complicari solent, curationem propriam consultò prætermisimus: neque enim defunt qui horum curationem fusiùs explicauerint, innumeræque eorû ferè remedia scripta reliquerint. Nos verò hic pestilentis duntaxat febris curationem docere proposuimus: qua etiam ratione & febres pestilentibus similes curari poterunt. Id tamen perpetuò vitare consulo, ne in communem grauissimumque nostræ tempestatis medicorum errorem incidas, qui in

Vnguenta
cordi admo
ta.

Sacculi.

*Vide finem
cap. 2. par-
tis tertie.*

eiusmodi febribus, præsertim perniciosis, & valde malignis, veluti in lypiriis, in quibus ob magnâ inflammationem in corporis parte aliqua profundiori ortam, seu erysipelas, interiora vruntur, exteriores autem partes sunt frigida, medicamentum quoddâ Mesues exhibent, non semel duntaxat, sed sæpius, quod Alchermes dicitur, putantes ex eo naturâ augeri calorē, atq; ita extremas partes calfacere; ignorantes quod cum propter inflammationem seu erysipelas calor intus trahatur ac detineatur, & propterea extremæ partes frigeant, ex eodem calido medicamento inflammationē ipsam, aut erysipelas augeri, magisq; propterea extremas partes refrigerari. Nec etiam innatum calorem augebit vnquam medicamentum hoc, cum non nutriat, quo circa ægrotantes sæpius hac ratione iugulant, tū vel maximē si ipsum cum vino, aut alio etiā calido potu præbeant. Admodum certē perniciosus abusus, nulla ratione aut auctoritate, nec etiam experientia cōprobat.

Quomodo, & quibus à pestilentia quis præseruari possit.
Caput X.

SED quoniam non minùs cōfert pestilentia curare, quam eadem vbi nō ægrotauerint præseruari, ne in pestilentem incidant febrem, propterea quo pacto ea præseruari possint, breuiter exponere decreui, ea videlicet corpora quæ iustas ob quasdam causas pestilentē aerem fugere, ac alias in regiones migrare nequeunt. quo minùs ergo hæc corpora à pestilenti & putrefacto aere patiantur, vnus siquidem ac primus est in omnibus cōmunis scopus; quod videlicet corpus quāmaximē superfuitatibus vacet atque optimē spirēt. secundo loco post hoc, vt præpotēti causæ quoad eius fieri potest aduersetur, Galeno auctore primo de differentiis febr. quapropter statim ab initio (vt ipse fatetur) quacunque corpora humida videbat, omni via exsiccare conabatur, quæ verò sicciore, in his antiquum habitum cōseruabat. At in quibus superfuitates redundabant, hæc purgationibus sanabat, obstructionem autem foraminum aperire, atque abstergere suadebat. hæc itaque omnia seruari oportet, si velimus à pestilentia corpora præseruari: neque alia tentanda est via seu methodus: & ob id præpotenti causæ, hoc est aeris pestilenti, & venenoso, hoc modò aduersetur. Primò, domus in qua commorari debent, eligatur ab omni inquinamento seu fœtore purissima, his etiam quæ in præcedenti cap. docuimus, seruatis cōditionibus. & quia ignis potissimū vbi eius non simplex lignorum materia fuerit, sed lignorum, aliarūque rerum odoratarum aeris putredinem consumit; propterea quisque domi suæ frequenter ad focum sedeat, cuius ignis alatur lauri, pinus, iuniperi, quercus, oliuæ, lentisci, cupressi, rorismarini, & myrtillorum lignis, ac vitium sarmentis; superimponendo etiam, interim thus, myrrham, lignum aloes, ebenum, ladanum, styracem, spicam, iuncum odoratum, malorum, ocimū, cassiam. Huic itaque igni mira vis est in omni tempore, & præsertim hyeme, quo tempore largius eo vtendum est, parcius autem æstate. Aërem insuper conclaus his odoramentis alteramus, thure videlicet, mastiche, styrace, ladanō, iuniperi baccis, ligno aloē, caryophyllis, cassia, santalis, rorismar. ex quib⁹ omnibus, vel quibusdam puluis fiat crassus, aut orbiculi quidam cum melissophylli, seu rosarum aqua,

figurentur, ac in exiguo igne proiciantur, sufficitq; fiat. His denique atque aliis in præcedenti capitulo conscriptis, alterandus est aer. Insuper pomum, seu pila odorata componatur, quam hoc tempore manugestare conuenit, quæ ex his constat, Recipe ligni aloēs, carpobalsami, casie singulorum scr. i. calamī odorati, amoni, spicæ ana grana 7. caryophyllorum, nucis muscatæ, thuri, myrrhæ ana grana 5. styracis drachm. i. s. croci grana 3. labani drachm. 3. ambræ, & moschi, seu zibeci ana grana 2. florum nymphææ, violarum, buglossi, ana drachm. 2. santalorum, & corallorum rubeorum drach. s. rosarum rubearum drac. 2. cōtundantur omnia simul, & cum aceto, aqua rosacea, & florum citrangelorum fiat pila; & vbi opus fuerit adde cremoris tragacanthi, seu gummi arabici, aut resinae terebinthinæ parum. Quod si omnia prædicta haberi nequeant, aut pauper fuerit æger, poterit ex quibusdam eorum eadem pila figurari. Item pro diuersa natura, ætate, consuetudine, regione, anni tempore, ac reliquis huiusmodi eorundem simplicium medicamentorum quantitatem, minuere aut augere licebit, maximèque curæ hoc tempore esse debet, vt hominum cætus quoad possunt, vitare conentur. somnus autem & vigilia (vt dictum est) moderatē conueniunt, vitandus tamen erit somnus meridianus, præsertim insuetis frictiones lenes conueniunt, potissimū alio exonerata: curare etenim opus est, vt singulis diebus eadem alui excrementa natura excernantur, aut saltem arte, clysteribus videlicet lenibus, aut glandibus: nec minùs & reliqua corporis excrementa excerni debent. exercitio, nisi admodum modico, haudquaquam vtendum est. Aere etiam prius per suffitus, aut aliqua iam dicta etiam in præcedenti cap. purificato: coguntur enim ob exercitium, vbi aliter fiat, multum & frequentem aërem inspirare homines; cuius contrarium iussit Hippocrates 2. de natura humana, & ratio etiam dicat. similiter & animi affectus omnes immoderati, vitandi sunt: iuuat tamen hoc tempore fabulis, iocis, leui lectione, liberalibusque ludis animum recreare. Tristitia autem & animi mœror, omnino pellatur; similiter & pestis timor, coitus item magnopere fugiendus, præsertim immoderatus. Quod ad cibum & potum attinet, nihil adeo vitadū, ac nimia cibi & potus repletio, vt dictum est: vitanda quoque, vt letale, est cruditas, nec minùs & fames, sed quantum oportet, & vires exigunt, exhibere conuenit. sint autem cibi facili coctionis, boni nutriti, ac putrefactioni minùs obnoxii; semperque eisdem acetum, aut acidum quempia succum, præsertim mali medici, permiscendo, quemadmodum cap. de ardenti febre, & præcedenti etiam, explicauimus. sit itaque carnis v-sus moderatus, asse magis quàm elixæ, qualis est gallinarum caponum, gallinaceorūq; pullorum, perdicum, fasianorum, istarnarum, artagenarum, vitulorum, hædorum, capreolorum, leporum, merularum, turdorum, turturum, iuuenum columbarum, ac reliquarum paruorum, & montanarum auium. oua item recentia, forbilia, & tremula conueniunt. Inter pisces, saxatiles commendantur omnes, neque contemnendus est nullus, scorpius fluuiatilis, trutta, & pelagicus mugil, & reliqui qui saporis suauitate cæteris præstant, minimè lentam, seu viscosam & crassam habentes carnem, qui omnes tosti in craticula ex aceto, aut ex eodem, gelu præstricti, confervunt. Ex oleribus lactuca ex aceto conuenit, cicorium

*Cap. 4.
Corpora ex
sicciōdas, &
pori aperit.
di.*

*Domus
qualis eli-
genda.*

*Aer immu-
sandi.*

Loc.

Cap.

*Pl.
con.*

chorium, scariola, sonchus, pimpinella, oxalis, buglossum, potissimum æstate. Hyeme verò melissophyllum, flores mali medici, ubi leuiter ebullierint, & cappares similiter ex aceto. Item ruta, salvia, pulegium, hyssopum, serpillum, apium, calendula, samolus, betonica, fœniculum. A fructibus præterea recetibus omnibus abstinere oportet, præterquam si acidi fuerint, ut mala medica, limones, limoncella, & reliqua aurea mala, pruna, & acida mala punica: his nanque uti conuenit, quemadmodum etiam uua passa, nucibus pinus, caricis, ac nucibus iuglandibus. lactis omnia genera, oleosa præterea ac pinguis vitanda sunt; & vniuersaliter omnia quæ humectandi, ac calfaciendi vim habent: etenim vniuersa victus ratio exsiccans esse debet, ut à Galeno præcipitur, 1. de diff. feb. similiter & refrigerans postquam ab immodica aëris intemperie calida & humida, ac ab eodem putrido existente, pestis generatur. Pro potu, vino vtantur tenui, aquoso, ac subadstringente. Vinosiora autem, & meraciora vitare oportet. Mediocris tamen potentia vinum subsistat, & suauis, mediocriter lymphatum. hyeme, & quibus crudi redundant succi, cæterisque corporibus temperamento frigidioribus, vitandum non est: quemadmodum aqua etiam confert calidis admodum temperaturis, & quibus ea uti consueuerunt, interim sola, interim verò cum momento cinnamomi, aut cyperi decocta: aut etiã caryophyllis paucis adiectis. Vbi verò in corporibus superfluitates aliquæ redundarint, easdem purgare conuenit, Galeni instituto, citato lib. 1. de diff. feb. Necnon & foraminum obstructions aperire, atque detergere studendum, quorum medicamentorum copiam in præcedentibus conscripsimus. Eligenda tamen ex eis sunt quæ minus molesta sunt, nihilque venenosi habeant, minimèque corpus agent, ac molestant, & pro ratione redundantium humorum vtendum: prius tamen eisdem concoctis ac preparatis, quæ verò obstructions aperiant, ac detergant, in vniuersali methodo explicauimus, eorumque magna copia habetur. quare non est cur hic iterum ea repetamus. id tamen non præteream, quòd inter purgantia medicamenta hoc ipse potissimum vteret, Recipe pulueris hieræ simplicis Galeni drachmam vnā, rhabbarbari cum spica tantundem, aut scrupulos quatuor, cum aqua melissophylli, aut buglosi, fiant catapotia, & præbeantur, à quibus per horam, vel alteram mellis aërei, aut syrapi è pluribus infusionibus rosarum rubearum vncias duas aut ij. s. cum eisdem aquis exhibeas. quòd si pituitosi magis redundauerint humores, pro rhabbarbaro, agarico vtare: & si melancholici, senna, & epithymo: possunt etenim humores omnes indifferenter qui in cordis ventriculis continentur, à pestilenti aëre inspirato infici ac putrescere, quamuis vnus altero sit paratior. Inter celebratissima pestis remedia, quibus corpus tutum redditur, sunt Ruffi Catapotia, quæ (ut quibusdam visum est) constant ex aloës lotæ partibus duabus, myrrha, & croci ana parte vna, quorum drachma vna aut drachma s. ex vino datur summo mane: promittit enim Ruffus quòd qui his fuerit vsus catapotis, neque pestilentia, neque contagione correptus fuerit vnquam. Paulus verò capitulo 35. libri secundi aliter ex Ruffi intentione hoc medicamentum de-

scripsit: ex aloe videlicet partibus duabus, guttæ ammoniaci tantundem, & myrrhae parte vna. hæc in vino odorato contrita instar dimidij cyathi exhibentur, nimirum quotidie, inquit ipse. eius autem quantitas sit similiter drachma vna, aut drachma s. nec quotidie, sed singulis tribus, aut quatuor diebus exhiberi poterit. etenim præter id quòd à pestilentia præseruat, ventrem etiam exonerat hoc medicamentum. quòd si huic Pauli descriptioni momentum etiam croci adieceris, non erit absolum. Præseruant item à peste carica cum ruta, nucibusque præsumpta: etenim vniuersis venenis aduersari testantur nonnulli, de letalium venenorum compositione scribentes, ut liquet libro de cibis boni & mali succi. At lib. 2. de antidotis, cap. 5. Ex Apollinij muris auctoritate hunc in modum medicamentum hoc descripsit Galenus, cap. 8. Rutæ folia xx. nuces iuglandes duæ: salis gran. vnum: carica duæ. hæc si ieiunus quis comederit, à venenis non lædetur. Deinceps aliam conscripsit eiusdem auctoris antidotum, quæ exhibita, accipientem tutum à venenis reddit. Recipit autem baccarum iuniperi drach. ij. terræ lemnis drach. ij. hæc ubi in puluerem redegeris, oleo & melle commiscebis & repones, atque cum opus fuerit, ex aqua mullæ cyathis duobus, quantum est auellana, dabis. Hac antidoto Nicomedes rex vtatur, si quando suspectos habuisset qui se vocarent: nam si venenum non subsit, quæta manet, sin adsit, nauseam concitat, & euomere cogit: ita ut venenum quoque cum antidoto reiciatur. hæc ille. Nec minus à peste præseruat myrrhidis herbæ radix, Dioscoridis auctoritate: ait nanque capitulo proprio: [Ferunt præterea quidam bis, tervè pota quotidie in vino in pestilentia radice eius, incolumes à pestilenti morbo seruari qui biberint.] in hunc etiam vsum conferunt flores melissophylli, rorismarini, & mali medici saccharo conditi: mirificè tamen conducit ipsiusmet mali medici acidum similiter saccharo conditum, & vniuersa eius substantia, si cum saccharo conficiatur saccharum quoque rosaceum, & buglossatum, non parum etiam confert. Si verò cum eorum aliquo drachmam vnā huius pulueris manè per tres horas ante cibum exhibebis, aut cum exiguo vino albo odorato & aqua rosacea, si quod aliud, præualebit, Recipe cornu cerui vsti, seminisque citri ana drac. ij. foliorum dictamni cretensis, baccarum iuniperi, radices heptaphylli (tormentillam vocant) & zedoariæ ana drac. j. seminis rosarum, & oxalidis, ac corallorum rubeorum cuiuslibet scrup. ij. croci gr. iij. fiat pulvis, quo, ut dixi vtet: poterunt insuper ex oxalidis, seu sonchi succo, limoncelij, limonum, aut cæterorum malorum aureorum acidorum succo syrapi ex saccharo parari, quibus sæpe uti, estate potissimum, apprimè cõferre puto, adiecta interim drach. j. prædicti pulueris. reliqua præcedenti capitulo petas. quæ si satis esse non videbuntur, cæteros consulo: reperies enim non paucos, qui pestis medicamina conscripserunt. Nos verò quæ magis conducibilia visa sunt, ratione, & experimento comprobata, hic meminimus: ne scilicet in magnam mutatus hic excresceret moles, & Tyrunculos artis medicæ perterrefaceret, atque confunderet. Quæ etiã causa nonnulla breuitati indulgens, reliquo in hoc opere consulto prætermisi, quæ fusiùs scribere potuissim.

TRACTATVS DE FEB. PESTILENTIBVS
FINIS.

Fff 4

R A I M V S G R A E C V S

PADVANO GVGLIELMINO

AMICO OPTIMO S.



NECOTIU M, quod tuo suafu suscepam, notandi particula-
res locos in miro illo, & iam diu satis à nobis expectato libro Alti-
mari Praeceptoris nostri, methodus de curandis febribus inscripto,
præter expectationem, non parum mihi attulit laboris, credidi enim
id facile præstare: sed cum facto opus fuit, sògè secus ac cogitaueram
rem se habere perspexi: necesse enim fuit omnia ferè Galeni, & nò-
nullorum aliorum bonorum auctorum monumenta legere ac relegere.
multum enim cum solus fuerim, te absente laboravi: sed maxima
utilitas, quam consequutus sum ex hac doctissima lectione, inuentione ornata, dispositione di-
gesta, & orationis perspicuitate illustrata: in qua nihil est, quod nò idem aptè, distinctè, & or-
dinatè dictum sit, hunc laborem perpeti fecit. Quantum profecerim non pœnituit, occasio mihi
data fuit, ut viderem multos auctores, & præsertim nostrum Galenum. nullus quippe fuit ferè
in eo locus, quem non accuratè viderim. quam mira legi de diffinitione methodi, & indicationis
de primis præcipuisq; indicationibus, deq; numero, & dignitate earum: & quàm constantem
sibimet Galenum in sua doctrina faciat: licet aliquibus se dissentire videatur: & quàm acerrim-
um Galeni defensorem cognoui hunc virum contra quosdam non postrema fama, hac nostra
tempestate, medicos: qui credebant suis rationibus, si diis placet, demonstratiuis, solidam, & ve-
ram Galeni in arte medica methodum euertere: quàm miro ordine prima genera febrium, prius
assignata definitione, ad Galeni mentem stabilivit: & diuisua methodo, ad insectiles diffe-
rentias, deuenit: demum qua arte omnium febrium & præsertim pestilentialis (in qua tractan-
da, omnes, quos viderim, superauit) dignotionem, prognosticum, ac curationem, tradidit. satis,
superq; tibi debere sentio, cum ad hunc fructuosum me laborem excitaueris. nullus enim est sen-
sus, in illa abstrusa, & difficilima methodo Galeni, qui hac lectione duce non pateat. nullus
ordo, qui non elucescat: omnia diuinè potius quàm humanè in arte medica vir iste ex rei natu-
rarimatur. cuius ingenium quanti faciam, semperq; fecerim, tu testis es. quò fit, ut omnes artis
medicæ studiosi huic non parum debeant. nam si verum dicere licet, nostri iam diu est, meum
liberum iudicium (absit adulatio, quæ nescit stare cum vera amicitia) nullus post Galeni me-
moriam, quem viderim, febrium doctrinam sub methodo vniuersali ac perspicua, à principio ad
finem tradidit. quapropter si quis erit, qui se huic doctissimo viro non debere sentiat, monstro se
& ingratus erit natura. interim artium medicina Tyrones commonefacio, ut de hoc nostro qua-
licunque labore, tibi amico sincero ac optimo gratias agant, qui me ad illum subeundum impu-
listi: & Deum optimum Maximum comprecantur, ut Altimarum in re medica φιλόπονον
seruet, licet enim mihi sic eum nominare, qui a iuxta Græcam sententiam τὰ ἀγαθὰ τῆς πίστεως
δοτὶ τῆς θεῆς ἐσθλὸν ἐστίν: hoc enim, saluo capite, promitto vobis, omnia in arte medica fore clara, per-
spicua, & facilia, & in vestri gratiam ac utilitatem vnà cum amico nostro non cessabimus illi
suadere, ut sub compendiosa methodo doctrinam de tumoribus præter naturam, iuxta Galeni
placita, elaboret: ut nihil obscuri remaneat in arte medica. speramus exoraturus quod petimus:
perspectum enim est nobis, iam diu est, viri ingenium, quàm ad omnia versatile, primum ad in-
uandum, & benefaciendum: & tandem de omnibus bene merendum. Vale amicorum opti-
me: & me ut soles ama.

DE MAN-



DE MANNÆ, VT
AIUNT, DIFFERENTIIS
AC VIRIBVS, DEQVE
EAS DIGNOSCENDI VIA,
ET RATIONE,

DONATO ANTONIO AB
ALTOMARI AVCTORE,

*Ad excellentem Hieronymum Albertinum intimum Philippi Regis, ac primum hoc
in Regno consiliarium ornatissimum.*



DE ea re quam vulgus Mannam appellat, & nostre tēpētatis Medici ad alium molliendam vti consuevere, quid sentia Albertine iucundis. honorum omnium, atque bonarum artium ornatissimè scribere petisti. Et quāuis id diu in animo fuisset, mēque ad hoc alij nonnulli sapius impulerint, meam tamen de hac re sententiam propalare nolui: ne fortè si aliud quā ceteri eruditif. viri qui de ea ipsa scripserunt, sentire cogerer (sunt etenim non pauci) contradicendi potius gratia, quā veritatem asserendi me scripsisse putarent, hisce nostris præsertim temporibus, quibus plerique eorum qui libros scribere tentant, quò sapientiores videantur, aliorum dictis contradicere potius, quā ex propria Minerva vtile quicquam posteritati in apertum proferre nitantur. Id quod (Deus inihit testis est) semper odiosum prosequutus in his omnibus quæ hæcenus literis mandavi. Nunc verò, & vt tibi morem geram, & posteris non parum, vt mihi videatur, proficiam, hanc subire provinciam non recusavi. nam pro tantistuis in Rempubl. meritis honores tibi habendi, gratia quæ sunt referenda, mecumque præsertim tam amicè, hōnorificentissimèque præsertim tam amicè, nullam partem tuomēque te semper gessisti, vt nullam partem tuorum meritorum non modò in referenda, sed necogitanda quidem gratia consequi possim, cogitansque (virtute excepta) nihil amicitia præstabilius esse, omnes, & me tibi, concordie benevolentia, & charitate coniunxisti. Demum vera opinio, & scientia præditus, atque ob id prudentissimus cum fueris, merito in omnibus tibi, Patriæ & huic Regno siquid acciderit, summum agens Consu-

lem, consulere potes. est nanque res sacra consilium, vt inquit Plato in Theage. Quamobrem ius suum hominibus tribuens, Mannæ (vt aiunt) ne iniuria inferatur, tuum etiam erit consulere, cumque mater (vt ita dicam) Natura rerum omnium in hac nostra cæli clementia hoc bonum nobis tribuerit, ne per eius vim, ne per Deos quæso direptioni, & contumeliis relinquatur, & dum nonnullorum iam diu visitata rabies, vt aliquid facere videantur in hæc cælestia dona propter animi acerbiter inuadit, te acerrimum defensorem agnoscat, & natura, & ars ipsius æmula, quæ humano generi miro quodam ingenio hoc medicamentum parans, de quæ agris benemerita, Dij immortales, cur causa cadere debeat non video. Illud tamen ingenue fateor iure ac prudenter à nostro iustiss. Præsidi atque Consulibus de quadam manna sancitum esse, vt igne cremaretur. Non enim suam sententiam sequuti, sed pharmacopolarum, & quorundam medicorum testificationem id decreuere, qui eam mannā aiebant rem esse pessimam, & humano generi omnino aduersissimam: quæ vera-ne an falsa sint, videant eorum conscientia: non enim censorem agere constitui, sed tantum posteritati consulens, quid de hac re sentiendum sit, tibi scribere volui, vt te fautore faciliè huius regni summo præfidi pateat veritas, dum ea, quæ scripsi, rem non aliter esse præstabit, & propterea perficienda iubeat, legemque hac in re velut in cæteris condar, tanquam maximum huic regno, vniuersæque Italiæ & toti ferè Europæ bonum, cuius ratione legum latores leges condere consueverunt Plat. auctoritate lib. de pulchr. Nec à tua dignitate alienum arbitror si summus Consul, & Iureconsultus in hac re te medicum præbeas: interest enim Reip. ipsius rectores ad hæc etiam descendere, quæ ad salutem pertinere videntur. Quod vt facias Christiana pietas te admonet, rogatque nostra humana societas atque charitas, quæ me etiam hor-

tata est, vt hæc ad te scriberem: quæ dum legeres, facilius pro manna dicere possis. Nam oportet (vt ait idem Plato in Alcib.) cum aliquid facturi, aut dicturi sumus, nos prius verè cognoscere quod prius agere & loqui debemus. Itaque quid sentiam currenti, calamo libenter scribere aggrediar, meam cum auctoritatibus, tum rationibus ac etiam experientia firmans sententiam, reliquorum iuniorum opinionibus prætermisissis, cum non eas improbare intendam, vt diximus, imò eosdem potius semper venerari ac colere. At vt dilucidior nostra reddatur oratio, quoniam cum Medicis omnibus ac Pharmacopolis res agenda erit, & demittendum esse stilum censui, ac primò discendum. Num ea Manna qua nostri temporis medici ad aluum molliendam vtuntur, velut ros quidam sit è cælo delapsus, quemadmodum Arabum familia censuit, an arbores succus, liquor, seu veluti lachryma, vel vtroque modo eam generari contingat? Secundo vtrum eorum fuerit. Num innoxie ea vti, citràque omne discrimen indifferenter valeamus, vel vniuersa omnino explodenda sit? vel si altera sit altera perfectior, num alicuius duntaxat sit innoxius vsus, quædam verò omnino vitanda? Tertiò si vna fuerit altera perfectior, & vtroque modo generari possit, num detur via, seu potestas aliqua, aut quispiam modus, quo alteram ab altera dignoscere, ac discernere valeamus? Quod igitur ad primum attinet, attendere oportet Aristotelem primo meteororum scriptum reliquisse, quòd quemadmodum ex media Aeris regione seu loco circa nubes tria proueniunt corpora, propter vaporum ad eandem aeris regionem eleuatorum infrigidationem, aqua videlicet, nix, & grandis: ita quoque proportionabiliter propter easdem causas, maioris duntaxat minorisve ratione dissidentes, ac multitudine & paucitate, in eiusdem aeris parte inferiori quæ prope terram habetur, duo pari ratione corpora generari consueuerunt, ros inquam & pruina: quorum primum aquæ, alterum niui correspondet: ros enim, & pluuia idem sunt, quamuis pluuia multa sit, ros autem paucus, cum ex multo vapore infrigidato, multo etiam tempore, ampliori-que loco pluuia generetur, ex exiguo verò, atque vno consistente, paucòque in loco ros fiat: id vero manifestum est ex pauca roris multitudine eiusque veloci generatione. Similiter pruina & nix idem ferè esse videtur: cum enim congelata est nubes, nix est, cum verò vapor, prius quam in aquam concretus fuerit, iterum pruina sit. Grandini autem quemadmodum idem Aristot. citato loco fatetur, nihil hic simile correspondet, ita vt quippiam grandini proportionem correspondens, circa terram generari non contingat, ob causas ab eodem philosopho ibidem explicatas: quemadmodum pluuie & niui similes ros & pruina generantur. Verum quamuis ros & pruina communicent, eo quòd ambo ex vapore fiant, qui de die euaporat, & propter caloris paucitatem, sursum admodum, ad eum locum quo in aquam fit transmutatio, eleuari non possit, sed nocte prope terram infrigidatus (frigidiores enim noctes sunt) deorsum tandem descendat: itè quòd ambo etiam fiant serenitate, & tranquillitate; nam serenitate non existente neque eleuari poterunt vapores, neque etiam constare vento flante, vt eidem Aristot. visum est: sic ita etenim opus est ad ipsius eleuationem, ac etiam tenuitatem à qua sursum ferantur, flante verò vento, non consistent, sed po-

tius dispergentur, & corrumpentur, vt inquit Alexander: dissident tamen inter se: nam ros generatur cum vapor concretus fuerit in aquam ita, vt neque adeò sit immodicus calor continentis loci, vt anni temporis, aut particularis constitutionis causa, vt idem sursum latus vapor exsicceatur, neque ita ingens frigus, vt prius quam in aqua conuertatur, coeleatur: & proinde in temperie quadam & temperatis locis, ros fit magis, pruina verò cum vapor prius congelatur quam in aquam concretus fue rit: & quoniam ampliori frigiditate opus habet vt ipse congeletur, propterea fit magis hyeme, & frigidioribus locis, ac particularibus constitutionibus frigidioribus existentibus. Quicquid tandem sit, serenitate, & tranquillitate indigent, vt ros & pruina fiat: & quamuis à diurno calore in vtriusque sursum vapor feratur, minori tamen existente eo quòd eleuatur, caloreque exiguo vt sursum admodum eum eleuare non valeat vt dictum est, à noctis tamen superuenientis frigiditate, generationem vtriusque habent: quæ si minor fuerit, in aquam concretus idem vapor, ros fit, & proinde in temperatis maximè locis hic fieri consuevit: Si verò frigidior nox superuenierit, ita vt prius quam in aquam conuertatur, vapor congeletur, pruina prouenit. His itaque de causis ros, & pruina fiunt, atque ita inter se conuenire & dissentire videntur iuxta Aristot. decreta. Quo fit, vt & rationi consentaneum sit, quibusdam etiam particularibus regionibus, seu locis, statim quibusdam anni temporibus, ac particularibus aeris constitutionibus, serenitas tamen semper, ac tranquillitas existentibus, liquor quidam suavis, melles consistentia, rorique similis, necnon res quædam sacchari, seu gummi similitudinem præ se ferens pruina instar generetur, crassiusculis quibusdam, interim etiam & lentis è terra vaporibus, atque aqua diurno tempore à solis calore sublatis, exacteque tenuatis, ac coctis; & deinde superuenientis noctis frigore concretis, seu congelatis, ac deorsum decidentibus. Qua ratione liquidam interim mannâ generari rori similem, quam rosicidum seu roridum mel, aut saltem eidem simile, appellare licebit, interdum concretam, atque congelatam, saccharo, seu gummi similem, pruina instar, quam roridum saccharum iure appellare poterimus, seu maius pruinofum, cum pruina magis quam rori similis sit, eidemque in eius generatione proportionem respondet. Sed mox queret quispiam, cum ros in temperie ac temperatis locis magis generetur, pruina verò in frigidioribus magis, vt Arist. visum est, citato lib. 1. met. & liquida manna, seu mel rosicidum rori, concreta verò, & quæ coagulata est, pruina correspondeat, num eodem anni tempore, eodemque loco ambo generari valeant? Huic responsum fit, quòd quamuis vterque halitus seu vapor, ex quo tam liquida, quam concreta manna generatur, à solis & diurno calore, vt dictum est, subleuetur atque à superuenientis noctis frigore prope terram infrigidatus ac concretus deorsum tandem descendat, quemadmodum de rore & pruina dictum est, dissident tamen inter se maioris, minorisve ratione. Nam cum exiguum fuerit superuenientis noctis frigus, quemadmodum ros magis generatur, perinde etiam, & liquidum, rosicidum, aëreumque mel, potissimum gignitur; si verò maius fuerit superuenientis noctis frigus, congelatus siquidem idem vapor à maiori frigore priusquam in liquidam, & mel-

leam substantiā conuertatur, concreta manna, pruina seu etiā niui similis procreatur, etenim amplioris frigiditatis est ipsum congelascere, vt inquit Aristoteles citato loco. Quapropter in temperatis etiam natura locis, ac etiā calidis, & æstate, nihil impedit quod quandoque pruina generari possit, particulari cæli statu (superueniente nocte) frigidiori existente, & ob eandem etiam causam congelata, seu coagulata manna similiter eodem in loco, eodémque anni tempore diuersis tamen noctibus, quemadmodum & liquida generari poterit: quamuis ros in temperie atq; temperatis locis, pruina verò hyeme, & hyemalibus locis magis fieri contingat. nam idem operari poterit particularis aeris constitutio frigida, quod regio, seu anni tempus frigidum. At si dixeris, ex Solis calore extenuatos, & coctos adeo fuisse pridie ob calidam & siccam aeris intemperiem sublatores vapores, vt concrefcere amplius, seu congelascere pruina instat, à sequentis noctis frigiditate, etiam valida existente, haudquaquam valeant, adeo vt concreta manna fieri possit, æstate præsertim, dicimus nos non modò non impedire, sed conferre admodum ad promptiorem, & celeriore maioremque coagulationem, seu congelationem præcalescentes vapores seu halitus: etenim citius ad eorum tenuitatem, ac impensius à sequentis noctis frigore infrigidantur, & propterea congelantur, seu coagulantur: quemadmodum siqui voluerint citius aqua refrigerare, ad solē primò imponūt, & circa Pontum habitant, cum in glacie habitacula faciunt ad piscium venationes, (venantur etenim intercidentes glaciem) aquam calami calidam circumfundunt, propterea quòd citius coagulatur, eodem Aristot. auctore citato lib. 1. meteororum. Id quod Galen. etiam confirmauit 6. de morbis vulgaribus inquit, Hac ergo ratione cum aquam frigidissimam reddere voluerimus, niuem habentes prius feruefacta aqua ipsam exterius circumponemus, sed niue carentes in puteo seu amne labete ipsam prius calefactam, vt facilius permutetur refrigerabimus. Nam quodque prius calefactum à vicinis in se totam alterationem admittit. Ex præcalescentis itaque à Solis & diurno calore vaporibus, & deinde à sequentis noctis frigore cōgelatis, nihil impedit quominus concreta manna æstatis tempore generari possit, quemadmodum ex ipsis concretis à paucio frigore mel roridum fit eadem in regione, eodémque anni tempore, modò frigidior superueniat cæli status in sequenti nocte: quinimo & æstate magis vbi eandem quam diximus seruauerit constitutionem. Proinde etiam constat ex dictis, quod veluti materia ex qua roscidum, seu aereum mel generatur, eiusdem est cum rore generis, vt inquit Galen. 3. de aliment. fac. perinde etiam & ea ex qua manna concreta, quam roridam vocant, generationem habet, eiusdem erit cum pruina generis, vt probauimus Aristot. auctoritate. Est namque pruina (vt ipse inquit lib. de mundo) nihil aliud quàm ros concretus. Et Plinius cap. 60. lib. 2. his verbis idem confirmauit, grandinem congelato imbregigni, & niuem eodem humore mollius cōacto, pruinam autem ex rore gelido. Et idem Aristot. 5. de generatio. anim. cap. 4. ponens conuenientiam & differentiam inter situm, & pruinam, dicebat, omnis enim vapor terrenus, vim habet aeris crassioris; situs enim quasi respondens pruina existimatur: nam si vapor se effrens concretis, pruina fit, sin pu-

trescit, situs, quamuis neque assidue, neque copiose vt illa, ambo hæc proueniant, mel inquam roscidum, & manna hæc concreta. Et licet potuerit à lapidibus seu plantis in quibus reperitur quodammodo in eius coagulatione, seu congelatione iuuari, eius tamen præcipua & propria coalescentia, seu congelatio, ab ambientis aeris frigiditate prouenit: est enim eius generatio niui, seu pruina assimilis, vt dictum est, quamuis non tantam exigit frigiditatem pro eius concretione seu coagulatione, propterea quòd vapores seu halitus ex quibus manna hæc concreta generatur, licet crassiusculi & lenti propemodum existant, tamen non eo indigent frigore pro eorum concretione, quo nix, & pruina, sed minori, propterea quòd à Solis calore pridie sublato, exacte fuerint extenuati & cocti, qua ratione citius concretionem seu coagulationem admittunt à sequentis noctis frigore, vt demonstrauimus, etiam si immodicum non sit; cumque è cælo ambo hi liquores proueniant, tam liquidus videlicet, quàm concretus, necessariò sequitur quòd non in quibusdam arboribus, seu fruticibus aut etiam particularibus quibusdam eiusdem generis plantis, sed indifferenter in omnibus tum arboribus, tum fruticibus, ac reliquis plantis, simulque lapidibus, ac terra eiusdem loci etiam decidat, quauis boni malive quippiam ex his plantis in quibus colligitur ipsi accedere possit, & in quibusdam magis, in quibusdam verò minus seruari valeat. fit itaque quemadmodum suauis ac liquidus quidam liquor, quem mel roscidum, seu aereum nominamus, aut admodum melli similis, à materia quæ eiusdem est generis cum rore; ita quoque & concretus seu coagulatus quidam semini gummi, saccharo quæ similis, qui manna aerea appellatur, ex eiusdem generis materia ex qua fit pruina. At quæ eo quo diximus modo generantur, conueniunt, ac dissident inter se, vt prius demonstrauimus. Sed statim quispiam ea quæ diximus oppugnaret, inquit, Si ex frigore vtrique enarratam manna generationem habet, qui fieri possit vt dulcis sit, temperatæque calida, ac aluum soluat, vt omnes medici vno ore fatentur? Nisi esset quòd quamuis à frigore concrefcant sublato halitus seu vapores ex quibus vtrique manna generatur, à Solis tamen calore, prius fuere extenuati & concocti, aliàs eleuari haudquaquam potuissent, quapropter etsi concretio ex frigore eis proueniat, earum tamen materia calida est & humida, cuius etiam temperatura remanet vtrique manna ex eis genita, similem etenim habet generationem ac pinguedo ipsa, quæ non minùs dulcis ac calida moderatè existit, quamuis à frigore concrefcant, vt Galen. visum est. Quòd verò vtrique manna taliter generari possit, auctoritatibus quoque confirmare non grauabor, ab Arabum familia exordiens. Sunt etenim inter eos qui de vtrisque iam dictis liquoribus verba fecisse videntur, præsertim Serapio & Auicenna. Nam Serapio cap. 45. loquens de manna ait, Men, id est Manna, est calida & abstergit, & lauat, nisi quia virtus eius augetur, & diminuitur secundum diuersitatem arborum super quas cadit, mesuragie, est calida in primo, temperata in humiditate & siccitate, bona pectori, & pulmōni, & quod de ipsa cadit super arborem Tamarisci, est bona tussi. Haben mesuhai, manna, cadit super Tamariscum, & quod de ipsa colligitur, confert tussi, & asperitati pectoris.

Obiectio.

Responsio.

Collegit Razes, & dixit quod manna cadit super arborem quæ dicitur Maluauficus sicut mel, & quando facit moram super plantam istam, albescit; sed quando non diu ibi moratur, sed colligitur cito cum folio eius, est viridis, & deinde subdit, Habix est calida in fine secundi gradus &c. Ex quibus verbis & reliquis quæ eodem cap. conscribuntur, clara luce apparet hoc loco, non de liquida (ut quibusdam visum est) sed de concreta ac coagulata aerea manna Serapionem verba facere. Quod confirmare videtur idem auctor cap. 11. cum de Tereniabin sermonem habet, quo loco luculentissime apparet liquidam, & melli similem conscribere, ait enim, Tereniabin est ros cadens de caelo, assimilatur melli granuloso aggregato, estque nominatum mel roris, & plurimum quod de ipso cadit, est super arbores quæ sunt in terra Corasceni in Oriente, quæ arbores habent folia similia, & spinas virides, & flores rubeos & non faciunt fructum, & cadit in castella super summitates palmarum, & deinceps posito eius temperamento, narratisque eius viribus, subdit, Habix Tereniabin est plus saccharo, & sedat inflammationes febrium calidarum, & aufert sitim, & mollit ventrem molliatione mediocri, & est manna quæ cadit ex aere sicut cadit manna, & lenit pectus ex tussi, & reliqua. Ex his itaque locis manifeste apparet, Serapionem utrumque iam dictum aerem, suauemque liquorem tam scilicet liquidum & melli similem, quam concretum, saccharumque similitudinem gerens, descripsisse: à qua Serapionis sententia, ne latum quidem vnguem discedere videtur Auicenas, qui cap. 490. lib. 2. trac. 2. de manna sic scriptum reliquit: Manna quid est? est omnis ros cadens super lapidem, aut arborem, & fit dulcis, & coagulatur sicut mel, & exsiccat sicut gummi, quemadmodum Tereniabin, & Siracost, inquit Bellunenensis, antiquus codex habet hanc eracost, & mel asportatum de terra Cusaram syluestri: habet autem Bellunen. Caseran in reb. & deinde inquit: & nos quidem iam diximus vnu quodque in suo cap. & ipsum assumit de natura eius super quod cadit virtutem & cetera. cap. verò 702. eiusdem lib. & tract. de Tereniabin, ita scripsit, Tereniabin quid est? hic est ros qui plurimum cadit in Corasceni & in locis qui sunt ultra fluuium, & plurimum casus eius in regione nostra est super lapides. melius est recens, albus, & cetera. Nemo itaque hæsitare debet quod per Tereniabin Auic. quoque liquidam mannam intelligere voluerit quæ melli assimilis existit, & per mannam, concretum, seu coagulatum rorem, & velut gummi exsiccatum. verum aliud intelligere videtur per Tereniabin quam mel roridum, licet eodem modo generetur, & Serapio aliud fortè sentiat: id quod comprobare videtur eius verba posita cap. de manna, & etià quæ de melle profert cap. 497. cum inquit, Mel est ros occultus cadens super flores, & super reliqua quod colligit apes, & est vapor qui eleuatur, & maturatur in aere, & conuertitur, & ingrossatur in nocte, & mel factum cadit, & quandoque cadit mel, sicut quando est circa Caseran, inquit Ballunen. in monte Caseran. & subdit: diuersificatur autem secundum ea super quæ cadit, quæ sunt arbor, & lapis, & manifestum ipsius colligunt homines: quod verò occultum est, colligunt apes. Concreta namque manna non modò ros est, ut ipse faceret, & coagulatur sicut mel, sed exsiccat etiam sicut gummi, ut ipse dixerat Cap. de manna, id quod de Tereniabin haudquaquam asseruit. Succedit ter-

tio loco inter Arabes Ioannes Mesues, qui in suo tract. de simpl. cap. de manna, hæc scripsit, manna est ros cadens super quasdam platas & lapides cuius materia est vapor qui eleuatur, cui accidit digestio, & maturatio in aere quando est æqualis & fecundus: latis aspectibus diuersificatur autem secundum diuersitates rerum super quas cadit: cadens enim super lapides est sicut gutta parua quæ cõgelantur, & sunt sicut semen, & cadens super plantas, suscipit de virtute plantarum, & est cum permissione particularum foliorum, & florum. Quibus ex verbis liquido constat Mesuen de concreta & coagulata manna, & non de liquida hoc loco verba facere. Nanque dixit quod est sicut gutta parua quæ congelantur, & sunt sicut semen, & prius dixerat eius materiam esse vaporem cui accidit digestio & maturatio in aere. De liquida verò fortè non meminit, nisi quispiam velit eam voluisse intelligere per aliracost, cuius meminit in confectione yeracost, descriptio Irani in suo antidotario. Patet insuper ex eius dictis eam esse rorem cuius materia vapor est eleuatus, digestus, & maturatus in aere æquali & fecundo, latis aspectibus, ut ipse ait, & demum refrigeratus & congelatus à superueniente frigore, quemadmodum nos prius determinauimus. Etenim concretus hic vapor, & congelatus in aere deorsum descendit, & non liquidus, & deinceps congelascit in lapidibus seu plantis in quibus reperitur, ut quibusdam visum est, quauis in hoc quodammodo opem ferre videantur, saltem pro eius conseruatione, quod quidem liquidum constat ex his quæ Mesues dixit, quod videlicet vapor ex quo fit manna, digestio & maturatio accidit in aere, & quod cadens super lapides, ut sicut gutta parua quæ congelantur, & sunt sicut semen. Neque etiam potens esset lapidum aut platarum naturam rorem ubi liquidus deflueret congelare, nisi prius concretus ac congelatus in aere fuisset, confestim quoque liquefceret à superueniente diurno Solis calore, neque diu ea etiam collecta eiusdem concretio permaneret, potissimum cum in regionibus, anni que tempore calidioribus, concreta & congelata hæc manna generari soleat. Nam cum præcesserit calidior dies, & siccior, adeo ut à Solis calore vapores seu halitus è terra, & aquis subleuentur, exacteque fuerint ab eo extenuati ac cocti, superueniente deinde frigore, sequentis noctis ob particularem celi statum, etiam frigidiorum, iidem halitus, seu vapores, concrefcunt, ac coagulantur, atque ita manna hæc decedit, ut dictum est. At ab hoc frigore, frigidaque particulari aeris constitutione superuenientis noctis, aerem ipsum magis, quam terram, lapides, seu plantas refrigerari necessum est, cum tenuior sit substantia aer ipse. Nam ut aqua facilius quam omnia terrena corpora calet, atque frigescit, quippe cum illa tenuitate partium superet pari ratione, & aer quam aqua, ut inquit Gal. 6. de morb. vulg. satis itaque non esset lapidis, plantarum, terrarumque frigiditas, ad vaporis huius ex quo concreta manna generatur, congelationem si ab aeris frigore congelari, seu coagulari non potuisset, maiori siquidẽ existente eiusdem aeris frigiditate, ut probauimus, quam terræ, lapidum, seu plantarum; decedit ergo, & non in his locis in quibus reperitur, concrefcit, concreta, & cõgelata manna, saccharo, aut semini similis existens. Quod verò in calidis regionibus, temporeque anni calidiori aer frigidior esse possit in nocte, quam terra in eius superficie, & terrena omnia corpora, particulari potissimum

tissimum constitutione frigida existente, hac insti-
per ratione cōformari poterit. Nam quēadmodum
ex præcedentis diei calore impensius ob eius tenui-
tatem ac citius fuit calfactus aer, pari ratione à se-
quentis noctis frigore impensius ac citius refrige-
rabitur, id verò terræ & terrenis, haudquaquā con-
tingit: non solum autē ob eiusdem aeris substantiæ
tenuitatem, verum etiam propter radiorū Solis refle-
xionem, in die factam, id veritatem habet, nam ob vi-
cinitatem, calorem magis perpetiuntur terra, & quæ-
cunque terrena sunt, quā locus ille aeris in quo li-
quor hic concretus generatur, & propter crassam
quoque eorum substantiam, diutius in eis permanet
calor ille, adeo ut vix tota etiam nocte delitescat,
quinimo non absque ratione censendum, mannā hāc
concretā roridā subluanis maximè temporibus, pri-
māque aurora, quo tempore præcipue frigus intēditur,
potissimum decidere, quemadmodū Pli. cap. 12. lib.
11. de roscido ac liquido melle scriptum reliquit, est
autem eo tempore aer frigidior quidē, tum ob So-
lis longiore absentiam, tum quod eodem iterum
appropinquante, terra sublatis frigidis vapores vni-
antur ac densentur magis. Quamobrem mannā
quam vocant aereā cōcretā & coagulata ē cælo
delapsam, proculdubio in aere, & non locis in qui-
bus reperitur, concretā ac coagulari censendum
est; conferre tamen locos in quibus colligitur quo-
dāmodo ad eius saltem conservationem, adeo ut
in quibusdam plantis, terris, seu lapidibus melius
quā in quibusdam aliis cōseruetur, licet, ut ratio-
nibus sufficienter probauimus, & ex iam dictis Ara-
bum auctoritatibus liquet, præsertim Mesues indif-
ferenter in vniuersis tum arboribus, tum lapidibus,
in ea regione decidat, in qua generatur, & non in
quibusdam speciebus duntaxat, ac determinatis ei-
usdem speciei arboribus, ut quidam falsō imaginā-
tur. Neque etiam prætermittendus ērit Auerrois,
qui lib. 5. colligit. talia de manna verba scripta reli-
quit, de hac fortē quæ concreta est intelligens, aut
saltem de ea quæ liquida est, ait enim: Terregebin,
id est manna, est ex speciebus antiquæ mannæ quæ
prouenit à partibus superioribus Syriæ vel Indiæ, &
est similis saccharo, in suis virtutibus, calida & hu-
mida in primo gradu, & eius proprietas est purgare
suauiter cholera, & est debiliior aliis purgatiuis, i-
deo datur in passionibus calidis, antequam etiam
appareant signa digestionis. De hoc suauis ac
coagulato liquore inter Græcos quos legerim, ne-
minem hætenus reperi, qui meminisset, quicquid
alij sentiant, nisi quispiam velit Actuarium de hac
manna intelligere voluisse, cum dixit, quæ his de-
inceps succedunt perquam moderatè purgant,
nimirum cassia nigra, & manna: cassia quidem tri-
bus aut quatuor drachmis sumpta, vix moueret al-
uum, manna verò etiam maiore modo quā cassia
fumenta est, & flauam bilem simplici ratione pellit,
&c. De liquida autem manna, seu potius roscido
melle, Theophrastus lib. 3. de hist. plantarum cap. 9.
de robore verba faciens, hunc in modum scriptum
reliquit. Sed nihilominus, ut dictū est ferax hæc ar-
bos habetur plurimum, sin autē auctore Hesiodo,
mella, apesque ferat, magis quoque illud confirma-
tur, ergo nascitur vel hic melleus humor cælo ca-
dens, nec aliis magis infidens frondibus. De melleo
itaque liquore seu humore, quem mel roscidum, seu
aereū appellant, hoc in loco verba fecit Theoph. &
non de coagulato, de quo quidem soli Arabes scri-

psisse videntur. De eodem etiam aereō seu roscido,
& liquido melle, meminit Gale. 3. de alim. fac. c. de
melle, ubi de melle verba faciens inquit, omnis ali-
mentorum materia, hætenus duobus generibus est
cōprehensa, quorum alterum quiddē ipsorum à pla-
tis, alterum verò ab animalibus fumebatur, & dein-
de subdit, ab utroque verò ipsorum mel est secre-
tum, ita ut duo sint mellis genera apud Galen. quo-
rum vnum ab animalibus, ut ex apibus, reliquum
verò à plantis colligitur, quod quidem, ut ipse in-
quit, oritur in plantarum foliis, est verò neque suc-
cus earum, neque fructus, neque pars, sed eiusdem
est cum rore generis, non tamen assidue, nec copio-
se ut ille prouenit, de quo iterum continuans fer-
monein, ita scripsit, meminisse aliquando cum æstate
super arborum & fruticum, herbarumque folia mel
quamplurimum fuisset repertum, agricolas velut
ludentes cecinisse, Iupiter mella pluit, & deinceps
declarans eius generationis modum, ait, præcesserat
autem nox, ut per æstatem bene frigida, nam tunc
tempus anni æstiuum erat, pridieque calida & sicca
fuerat aeris temperies, peritis quidem naturæ inter-
pretibus videbatur halitus ē terra & aquis, à Solis
calore sublatis ac deinde exactè tenuatos, ac co-
ctos, à frigore sequitæ noctis concretos, coaluisse,
apud nos verò rarò id accidit, in monte autem Li-
bano quotannis sæpe. Itaque coria super terram
extendentes, & arbores excutientes, quod ab eis de-
fluit excipiunt, & collas ac fictilia melle implent, vo-
cāntque id mel roscidum, & aereum, proinde constat
materiam ex qua mel generatur rori esse congene-
rem, videtur autem ex plantis in quarum foliis col-
ligitur boni, malive quippiam ipsi accedere. Hæc
Gal. de roscido, seu aereō melle. Quibus ex verbis
quilibet vel parum in eius doctrina exercitatus, per-
cipere poterit de liquido, ac aereō melle rori simili
eundem verba facere, & non de ea liquida manna
quam Terenianus Serapio, & Auicenna appellant,
neque de congelato melle quod manna appellatur,
& saccharo seu semini similis existit: nam licet
concreti fuissent à sequitæ noctis frigore halitus
pridie à Solis calore sublatis, & propterea coaluis-
sent, non tamen adeo concreti fuerunt, ut congela-
rentur, ac coagularentur, & solida genita fuisset
manna sed eò concreti fuerunt, ut mel genitum
fuisset liquidum, ut cætera mella, & rori simile: con-
cretescitur etenim vapor, seu halitus, etiam dum in ro-
rem seu aquam conuertitur, ut inquit Aristot. cita-
to libro primo meteororum. Patet insuper ex eisdem
Gale. verbis, modus, tempus, ac locus genera-
tionis eius, & quod cum sit eiusdem generis cum
rore, non super quasdam arbores duntaxat, easque
determinatas, sed super arborum, fruticum, herba-
rumque folia indifferenter reperiatur quando de-
cidit: necnon quod in monte Libano quotannis
sæpe id accidat: rarò autem in Galen. patria: ita ut
velit ipse ostendere quod non semper neque in quo-
libet anni tempore, aut quauis regione, & cæli sta-
tu, hoc etiam mel roscidum defluat, sed quibusdam
anni temporibus, & potissimum æstate; quibus-
dam etiam in regionibus, ut in monte Libano, &
eadem existente particulari aeris constitutione,
quam ipse descripsit, & nos supra narrauimus. De
quo etiam roscido melle Aristoteles libr. 5. de hi-
stor. anim. cap. 22. hunc in modum scripsit, de api-
bus verba faciens, Construunt fauos ē floribus, ce-
ram ex lachryma arborum fingunt; mella ex rore

aeris Syderum ortu potissimum, & arcus cœlestis incubitu contrahunt, omnino ante vergiliarum exortum mel non fit, fauos itaque, ut dictum est, floribus faciunt, mel autem ipsas non facere apes, sed rorem cadentem deferre, argumento est quod vno aut altero die cellas melle repletas inueniunt apiarum. Hec Aristot. Inter Latinos auctores Plinius vir alioqui magnæ auctoritatis, de hoc eodem roscido, aëreo, ac liquido melle, non semel duntaxat meminit. Nam libro 16. cap. 8. videtur ad vnguem quæ de eo Theophr. scripta reliquit, transcripsisse, dum inquit, Robora ferunt & viscum, & mella, ut auctor est Hesiodus, constatque rores melleos è cœlo (ut diximus) cadentes, non aliis magis insidere frondibus, & libro 11. cap. 12. tractans de mellis natura, ait: venit hoc ex aere, & maxime syderum exortu, præcipueque ex ipso syrio explendescente fit, nec omnino prius Vergiliarum exortu subluçanis temporibus, itaque tam prima aurora folia arborum melle roscida inueniuntur, ac si qui matutino sub dio fuere, vinctas liquore vestes, capillumque concretum sentiunt, siue ille est cœli sudor, siue quædam syderum salua, siue purgantis se aeris succus, uti nante esset & purus, ac liquidus, & suæ naturæ qualis defluit primo, &c. Quis itaque hæsitabit vnquam quod Plinius hisce in verbis de aëreo liquidoque melle, & non coagulato verba fecerit inquiring, utinamque esset & purus, ac liquidus & suæ naturæ qualis defluit primo. Et ca. 14. eiusdem lib. inquit, Alterum genus est mellis æstiuum quod ideo vocatur hoereum, à tempestiuitate præcipua, ipso syrio explendescente, post solstitium diebus triginta, ferè immensa circa hoc subtilitas (alius tex. dicit sublimitas) naturæ mortalibus patefacta est, nisi fraus hominum cuncta pernicie corrumpere, & cætera. Et si liceat nobis Latinorum etiam Poëtarum auctoritatibus hac in re uti, Vergilius libro 4. Georg. de aëreo melle sic cecinit,

Protinus Aerei mellis cœlestia dona:

Exequar. Et in Bucolicis ecloga quarta.

Et dure quercus sudabunt roscida mella.

Hæ sunt quæ (ut mihi videtur) cum rationibus, tum auctoritatibus dici possunt de roscido & aëreo melle, tam liquido, quam coagulato: ob quæ proculdubio fateor quod neque vllus inficias ibit, mannam quam vocant æream, tam liquidam quam concretam generari posse: non in vniuersis regionibus mundi; quia non in valde intemperatis, neque quouis anni tempore, sed æstate potissimum circa auroram, neque etiam quauis existente aeris particulari constitutione, sed vbi dies præcesserit calida, & sicca, superuenieritque nox, ut ad æstatem bene frigida, lætis quibusdam, & benignis aspectibus, ac syderum exortibus concurreribus, si iam dictis auctoribus astrarumque peritis credendum sit: nam ut ait Plin. citato loco, ab exortu syderis cuiusque, sed nobilium maxime, aut cœlestis arcus, si non sequantur imbres, sed ros tepescat, Solis radiis, medicamenta, non mella gignuntur, oculis, vlcibus, internisque visceribus dona cœlestia, & Mæfues mannam prouenire in aere, quando est æqualis, sæcundus, & lætis aspectibus fateor. Nec minus Arist. citato loco, mella ex rore aeris, syderum ortu potissimum, & arcus cœlestis incubitu apes contrahere, nec omnino ante Vergiliarum exortum, asseruit. Confirmant insuper hæc rorida mella, liquida & coagulata, locupletissimi nostri temporis testes, vi-

ri alioqui eruditissimi Ant. Musa Brasauolus, & Petrus Andreas Matthioli, quorum alter vtranque speciem ab Oriente delata, propriis oculis inspexisse fateor: alter verò concretam, & granulofam duntaxat, tam perfectam & veram (matichinam vocat) quam adulteratam, seu quæ iam euauerit, bombicinam dictam, ab Oriente & ipsam quoque delatam, & proinde vtranque Orientalem dictam. Refert insuper idem doctus. Matthioli se nedum cognouisse, sed manibus propriis legisse tam liquidam, quam concretam mannam è cœlo defluxam anno 1546. in Goritiæ comitatu, ac Friuli patria, & quibusdam etiam vicinis regionibus, mense Maio, & Iunio super ficus, & orni folia, quæ candida, & granulosa erat. At super percissi, amygdalæ, & quercus, liquida reperiebatur, sapore ac calore mellis similis. Ipse verò ingenuè fateor, & si maximam adhibuerim diligentiam, neutram adhuc Orientalem vidisse mannam, præter eam quam bombicinam vocant, ex Venetiis transmissam. At in Regno nostro Neapolitano, pluribus in locis sæpe liquidam, & mellæ consistentiæ mannam instar rosis decidere supra folia ac ramos nonnullarum arborum, nec non super herbas & lapides, nedum à quamplurimis rusticis, verum etiam à non paucis Nobilibus percepi: ipsamque Sole superueniente, fundi ac liquari cognoui: verum adeò noxam esse retulerunt plantis super quas decidit, ut protinus earum folia saltem marcescant. Hanc verò vno ore fatentur omnes, super vniuersas indifferenter arbores, plantas, seu herbas ac lapides cadere, ea in qua decidit parte: quam tanquam nullius vñs paruifacientes, minime colligunt, nec quispiam eorum quos nouerim, hæcenus ea uti ausus est. Concretam verò & granulofam, semini, aut gummi similem, & cuius frequens est vñs, quotannis colligere confueverunt, nedum Calabri, sed & Samnites, Vestini, qui Garganum incolunt montem, & pleraque Apuliæ partes, ut Castellanetam, aliique etiam in locis ipsam colligere solent. Eam tamen non nisi ex fraxino, & orno, altera ipsius fraxini specie colligi, vno ore fatentur: quæ item ea est manna, quam communiter ad molliendam aluum medici omnes vtuntur, ac vñ sunt quotquot per centum ferè annos & ultra, medici ante nos fuere. De qua nō ab re discedendum esse censui, an sit velut ros quidè è cœlo cadens, quæ admodum ea de qua Arabes meminerunt, vel dictarum arborum succus, humor, seu lachryma. Quod verò quam colligunt ex fraxino & orno manna, minime ros sit, seu pruina similis è cœlo cadens, velut ea quam Arabes scripserunt, hac prima ratione poterit demonstrari. Quæcunque ex aere decidunt, in quacunque regione, ac quouis loco, non speciatim supra vnā rem determinatam illius regionis seu loci, sed indifferenter in vniuersis ibi existentibus rationabiliter cadere debent: sed manna hæc non nisi in fraxino & orno reperitur, in cæteris verò arboribus, herbis, seu lapidibus eiusdem loci nequaquam: non igitur generatur in aere, neque è cœlo cadit. Ad hæc illa quam Arabes scripserunt, præsertim Mæfues manna, super arbores, herbas & lapides indifferenter decidit, hæc verò qua vtimur, nunquam super reliquas plantas, seu lapides præterquam supra fraxinum & ornum colligunt, neque etiam eadem in cæteris præter dictas arbores, ut collectores aiunt, reperitur. Igitur eiusdem speciei non est cum illa quæ è cœlo decidit. Rursus hæc qua vtimur

vitur manna, quotannis ex eisdem colligitur particularibus arboribus, quod quidem per xxx. fere annos, vt aiunt, aut xxx. seruatum est, ac etiam vltra, vt colligentes eam fatentur, ita vt non defint qui easdem arbores emant, tanquam singulis annis hoc producentes vectigal, veluti & nos ab eisdem emptoribus accepimus: suntque eodem in loco, & eiusdem etiam speciei arbores nonnullæ super quas manna hæc non reperitur, igitur è cælo non cadit. Nam quæ maior ratio reddi posset de vna quam de altera, præsertim eiusdem speciei arbore, eodem in loco existente, ac per plures continuos annos eam producente, vbi è cælo caderet? nulla inquam quâuis in vno plantarum genere magis quam reliquo quædam afferri possit apparens ratio. Præterea si manna cælestis seu aërea pro eius generatione, particularem quandam, vt dictum est, cæli constitutionem requirit, ita vt calida & sicca præcedat diurna aëris temperies, nox verò sequatur, vt per æstatem bene frigida, (etenim æstiuo tempore potissimum generatur) consonum rationi existit vt non qualibet die, singulisque noctibus etiam æstiuo tempore ea generari possit, sed raro admodum, quemadmodum & liquida, hac præsertim nostra in regione. At hæc qua vitur, quæ quidem in fraxino & orno colligitur, singulis diebus, Canis tempore præsertim, aut parum ante in eisdem reperitur, modo pluuiæ, & præsertim magnæ, aut ventorum vehementia non adfit, igitur aërea non est. Amplius si aërea manna de genere est mellis rosæ, seu aërei, magis tamen à frigore cōcretis, vt determinauimus, cum mel soluatur à calido sicco, coaguletur autem ab aqua, hoc est ab eo quod in ea est frigiditas, vt liquet quarto meteororum: sequitur quod eadem manna, à frigido, tanquam contrario causis liquefactionis, coagulari debeat: solui verò à calido: cum verò hæc quæ in orno, & fraxino reperitur, contrarium perperiat, etenim à calido durior fit, atque coagulatur, ab aqua verò soluitur, ac dissipatur, necessarium sequitur quod eadem, aërea de genere mellis rosæ non sit. Quod si dixeris non modò à Solis calore mannam in his arboribus repertam concretere, & durior reddi, verum etiam à frigore, vt eam colligentes diu obseruarunt, aiunt etenim non solum à Sole, verum etiam à frigore Aquilone videlicet modicè flante in nocte, eam condensari, siccioremque reddi, dicimus nos: & hac etiam ratione probari eam non esse rorem è cælo cadentem: nam hic cum sit aqua, à frigido duntaxat coagulatur, quæcunque etenim sunt aquæ (inquit Arist. citato lib. 4. meteo.) non coagulantur ab igne, soluntur enim ab igne: quæ verò communia sunt terræ & aquæ, & ab igne coagulantur, & à frigida, vt ipse inquit, quoniam ab utrisque ingrossantur, recedente videlicet, & euaporante humido, diuersa tamen ratione. Cum itaque coaguletur, & à Solis calore, & ab aquilonis frigore, hæc quæ in fraxino & orno reperitur manna, necessario sequitur eam, nec vapore, nec rorem esse, aut ex eisdem genitam, propterea neque etiam aquæ folius, sed aquæ & terræ esse. Item & fortius, si à Solis calore manna hæc non soluitur, nec liquefit, sed potius cōcrefcit, duriorque efficitur, adeo vt eam colligentes asserant meridie, Solèque magis ardente, aridiorem, candidiorem, magisque concretam, & coagulata esse, & collecta iam vbi humidior fuerit, ac liquefieri cœperit, Soli imposta, albidior etiam duriorque

redditur, quis vnquam asserere audeat eam à cælo fuisse delapsam? atque ex concreto rore genitam? Cum quæcunque à frigore concrefcunt seu coagulantur, à calido liquefcant, & soluantur, & quæ à calido concrefcunt & coagulantur, à frigore liquefcant, eiusdem Arist. auctoritate eodem 4. meteo. Quinimo manna hæc ab aqua soluitur atque liquefcit, id quod nedum in dies obseruamus: verum etiam eam colligentes testantur, aqua namque superueniente, cōfestim eadem soluitur, atque euanesce, adeo vt amplius haudquaquam colligat, cum primum Augusti mense plueri cœperit, quod quidem proprium est eorum, vt inquit Arist. citato loco, quæ à sicco calido coagulata sunt: quemadmodum eorum quæ à frigido sunt coagulata, ab igne solui: etenim quæcunque coagulata soluntur, à contrariis solui necessarium est, & hoc aut frigido, aut calido, si igitur ab aqua soluitur, necessario sequitur quod ab igne, seu calore igni assimili fuerit coagulata, igitur non est aërea, nam quæcunque sunt aquæ, vt ipse inquit Arist. non coagulantur ab igne, soluntur enim ab igne. At vapor aquæ est, vt inquit idem Aristote. signum, quod vbi consistat, aqua est, vt patet in eis qui in aëre operculis congregantur. Cum itaque non ab igne, neque à sole, sed ab aqua soluatur atque liquefcit manna hæc in fraxino & orno duntaxat reperta, coaguleturque ac durior reddatur à calido, demonstratiue concluditur eam non esse de genere roris, nec ex concretis à frigore vaporibus genitam, neque è cælo cadere, si Arist. ac veritati fides sit adhibenda. Adde quod vt huius mannæ copia maior generetur, contrariam requirit particularem aëris constitutionem quam aërea: non si eo tempore quo emanare consuevit, dies pluuiosa præcesserit & frigida quodammodo, sequaturque admodum calida & sicca altera non prima duntaxat, sed secunda, & tertia, maior, vt aiunt, in eisdem arboribus quantitas colligitur. Qua item ratione aërea seu rosæda esse non poterit. Quod si quispiam rationibus destitutus, ad cæcas & occultas causas confugerit, inquires causam ob quam manna hæc in fraxinis & orni duntaxat reperitur, esse earundem arborum proprietatem quandam, ob quam ad se ipsas magis alliciant, trahantque hunc suauem liquorem è cælo cadentem quam cæteræ arbores, quemadmodum magnes ferrum, & succinum paleam trahit, dicat quæso cum hæc totius speciei proprietas existat, nonne cuilibet particulari eiusdem speciei conuenire debet? adeo vt quemadmodum cuilibet particulari magneti, & particulari succino donatum est, vt ferrum & paleam trahat, ita etiam cuilibet fraxino & orno hæc facultas tribui debet. At per multos annos, eosque continuos obseruatum est, quod in vna regione eodémque loco quotannis quidam determinati fraxini & orni talem in se contineant dulcem liquorem: quidam verò alij eodem in loco existentes, eiusdem magnitudinis, eiusdemque ætatis nequaquam: obseruatumque præterea est, quod diuersæ magnitudinis ac ætatis quædam particulares arbores ex iam dictis, eodémque in loco consistentes, quotannis etiam, talem in se contineant dulcem liquorem: determinatis tamen temporibus, vt puta sub Cane, vel parum ante, quædam verò nunquam, qua de re fateri haudquaquam poterit hanc esse fraxini & orni quandam proprietatem, quoniam singulis hæc inesset proprietas, etiam si non æqualiter eis-

dem reperiretur: non itaque à tota substantia seu specifica forma fraxini & orni talem sibi liquorem alliciunt è cælo cadentem: nam omnibus talis donata esset trahendi facultas. Nunc verò in paucis id obseruatur: quæ item ratione neque id persuadere mihi valeo quod manna hæc supra easdem arbores è cælo ceciderit, proximè antegressis mensibus Maio, & Iunio, imbibitæque sit in earum corticibus, ac intra eosdem attracta: propterea quod arefacti & exsiccati, necnon rarefacti & scissi, à Solis calore cortices fuerint, & ob id incisis eisdem corticibus canis tempore ab eodem Canis ardentissimi, calore foras trahatur, à quo iterum concreseat, condensetur, & granulosa instar gummi fiat: nam eisdem etiam corticibus hæc manna sæpe emanare visa est, quapropter cur prius trahatur, & deinceps ab eisdem sponte etiam Canis tempore excernatur, nam in ornis etiam ante sponte emanat, ratio nulla dari poterit, præsertim longo tempore, & per singulos dies continuos, cadit quoque eadem, in aëre prius ex frigore concreta, & coagulata, & non liquida ut probauimus, quæ aërea est, neque à Sole seu alterius calore concreuit, sed liquatur ac soluitur potius cum fuerit à frigore iam coagulata. Sed pone eam liquidam decidisse, cur potius à Solis calore Maij & Iunij etiam tempore non liquatur ac soluitur, adeo vt solum petat, quàm à dictarum arborum cortice trahatur, & in eodem, ut ita dicam, bibatur, cum nulla adsit familiaritas aut altera causa ob quam attrahi ab eodem debeat, quinimò cum sit à dictarum arborum natura aliena, & veluti superfluum quoddam, propterea quod earum nutrimentum nõ est, expelli potius quàm attrahi deberet, opem ferente in hoc Solis calore, qui foras trahit. Nec satis est, quod ab eodem Solis calore cortex fuerit eo tempore exsiccatus, aridusque redditus, & arefactus pro eius attractione, cum valentior admodum fuerit Solis calor in dissoluendo, ex siccando, ac foras trahendo, quàm dictarum arborum cortex, necnon & ipsimet cortices in expellendo tanquam superfluum, in hoc potius opitulatur quàm in trahendo: similiter vt eorum sciscio & arefactio potius opem ferre videntur, vt commodius à Solis calore foras trahatur, quàm vt intus in eorum substantia imbibatur, & detineatur. At si dixeris roridam hanc mannâ non esse velut superfluum quoddam, & alienum dictarum arborum, sed simile, & familiare, ac velut alimentum quoddam, & propterea ab eis trahitur, cur causa fuerit quod deinceps tam continuè, & diu, & copiosè ab eisdem excernatur, & non detineatur potius imaginari nemo queat. Rursus quæ poterit diuersitatis causa tribui quod Solis calor opituletur, vt eadem manna in cortice imbibatur prius, ipsum exsiccando, arefaciendo, scindendo, ac rarefaciendo, & deinceps Canis feruidus calor eundem humorem foras trahat, condenset, ac coagulet, cum multo magis corticem ipsum coagulet, cum multo præcedens Solis calor mense Maio & Iunio, potissimum cum absq; incisione aliqua sæpius sponte ex eisdem arboribus prodeat, ac in eis reperitur Canis tempore: & interdum ante, præsertim in ornis vt dictum est. Ad hæc quid fuit impedimento quod eodem Maij & Iunij tempore eadem manna non fuerit à Solis calore concreta potius & coagulata instar gummi circa cortices dictarum arborum, quàm in cau-

sa vt in eisdem imbibatur, & intus trahatur? postquam Canis tempore ab eodem calore iterum condensata & granulosa, instar gummi reddita est, eundem id ipsum imaginari non valeo, quâvis eruditissimi, certè viri, à me semper colendissimi, ita sentiant. Sed puto eos deceptos fuisse à villicis & pastoribus Calabris falsò asserentibus quod mannâ hanc quæ in fraxinis & ornis reperitur, manè antequàm Solis calor inualecat, collectores colligant, cum communiter contrariū & hodie obseruetur, & semper obseruatū sit, etenim non manè priusquàm Sol valde perurat, vt ipsi falsò retulerunt, sed meridie, solèque feruidissimè colligunt: neque adè à Solis calore rarefit, soluitur, atq; in aëre vertitur: sed potius concreuit, & durior ac candidior redditur. Vt verò non adeo areseat, duriorq; reddatur, Solis superueniente feruidissimè calore, & nõ quod ab eo soluitur, & liqueat, eam quæ ex ornis prouenit, præsertim à Solis ortu per tres, vel quatuor horas colligunt, non enim vt concreat, & coaguletur, perinde vt ea quæ in fraxinis colligitur immodico calore hæc manna indiget, cum siccioris ac terrestrioris, vt ita dixerim, naturæ fuerit orni quàm fraxini humor, seu succus: colligunt insuper eam quandoq; vt aiunt, ante Solis ortum, vbi pridie inclinante iam Sole profluxerit, & ab eodem concreta fuerit, aut nocte flante aquilone fuerit coagulata, ob eandem videlicet causam, ne Sole superueniente siccior, aridiorque reddatur, potissimum vbi non sponte, sed vi adiectis causis profiliierit. Quapropter asserendum haudquaquam erit, quod à proprietate quadam specifica fraxini & orni hanc aëream, & è cælo cadentem mannâ sibi ipsis alligant, & trahant, neque quod in eorum corticibus imbibatur, mense Maio & Iunio delapsa, & deinde sub cane dureat, & coaguletur ob dictas causas, & Iunio etiam mense præsertim in ornis, eadem sponte prodicens reperitur, ac colligitur, neque etiam dicenda erit cælestis & aërea hæc manna quæ in eisdem duntaxat colligitur arboribus, sed arborea, & propria dictarum arborum, nec etiam asserendum est hanc mannâ esse melsaccharum Diosc. aut zuccharum alhusar. Auic. nam melsaccharum, vt inquit idem Dioscor. 104. libri 2. in India, & felici Arabia reperitur in arundinibus, & non in Regno Neap. in fraxinis & ornis, præterea falsis modo coactum est, fragile dentibus, vt ipse inquit, quod quidem huic nostræ mannæ haudquaquam conuenit, similiter quoque dicendum est de zuccharo alhusar. Auic. quod quidem, vt ipse ait, manna est cadens super alhusar, & non super ornum & fraxinum: est etiam sicut frusta salis, præterea in eo est cum abstersione, & resolutione ponticita, & amaritudo, quæ omnia huic nostræ mannæ non competunt. Quæ etiam ratione nemo asserere audebit mannâ hanc, id esse quod à Galeno 7. de simplic. medica. facult. cap. de melle, sacchar nominatur, nam id quoque (vt de melle saccharo dicebat Diosc.) ex India & felici Arabia conuehitur, vt Galenus inquit, & in calamis, vt aiunt concreuit, & non in fraxinis & ornis, quemadmodum hæc nostra manna reperitur, & propterea idem esse reor melsaccharum Diosc. & id quod sacchar à Galeno nominatur, quamobrem neque ros cadens è cælo, neque melsaccharum seu sacchar, aut zuccharum alhusar est manna hæc quæ in fraxinis & ornis duntaxat colligitur, & nostræ tempestatis medici ad aluum molliendam vtuntur. Quod verò

verò neque manna thuris fuerit, nedum medicis omnibus & pharmacopolis, sed & tonsoribus liquet. Sed porro aliud quippiam est seorsum ab his distinctum, utpote proprius dictarum arborum succus seu humor, & propterea arborea, & non rorida, & aërea appellari debet: id verò luculentius patebit, ut eiuſdem generationis modum, ac cauſas inuestigauerimus. Quapropter animaduertendum est nonnullas eſſe plantas quæ humorem, seu succum plurimum habentes, determinatis quibusdam temporibus in caules, seu caudices, ramos, atque etiam radices earum ab eisdem delegatur, ibidemque conſiſtit, nec deſunt etiam quæ tum in radice tum in caule eundem habeant humorem. Verum quibusdam earum humor ipſe craſſitudine tantum conſiſtit, ut lactuoſis, quibusdam etiam in lachrymæ modum gignitur, ut Abieti, Pino, Terebintho, Larici, Piceæ, Amygdalæ, Ceraſo, Pruno, Iunipero, Vlnæ, Spinæ Egyptiæ, & plantis quæ thus & myrrham præſtant, Theophrasto auctore cap. 1. libr. 9. de hiſto. plan. Accidit verò, ut vel proprii ſucci colorem plantæ nonnullæ ſortiantur, id quod planius in annuis & anni caulibus animaduertitur, quam in arborum genere, licet vires pro cuiuſque plantæ ratione, humor ſeu ſuccus ſortiat, ſapor verò humorem alium magis, alium minus conſequitur, ita ut nec omnibus ineſſe appareat ſic exilis, & diutius quidam in plerique ſentitur, ut idem Theophr. inquit citato loco. Inter has arbores ſeu plantas quæcunque pinguedine aliqua conſtant, gummi, ſeu lachrymæ odoratæ percipiuntur, quæ contra pinguedine carent, ſine odore proueniunt, ex prædictis verò omnibus, alia ſponte conſiſtunt, alia incifura, alia modo utroque, quibus concretio ſponte conſiſtit, iis fluxus humoris largior prodiit, caſura verò capiuntur quæ vtilia, magisque operæpretium ſunt: at non eodem tempore omnium incifuræ, atque concretiones notantur: nam quamuis humor plurimus omnibus iam dictis ac reliquis etiam plantis reperiatur cum germinare incipiant, validiſſimus tamen, maximeque ſuam oſtenſens naturam eſt, cum iam à germinatione, & à fructificatione aſſarunt. Quapropter qui talem humorem, ſeu gummi ad uſum quempiam conſeruant, hæc eadem pro eius collectione tempora obſeruant, ut patet ab eodem Theophr. citato loco. Inter has itaque arbores quæ copioſum ſuccum, ſeu humorem habent, non ab re fraxini & orni connumerari debent, poſtquam modo utroque ſponte videlicet, atque etiam incifura, & in caudicem, ramos, ſurculos, iuxtaque foliorum pediculos, ac folia ipſa talem expuunt humorem ſeu lachrymam, ut in ſequentibus parebit, non quolibet tamen tempore, ſed ſub cane, aut iuxta canem, quo tempore hæ dictæ arbores à germinatione, & fructificatione etiam ceſſarunt, qua ratione, eodem quoque tempore earum ſuccus validiſſimus exiſtit, maximeque ſuam oſtendit naturam, ut diu obſeruat, eſt, & nos infra demonſtrauiſmus. Nec quicquam reſert, ſi Theophr. cæterique veteres auctores qui de plantarum hiſtoria ac cauſis ſcripſerunt, inter eas arbores in quibus iam dictus humor emanat, conſiſtit, ac coagulat, fraxinum & ornum non connumerant: nam neque oleam tam domeſticam quam ſylueſtram, quæ ſponte, & vi etiam ſimilem præcreat lachrymam, ut diu à quibusdam obſeruat, eſt, meminerunt: huius tamen lachrymæ hucufque nullus eſt in medicina uſus, præſertim ad aluum molliendam, ſed potius

contrarium molitur, eſt quoque impedimento, reliquis purgantibus medicamentis ubi cum eisdem propinetur, velut qui ſæpius id experti ſunt medici, mihi retulerunt, & nonnulla quoque alia à iunioribus inuenta obſeruatæque ſunt, etiam in arte medica, quæ priſcis fuere incognita. Neque etiam iam dictæ arbores omnes, ſed inter eas pauca admodum, nec ſingulis etiam in locis & quolibet anni tempore, ſed quibusdam particularibus cum regionibus, tum anni temporibus, ſponte præſertim, talem expuunt humorem, ac procreant, ita ut facile priſcos fugere potuerit, quamuis cætera de eisdem plantis conſcripſerint. Etenim Theophr. cap. 11. libr. 3. de hiſto. plan. duo ſateatur eſſe fraxini genera, quorum alterum exceſſam procerumque eſt, lignum candidum, craſſiuenium, neruatum, mollius, enodius, criſpiuſque habens: alterum humilius, minus acule, ſcabrius, durius, ſauius: folia habens laurinis, lauri latifolia ſimilia, in acutius tamen coacta, & ambitu leniter ſerrata, ac ſubſidentia, ſeu aculeata, ramulus totus, quem folium vnum putaueris, quoniam ſimul cuncta folia ferat, ſingulari pediculo, & ſingulis foliis coniugatum, veluti per genicula pendentes, conſtat: amplo intervallo, coniugationibus diſtinctis, ſimiliter atque in ſorbo: ſunt aliis breuiora internodia, coniugationeſque pauciores, aliis utputa candidis, longæ, plureſque, & ſingula folia oblongiora, anguſtiora, coloreque porracea, cortice leui, ſpiſſo, tenui, coloreque rubro integitur, radicibus crebris, craſſis ſublimibufque adhæret. Fructum Iudei nullum hanc habere exiſtimant, atque etiam flore carere: fert tamē in ſiliqua fructum minutum, nucis modo, qualis amygdalæ, guſtu ſubamarum, & poſt pauca eodem loco ſubdit, leuiſ illis, locis potiſſimum cōcauis, madidiſque emigrat, ſcabra, ſiccis, atque ſaxoſis, quidam alteram fraxinum, alteram bubulam Fraxinum vocant, hoc eſt ingentem & maiorem, ut Macedones &c. Diſcorides verò cap. 109. libr. 1. de Fraxino ſic ſcriptum reliquit: [Fraxinus arbor nota eſt, cuius folia & ſuccus, illa illita, hic potus ex vino, viperarum ictibus auxiliatur. Corticis cinis ex aqua illitus, lep. as eximit: ligni ramenta pota letalia eſſe ferunt.] At Plin. cap. 13. lib. 16. hæc de fraxino ſcripſit, Materiæ enim cauſa reliquas arbores natura genuit, copioſiſſimamque fraxinam, proceram hæc ac teres pennata & ipſa folio, multumque Homeri præconiō, & Achillis haſta nobilitata, materies eſt ad plurima utilis, ea quidem quæ ſit in Ida Throadis, in tantum citio ſimilis, ut ementes fallat cortice ablato. Græci duo genera eius fecere longam enodem, alteram breuiem, duriorē, ſuſcioremque, laureis foliis (Bumeliam vocant in Macedonia) ampliſſimam, lentiſſimamque, alij ſeu diuiſere. Campeſtrem enim criſpam, montanā ſpiſſam folia earum iuuentis mortifera, cæteris ruminantiū innocua Græci prodidere: in Italia nec iuuentis nocet, contra ſerpentes verò, ſucco expreſſo ad potum, & impoſita vlceribus opifera, ac nihil æque reperiuntur, tantæque eſt vis, ut ne matutinas quidem, occidenteſve umbras quæ ſunt longiſſimæ, ſerpens arboris eius attingat, adeo ipſam procul fugat, & demum ſubdit, experti prodimus ſi fronde ea gyro claudatur, ignis & ſerpens, in ignem potius quam in fraxino fugere ſerpentem, mira naturæ benignitas, priuſquam hæ prodeant florere fraxinum, nec ante conditas folia dimittit: & cap. 18. eiſdem libr. inter arbores quæ

montes amant ornum, qui & ipse fraxini species quædam est: inter eas verò quæ aquosis montibus gaudent, fraxinum connumerant libr. verò 24. cap. 8. hæc de fraxino protulit verba, Fraxinus quam vim aduersus serpentes haberet indicauimus. Semē eius foliis inest, quo medentur iocinoris, & lateris doloribus in vino: aquam quæ subit cutem extrahunt, corpus obesum leuant onere, sensim ad maciem deducunt, iisdem foliis cum vino tritis ad virum portionem, ita vt puero quinque folia, tribus cyathis diluantur, robustioribus septem folia quinque cyathis vini, & subdit, Non omittendum ramenta eius & scobem quibusdam cauenda prædicat. Hæc Plin. de fraxino & orno tradidit, quæ ferè omnia potissimū quæ de fraxino scripsit, à Theop. & Diosc. transcripsisse videtur, quamuis iuniores quidam (vt Hermolaus & Ruellius) voluerint in hoc parum sibi constare Plinium, vt qui fraxini folia dixerit omnibus venenatis salutaria esse; iuuentis tamen letalia, cæteris verò ruminantium innocua, quæ quidem de Taxo, & non fraxino Theophr. interpretatur: posset tamen (vt mihi videtur) à calumnia idē Plin. vendicari. Nam quamuis Theophrastus cap. 10. lib. 3. de hist. plan. de Taxo verba faciens inquit, adiunt, quod si iumenta folia comederint, emoriuntur, si ruminantia, nihil patiuntur, non propterea notandum erit Plin. quod idem quoque de fraxini foliis sentiat, potissimū cum neque id Theophrast. negare videatur, quamuis id non fateatur, & si quispiam dixerit in Italia obseruatum esse Taxi folia, & non Fraxini, non ruminantia animalia interficere; dicimus haudquaquam Plin. negasse, & si fraxini folia eadem interficere testatur, illud in Italia veritatem non habere fatetur, imò fraxini folia nec iumentis in Italia nocere ait, sed quicquid sit, satis est monstrasse ornum & fraxinum inter eas arbores connumerari posse quæ succum, seu humorem superfluum habentes, lachrymam seu gummi procreant ac generant, quamuis iam dictis auctoribus, aut cæteris quibusdam illud haudquaquam scriptum fuerit, nam quemadmodum alia quedam ferunt, vt Theophrast. testatur citato cap. 11. libri 3. de histo. plan. Veluti mulcos quemadmodum laurus, verum magis adstringentia gustu, singulæque per se in orbem circumacta platani pilorum specie, & horum alia circa fructum, alia, multo semota exeunt, quin & implicamina quædam eodē modo in eis nascuntur, perinde etiam cum multo humore scatant, ac redundant, lachrymæ seu gummi modo, vbi idem ad caudicem ramos, seu furculos, & etiam folia demandatur, iuxtaque corticem concresecat, & coaguletur, hæc quam in eis colligunt, & mannam appellant, generari poterit gummi substantia similis, postquam è celo, vt probauimus, eadem lapsa non est, & in eisdem solis, & non cæteris in plantis herbis, fructibus, seu lapidibus eiusdem loci reperitur, ac colligitur. At si dixeris non omnes eiusdem generis arbores talem producere liquorem, & propterea non esse earundem arborum humorem, seu succum proprium, asserimus nos hoc arborum genus, fraxini inquam & orni, talem habere naturam, vt eandem lachrymam, seu gummi, ob earundem superfluum humorem seu succum, generare possit. Quod verò non omnes sed paucæ eiusdem generis illam procreant, sponte præsertim (nam cæsuris illatis modo, & tempore quo dicit, plures illam expuere videntur, vt ferunt) ob aliquod prouenit

impedimentum, vt puta vel ob earundem arborum defectum, aut vitium aliquod, vel ob Solis, seu regionis diuersitatem, quemadmodum & amygdalarum, prunorum, ceraforum, igniperorum, ac reliquarum quarundam arborum generi contingit, licet eandem habeant facultatem seu naturam. Est igitur proprius dictarum arborum succus, seu humor manna, quæ quotannis, sub cane potissimū in fraxinis & ornis duntaxat pluribus continuis diebus colligitur, quæ & nos longo tempore Neap. vñ fuimus, & quotquot etiam ante nos per plures annos medici fuere ad aluum soluendam vñ sunt, & non ros è celo cadens; vt fusissimè demonstrauimus, quod quidem, pluribus etiam experientiis confirmare volumus. Nam superiniecto linteo lanceo, aut lineo, vt quibusdam præcepimus sapius, per plures noctes ac dies, supra easdem arbores, ita vt ros ad eas peruenire non potuisset, inuenta nihilominus in eis, eisdem diebus, ac collecta manna fuit, dictis etiam arboribus non incisis, vt retulerunt, id quod fieri haudquaquam potuisset, si sponte ex eisdem arboribus non emanasset, potissimū cum supra idem linteum ne vestigium quidem eiusdem generis roris, nec liquida, nec concreta, aut coagulata manna fuisset inuentum. At quid opus est diu hac in re sermonem protelare, tempusque frustra terere, cum non vnus duntaxat, duo, vel tres, sed longè plures, & quidem fide digni vno ore confessi fuerint, mihi que retulerint, vt qui rem hanc penitus inuestigare decreuerim, eos propriis conspexisse oculis, post collectam in dictis arboribus mannam ex eisdem locis; reliquam refudasse, ac emanasse, atque sensum effluxisse, & deinceps Solis calore superueniente, coagulatam esse: idque non semel duntaxat, sed sapius ac sapius se obseruasse testantur. Aiunt insuper in fraxini, orni que caudicibus iuxta corticem sapius adnatas veluti vesiculas quasdam se inuenisse, seu tubercula quas disrumpentes primo, liquorem quandam album dulcem, concretum & crassum in optimam mannam conuersum, deinde minus album tenuiorem, liquidiorēque redditis, sed dulcem quoque manifestissime emanentem sapius inspexisse, qui etiam à superueniente Solis calore coagulatus, concoctus arbidiorque redditus, effectus est manna primæ assimilis, & vbi diu permansisset superflue à Solis calore exsiccata, inutilis reddita est. Adhæc si incisis dictis arboribus, in eisdem incisionibus talem iam reperiunt concretum & coagulatum humorem, eiusdem ferè coloris, saporis, & consistentiæ cum ea quam in eisdem arboribus non incisis colligunt, manna, quis vnquam hæsitare audeat eam non esse earundem arborum humorem seu succum, sponte ad eisdem ramos, caudicem, seu furculos detrusum, potius quam rorem quempiam è celo delapsum, postquam eisdem incisis arboribus similē colligunt concretum humorem, ac antea priusquam cæsuræ factæ fuissent? nemo inquam nisi admodum duræ ceruicis homo, ac pertinax valde. Confirmant illud insuper quoniam cicadas, & quædam alia animalcula se propriis oculis inspexisse fatentur quæ à dictis arboribus, ornis præsertim, cum corticem perforauerint, hanc lachrymam exugunt, & deinceps eisdem profigatis, ex eodem foramine seu scissura, liquorem hunc dulcem profluxisse, quem postea à Solis calore coagulatum legerunt, tanquam in optimam mannam conuersum. Qua de re dubio procul quæ in ornis

ornis & fraxinis folis colligitur manna, non modo hac nostra tempestate, verum etiam quæ per omnes iam elapsos annos collecta fuit, earundem arborum humor seu succus est, quemadmodum rationibus locupletissimè probatum est, & experientia confirmauimus, & vt longo tempore, ac sapius ab eiusdè collectoribus obseruatum est. Cognoui insuper à fide dignis quibusdam viris se plures secuisse ornos, vt ex eis pro vini dolis circulos pararent, quos cum findissent, Solisque exposuissent, non paruam in eis huius mannæ, quantitatem inuenisse, non quidem extra in cortice, sed in lignosa ac veluti eiusdem orni etiam medullosa substantia emanatam. Testatur item quidam faber ferrarius, vir probus, cuius nomen Cæsar de Ruodi, quod cum in quandam perrexisset Syluam pro carbonibus faciendis, igneque accenso, ex orno qui prope fornacem aderat, mannam resudasse oculis propriis inspexit, & exiguo post tempore ab eodem igne coagulata fuisse. At cum dictarum arborum cortex simul atque folia amara præ se ferant saporem, non ab re quæreret quispiam, qui fieri possit vt tam dulcis liquor, si earum arborum humor seu succus est, ex eisdem gigni possit. Et dicimus quod quamuis cuiusque plantæ humor, vires, pro eiusdem plantæ ratione semper fortitur, sapor tamen humorè alium magis, alium minus consequitur, nec omnibus inesse apparet, ita ex illis & dilutus quidam in plerisque sentitur, quæadmodum etiam neque idè succus (in arboribus præsertim) eundè semper feruat calorem, vt inquit Theoph. citato cap. i. libro 9. de hist. plant. Qua de re non inconuenit liquorem hunc dulcem esse, licet ex amaris profluat plantis. At hæc licet cortex dictarum arborum amarum representet saporem, hic tamè humor, seu liquor, nõ ex cortice, sed ex propria lignosa ac medullosa substantia effluit, quæ sapore dulcis ferè est, aut saltem amaritudinis non est particeps, aut parum admodum, ita vt nõ sentiatur, effertur autem foras per corticis meatus, seu fissuras, & non ex corticis substantia. Et si quis permiscetur ipsius corticis humor, exiguus cum sit, à Solis calore concoctus, tandem dulcis redditur; potissimum cum maior sit copia eius qui à propria arborum substantia humor excernitur, quam qui ex cortice. Præterea esto quod multus fuerit humor, qui ex cortice emanauerit, incisis potissimum arboribus, aut vniuersus ex eo profluat, & harum etiam arborum propria medullosa & lignea substantia, eiusdem particeps sit amaritudinis quemadmodum cortex & folia, adhuc mirum videri non debet, quod talis dulcis liquor in eisdem colligi possit, aut ferè insensibilis amaritudinis particeps. Nam cum superfluous fuerit, vt prius dictum est, harum arborum humor seu succus hic, qui ad caudicem ramos, seu etiam folia excernitur, non quantitate duntaxat, sed etiam qualitate necessariò is dulcis erit, postquam pro earum nutrimento quod satis est ex eisdem attraxerint similem, ac retinuerint humorem, qui rationabiliter amarus esse debet, quemadmodum iam dictæ arbores, is verò qui excernitur, dulcis eo potissimum, quoniam à Solis calore, coelique benignitate, concoctionem, coagulationem, ac perfectionem acquirit, simileque huic liquoris accidere videtur ac terris in quibus agricolæ lupinos feruerint: aiunt nanque terram dulciorem, ac fertiliorem reddi, non ob aliud quam quod amarum succum è terra lupini pro eorum nutrimento traxerint tanquam eis familia-

re, dulcemque reliquerint. Adde quod cum per tenues ac angustos corticis meatus idem excernatur humor, quod quidem ipsis crassum est, in eisdem impingitur, ita vt per eos expelli nequeat, nisi quod dulce & tenue existit: id quod contingit etiam iis qui aquam dulcem ex salsa, ac etiam amara interdum extrahunt vase cereo tenuique constructo, adeò vt tenues, & quæ dulces sunt in id resudent aquæ partes, reliquæ verò resudare, ac extrahi nequeant. Retinent itaque pro earum nutrimento dictæ arbores id omne, quod eisdem familiare ac simile est liquoris, seu eius humoris quem in se continent, quod verò alienum & dissimile, tanquam superfluum excernunt, & propterea dulcis est qui in earum caudice, ramis, seu foliis colligitur (hoc est aut nullam præ se fert amaritudinem quæ sensu iudicari queat, aut valde exigua, nam secundum naturam forte ab ea omnino non absoluitur) præsertim cum per angustos transeat meatus, & à Solis calore cōcretionem, perfectionem, dulcedinem quodammodo, ac concoctionem acquirat. Sed id saltem vitari non posse (iniques) quod quæ in foliis reperitur atque colligitur, manna dictarum arborum, aërea non sit: nam quò pacto, aut qua vi ad ea transmitteretur ac peruenire posset, si earundem arborum humor esset? At dicimus hos quod in orni foliis nunquam talem colligunt mannam, neque in eisdem reperitur, quinimò nec etià in eorū ramis, nisi per quàm rarissimè, & fortè quæ nõ in eisdem sit genita, sed ex caudice defluerit, sed in eorū caudicibus seu truncis, aut crassioribus ramis duntaxat ipsam reperiunt & colligunt. Cuius causa esse poterit, quod cum in saxis magis mōtosisque ac siccis locis emigret ornus, siccioris etià naturæ, hoc est minùs humidæ est quàm fraxinus, qui in concauis madidisque magis gaudet, Theop. & Plin. auctoribus. Quapropter tantà in se nõ continet humiditatem superfluum, neque adeò dilutam & tenuem, vt ad folia vsque ac paruos ramos perueniat. Est item scabrosa arbor, ita vt faciliè priusquam ad ramos & folia humor deueniat, per caudicis corticem prorumpat: idque faciliè comprobatur, propterea quod qui eam colligunt, aiunt huius arboris mannam perfectiorem esse, si manè & vespèri legatur, quàm meridiè sub ardenti Sole; nam ex immodico Solis calore aridior, sicciorque admodum redditur, & propterea imperfectior. In fraxini verò foliis, eam sapius colligere tradunt. At non manè ac vespèri, sed meridiè ac calidissimis diei horis, vt dictū est. Nam manè humidior cum sit, colligi nequit. Verum satis exigua est ea, quam in foliis reperiunt, & veluti milium parua eius grana, ita vt faciliè persuaderi possit ex eiusdè arboris ramis super folia decidisse potiùs, quàm in eisdem genitam esse, aut saltem propterea quod magna ex parte, vt collectores referunt, in fraxinis manna emanat ex ramis, ea potissimum parte, qua foliorum pediculi eisdem annectuntur, quem locum vulgo vocant gliocchi, atque in eisdemmet pediculis & ramis coalescentem inueniunt; poterit ob id quæ in foliis reperitur, per eosdem pediculos ad folia effluxisse, postquàm minuta admodum ac milijsimilis ferè in eisdem reperitur, adeò vt die vna ac etiam altera ex foliis ipsis vix semiciam colligant. Rursus dicas quid erit impedimento quominus in fraxinis qui in concauis, madidis, paludosisque locis oriuntur, in quibus præsertim (vt aiunt) manna reperitur, quod in eorum foliis eadem generari

possit, quem admodum in caudice, ramis, furculis, seu foliorum pediculis, ad eadem folia transmissa portione quadam exigua superfluetis humoris seu succi, per eosdem foliorum pediculos ab eisdem fraxinis, postquam humidiores sunt quam orni, & in madidis locis magis quam in siccis talem producit lachrymam, seu gummi, nonne & in quibusdam etiam arboribus, ut vlmis, vesiculæ, seu tubercula quedam, humore etiam crasso & lento plenæ in foliis reperiuntur? Et in Fago propriis me inspicisse oculis fateor, præter eos quos in spinosis quibusdam folliculis proprios fructus procreant, in foliis etiam plures generare veluti fructus quosdam cono similes, herbacei coloris primò, deinde rubescences, duos quidem, intus verò inanes. Non itaque à ratione alienum cuiuspiam videri debet quòd in fraxini foliis similis concrescat, & coaguletur humor veluti in eius caudice, ramis, ac foliorum pediculis, transmissio tanquam superfluo per eosdem pediculos humore ad eadem folia, ac per eorum poros demum refudans, à Solis calore concrescat, & coaguletur, postquam humidiores natura sunt, ac in madidis locis magis talem producant lachrymam, cuius indicium maximum existit, quia (ut ferunt qui eam colligunt) de relicta illa exigua manna quandoque in foliis, vno vel altero die, maiorem postea eam reperiunt, circa quam grana alia etiam, admodum minuta & coagulata sunt. Aiunt insuper parua illa grana quæ manne super folia reperiunt, eodem etiam die Sole superueniente augeri, & maiora reddi, quæ postea vesperè colligunt. Quod fieri haudquaquam posset si ex aère fuisset delapsa, nã à Solis calore potius liquifaceta ac absorpta fuisset, quã coagulata, & maior reddita eius substantia, ut paulò ante probauimus. Quapropter valeant qui mannâ in fraxinis & orni foliis repertam, æream seu foridam, ac è cælo delapsam esse contendunt. Dixi non ab re foliis, nam contingere poterit quòd eademmet arbores in quibusdam locis, in quibus ærea manna deciderit, reperiuntur, & ita in eisdem etiam decidere poterit. At non in eis foliis, & quotidie per multos dies, sed cæteris quoque omnibus, & rarò tum arboribus, tum fruticibus, tum herbis & lapidibus eiusdem loci similiter eam inueniri necessum est, postquam è cælo deciderit, in aëreque & non particulis plantis concrescit, & coagulatur, ut probauimus particularémque quandam aëris constitutionem, ut diximus, requirit: sed quæ in eis duntaxat reperitur, earum arborum humor proprius seu succus existit, qui cum superfluo fuerit, non solum quantitate, sed etiam qualitate pro earum nutrimento: ad caudicem ramos, seu furculos, interim etiam ad folia eorumque pediculos excernitur, quemadmodum in cæteris plantis, quæ lachrymam seu gummi procreant: pro cuius generatione non parum etiam Solis calor opitulatur, earundem arborum corticem, aliasque partes, rarefaciendo, ac findendo, dictumque humorem aliquando primò, ac extenuando, forasque trahendo, & deinceps cogendo, coagulando, ac concoquendo, ita ut suauior & dulcior fiat, & ad usum quempiam paratior, idque potissimum sub cane, aut non multo ante tempore, quo quidem tempore feruentior calor existit. Nam feruentissimis etiam diebus, sub cane videlicet, thus, & myrrham colligunt, Theophr. auctore cap. 2. lib. 9. de histo. plan. licet hæc incisis arboribus (ut ipse inquit) fiant. Cuius rei occasione non ab re quis quæ-

reret, num incisis eisdem arboribus, fraxinis inquit & orni, quemadmodum sponte conclusimus, hanc etiam lachrymam seu gummi dictæ arbores producant? Huic ex his quæ prius diximus responsum patere poterit: diximus enim has arbores inter eas posse connumerari quæ & sponte, & incisura quoque talem valeant lachrymam generare, atque experientia etiam eorum, qui incisis eisdem arboribus, eam colligunt ut vno ore omnes fateantur, probauimus posse etiam sponte dictas arbores eandem producere. Quæ de re nemo inficias ibit quòd manna ex his arboribus incisis emanet, ac emanare possit, quinimò ad vulnera illata copiosior humor confluit, ut aiunt. Verum non vnus duntaxat eorum est incisionis modus, ut ferunt omnes, nam quidam nonnullis factis incisis in toto caudice, ita sequenti die, vel altera eam colligunt, quidam verò per aliquos dies ante easdem arbores incidunt, quibusdam incisis in inferioribus earundem partibus illatis, & deinde eadem collecta, ac proiecta quam primò reperiunt in eisdem incisis manna, quæ deinceps consistit per easdem incisas, colligunt, & conseruant. Alij verò prætermissa omnino ea quæ per primas effluit incisas, post paucos dies alius in locis superioribus easdem arbores incidentes colligunt, quæ quidem præ cæteris dulcior, admodumque suauior existit, purgato, ut inquit per primas incisas arbore, hoc est excreto eo humore, qui impurius, & propterea amarior, & crudior erat. Id verò in orni potius quam fraxinis non ab re machinati sunt: nam fraxini humidiores cum sint, ut dictum est, sponte magis, nedum in caudicibus & ramis, verum etiam in foliis eorumque pediculis atque eo in loco qui est inter foliorum pediculos & ramos, talem emittunt lachrymam. At orni, ut qui sicciores natura sint, hoc est minus quam fraxini humidi, corticemque duriores & scabiores, locisque saxosis, montosis ac siccis degant, tantam in se humiditatis copiam non continent, nec adeò dilutus & tenuis est eorum humor ut ad ramos & folia eum sponte emittere valeant, sed in caudicem solum & rarissimè in ramos. Quapropter ut copiosius effluat ex eis humor, eisdem vulnera iniiciunt; ita enim & promptius effluit, & à Solis etiam calore non parum arbores pro eius expulsionem eisdem incisis iuuantur, eundem scilicet humorem ad corticem trahente. Ex quibus plenissimè satisfactum esse cæseo ad primum quod differendum proposuimus. Etenim non solum mannâ quam vocant, rorem esse quandam è cælo delapsam, ut Arabes sentire videntur, verum etiam arboreum humorem seu succum, fraxini inquam & orni, satis superque demonstrauimus, ita ut modo vtroque eam generari contingat.

Validissimis insuper rationibus atque experientia probatum esse reor, eam, quæ nostra tempestate vtimur ad aluum molliendam, quæque etiam prædecessores nostri per plures ante annos vsi fuere, illam non esse quæ eiusdem generis cum rore existit, quàmque etiam Arabes scripsere, sed fraxini seu orni humorem, siue succum concretum, postquam ex eisdem duntaxat, hoc nostro in regno Neap. ple-risque in locis præsertim Calabriae eam colligunt, & per plures ante annos se collegisse fateantur: idque etiam percepisse aiunt ab iis qui eam colligere eos docuerunt. Reliquum est ut ad secundum dilucidandum transeamus. Erat autem; num liceat medicis

dicis indifferenter atque innoxie eisdē mannæ speciebus uti, postquam rationibus, auctoritatibus, atque experiētiā, inuentum est bifariam eam generari posse: & num vna etiam eiusdē speciei sit altera perfectior, & quæ imperfectior quodammodo earum est nunquid omnino vitanda, explodendaque sit? Pro cuius dilucidatione asserimus aērēā mannā ex rore genitam, ab Arabibusque descriptam, potissimum concretam, & quam Mesues commendat, ad eos vsus quos ipse ac Serapio & Auic. probant esse vtilissimā; etenim cum ex rore sit genita æquali, ac fecundo aère, & latis aspectibus, saporeque dulcis sit, ad æqualitatem ferē accedit, ad caliditatem, & humiditatem, parū vergens quodammodo: quapropter guttur, pectus, ac ventrē lenit, leniendoque cum facilitate quadam bilē educit, ac sitim sedat; præter id quod sua dulcedine, si cū aliis purgantibus misceatur medicamentis, eorū operationes vigorat: efficit enim ut natura ob eius dulcedinē propius ea aggrediatur, ac ad actū ducat. Verū si super lapides cadat, ea optima est (ut inquit idem Mesues) quæ est sicut semen album, & est dulcis, & recens: sequitur deinde quæ est subcitrina, nam fusca, cænosa, & antiqua non est bona. At si super arbores seu plātas cadat, melior est illa quæ est paucæ permissionis cum foliis, & est subalbida, recens: suscipit enim hæc quippiam de virtute plantarum, ut idem Mesues testatur. Quas etiā ferē omnes facultates Tereniabin dictæ, quam liquādam & melleam mannā esse diximus, Auic. & Serapio etiam tribuerūt: ita ut non minus innoxie iuxta eorū sententiam ad iam dictos vsus Tereniabin uti valeamus, quam iam dicta concreta & coagulata manna. Ipsæque vtrāque apprimē idoneā ad eos vsus esse censerem, modō vtrāque his nostris in regno Neap. e cælo cadere puto, aut valde exiguā, eāque rarissimē, & non quotannis, potissimum concretā, & coagulatā: liquidam verō aut non omnino, aut si qua reperitur quæ non concrecat, ut dictum est, eā non esse eiusdē speciei ac facultatis ingenuē fateor, cuius Arabes Tereniabin esse fatentur, postquam neque eiusdē notas habet. Et qui coagulatā mannā colligit, tanquam inutilem eam derelinquūt, & per plures ante annos dereliquerunt, quotquot concretā & coagulatā mannā hoc nostro in Regno Neap. quibusvis in locis colligunt, eāque segetes in quotquot incidit, protinus tabe quadā, veluti rubigine perimere aiunt, quod quidē haudquaquam de Tereniabin Arabes scripsere. Itaque ubi haberi possit rosca concreta ac coagulata manna, tutē ad iam dictos vsus vtare: at eius defectu, nū ea, quam arboreā esse probauimus uti liceat, nondū liquet. Pro cuius dilucidatione in memoriam reuocandū est fraxini folia, eorūque succum, illa illita, hunc potum, serpentum morsibus subuenire Diof. auctoritate. Quod etiam confirmauit Plin. cap. 13. lib. 16. cap. vero 8. lib. 23. ut paulō ante animaduertimus, hæc de fraxino scripsit, Fraxinus quam vim haberet aduersus serpentes, indicauimus, & dein de subdit, semen foliis eius inest. putarem ipsum melius dixisse folliculis seu siliquis eius inest, ut cum Theophr. concordaret qui dicebat, fert tamen in siliqua fructum minutum nucis modo, & deinceps idem Plin. de semine ait, quo medentur iocinoris & lateris doloribus in vino, & iterū de foliis ita subdit. Aquam quæ subit cutem extrahunt,

corpus obæsum leuant onere, sensim ad maciem reducentes, iisdem foliis cum vino tritis ad virium portionem: ita ut puero quinque folia, tribus cyathis diluantur, robustioribus septem folia, quinque cyathis vini, non omittendum ramenta eius, & scobem quibusdam cauenda prædici. Has Plin. de seminis & fraxini foliis facultates enarrauit, quamuis in fine enarrationis addiderit id quod fabulosē potius de eodem fraxino conscripserat Diof. cum dicebat, ferunt tamen ligni ramenta pota letalia esse: nam cum insipida quodammodo sit lignea fraxini substantia, nec quampiam præ se ferat exceedētem qualitatem, aut fungorum modo enecet, propterea quod multo liquore plena non est ut colchicon, imaginari non valeo, cur eius ramenta pota possint esse letalia, seu deleteria venena, eo potissimum cum illa nonnullis sapius exhibens, letalia non esse experientia comprobarim: quibus non modō letalia non fuere, verū neque vllum periculum aut aliud quoduis symptoma potu malum attulere, adhæc si foliorum succus potus velut alexiterium est aduersus serpentum ictus pharmacum, eorundem auctoritate, qui fieri possit ut ligni ramenta pota deleteria esse possint non inuenio. si igitur letalis haudquaquam est fraxinus, ut ex eius sapore liquet, & experientia comprobauimus, sed tales habet vires secundum folia & fructus, postquam manna quæ in eo colligitur probatum est eiusdem arboris humorem seu succum esse, & quilibet succus seu humor, ut Theophr. auctoritate, dictum est cap. 1. lib. 9. de histo. plan. vires fortitur pro cuiusque plātæ ratione, sequitur quod easdem etiam habebit vires, & quod tutē & innoxie ea uti valeamus, præsertim ad iam dictos vsus, ad quos semina & folia fraxini, eorūque succi sunt accommodata. Similiter quoque sentiendū esse puto de ea quæ in ornis colligitur manna, postquam eiusdē sunt cum fraxino generis, parūque inter se dissidere videntur, ut prius ostendimus: nam si roscidum mel, aērēque manna cadens suscipit de virtute plantarum super quas cadit, ut Gal. & Mesue, visum est: quantō magis proprius earundem plantarum humor eadem participabit facultate, quæ ipsis arboribus propria est; Rursus si dulcis est humor hic seu lachryma quā mannā vocant, neque multo crasso lentoque humore plena est, aut parum amari saporis particeps, adeo ut ferē imperceptibilis sit, & à sensu iudicari nequeat, sintque dulcia omnia moderatē calida, gratæque, & nostræ naturæ amica, ut liquet 4. de simp. medic. facul. à Gal. scriptum est: & ut summum dicam, præter iam dictos vsus cunctas etiam præstabit vtilitates, quas Arabes aērēæ mannæ tribuerunt, quatenus dulcedine communicant, quamuis non tantæ humiditatis sit particeps, neque adeo temperatē calida existat. Et si dixerit id saltem vitari non posse quod licet propria dictarum arborū lignosa, & ut ita dicam, medullosa substantia nullum exceedentem præ se ferat saporem, cortex tamē & folia amaritudinem manifestā repræsentēt, qua-

propter & hæc arborea manna quæ in foliis & iuxta corticem earundem arborum colligitur, necessario quadam participabit amaritudine, saltem occultata, & sensu imperceptibili, & ob id prætare eos non poterit vsus quos præstat aërea, quæ dulcis est omnino, asserimus nos dubio procul quòd ob eas quas superius diximus causas, non inconueniet quòd amaritudine careat, quamuis cortex & folia amarum representant saporem: & si alicuius amaritudinis particeps sit manna hæc arborea, adeò tamen exigua est, ut nullo pacto, aut vix percipiatur, multam verò, eamque suauem admodum præ se fert dulcedinem, & proinde quos præstant vsus dulcia omnia, & ipsam quoque prætare posse non inconuenient, licet non adeò exquisitè, & præter id eandem quodammodo utilitates molietur, quas amara prætare solent, non tamen valenter, & exquisitè. Quæ de re citra manifestam seu excedentem caliditatem, abstergeri vim quodammodo habebit, extenuabit, incidetque humoris crassitiem, & meatus quoque perpurget, quemadmodum de cæteris amaris scriptum reliquit Galen. citato lib. 5. de simplic. med. facul. nec minus & menses mouebit, educendoque ex pectore & pulmone quicquid in eis continetur, siue pus, siue pituita crassa, non parum auxiliabitur, & eadem quoque ratione comitiali morbo opem feret, velut de amaris omnibus testatur Galen. citato lib. 4. de simplic. med. fac. Et quo amarior fuerit manna hæc arborea, eo magis & valentius, eos vsus quos amari saporis prætare possunt, præstabit, minus tamen quos dulcis sapor, & quo dulcior, magis dulcis saporis facultates potius molietur, minus autem eos producat effectus, quos in corporibus nostris amara efficere solet, utrosque tamè perpetuo præstabit vsus, cum vtriusque saporis sit particeps, & à neutro manna hæc omnino absolui possit, eos tamen imbecillius quàm exquisita dulcia, exquisitaque amara operabitur. itaque cum ea adeò dulcis sit, ut nullam sensui representet manifestam amaritudinem, nam secundum rei naturam ab ea fortè non absoluitur, quoniam omnino syn-cera, & ab aliarum qualitaturn mistione aliena dulcedinem aut saporem quempiam alium inuenire impossibile est, ut liquet ex Galen. citato lib. 4. de simplic. medica. facul. non ab re eos præstabit vsus, quos aërea manna, cæteraque dulcia præstant, & quo magis vel minus amaritudine participabit, eo plus vel minus easdè in corporibus nostris utilitates molietur, quas amaris omnibus conuenire cum Galen. conclusimus, eos tamen non adeò exactè & absolute postquàm semper in hac arborea manna siue sponte, siue vi emanauerit dulcis sapor prædominatur, dulcedoque in ea primò ac magis à gustu percipitur quàm amaritudo, etenim hæc aut non omnino, aut vix, & in fine percipitur, quapropter non modò citra omne discrimen ac periculum penitusque innoxie hæc quæ in fraxinis & ornis reperitur manna uti poterimus, quomodolibet ea prodierit, sed ad omnes iam dictos vsus proculdubio erit accommodata, ac præ cæteris eligenda erit postquam sapore dulcis, moderatèque calida existens, aut exigua amaritudinis particeps, quæ etiam interdum in ea non percipitur, aut vix tandem eas quas narrauimus utilitates præstabit, & nullius excessus periculi, aut mali auctor mortalibus esse poterit, etiam si manifestè amaritudo aliqua in ea sentiat. At quid opus est tot rationibus ac auctoritatibus uti, ubi res experientia pateat, & longo vsu fuerit comproba-

ta? quippe cum huius rationem querere dimitte-tes sensum, infirmitas quædam intellectus est, quæ admodum aduersus Zenonis opinionem qui omnia quiescere fatebatur, Arist. dicebat 8. phys. Neque enim ipse solus, sed eorundem omnium qui hac nostra tempestate Medici sunt, nemo est qui sapius longoque tempore hac manna quæ ex ornis & fraxinis colligitur vsus non fuerit, perpetuoque cum bono & felici successu citra ullam noxam eorum qui eam sumpserunt, præsertim ad alium molliendam, etenim neque inquietudines & fastidia, neque tormina, colliuationem, aut superpurgationem, aut aliud malum symptoma ex eius assumptione quicquam perpeffus est, tam si ex foliis, aut loco qui est inter foliorum pediculos & ramos, seu ex ipsismet foliorum pediculis, ramis, seu caudice fuerit collecta, quarum primam frondium, secundam verò corporis mannam vulgò appellant. Quotquot item medici hoc nostro in Regno Neap. per multos annos ante nos fuere, semper hac qua modo vitmur manna, citra discrimen aliquod vsi sunt. Puto tamen eos hæcenus non obseruasse cæteros quos eiusdem narrauimus vsus, arbitrati (quemadmodum & ipse etiam multo tempore arbitratus ac hallucinatus fui) hanc mannam eam esse quam Arabes scripsere. Postea verò non multis abhinc annis rationibus instructus, & vsu, ac experientia certior redditus, iam dictos enarratos vsus omnes, per Deum immortalē me obseruasse ingenue fateor, & dubio procul omnes in futurum quos narrauimus vsus, citraque ullam noxam ex eius assumptione, non solum periti & generosi medici, sed vulgares etiam (si ut decet, ea vtantur) perpetuo prouenire videbunt. Sed mox inquires ea omnia quæ de fraxini & ornis lachryma narrata sunt, veritatem habere, ubi sponte emanauerit, & non si incisus iam dictis arboribus colligatur: quæ etiam non multò ante hac fuit inuenta: hæc nanque cum factitia quodammodo sit, & non spontè proueniat, saltem inhibenda erit, omninoque vitanda tãquàm mortalibus noxia, & veluti deleteriũ quoddam pharmacum. At nos asserimus quòd quouis modo fiat & producat earundem arborum lachryma seu concretus humor, quem mannam appellant, & in quacunque dictarum arborum parte siue sponte, siue vi aliqua emanabit, ea innoxie ad diuersos, tamen vsus vtendum erit, neque earum quæpiam prohiberi, aut omnino vitari debet: cum quælibet ipsarum tempestiue adhibita non parum conducatur: etenim ubi spontè proueniat, cum dulcis admodum sit, moderatèque calida, eos præstabit vsus, quos narrauimus dulcia omnia moliri, & propterea valde similes facultates habebit cum Arabum manna, quæ etiam (ut ipsi aiunt) ex plantis super quas cadit, aliquam suscipit facultatem. Idque veritatem habere censemus, tam si in foliis eorundemque pediculis, quàm si in ramis, aut caudice colligatur, eo dūtaxat dissidentes, quod quæ in foliis foliorum facultate, quæ verò in ramis & caudice, totius arboris & corticis quoque facultate quæpiam participabit. Vbi verò incisus prius arboribus ea profuerit, quam mannam vulgò appellant manna forzata, aut eam in primis vulneribus illatis colligunt, & hæc omnium maxime amaritudinis particeps erit, præsertim ea quæ primò ex eisdem effluit: aut prius per aliquos dies ante, quibusdam cæsuris factis, eam quæ ex eisdem profluit, prætermittunt, & deinceps reliquis illatis, quæ inde profluit, colligunt, & hæc medio modo se habebit & sapore & facultate inter eam

eam quæ sponte, & eam quæ ex primis incisuris factis, primò emanat, quælibet tamen earum semper dulcedinem magis præ se fert quàm amaritudinem, cum hic sapor in eis omnibus præualeat, quapropter licet prima quæ incisuris factis colligitur, minorem habeat concoquendi, laxandi, ac rarefaciendi, seu læuigandi & fundèdi vim, propterea quòd non ad eò temperatè sit calida ob amaritudinem cuius magis particeps est, maiorem tamen habebit abstergendi, extenuandi, meatus purgandi, ac incidendi facultatem, & ob id in educendo pure, aut crassa pituita ex thorace, & pulmone, meniscq; mouendo, magis auxiliabitur, magisque aluū soluet, & liberadis obstructionibus opitulabitur, quinimò Theophr. citato c. 1. lib. 9. de histor. plant. de lachrymis quæ incisuris arboribus consistunt, inquit: cæsura capiuntur quæ vtilia, magisque operæpretium sunt: ita ut propterea vtilior hæc manna quodammodo esse videatur, & nō ab re tot præstabit vsus quot narrauimus: ubi congruè ea vtaris: cauenda tamen erit in ardentibus febribus alui fluoribus ac dissenteris aliisque calidioribus morbis, similisque naturæ corporibus, ac etiam æstate, regionibus, anni que constitutionibus, similiter valde calidis existentibus, non tamen adeò vt cætera pharmaca aluum soluentia quæ calidiora sunt, tempore anni calido, calidioribusque corporibus, prohiberi debet, cum nō adeò noceat, atque calidior sit, sed ea vtendum præcipuè ubi hæc adsint, quæ sponte emanat, & in foliis eorūmq; pediculis, ac eo potissimum loco qui inter pediculos & ramos colligitur. Si verò quibusdam vulneribus prius dictis arboribus illatis, quam primò reperiūt ex eisde emanantē mannam non colligunt, sed eam quæ deinceps ab eisdem, aut ex aliis secundo loco factis cæsuris, profluit, hæc licet vi etiam extrahatur, incisus scilicet dictis arboribus, & propterea violenta quodammodo appellari possit, & in hoc cōuenit cum modo dicta, tamen quod ad facultates attinet, medio modo se habebit inter hanc, & eā quæ sponte profluit, cum non adeò exquisita & pura fuerit quemadmodum ea quam sponte dictæ arbores amittunt, neque adeò impura & violenta, vt ea quæ ex primis illatis cæsuris primò emanat: propterea quòd ex primis illis incisuris, qui impuri ac magis amaritudinis particeps est humor, fuit expurgatus. Iure igitur mediocriter se habebit tam ad eas operationes, quas spontaneè competere diximus, quàm ad eas, quas perficere retulimus eam mannam quæ ex primis incisuris illatis primò effluit. Quamobrem procul dubio asserimus quemlibet ex iam dictis succum, seu concretum humorem, lachrymā, seu gummi, aut quomodolibet appellare volueris, admittendum esse, etiam si vi extractus fuerit, mortalibusque ad diuersos vsus esse accommodatū, & citra noxam aliquam magnopere conducere, iure arbitror, nec minus eorum prohibendum esse, iure arbitror, nec minus naturæ, & arti quoque plurimum debere censeo, & innumeræ agendæ sunt gratiæ (mea sententia) vt quæ nobis inter cætera medicamēta valde conducibilia, hunc fraxini & orni humorē, quem mannā appellant, producere, ac propalare conatæ sint: quo vt decet videntes citra noxā aliquā, vt sæpius dictū est, nonnullos præter naturā affectus curare valeamus, etiam si aliqua ferro inquā, aut igne, & non sponte profluerit. Quocirca vt rem hanc paucissimis perstringamus, nam præclarū proverbium illud est (vt inquit Plato in Philebo) quo dicitur quæ pulchra sunt & bis, & ter, repetenda esse, ubi ea haberi non pote-

rit manna quæ ab Arabibus scripta est, loco eius ea vtare quæ sponte in dictis arboribus emanat, nam eosdē ferè præstabit vsus, quos Arabes bonæ, æræ quæ mannæ tribuerūt, & longè plures præfertim ea, quæ in fraxini foliis, eorūque pediculis, aut parte ea qua foliorū pediculi ramis annectuntur, colligunt, & frondium mannam appellant, hæc nanque inter cæteras eligenda erit. Nam præterquā humor ille ex quo generatur syncerior, dilutior, ac tenuior est, quoniam ad extremas peruenit ad summas arboris partes, ac concoctus magis, & ob id dulcior existit, foliorum etiam viribus quodammodo participabit, quorum succus, vt dictum est, serpentū ictibus valde opitulatur. Diosc. & Plin. auctoribus, qua de re inter cæteras ad eos vsus ad quos ærea accommodata est Arabum auctoritate, præcipuè hæc eligenda erit. Nā cum dulcior sit quàm cætera arboreæ manne, candido, aut subcitrino calore velut roscida, cæteris propterea eiusdem generis præstare videtur, & ærea etiā præstator, cum nedum serpentū ictibus, verum etiam & eadē ratione malignis pestilentiis, & febribus auxiliabitur. Deinceps verò ea quæ etiam sponte prodies in ramis aut caudice tam fraxini quàm orni reperitur, succedit. Nā in orni foliis aut eorum pediculis humor hic sponte non emanat aut rarè admodum, & rarè etiam in ramis. Sed in caudice plurimum, vt sæpius dictum est: quamuis quæ in fraxini ramis, seu caudice colligitur exigua sit, vt diximus, collatione facta, ad eam quæ in orni supra dictas partes legitur, dignitate tamē præstat ea quæ in eisdem orni partibus reperitur: propterea quòd nō adeò calidæ temperaturæ sit fraxinus ac ornus, humiditateque magis participet: & ob id dulcior quoque est quæ in fraxini ramis, seu caudice colligitur manna, quàm quæ in orni eisdē partibus reperitur. Sequitur in bonitate tertio loco quæ non ex primis illatis cæsuris colligitur, videlicet quæ ex eisde primò profluit, sed ex aliis vulneribus, post aliquos dies factis. Nam ex primis illis quod primò effluit, impurū, incōfectum, ac excrementosum valde esse cōsensus est: & propterea puriorē, perfectiorē, dulciorēque ex secundis cæsuris humorē profluere: necnon & secundo loco ex illis primis incisionibus factis non ab re putandum est. Postremò neque etiam ea omnino spernenda est arborea manna, atque penitus profliganda, quamuis quarto loco in bonitate succedat quæ primò ex primis illis incisuris profluit. Nam & hæc quoque, licet amaritudinis cuiusdam quodammodo particeps sit, dulcedinem magis præ se fert, qui sapor perpetuò in eā etiā præualeat, quāuis parua quædam, & in fine sentiat amaritudo, cuius etiam gratia quandoque morsus quidā sentitur dum gustatur, est enim mordicatio communis cum acidi, tum amari, tum etiam acris saporis, vt liquet 4. de simp. medic. fac. quapropter & ad eos valde conducere videtur vsus, quos dulcia omnia, mordicæque amara perficere solent, vt sæpius dictū est, & si contingat, vt quidam ferunt ac experti sunt, quandoque humorem hunc lento igne sub dictis arboribus accenso, vi extrahi: & hæc quoque manna admittenda erit, cum non nisi caliditate quadam magis participabit, quæ non adeò erit immōdica vt vrat, & corrumpat, at sensibiliter lædat, sed vt valētius operetur, id quod manifestat huius humoris dulcedo, quæ quomodocunq; his humor ex iam dictis arboribus effluat, semper in eo præualeat, & amaritudo aut nulla inest, aut adeò exigua, vt vix percipi possit, perquam rarissimè autē, idque in fine potius

manifestè sentitur: quò fit vt hoc eodè humore, succo, lachryma, seu gummi, quomodocunque à dictis arboribus emanauerit, siue sponte, siue vi aliqua innoxia, citraque omne periculū vti valeamus. Id quod nō solum validissimis rationibus, ac auctoritatibus probatum esse reor, verum etiam & longa experientia confirmatum. etenim nedum ipse sæpius & longo tempore eadem sponte, & vi etiam collecta vsus fui, sed & ceteri ferè quotquot sunt in hoc nostro Regno medici, indifferenter per plures annos eadē māna quomodolibet collecta ad molliendā aluum, præcipuè citra noxā aliquam, citraque omne discrimen vsi fuere. At si quispiam dixerit quādoque obseruatum esse, ex eius saltem mannæ vsu, quæ primo arboribus iam dictis incisus emanat, superpurgationes, intestinorum abrasiones, seu tormina & alia quoque mala superuenisse: nos facile obiectionem hanc delebimus, asserentes hanc non huius arboreæ mannæ ratione prouenisse, sed quia minùs rectè medicus quispiā ea vsus fuerit intèpestiuè, aut morbis, seu corporibus quibus non competit, exhibēs; vel coniectura malè eius quantitatem assequutus, aut fortè deceptus, putans eam aëream esse, vel quippiam aliud adulteratū, seu factitiū, pro manna hac exhibens: quamobrem frustra nō animaduertimus nos priùs quādo diximus quòd absq; noxa semper hac arborea manna vti poterimus: vbi vt decet ea vtamur. Ceterū quis vnquam eiusdè vsum impedire audeat, si nō nulli alij arborum, fruticum, seu herbarū succi, humores, lachrymæ, resinæ, seu gummi, in medicinā vsu admittuntur, quamuis eorum aliqui violentiores, calidiores, acriorēque fuerint, & quidā venenosa etiā qualitate participant, vt scammonium, elateriū, euphorbiū, & alij similes: sunt & præter hanc humores alij, gummi seu resinæ, quorum in arte medica vsus admittitur, vt aloë, bdelliū, sagapenum, opopanax, Hammoniacum, myrrha, mastiche, thus, & reliquæ resinæ omnes, præsertim terebinthina, nōnullæque alia, quæ breuitatis causa cōsulto prætermittimus. Admittēda itaq; est hac nostra manna, quæ ex fraxino & orno duntaxat quouis modo colligitur, tanquā mortalibus magnopere ad iā dictos vsus conferens: illud tamen animaduersione dignum puto, quò maiori emolumento ac tutiùs ea vti valeas, vt ea quæ recetior & humidior est semper eligas: nam quæ diuturnior aut quouis modo aridior reddita est, omnino vitari debet: necnō vt vnam ab altera secernere coneris, ac rectè distinguere: nam & hoc erat tertium à nobis absolendum. Quod etsi difficile admodū videatur, id tamē quoad fieri poterit manifestare conabimur, asserentes aëream, & quam Arabes scripserunt mannā haud agrè dignosci præsertim optimā, eisdem videlicet notis, quas Mesues animaduertendas, suo proprio cap. de mannā, neque etiam admodum difficile est hanc, ab ea quæ arborea est distinguere, nā cum hæc à frigore cōcreseat semper, atque coaguletur, vt sæpius dictum est, necessariò liquefiet ac soluetur à calore, si Aristotelis principia vera sint. Itaque si Soli seruētissimo, aut igni seu calefacto ex igne ferro aut lateri imposita, soluetur, atque liquefat, quòd aërea sit, certo affirmare poteris, modo adulterata nō fuerit, & eas seruauerit notas, quas Mesues meminit: quæ etiam ratione neque admodum difficile erit hanc quaerimus, & arborea est, à roscida discernere. Etenim à Solis seu ignis calore, etiam immodico, neque soluetur, neque liquefiet, cum ab eodem vt dictum est cōcreseat, & coaguletur. Quod etiam dum hæc scri-

berem experiri volui. Nam cū diligentia Ferdinandi imparati, solertis quidē pharmacopola Neapolitani, ex Venetiis eam Orientalem mannā quā bombacinam appellāt, habuissē, calefacto ex igne ferro, ac lateri, impositis eiusdem, & nostræ mannæ granis quibusdā, tā eius quæ ex foliis, quā ex caudice & ramis colligitur, illa protinus liquefacta & soluta, hæc verò aridiora diutiorque reddi visa sunt: exposui quoque eadem Soli seruētissimo, propriisque oculis inspexi, & si non ita repēte & affatim, paucotamē interiecto temporis spatio, bombacinā mannā sēsīm liquefactam, nostram diutiorē effectam, & albidiorē. Nec secus cōfendū puto de ea quam mastichinā vocāt, & de qualibet alia manna è celo cadente quocūque in loco, ac quouis tempore, vbi adulterata non sit. cum enim & humidior & recetior sit quā bombacina, cōsentaneum est vt citiùs & ad Solem, & ad ignem imposita liquefat. Liquefit autem, ac soluitur à frigido humido, hoc est aqua, manna hæc arborea: nam quæ à sicco calido coagulata sunt, ab aqua soluantur, quæ est frigida & humida, inquit Arist. 4. meteor. liquidem coagulata, quæcunque liquabilia existunt, dissoluntur ab his, quæ causis coagulationis contraria sunt, & propterea, vbi fuerit frigidū aliquid sine humiditate eā quoque soluere non valet, quoniam & à frigido sicco etiam, quandoque concrefcit hæc māna, vt collectores testantur, & nos priùs dilucidauimus, & hoc nō ob aliud nisi quòd non solum aquæ, sed terræ etiā existit eius materia, quæ quidem dictarū arborum succus, seu humor est vt diximus, & quæcunque communia sunt terræ & aquæ, & ab igne coagulantur, & à frigido, ait Aristot. citato loco. Idque non ob aliud, nisi quòd hæc quæ sunt cōmunia terræ & aquæ cū eorū coagulatione ingrossantur etiam, quæ ingrossatio alio modo fieri nequit, quā humido abeunte, sicco autē cōstante: id verò indifferenter, & à calido & à frigido, quamuis diuersa quodāmodo ratione perficitur, vt liquet ex eodem Arist. ibidem. Quo fit vt nō absque ratione arborea hæc māna interim à frigida, interim verò à calida, præsertim non immodica, aqua soluetur atq; liquefat, eo ab vtraque iniectione iterū, quod priùs abierat humido, ac in maiori copia, siccoq; , quod propterea cōstiterat, iterū dissolutum à suo cōtrario. Illa verò quæ aërea est, & à calida aqua, tāquam à cōtrario, nonnunquā autē à frigida, cuius causa quod priùs à sicco frigido concretū erat, iterū liquefit ac soluitur, quemadmodū niui, atque grandini cōtingit, quæ nedū à Solis seu ignis calore liquefiunt ac soluantur, verum etiā à calida & frigida aqua. Soluitur itaque atque liquefit aërea & roscida māna semper à Solis, seu ignis calore atque etiam à calida aqua, quatenus scilicet calida est potissimum: & à frigida quoq; , verum non tanquā frigida, sed tanquā humida. Quæ verò arborea est nūquā à solis seu ignis calore soluitur, sed potius cōcrefcit, & coagulatur magis, ab aqua verò, siue modicè frigida, siue modicè calida fuerit, & soluitur, & liquefit tam si à calore, quā si à frigore fuerit cōcreta, propterea quòd eadem aqua semper humiditatem admistam habet, & quod ad actiuas qualitates attinet, perpetuò contrariam quodāmodo habebit qualitatem ei, quæ causa coagulationis fuit, siue immodicus calor, siue immodicum frigus ingrossationis & coagulationis eius causa fuerit. At cum decretum à nobis prius sit hūc arboreum succum interdū concrefcere & coagulari à frigore, quemadmodum aëream, & roscidam mannā semper: non ab re quispiam quaere-

quereret, cur causa sit, quod hæc saltem arborea manna, à Sole & igne non liquefiat, velut ea quæ à cælo lapsa est, cum vtræque à frigore concreta, ac coagulata fuerit. At nos dicimus non esse vnum & eundem modum concretionis & coagulationis vtriusque, sed valde diuersum, quamuis ab eadem causa efficiente perficiatur, frigore inquam. Præterea materia etiam quæ coagulatur, diuersa est; nam arborea manna materia, succus seu humor est, qui terræ & aquæ existit, æræ verò vapor, aquæ existens solum. Quæ verò communia sunt aquæ & terræ, vbi coagulantur, incrassantur etiam insimul, quæ incrassatio, humido quidem recedente & euaporante fit, siccio autem constante, vt diximus, tam si à calido, quam si à frigido coagulentur, & incrassantur. At quæ folius aquæ sunt, & à solo frigore coagulantur, & talia coagulata cum fuerint, non incrassantur, vt inquit Arist. citato lib. 4. met. propterea quod neque recedit, neque euaporat humidum quod in eis continetur, quemadmodum in his quæ cum coagulatione incrassantur, quod fit vt à Solis, seu ignis calore, qui siccitati etiam commixtus est, quod in eis continetur humidum, & prius à frigore fuerat concretum seu coagulatum, fundatur, & propterea eadem liquefiant, quamuis calor siccitati fuerit copulatus. Verum quæ simul coagulata, & incrassata à frigore sunt, nequeunt à calore siccitati commixto solui, ac liquefieri: nam nedum calido, verum etiam humido indigent; eo iam euaporato quodammodo; & nisi eisdem illud adiciatur, quoniam iam ferè euaporatum erat, & recesserat, liquefieri nequeunt, nec solui. Qua ratione dictum est hæc à calida aqua liquefieri, non tamen ab igne & Sole, quæ videlicet simul aquæ, & terræ existentes, à frigore fuerint coagulata, & incrassata: cuius generis est arborea hæc nostra manna si à frigido sicco concreuerit, propterea eadem à calida aqua quæ humida est, etiam soluitur, atque liquefit, non autem ab ignis, seu Solis calore, qui siccitati permixtus est, quoniam causis coagulationis contrarius omnino non est, veluti aqua modicè calida. Dissidet insuper hæc arborea manna, quomodocumque coagulata fuerit, ab æræ, colore. Nam non ita cædida erit, quemadmodum illa, neque adeo exactè dulcis, modo à plantis super quas decedit rosca manna, aliquam non participauerit amaritudinem. Est item huius mannae arborea substantia siccior, & densior quodammodo, cum non solum aquæ, sed etiam terræ sit particeps, & ob id etiam ponderosior, nisi immodicè fuerit à Solis calore exsiccata. His denique notis æræam ab arborea manna, haud ægrè discernere poteris. At arboream num sponte ea prodèat, vel vi fuerit extracta, non ita facile dignoscet. Poteris tamen & illud quoque coniectura quadam assequi, nam vbi sponte emanauerit, si in foliis, eorumque pediculis, ac locis quibus pediculi ramis annectuntur profuerit, & alba & dulcia, admodumque exigua grana sibi inuicem adherentia citra incisionem, vbi simul coaceruata fuerint videbuntur. Hæc quippe est illa manna quæ semper sponte erumpit, & cæteris etiam sponte emanantibus præstat ad aluum molliendam, bilémque leuiter educendam, ac thoracis asperitatem leniendam, & præter hæc aduersus venenâ confert, quemadmodum fraxini folia, hancque nostris temporis me-

dici pro magnatibus eligunt, præsertim in febribus acutis, & frondium mannam appellant, quamuis, vt diximus, optimam æræam mannam se elegisse putent, hæc tamen ignorantes quod dictarum arborum succus fuerit, vt demonstraui. Si vero in caudice & ramis legatur manna hæc arborea, quæ manna corporis nuncupatur, vbi sponte prodierit, præterquam, quod eius grana maiora sunt, & ita ab ea proximè scripta distat, dulcior quoque erit, albidior, atque humidior ea quæ vi emanat, ob eas quas supra recensuimus causas, minus tamen ea, quæ in foliis, eorumque pediculis legitur, & alba, & dulcis erit. Quæ verò incisis arboribus effluit, si ex primis incisuris prodierit obscurior, ac quodammodo herbaeo, seu subuiridi calore participans apparebit: sapore verò in fine saltem cum eam gustaueris, amaritudinem repræsentabit, & cum ea quandoque mordacitatem quandam, sicciorisque substantia erit, præterea quod terræ magis ferè quam aquæ substantiæ & earundem arborum corticis coloris ac saporis quoque particeps est. Verum vbi non ex primis incisuris, sed cæteris postea illatis, aut ex eis demmet primis, sed non prima colligatur quæ effluit manna, medio modo se habebit inter hanc & eam quæ sponte emanat, substantia, calore, sapore ac humiditate, & siccitate, & ob easdem etiam causas facultate & viribus mediocriter se habebit. Hæc igitur breuiter animaduertendæ sunt notæ pro cuiuslibet (vt aiunt) mannae notitia, tam si æræa quam si arborea fuerit, & si arborea, tam si sponte quam non sponte emanauerit. Illud tamen prætereundum non est, quod si contingat hac in re quæpiam decipi pro eius exacta cognitione, quod ad vires & facultates attinet, parum aut nihil referre, modò deceptio valde magna non fuerit, tam si fuerit æræa quam arborea manna, & si arborea, tam si sponte quam non sponte prodierit. Neque enim valde inter se, quod ad vires attinet, dissidere videntur; nisi pro æræa aut ea quæ sponte nascitur arborea, eam eligas, quæ ex primis arborum incisuris primò effluit. Hæc nanque valentiùs purgat, incidit, & detergit quam vtræque earum, & propterea ad eos affectus qui talibus indigent, licet valde idonea fuerit, minus tamen confert thoracis & pulmonis asperitati ac febribus ipsis, præsertim acutis, vt paulò ante determinauimus. Hæc denique sunt quæ de manna (vt aiunt) quæ nostra tempestatis medici, in hoc Neapolitano Regno ad aluum molliendam sapissimè vtuntur, iure sentio, quicquid alij (eorum pace dixerim) ante nos, & nunc etiam scripserint, aut absque ratione, auctoritate & experientia sentire videantur. Tua nunc interest clariss. Albertine, vt quæ de manna scripsimus tot validissimis rationibus, & auctoritatibus, ac etiam experientia comprobata, summo huius Regni præsidii iustissimo ac prudentissimo Alchazæ Duci, confulas, vt perfici iubeat, postquam nedum hoc Regnum incolentibus, sed & Italiam totam, & vniuersam ferè Europam, quæ de ipsa scripsimus, tot talisque vtilitates præbent: omniumque tu velut præcipuus auctor eris, & Deo opti. max. rem gratissimâ facies. Si quid verò inconcinne & imperfectè à me scriptum fuerit, corrigere ac emendare tuum erit. Idque non mihi sed temporis angustia, qua hæc ad te scribere coactus sum, adscribas quæso. Vale.

Hhh

F I N I S.

DONATI ANTONII

AB ALTOMARI, DE

VINACEORVM FACVL- TATE, AC VSV.

AD EXCELLENTIEM FRANCISCVM ANTONIUM Villanum intinum Philippi Regis Consiliarium Dignissimum,
Iustitiam atque Prudentiam colentem.



VM diebus non longe ab hinc elapsis in tuo iucundissimo agro simul conuenissemus, excellens vir, literis, & dignitate clarissime, cupiebam siquidem simul, & tecum colloqui de re, quam pridie mihi commiseras, nec minus & uxorem tuam, mulierem sanè lectissimam, diu laborantem visere; postquam iam pridem vocatus, ob vehementissimum cruris dolorem, quo eo tempore cruciebar; quod magnopere desiderabam, perficere nequiuim, præter cætera, inter nos sermo incidit de vinaceorum facultate, ac vsu; cum ex eis me à tali dolore vindicatum tibi asseruissem; exoptabamque à me intelligere num illustrissimo, & excellentissimo Don Parafanno Riberæ Alchalæ Duci huius regni Proregi genuum imbecillitate, ac dolore quandoque laboranti, simulatque tibi arum frigiditate, ac debilitate, necnon pedum œdematoso tumore, & interdum dolore affecto, eorum vsus conferret. Quamobrem visum est extemporaria hac, incultaque epistola tibi, cui multum debeo, de vinaceorum facultate, ac vsu, quicquid sentiam, recensere, potissimum cum & tu id, vt ex tuis percepi verbis, scire desiderares, & perquam utilis in nonnullis, vt demonstrabimus, affectibus sit eorum vsus, neque vllus ante nos, qui ad manus nostras peruenit, de his verba fecerit, id verò non in me solo experimento, ac aliorum nuda experientia, sed ratione etiam, ac auctoritatibus confirmare conabimur, illud primò animaduertentes, quòd per vinaceos nihil aliud subintelligere volumus, quàm solidas vuarum reliquias, cum in torculari succus ipsius omnis expressus fuerit, auctore Galeno secundo de alim. fac. cap. 9. quamuis quidam per vinaceos, seu vinaceas acinorum semina intelligere videantur, hos tamen vinaceos Galenus Græcè *σμήχυλα* citato loco appellat, cap. 3. similiter & Dioscorides libr. quinto, reliqui Græci, interdum *πύρα* quandoque *σπίτια* nuncupant, qui itidem vinaceorum dilutum *πύρα* vocitant, aliquando autem & vini fecem ita appellant, *σμήχυλα* verò oliuarum partes solidas, cum ex eis oleum fuerit expressum. Quamobrem rationi consentaneum est, vinaceos iuxta Galeni doctrinam constitutos esse ex membranoso acinorum tegumento, seminibus, seu nucleis, *γίγαρα* Græca dicunt, & eorundem acinorum radice, quæ ex palmitate enascitur, vnde ipsi acini pendunt, quam Galenus *βότρυον* nominat citato loco, quidam vt ipse inquit, *σμήχυλον*; Plin. verò lib. 23. cap. 1. partes eas, in quibus acini fuere, sarmenta vocat; postquam vuarum partes solidas, quæ multo expressio superiunt, cum eodem Galeno vinaceos nuncupamus, sed mox dubitabis, si acinorum substantia, qui *πέριε* Græcè dicuntur, ex Galeni monimentis composita est ex ipsorum velut carne, & humore, qui per carnem dispersus est, ex quo fit vinum; præterea ex feminibus, atque ex membranoso tegumento, quod omnia hæc extrinsecus circumambit, nunquid particula quædam musto etiam in torculari expressio tum ipsius velut carnis acinorum, tum etiam ipsius humoris per eandem dispersi remaneat; & sanè videtur per ea, quæ modo citauimus Galen. verba, quòd utique non. Nam solidas vuarum reliquias, cum in torculari succus ipsius omnis fuerit expressus, vinaceos appellat. Atquinos quòd vtriusque substantiæ quidpià relinquatur in vinaceis, etiam si torculari vuarum admodum expressæ fuerint, audacter affirmamus, quinimo ipsius humoris nedum portiunculæ quædam per carnem dispersæ, verum etiam in membranoso tegumento, nucleis, ac sarmentis effunditur. Argumento est, quòd cōiectis in dolia vinaceis, vbi tantum aquæ superinfuderis, quoad omnia permadeant, & pro vinaceorum copia aqua effundatur, nò multo post in dolij fundo foramen aperiens dilutum effluit, idque pro vino bibant, sapitque vinum saporem, calorem, odoremque ipsius prius expressi vini præ se ferens, quæ ratione & substantiam quoque participare consentaneum est, hoc dilutum Græci quandoque *πύρα*, Attici verò *δευερίαν* vocitant, à nostratibus inquit Gal. *σμήχυλιν*, à Latinis lora appellatur, poteritque eadem aquosior, interdum etiam meracior fieri, vt ipse fatetur, pro maiori, vel minori quantitate aquæ superinfusa, quàmquam huiusmodi aquæ quantitatem Plinius metitur libr. 14. cap. 10. tria que narrat loræ genera, & Columella libr. 12. ca. 40. de re rustica, quomodo optima lora fiat, docuit, Marcus etiam Varro libr. 1. cap. 54. quomodo lora pareretur insinuat, quòd pro vino operariis dari hyeme dicebat. & M. Cato. ca. 25. de recentibus vinaceis seruatis verba faciens dicebat; itidem, si voles lauto paululum, & lora erit familia, quod bibat. Quòd verò in loris ipsis portio quædā acinorū, & eius substantiæ, quæ velut caro existit, & humoris, qui per eam dispersus est, ex quo fit vinū, permixta sit, idē Plin. eo. li. 14. c. 10. his verbis cōfirmavit. Nò possunt iure dici

vina,

Cap. 10.

Citalia

Citato loco
 vina, quæ Græci *δευρεπιά* appellant, Cato, & nos loram, maceratis aqua vinaceis: sed tamen inter vina operaria nominantur, quinimò rursus aliam aquam, parciorem tamen priori, vinaceis quidam affundentes, vt inquit idem Gal. aliud parant dilutum, ita vt id quoque in potu sit tolerabile. quod etiam loram nos appellamus: quàmuis quidam Attici propriè non, vt priùs, dilutum hoc *δευρεπιά* nominari velint, nec minùs & ipsum vini quandam commistionem habens, cum & vini antea etiam expressi quodam modo saporem, colorem, ac odorè habeat, id verò fieri haudquaquam posset, nisi & substantia quæpiam ipsius humoris, ex quo fit vinum, ipsis permixta esset. Accedit ad hæc, quòd ni succus, seu humor quispian, simulque carnosæ substantiæ aliquid in vinaceis relinqueretur, sed solidæ duntaxat partes supersessent, non haberent vinacei ex quo, veluti ex materia, parua quædam animalia volatilia quidem, & admodum culicibus similia generarent, exigua quandam putredinem perpessi, & deinceps eadem magis aucta vermiculos quosdam paruos instaret eorum, qui in cerasis, aliisque fructibus humidioribus existentibus, ac putrescentibus, postquam humiditas in eis non adesset, ex qua talia produci animalia possent; aut saltem eadè satis non esset ad eorum generationem. Attendendum insuper quòd pro maiori, vel minori etiam vuarum prelo expressione, maior item, aut minor copia tam ipsius veluti carnosæ substantiæ, quàm humoris per eam dispersi, ex quo fit mustum, in vinaceis relinquitur; nunquam tamen vniuersæ hæc geminæ substantiæ prorsus à vinaceis, eisque præsertim recentibus, secerantur, ob eas, quas nuper retulimus, causas. Ad Galeni auctoritatem, cum dixit, vinaceos appellare, solidas vuarum reliquias, cum in torculari succus ipsius omnis expressus fuerit, hoc modo satisfacias; eum intelligere voluisse omnem succum, qui exprimi potest per torcular; qui autem minimè etiam valde prelo pressis vis secerni potest, cum eisdem vinaceis relinqui non negans, adeò vt secundum sensum, non autem secundum rei naturam videatur omnis succus fuisse expressus. Nam vt dictum est, non modò per eam substantiam, quæ velut caro existit, portiuncula eius dispersa, sed in membranoso tegumento seminibus, ac sarmentis impacta in ipsa expressione permanet, de ea autem substantia, quæ ceu carnosæ existit, hæsitari non debet quin aliqua eius portio remaneat simul cum acinorum tegumento permixta. Quòd si aliter Galen. verba interpretentur, nequaquam vindicari posset, quin sibi ipsi pugnaret; postquam citato loco asserit ex iam dictis vinaceis, si aqua pro eorum copia infundatur, vt quidam experientia docti infundunt, dilutum fieri suaue, & interim dilutum hoc aquosius, quandoque verò meratius, seu vinosius, quod quidem proculdubio absque aliqua humoris, ex quo fit mustum, permissione, haudquaquam fieri posset: & nos etiam paulò ante probauimus, intelligere itaque per vinaceos oportet cum Galeno solidas vuarum reliquias, quæ prelo subiectæ, mustoque expresso supersunt. Sunt autem hæc maximè membranofum acini tegumentum, ipsiusque nuclei, ac radices acinorum, quæ ex palmite nascuntur, seu sarmenta, necnon & exigua quædà portio eius substantiæ quæ ceu caro existit, atque humoris per eam dispersi, & reliquis etiam solidis substantiis per expressionem imbibiti,

harum autem duarum substantiarum portio maior, aut minor in vinaceis relinquitur, prout magis etià, vel minus per torcular vut fuerint expressæ. Et quoniam valde exigua, vt dictum est, harum duarum substantiarum quantitas in vinaceis continebatur, aliarum trium solidarum relatione, propterea Galenus de eis haudquaquam meminit; sed solidas vuarum reliquias vinaceos appellauit. At quoniam magnum reperitur vinaceorum discrimen, pro varia, ac diuersa vuarum specie, ex quibus vinacei sunt, ob id rursus attendas oportet quot, quæue sint hæc vuarum differentiæ, quò diuersas etiam vinaceorum naturas inuestigemus, verum non de omnibus vitium generibus verba facere oportet, ne minis longa sumatur oratio; sed earum duntaxat differentias recensimus, quæ ex diuerso vuarum sapore pullulant, & etenim ad nostrum institutum non parum conducere videntur: tum vel maximè quòd Plinius libro 14. cap. 11. scripta reliquerit de vitium generibus hæc verba, omnia genera vitium numero comprehendendi posse vnus existimauit Demochritus, cuncta sibi Græciæ cognita professus, cæteri innumera, ac infinita esse prodiderunt, sunt tamen & quod ad saporem attinet, vuarum insuper differentiæ non pauca; id quod manifestauit Galenus eodem libro secundo de alimentorum facultatibus, cum inquit: Non parua autem est inter vvas differentia, quòd aliæ sint dulces, aliæ acidæ, aliæ austerae, aliæ denique quæ nullam habent vehementem qualitatem, vocant autem ipsas vinofas, qui licet in his verbis de acerbis vis non meminerit, paulò tamen post comparans inter se austeras, & acidas, de eis verba facit, inquit: austerarum autem quædam si suspensæ diutius fuerint, dulciores redduntur, acerbæ verò, vt acidæ etiam si suspensæ fuerint diutius, mutationem in dulcius nunquam assequi poterunt, quocirca ipsarum esus perpetuò est cauendus, quibus ex verbis liquet quinque in vniuersum esse simplices vuarum differentias, quæ ab earundem saporibus capiuntur: dico simplices quoad fieri liceat; neque enim reperias omnino syncerum saporem aliquem eodem Galeno auctore quarto de simplicium medicamentorum facultatibus, cap. quinto. compositæ autem multò plures esse possunt ex varia dictorum saporum commistione, quas omnes vbi simplices quispiam rectè perceperit, facile assequi poterit. Cæterum quæ dulces sunt vuarum, succum habent calidiorem, & ob id sitibunda: acerbæ verò austerae, & acidæ frigidiore, vinofæ autem inter calidum, & frigidum medium locum obtinent: cuius etiam naturæ putandum esse censeo, & dictarum vuarum vinaceos. Nam veluti dulcium acinorum succus calidior est reliquis vuarum succis, ita & reliquæ eorum substantiæ proportionabiliter se habebunt relatione ad eas, quæ aliorum saporum sunt, præsertim ob eiusdem succi substantiam, cuius participes esse videntur, & quemadmodum frigidiorem habent succum vuarum acerbæ, austerae, & acidæ, ita quoque & reliquas earum substantias esse dixeris, & vinofarum velut succus, ita & reliquæ partes medium locum obtinebunt, inter acerbæ autem, austerae, & acidas, ceu succus acerbæ, ita & reliquæ substantiæ frigidiore erunt, quàm austerae, & acidarum; & austerarum succus rursus, cæteræque substantiæ frigidiore quàm acidarum. Hunc etenim

Hhh 2

ordinem seruant in frigiditate sapores ij, vt liquet 4. de simp. med. facultat. cap. 6. verum non ab re dubitabis, propter quid austerarum vuarum quædam, vbi diutius suspensæ fuerint, dulciores redduntur, acerbæ verò, & acidæ, etiam si diutius fuerint suspensæ mutationem in dulcius nunquam assequi poterunt? An dicastu quod acerbæ multam habeant terrenam, siccam, crassamque substantiam quæ à calido etiam ascitio minime potest adeo euinci, vt dulciores fiant: austeræ verò tenuiorem, humidiorémque: ac minus etiam frigida sunt, & quamuis acidæ minus frigida sint, quàm austeræ, id tamen aquosum, & quod velut semicoctum est, in eis excrementum, multum est; adeo vt neque ab earum calore etiam ascitio confici possit, & in dulcius mutationem assequi, quamuis ipsæ minus frigida sint, quàm austeræ. Ad hæc non omnes austeræ, sed quædam dulciores redduntur, inquit Galenus, vt pote illæ, quæ non exquisitè tales sunt, sed quidpiam dulcedinis, licet non manifestè, in seipsis continent. Acerbæ verò, & acidæ sincere nunquam. Facta insuper collatione inter easdem quatuor acinorum partes eiusdem vuarum inter se, fatemur membranosi tegumenti, ac seminis substantiam siccam & frigidam esse, frigidiorém tamen, ac sicciorém seminis, quàm membranosi tegumenti; calidam autem esse fatemur eam, quæ ceu caro existit, ac humoris substantiam, qui per eam dispersus est, necnon & humidam, minus tamen calidam, sed humidam magis esse humoris substantiam, quàm carnis, argumento est, quod minus nutriat, & promptius subleat, calidior item quodammodo, & mediocris humiditatis est ea substantia, quæ velut caro existit, eo quod copiosius quàm succus nutriat, nec adeo citò deiciatur, & propterea vuarum quibus exiguus est succus, magis nutriunt, quibus verò vberior, minus quidem nutriunt, sed promptius subsident. Quamobrem, vt inquit Galenus citato loco, copiosius ex carnea acinorum substantia, quàm humidum, alimentum corpori accedit. Cùm itaque in vinaceis minima sit acinorum tum caro, tum succus, quorum substantia, vt dictum est, calida, & humida existit, signum quod eis duntaxat deuoratis alius magis laxatur, vt idem Galenus inquit citato loco, semina autem ferè omnia reliqua sint, quorum substantia eodem auctore sicca est, & quodammodo adstringens, quo fit vt si transglutiantur, nihil quod sensu deprehendi queat, à sese mutata, omnia intestina peruadant, insuper & tegumenta omnia remanent, quæ cùm vsum acinis præstent, quem cutis animalibus, eandemque ferè siccam substantiam habeant, quemadmodum & semina, vt diximus, qua ratione & ita quoque exigua, cùm deuorata fuerint, in ventriculo mutationem suscipiunt, nec minus & farmenta, in quibus acini fuere, omnia post multam expressionem supersunt, ipsa quoque frigida, & sicca, ac adstringendi vim habentia, quemadmodum & acinorum nuclei ex Plinij auctoritate citato libr. 23. cap. 1. cùm dixit; Sarcmenta earum, in quibus acini fuere, loquens de visis, adstringendi vim habent, efficaciora ex ollis, nuclei acinorum eandem vim obtinent: reliquum propterea est, vt vniuersa vinaceorum substantia frigida sit, & sicca, atque adstringendi vim habeat, qua ratione mammarum inflammationi tritici cum sale vetiles sunt: decoctumque eorum veteres dysente-

ricos, & celiacos iuuat, & potione, & fotu, vt idem Plinius ibidem testatur, haud valde dissentiens à Dioscoride, qui libr. 5. cap. 3. de eis verba faciens ita inquit; Reconditi vinacei inflammationis mammis, ac duris, nimioque lacte turgentibus, ita enim interpretanda sunt eius verba, cùm dixit *καὶ ἀπὸ τῶν μαστῶν ἰλινιῶν* illiniuntur, eorum decoctum dysentericos, celiacos, & feminas fluxione vulvæ laborantes iuuat infusum; ad deflexiones, ac foetus assumitur, & demum de acinorum nucleis ait; Nuclei acinorum adstringendi vim obtinent: stomacho viles sunt: inspargitur farina tostorum polentæ modo dysentericis, celiacis, & solutis stomacho. Talis itaque est vniuersa vinaceorum propria substantia, seu natura, hosque vsus præstare valent, si eorum potentiam perpendas, magis tamen, & minus pro diuersis vuarum differentis, ex quibus fiunt, quas etiam prius narrauimus, sed cùm non solum vires eorum, quas in potentia possident, verum etiam & eas, quæ ab eorundem qualitate actu existente proficiuntur, animaduertenda sunt. Restat propterea discedendum, quidnam præstare corpori vobis nostris valeant per hæc, quam actu obtinent, qualiterque; postquam in potentia adstringendi, ac refrigerandi facultatem habent; necnon & prius hoc vnde tale susceperint actu ascitium temperamentum, siquidem tangendo eos sentimus, quod licet potestate frigidi sint, vt retulimus, actu tamen calidos esse, potissimum vbi recentius fuerint prelo pressi, simulque cum multo prius efferbuerint, quæ vtique huius caliditatis causa existat, inuestigare primum oportet; vt exinde pateat, quot, quæque vsus ex his hac ratione nostris corporibus adhibitis prouenire possint, vt verò huius quæsitæ veritas pateat, altius quodammodo inchoanda erit oratio nostra, sumpto principio ab Aristotele, qui libr. quinto de gen. animalium cap. sexto concoctionem à calore fieri ait, & quarto meteororum, concoctionem perfectionem quandam esse retulit, quæ à calore proprio, & naturali efficitur. Quamobrem concludit eodem quarto meteororum, fructuum maturationem à naturali calido fieri, quam *παραγωγή* appellat, calor enim, vt ait Theophrastus libro secundo de causis plantarum, vbi que vim obtinet concoquendi, nam, si quem vsum frigiditas præstat, per euentum fieri necesse est, vt ipse refert, vel ex accidit, quemadmodum Aristoteles eodem quarto meteororum sentire videtur, hanc fructuum concoctionem idem Theophrastus, libr. 1. de causis plantarum, cap. 18. duplicem esse asseueravit, aliam videlicet pulparum; aliam verò seminum, quarum prima ad hominum vsum præualet, propter cibum: cùm eadem in pulpa fructus fieri soleat, qua confecta, succum, saporemque capessere nostræ naturæ congruum necesse est. Quamobrem idem etiam auctor libr. sexto cap. 12. eiusdem asseuerat, quod vuarum etiam sapor in ipsa etiam carne consistit, de qua concoctione tanquam nostro instituto necessaria disserere intendimus. Nam reliqua, quæ seminum est, cùm ad generationem, vt ipse inquit, perpetuatemque arborum pertineat, cuius causa fructus, ac semina natura produxit, ad rem nostram haudquaquam conducere videtur, quemadmodum etiam præsentis negotij neque est indagare, vtra earum perfectior sit; nunc verò satis sit sciuisse concoctionem, seu fructuum maturationem, quam

Cap. citato

Tex 19

Citato lib

quam nunc intendimus, cum perfectio quædam eorum sit, ab infito eorum calore perfici, eamque ad hominum vsum, propter cibum, vt diximus, præualere. Et quoniam quicquid nutrit, ex genere dulcium est, imò nihil præter dulce nutrire potest, vt liquet per Galenum 4. de simplicium medicamentorum facultatibus cap. 15. id verò omne concoctione efficitur. Nam concoctum, vt inquit Aristoteles 3. de generat. animalium cap. 1. in quouis genere dulcius est coctione: namque dulce efficitur eodem auctore citato libro quinto, de generatione animalium, propterea non ab re inquirendum est à quo calore dulce omne efficiatur, vt deinceps pateat inter fructus, visus, ac musto à quo calore dulcedo proveniat. hoc etenim inuento, tum musti, tum etiam & vinaceorum caliditatis causa, quam actu possident, facile patebit. Cum verò familiare, amicum, iucundumque fuerit, ac modicè calidum id, quod continè ex nostra substantia euacuatur, ac dissipatur, siquæ nutritio euacuati repletio, quòd familiare quoque esse necesse sit id, quòd nutrit, nemini dubium est, ac etiam modicè calidum, qua ratione à moderato calore dulce omne provenire confiteri necessario oportet, idque bifariam fieri posse in quocunque corpore decretum reliquit Galenus eodem 4. de simplicium medicamentorum facultatibus cap. 10. partim enim sunt, vt ipse inquit, proprio, & infito calore dulcia, partim verò ascititio. proprio quidem calore, vt mel, ascititio verò, vt sunt omnia, quæ pro cibo igne præparantur; ac proinde dum calida sunt, suaviora his, quibus nutritione est opus, apparent. quædam autem non suo modo proprio, & infito calore dulcia fiunt, sed acquisititio quoque quemadmodum in fructibus apparet, in his enim vt ait Galenus citato lib. 4. de simplic. medicamen. facultat. cap. 11. Aristotelis, & Theophrasti auctoritate multum ceu ardoris, Græci *ὑπερπυρρα* vocant, etiam ex solari calore reliquum est, à quo illud aqueum, ac etiamnum semicoctum ad concoctionem ducitur, conficiturque, ac transmutanti simile redditur. & propterea tam acinis, quam musto multa inest talis caliditas, ita vt non solum mustum ipsum feruere deprehendas, sed ex quibuscunque pomis, si succum exprimas, eum protinus non secus, ac mustum feruere videbis. tanto tamen feruoris discrimine, quanta erit vnus fructus ab alio in calore diuersitas. à solari denique calore provenit visus dulcedo, & fructibus omnibus maturatio, eodem Galeno teste citato loco. nihil enim fortasse prohibet, quominus externo quoque calore fructus coquantur, vt Theophrastus inquit libro 2. cap. 10. inest itaque ipsi musto omni dulcedo quamdiu feruet, ex eo qui circa semicoctum, aquosumque excrementum inest solis feruore proveniens, & proinde quodlibet mustum, donec ferueat, actu calidum est, ac dulce sentitur. sed vbi quod iam aquosum, ac semicoctum erat, transmutatum fuerit, atque confectum, & is, qui feruorem concitabat, calor, evanuerit, tunc propriè vinorum naturæ, ac quæ propriæ sunt succorum proprietates, sincerae conspiciuntur. eo etenim tempore, quæ propriè sit vinorum natura, agnoscescimus, vt liquet apud eundem Galenum citato loco, ex quibus omnibus liquet, quòd quamdiu feruor, dulcedoque iam dicta, quæ ex ascititio calore in musto provenit, perduraverit, tam diu etiam id actu calidum esse, idque eidem provenire ab illo acquisititio calore, quem ex Sole suscepit, eam verò

qui feruorem concitabat calor evanuerit, neque amplius omne mustum dulce permanebit, sed ad propriam suam quodlibet redibit naturam, quod si postquam efferbuerint, in quibusdam dulcedo quædam remaneat, eadem sincera erit, sua vis, ac ex propria ipsius succi natura, eiusque proprio, ac infito calido proficiscens, non qualis antea erat mista, scilicet proprio, ac infito calore & ascititio. ex solari calore suscepta. nullum tamen eorum hoc tempore actu calidum sentietur. Quod etiam rationabiliter de eorum vinaceis asserendum est. etenim acquisititiam, quam habent actu caliditatem à solari calore susceperunt medio musto, seu acinorum humore ac carnea eorum substantia præcipuè, eaque tandiu in eis reperitur, quamdiu ascititius ille calor evanescat, qui licet ascititius sit, moderatus tamen est, vt diximus, & concoctionem, perfectionemque operatur velut proprius, & insitus. conficit enim id, quòd ad eum, & velut semicoctum est in musto excrementum, quo cum participare decretum sit vinaceos ipsos, similiter & talem calorem participabunt, qui licet externus sit, & ascititius, moderatus tamen est, seu insitus, vt dictum est, ac proprius ipsorum acinorum, postquam idem quoque operatur, dulcedinem inquam, & concoctionem, si gnun quòd superinfusa eis aqua, vbi exiguo tempore cum ea macerentur, dulcedinem, ac actu caliditatem retinet, vt in loris in dies obseruamus. deinceps autem temporis progressu vtrunque evanescit. poterit tamen dulcedinem quandam diu retinere, vbi ex dulcibus naturæ visus vinacei fuerint expressi, & modica aqua superinfusa. hac itaque ratione vinacei cum primum cum musto efferbuerint, ac prelo ex acinis fuerint pressi, actu calidi sunt. Sed dices, hoc Aristoteli pugnare, quòd videlicet mustum, acini, cæterique fructus ab ascititio calore dulcedinem, ac concoctionem nanciscantur. cum ipse velit 4. meteororum, vt dictum est, ab infito calore hoc fieri, ab alieno autem non perfectionem, & concoctionem, sed putredinem ac corruptionem proficisci. huic responsum dabimus, quòd Aristoteles à naturali calido maturationem fieri fructuum asseruit, intelligens præcipuè, & propriè, non negans quòd ab ascititio quoque quodam calore, vt Solis, possit etiam simul cum eodem infito calido concoqui, & perfici, quemadmodum Galenus innuere videtur citato libro 4. de simplicium medicamentorum facultatibus. cap. 10. vel dicas eam fructuum concoctionem à naturali calido perfici voluisse Aristotelem, quæ præcipuè feminum est ad generationem, perpetuitatemque arborum pertinsens, vt prius cum Theophrasto conclusimus. id verò eius verba ostendunt. dicebat etenim eodem 4. meteororum, fructuum tunc perfectam esse maturationem, quando semen, quod in ipsis est, potest efficere tale alterum, quale ipsum est. quam confiteri à naturali calido perfici, absolum non erit. Atqui nos, vt iam dudum diximus, de hac verba nō facimus. Rursus, cum dicebat ab aliena caliditate putrefactionem, ac corruptionem generari, intelligebat de ea extrinseca caliditate, quæ valde immoderata, validiorque existit, nec minùs & humida, asserens eam esse, quæ ambientis. Nos verò non de hoc immoderato valde, humidoque calore externo, & ascititio subintelligimus. scimus etenim rem quamlibet ab hoc corrumpi, quemadmodum à proprio & infito calore in propria fer-

uatur natura, sed solarem calorem simul cum Galeno falsi sumus, eumque moderatum in acinorum, reliquorumque fructuum concoctione opitulari, à quo quidem, cum moderatus sit, & vis ac fructibus omnibus maturatio prouenit, & dulcedo, hic namque generationem, ac retionem, concoctionem, & ut summatim dicam, perfectionem omnem cunctis rebus asferre solet, haudquaquam ignorantes, quemadmodum hi, qui circa naturam exercitati non sunt, quod caliditas mediocris omnibus sit utilis: immoderata verò non minus frigiditate noxia, eodem Galeno auctore citato libro quarto de simplicium medicamentorum facultatibus. cap. 14. Sed iterum quaeres: propter quid uarum acini, aliique fructus, priusquam in minutas partes redacti sint, aut ab eis succum exprimas, hanc eorum actu caliditatem tactui non praeseferunt? huic responsus sit, quod cum crassa sit eorum membrana, qua veluti tegumentum eos circumambit, eam tactu sentire caliditatem non ualemus. haec etenim una ex causis est, ut inquit idem Galenus 3. de simplic. medicam. facultat. cap. 21. quod pleraque, quae actu sunt calida nos fugiunt, propter crassam uidelicet eorum essentiam. addit & aliam causam, propter quam hoc contingat, quod scilicet ipsi plurimum habeamus caloris, propter unam itaque vel alteram dictarum causarum, aut ob ambas, contingit acinis, aut fructibus haudquaquam in minutas partes redactis, aut expressis, quem in se continent actu calorem, nos fugere. An propterea talem nos calorem non percipere inquires, quoniam extrinseca eorum superficies ab ambiente extrinsecus aere sit refrigerata? quemadmodum de calce refert Galenus citato libro 3. de simplic. medicam. facultat. cap. eod. Nam si bolum ex ea unum ac ceperis, nullum ob iam dictam causam, calorem percipies, quippe qui refrigeratas tantum eius partes contingas. idque antequam in minutas partes redactum sit. si uero accumulatae calci manum in profundo inferas, confestim calidam senties, quemadmodum etiam accumulato stercore columbino, quippe cum refrigerata ab ambiente extrinsecus aere non sint, nec minus & hoc simile in vis contingit. Nam si eisdem simul acutatis ad internas partes manum inferas, confestim earum caliditatem percipies. haec eadem insuper ratio in vinaceis ipsis seruatur, quippe cum eorum externa superficies ab ambiente aere sit refrigerata calorem non praeseferunt. si uero altius manus imponas, protinus eorum caliditatem senties. Vel dicas, exiguum esse humorem, qui in singulis uinarum acinis, ac fructibus continetur, & propterea calorem quoque exiguum esse. Quo fit ut commistis etiam cum seminibus, ac tegumento, vix, aut nullo modo sentiatur. Cum uero fuerit expressus, separatus, multumque ob eam rem effectus talis succus, protinus eius calor percipitur. Permanet igitur ille, seu ardor, ex solari calore acquisitus, ac moderatus calor in vinaceis ipsis, quemadmodum & in ipsis vis priusquam fuissent expressae, continebatur, eumque excipiunt ex humore praecipue, qui per acinorum substantiam, quae veluti caro existit, dispersus est. tandiuque eum in eisdem permanere fatemur, donec alter validior, ac immoderatus extrinsecus calor superuenerit, eundem moderatum calorem, ac etiam insitum quem habent in propria humiditate existentem, vincens, ac corrumpens, molestus siquidem, immitis, insuauis, ac tactui mordax, quo tempore cum putrescere coeperint vinacei ipsi, ac eo-

rum humiditas corrumpi, necnon & acidi fieri, amplius eis utendum esse non censo. nam cum aliena omnino validior, mordax, ac immoderata fuerit haec eorum caliditas, ut ad sensum cuilibet tangenti patere poterit, non minus ut diximus, frigiditate noxia est, quemadmodum quoad eorum caliditas moderata, ac mediocris fuerit, omnibus esse utilem cum eodem Galeno audacter affirmo. Quamobrem vinaceos recentes, qui mox, cum multo effuerint, ac prelo pressi sint, valde utiles esse asserimus, priusquam tale aliquid perpetantur, sed moderatam, seu medicam in se ipsis caliditatem obtineant: & ij sunt, quibus procurandis nonnullis praeter naturam affectibus utendum esse consulo. quod quidem ratione, & experientia facile confirmabimus. Nam cum mediocris, seu moderata sit, ut determinauimus, eorum caliditas, non tantum calore excedunt, ut hos laedat, ac molestus sit, aut immodice calorem nostrum exuperet, calefaciunt tamen moderatè, ac medicriter vinacei ipsi, non tamen adeo ut soluant, secent, distrahantve continuum, ac propterea mordacitatem, dolorumque inferant: sed eorum caliditate fundunt, laeuigant, ac molliunt. fundunt siquidem quod in corporibus nostris constiterat, atque concretum fuerat. quo maxime affectu voluptas animantibus constat. haec enim itaque nos calefaciunt, vinacei suo mediocri, seu moderato calore, ut concretas frigore in nobis particulas fundant, quemadmodum quaelibet similis caliditas efficere solet Galeno auctore quarto de simplicium medicamentorum facultatibus, cuius quidem proprium est fundere, & liquare. qua ratione scirrhis, seu induratis corporis tumoribus magnopere conferunt. tales enim affectus, ut inquit Galenus secundo de arte curatiua ad Glauconem: simile quid pati debent iis, quae sub Sole funduntur. Quapropter curari debent eo medicamento, quod calorem habeat tepidum: humiditatem uero nec omnino multam, nec omnino minimam. vocantur autem huiusmodi medicamenta molliciantia, seu mollientia. argentes quoque partes propterea moderatè calefaciunt, ita ut ad refrigeratas corporis partes magnopere conducant. Quamobrem non sine ratione putandum est, podagra, & coxendicum dolore laborantibus, praesertim ex frigidis fuccis, magnopere conducere, etiam si à principio fuerint adhibiti, praecedente tamen totius corporis vacuatione: nam eorum moderato calore, fundendi, molliendi, & laeuigandi vim habent, ut dictum est, necnon & dolorem leniendi, quemadmodum & cetera huiusmodi medicamenta: Insuper cum adstringendi, ut diximus, facultatem obtineant, robur eisdem partibus addunt: ita ut per eos, qui morbum parit humor frigidus, calefiat, fundatur, ac emolliatur cum earundem partium firmitate. Quod si diutius etiam eis utare, sensim eundem humorem digerere, ac dissoluere valent. nam quatenus etiam vim habent molliendi, adhuc parum dissolunt, quemadmodum & cetera huius generis medicamenta, iuxta Galeni sententiam citato libro secundo de arte curatiua ad Glauconem, & 5. de simplicium medicamentorum facultatibus cap. 8. & 9. cedematofos insuper tumores exsiccant, ac discutunt. ubi eis praesertim non exiguo tempore, sed diutius quodammodo utare. nec minus & nervosorum partium imbecillitates, ex humiditate, frigiditate, aut ex frigidis,

Eol. 14.

Cap. 2. 61

Cap. 14. rhu.

Cap. eodem

frigidis, & humidis humoribus ortas tunc curant, ob eam, quam habent caliditatem, ac siccandi, & adstringendi facultatem. Aqua etiam inter cutem laborantibus propterea non parum conducere videntur, præsertim λευχορροια, verum admodum expressi, & dulcium vuarum vinacei esse debent. At non propterea quod eorum caliditate vinacei fundant, molliant, lauigent, ac dissoluant, partibus etiam immodico calore affectis, ac propterea imbecillibus existentibus non opitulantur. nam cum modicus sit eorum calor, si quis eis moderatè vtatur, æstuant etiam frigefaciant, quemadmodum & balnea. hic etenim est moderati caloris effectus, vt rigentes exalfaciat, æstuant verò frigefaciat, veluti etiam & rosaceum, eodem Gale. auctore tertio de simplicium medicamentorum facultatibus. cap. 11. id verò semper cum partium robore, postquam ab eis vis adstringendi, quam habent, separari non potest. admodum tamen pressi vinacei in his affectibus esse non debent, & ex vinosis, aut quibusdam aufteris potius, quam ex dulcibus vis pressi, neque diutius est eis vtendum. insuper quamvis partes frigidis humoribus refertas, ac propterea etiam in tumore adactas cum earum robore curare valeant vinacei, non ob id extenuatis quoque partibus conducere non videntur, ob quamcunque causam fuerint extenuata, siue ex immodico calore, siue ex frigore, aut propterea obstructæ sint viæ, per quas sanguis, & spiritus ad eas peruenit. & ita ob nutrimenti defectum id perpetiantur possunt etenim, vbi, vt decet, eis quispiam vtatur, vtranque intemperiem corrigere eorum moderato, ac mediocri, vt diximus, calore, necnon & obstructionibus liberare. Quamobrem non immeritò à Galeno decretum est citato libro quarto de simplicium medicamentorum facultatibus cap. 14. caliditatem mediocrem omnibus esse vtilem. qua etiam ratione & nos concludamus cum eo, vinaceos omnibus esse viles, & præsertim iam dictis, propter eorum, quam habent, mediocrem, seu moderatam actu caliditatem, ac potestatem adstringendi, quam semper obtinent, si quis eis ritè vtatur. Porro rectè eis vtare, vbi præter naturam affectum, quem curare studeas, eiusque causam, simulque & affectuum partium, ac totius corporis temperamentum exactè noueris, nam vbi is frigidus fuerit, eiusque causa frigida, vinaceos adhibebis dulcium vuarum, & præsertim earum, quas Græci vulgus appellat, diutiusque, ac sæpius eis vtantur. Quod si humidiores fuerint tum affectus, tum causæ, eligendi sunt ex eis vinacei admodum prelo pressi, quemadmodum si hic humor concreuerit, frigidus, aut sicior fuerit, ita vt ex eo duriore tumor fuerint geniti, aut etiam extenuata partes fuerint ob nutrimenti penuriam, seu ob quamcunque aliam causam, eosdem vinaceos non admodum expressos applicabis. Sunt verò inter omnes vinaceos hi calidiores, cum nedum actu, sed potestate etiam quandam obtineant caliditatem. & quod dulciores viæ fuerint, eò & vinacei quodammodo calidiores erunt. Propterea eis præcipue vtendum Si verò hos vinaceos habere nequeas, aut non adeò frigidi affectus fuerint, eos, qui ex vinosis restant vis eligas, cum suapte natura quodammodo medium obtineant locum inter calidum, & frigidum, quemadmodum & eorum viæ, vt dictum est, eadem seruata ratione circa earum expressionem. Ab acidarum autem, acerbiorumque vuarum

vinaceis, quemadmodum & ab earundem vuarum usu, omnino abstinendum esse consulo. cum maiorem habeant vim refrigerandi, & exsiccandi, ob eorum propriam naturam, ac substantiam, quam calfaciendi ob ascititium, quem obtinent, actu calorem: aufterarum tamen vuarum vinaceis, vbi eadem tales non exactè fuerint, sed quandam habeant permixtam dulcedinem, quandoque vtendum ad affectus calidos, aut non adeò frigidos, minisque frigidiores causas: cum frigida quoque sunt naturalia partes affectæ. tutius tamen erit eos prætermittere, & dulcium, seu vinosarum duntaxat vuarum vinaceis vt. vtrum verò sæpius, aut non; longiori etiam tempore: aut breuiori laborantibus sint adhibendi, ac repetendi, affectus ipsi præter naturam, earumque causæ suadebunt: necnon & agrotantium natura, seu temperamentum. Nunc latis meditationibus, ac auctoritatibus demonstrasse puto vinaceorum vsum: ac qua ratione, quibusque causis cunctis à me narratis affectibus præter naturam conferant, modò eorum curationem assequi liceat. & quos, qualisque vinaceos pro eorum sublatione quilibet ipsorum desideret. nec minus & illud ex his, quæ diximus necessariò consequitur, quod eò vtiliores, ac potiores sunt vinacei pro medendis narratis præter naturam affectibus, naturalibus balneis, ac exsudationibus siccis, Puteolanis videlicet, quibus etiam pro eisdem curandis vt consueuimus, quod vinaceorum caliditas suauior, mitior, ac moderatior, quam earum fuerit, ac semper cum adstrictione coniuncta. qua ratione affectis quoque partibus robur asferre solent. id quod in iam dictis naturalibus balneis, ac exsudationibus siccis haudquaquam perpetuò contingit. Sed iam tempus est eorum utilitates, quas ratione inueni, experientia comprobare, à me ipso inchoans, qui cum graui quodam dolore diu laborantem musculorum circa ischium, ac lumborum. qui dolor insuper ab eodem articulo non raro sumebat initium, quandoque etiam in crurum musculis, modo vno, modo alio sentiebatur: interim circa poplitem, præsertim in musculo sub eius inflexu substrato, aut in tendonibus iuxta rotulam, interdum autem tibiæ musculi afficiebantur. nonnunquam partes iuxta talum. inter cæteras autem partes sæpius dolore cruciabar eius nerui magni, qui quatuor habens principia ab osis sacri vertebis ad plantam vsque pedis distribuitur. Quamobrem nonnullis adhibitis remediis, venæ inquam sectionibus, purgationibus, fotibus, cataplasmatibus, vnguentis, emplastris, perfusionibus, denique balneis tum naturalibus, tum arte paratis, cum ab eisdem parum, aut nihil utilitatis percepissem, ad vinaceorum vsum me contuli: à quibus omnino Deo fauente fui liberatus, & vxor mea coxendicum dolore diu vexata à frigidis, crasis, lentisque succis, nec valde à cæteris medicamentis adiuta, ex eorundem vinaceorum vfu curata fuit. Excellens Troillus Spes podagra, coxendicumque dolore ex eisdem frigidis, crasisque succis orto magnopere, ac diu offensus, ex eorum vfu non parum percepit utilitatem. quamvis ob vinaceorum inopiam paucis quibusdam diebus eisdem vsum fuerit. Illustrissima quoque Caterina Sanfeluerina nuper eodem coxendicum dolore affecta ob iam dictos frigidos, crassosque humores, necnon & crurum, ac tibiæ, ob eandem causam magnam cum contraxisset imbecillitatem ex iam

dictis vinaceis maximum commodum ingentemque utilitatem adepta est, ferè omnino curata: quamvis paucis etiam quibusdam diebus eisdem via fuerit, ob eorum etiam inopiam: erant etenim eo tempore omnes ferè vindemiæ absolutæ. Magnificus item artium, & medicinarum doctor Fulvius de Bernardis à dextræ tibiarum, sinistrique cruris diuturno dolore ex vinaceorum usu prorsus liber euasit, quamvis valde extenuatas easdem etiam partes habuisset: percepi insuper excellenti Hieronymo Albertino Philippi regis intimo Consiliario dignissimo, vinaceorum usum mirum in modum contulisse: cum podagra, maximæque pedum imbecillitate laboraret. & si neque ipse, ut intellexi, nescio qua de causa diutius, neque, ut nos infra docebimus, eisdem fortè usus fuerit. licet cum me interrogasset, non aliter ut eis vteretur, præceperim. Nec defunt & alij nonnulli, qui ex vinaceorum usu magnam quoque naçti sint utilitatem pro diuersis enarratis affectibus curandis: quos breuitati indulgens iure prætermitto. illud tamen silentio non præteream, quod nuper dum hæc conscriberem, retulit excellens Marius Galeota vir aliqui prudentissimus, omniumque bonarum artium peritissimus, nec minus veritatis amantissimus, ita ut propterea non parua ei adhibenda sit fides, retulit, inquam, quod cum eius filia nomine Maria nunc in venerabili monasterio Sancti Francisci monialis, tribus, quatuorve annis, magno, ac duro amborum genuum tumore laborasset, ut ambulationis motus ferè fuerit ablatus, ex dictorum vinaceorum usu adeo perfectè curata fuit, ut exinde nullum amplius neque dolorem, neque laborem, in eisdem partibus senserit. insuper in quadam eius subdita, contrariis vinaceorum effectus se obseruasse testatus est, hæc cum diurno tempore cum crura, tum tibias maximè extenuatas haberet, motu omnino priuatas, cum paucis admodum sensu, viginti ad summum diebus vinaceis insidens, ambulare cœpit, carnemque impleri cœperunt dictæ partes eo anno. sequenti autem, cum iterum eis usa fuisset, sanitatem omnino adepta est, instauratis, quæ extenuatæ erant, partibus, articulis, ac nervis omnibus roboratis, adeo ut motum, ac sensum omnino recuperarit. ad hæc quendam inspexit genuum tumore, tibiæque extenuatione simul laborantem, qui ex eorundem vinaceorum usu omnino liber euasit: & in seipso expertus est, quod cum ex præcedenti podagrico dolore pes reliquus esset admodum imbecillis tumoreque affectus, ita, ut, cum moueretur, non parum doleret, ex usu vinaceorum, tumor, & dolor penitus cessarunt: tantumque robur inde adeptus est, ut non modo citra dolorem ambulet, sed robustior etiam altero pede euaserit. quinetiam cognoui à Cæsare Scamnapæco medico, & philosopho peritissimè magnam attulisse utilitatem vinaceorum usum Andrea Carlutio laboranti œdemate magno ac diuturno in utraque tibia, ubi ne minimam quidem ex nonnullis aliis medicamentis adhibitis utilitatem sibi comparasset. Non ab re itaque vir peritissime pro medendis omnibus præter naturam affectibus, quibus laborare percepi iam dictum illustrissimum, ac excellentissimum Proregem nostrum, vinaceorum usum commendauit: iterumque commendo, tanquam saluberrimum, valde bonum, citraque omne periculum medicamentum, dummodo eisdem, ut decet vtatur. Ad quem, et si

nullus mihi datus sit aditus, ut eidem mea opera inferuirem, nihilominus, tanquam diuinum quendam hominem existimo, ac colo, ex his, quæ in dies, prudentissimis suis operationibus, intelligo, ac experientia obseruo. adeo enim vera opinione, ac prudentia ad rectum dux est, rectèque præest, ac sapienter & iuste omnia gubernat, ut cuncti per publicam amicitiam, iustitiamque seruentur. Quamobrem nedum sanitatem, sed vitæ etiam perennitatem summopere ipsi desidero, ac exopto. Rectè denique vinaceis vtetur, si prius, quæ à me de eisdem narrata sunt, obseruentur, ac inter cetera, quod ex dulcibus visis fuerint expressi, non parum prelo pressi, ubi prius cum eorum musto efferbuerint, recentisque fuerint. ij etenim vinacei sunt, qui eidem domino magis conducere videntur, ut ex his, quæ prius differimus facillè liquet. & quo dulciores fuerint vix, ex quibus secreti fuerint, eo etiam utiliores erunt, perpenis eiusdem excellentissimi domini morbis omnibus, earumque causis, ac totius corporis temperamento, & reliquis. Modum verò usus eorum omnibus communem recensebimus, sub quo, & qui proprius & particulari huius illustrissimi, ac excellentissimi domini existit, proculdubio continebitur. Capiendi sunt vinacei modo dicti, aut reliqui, quos supra probauimus similiter recentes, preloque pressi, qui prius cum eorum musto, & non aqua efferbuerint, humique, aut conclauis pauimento acervandi. Nam multi esse debent, iique manibus adeo premendi, ac laeuigandi sunt, ut, quoad fieri liceat, partes omnes inuicem cohæreant. deinde crasis laneisque tegumens, quæ eos omnes, circumambiant, contegendi sunt, ne ex ambiente aere refrigerentur, serueturque eorum caliditas, foribus ac fenestris omnino clausis, potissimum ubi ex aliqua causa aer ambiens frigidior fuerit. Atque ubi eisdem uti velis, prius vniuerso corpore vacuato, ventrèque à cibis, aliisque superfluitatibus immuni, ac deiectis alui prius excrementis, exutus vestibus serobe quam primum longitudine, latitudine, & profunditate manibus commode parata, in eos se inferat æger, protinusque eisdem vinaceis, qui pro serobe fienda sublati sunt, contegi debet, eis moderatè manibus compressis, ac laeuigatis, & deinde laneo etiam tegumento velentur, ubi verò mediæ, ac superiores corporis partes minimè affectæ sint, satis erit eisdem vinaceis insidere, ac crura, tibias, simulque pedes affectos in eos inferre, reliquo corpore consuetis pannis contexto. At si admodum deliciosus fuerit æger, mollisque carnis, ne in partibus circa sedem labor aliquis, dolor, aut exulceratio ex vinaceis inferatur, lineum linteum duplicatū, triplicatum, aut etiam quadruplicatum substernes, super quod incideat. si verò dorso, ac scapulis solis laboret, eadem partes vinaceis immergenda sunt; crura autem & pedes haudquaquam; verum ubi vniuersum corpus fuerit affectum, fovea in vinaceis effodienda erit pro vniuerso corpore congrua, maiorque copia vinaceorum esse debet, ut eis contegi vndeque vniuersum corpus valeat, atque ita in eis, veluti in lecto iacere, puluinarum duntaxat sub capite impositor: laneo etiam tegumento superposito: id quod semper seruari debet, brachijs autem, & manibus, si quispiam afficiatur, easdem partes vinaceis obruat. hoc modo si quispiam vinaceis vtatur, utiliores erunt. At ubi admodum deliciofi sint ægrotantes, ut pueri, vel mulieres,

mulieres, aut reliqui molles carnes habentes, priusquam vinaceis immergantur, linteo lineo molli, ac veteri inuoluantur, desuperque vinacei proiciantur, manibusque premantur, ac laeuigentur: & deinde laneo, vt diximus, tegumento contegantur. Nec minus quam per media hora spatium in eis quispiam immorari debet, melius tamen erit, si hora vna permiserit. Nam cum mediocris, seu moderatus sit vinaceorum calor, exiguu tempore, si in eis permanserint, quibusdam parum proficiunt, longiori autem multum. est tamen eorum vsus omnibus semper utilis, vt dictum est, vbi probe eis vtare, sunt demum a vinaceis aegrotantes detegendi, cum congruo tempore in eis commorati sint, & in eodem coclavi cubuli parato, leuiterque exalfecto ab eisdem exurgentes iacere debent saltem per horam pannis mediocriter contecti, deinde calido etiam linteo lineo defergantur, & consuetis vestibus induantur. At cum primum ex vinaceis exurgunt, iterum iidem aceriari debent, manibusque premi, & laeuigari, & pannis contegi, vt prius, atque id quoque sequenti die, & reliquis seruandum erit, quamuis vbi robusta fuerint corpora, nedum mane ante cibum, verum etiam vesperi eisdem vti poterunt, maioremque vtilitatem afferunt, quemadmodum & ipse vsus fuit. Illud tamen animaduertas oportet, quod singulis tribus, aut ad summum quatuor diebus iidem vinacei renouandi sunt. etenim verendum est, ne post hac putrescere ceperint, eorumque mediocris caliditas deperdat, & altera immoderata superueniat, quae ambientis est, qua ratione nocumentum magis, quam iuumentum corporibus praestent. sed videbar forte oblitus esse differere, num renum dolore laborantibus, etiam fabulo, aut calculo vinacei conferant, cum id quoque a me scire desiderares. Quare priusquam huic epistulae extremam manum imponam, in hoc quoque tibi satisfacere putavi, potissimum cum in eiusmodi dolorem non raro incidere consueueris: fateor propterea, quod cum vinacei eorum moderato calore, vim habeant fundendi, laeuigandi, ac molliendi, vt prius demonstraui, admodum utiles esse puto iis, qui graui renum dolore vexari solent. Nam

cum tenuare, ac mollire praeter caetera iubeat Hippocrates. in renum dolore 6. de morbis vulgaribus: & optima res sit, tenuare videlicet humores, & renum corpora mollire, vt per ipsa transire facile humores possint: vt inquit Galenus in commento, imò si quis haec vtrique diligenter obseruauerit ab initio, calculus in ipsis nunquam generabitur. ob id non parum vinacei conducere videntur. siquidem ipsa renum corpora mollia reddunt: ac humores etiam tenuant, & fundunt eorum moderato calore: ita, vt facile per eosdem renes transire queant. qua insuper ratione & arenulae facile pelluntur. & si qui sunt calculi, eorum etiam calore molliuntur, franguntur, & demum per urinam excernuntur: roboranturque ex eis renes, ob eorundem adstringendi facultatem, quam habent. Nec quispiam dixerit, quod propter vinaceorum caliditatem calidiores fiant renes, & propterea aptiores ad calculos generandos reddantur: nam vt prius determinauimus, moderatus, ac mediocris est eorum calor. ex quo renum caliditas etiam si immodica fuerit, moderatio redditur. neque enim possent calculos generare, nisi aestuarent, & immodice calidi essent renes, vt etiam lippis, & tonsoribus, nedum medicis omnibus liquet. Qua de re non modo calidiores renes non fiunt ex vinaceorum moderato vsu, sed praeter id, quod dictum est, a lapidis generatione praeseruat, cum eius causam extenuet, ex qua fiunt, & renum caliditas immodica, quae est eorum causa efficiens, per eos obtundatur, & moderatio reddatur. vt itaque eis vtaris, consulo, omnibus tamen seruatis, quae prius narraui, praesertim vniuerso corpore antea euacuato, vinaceosque eligas vuarum dulcium, aut etiam vinosarum, non tamen multum prelo pressos, neque diutius in eis immoreris, aut multo tempore eisdem vtaris, quae, si rite seruabis, non paruam ex eis vtilitatem assequeris. & ne adeo de vinaceis nostra oratio protrahatur, vt & tuas purissimas, ac aliorum aures offendere videar, satis sit haec currenti calamo scripsisse, & meam de his sententiam explicasse: quam nedum experientia, sed validissimis quoque rationibus comprobasse puto.

F I N I S.





DOMINICVS PIZIMEN-
TIVS VIBONENSIS IN
DONATI ANTONII ALTIMARI
EPISTOLAM, DE VINACEIS.

HUc Iouis Imperijs tulerat genus omne malorum
Pandora, excelsa culmine lapsa poli.
Pellit at Altimarus morborum millia, mittens
Pharmaca muneribus nobiliora Iouis.

Quam terris igne abrepto pater altus ademit,
Cernimus hunc dulcem ferre salutis opem.

Per quem nunc primum meritas vinacea laudes,
Et Bacchus tanti muneris author, habet.

Ergo vulgetur diuumque, hominumque per aures,
Altimarum meritis exuperasse Iouem.



